



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

HIPOCRATIS
CORNARII

616

H 65

Rien rien plus commode que d'avoir en
un seul petit volume in 8°. toutes les
œuvres d'Hippocrate. en poët les
medecins, comme la Bible des Evêques.
après l'Édition grecque et latine faite
par Vander Linden, celle cy est celle
dont je fais le plus de cas. elle a sur
l'Édition de Froben l'avantage d'être
en un seul volume, et d'être imprimée
en caractères romains.

A 616
Hippocratis Col

MEDICORVM OM-

nium longe principis, opera
quæ apud nos extant
omnia.


PER IANVM CORNARIVM
Medicum Physicum Latina
lingua conscripta.

ACCESSIT INDEX RE-
rum copiosissimus.

PARISIIS.

Apud Carolam Guillard, sub Sole au-
reo, & Gulielmũ desbois, sub Cru-
ce alba, uia ad diuum Iacobum.

M. D. XLVI.



AVGVSTISSIMIS AC PRVDEN-
tissimis, honestissimisque uiris, Senatui po-
puloq; Imperialis urbis Augustæ Vinde-
licorum, Ianus Cornarius Medi-
cus Physicus, S. D.



Non alienū, nec ab re esse arbitror,
Augustissime Augustę vrbis Sena-
tus, hoc in loco, hac instituta ad
amplitudinem tuā, in Hippocratis
Coi medicine principis scriptorū,
à me in Latinā linguam trās lato-
rum editionem, præfatione, paulo
alti⁹ repetere, qualis fuerit nostro
hoc æuo rei medicę, & simul etiam
aliarum artium ac studiorum sta-
tus: qualis factus sit progressus: quantum accesserit incre-
menti: & quid de toto hoc studiorum genere sit sperandum.
Nam & necessariam esse Hippocratis librorum editionem,
lectionem, ac cognitionem, inde clarè constabit: & me hæc
vel peractorum laborū gratia, meminisse iuuabit: & qui ista
legent, non inutilem consequentur huius narrationis cogni-
tionem: & Amplitudo tua, spero, harum rerum memoria iu-
cunde afficietur, & si quid præsidij ac opis ad hæc studia cō-
seruanda opus fuerit, (sicut reuera vestram, vrbium Imperia-
lium opem desiderant ac implorant) huc libenter incumbet,
quo literę vnicum totius vitę ornamentum durent ac vige-
ant, in Germania nostra, ne si hæc corruant ac iaceant, verè
neutra vita vocari mereatur, haud secus quàm neutrum cor-
pus medicis dicitur, quod neque sanum, neque ægrotum ap-
pellari potest. Talis autem futura vita mihi videtur, vt mihi
ac familiari nobis similitudine, res omniū tristissima, & per-
petua nocte obscurior adumbretur, si horum studiorum lux
extinguatur, si literarū decus deturpetur, si robur illud, quod
& pacem, & rerum publicarum ac priuatarum tranquillita-
tem retinet, elanguescat. Quum itaque primum animum ad
medicinę studia adiicerem, magna erat bonorū & professio-

EPISTOLA

rum, & librorum penuria : adeò vt Hippocrates & Galenus medicæ sectæ optimæ, rationalis illius, principes, ne nominibus quidem suis iustis, in scholis satis noti essent, quum vulgo Hippocras & Galienus à plerisque omnibus appellarentur. Itaque quum essem adolefcent viginti natus annos, ex Petri Mosellani, viri & eruditi, & imprimis sua eloquenti facundia ornatī auditoribus. (Nam neq; hunc, neque aliū vllum vnquam priuatū præceptorem habui, post primā grāmaticā rudimenta) in literis vtriusq; linguæ eo progressus, vt non modo grāmatica docerem, sed etiam Poetas ac Oratores Græcos publicè enarrarem, plurimum mox ab initio, ab honestissimæ artis discendæ proposito decidebam. Avertebant enim me barbari scholarum magistri, & non multo expositioribus suis potiores scriptores, quibus tum medicorum scholæ pro optimis autoribus utebantur, Auicenna, Rasis, Albucasis, Auenzoar, Mesuas, & alij non citra tædium nominandi, Arabicum hominum genus. His accedebant practices scriptores superioris seculi ac illius quoque, gens per omnia inepta, sordida, ac impura, & tam spurcè latine loquens, ac tam infelicitè id quod docere vult tradens, vt penitus desperarem ex tam putidis libris fore posse, vt vnquam ad medicinæ cognitionem peruenirem, eam videlicet quam ex Hippocratis aliquot libellis, aphorismis dico, prognostico, & eo qui de victus ratione in morbis acutis inscribitur, olfecissem: & quam mihi ex Galeni aliquot libellis latinè itidem extantibus delineassem. Erant autem hi Leonicieni interpretatione, De febrium differentiis libri duo, & Copi versione sex libri De locis affectis inscripti. Et his interpretibus tum extabant quoque Hippocratici illi libelli. Ac in philosophia quidem eo tempore extabat sua lingua Plato, Aristoteles, Theophrastus, Xenophon, & Plutarchus, magno erga bona studia Aldi Manutij beneficio. Verum in medicina nihil Hippocratis ac Galeni ipsorum lingua habebatur, præter Hippocratis aphorismos, quos Philippus Melanchthon mihi communicauerat, & vnā Galeni methodum, quam Romæ si rectè memini, excusam, apud amicum quendam videram. Hic ego dum ambiguus quid facerem sæpe mecum cogitarem, tandem illud statui, quod præsens esset boni consulendum esse, donec aliquando dies

NUNCUPATORIA.

do dies meliora proferret. Proinde relictis magna ex parte Arabibus illis scriptoribus, & ex practicis quoque paucis aliquot, melioribus ut fieri solet in malorum electione, assumptis: videbantur autem tales esse, Berrutius, Gatina-ria, Guainerius: his ad prædictos libellos Hippocratis ac Ga-leni additis ac collatis, sed magno interposito interuallo, a-liquot annis medicinæ studia sectatus sum, donec cū his si-mul magister magnus artis venter persuasit mihi, ut artis pe-riculum facerem, quod iam per annos viginti quinque face-re pergo, ab eo tempore quo primum animum ad medicinæ studia, velut dixi, adieci. Quanto vero meo commodo hoc fecerim, aut etiam aliorum utilitate, non est quod multum iactem, Diligentiam meam & fidem, tum in docendo qua-liacunque didici, tum in curando qualia ars præstare po-tuit, multis cognitam esse scio. Opes velut studiorum im-pedimenta, non anxie quæsiui, & eas quoque quæ contin-gere potuissent, contempsi. Hoc nondum scio an commo-dum, aut potius incommodum dici debeat, quod totum istud studiorum priorum genus, per totos nouem annos à me tractatum, relinquere ac quasi dediscere coactus fuerim, quum iam magnam Europæ partem, rerum medicarum ex-periendarum gratia peruagatus, Basileam peruenissem. Et quod quidem incommodum hoc sit, tot horas malè collo-casse in studiis dediscendis, nemo non intelligit, etiam ex his quibus non dediscenda, sed amplectenda esse illa adhuc hodie videntur. Quod vero commodum sit, totam barba-ram medicinam à me esse relictam, & græcam assumptam, productam, & non parum per me etiam auctam, & amplia-tam, nondum persuasum esse scio plerisque, qui adhuc cum Gryllo grunnire malunt, & glandibus vesci frugibus opti-mis repertis. Profectò horum ingenia velut ineptissima, & iudicia velut nihil sani habentia auersatus, tum mox toto pectore ad Hippocratem Græcum, ac Galenum, itemque Pau-lum me contuli, paulo ante Venetiis ex Aldi itidem officina allatos: quibus etiam alienis ad tempus utebar, atque in his ita versabar, ut vel totum Hippocratem ad latinos transcri-bere me posse non desperarem, si tam magni laboris præ-mium alicunde affulsisset: nedum de Galeno ac Paulo ambi-gerem, quos faciliores esse, vel leuiter græca scientibus con-

EPISTOLA

stat: si quis modo non penitus rudis eos autores aggredi conetur. Et extant libelli duo Hippocratis eo anno à me conuersi, aliter de aere, aquis, & locis: alter de flatibus inscriptus, qui animum meum studiosis satis declararunt, quantum uoluerim medicinam illinc adiutam. Nec deerāt nobis inhortatores ad rem tentatam strenuè obeundam, inter quos magno erga optima studia merito præcipue mihi nominandus est Des. Erasmus Roterodamus, cuius etiam scripta ad me epistola extat, qua me ad constanter prosequendum id quod in Hippocratem medicinæ principem orsus essem inhortatur. Ad idem me institutū Frobenius ac Episcopus, qui prius etiam aliquot mihi commentationum fuere autores, tantum non cogeant: digni profectò propter sua in doctos homines merita, ut ab omnibus bonis viris aduersus ὁμοτίχους æmulos instar ignauorū fucorum insidiantes libris ipsorum sumptibus & industria in lucem editis, foueantur & tueantur. Quum igitur hæc mea tunc fuerit voluntas, & non omnino desperata etiam præstandi facultas, Cur, inquit aliquis ex illis, ad tot annos dilatum est, quod propter communem utilitatem, si ita est veluti ipse dicis, quam primū inuulgari oportuerat. Fatebor sanè hic quod res est. Primum quidem voluntatem meam remorata est maxima operis difficultas. Nam ut glossas & voces penitus obsoletas omittamus: ut dicendi genus breue illud, & quo velut per enigmata, innuere magis quàm significare sententiam voluit, ne producamus: adeò ut ne Galenus quidem se ex omnibus extricare valeat: ut nihil etiam dicamus de lectione varia, ac subinde à plurimis præcis Hippocratis expositioribus mutata, & temporis insuper iniuria corrupta: vel ipsa vetustatis reuertiendi senis maiestas detertere posset, ne quis familiari⁹ versare doctissima, & per omnia grauissima scripta audeat. Quod vero tantæ grauitatis, maiestatisque scriptor sit Hippocrates, idemque optimus methodi doctor, etiam Plato testatum de ipso reliquit, cuius verba ex Phædro adscribere non pigebit. Fieri ne posse putas, inquit Socrates, ut quis animæ naturam pro dignitate consideret, absque vniuersi naturæ? Si quidem Hippocrati Asclepiadarum generis credere oportet, inquit Phædr⁹, neq; corporis, citra hanc methodum. Bene, inquit Socrates, amicissime Phædre Hippocrates dicit.

NUNCUPATORIA.

dicit. Oportet tamē in super ad Hippocratē, etiam rationem expendere, & an consona est videre. Ita sentio, respōdet Phædrus, Proinde de natura cōsiderare, inquit Socrates, quid tandem dicit Hippocrates, & ratio vera? Nōne hoc modo: De cuiuscūque rei natura cōsiderare oportet, primum simplex ne sit, an multarum specierum, id in quo artifices esse volumus, & alios vt tales sint facere. Deinde si simplex est, viam ipsius cōsiderare, quam à natura habeat, ad hoc vt in aliud faciat quid, aut quam vt ab alio patiatur. Si vero plures species habuerit, his enumeratis, id quod in vna, hoc in singulis cōsiderare, quidnam à natura facere solet, aut quid ab alio pati. Consequens, inquit Phædrus, hoc est ô Socrates. Proinde methodus, ait Socrates, absque his similis est itineri cæci. Hactenus Plato. Et non sunt quidem hæc ita ad verbū in Hippocrate, sed talis est omnino doctrinæ methodus libri De natura hominis inscripti, vt de nullo alio loqui hîc videatur Plato: quanquam similis methodus etiam in aliis huius viri scriptis genuinis esse videatur. Quare quum hactenus reperti sînt, qui Platonem, qui Aristotelem, qui Theophrastum, qui reliquos Græciæ philosophos ac scriptores, ad Latinos conuertere aggressi sînt, & aliquid operæ precij præstiterint in Hippocrate nemo hoc feliciter tentauit, ex toto, vt ne in minutissimis quidem libellis aliqui satis aptos artifices se declarauerint. Non igitur nihil est quod & nos de difficultate huius scriptoris queramur, qui hactenus omnes ex æquo à se auertit: etiam si nunquam ex toto à nobis desperatum sit, fore vt aliquando omni difficultate superata, Latinus à nobis factus Hippocrates legatur. Accessit ad hanc difficultatem alia remora ex temporum infelicitate. Quum enim per viginti fermè iam annos medicina Græca reuiuiscere cœperit: reducti sînt Hippocrates, Galenus, Aetius, Paulus, Dioscorides: & hi non sua solum lingua, sed Latini etiam magna ex parte (vno Hippocrate hactenus saltem excepto) tum per doctos aliquot viros, tum per nos quoque facti, tamen ea est seculi infelicitas, vt nemo tantæ artis, quæ ipsam etiam vitam, qua nihil homini preciosius esse potest, cōseruat: pretium agnoscat. Vidimus ardens primum studium multorum circa linguas addiscendas: deferbuit hoc paulatim. Vidimus maximum studiosorum cōcursum ad discendā theologiam,

EPISTOLA

quum primum in Germania sincerior pietatis doctrina illucesceret: Durauit hic aliquot annis. Transitum est ad studium Iuris ciuilib: Nec puto vllō vnquam tempore tot fuisse studiosos, qui leges Imperatorias sequerentur, aut doctorum titulis insignirentur. Sola Medicina vbique contempta iacet, frigent gymnasia, torpent professores, ars ipsa in ætate abiit, & non nisi apud delyras aniculas, & recutitos Apellas, & eos qui multorum periculis de sua ignorantia experimenta faciunt, eius vsus quæritur: paucis quibusdam bonis medicis non in vsum publicum, sed in priuatum sibi thesaurum, vera medicinæ studia possidentibus. Quanquam ego quidem grauiorem adhuc, ac similem timeam optimæ arti ruinam, si continget vt altius aliquando euehatur, qualem videlicet Christianæ religionis studium pertulit, & qualem iuris scientia minari videtur. Sicut enim dum pij aliquot viri euangelium Christi purum ac sincerum reducere conati sunt, factum est vt apud plerosque Christus penitus fabula factus sit, & parum adhuc in paucorum cordibus hæreat: Ita ex magna iuris scientia eo peruenitur, vt ius sit in armis ac vi positum, vt sint qui quiduis sibi licere adstruant, adulterare, scortari, prædari, prodere, rapere, agere, capere, & cœlum ac terram miscere, modo apex sit in iure scripto, qui vt ipsorum cupiditatibus inferuiat cogi possit: quomodo summum ius summam iniuriam esse, iuxta vetus adeo verbū, atque ita omnem optimarum legum doctrinam, vsū ac necessitatē intercidere, nemo non sentit. Atque vtinam non similis casus maneat rectissimum medicinæ studium, si quando etiam hoc ad summum adductum fuerit: & ex scholæ vmbra, ad publici exercitiij theatrum productum. Sed quis prohibere potest malos vt ne sui similes sint, in quocunque studiorum genere peruertendo? & ea quæ ad multorum salutem inuenta sunt, partim per ignorantiam, partim ex malitia, ad perniciem abutendo? Propter tales cessandum à nobis non est, vt non optima faciamus, doceamus, ac in lucem proferamus, & artem per se optimam ad summum statum euehamus. Nos certe vt quod possumus huc conferremus, & vt & ocij, & negocij nostri ratio publicè omnib⁹ constaret, sepe in partialib⁹ editis libellis promissum sæpe repositum sæpe repetitū Hippocraté nostrū Latinū tandē etiam his infelici-

simis

NVNCVPATORIA.

finis temporibus, quibus præter ea quæ iam relata sunt, omnia perpetuo metu consternata grauantur, insidiis pertentantur, proditionibus obtinentur, bello expugnantur, incendiis consumuntur, edere volumus atque hunc inæstimabilibus laboribus, & non leui sumptu ac rei familiaris iactura, perpetuis quindecim annis absolutum. Non quòd hos totos in hoc solum opus impenderimus: hoc enim verè esset suo sibi iumento malum accerfire: sed quòd nunquam hanc curam reiecerimus huius quoque operis absoluendi, dum illa partim de Græcis plurima translata, partim à nobis scripta ac commentata, in publicum emisimus. non omnino nulla nostra priuata vtilitate: Fatendum enim & prædicandum quoque hoc est, quum & magnorum principum, & præclararum vrbiū, magnificentiam ac liberalitatem sumus experti, & ad hæc præstanda quasi fomite quodam coalti, ac prouecti. Superauimus autem hanc operis difficultatem, tum sæpe repetita Hippocratis lectione, tum locorum subinde a libi ab ipso Hippocrate repetitorum collatione, tum perlecta denuo tota Galeni Græca ac Latina editione, eo studio vt totum aliquando editurus sim Galenum, aliqua parte ex mea translatione, & reliquis itidem versionibus ad veram Græcam lectionem correctis. Et profecto longum esset hic declarare, quibus rationibus inductus, multa ex lectione Aldini, plurima præter lectionē Frobeniani exemplaris, à nobis ad multa manuscripta exemplaria collati ac editi, in hac nostra Latina Hippocratis cōuersione mutauerimus. Statuimus autem huc impendere quinquennium plus minus, vt si deus vitam tamdiu prorogarit, totius nostræ conuersionis ratio ac aliqua expositio extet, in diurnaliorum siue coniecturarum libris, tot à me scribendis, quot omnino existunt libri Hippocratis scriptorum. Interim tamen hunc præcipuum nobis fuisse scopū, studiosos omnes non exlabimus, quem etiam pro iustissima lege Galenus agnoscit, dum sic scribit: Hæc, inquit, Lex mihi in exponendo ac interpretando obseruatur, vt vniuscuiusque scripta ex illo ipso declarentur & non vanis opinionibus, & pronunciata citra demonstrationem sententia quisque quicquid velit deblateret. Hanc legem nobis in scopum, in Hippocratis libris Latinè conscribendis proposuimus, & omnes obscuros locos, collatione ad
alios

EPISTOLA

alios facta, vbi hoc fieri potuit, exposuimus, reddidimus ac expressimus, multis immutatis, non paucis reiectis, plurimis apposis, quæ nec in impressis, nec manu scriptis codicibus ita habentur: sed tamen vt alicubi vestigia veræ lectionis etiam ex illis odorati sumus. Quorum omnium iusto opere à nobis ratio reddetur. Atq; hæcenus suffecerit protulisse me studiorum nostri æui statum, progressum ac augmentum, & præcipuè rei medicæ. Cuius primum, summum ac maximum authorem, tandem ego Latinis hominibus non minorem, sed aliquanto, nisi penitus fallor, meliorem quàm Græcis extat legendum produco, edo ac publico. At ne ego mihi tanti, beneficij publici gratiam expetere videar, aut ne tanti authoris ac operis patronum præstare me posse, aliunde confidere puter: ad te augustissime Senatus Augustane confugio. Tux amplitudini hanc authoritatem defero, Tux erga literas & literatos benignitati hanc gratiam deberi confiteor, quòd Hippocrates Latinus noster publicè extat, habetur, legitur: quòd rebus mortalium iuuandis opus expositum est, vltra duo milia annorum ab omnibus in Latina lingua desideratum. Nec verò videri possum aut velut ignotus, aut temerè, ad tantorum virorum præsidium confugisse, dum in publice recepto illo more dedicandorum ac consecrandorum librorum, ad vos viri Augustèsses me recipio. Nam quum vestra respubl. per omnem non modo Europam, sed orbem terrarum celeberrima sit, à bonis legibus, à probatis ac grauib. moribus, à seuera in malos animaduersione, à clementi erga bonos benignitate, à pientissimo religionis cultu, ab ingenti erga literas & bona studia fauore, à doctissimis cōsiliòque ac prudentia præstantissimis viris, videri non debeo temerè magis quàm recto iudicio, ad tam augusti senatus, ad tantorum virorum tutelam, Hippocratis & pariter meum opus attulisse. Nec ignotus ego vobis esse possum, cui⁹ scripta ac opera tot principes viros, tot claras vrbes fouere ac tueri nondum, quod sciam, pœnituit. Hic non referam quibus viris semper respub. vestra floruerit. Non recēsebo Fuggaros, non Paungartneros, non Ilfungos, non Vuelsēros, non Herēbrotios, non alias magnas familias principum opes adæquantētes, & simul pietate, prudentia, fortitudine, magnificentiaque ac summa liberalitate præstantes. Non dicam de Monopoliorum

NUNCUPATORIA.

apoliorum apud vos extantum vtilitate, per quæ fit vt Germania ab hominibus sub polo Antartico habitantibus, & ab ipsis Antipodib⁹ mercimonia, in quotidiano vſu habeat. Non dicam de plebis ſedula opera, & laudatiſſimis operibus, vnde linei generis, biliciorum, triliciorum, quadriliciorum variis texturis, multiplicibus tincturis, non modo Germania, ſed omnes exteræ etiam nationes redundant. Nec dicam de vrbis magnitudine, ſplendidis extruccionibus ac ædificiis, & populofitate, quæ vt peculiare laudes vrbium ſunt, ita & loci optimum ſitum, & terræ, ac naſcentium omnium copiam ac vbertatem coarguunt. Verum ſtudium veſtrum circa literas, bonas artes, pietatem ac rectam religionem conſeruandam non tacebo. Quum enim videretis ſtudiorum omnium fluctuationem, ſurſum deorſum omnia iaſtari, in præcipiti omnes linguas, artes, ac diſciplinæ conſiſtere, nullo vnquæ tempore plures in omnibus ſcriptores extitiſſe, partim ſua magnificè iaſtantes, partim aliorum & veterum quoque ſcripta damnantes: Vos optimos ſemper apud omnes recte ſentientes habitos authores Græcos, magna copia per occaſionem nuper aded vobis oblatos non neglexiſtis, ſed velut rem reipub. imprimis vtilem, eorum opera ac libros comparatiſtis, comiſtiſtis, ac pro ingenti theſauro, velut reuera eſt, repoſuiſtis, habetiſtis, & poſſidetiſtis: non tamè vt priuatâ vtilitatem hinc vobis quærat, ſed vt publicum bonum iuuetis, vt ſi opus ſit, inde rebus humanis ſubſidium afferatiſtis. Neq; enim quicquam ad reſpub. optimè inſtituendas ac retinendas, vtilius eſt bonorum virorum bonis ſcriptis. Sicut contra mera peſtis eſt, quæ ex malis malorum libris hauritur. Rectæ enim artes, boni mores, optimæ diſciplinæ traduntur ac ſeruantur in bonis libris. At ſine rectis artibus, ſine bonis moribus, ſine optimis diſciplinis, & in ſumma, ſine literis vita non eſt vita cenſenda, velut ſupra ab initio dixi, & vetus illud chaos, rudis indigeſtæque moles reduciſtur. At vos ſanè in illo librorû Græcorum theſauro veſtro, non vnus alicuius liberalis artis aut diſciplinæ authores habetiſtis, ſed ex tota philoſophia, medicina, mathēſi, ac Theologia optimos, & eos neque hæcenus typis excuſos, neque multis aded adhuc viſos, immo ne nominibus quidem plerique omnibus notos, & fortaiſſis nuſquam alibi extantes, velut ex indice cognoui, quem multarum re-
rum

EPISTOLA

rum vſu ac experiētia clarus medicus apud vos Geryon Seilerus ad me miſit. Immo non modo indicem hic amicus noſter miſit, ſed quæ veſtra eſt viri Auguſten. erga reſta ſtudia benignitas, de vobis eorum librorum etiam vſum mihi promiſit, multa ſimul de veſtra magnanimitate, ac magnifica voluntate mecum loquutus, ac mihi pollicitus. Quamquam autem antea mihi virtutum veſtrarū gloria non ignota eſſet: (Qui enim ignota eſſe poſſit, quæ per totum orbem decantata eſt?) tamen eo referente plura cognoui, & propi⁹ introſpexi, quàm antea ex auditu & aliorum ſcriptis intellexeram. Acceſſit ad huius narrationem vir excellenti iuriſcientia, & eximia prudentia præditus Claudius Peutingerus, clariſſ. iuriſconſulti Conradi Peutingeri filius, non modo in paternis virtutibus referēdis, ſed in maximis etiam rebus ac negotiis, pro patria obeundis ac gerendis, non iam ſpem, ſed ipſam rem præſtans. Cum hoc viro ante paucos annos mutua aliqua cognitio mihi interceſſit, quæ ſanè iudicium de vobis meum confirmavit, & in id conſilij me adduxit, & breuiter effecit, vt non dubitauerim Hippocratē hunc latinum meum ad vos deferre, vobis inſcribere ac dedicare. ære ac libra veſtrum facere. Cæterum erunt fort. aſſis qui vel hoc nomine Hippocratem à nobis latinè conſcriptū impetent, quòd præſtiterat græcum legere, ac ſatis fuerat græcum extare. His ſanè larga data eſt eius rei faciendæ etiam per me copia. Nam & Græcum exemplar per me editum ex Frobeniana officina, non paucis locis melius ac correctius eſt quàm Venetum. Et ſi vere Hippocratis ſtudioſi ſunt illi, non pœnitebit ipſos vel ambo coemere, habere, ac legere, immo etiam plura inquirere, quo tandem emendatiſſimus ſua lingua loquens Hippocrates habeatur. Quin & ego ſemper ita ſenſi, melius eſſe quosuis ſcriptores in ſua lingua, qua ipſi ſcripſerunt legere, quàm optime etiam in aliam tranſlatos. Sed quid facient hi qui Græcum non intelligunt? Antea oſtendi huius autoris difficultatem, breuitatem, & ænigmatis ſimilem obſcuritatem. Quandiu vero expectandū nobis eſt hoc ſæculum, in quo medicinæ ſtudioſi ex æquo omnes ad legendum ac intelligendum Hippocratem Græcū ſufficient? Eſſe autem Hippocratem talem rei medicæ autorem, vt ſine ipſo res medica integrè conſiſtere non poſſit, &
ſæpe

NUNCUPATORIA

ſæpe aliàs dixi, & nunc non minus aſſeuerantiſſimè affirmo
Torus enim Galenus omnem ſuam doctrinam ad Hippo-
craticam methodum, velut ad amuſſim direxit. Idem fece-
runt & ante, & poſt Galenum, optimi quique tum medici, tū
philophi, vt ineptiſſimos pariter ac indoctiſſimos ſe eſſe
declarauerint, qui vnquam ab Hippocrate deſciuerunt, aut
ipſius dogmata impetiuerunt, quorum multos adeo in libris
ſuis hinc inde, ex omni occaſione Galenus reuellit, ac explo-
dit. Demus autem hoc ſæculum ſpem nobis iniicere de futu-
ris. Nam reuera nullum antea fuit, in quo per omnem fermè
Europam pariter vtriuſque linguæ cognitio in tantum ali-
quandiu floruiſſet. At quid vetat, aut quid adeo obſuerit, hæc
etiam acceſſionem linguæ latinæ contingere, vt Hippocra-
tes Latinus pariter & Græcus legatur? maxime quum etiam
Græcus ex noſtra Latina interpretatione clarior euadat, &
expoſitionis Græci vicem Latin⁹ ſupplere poſſit. Verum mi-
hi, velut antea quoque dixi, videntur omnia nunc ingenia,
omnes artes ac diſciplinæ in ſummo ac præcipiti ſtare: atque
vtinam ſic retinerentur, non retro vt ruerent, & eſſet aliqua
ſaltem ſpes in paucis, qui in poſterum ſuis magiſtris diſcipuli
euaderent præitantioreſ. Ego proſectò quum multis annis à
ſcholis abſuerim, à docendi munere abhorruerim, ſtudiis
meis ad ſcribendum, & ad exercendam medicinam colla-
tis: proximum fermè triennium rurfus profeſſor medicinæ
conſumpſi, non omnino ſurdo ac muto auditorio, in Heſ-
ſorum ac Cattorum principis Academia Marpurgenſi. Sed
vt verum apertè fatear, longe infra meam ſpem, & infe-
riore ſucceſſu quàm Illuſtriſſ. Herois Philippi Heſſorum
principis, vel erga me, vel erga ſtudioſos, magnifica libera-
litas depoſcere videtur. Non tamen deſunt huius rei cau-
ſæ. Plerique omnes fugimus immenſum ſtudiorum laborem,
delicias ac voluptatem in his conſectamur. Itaque vel quan-
tum iucundum eſt, vel minime moleſtum, didiciſſe ſatis eſſe
putamus. Alij ad ea ſtudia ſe conferunt, vnde quàm breuiſſi-
mo tempore, ac minima impenſa aſſequantur, quo ventri ſit
conſultum, & πρὸς τὰ ἄλφια reſpiciunt, non cogitantes ple-
runque quàm ſint ad ea tractanda appoſiti. Medicina vero
requirit naturam idoneam, à puero institutionem, doctrinā
linguarum, literarum, philoſophiæ, mathematicum, & totius
naturæ

EPISTOLA

naturæ cognitionem : multam insuper industriam ac diligē-
tiam, locum studiis conmodum, & longissimum etiam tem-
pus. Si non hæc sunt quæ studiosos à Medicina auertunt, li-
benter patiar alium potiores causas afferre. Ego Hippocrati
in libro De lege hæc referenti accedo. Detineo amplitudi-
nem tuam Augustissime Senatus lōgius quàm proposueram:
Vnum si adhuc retulero dimittam. Non conatus sum in hac
mea translatione Ciceronianus videri, non quòd omnino
improbem hoc nouæ sectæ hominum genus, qui per omnia
Ciceroni in dicendo similes fieri student: aut quòd penitus
negem fieri posse, vt omnes artes ac disciplinæ, Ciceronis
dictione in imitationem assumpta ac seruata, tradantur. Sed
vt simpliciter dicam, primum quia non placet. Deinde quòd
videam magna ex parte longum & inutilem laborem, & po-
stea etiam omnibus factis, conatum infelicem, ac successu ca-
rentem, quo plerique ex illis referunt Ciceronem, non ali-
ter quàm Nero princeps Catonem, aut vt vicinius comparē,
cuculus lusciniæ. Accedit his seruilitas & mancipatio, nul-
lam linguæ, immo ne cogitandi quidem diuersum aliquid, li-
bertatem relinquens. Et quando definemas esse turpicula
simiæ, pulcherrimum hominum genus creati? Sed oportuit
hoc quoque ad reliqua seculi incommoda accedere, vt habe-
remus qui non solum loquendo ac scribendo, Ciceronis si-
miæ vt essent, se excruciant, sed etiam Græca omnis gene-
ris scripta in Latinam linguam conuertendo, tanta sui man-
cipatione, vt si modo Ciceronis verbis vndique conquisitis
loqui videantur, etiam à sententia subinde excidere nec ve-
reantur, nec animaduertant: quasi magni adeo referat Cice-
ronem ita exprimere, & quasi nemo alius bonus Latinus scri-
ptor extet, quem sequi oporteat, ipso etiam Cicerone, si co-
gnoscat, risuro suos κακομήτας, præsertim si quomodo se ad
Lelios, Scipiones, Terentios, atque alios composuerit, in me-
moriā reuocet. Et tamen hic nihil dicam de his rebus quas
medicus tractat, quas ne ipse quidem Cicero Ciceroniane
eloqui posset, etiam si à Medico de his edoceret: quum sa-
nè aliàs non multus sit in rerum naturæ tractatione, nimirū
intra morales ac rationales philosophiæ limites conclusus. At-
tum demum Simia vere simia est, quum etiam supra hominē
præstare quid molitur. Hoc itaque agant hi quibus istud pla-
cet, ac

NUNCUPATORIA.

est, ac datum est, ego neminem prohibeo. Sed sic sentio, Hippocratem istos fucatos ornatus auerfari, & amare ut sicut in sua, ita in omni lingua, brevis & verbis, & sententiis, & tamé plenius ac grauis, clarus item ac dilucidus, quantum ad eius ætatem posteris assequi datur, & quod potissimum est, rectus legatur. In hoc si quid præstiti, quod volui sum assequutus: nec est quòd verear villos nasos, vel *ῥινοκίρωτας*, quantumvis in cornu exacutos. Quo vero sciant studiosi aliquam huius operæ à nobis transactæ partem, Habent in hoc nostro Latino Hippocrate librum De aere, aquis, & locis, duplo aucti, & nisi fallor integrum: Habent libri De capitis vulneribus principium, quod in Græcis codicibus impressis deest: Habent librum verum *μοχλικόν*, id est Vectiarium eundemque De ossibus inscriptum: quæ omnia in græcis exemplaribus partim desiderantur, partim alieno loco posita, iustis locis restituta sunt. Quorum omnium gratiam ut vobis viri Augustenses, medicinæ studiosos debere volo, ita nec pudebit, nec pigebit vos, spero, summum medicum Hippocratem vestra autoritate tutum, vestro fauore commendatum, in publicam vtilitatem, & meæ erga Augustissimum Senatum voluntatis declarationem, vobis inscriptum ac dedicatum prodiiisse. Valete viri magnifici. Marpurgi Hefforû. Calend. Septembribus. Anno Christi M. D. X. L. V.

INDEX LIBRORVM IN HOC volumine contentorum.

Hippocratis vita ex Sorano folio.	De natura hominis.	23
Hippocratis Iusiurandum.	1 De salubri diætâ, Polybi.	29
Lex Hippocratis.	2 De genitura.	31
De arte liber.	3 De natura pueri seu fœtus.	
De veteri medicinâ.	4 34	
De medico.	8 De carnibus.	44
De decenti ornatu.	16 De septimestri partu.	48
Præceptiones.	18 De octimestri partu.	52
	21 De superfœtatione.	53
	De exc-	

INDEX

De exsectione foetus.	58	morbis mulierum adiecta.	
De dentitione.	59		298
De corporum resectione.	60	De sterilibus.	301
De corde.	61	De morbis popularibus. lib.1	
De glandulis.	62		310
De ossium natura.	65	Liber secundus.	320
De locis in homine.	71	Liber tertius.	328
De aere, aquis, & locis.	83	Liber quartus.	338
De flatibus.	94	Liber quintus.	344
De medicamentis purgantibus.	98	Liber sextus.	354
De diæta siue victus ratione, lib.1.	98	Liber septimus.	363
Liber secundus.	108	De victus ratione in morb. acut.	379
Liber tertius.	118	De iudicationibus.	396
De insomniis.	124	De diebus iudicatoriis.	399
De alimento.	128	Prænotiones.	401
De humorum usu.	130	Prædictionum, liber primus.	
De humoribus.	133		408
De morbo sacro.	137	Liber secundus.	413
De morbis, liber primus.	143	Coacæ prænotiones.	423
Liber secundus.	154	De vulneribus capitis.	444
Liber tertius.	172	Chirurgiæ officina.	450
Liber quartus.	180	De fracturis.	454
De affectionibus.	192	De articulis.	469
De internis affectionibus.	203	De vlceribus.	498
De virginum morbis.	224	De fistulis.	503
De natura muliebri.	225	De Hæmorrhoidibus.	505
De morbis mulierum, liber primus.	242	De visu.	507
Liber secundus.	273	Aphorismi.	508
Notha ad finē primi libri de		Hippocratis epistolæ.	520

FINIS.

INDEX COPIOSISSIMVS IN opera Hippocratis.



A Abortus grauiore quam partus. 263.f	A Abortus plurimi in primis qua- draginta diebus. 49.b	A Acetabulorū vteri pituita ple- norum curatio. 258.a	
A Abortus deformes quando fiant. 37.f	A Abortus sanatio. 268.c	A Acida pituitosa. 81.e	
A Abortus varix caussæ. 251.a	A Abcessus tabidorū qui me- liores. 416.c	A Ἀποχρεῖν. 116.f	
A Abcessus Iunioribus, quar- tanæ seniorib⁹ magis fiunt 407.c	A Abcessus quo tēpore magis fiat. 407.c	A Acyli. 114.c	
A Abcessus circa aures. 405.d 411.d.e	A Abcessus circa aurem. 398.b	A Acuti morbi iudicium. 397.a	
A Abcessus in febribus. 134.e	A Abcessus boni. 320.f	A Ad hominis generationē se- men ex omnibus & viri & mulieris membris ma- nat. 180.c	
A Abcessus humorum quid fa- ciat. 357.c	A Aceti facultas. 132.a.b.113.a	A Admonitio sufficiens, rerum omnium vicissitudo. 528.f	
A Acetum multum quibus de- tur. 76.c	A Acetum multum in morbis acu- tis quale esse oporteat. 386.b	A Ad mulierē parere nequeun- tem medela. 305.d	
A Acetū multum in morbis acu- tis quale esse oporteat. 386.b	A Acetum biliosis magis con- fert. 386.c	A Adolescens in foro decum- bentis historia. 330.c	
A Acetum mulieribus magis q̄ viris aduersatur. 386.c	A Acetabulorum pituita pleno- rum curatio. 229.a	A Adolescēs in Melibœa ex ve- nere calfactus mortuus. 337.d	
		A Adolescēs multo meraco po- tus perit. 352.f	
		A Adstringētia & corroboran- tia. 199.e	
		A Aegri quæ sibi nocent quàm quæ iuuant assumere ma- lunt. 5.f	
		A Aegri. 4. signis seruantur. 314.c	
		A Aegris non semper creden- dum. 7.c	
		A Aegro petenti omnia, modo non noxia, danda. 200.c	
		A Aegrorum varix historiz. 366.367.368.375.	
		A Aegrotorum sedecim narra- tio. 333.c	

†† Aegroti

INDEX

- Aegroti variis morbis corre-
 pti. 321.e.f.322.a.d.325.a
 Aegrotus quis. 24.f
 Aegroti cur non parcant. 5.f
 Aegrotum quæ vexent. 23.e
 Aegrotantis ac medici error.
 259.d.e
 Aegrotantis cupiditas. 22.d
 Aegrotantium varia historia.
 338.a.b.339.&340.341.
 Aegrotantium victus. 202.f
 Aegrotorū quatuordecim va-
 rie agitatorū historia.316.b
 Aegrotorū duodecim histo-
 ria. 328.b.329.330.331.
 Aequinoctium. 118.c
 Aes optimum. 105.e
 Aesculapi⁹ & Hercules in ho-
 minū vtilitatē nati. 538.f
 2.d
 Aestatis transmutatio. 337.e
 Aestas & hyems in fracturis
 quid possat. 464.d
 Aestas bilem, ver autem san-
 guinem parit. 136.a
 Aetatum singularum morbi.
 512.a.b
 Aetatum & locorum differē-
 tię. 417.a.b.106.e
 Aetas sana & morboſa. 106.
 a.b
 Aetati cuiq; cōueniētia.106.c
 Aetatum cognitio. 106.d
 Aetas omniū morborū capax
 quæ. 439.c
 Aetatis cuiusq; vitia. 529.f
 Aetates tabi obnoxia. 436.e
 Aegyptiæ terræ benignitas
 & fecunditas. 51.c
 Aegyptij iter se similes. 90.e
 Aegyptij & Libyci Asiaticis
 similes. 89.b
 Affectus morbo neapolitano
 similes. 332.a
 Affectuū variorū causa. 11.c
 Africani cur nō sanarentur.
 137.f
 Aglaïdæ filia. 314.f
 Alia contrariis alia similibus
 curātur. 80.f
 Alimentum vnde tale. 129.b
 Alimentum hominis, humor
 leuis. 188.b.c.d
 Alimentorum vnum genus,
 species vero plures. 128.d
 Alimento copiosiore qui e-
 geant. 509.c
 Alimenta plura qñ & quare
 adhibenda. 509.c
 Alui secessus quos enecaue-
 rit. 332.f
 Alui liquidæ curatio. 389.f
 Alui fluxus varij. 311.e.312.c
 408.b
 Alui profluvia. 420.c
 Alui egestiões. 397.d.f.403.c
 Alui solutio. 395.f.298.f
 Aluum subducentia. 158.d
 Aluus plena, vel vacua quid
 efficiat. 189.a
 Aluus turbata, quibus sit ma-
 lum. 145.f
 Aluus nimis soluta hominem
 enecat. 176.e
 ἀλινδης. 116.f
 Allij natura. 393.e.113.b.201.f
 Alumen melium. 500.f
 Amphictyones populi. 555.cf
 Amygda-

INDEX.

Amygdala.	114.c	tix.	112.c.d
Anaxionis Abderitani histo-		Animas vnà cum corporibus	
ria.	335.d	purgandas.	525.c
Anaxyridæ.	92.e	Anni partibus morbi proprij.	
Andreas Hippocratem infam-		511.c.512.a	
mauit.	1.c	Anni constitutiones quæ sa-	
Androgyni. i. effceminati.		lubriores.	511.c
105.b		Anni quatuor partes.	118.d
Anethum.	113.c	Annus ois, particeps. 4. qua-	
Anhelationis muliebris cu-		litatum.	26.c
ratio.	238.c	Antiquorū ac recentiu mor-	
Angina eiusq; signa.	174.c	borum curatio.	79.c
Angina siue Cynanche.	155.f	Antilochus & Aleuas.	321.d
159.c		Antiphonis ægri historia.	
Angina & eius curatio.	78.f	313.c	
79.a.299.b		A pituita in aquā inter cutē	
Angina qñ fiat.	388.f.389.b	transitus.	211.c
Angina secūda & ter.	160.b.c	Apium.	113.c.202.a
Anginæ vexatio.	360.c	Aptha & ei⁹ curatio.	165.e.f
Anginæ varietas.	406.f.359.f	Apollonij Abderitani histo-	
Anginæ lippitudinis, & ītesti-		ria.	336.e.f
ni vulnerati curatio.	327.f	Apollo nomius.	138.c
Anginosa cur moritur.	353.f	Apollinis responsum.	536.a
366.c		Ἀποπληξία.	64.d
Anginosorum affectus.	323.a	Apoplexiæ vel Syderationis	
Aīa admiscetur animæ.	105.c	causæ.	97.c
Aīa similitudo cū carbonib⁹.		ἁπορία.	14.c
105.c		Apparentia quo tēpore fiat.	
Anima in somnis vigilans nō		325.d	
est sui iuris.	124.f	Apparitiōes in somnis.	517.f
Aīa hoīs vsq; ad mortē sem-		Appendices.	72.f.72.a
per producitur.	358.c	Apprehensio venarū brachii.	
Anima quales ab æthere sūt		17.f	
fluxus somniat.	126.d	Aqua potabilis.	130.c
Animæ hoīs qualitas & tem-		Aqua in morbis acutis.	386.c
peramentum.	101.d	Aqua curādis vulnerib⁹ qua-	
Animalia quibus cōseruetur.		lis.	452.c
135.c		Aque leuioris cognitio.	322.c
Animaliu & carniū differē-		Aquæ potus.	115.f
		†† ij Aquæ	

INDEX.

Aquæ facultas.	112.f	Argumētis septis probat potū	
Aqua calida oculis utilis.		in pulmones non decerra-	
132.c		re.	191.f
Aqua frigida qb ^o pfit.	132.c	Aristoteles & Plinius taxan-	
Aqua cœlestis.	179.c	tur.	43.a b
Aqua cur hyeme calida, æsta-		Aristochidis ægri historia.	
te frigida.	41.a	313.c	
Aqua fontis profundi qualis.		Arithmetica vsus.	532.f
41.b		Arteria & vena caua.	45.b
Aquæ quæ morbosæ, & quæ		60.d. 66.d. 67.b. 68.c	
salubres.	85.c	Arteria vulnerata & curatio.	
Aquæ palustres.	85.c	166.c	
Aquæ potoribus familiares		Arteriæ conuulsæ curatio.	
morbi.	85.d e	204.b c	
Aquæ optimæ.	85.f. 86.a	Arteria magna ventrē & in-	
Aquæ salsa.	85.f. 86.b c	testina depascitur.	62.b c
Aquæ pessimæ.	86.a	69.a. 435.c	
Aquæ pluuiiales	86.c d	Arteriæ à rene ortæ.	326.b
Aquæ ex niue & glacie oēs		Articularis morbus eiusque	
malæ.	86.f	curatio.	198.c d
Aquæ inuectitiæ.	87.b	Articuli pulmonis cōuulsi &	
Aquarū robur ex vëtis.	87.b	curatio.	167.2
Aquarū per sōnū bibere quid		Articuli manus.	73.2
significet.	128.a	Articuli pedum.	73.c
Aquarū & ciborum qualitas.		Articuli parui ī corpore	73.c
358.a. 83.d		Articulorū generatio.	46.b
Aqua iter ^o ab hepate & sple		Articulorum tumores.	132.d
ne cum curatione.	212.d e f	Articulorū curatio & repofi-	
213.a b c d		tio.	493.a. 495.c. 497.a
Aquæ inter cutē caussa.	212.a	Ars quid.	19.d
Aquilo qualis & Auster.	141.	Ars exercēdi corpora & me-	
c f		dicina contrariæ.	79.d
Arbor quī plantetur, & cre-		Ars tā nocētibus q̄ etiā iuua-	
scat.	39.f	tibus cōprobatur.	5.c
Arbor multum tenera fructū		Ars vaticinandi & medicina	
non producit.	40.d	fere similes.	103.a
Arcturus.	88.d. 311.c. 313.f	Artes quæ probandæ.	19.a
Arcturi ortus.	118.b	Artis medicæ magna pars iu	
Archigenes.	136.f	dicium.	337.f
		Artium	

INDEX.

- Artium variarū partes & officia. 103.a b
 Artificum differentia. 380.a
 Ascarides quando magis videntur. 320.c
 Ascaridum eiectionio. 293.a
 Asiana pulchriora & maiora. 88.e
 Asianorum genus cur imbelles. 90.b
 Asianorum & Europæorum differentia. 90.a
 Asiatici imbelles & effœminati. 89.a.90.a b
 Asparagus. 113.d
 Aspretudines culicum moribus similes. 323.f
 Astra visā per somnū splēdida quid significant. 126.c
 Astrorum cognitio necessaria medico. 100.a
 Astrorum exortus. 88.d
 Astrorum observatio utilis medicinæ. 83.c
 Astrorum iudicium. 126.f
 Atheniensiū. 2. historia. 346.b
 ἀτὲλῆς. 5.c
 Atra bilis qualis. 28.f
 Attenuatio vnde. 185.a
 Attoniti siue stupidi. 107.d
 Atriplex. 113.d
 Auditus quī fiat. 47.a.71.c
 Auena comesta. 111.b
 Aures purulentæ. 64.e
 Auriculæ fractura. 480.c
 Auris dolor quando lethalis. 406.d
 Auris incisa curatio. 480.f
 Auriū doloris curatio. 74.e
 193.c.358.d
 Aurifices. 103.e
 Auster à similib. Boreæ natura regionibus spirat. 109.d
 Austri facultates. 109.e
 Autumnus lethalis. 313.b
 B
 Balnea quibus profint. 387.d c
 Balnea calida. 115.b.29.f.124 a b.201.f
 Balnea frigida. 115.c
 Balneorum vsus. 387.b
 Barbarorum victus ratio. 9.f
 Beta refrigerat. 123.e.113.e
 Biduum sine cibis vivitur. 184.d
 Bilis & pituita homini cōgenita. 144.b
 Bilis corpus possidet. 26.b
 Bilis educio. 300.b
 Bilis, sanguis, pituita quomodo fiant. 180.d
 Bilis per æstatē effectus. 135.e
 Biliosæ ac pituitosæ mulieris signa. 305.d
 Biliosi lassitudine affiguntur. 74.a
 Bionis ægri historia. 313.d f
 322.f
 Bitonis ægri historia. 330.e
 Blitum. 113.c
 Bona vel mala à medico facta. 146.a b
 Bonis aut malis præter rationē factis nihil credendum. 510.c
 Boreas frigidus. 109.c
 Botri. 114.b
 † iij Brachij

INDEX

- Brachij fracti coaptatio. 457. b
 Brachij caput. 66. b
 Brachij luxati signa. 472. d
 Brachiū antrorsum & retrorsum luxatū quale. 468. b c
 Brassica. 113. e. 202. b
- C
- C** Adentes tā ex alto q̄ ex plano quid patiatur. 446. d
 Cæcitat̄ signum. 399. e
 Calamintha. 113. d
 Calcanei cura in tibiæ fractu ris. 462. b
 Calculi varia causa. 190. f
 Calculi quinque signa. 190. f 87. d
 Calculi causa & curatio. 208. f
 Calculi duo vel plures qui fiant. 191. a
 Calcul' puerorū vñ fiat. 190. c
 Calculi cur pueris fiant. 28. a
 Calculi cū ferro similitudo. 190. c
 Calidi seu ætheris vis & actio. 44. c
 Calidus vel frigidus cur quis fiat. 152. a
 Calida aqua copiose vtētib' quid accidere soleat. 131. b
 Calidū hoc vel contra ne sit, certum non est. 12. e
 Calida apposita. 82. e
 Calida spiritū emittunt. 34. f
 Calidiores tenaciore habent memoriā. 107. f
 Calfactio. 131. a
- Calfacientia sunt, dulcia, acida, salia, amara, austera & carnosa. 114. f
 Calor & frigus nō putrescit. 14. c
 Calligenis curatio. 373. d
 Caluiciei causa. 256. c
 Caluus in Larissa quarto die moritur. 335. a
 Caluitij causa. 38. e
 Calūnia, artis ignorātia. 4. bc
 Canales an crurib' fractis supponendi. 460. d
 Cancri curatio. 328. a
 Cancri occulti futuri signa & curatio. 280. f
 Cācri occulti nō curādi. 517. d
 Canicula. 88. d
 Canices vnde. 38. e
 Cani à natiuitate. 38. e f
 Cātharides. 217. d. 227. a. 229. c
 Carbunculi astiui. 320. b
 Carcinoma mulierē enecat. 353. e. 377. d. 378. a
 Carnes roborantes. 201. b
 Carnes leuissime & graues. 201. e
 Carnes fluxu laborantibus dandæ. 277. e
 Carnes piscesq; dādi pituitosis. 211. d
 Caries ossis cap. 155. d. 159. c d
 Carnes conditæ. 114. c
 Carnis cuiusque animalis facultates. 111. d e f. 112. a
 Carniū attractiū indicia. 359. a
 Carnosi oēs & iter se similes qui Riphæos incolūt. 91. c
 Carno-

INDEX

- Carnosorum affectus. 122.d
 Caro quæ fiat. 46.a
 Caro est medij temperamēti
 inter ventrē & venas. 102.c
 Caro cū generatur, quid fiat.
 36.d
 Capillū fluentē sistētia. 293.b
 Capillorum vel pilorum na-
 tura & origo. 38.c.46.f
 Capitis repētīn⁹ dolor. 158.f
 193.b
 Capitis & colli differentia.
 16.a
 Capitis vlcera ac vulnera ma-
 gna. 48.d
 Capitis dolor assiduus quādo
 lethalis. 406.d.410.a
 Capitis dolor in febre quid
 significet. 396.c
 Capitis dolorē sedātia. 250.a
 Capitis vulnera lethalissima.
 418.a
 Capitis grauitas quæ fiat. 155.a
 Capitis dolor duplex. 421.c
 Capitis dolor grauidis perni-
 ciosus. 410.c
 Capitis torpor. 156.b
 Capitis tumor. 357.e
 Capitis dolentis curatio. 355.
 e.174.c.239.c.292.d.80.a
 Capitis fluxio. 79.e
 Capitis os qua parte robusti-
 us sit. 445.a
 Capitis vulneribus conferē-
 tia & contra. 418.b
 Capitis dolor vocem inter-
 cipiens. 155.c
 Capitis rheuma. 148.c
 Capitis vuln⁹ icurabile. 446.a
 Capitis rigor, dolor ac febris
 cum curatiōe. 157.f.158.a
 Capitis dolor cum febre vn-
 de. 96.c.397.b.398.f
 Caput quale. 63.e.15.d
 Caput purgantia. 75.b
 Caput oblōgum & ceruices.
 321.b.c
 Caput lapide percuss⁹ perit.
 351.a
 Caput vlceribus plenū. 156.f
 Caput pituitæ locus, cor san-
 guinis, lien aquæ. 183.e
 Caput instar cucurbitulæ tra-
 hit. 181.d.e
 Caput brachij fractū. 468.e
 Caprine carnis facultas. 394.a
 Caulis siue pudendum. 69.d
 Causæ morborū nō statim co-
 gnoscuntur. 7.c.129.a
 Causæ variæ. 129.a
 Causi solutio. 398.c.d.400.b
 K200000. 153.a.310.c
 Cantio in admouendo tere-
 bello. 450.c
 Cautio circa os in vulnere cu-
 rando. 448.d
 Cauæ partes. 44.e
 Cauma, Rheuma. 14.a
 Casei facultas. 112.c.393.f.
 202.b
 Caseus esu malus. 14.e.f
 Castanex. 114.c
 Cataplasma ad fluxus. 293.f
 Cataplasmata vlcerati pudē-
 di. 240.c
 Cencron ventus. 90.a
 Cepa. 113.b.201.f
 Ceratum in deligatoris qua-
 †† iiii le.

INDEX.

le.	452.e	Συμῶς.	15.b
Cerebri corruptio cum curatione.	173.d	Chirurgiæ officinæ quæ conducant.	450.d
Cerebri vsus & situs.	533.b	Chirurgus prospicienda quæ.	450.e
Cerebrum glandulæ simile.	64.a b	Chirurgi man ⁹ & digiti quales esse debeant.	451.a
Cerebrum invtero purgatur.	139.c	Choenix.	179.f
Cerebri tumor cum curatione.	172.e	Cholericæ affectiones quæ & quando fiant.	374.d
Cerebri situs ac sensus.	444.f	Cibaria leuissima & grauia.	200.e f
Cerebri venulæ superuomētes.	154.e	Cibaria describuntur.	9.c
Cerebri repletio dolorosa eiusque curatio.	173.a	Cibi quantitas.	81.b c
Cerebri corruptio.	155.b	Cibi vel potus conferentes & contra.	201.a b
158.e. 159.c		Cibi & potus omnia irrigat & augment.	46.e
Cerebri ac capitis morbi, & curationes.	158.b c	Cibi quatenus medicamenta sint.	98.d
Cerebri biliosi morbus & curatio.	1bidem.d	Cibi distributio per singulas ætates.	130.a
Cerebri madentis signa, & curatio.	157.d	Cibi quo tēpore facilius coquantur.	509.d
Cerebro, ossibus, dentibus, nervis frigida inimica, calida vero amica.	131.c d e	Cibi hora cum præterit quid faciendum.	11.b c
Cerebri membranæ duæ.	71.f	Cibis vexantibus quid agendum.	202.e
Cerebri affectiones.	64.f	Cibi & labores vires habent contrarias.	99.f
Cerebrum quale.	44.f	Cibi si mox in corpore graueolent, quid fieret.	184.c
Cerebrum quorum sit causa.	142.b	Cibi si eodē die excernerentur, quid eueniret.	1bid.e
Cerebrum quando insaniat.	1bidem.c	Cibi plus equo in ventriculo retenti quid faciant.	1bid.f
Cerebrum hominis duplex.	139.a	Cibi perturbantes.	12.d
Ceruix.	65.f	Cibi frigidissimi qui.	358.f
Cherionis ægri historia.	330.a	Cibi ac potus facultates multas	
Χειρὸν ὀμῖν.	116.f		

INDEX.

tas ex terra trahunt.	181.c	Clazomenius sanitati restitu-	
Cibi qui celeriter excernan-		tus.	318.e
tur.	510.a	Cleane&ides graui morbo li-	
Cibo non augeri, malum.		beratus.	317.f
510.c		Clyster mitissimus.	211.a
Ciborum varietas.	130.b.c	Cnicus.	111.d
Ciborum varietas.	359.a	Coagulum asininum.	293.e
Ciborum facultates.	128.c	Coccus enidius.	165.c
Ciborum ac potuum singu-		Coci obsonia parant.	103.d
lorum vis.	110.a.202.a.c	Co&iones ac cruditates quid	
Ciborum comparatio.	10.c	significent.	312.e
Ciboru& facultas qui cogno-		Cœlestisvis qd& efficiat.	187.d
scatur.	200.d	Cœli clementia & soli vber-	
Ciborum facultas multis cõ-		tas in Asia.	88.f
paratur.	103.c	Cognitio vera quid præstet.	
Cibus sanorum ægrotis no-		19.e	
cet.	10.b	Coitus voluptas vtriusq; est.	
Cibus sensim augêdus.	118.a	32.d.115.c	
Cibus in vigore morbi dete-		Coitus quibus proficit.	358.f
rior.	384.c	Coitus ebriis quid proficit.	
Cibus quando morbum ge-		414.f	
neret.	510.a	Coi singulis annis Hippocra-	
Cibus in tabido qualis.	165.c	ti sacra faciebant.	1.c
Cicer album.	111.c	Colli dolor pessimus.	409.e
Ciceris facultas.	393.f	410.c	
Circuitus, constitutio & de-		Columellæ vuluæ curatio.	
cretoria.	134.d	298.e	
Citharœdi.	47.f	Collutio biliosa & pituitosa.	
Citra sanitatem nihil vtile ef-		270.d.f.271.b	
se potest.	120.b	Collutiões purgatorię.	270.e
Clauda membra quæ & quo-		Collutiones variæ.	298.c
modo fiant.	418.c	Collutiones ad fluxus.	294.b
Claudi vel cæci partus vnde		Collutiones pudendi.	240.d
fiant.	49.f	Collutionum mensura.	269.a
Claudicatio vnde.	73.d	Colon.	60.f
Claui culæ fractæ curatio.		Color ossis capitis.	444.d
474.c.d.e.& caussæ.	475.	Colorum mutatiõe à corde.	
bef		70.e	
Claues pectoris.	66.b.72.f	Comitiales morbi vnde.	
		388.e	

INDEX

- 388.e
Comitialis morbus cur non
magis diuin⁹ quàm alij pu
tandus sit. 137.b
Comitialis morbi liberatio.
510.f
Comitialium cur os spume-
scat. 97.f.98.a
Comitialis morbus senes ma-
xime tollit. 416.f
Comitiales omnibus sensib⁹
priuantur. 97.f
Commotiones. 116.e
Compressa à seipſis calidiora
40.c.d
Conceptus in vtero qualis.
47.f
Conceptus signa. 48.a.b.32.f
Conceptus varietas. 53.a
Conceptui tempus aptum.
250.d
Cōceptus qui paretur. 55.b.c
Cōcept⁹ restauratio. 56.a.b.c
Cōceptum impediētia. 56.b
420.e.240.b.266.b
Conceptus qui vltra plenilu-
nium fit. 53.b
Conceptus fallacia quid por-
tendat. 421.b
Conceptus à quo morbo li-
beret. 227.b
Conceptus, partus, abortus &
morborum decretorium.
50.c
Concepturæ mulieris signa
varia. 302.b.c
Conceptus virgines à dely-
rio liberat. 225.a
Conceptorum summū. 307.b
Concubitus mox à partu mu-
lieri morbi est causa. 226.a
Congeniti homini 4. primi
humores. 25.e
Conchylia. 112.e
Coniectores quæ non asse-
quantur. 125.a.b
Cōiugio permutato cur per-
mutetur & soboles. 33.e
Conformatio partus. 36.d.e
Conformationis in vtero tē-
pus. 50.e
Consideranda medico in vi-
ctus ratione describenda.
509.c.d
Consideranda initio morbi.
340.c
Consideranda in ægro quæ.
391.a.b.c
Cōsiderāda ī muliere sterili,
& fluxu laborare. 274.d.e
Cōstantes homines. 107.a
Cōstitutiones morborum &
vigores quando magis aut
min⁹, citius aut serius fiāt.
344.a
Cōstitutiois temporis pesti-
lētis & morborū in ea graf-
fantiū descriptio. 331.e.332
Consuetudo victus multum
potest. 382.d
Contenta in manibus ac pe-
dibus. 38.b
Contraria tollunt contraria.
94.c
Contraria commissa non læ-
dunt. 13.a
Contusionis species. 445.d
Convulsionis curatio. 79.f
Convulsiones

INDEX

Convulsiones quibus viles.	534.a b	Corpora formę peregrinę vi sa quid velint.	127.f
Convulsio puerperę.	326.f	Corpus post calidam frige- scit magis, post frigidam vero calefcit.	131.f
Convulsiones faciles quę.	440.c	Corpus ac venę in ictico quales.	217.c
Cor quid.	61.d	Corpus quo pacto humores 4.ex cibis trahat.	180.c
Cordis ventriculi, siue sinus.		Corruptio omnium mutua.	101.b
Ibidem.d e		Corna.	114.a
Cor quale.	61.a. 45.e.	Καρυκομαχίη.	116.f
60.d. 66.d		Costę.	66.a.c. 72.e
Cordis latentes pelliculę.		Costę quanto tempore coa- lescant.	485.d
62.b		Corylidonũ natura.	307.a b
Cordis natura.	45.b	Coxa.	65.f
Cordis & præcordiorum fa- cultates.	143.b	Coxendices.	73.b
Cordis & arteriarum con- sensus.	67.c	Coxendicum dolor qua eta- te affligat.	422.f
Cordis dolentis curatio.	321.e	Cratię ægri historia.	313.f
Cordis alimētum vnde.	62.c	Crapulę morbi cum curatio- ne.	198.a
Cordis auriculę.	61.f	Cranonis populares morbi.	320.b
Cor creatoris optimi summũ opificium.	62.a	Crapula morborum parens.	393 b
Cor cur non afficiatur, caput & lien multũ.	183.e. 182.e	Cratistonax.	315.a
Cor calidissimum.	45.c	Criseorum calamitas quanta.	535.e
Cor & venę semper mouen- tur.	Ibidem.	Crysus primus murum con- scendens.	536.d
Cordis tunicula.	61.a	Crisęi populi.	535.d
Coriandrum.	113.c. 202.a	Critonis mors secũdo die ab initio morbi.	318.d
Corpus quale.	71.d	Critobuli ægri historia.	313.c
Corpus humanũ medici sub- iectum.	Ibidem.d e		
Corpus impurum puro ali- mento læditur.	509.f		
Corpora attenuata quomo- do reficienda.	Ibidem		
Corporis repentinũ labores.	384.c		

INDEX.

- Kpious* quid. 23.c
 Crisis morborum acutorum. 2.a
 427.b
 Critiæ ægri historia. 313.f
 Cubiti & tibiæ ossa qualia. 117.f
 467.c
 Cubiti repositio. Ibidem.c
 Cubiti ossa ubi fracta, quid agendum. 156.f
 455.c
 Cubiti luxati curatio. 476.c d
 a b.
 Cucumeris agrestis facultas. 508.a
 358.f. 114.c b
 Cucumeris sylvestris radix. 210.b
 78.d
 Cucurbita. 121.c
 Cucurbitulæ forma cur talis. 122.a
 15.c. 17.d
 Calpa ægrotantium medico sæpe adscribitur. 116.c
 20.f
 Cum fœtus mortuus crus aut manum præmittit, quid agendum. Ibidem.d
 263.a
 Cum morbus repullulat quid agendum. Ibidem
 157.b
 Cū loc^o cucurbitulæ admotæ aperitur, quid agendū. Ibidem
 17.c
 Cum fœtus manum aut crus præmittit quid agas. Ibidem
 262.f
 Cuminū Aethiopicū. 114.a
 179.d
 Cur modo mares, modo fœminæ gignantur. 110.c
 33.a
 Cur de articulis scribat. 116.a c
 483.
 a b.
 Cur quædam natura sine lætæ sint, quædā eo ante tempus destituantur. 397.c
 264.a
 Cur homo imparibus diebus moriatur. 186.a
 Cur Hippocrates capite tectō pingatur. 2.a
 Cur corde nō sapimus? 143.a
 Curationis lassitudinis facultas. 327.c
 117.f
 Curationes variæ. 156.f
 Curatio ulcerū capitis. 156.c d
 Curatio morbi à capite. 508.a
 Curatio cum quis sanis oculis non videt. 121.c
 Curatio anceps. 122.a
 Curatio celeris. 116.c
 Curatio ex viâ ratione. 210.b
 121.c
 Cursus longi. 116.c
 Cursus vestiti. Ibidem.d
 Cursus recti. Ibidem
 Cursus circulares Ibidem
 Custodia ac scientia multa prægnantibus opus est. 251.c
 Cutis capitis læsa periculosa. 444.a
 Cutis vřsulata pilos non producit. 38.d
 Cydonia. 114.a
 Cyceonis facultas 110.c
 D
 Amnatur ars medica, etiam cum deploratos non curet. 6.a
 Dætharsei ægri historia. 313.c
 Deambulationes post exercitia 116.a c
 De aqua cur in corpore augetur. 182.c
 De alcis vxoris historia. 337.c
 Debilitatis signa. 397.c
 Debilitas

INDEX.

- Debilitas à partu. 230.b
 Decemestres maxime educan-
 tur. 50.b
 Decemestres, vndecimestres,
 & septimestres quando pa-
 riantur. 52.f.53.a
 Decretoria febrium. 400.f.
 406.a b
 Decretoria paria vel imparia
 315.f
 Decretorij dies cur impares
 tantum sint. 185.d.186.d
 Decretum Atheniensium in
 gratiam Hippocratis. 534.c
 Decubitus qualis. 401.e
 Decubitus ægrotantium pro
 morborum varietate eligen-
 di sunt. 20.f
 Defrictionis potestas. 453.a
 Deglabratio qui fiat. 299.f
 Deligatio duplex. 451.c
 Deligatione in fracturis qui
 non egeant. 464.d
 Deligatio pedis & manus cur
 diuersa. 460.b
 Deligamēta qualia esse opor-
 teat. 451.f.452.b.d. 455.d
 Deligandi modus. 451.d.e.
 453.b.454.f
 Deligatura, in qua duo maxi-
 me profunt. 17.a b
 Delyrij causa. 224.f
 Delyrij vehementis signa.
 384.b c.391.d.509.f
 Delyrij curatio. 225.a
 Delyratio quibus profuit. 359.
 b c.
 Democrit⁹ insanus putat^r. 1.d
 Democriti de mundo senten-
 tia. 530.f
 Democritus quæ in vita ri-
 deat. 528.a b
 Demonstratio iucundior quæ
 opere sit quàm quæ sermo-
 ne. 8.c
 Dentati cur nascantur. 46.c
 Dentes pueris quando rena-
 scantur. 48.c
 Dētes posteri⁹ nascunt^r. 46.c
 Dentes pueris quando ena-
 scantur. 48.c
 Dentes stupescunt molarum
 attritu. 135.a
 Dentitionis varietas. 59.c
 Dentium generatio. 46.c
 Dentium stridor quid porten-
 dat. 402.a.409.b
 Dentium dolor. 193.c
 Deploratos non expedit tan-
 gere. 6.c
 Desidiosorum morbi & curatio
 122.d e f.123.b c d.124.b c
 Desidiosi copiosiore labore
 quàm cibo egent. 122.f
 Desidiosorum victus ratio.
 123.b d f.124.a
 Desilientium ex alto curatio
 458.a
 Destillationis remediū. 558.e
 Destillationis signa. 13.c
 Destillationes oculorum. 13.f
 Deterior victus meliori quā-
 do præferendus. 510.e
 Deus rerum humanarum po-
 tissima causa. 225.b
 Diarrhœa cuiusque curatio.
 197.f
 Diæta recta multum confert.

INDEX.

107.d	Dispositio hoīs bona.	14.d
Dieta hominum perquiren-	Dissectio & sedes idé.	446.f
da.	Distentio maxima vbi fiat.	453.a
83.d	Distortiones faciei.	422.d
Diebus imparibus omnia æ-	Diuerſa medicamenta men-	
grotantia discernuntur.	ses detrahétia.	264.b c d e
186.b	Diuerſa ex oculis cognitio.	327.c
Dierum obseruatio.	Diuerſa eiusdem morbi cu-	
50.c	ratio, vnde.	150.c
Dies ac menses quantum pos-	Diuerſi terræ humores.	181.c
sint.	Diuerſitas cōsiderāda.	129.d
50.c d	Diuerſitas languentiū.	414.a
Dierum parium obseruatio.	Diuerſorum morborum cu-	
Ibidem.d	ratio.	328.a b c
Dies in crisiſibus cōsiderādi.	Doctrina, vnā cum prudentia	
510.b	comparanda.	3.d
Dies qui offium repositiōe	Dolor vnde	15.f
non admittant.	Doloris sedatio.	298.b
466.a	Doloris hepatis solutio.	436.f
Differétia inter Asiam & Eu-	Doloris & vlceris vterorum	
ropam.	curatio.	298.d
88.c	Doloris subiti curatio.	398.d
Difficultatis spirādi curatio.	Dolores in lumbis & vesica	
274.c	breues.	209.c
Digitī tanquam rami postre-	Doloris circa lumbos aut co-	
mo disparātur.	xam curatio.	373.f
38.a b. 73.a	Doloribus circa caput quid	
Digitorum articuli quot mo-	proſit.	421.d
dis luxentur.	Dolores ex itinere qui.	393.b
497.c	Dolor aurium magnus tertio	
Digitū luxati repositio & cu-	die hominē tollit.	359.c
ratio.	Doloris ad clauiculā cura-	
477.a	tio	381.f
Dignoscenda in principio.	Doloris sub diaphragmate	
134.b c	curatio.	Ibidem
Dilatio ab arte aliena.	Domorum structura.	103.c
525.e	Dormicatum cōsideratio.	
Diligens inquisitio contrarij		
ac certissimi remedij.		
11.f		
Discenda etiam quæ male sue		
cesserunt.		
484.e		
Disciplina nulla pbat, quæ		
vitz humanæ non conse-		
rat.		
18.f		
Disparationis offium cubiti		
signa.		
476.c		
Dispositio Athletica non est		
à natura.		
129.f		

INDEX.

401.e		Epileptici cur suffocentur.	
Dormiens internis, vigilans	140.b	Epileptici cur calcitrét pedibus.	Ibidem
verò externis partibus calidior.	358.a	Epilepsia inueterata, incurabilis est.	141.d
Dormire diu, quibus conducit.	31.a	Epileptici casuri fugiunt.	Ibidem
Dorsalis morbus cum curatione.	167.f	Epilepticis vétorum mutatio quid afferat.	141.e.142.a
Dossi vlcus	502.e	Epilepsia cur pueros suffocet	140.c
Dracon Thessali frater.	537.c	Cur adultos non occidat.	Ibidem.e
Dromeadae vxoris puerperae mors.	319.a.b	Cur senes perimat. Ibidem.e	
Duorum victuum differentia.	10.b.c	Cur dextram partem potius occupet.	Ibidem.f
<i>Δύο victα.</i>	69.c	Cur vere periculosior sit.	141.b
Dysenteria eiusque curatio.	197.b.f 121.b.300.c	Equestre certamen.	336.c
Dysenteria in quæ degeneret mala.	392.c	Equitatio continua quæ mala afferat.	91.f.92.d
Dysenteriae mala quæ.	419.f	Erasini Bootis historia.	318.c
Dysuria cum delirio hominẽ enecat.	157.b	Eratonis ægri historia.	313.d
E		Error medicorũ in forbitio- ne exhibenda.	382.c
Ebrietatis morbus & curatio.	159.a.b.155.d	Errores ab initio commissi facilius corriguntur.	383.f
Edere aut bibere per somnũ quid sit.	127.f	Errores quando patent.	11.a
Elementorum quatuor vires & situs.	44.c	Erucae tithymalidis.	55.f
Epaminondas.	314.f	Eruum.	179.f.111.c
Epaminonis ægri historia.	313.e	Erysipelas.	145.f
Epicratis vxor graui morbo liberata.	317.c.d	Erysipelas pulmonis.	148.e.
Epiglottis	61.b	& eius curatio.	167.c
Epilepticis cur oculi distorqueantur.	140.a	Esus carniũ in somno quid vehit.	127.f
Epilepticis cur os spumescat.	Ibidem.b	Etesia.	311.c.313.b.323.d
		Euacuatio dolorem excitat.	25.a
			Euagon

INDEX.

Euagon Diapharſis filius.	314.f	Ex rigore qui pereant.	423.e
Euſia natura quædã eſt.	23.a	Excreationes in febrib⁹ qua-	les.
Eunuchi cur non cocant.	32.a		533.c. 519.d
Eunuchi in Scythia adorantur.	92.a	F	
Eunuchi non calueſcunt.	38.e	Abx alunt &c.	111.b
Europæi inter ſe diſſimiles.	92.c	Fabula de Amazonidibus	487.c
Europæi bellicoſiores quàm Aſiani.	93.a	Faciei conſideratio.	429.a.b
Europæi Aſianis corporum forma magis inter ſe diſcrepant.	92.f	Faciei ornamenta.	293.b
Europæi cur ſeniores. Ibidẽ.		Faciei ſingularum partium ſi-	tus & vtilitas.
Euryphon medicus.	1.d	Facies bona in malis tam magnis quàm paruis quid ſignificet.	333.c
Euryanaſtis filix hiſtoria.	330.c	Facies rugas leuigantia.	293.b
Ex abortu morbi ac curatio.	354.a.b	Facilitas quibus inſit.	146.d
Exacerbationũ indicia.	509.b	Fames quo ſoluatur.	510.b
Excrementa cur vrinam odore referant.	191.d	Farinæ puræ & cum aliis mixtæ, facultas.	111.a
Exercitatiois facultates.	185.b	Farina ordeĩ plenĩ.	179.c
Exercitatorum morbi & curationes.	124.b.c.d	Fauces.	44.d
Exercitationis in puluere & oleo differentia.	116.f	Fauces cruentæ.	418.f
Exercitationes deſidioſorũ.	122.c. 123.c.e. 124.a	Faucium exulceratio & inflammatio.	96.f
Exercitia.	30.e.f	Faucium dolor.	408.c. 410.af
Exhalatio humoris quomodo fiat.	186.f	Faucium exulceratio.	406.c
Ex morbis, anni temporibus & tempeſtatibus omnium fit coniectura.	136.b	Faucium inflatio.	193.d
Ex partu flux⁹ curatio.	256.a	Fauĩ ficci.	179.c
Ex partu vomitus ſanguinis curatio.	Ibidem	Fauonius	118.b
		Febrium quatuor ſpecies.	28.c
		Febrium differentix.	354.f
		Febrium genera duo.	95.c
		Febriſ communis & peculiaris cauſa.	Ibidem
		Febriſ ex mala diæta.	Ibidem
		Febriſ ardens recidens.	398.b
		Febriſ interficiens, & eius curatio.	170.c
		Febriſ	

INDEX.

- Febris cōtinua & tertiana cū
 curatione. 162.d e f
 Febrium omnium propria &
 species. 315.d e
 Febris continuæ varietas.
 Ibidem.e
 Febres à bile & curatio. 162.
 b.c.
 Febris & vomitus contraria.
 80.e f
 Febriū omnium causa spiri-
 tus transitus 96.c
 Febrium effectus. 137.c
 Febre ardente quando mori-
 riuntur. 153.f
 Febris ardens, & curatio. 169.
 d. 173.e
 Febris ardētis cōstitutio. 332.c
 Febris ardens quī fiat. 387.f.
 388.b
 Febres erroneæ unde fiant.
 224.f
 Febres erroneæ acutę. 246.d
 Febres incōstātes donec cōsti-
 terit finire oportet. 390.d
 Febrium acutarum causa. 509.c
 Febris continua. 397.f
 Febris quartana & curatio.
 163.a
 Febricitantium medicamen-
 ta. 99.a
 Febris diuturnæ signa. 510.c
 Febris vexātis curatio. 78.b
 Febrium diuersæ species. 311.
 d.e. 315.d. 331.b.
 Febres leues ac lethales. 396.d
 Febres hybernæ obseruandæ
 194.f
 Febris post frig° quī fiat. 189.c
 Febres in glandularum tumo-
 ribus exceptis diariis malis
 324.d
 Febris singultiens cum cura-
 tione. 169.e
 Febris à pinguiore tantū hu-
 more. 186.c
 Febres in Perintho grassan-
 tes. 323.e
 Fel. 66.d. 70.c
 Femur. 73.b
 Femoris ossis fracti curatio.
 461.c d
 Femur fractum quotum coa-
 lescat. Ibidem
 Femur retrorsum luxatum.
 489.a
 Femoris luxati signa. 488.b
 Femoris luxati repositio.
 494.b
 Femur antrorsum elapsū. 490.c
 Femoris articul° quot modis
 excidat. 486.c d
 Feræ magnæ in Ripheis mō-
 tibus non nascuntur. 91.b
 Ferulæ quales esse deceat.
 452.e. 469.c
 Ferulæ quando apponendæ.
 460.f. 463.d. 469.c.
 Ferulæ quādo firmādę. 456.c
 Fibræ à ventre in vesicā. 73.d
 Ficus. 114.b
 Ficus quibus proffit post cibū.
 122.a b
 Figmentum de morbo sacro
 cur productum. 138.c
 Figura fracturarum commo-
 dissima. 469.a
 Figurarum summa. 453.c
 ††† Filiij

INDEX.

Filij Cydis ægri histo.	364.d	Fluxus suppressi signa.	259.e
Fissuræ carnis & intercus mor-		Fluxus ex partu corripientis,	
bus quæ fiant.	97.a	curatio.	237.d
Fistulæ caussa & curatio.	503.	Flux ⁹ pituitosus quid efficiat	
d e. 504. a b c		247.b	
Fistulæ tam faciles quàm dif-		Fluxus consuetudo.	246.f
ficiles curatu.	439.b	Fluxus albi signa ac curatione.	
Fistulæ pulmonis foliū vel e-		228.d e f. 276.b. 277.b	
piglottis quid faciat.	191.f	Fluxus à partu aut labore cu-	
Flatus quid agat.	15.f	ratio.	275.d e. 276.a
Flatus omnium morborū cau-		Fluxus aquosi purgationes	
sa.	98.b	294.f	
Flatus in vteris purgatio.	291.	Fœcunditatis præparatio.	
f. 292.b. 298.e		250.d	
Flatus in vterū quomodo in-		Fœcunditatis experimētum.	
ducantur	308.d	267.d	
Flumina quæ salubria.	93.c	Fœmellæ procreatio etiā tri-	
Fluminis cursū per somnum		plex.	105.c
visus quid præsignet.	127.b	Fœmina cur ex coitu magis	
Fluor cruentus ante partum		valeat.	32.e
periculum affert.	54.d	Fœminæ corpus.	65.b
Fluxio in aures.	74.d	Fœminæ humidiores & frigi-	
Fluxio in oculos.	74.f. 75.a	diores.	106.e
Fluxiones de capite septem		Fœminis quid in coitu acci-	
sunt.	74.a	dat.	32.d
Fluxiones à frigore ac calore		Fœtu corrupto & secūdis nō	
73.e		exeuntibus quid sit agen-	
Fluxionis caussa.	96.d	dum.	256.f
Fluxionis diurnæ signa ac		Fœtus conformatio.	150.a
curatio.	257.f	Fœtus qua parte existat.	55.a
Fluxum resiccantia.	294.e	Fœtus in vtero quo tempore	
Fluxum sistentia, & dolorem		moueatur.	38.f. 263.d
sedantia.	293.f	Fœtus quomodo ex vtero pel-	
Fluxus diuersi, eorumq; cura		latur.	239.f
tio.	277. 278. a b. 239.b	Fœtus in vtero aut mortui	
Fluxus vteri caussa ac curatio		aut debilis signa.	251. e. f.
274. e f. 275.a		54.d f	
Fluxus diuersæ ætatis causa.		Fœtus in vtero mortui expul-	
273.e		soria varia.	273.b c. 308. a
		Fœtus	

INDEX.

- Glandulæ quales. 62.e f
 Glandulæ qua parte sint. 63.b
 Glandulæ periculosa 473.c
 Glandulæ intestinorū quales
 64.a
 Glandulæ intestinorum maio
 res. 63.d
 Glandulæ renum. Ibidem.
 Glandulæ morbum generant.
 Ibidem.f
 Glandulæ & pili eiusdem vti
 litatis participes. Ibidem.b
 Gnato. 315.a
 Gracilium victus ratio. 30.a
 Grammatica. 104.a
 Grauedinis curatio. 300.a
 Graecolentię in pudendis cu
 ratio. 238.d
 Gratis nonnulli curandi. 22.b
 Gulæ effigies. 60.c. 61.b
 Gutturis dolentis curatio.
 327.c
- H
- H**abit^o boni causa. 185.c
 Habitus bonus quando
 mutandus. 508.b
 Hæmorrhoidum causa & cu
 ratio. 505.f. 506.a c f. 507.
 b. 395.c
 Hæmorrhoidum cognitio.
 506.b
 Hæmorrhoidarum utilitas.
 136.d
 Hæmorrhoidas patietes, à q
 bus morbis tuti sint. 357.b
 Hemitriteos eiusque signa.
 310.c
 Hepar iaculo percussus sta
 tim moritur. 15.f. 351.b
- Hepati infestissima. 214.e
 Hepatis & partium interna
 rum descriptio. 533.d
 Heracleius. 315.a
 Heragoras. 321.b
 Heraclidis ægri historia. 313.c
 Herba brevis melior pecori
 bus. 471.f
 Herbarum facultates à quali
 tatibus. 113.e f
 Hermocratis ægri historia.
 328.f
 Herophon graui morbo libe
 ratus. 317.a
 Heropythi Abderitani histo
 ria. 335.e f
 Herpetes mitiores. 417.f
 Herpetes quibus familiares.
 Ibidem.c
 Hiatus præcedit febres. 96.a
 Hiantia nihil attrahunt. 15.c
 Hippace quid. 91.a. 187.e
 Hippocratis diuersa curadira
 tio à Cnidiis medicis. 379.b
 Hippocrates contemptor pe
 cuniarum. 2.b
 Hippocratis laus & genealo
 gia. 520.d
 Hippocrati oblata ab Artaxer
 xe rege. Ibidem.f
 Hippocratis ad Democritum
 aditus. 526.c d
 Hippocratis inuentum. 120.b
 Hirundo. 118.b
 Homo humores quatuor sem
 per habet. 26.c
 Homo tot^o ex natiuitate mor
 bus est. 529.f
 Homo quatuor locis purga
 tur. 1

INDEX.

tur.	184.a	Humores quatuor in homine
Homo omnium artium parti		imitantur quatuor anni tē
ceps	104.c	pōra. 26.d
Hominis temperamentum.		Humorum impetus & feroci
Ibidem.		tas. 133.c
Hominis fundamentum, seu		Humorum qualitates. 151.e
materia.	11.e f	Humorū quatuor fōtes. 180.b
Hominum species & colores		Humores in corpore quo pa-
boni.	417.b	cto minuantur. 183.f
Homines sicuti arbores nu-		Humores, succiue & sapes
triantur.	41.c. 118.c	in homine. 12.c
Hominis calefacti historia.		Humoris aquæ in vtero si-
319.b c		gna ac curatio. 225.d
Hominum sancita mutabilia.		Hydropis duo genera ac cu-
102.c		ratio. 394.c
Hormini semen.	111.c	Hydropis causæ. 188.e
Horrentes quales.	424.b	Hydropis origo. 402.f. & di-
Horror qualis.	151.f	uerſitas 74.b. 403.a
Horroris ante febres causa.		Hydropis signa. 97.b. 192.b.
95.f		196.d f
Hortandus æger, vt bene spe		Hydropis præcognitio. 136.c
ret.	22.f	Hydropicorū curatio. 77.b.
Humerorum dolor.	422.c	398.c. 351.e. 360.f. 415.d
Humerorum luxatio.	469.d	Hydropicorum catapotia.
Humeri luxati repositio.	470	395.b f
a b d. & vſtio. 473.a		Hydropis curat. anceps. 77.e
Humeri summi auulſi cura-		Hydropis in muliere causa.
tio.	474.a b	259.a
Humida cōpreſſa magis, ſicca		Hydropicæ mulieris affectus
minus putrefcunt.	40.c	Ibidem. b
Humidæ magis ſupernæ par-		Hydropis in vteris purgatio.
tes quàm infernæ.	73 f	291. c d
Humidi quatuor species. 32.c		Hydropico cur ſolus venter
Humidum & liquidum calo-		turget. 192.c
ris quid habeat.	46.a	Hydropi febris leuis ac bre-
Humorum obſeruatio & effe-		uis oboritur. 188.a
ctus.	134.f	Hydropis in vtero ſigna ac
Humorū differentia ex pon-		curatio. 258.b d
dere.	187.f	Hyems frigida quos morbos
		††† iij inuehat.

INDEX.

inuehat.	84.abc	Imperitia, malus thesaur ⁹ .	3.e
Hyemales morbos æstas succedens transmutat.	337.e	Impetiginis curatio.	293.c
Hygea.	2.d	Impetigines, leucæ, & lepræ vnde fiant.	423.d
Hyssopum.	113.e	Incertæ morborū prædictiones quæ.	510.a
I		In cōceptus cupiditate quid agendum.	104.e
Icteri curatio.	78.c	In Dealcis horto decumbentis historia.	329.b
Icterus niger & curatio.	161.f	Indicationes variæ.	314.e
Iecur.	45.e. 60.e. 66.d	Indicia ex egestionib ⁹ .	510.a
Ieiunium qui facilius ferant.	509.b	513.a. 442.c	
Ignarorū graphica depictio.	4.c	Indicia ex atra bile.	513.a
Ignis.	115.c	Indicia crisis.	509.f
Igni aquam superante quales fiant homines.	107.e	Indicia ex somno.	Ibidem.e
Ignis & aqua omnia constituunt.	100.cd	Indicia ex febribus.	513.e.f.
Ignis & aqua quæ à seinuicē fecernant.	Ibidem.e	514.a	
Ignis & aquæ vires. Ibidē.d		In doloribus quid agendum.	359.a
Ignis humiditas in vena caua	102.c	Industria medicinæ cultura.	3.e
Ignis quæ gubernet.	Ibidē.d	In exacerbationib ⁹ obseruanda.	134.c
Ignis tres partes.	Ibidem.	Inexercitati cū laborāt, quid patiantur.	117.b.c
Ignis inimicus nervis.	473.e	In Helide morbi populares.	345.c
Iguem sacrum ab vlceribus prohibentia.	500.b.	In febre acuta siticulosis vomitus ex aqua frigida prodest.	345.a
Ignorātia vbi malum.	409.d	Inflationis patientis curatio.	238.e
Ignorata à medicis.	379.f	Inflammatio ad palatum.	161.a
Ignis sine spiritu non viuit.	94.f	Inflammationis curatio.	299.b
Ilyrica pestilentia.	517.d	Initio morbi purgandum esse.	510.c
Imagines præ oculis cursitantes.	72.a		
Impedimenta quominus exalta vict ⁹ ratio describi possit.	118.b.c		

Infecun-

INDEX.

- Infecunda victus ratio & cu
ratio. 56.d.e.f. ris constitutio. 313.a
In locis siccis nata. 114.c Intestinorum morbi vnde.
Inobediētia ægri causa mor- Intestinorum diuturna leni-
tis. 6.a tas. 322.c
In Oeniadis morbi popula- Intestini recti inflammati cu
res. 345.d.f.346. ratio. 594.d.e
In Perintho morbi populares Instrumēta chirurgo in prō-
qui. 323.d ptu sint & ministri. 451.b
Infantia citra medelam sana- Instrumenta medico in prō-
tur. 525.c ptu esse debent. 20.b
Infantia aut cerebri corrupti Instrumētorum omnium for-
causæ.2. & vtriusq; cogni- tissima quæ. 465.f
tio. 531.c Inuentio medicinæ. 9.f.8.f
Infantia species. 107.e Inuentum Hippocratis. 128.b
Infanientis signa. 328.c Ionia regio & Peloponēsus,
408.d 181.a
Infantia solutio. 398.c Irio. 111.c
Infusa proprium fructum fe- Ischiados causa & curatio.
runt. 41.e 222.f.77.c.400.b.198.b.c
In somnis quæ obueniant. 81.a
124.f Iuuantia & lædētia.
Insomnia phreniticū. 408.b Iudicationes bonæ vel malæ
Insomnia quæ vexent. 399.c 316.a
Insomnia & ebrietas animū Iudicium sine signo indica-
immutant. 97.e tionis malum. 324.d
Instauratio faciliior quī fiat. Iuniores cur magis seniori-
509.f bus afficiantur. 151.b.c
Instrumenta. 17.a Iunonis templum. 319.f
Instrumēti cōstructio. 483.d Iuuenum victus ratio. 29.e
Insularum qualitas. 109.b Iusurandum Hippocratis.
Intelligentia & prudentia à 2.d
cerebro non à præcordiis.
142.f

L

Abor viris quid cōferat.
243.c

Labor quando noxius. 510.a

Labor quādo vlcera excitat.

358.f

Labores cibos præcedant. *Labore dēstimulā*

358.b *et variis vitiis, somnis*

||| iiii Labores vifidit 7.7

INDEX.

Labores in circuitibus.	325.d	37.c	
Labores subeundi in ætate.	118.e.f	Lateris tubercula qui fiant.	149.d
Laboris effectus.	186.d.187.c	Lateris tuberculum, & ei ⁹ cura- ratio.	168.f
Laborum vis.	115.f.e	Laudandi potius quàm vitu- perandi qui vel tantillum vitam humanam adiuuât.	99.d
Lac cur fiat.	39.a	Lectus ægri qualis esse debe- at.	384.e
Lac nutrimentum.	129.e	Legumina in Aeno.	357.f
Lac asininum pro sero coqui- tur.	277.d	Leguminum facultates.	393.f
Lac pustulas excitat.	322.c	Legumina, arborעי fructus & similia spiritum habent.	35.a
Lac extinctum quænam re- uocent.	256.b	Lenientia, exasperantia, clau- dentia, & aperientia vte- rum aut locellos.	57.b
Lactis facultas.	110.e	Lentes æstuosæ.	111.c
Lactis copia quando.	39.b	Lentis ac Lupini vires.	393.f
Lactis procreatio.	263.f	Lethales alui egestiones.	443.c
Lactis potus.	209.d.222.d	Lethargus & eius curatio.	170.a.173.d
Lactis varietas.	130.a	Lex Hippocratis.	3.b
Lactis suppressi remedia.	239.d	Leges sibi posuerunt homines non intelligentes.	102.c
Lachryma calida & salsa.	419.b.342.f	Libri Hippocratis in contro- uersiam adducti.	2.b
Lachrymæ inuitæ fluentes.	314.d	Libum vestitus.	191.d
Lachrymæ vitronæ & inuo- luntariæ.	354.c	Libya, Delos & Scythia pro omnibus regionib ⁹ ponû- tur.	407.f
Lactuca.	113.c	Lien.	70.c
Lætio ex aceto mulso.	386.d	Lienosorum signa.	356.a
Lagopyrus.	501.c	Lienosi eorumque curatio.	196.c
Lapis Magnesiar.	211.c	Lienosi passiones.	134.f.135.a
Lapis in vesica qui fiat.	190.d	Lien-	
Lapsus ab equo quid attule- rit.	34.c.d		
Larinx.	66.d		
Lassitudines spontaneæ mor- bos denunciât.	509.c		
Lassitudinis curatio.	117.c.d		
Lateris dolor, ex sputis bilio- sis.	410.c		
Lateris sinistri grauitas.			

INDEX.

Lienteria eiusque curatio.	Locum suum singula seruant.
197.c.299.f	101.c
Lienterie symptomata.437.c	Locus morborum differentiã facit.
Ligationum species. 451.c	94.c
Ligna ardentia spiritum emitunt.	Locus affectus spiritu occupatur, vnde rupturã. 97.a
34.f	Locus ad disciplinã aptus est velut eius nutrimentum.
Lignum medico paratũ quale.	3.c
495.a	Locri populi. 535.d
Lini semen. 111.c	Lucis ratio. 16.c
Lingua saliuosa. 399.c	Lucis species duar. 450.c
Linguar vis. 103.d	Luãa. 116.c
Linguar affectar causar & notar variar. 358.c	Lumborũ dolor.409.b & mala alia. 410.d.e
Linguar vocisque diuerfitas. 321.b	Lumborum doloris curatio. 238.c
Linguar obscuritas vnde.23.d	Lumbi aut latera vexata eorumque curatio. 230.b
Linguar spasmũ & tremor. 408.d	Lumbrici lati qui nascantur. 189.d
Linum omnia educens. 297.b	Lumbrici rotundi pariunt, nõ item lati. 189.c.f
Linteola. 16.f	Lumbricus longus. 190.a
Lintea in deligaturis qualia. 452.a.453.d.455.d	Lumbrici lati signa. 190.b
Linteorũ in deligaturis qualitas. 463.f	Luna per somnũ pati visa qd portendat. 125.f
Linteorũ subligationes duar. 452.d	Lupinum. 111.c
Lippitudinis solutio. 398.f	Luxationum curatio. 472.c
Lippitudinis curatio. 508.a	Luxationis curationi communia. 476.c
299.c	Luxationis summa. 491.b
Lippitudinis crisis. 419.a	Luxationis articulorum pedis curatio. 498.a
Loca corporis vacua. 7.a	Luxationis veteris repositio. 471.c
Loca alta & squallida. 108.f	Luxationum mala. 459.f
Loca sancia curatu difficilia. 417.c	Luxus domesticus prohiberi. 16.f
Locorũ mutatio quos iuuat. 359.c	
Locus bilis fel. 183.d	

Machina

INDEX.

M

- M** Achinamenta quibus
partibus adhibean-
tur. 464.c
- Macri signa. 321.c
- Macrocephali. 89.c
- Maculas solares purgantia. 293.c
- Madefactio. 131.a
- Meotis palus Europæ & Asiæ
terminus. 89.b.90.d
- Magi & expiatores. 137.d
- Magi vel venefici quales. 138.a
- Mala odorata. 180.a
- Mala punica. 114.b.202.a
- Mala dulcia. 114.a
- Mala sylvestria. 114.a
- Mala ex usu veneris. 356.d
- Malorum humorum causa. 14.a.b
- Mala homini unde accidat. 14.b
- Malum ex articulo non repo-
sito. 490.a
- Malum à bono non fit nec cõ-
tra. 154.c
- Maligniora quæ derepente ap-
parent. 325.f
- Malagmata pudendi. 240.c
- Maliensis curru onusto cal-
cati historia. 348.c
- Malicorium. 214.d
- Mammæ. 65.a
- Mammæ exasperatæ curatio. 292.f
- Mandibulæ. 72.c
- Maniacis seu atrabiliaris qd
contingat. 523.c
- Manus natura & descriptio. 454.c
- Manus luxatæ signa, repositio
ac curatio. 476.c.f
- Manuum latio quid porten-
dat. 402.a.410.c
- Mare & fontes unde hyeme
calescant & turgeant. 40.d
- Mare perturbatum in somno
quid velit. 127.b
- Mare quibus proficit. 132.a
- Marium corpus. 65.b
- Mas & fœmella quæ gignan-
tur. 104.c
- Masculi in omni genere cali-
diores & sicciores sunt. 106.c
- Mas aut fœmina quomodo ge-
neretur. 57.a
- Masculus dextris in utero hæ-
ret. 327.f
- Matutinæ deambulationes. 116.b
- Maxillæ solæ inter omnia os-
sa venulas habent. 46.d.e
- Maxillæ luxatæ repositio ac
curatio. 477.a.d
- Mazæ facultas. 110.b.c.12.b
- Meatus capitis septem, totque
fluxiones. 64.c
- Meconium quid. 396.a
- Medicina quid. 4.c.94.d
- Medicinæ antiquitas. 8.f
- Medicina qualis. 81.b
- Medicinæ viæ seu partes. 20.a
- Medica ars quibus constet. 312.f
- Medicina cur sapientiæ so-
ror.

INDEX.

- ror. 533.a
 Medicina varia. 129.b
 Medica ars nihil cæteris simile habet. 7.c
 Medicina diuisa in chirurgicæ, pharmaceuticæ & dieteticæ. 10.c
 Medica ars cur refelli non possit. 5.c
 Medicina quæ doceat. 81.f
 Medicina constans & firma tota. 81.f
 Medicinæ pars potissima. 399.a
 Medicina non statim scitur. 80.b
 Medicinæ voluptates & molestiæ. 94.a b
 Medicina morbos omnes nō sanat. 4.c
 Medicinæ artis præstantia & contemptus. 3.b
 Medicinæ comparatio ad agriculturam. 3.d
 Medica ars esse, & vera affirmatur. 8.c
 Medicina ars est de rebus vel morbis vulgo notis. 9.b
 Medicinam homines coacti sunt inquirere. 9.b
 Medicus qualis esse debeat. 16.c c
 Medicus munus. 312.f. 401.a 508.d
 Medici munus in recte tractandis mulieribus. 225.c
 Medico diligenter obseruanda. 361.d e f. 362.10.a 133.c d
 Medico cōsideranda ante curationem. 5.f. 20.d. 401.c
 Medici ad duos fines militāt. 525.c
 Medicū quæ nosse oporteat. 143.c
 Medic⁹ quæ præstare debeat. 143.c
 Medicus deos potissimum colit. 19.f
 Medicus philosophus deo æqualis. 19.c
 Medicus qui laudandus. 379.c
 Medicorum error in arenæ iudicio. 208.f
 Medicus assidue legat. 23.c
 Medico quid agendum erga ægrotantes. 356.b. 357.f
 Medicus cōsiderat morbos in corpore præualentes. 26.c
 Medici præparatio ad articulorū repositiones. 459.c
 Medico præstanda in fracturis. 454.a
 Medici imperiti taxantur. 454.b
 Medico curāda in capite vulnerato. 444.b
 Medicus morbum, vbi nouit, facile pellit. 7.d
 Medicus etiā rudes sciscitari debet. 21.f
 Medicus admonetur. 23.d
 Medicus de quibus iniuste arguatur. 146.c
 Medic⁹ ægros crebro inuisere debet. 20.c
 Medici

INDEX.

Medici plures conuocandi.	do mouéda. 509.d'e.512.d
22.c	Medicamenta nulla quando
Medicus de rebus vulgo no-	adhibenda. 509.d
tis tractat. 9.a	Medicamenta quibus nō ex-
Medicis non vtentes sanari	hibenda. 532.d
posse. 5.a	Medicamentū in repletionē
Medici fama multi, re pauci.	reicitur. 121.d
3.c	Medicamenta purgātia & fi-
Medici personati. Ibidem.	stentia nō satis sunt ad cō-
Medicus mal ⁹ quid agat. 22.c	ualescentiam. 5.d
Medici nauium rectoribus cō-	Medicandum perperam non
paratur. 10.c	esse. 145.e
Medici alimentū salubre ex-	Medicamēta sine fortuna, sed
cogitauerunt. 9.e	melius cum ea sanant. 82.a
Medicorum quorundam opi-	Medicamētum tetragonum.
nio. 24.b	220.f
Medicamentorum vires & a-	Medicamentum sanguinē fi-
ctio. 81.c.191.c	stens. 395.b
Medicamentorum modus.	Medulla offis alimentū. 130.d
324.b	Medulla spinæ, iproprie me-
Medicamēta pro natura cu-	dulla. 45.a
iufque danda. 98.c	Medulia spinę cur resiccetur.
Medicamēta ad conceptum.	208.c.d
265.a d e f. 266.a. 272.c	Medullæ spinæ affectæ signa.
Medicamenta cōceptum re-	418.e
parantia. 302.f	Mel. 113.b. 202.c
Medicamentum contra abor-	Mel Articum. 223.b
tum. 55.d	Mel semicoctum. 82.f
Medicamenta valentia mor-	Melancholici & comitiales
bis acutis, debilia mitiori-	communicant. 362.d
bis exhibenda. 81.d	Melancholicum cacoethes.
Medicamentavalentia ad vl-	408.c
cera. 500.d c f	Melidia graui morbo libera-
Medicamenta, cruda adhuc	ta. 319.f
materia quę noceat. 388.d	Meliffus. 24.b
Medicamenta non adhibēda.	Melos insula. 346.b
79.b	Membra adnascentia. 51.b
Medicamēta danda. Ibidē.c	Membrorum conformatio.
Medicamētis quænā & quā-	104.d

Membrorū

INDEX.

- Membrorū origo. 71.a b
 Membrana tunica. 44.c f
 Mens hominis obscura. 102.f
 Mens quando non fallitur. 399.b
 Mentis situs. 62.c
 Mente valere in morbis, bonum. 510.d
 Menses cur à natura inuenti. 302.f
 Menses quādo pauciores quid agendum. 235.a.301.f
 Menses quos morbos extrudant. 440.c
 Menses mali qui. 439.c
 Menses educentia. 515.c
 Menses quibus diu permanent. 354.c
 Menses diutius quā quatuor diebus fluētes, malū. 245.f
 Menses diutius suppressi quos morbos excitent. 243.c
 Menses sex mensibus retenti incurabiles. 243.f
 Mēsiū varius affectus. 244.a b
 Menses cum in pudendū non procedant. Ibidem.c
 Mensium modus & qualitas. 245.f
 Mensibus septem annis suppressis quid euenerit. 343.a
 Mensium bilioforum signa. 246.c
 Mensium pituitosorum effectus. 247.a
 Mensium plus iusto fluentiū curatio. 306.a d e
 Mensium prouocatio. 264.a
 Mensium purgatoria. 241.c
 Mensium suppressorū curatio. 238.a f. 239.a. 244.c
 229.a b
 Mēsiū defectu mortua. 362.c
 Mēsiū cognitio. 271.b. 247.d
 Menstrua diutius retinentibus quæ ægritudines continent. 36.c d
 Menstruarum purgationū circuitus est. 325.c
 Menstruorum in iunioribus & senioribus differētia. 83.2
 Mentha. 113.d
 Meretrices quæ docuerunt. 48.a
 Mespila. 114.a
 Mesocolon. 66.d
 Meton vehementi febre correptus. *versia* 118.b
 Milium quid sistat. 321.c
 Milium alit. 111.c
 Militarium vlcerum curatio. 18.c
 Ministri quales ægrotis dādi. 21.a
 Mira & brevis tum humorū tum partium animalis enumerationatio. 129.c
 Missio sanguinis vbi & quādo facienda. 17.c d
 Mistiones in hoīe bonæ. 14.d
 Modicis impleri & pluribus vacuari quī contingat. 115.a
 Molæ in vtero generatio & expulsio. 292.a
 Molæ cōceptus causa, signa ac curatio. 307.b c. 363.c d
 Mollitoria. 297.b
 Molli-

INDEX.

Mollitoria vteri varia.	296.e	bonum.	510.d		
μολυστία.	115.e.200.b	Morbus quando debiliior &	quando fortior.	510.e	
Moræ.	113.f	Morbus facer quibus diis tri-	buatur.	138.c d e.143.c	
Morbus typhosdicitus cū cau-	lis ac curatione.	218.a b.	Morbus facer sanabilis.	138.f	
	219.a	Morbus deficcatorius & cu-	ratio.	170.b	
Morbus biliosus.	223.c	Morbos iudicare quid.	194.b		
Morbus sanguineus. Ibidē.	d	Morbi laterum causa & cu-	ratio.	Ibidem.a f	
Morbus liuidus & curatio.	170.e	Morbi pituitosi causa & cu-	ratio.	211.d	
Morbus ructuosus eiusque cu-	ratio.	170.f	Morbi crassi & hydropis ea-	dem est curatio.	222.e
Morbus pituitosus eiusq; cu-	ratio.	171.b.223.c	Morbi estate vexantes eorū-	que curatio.	195.a c
Morb ⁹ magnus, à renum mor-	bo.	210.a	Morbi hepatici causa, signa	ac curatio.	213.f.214.a b d e
Morbus crassus sex annos ve-	rat.	222.e		215.b	
Morbus locellorum.	225.d	Morbi varij.	332.e		
Morbus ex abortu dolorem	vicinis vteri partibus com-	municans.	225.d	Morbi æstiuī & autumnales.	310.e.311.c
Morbus regius.	338.d.313.c.	373.d.396.e.398.a.400.c	Morbi lethales.	228.b c	
Morbus regius acutus eiusq;	curatio.	175.a.180.a.198.e	Morbi qui ante pubertatem	nō fiunt.	439.b
Morbos æstiuos hyems succe-	dens soluit.	337.e	Morbi natura.	327.c	
Morbos latentes opinio po-	tius quàm ars iudicat.	94.c	Morbi popularis cura.	27.b c	
Morbus imaginationis.	64.d	Morbi ex mensibus suppres-	sis.	439.c	
Morbus à venis ortus.	72.c	Morbi post canem fyds qui.	363.a b.364.365.&c.		
Morbus niger eiusq; curatio.	172.a b c	Morbi ab spiritu fiunt.	95.b		
Morbus stercoris vomitū fa-	ciens.	123.f	Morbi.11.à pituita cum cura-	tione.	199.a
Morbus corruptorius eiusq;	curatio.	172.d	Morbi cur obscuri.	7.b	
Morbusaliquo modo affinis,		Morbi obscuri multi,manife-	sti pauci.	6.e	
		Morbi ex ptu curatio.	284.2	Morbi	

INDEX.

- Morbi paulatim accedunt.** 100.c
Morbi cuiusq; vterorum se-
datio. 298.a
Morbi vernaculi. 84.e
Morbi acuti vnde. 399.d
Morbi lethales. 151.d.144.c
Morbi ex abortu causa & cu-
ratio. 259.f.250.d
Morbi comitialis diuersi af-
fectus. 139.f
Morbi ex repletionem curatio
& cōtra. 510.b.120.f.122.b
Morbi à capite orti. 156.b
Morbi partium anni. 135.e
Morbi mutilantes. 144.d
Morbi longi. Ibidem.e
Morbi cito decernētes. Ibid.
Morbi in alios transeuntes.
Ibidem.
Morbi necessario ex aliis su-
peruenientes. Ibidem.f
Morbi acuti qui. 379.c
Morbi connutriti curatio.
358.d
Morbi dubij. 144.d
Morbi ab hepate & splene.
321.d
Morbi diebus imparibus iu-
dicantur. 180.d
Morborū causā. 186.e.187.
f.24.f.26.f.135.d 144.b
193.a
Morbi vnius signa septē. Ibi.
Morborum tria principia.
187.a
Morborum quinque crassorū
causā & curationes. 221.a
b f.222.a d
Morborum acutorum natu-
ra. 195.a
Morborum causā aer & vi-
ctus ratio. 27.a
Morborum ex victus ratione
curatio. 393.c
Morborum diuersi effectus.
338.d.340.b
Morborum omnium cōmu-
nes solutiones. 393.a
Morborum vteri fere omniū
curatio. 283.e
Morborum cognitio & obser-
uatio varia. 315.c.197.e
Morborum modi. 135.c
Morborum effectus diuersi.
150.f
Morborum omniū idem mo-
du. 94.e
Morborum duo genera. 534.a
Morborum natura medicus.
358.c
Morborum decreta. 185.c
Mores feri. 84.e
Moribundis in Perintho quē
acciderent. 324.b
Mori appetentium curatio.
79.f
Morituri & futuri supersti-
tes quib⁹ noscant. 407.e.f
Morituri ex vulnerato capite
signa. 449.c
Mors Hippocratis. 1.f
Mors quo tempore accadat.
327.e
Mors vnde contingat. 51.a
Mortis signum. 409.c.418.c
Morum diuersa ratio in Eu-
ropæis atque Asianis. 92.f
93.a

INDEX.

- 93.a
Mucus à natura . 73.d
Muliebris menstrui causa. 243.c
Mulier vterum gerens cur à mensibus non doleat. 36.a
Mulier præter naturam pinguis non concipit. 55.d
Mulier quæ prægnans fiat. 239.c.241.a
Mulier cur sit viro calidior. 243.c
Mulier ab vtero quo modo stranguletur. 246.b.c
Mulier concipere solita cur non concipiat. 304.d
Mulier bimestrem aut grandio-rem foetum cur perdat. 55.d
Mulier lienosa. 356.c
Mulier Larissa decimo mense abortit. 346.c
Mulier concipere cupiens. 349.f
Mulieris non concipiētis purgatio. 241.d.305.a.247.c.250.a
Mulieris à partu non purgatae curatio. 227.b
Mulieris corpore male habente menses pauciores fluunt. 246.c
Mulieris cibum, ob vteri dolorem, auersantis curatio. 237.c
Mulieris semen retinētis sed non concipiētis curatio. 308.d
Mulieris inuita abortum facientis curatio. 308.f
Mulieris quæ diu non concipit, curatio. 237.d
Mulieris præ obesitate non concipientis curatio. 303.d.f.305.f
Mulieris decumbentis in litore historia. 319.d
Mulieris apud Tisamenū decumbentis historia. 330.f
Mulieris à morbo vteri obmutescētis curatio. 287.b
Mulieri post viri congressum quid agendū. 248.b
Mulieri semen non continēti quid agendum. Ibidē.d
Mulieres rariore carne & teneriore quàm viri. 243.a
Mulieres cur steriles fiant. 301.b.d.303.c.226.f. cur non concipiant. Ibidē.b.f
Mulieres crassas cur non concipiant. 229.d
Mulieres etiā hydropem patiuntur. 192.d
Mulieres quæ grauius è mē-
sibus ægrotent. 242.c
Mulieres à vatibus deceptæ quid Dianæ consecrarent. 225.a
Mulieres quæ paterentur. 313.c
Mulieres in cōceptu errant. 49.c
Mulieres, quæ longius quàm decem menses vterum gestasse visæ sunt, falluntur. 42.d
Mulieres nihil aut parum la-
tis ha-

INDEX.

- Ais habentes. 43.a
 Mulieres vterū non gerētes à
 sup̃p̃ssis mēsis⁹ dolēt. 36.b
 Mulieres menstruīs carentes
 non concipiunt. Ibidem.
 Mulieres plus vel min⁹ in par
 tu laborantes. 37.b
 Mulieres cur falsò se vterum
 gerere credant. 280.e
 Mulierū diuersæ naturæ, tum
 à coloribus, tum ab ætati-
 bus petitr. 225.c
 Mulierum affectus. 360.b
 Mulierum victus ratio. 30.e
 31.a.c
 Mulierū diuersi morbi. 341.e
 Mulierum trium ægrotantiū
 historia. 331.a.b.c
 Mulierum fœcunditatis co-
 gnitio. 420.c
 Mulierum Scythicarū formæ
 fluxæ. 91.e
 Mulierib⁹ iudicio præditis de
 partub⁹ fides habēda. 49.d
 Mulieribus omniū morborū
 causæ yteri. 82.b
 Multi valetudinarij nascun-
 tur. 52.c
 Multi etiā imprudētes in me-
 dicinā incidunt. 5.a
 Multi priore cibo perierunt.
 9.d
 Multa ex vno quo modo gi-
 gnantur. 39.e
 Mundi imitatio. 102.c
 Musculi solidiores. 130.c
 Musica. 103.c
 Mustum. 113.a
 Mutatio ciborū quī fieri de-
 beat. 382.c. 383
 Mutatio subita & magna pe-
 riculosa. 383.b. 384.f
 Mutationes locorū ac victus
 morbos gignunt. 52.e
 Mutationes locorum, varios
 homines procreant. 93.b.c
 Mutationes mentem excitāt.
 90.b
 Mutatiōes quæ cauēde. 357.a
 Mutatiōes temporis & aeris
 morbos pariunt. 511.b
 Mutationes temporum mor-
 bos pariunt. 136.a
 Mutationes temporū obser-
 uandæ. 88.d
 Mutus cur fiat quī comitali
 morbo corripitur. 139.f
 Muti vnde. 47.e
 Mutili à natiuitate curabiles.
 491.d
 Myli ægri historia. 313.d

N

- N**ares repletæ nihil emū-
 gentes. 120.c
 Nares humidæ habētes qua-
 les sint. 359.d
 Narium qualitas. 71.e
 Nasi fracti curatio. 478.f
 479.b
 Nasturcium. 113.c
 Natationes somniare quid ve-
 lit. 127.d
 Natura faciēdæ demonstrat. 8.a
 Natura repugnāte omnia ir-
 rita fiunt. 3.d
 Natura calidior quantum à
 cæteris variet. 108.a
 Natura in omnibus dux. 19.c
 †††† Natu-

INDEX.

Natura ossium, neruorū, venarum, carnis & aliorum humorū quī cognoscatur.	359.e	Nexus qua parte procedat.	451.d
Naturæ humanæ descriptio.	533.b	Nicodemi Abderitani historia.	336.a b
Naturæ actio.	7.f	Nihil temere iudicandum.	355.e
Naturæ conatus & vis.	103.b	Nocumentum nullum à medico bono, aut ab arte medica oritur.	5.d
Naturæ & morbi quib⁹ aquæ in potu salubres.	86.a	Nomæ lethaliissimæ.	417.f
Naturæ diuersæ ignis & aquæ varia temperatura fiunt.	107.c	Nomina artibus ex speciebus imposita.	4.d
Naturæ varix variis sensibus percipiuntur.	107.c d	Nomina lege naturæ indita.	4.e
Naturæ calidioris victus ratio.	107.f. 108.b	Non eadem via feminis & virinar.	31.f
Naturæ diuersæ victus.	107.f 108.a	Nosce morbos & curare eiusdem est scientiæ.	7.c
Naturæ quæ nulla cura aut victu mutantur.	108.c	Notæ ex collo & faucibus.	430.e
Naturæ studium.	7.d	Notæ ex præcordiis & ventre.	431.a b d
Naturæ modum excedēs nihil bonum.	509.e	Notæ ex lumbis.	432.a
Naturarum cognitio.	106.c	Notæ ex sanguinis eruptione.	Ibidem.d
Nebri qui dicantur.	536.b	Notæ ex dentibus.	429.f
Nebula quid.	40.f	Notæ ex maxillis, labiis, gingiuis, sputis & secretionibus.	430.a
Necessaria medico futuro.	3.d	Notæ ex voce.	Ibidem.b
Neruus torpidus.	66.c	Notæ ex dysenteria.	437.c
Nerui quomodo facti.	44.d	Notæ ex vrina.	441.a
Nerui vbi non sint.	72.d	Notæ ex sputo.	434.e. 435.f
Nerui à cerebro.	68.c	Notæ ex prægnatib⁹.	439.d c
Nerui non lædendī.	473.c	Notæ ex variis affectibus.	436.a b. 438.d
Nerui cur dolore minus affligantur.	15.f	Notæ ex puris mixtiōe.	415.c
Neruorum generatio.	46.b 66.e	Notæ ex lethargo.	426.e
Neruorū distributio.	326.c d	Notæ ex vertigine.	421.f
Neruorum qualitas.	72.c	Notæ	

INDEX.

- Notæ ex oculo rupto & pro-
minente. 419.c
- Notæ ex doloribus aurium.
428.c.d.f
- Notæ ex morbo regio.
428.c
- Nota vberioris alimenti.
509.f
- Notæ ex hydropo, tabe, po-
dagra & morbo sacro. 415.
d.416.d.e.f
- Nuces. 114.c
- Nuclei. 114.b
- Nyctalops quæ curetur. 507.f
422.a.359.f
- Nyctalopicæ affectiones in
pueris. 360.b
- O**
- O Besorum victus ratio.
29.f
- Oblivio malum. 409.d
- Oblivio & nocturna vocife-
ratio unde. 142.d
- Oblivio dysenterici quæ.
364.a
- Oblivionis causa. 531.c
- Obseruanda in ægris. 343.d
324.b
- Obseruanda medico in mor-
bis dignoscendis. 531.a.b
- Obseruanda, ac cauenda cir-
ca victus rationem. 394.c
381.c
- Obseruanda circa viscera tra-
ctanda. 417.a
- Obseruatio varia. 414.b
- Obseruatio variorum peruti-
lis. 133.f.134.a.b
- Obseruatio præcipua in ocu-
lorum lippitudine. 419.f
- Obseruatio in Typho mor-
bo. 218.c
- Obseruationes morborum. 26.f
- Obseruationes præcipuæ. 414.c
- Obseruatione digna. 99.f.
100.a
- Obseruationis modus ad præ-
dictionem. 414.c.d
- Obsonium in renum morbis.
209.f
- Obsonia ex variis sitritis præ-
parata. 115.b
- Occasiones temporum. 144.f
21.c
- Occasiones morborum con-
siderandæ. 357.b
- Occasiones curandi tempe-
stiuæ. 145.b
- Intempestiuæ. Ibidem.c
- Ochri siue phasioli. 111.b
- Ocimestris partus. 48.c
- Ocimestres non superstites
manent. 49.c
- Ocimestria & trimestria cur
non viuunt. 51.c.52.a
- Oculus totius corporis tem-
peraturæ index. 558.b
- Oculi contractio mala. 410.a
- Oculi corrupti qualitas & cu-
ratio. 507.c
- Oculi humor. 47.d
- Oculi fulgētes. 75.c
- Oculi situs & utilitas. 535.b
- Oculi distortio malū. 409.d
410.b
- Oculorū doloris curat. 517.c
- Oculorū consideratio. 429.c
- †††† ij Ocu-

INDEX.

Oculorum medelæ.	395.e	Opifex, naturæ vel artis infra	
Oculorum fluxiones.	355.f	mentis vitur.	6.b
Oculorum fluxionis in nares		Opinio in medicina perni-	
aerfio optima.	373.f	ciosa.	19.d
Oculorum figna.	354.fe	Opisthotonos eiusq; curatio.	
Oculorum fordes ficcæ.	419.a	175.c.d.400.a.224.a	
Oculorum tumor. Ibidem.b		Oratio Hippocratis ad aram	
Oculorū notæ.	399.d.401.d	confidentis.	534.e
Oculorum tumor.	75.c	Oratio legati ad Athenien-	
Oculorum remedium.	130.e	fes.	535.b
Oculorum tres tunicæ.	71.e	Ordei facultas.	110.b
Oculis nullum pharmacum		Ordeum Achileum.	179.d
adhibendum.	75.c	Ordeum torrefactum. Ibid.f	
Oculis potius quàm opinio-		Origanum.	113.e
nibus credendum.	100.f	Origo venarum & arteria-	
Oculis incōmodi cibi.	373.f	rum.	129.e
Ocymum.	113.d.202.a	Oris male olentis purgatio.	
Olera.	201.f	292.e	
Oleum & oleofa.	202.c	Oris vteri plus quàm in mē-	
Oleum Aegyptiū albū.	229.f	fibus hiātis curatio.	289.f
Oleum quibus vlceribus in-		Oris vteri inflammati cura-	
utile fit.	499.c	tio.	282.c.283.c
Olerum quodnam bonum.		Oris vteri femen præ duritia	
396.b		non fufcipientis curatio.	
Olfactus cauffa.	47.b.71.e	288.b.c	
Olfactum male afficientia.		Oris vterorū occlufi curatio.	
133.f		235.f.289.c.307.f	
Omentum quando putrefcat.		Oris vteri humidi curatio.	
144.f		229.e	
Omne vnum eft. Ibidem.a		Os vteri fiue vulnæ conclu-	
Omne incōcretū cauum.	6.f	fum.	243.c.d
Omnes doloris cauffæ ad idē		Oris vteri vlcerati curatio.	
referuntur.	10.b	237.f.239.b	
Omnia terræ nafcētia fuę ter-		Os capitis duplex.	444.d
ræ naturā fequuntur.	93.f	Os capitis tenuiffimū quod.	
Oīs attenuatio laxat ac cor-		Ibidem.e	
rugat cutē, renutritio con-		Os eminens quando præfe-	
tra.	357.a	candum.	466.d
ὀφθαλμία.	64.d.311.c	Os femoris quàm periculo-	
		fum	

INDEX.

sum.	492.f	104.a
Os intro cedit multis modis	445.e	Pallidorū curatio. 80.c.d.e
Os quæ patiatur.	446.d	Palpebrarum curatio. 507.f
Os sacrum.	65.f.326.d	Palpebrarum ficus. 332.e
Os tibiæ eminens.	492.e	Panacea. 2.d
Osculi yteri alio inclinati cura- ratio.	280.d	Panificia varia. 9.d.103.e
Ossa quæ fiant.	44.f	Panis varietas. 110.f
Ossa vnde.	44.d	Panis differentia. 12.a b.201.c
Ossa quare à propriis locis di- scedant.	466.c	Panis calidus sitim, & alia in- ducit. 383.c.111.b
Ossa rupta minus periculosa quæ.	449.a	Papauer. 111.d.114.b
Ossa puërorū qualia. Ibidé.b		Pupilla qualis. 47.c.d
Ossa digitorū, man°, pedis & articularū.	65.e.&.66.c	παράδειγμα à cucumere. 33.f
Ossis maioris abscess°. 464.b		παράδειγμα à rosa & allio. 180.c
Ossis rupturā ambiguum co- gnoscendi ratio. 448.b.c		Paracynanche eiusque cura- ratio. 174.f
Ossis capitis confracti cura- tio.	326.f	Partheniū microphylū. 501.b
Ossis simplex fractura. 462.c		Parij ægri historia. 333.e.f
Ossis suppurati signa. 449.d		Pariunt statuto tēpore peco- ra. 43.c
Ossium cautorū actio. 38.a		Pars robustissima cur in coi- tu secernatur. 31.f
Ossiū,neruorū,carnis,cutis& venarū in corpe vsus.68.d		Partes mēsis aliquot. 53.a
Ossium fractorū & eminē- tium curatio. 465.e		Partes singulæ quæ nutriātur. 101.d.e.f
Ossium coactio. 487.d		Partiū iternarū feruor.195.b
Oscitationum assiduarū cu- ratio. 324.f.355.b		Partus qualis. 43.c
Oues & capræ comitiales. 141.c		Partus septimestris. 48.c.e
Ouorum facultas. 112.e		Partus gemellorum. 322.e
Oui candidum. 179.f		Part°quo morbo liberet.225.f
P		Partus cū vlcere in coxa no- no mense editus. 346.c
Alati fluxio. 64.e		Partus cur non omnes robu- sti edantur. 33.e
Palestra & Pædotriba.	50.a	Partus quando periclitantur. 52.b
		Partus macilenti ac tenues. 50.a

†††† iij Par-

INDEX.

Partus septimo mense quid agat.	49.b	curatio.	457.e
Partus quo pacto educat.	53.e	Pedum tumor.	502.e
Partus quomodo edantur.	53.e	Pedum calor febris solutionem denotat.	389.e
Partus mortuus quo pacto educetur.	53.f.58.e	Pedū frigiditas febriū accessum significat.	389.e
Partus varia similitudo.	33.d	Pedum torporem quid discutiatur.	224.f
Partus acceleratio.	43.b	Pedibus manibusq; distentus ac tort ^o curatur.	79.f.80.a
Part ^o retinēdi curatio.	250.b	Pellicula spumosa.	68.f
Partus difficultas quā tollatur.	253.a.b	Pellicula ab acre prefrigido superinducitur.	46.b
Partus appropinquantis signa.	252.f	Pellium tinctorum.	103.e
Partus difficultas unde.	252.d	Penicilli plumbei preparatio & usus.	281.c.282.a.304.a
Partus frustulatum extractio.	58.e	Percussus in palpebrā sine oculi latione sanatus.	350.c
Partus directio.	59.a	Perdiccas rex phthificus creditus.	1.c
Partus conceptio.	102.a	Perforationis modus quis.	449.f
Partum accelerantia.	266.b.c	Perfrigeratio malum.	409.d.f
Partum iuvantia.	265.c	Periclis Abderitani historia.	335.b
Patella.	65.f	Periculū mortis in prāgnante.	252.a
παβήματα.	15.b	Perinthus.	320.d.323.d.134.f
Puris in utero semen corruptis purgatio.	304.d.e	Peripneumonia quā fiat.	152.b
Pecora prāgnaria à potu & cibo pinguiora fiunt.	39.b	Peripneumonia & eius curatio.	163.f.164.b.176.a.193.f.194.b.392.d
Pectoris dorsive disruptio.	206.b	Peripneumonia quā suffocet.	153.f
Pecten.	69.d	Peripneumonia quid faciat.	400.d
Pectinis prae fluxu dolentis curatio.	295.a	Peripneumoniace affectiōes.	392.a
Pectus.	65.b	Peripneumonia	
Pectus in dorsum ruptum & curatio.	169.c		
Pedis cum manu collatio.	457.e		
Pedis & ossium eius fractorū			

INDEX.

Peripneumoniæ causæ. 194.	ria. 329.f
cf	Philini vxoris puerperæ Tha
Peripneumoniæ & pleuriti-	siæ mors. 317.a b c
dis signa. 435.b	Philisci ægri historia. 313.c.
Peripneumoniæ & pleuriti-	314.f. 316.c
dis differentia. 75.e f	Philonis filia cur mortua.
Pernicies fœminarum. 409.f	314.d
Pernionum curatio. 373.f	Phreneticus moritur. 334.f
Perpédenda in luxationibus.	Phrenetici signa. 408.c
471.d e	Phrenetici qui pereant. 153.f
Persarum bellum contra Græ-	Phrenitis qui fiat. 153.c
cos. 536.f	Phrenitidis solutio. 358.c.
Pestilentia obsidentium sum-	408.b
ma. 535.f	Phrenitides cum curatione.
Petêda in vulneribus capitis	174.d. 193.f. 194.c f
418.a	Phthisis. 64.f
Petenda à diurnas fluxio-	φύκτα. 63.a
nes patientibus 421.b	Physicus hominis habitum ac
Phagedænosus puer quæ pas-	robur considerat. 306.f
sus sit. 339.f	Phylam Alexandri pallicem
Phanocritus. 315.a	Perdiccas deperibat. 1.d
Pharmacû daturus quid prius	Physiognomia. 326.e
agat. 98.e f	Pilarum vsus in fracturis.
Pharmacum quid agat. 25.e	464.f
Pharmacû post dolores dan-	Pinguedo conceptum impe-
dum. 261.a	diens, quomodo curâda sit
Pharmaca fortuna reperta.	56.f
200.c	Pinguis signa. 321.e
Pharmaca cautius exhibêda.	Piper dentes iuvat. 359.e
198.f	Pira. 114.a
Phamagoræ ægri historia.	Pisa infant. 111.b
313.e	Pisces, edulium leue. 201.f
Phasianorum descriptio. 89.f	Pisces erronei. 112.b
Phasis incolæ. 89.e	Pisces graniorei & leuiorei.
Phasis qui fluat. Ibidem.f	Ibidem.b c
Pherecydis ægri historia.	Pisces falsi. Ibidem.c
574.e	Piscium facultates. Ibidem.a b
φλέγμα λυκόρ. 196.b c	Pittacus. 321.c
Philistis in Thaso ægri histo-	Pituita eiusque curatio. 210.c
	††† iiii Pituita

INDEX.

- Pituita cur hyeme augeatur. 25.f
 Pituita alba eiusque curatio. 171.d. 398.c
 Pituitæ ex ore ac naribus flu-
 entis signa. 253.c
 Pituitæeductio. 300.a
 Pituitæ vires 181.f
 Pituitosæ ac biliosæ mulieris
 purgatio. 289.a
 Pituitosi & biliosi furores
 quales sint. 142.c
 Pituitosi in ediam facilius fe-
 runt. 383.a
 Planta spiritum habet. 39.f
 Pleiades. 88.d. 310.b
 Pleiadum occasus. 339.b.c.
 340.c
 Pleiadum ortus. 118.d
 Pleiadum occasus. Ibidem.b
 Plenitudinis signa. 120.d.
 121.a
 Plenitudinis curatio. 120.d.e.
 121.b.c.f. 122.b. 125.c
 Pleuritis quæ fiat. 152.b.c
 Pleuritis quando enecat.
 153.f
 Pleuritis ex dorso eiusque cu-
 ratio. 177.c.d.e
 Pleuritis sanguinea & curatio
 178.b
 Pleuritis sicca, & eius curatio
 77.f. 78.a
 Pleuritis & eius curatio. 163.
 b.c.d. 177.a. 193.f
 Pleuritides sicca & biliosæ.
 177.b
 πληρωμα. 150.a
 Plus quiescendum quam labo-
 randum hyeme. 119.b
 Pluuia clemens visa in som-
 no quid significet. 126.c
 Pneumonis siue pneumonia
 eiusque curatio. 204.d
 Pneumoniarum causa. 205.b
 Podagra. 198.d
 Podagra qui laborent. 517.c.
 & quando fiat. 517.f
 Podagræ curatio & signa ex
 eadem. 416.d
 Podagræ medela. 299.b
 Podagrici morbi. 397.c
 Poena quæ malis medicis ir-
 rogatur. 3.c
 Polenta ex ordeo. 201.c
 Polentæ recentes. 111.b
 Polypus cum curatione. 161.
 b.c.d.e.f. 193.e
 Poma. 113.f. 118.c
 Porcinæ carnis vires. 394.a
 Porrum. 113.b. 202.a
 Portulaca. 113.d
 Positio partis vulneratæ qua-
 lis 452.f
 Postrema in morbis qualia.
 314.b
 Post canem febres quales.
 351.f
 Post purgationem exhiben-
 da. 199.f
 Post partum quæ eueniant.
 256.c.d.
 Potestas mala res. 539.b
 Potio ad fluxum rubrum.
 293.c
 Potio ad omnes morbos ab
 vteris ortos. Ibidem.d
 Potio ad fluxum album.
 295.a

INDEX.

295.a	Potiones mensium & secundarum purgatoriæ. 271.f.	Prædictiones exemplis confirmantur. 413.d
272.a	Potiones refrigerantes in febre ardenti. 179.c d e f	Prædictiones ex stercore. 415.a b
Potiones in promptu habendæ. 20.c	Potus via 66.d	Prædictiones ex lippitudinis signis. 419.c
Potus in pulmonem non deuenit. 191.b	Potissimum in fracturis curandis. 464.a. 462.c. 463.b	Prægnans non vtens coitu, facilius parit. 54.c
Prandium. 115.f	Præcautio ad conuulsionem. 30.c	Prægnans vnde moriatur. 228.a
Præcisa, quæ non coalescant. 146.c	Præcognitio & cognitio quid 120.c	Prægnans qui cognoscatur. 240.c
Præcordiorum inflammationes vnde. 388.c	Præcordiorum dolor. 410.b	Prægnans cur sit pallida. 252.c
Præcordiorum tumores. 397.b	Præcordiorum notæ. 402.c d	Prægnantis lienosæ affectus. Ibidem.b
Prædicendum nihil quando. 414.b	Prædicendum quid sit medico. 413.c	Prægnantis varia signa. 302.c d. 54.f. 55.c
Prædicendum prudenter. 413.c	Prædictio ex hæmorrhoidibus. Ibidem.d	Prægnantis foetum menstruum gestantis curatio. 229.c d.
Prædictionis modi qui derideantur. Ibidem.a	Prædictiones ex potu & cibo immodico. 414.a c	Prægnantes quando purgandæ. 512.d. 515.c d. 516.a b
		Prægnantium morbi. 250 e f. 251.c
		Prægnantibus terram vel carbores edentibus quid eueniat. 54.f. 55.a
		Præmia medico constitutum. 21.f. 22.a
		Prænotio futurorum qui pareretur. 83.d e
		Præfagia bona & mala ex insomniis. 125.c
		Præfagia ex temporum qualitate. 87.e f. 88.a b c
		Primiparæ magis in partu laborant. 43.d
		Primus dies in ægro obseruandus

INDEX.

pus.	390.e	Pudendi puerperæ obturati,
Principium alimenti.	129.e	causæ & signa. 255.e
Principium sanationis curnul-		Pudendi exulcerati curatio.
lum.	146.d	238.b f. 239.b. 240.c
Principia artis supponenda.		Puellæ cur tardius cõformen-
44.b		tur. 37.f
Priores artis medicæ taxan-		Puellæ à pueris qui differant.
tur.	8.d	50.f
Procreatio diuersa.	104.f	Puer à mulo percussus. 349.e
Prinorum hominum victus		Puer in caput prius naturaliter
ratio in hyeme, vere, æstate,	29.c d e	procedit. 42.c. 43.d
& autumnno.		Pueri cur semen non emittant.
Productionis & exacerbationis	336.f	32.b
morbi causæ.		Pueri situs in vtero. 41.f
Profluuium alui diuturnum.		Pueri quid peculiare à natura
398.e		habeant. 50.f
Profluuium alui.	39.f. 197.d	Pueri liuidi ac mortui expul-
Profluuium alui & vomitus		sio. 268.f
quibus conferat.	508.d	Pueri natura. 327.d
Profluuij alui ex partu curatio.	270.a	Pueri carnosius minus lactis sugunt.
Prominentiæ capitis priore	444.c	59.d
parte.		Pueri fugiẽtes simul & meientes.
Proprium medicæ artis.	8.b	Ibidem.e
Prospicienda medico.	83.b	Pueri modo parui, modo magni
Prudens natura quantum pos-		nascuntur. 33.f. 34.a
sit.	31.d e	Pueri cur mutilati nascuntur.
Prudentis viri consideratio.		34.a
31.c		Pueri sani & integri fere semper
Prisana.	179.e	ex mutis nascuntur. Ibidem.b
Prisana integra	169.f	Puerorum hydropicorum curatio.
Prisana quando exhibenda.		77.f
380.c		Puerpera gemellarum Cyzicena
Prisana laus.	Ibidem.b	mortua. 337.b
Prisana succus.	179.f	Puerperæ plus satis purgatae
Prisana conficiendæ ratio.		signa. 255.b c
380.e		Puerperæ recens enixa curatio.
Prisana incommoda.	380.f	58.b c
Pubertatis causa.	38.c	Puerperæ diuersa purgatio.
		267.a

INDEX.

- 267.a
Puerperæ Cyzicenæ historia 337.b
Puerperæ in Thaso decumbentis historia. 334.b
Puerperæ in quæ mala facile incidunt. 242.e f
Puerperæ non purgatę curatio. 254.c d
Puerperæ non satis purgatę affectus. 254.f
Puerperæ à secunda non liberata curatio. 256.c
Puerperæ cum non bene purgantur periculum. 37.d
Puerperij purgationis mensura & color. 263.e
Puerperij purgatiões. 266.d. e. 253.e
Puerperi, non purgati mala. 253.f 254.c. 255.b
Pulegium. 180.b. 113.e
Pulmo. 45.e. 60.d. 129.e
Pulmo cordis calorem moderatur. 61.e
Pulmo cor humectat. 61.b
Pulmo tumens præ calore curatione. 174.a
Pulmo consumitur. 64.f
Pulmo cum nihil plenus expurgat, malum. 404.c
Pulmo repletus & curatio. 168.c
Pulmo ad latus prolapsus curatione. 168.d
Pulmonis arteria exulcerata venæque rupta. 203.a b
Pulmonis morbus & curatio. 166.d
Pulmonis suppurati signa. 176.c
Pulmonis inflammatio. 105. c d.
Pulmonis hydrops & eius curatio. 169.a
Pulmonis & arteriarum diuersitas. 151.a
Pulmonis tuberculum. 149.a
Pulmonis tuberculum quifanetur. Ibidem. b c
Pulmonis erysipelas, eiusque curatio. 205.f
Pulsus venarum. 397.f
Pulsus & respiratio, signa sanitatis & morbi. 130.c
Pulsus circa tempora. 96.c
Pura omnia a deo dari quare per somnū videntur. 126.e
Purgatio puerperæ in caput progressa quid efficiat. 255.e
Purgatio in faciem progressa. Ibidem. f
Purgatio qua parte ducenda. 509.d
Purgatio sursum aut deorsum quando fiat. 512.f
Purgatio ventris quibus vlceribus proffit. 499.c
Purgationem quid præcedere oporteat. 509.f
Purgationes quot diebus fiant. 37.f
Purgationes menstrua multę unde fiant. 245.d
Purgationes diuersę. 271.f
Purgationes quomodo assignandę. 509.d e
Purgatoriū

INDEX.

- Purgatorium molle aquam & pituitam ducens. 242.c
 Purgatorium ad multa. 271.c.d
 Purgatorium molliens. 241.e 242.c
 Purgatorium tepidum. 242.f
 Pus è pectore sectione vel v-
 sione educitur. 204.f
 Pus collectum quid faciat. 76.c
 Pus qui fiat. 499.a
 Pus ex tumore interiore qui educatur. 164.e
 Pus ulceris alimentum. 130.d
 Pus optimum quale. 402.f
 Puris emissio. 206.f
 Pustulæ ex lassitudinibus. 340.f
 Pustulæ totius corporis vnde. 227.f
 Pustulæ latæ. 355.e
 Pythicum templum. 535.d
 Pythionis ægri historia. 328. d e 334.d
- Q
- Q**ua cura Hippocrates græciam à pestilentia liberauit. 1.e
 Quæ aduersa vel secunda fortuna fiant. 82.a
 Quæ ægre ac facile pariant. 53.d
 Quæ congelent. 115.f
 Quæ attenuetur & colliquetur in hydropico. 192.a
 Quædam citius, quædam posterius pariunt. 43.c
 Quædam opifici, quædam operibus imputanda. 6.d
 Quæ ex terra gignuntur quomodo crescant. 39.d
 Quæ ex rupe ceciderat sup-
 stes mansit. 350.e
 Quæ generantur & pereant, comiscantur & discernuntur. 100.f. 101.a b c
 Quæ foetum expellant. 267.e f
 Quæ foetum perdere conabatur, mortua est. 350.e
 Quæ mulieres facilius suppressos menses ferant. 242.f
 Quæ præstare debeat medicus. 2.f
 Quæ prius conformentur. 51.f
 Quæ prospicienda medico. 12.b. 15.a
 Quæ recidivas faciant. 320.e
 Quæ sint morborum principia. 180.d
 Quæ sint in natura hominis. 24.f
 Quæ superfoetant. 53.c
 Quæ vulnera poscant. 17.a
 Qualis panis & maza. 12.d
 Qualitates fortissimæ. 12.c
 Quando in partu matres foetusve pereunt. 43.d
 Quanto tempore brachium fractum coalescat. 457.c
 Quantum ab omnibusコレ-retur Hippocrates. 1.e f
 Quare nonnulli ab aliis differant.

INDEX.

- rant. 90.d
 Quare hoc calidum, illud cō-
 tra putatur. 12.f
 Quare morborum calor non
 statim cessat. 13.d
 Quartana quo tēpore, & qua
 etate grassetur. 28.f
 Quartana à quibus immunes
 præstet. 359.b
 Quartanæ longæ, & breues
 quæ. 510.b
 Quartanæ diurnæ. 355.d
 Quartanæ erroneæ. 311.d
 Quartanas diuturnas porio
 soluens. 532.d
 Quatenus medicina vitupe-
 retur. 4.f
 Quatuor paria neruorum.
 27.d
 Quibus diis supplicaretur.
 126.f
 Quī calor, & frigus concipia-
 tur. 13.b
 Qui causas morborum probe
 nouit potest cōmoda ad-
 ferre remedia. 94.c
 Qui cito moriantur. 409.c
 Quicquid sit finis alicui⁹ gra-
 tia sit. 5.d.c
 Quid patiantur, diu à cibis
 abstinentes. 11.d
 Quid per niues geluque iter
 facientibus accidat. 13.c
 Quid spectarint primi medi-
 cinæ inuentores. 12.b.c
 Quid primum obseruet medi-
 cus. 16.e.20.ab.d.21.f
 Quid oporteat medicos sci-
 re. 14.d
 Quid sit homo & quomodo
 gignatur sciat medicus.
 14.e
 Quies quibus conducatur. 31.b
 Qui ex ægris perirent in ma-
 gna morborū multitudine.
 314.e
 Qui humores singulis anni tē-
 poribus augeantur. 26.a
 Quis error in ægris. 10.e
 Qui probe augeantur. 52.d
 Qui sani diutius perseuerent.
 105.f
 Qui sine medicis à morbis
 conualescunt aliqua re sa-
 nantur. 5.b
 Quod diutius quàm decē mē-
 sibus non contingat vterū
 gestare. 42.e
 Quo gestu inuisendus sit æ-
 ger. 16.d
 Quomodo omnia gignātur.
 24.e
 Quo pacto sua quisque fons
 facultate trahat. 183.c
 Quo plus cibi sumpsimus eo
 plus expetimus. 183.d
 Quota inedia. 48.b
 Quota offium coalescentia.
 130.b
 Quot morbos ex vteris fieri
 contingat. 284.e
 Quoto tēpore pedis ossa fra-
 cta sanescant. 457.f
 Quum partus non rite pro-
 dit, quid agendum.
 262.e
 Quum plus iusto comeditur
 quid agendum. 202.d
 Radix

INDEX.

- R** Adix humanorum morborum caput. 534.b
 Raphanus. 113.c
 Rapum. 113.c
 Ratio eür de humano victu scribat. 99.c
 Ratiocinatio. 21.c
 Recidiva quid portendat. 427.a
 Recidivarum causa. 509.f
 Recte & non recte quæ fiat. 145.c.d.e
 Regij morbi quatuor cum signis & curationibus. 216.c
 217.a.b.f
 Regio sterilis quales gignat. 93.d
 Regio montosa quales profert. 93.c
 Regio alta quales producat. 93.d
 Regio pinguis quos gignat. 93.c
 Regiones insalubres. 109.f
 Regionum situs & natura. 108.c.f
 Regionum inter se differentia. 89.b
 Reiiçitur à schola Hippocrates falsa secta imbutus. 23.f
 Relicta post iudicationem, recidivas facere solent. 324.f.355.c
 Remedia singulis exhibenda. 78.c
 Remedia secundas ac mentes educunt. 230.c.d.231.232.233.234.
 Remedia solum disciplina ac natura inveniuntur. 6.e
 Remedium quibus tanquam desperatis nullū adhibeatur. 277.f
 Renes. 45.f.60.c.66.d
 Renum affectus quibus sanetur. 361.b
 Renum morbi quatuor. 208.e
 209.a.b.c
 Repletionis mala. 211.b
 Repositio per scalam. 470.f
 Repositio optima. 470.f
 471.c
 Responso aduersus eos qui mortuos medicis assignant. 5.c
 Rigor lethalis. 513.e
 Rigor in morbis vnde. 151.d.e
 Rigoris causa. 188.f
 Rigoris ex partu aut abortu curatio. 238.c
 Rigores vnde incipiant. 356.c.325.c
 Riphçi montes. 91.a
 Robur ac carnem producentia. 200.f
 Robusti ex robustis cur non generentur. 33.e
 Rumex. 113.d
 Ruptiones quæ fiant. 149.e.f
 Ruptura. 79.f
 Ruta. 113.d

S Acer morbus. 84.d.e
 Sacer morbus quæ fiat. 97.c.e

INDEX

- 97.c.e
 Sacer morbus pituitosis acci-
 dit. 138.f.139.c
 Sacer morbus cur non diuin⁹
 fit. 138.a
 Sagitta percussus præter om-
 nem opinionem sanatus.
 350.b
 Salaminus anchora vulnera-
 tus. 349.e
 Saliva suppressa & curatio.
 159.f.160.a
 Salsua. 113.d
 Salutis & mortis causa. 185.f
 188.b
 Sanguis in somno intro ma-
 gis fugit. 358.f
 Sanguis ex naribus fluēs qui-
 bus proficit. 359.d
 Sanguis albus ex glandulis
 erumpit. 62.f
 Sanguis cur circa nervos cō-
 pingatur. 245.c
 Sanguis quomodo mittend⁹.
 394.f
 Sanguis coagulatur. 45.f
 Sanguis diutius in vtero re-
 tentus totum corpus affi-
 cit. 36.b
 Sanguis prudentiam iuuat.
 97.d
 Sanguis putris in pus conuer-
 titur. 96.f
 Sanguis calidus natura nō est.
 62.e
 Sanguis quomodo sistatur.
 158.f
 Sanguis serosus in quibus fiat.
 356.a
 Sanguis ex naribus quibus e-
 rumpat, & pueris quando
 incipiat. 356.f
 Sanguinis fluxus in vlceribus
 quid faciat. 499.b
 Sanguinis effectus & vis.
 97.e f
 Sanguinis & aliorum humo-
 rum varietas. 129.f.130.b
 Sanguinis vomitus causa &
 curatio. 270.a
 Sanguinis venarum suppres-
 siones quæ faciant. 360.d e
 Sanguinis eruptiones malæ
 quæ. 411.c d e
 Sanguinem ex partu vomen-
 tis curatio. 237.d
 Sanguinem ex vteris fluentē
 sistentia. 293.c
 Sanguinem ex naribus sistē-
 tia. 293.c
 Sanitas quæ contingat. 184.a
 Sanitas & mors vnde contin-
 gant. 50.c
 Sanitatis exercitatio qualis.
 358.a
 Sanitatis & mortis causa cui
 attribuitur. 530.c.531.e
 Sanitati qui restituantur &
 qui non. 422.d
 Sanitati conducentia. 200.f
 Sanus quis. 24.f
 Sapa. 113.a
 Saperna. 215.d
 Sapientia qualis describenda.
 19.e f
 Sapientiæ author aer. 142.e
 Sapientiæ & desipientiæ cau-
 sæ & signa. 106.f
 Sapient-

INDEX.

Sapientissima anima & memoria valentissima prædicta.	107.a	Seçtio.	17.b
Sapietum victus & exercitatio.	107.b	Secundam quæ educant.	267.
Sata quomodo nascantur.	39.c	b.268.a b.515.f.54.a	
Satyrus pollutione mortuus est.	362.c	Secundæ reliquæ causa.	256.c f
Sauromatæ.	90.d	Secundarum hærentium expulso.	237.f.239.a c
Sauciati signa.	447.a	Sedes teli quid,& ei ⁹ species.	445.f
Scapulæ.	66.b.72.f	Sedis procidentia.	420 c
Σκῆματα.	15.b	Sedis procidentis varia curatio.	505.a b
Scientia facile ac feliciter discitur.	81.f	Sedis ex partu laborantis curatio.	257.b.270.a
Scientiæ votum ac opus.	4.b	Segnicies.	115.c
Scientiæ & opinionis differentia.	3.f	Semel cibum sumere in die quos & quando oporteat.	30.f
Screatio phrenitici.	408.b	Semel cibum capere quando conducat.	123.f
Scripturo de humano victu necessaria.	99.e f	Semen lini.	179.a
Scymnus.	315.a	Semen cur spumescat.	31.e
Scytharum gens fulua.	91.e	Semen fauo simile.	66.d
Scythia gens infœcunda.	91.a	Semen in vtero cum permanserit quid agat.	34.e.35.b
Scythicum hominum genus.	90.d	Semē masculum & fœmineū in vtroque inesse.	33.a
Scythæ Nomades quī viuant.	90.f	Semen in pellicula tanquam ouum continetur.	35.d
Scytharum ditissimi potius quam pauperes steriles cur efficiantur.	92.c	Semen genitale ab omnibus corporis partibus procedit.	89.d
Scythæ minime ad coitum valentes.	92.e	Seminis, quod in vtero sex dies extiterat, forma.	35.c d
Scythiæ mulieres vnde steriles.	91.f	Seminis genitalis varietas diuersas efficit formas.	92.f
Scythæ Eunuchi muliebria officia subeuntes.	92.a	Seminis in vtero putrescentis curatio.	249.b
Secretio morbi causa.	120.f	Seminis statim post coitum fluentis	

INDEX.

Auentis caussa & curatio.	Siccum corpus citius humido
248.f	agrotat & dolet. 71.b
Seminis clandestinus fluxus.	Sideratio. 64.d
166.c	Sideratus morbus vel homo.
Semina vbi non nascantur.	155.e.159.d
63.c	Signa ab Erysipelate. 406.f
Semina & plantæ cur contra-	Signa agrotantis. 129.c
riam habeant germinatio-	Signa bene curati & deligati.
nem. 40.a	455.e.f
Senes paucis fomitibus opus	Signa bonæ spei. 404.d &
habent. 509.c	malæ.e
Seniores & iuniores à quib ⁹	Signa breui morituri. 397.f
suppurationibus magis mo-	Signa ex angina. 433.d.e
riantur. 405.f	Signa ex colore. 421.f
Seniorum & iuniorum affe-	Signa ex conuulsione. 514.e
ctiones. 150.f	Signa ex decubitu. 438.d.e
Senum victus ratio. 29.f	Signa ex distentione & sudo-
Senum morbus & curatio.	re. 433.d.440.f
159.a	Signa ex doloribus circa ar-
Sensus maximus circa thora-	ticulos. 423.b
cem. 70.c	Signa ex hæmorrhoidæ & cõ-
Sensus humanus septem figu-	uulsione. 433.b.c
ris contingit. 104.a	Signa ex hydrope. 437.a
Sententiæ variæ de hominis	Signa ex lienteria. 420.a.e
natura. 24.a	iusque curatio.b
Septenarij annorum in cor-	Signa ex lingua. 408.b.419.e
poribus præualent. 51.b	Signa ex lippitudine. 418.f
Septimestres cur edantur.	Signa ex morbis acutis. 427.
49.a	b.c
Septimestres cur pauci super-	Signa ex oculis. 409.b
stites mancant. 49.b	Signa ex pallore. 422.a
Septimestres alij plus, alij mi-	Signa ex perfrigeratione.
nus afficiuntur. 49.b	423.f
Septum transuersum. 60.f	Signa ex pleuritide. 434.a
68.c	Signa ex pupillarum colore.
Sermonis facultas. 47.c	419.d
Siccantia alimenta. 200.a	Signa ex sanguinis mictione.
Siccitates multæ post fauo-	415.c
rium. 353.b	Signa ex soporosis affectio-
	ttttt nibus.

INDEX.

nibus.	428.a b c	Silphium vbi nascatur.	181.b
Signa ex spiritu.	430.d	Similago.	111.a
Signa ex splene sano.	422.c	Similitudo genituræ obser-	
Signa ex sputis varia.	344.f	uanda.	36.f
Signa ex tabe.	436.c	Similitudinem iuuantia.	
Signa ex timore & tristitia		51.d	
sine causa.	423.f	Simulatores & deceptores.	
ex ignorantia & obliuio-		104.b	
ne.	ibidem.f	Sinapi.	113.c
ex rigoribus soporosis.		Singula naturam suam con-	
ibidem.f	424.a b	seruant.	81.c
ex horroribus.	424.a b	Singultus quando malus.	
ex vrina suppressa. ibidem.		408.e	
c		Singultus curatio.	391.f
Signa ex variis capitis dolo-		Si re vna homo costaret nū-	
ribus.	427.d e. 428.a	quam doleret.	24.c
Signa ex variis affectibus ma-		Sitis quando mala.	409.c
xime febribus & phreniti-		Smegma.	261.d
de.	424.d. 425. 426.	Sol.	115.c
Signa ex voce.	409.b	Sol fructus coquit.	39.f
Signa ex vomitu.	440.d	Sol, Luna, cœlum, ac stelle per	
Signa ex vrinis.	397.c d	insomniū visæ quid signi-	
514.c		ficient.	125.d
Signa ex vrina crassa.	415.c	Sol pati visus per somnū quid	
Signa inherentium telorum		significet.	125.f
in corpore.	18.d	Solanum.	113.d
Signa maris & foeminae in v-		Solstitium æstiuum.	118.f
tero.	302.d	Solstitium brumale.	311.c
Signa mortis & vitæ.	358.b	315.a. 338.d. 118.b	
165.b		Solum mutare in longis mor-	
Signa obseruanda.	129.d	bis, bonum.	358.c
Signa suppuratorum & tabi-		Somnia diligenter obseruan-	
dorum.	416.c	da.	125.b
Signum venularum cerebri		Somnia veneris quibus fiant.	
superaoementium.	155.a	31.f. 32.a	
Sileni ægri historia.	313.c d	Somniare vestes & calceamē-	
314.f. 316.f		ta.	127.d
Silentium in febribus perni-		Sompniantium curatio.	127.a
ciosum.	409.c	Somniare mortuos quid sit.	
		127.c	

INDEX.

- 127.c
 Somnij Hippocratis interpretatio. 525.a
 Somniorum diuersorum consideratio & curatio. 128.a.b
 Somniorum diuersorum obseruatio. 126.a
 Somnus. 115.c
 Somnus frigefacit. 97.d
 Somnus hydropici qualis. 403.b
 Somnus interdum vitandus plethorico. 120.d
 Somnus quando est medela. 358.a
 Sonitus aurium vnde. 139.d
 154.f
 Sopor ubi malus. 409.d
 Soranus Cous. 1.c
 Sorba. 114.a
 Sorbitio in vasis pulmonis ruptis. 204.a
 Sorbitiones. 199.c
 Sorbitiones validæ. 200.c
 Sorbitionibus quando utendum. 385.a
 Sordes aurium quid portant. 358.c
 Spasmi solutio. 398.f. 400.a
 Species fortunæ nuda. 5.a
 Specillum quale. 56.c
 Spectanda in vulnerato capite. 446.b. 449.b
 Spina. 65.f
 Spina gibbosa. 481.d
 Spinæ natura pernoscenda. 482.c
 Spinæ obliquatæ curatio. 483.c.d
 Spiritus densus quid significet. 402.a
 Spiritus omnia inter cælum & terram replet. 94.f
 Spiritus semper adducitur vel exhalat. 95.b
 Spiritus varietas. 355.b
 Spiritus vocem edit. 47.f
 Spiritus vsus quàm sit necessarius. 95.a
 Splen. 45.f. 60.f
 Splen turgidus. 77.d
 Splen tumefactus quid efficiat. 182.d
 Splenis morbi quinque, eorumque curationes. 215.
 216.a
 Splenis natura. 259.a
 Splenis vehementer dolentis curatio. 378.c
 Splenis curatio. 77.c
 Splenem attenuantia. 215.c
 Spleniorum electus. 452.c
 Spleniorum numerus. 464.c
 Splendidi viri quæ generentur. 105.a
 Spongiformes, lien, pulmo, & mamma. 15.d
 Sponte sua quæ in morbis fiunt, tum bona, tum mala. 145.c
 Sputi consideratio. 404.b
 Sputi cruenti impedimentum. 357.c
 Sputum in pleuriticis, & peripneumoniacis quale. 454.d
 Sputum liuidum & sanguine. ibidem.c

TTTT ij Sputa

INDEX.

Sputa quę mala.	404.c	397.c c	
Sputa rotunda quid agant.		Sudor multus quando malus.	
359.d		409.c	
Sputum subcruentum & liui-		Sudoris caussa.	151.f
dum.	153.d	Sudores.	115.c
Statuarij.	103.f	Sudores in febris.	513.c
Stercus qui fiat.	46.c	Sudores in diebus iudicato-	
Stercus omniũ quale esse de-		riis.	519.f
beat.	415.a	Sudores qui excitentur.	96.b
Steriles vnde fiant.	242.f	Sudores qui boni.	396.b &
Sterilitatis naturalis caussa.		contra.	402.b
301.c		Suffitus varij ad fluxus.	294.c
Sterilitatis fluentibus etiam		Suffimentum vteri.	292.c
menstruis curatio.	238.d	Suffocationis ab vtero caus-	
Stomachus.	60.f	sa.	246.a
Stomachus vteri.	302.c	Suffocationis ab vtero cura-	
Stomachus os vuluæ.	53.d	tio.	229.f.278.c.295.b c
σμάτα.	61.f	295.f.296.a.239.c.252.c	
Strangulationis ab vtero co-		257.c	
gnitio.	395.f	Suffocationis curatio.	214.c
Stranguria.	156.c.311.d	Suillæ carnis facultas.	394.a
Stranguria quare inflamma-		Sulphij facultas.	393.f
tus intestinis succedat.		Superforationes quomodo	
504.f		fiant.	105.c
Stranguriæ solutio.	328.a	Supercilia.	72.c
238.b.297.c.298.d		Superstites ex suppuratis &	
Straguriæ signa & curatio ex		contra.	405.c
sorbtionibus, potionibus		Superstites post partum.	50.a
& victus ratione.	273.f	superuenientia quomodo vi-	
274.a b		ribus adæquentur.	188.a
Strumę quos corripit.	417.b	Suppurati.	74.b.75.f
Succi dulcioris sunt quę iux-		Suppuratus à vulnere.	150.b
ta aquas nascuntur.	525.d	Suppurationis caussa.	147.d
Succorum facultates.	128.f	150.d	
Succorum seu saporum con-		Suppurationis curatio.	395.d
sideratio.	16.a	Suppurationes diuersæ.	404.
Sudor sani.	397.f	d	
Sudor decretorius.	397.a	Suppurationis principiũ cõ-	
Sudor frigidus pessimus.		siderandum.	404.f
		Suppura-	

INDEX.

- Suppurationis signa. 76.c 165.a c
 435.c
 Suppurati pulmonis signa. 416.b
 146.c f
 Suppuratorum remedia. 76.f
 Suppuratorum signa. 405.a
 Suppurati vteri causa & auxilium. 55.f
 Suppuratus venter superior quot modis fiat. 147.c f
 148.a b
 Surditas in quibus malum. 408.f
 Surditatis curatio. 373.b
 Surditatis mala. 429.a
 Sutor subula latus perit. 350.a
 Sutura capitis longior & brevior. 444.c
 Sutura capitis H. literę similes. 444.d
 Sutura capitis diuersę. 444.b.72.c
 Sutura χ. literę similes. 444.d
 Syderatus eiusque curatio. 173.c.359.f
 Syderationes repentinę malę. 409.f
 Syluestria omnia pri⁹ fuerūt. 181.c
- T**
- T**Abes. 74.b.76.a b
 64.c
 Tabes sicea. 69.c
 Tabes spinea & eius signa. 76.d & curatio. 77.d
 165.a c
 Tabes mulierum. 416.b
 Tabes dorsalis, & ei⁹ curatio. 166.b c
 Tabes erronea. 311.a
 Tabes grauissima. 333.c
 Tabis tres species. 206.f
 Tabis triplicis causę & curationes. 207.a b c
 Tabis curatio in secūdo, tertio ac quarto mense. 208.a b
 Tabidi à quib⁹ male habeāt. 361.a
 Tabidi quo tempore moriātur. 416.b
 Tabidorum bona signa. 416.a
 Tabidorum forma. 333.c
 Tabidorum curatio. 77.a
 Ταχύνουα. 69.c
 Taxantur qui de ciborum facultate iudicauerant. 110.a
 Thasię mulieris morosę historia. 336.c
 Telebuli ægri historia. 313.c
 Telorum varietas. 446.f
 Temeni neptis mors. 321.a
 Temeton bonum non est. 14.f
 Temperaturę diuersę. 199.c
 Templum Herculis. 334.d
 Templum Apollinis. 336.c
 Tempus quid. 21.c
 Tempus calidius quibus vulneribus profit. 499.d
 Tempus concubitus. 249.c f
 Tempus coaugmētationis in vtero. 37.a

||||| iij Tempo-

INDEX.

Temporis in sex partes diuifio.	113.c	tur, expelluntur.	184.b
Téporis autores, fol & luna.	51.c	Tetani mala.	398.a & species.
Temporum & hominum varietas.	89.c. 310.b		399.f
Tempora cur periculosa.	444.f	Tetani tres eorumque curatio.	223.c f. 175.b
Temporum dolores quid portendant.	422.b	Tetanus lumborum.	392.c
Temporū varietas quos producat.	93.d	Thafij morbi.	310.b. 311.b
Terebella aqua frigida fape intingenda.	450.a	Theatrum Epigenis.	314.e
Terra ætate rara & leuis.	40.c	Theſſalus Dracoque Hippocratis filij.	2.c
Terra qualis.	102.c	Thymbra.	113.c
Terra omnem habet humorem.	39.c	Thymum.	113.c
Terræ qualitas.	83.d	Tibia.	73.c
Terræ facultates infinitæ.	181.c	Tibiæ offis luxati curatio.	492.a b. 459.a
Terræ vires.	180.c	Tibiæ offis vtriuſque fracti curatio.	459.f
Terræ motus circa ſolſtitium hybernum.	340.c	Tibiæ offa duo.	458.f
Terræ inferiora cur hyeme calida, ætate frigida ſint.	40.b	Tibiæ offa quanto tempore coaleſcant.	460.f
Terræ motus vel domus in ſomnis quid ſignificet.	127.c	Timiditas & virilitas vnde.	93.a
Terræ inundationem ſomniare quid velit.	127.c	Tineſmus.	197.c
Terram nigrā ſomniare quid præſignet.	127.c	Tinnitus auriū qualis.	408.d
Terroris ac timoris cauſa.	142.c	Tritici facultas.	110.c
Tertianæ naturales.	355.d	Tonſillarū vlcera.	59.f. 60.a b
Tertio quoq; die quæ ſumū-		Tonſillæ ac vicinæ partes.	156.a b. 160.f. 63.c
		Torpori pruriginoso quid proſit.	421.c f
		Toſta vel affata.	114.d
		Tremorem crurum ac pallorem quæ faciant.	135.b
		Tremuli & gibboſi vñ.	139.c
		Tres morborum obſeruati-ones.	399.b c
		Triduo excernenda ſunt excrementa.	184.c
		Trifolium.	180.a
		Triplicia	

INDEX.

Triplicia nutrimenta omni- um animantium corpora su- stentant. 94.e	Tussis circa solstitia hyberna 359.f
Trichiasis curatio. 395.c	Tussis hyeme flantibus au- strinis. 352.c
Trygis, id est Tragus. 111.b	Tussicula aurium abscessus mollit. 411.e
Tuberculum ventris ab igna- ris male sectum. 244.c	Tussientes ex manuum agi- tatione. 344.c
Tuberculum sub lingua, vel hypoglossis. 161.a	Typhi morbi causa. 219.c.d
Tuberculum lateris. 206.c	Typhi calor qui leniatur. 218.c
Tuberculum in pulmone & eius curatio. 168.a	V
Tubercula bona & mala. 354. d. 198.f	Vacuacionis faciendæ si- gnum. 509.f
Tubercula circa aures, qui- bus fierent. 310.c. 313.d. 314.d. 315.a. 340.d. 357.d 363.f	Valetudinis signa. 390.f
Tuberculorum in pulmone suppuratio & curatio. 212.b	Validis eduliis alij facile vtū- tur, alij læduntur. 9.d
Tumor narium. 74.d	Varietas rerum in Asia. 88.f
Tumoris circa poplitem aut aliā partē curatio. 461.f	Varix sententiæ de sumēdis cibis. 11.a
Tumoris causa. 187.c	Variorum affectuum enume- ratio. 372.b
Tumoris interioris signa & curatio. 164.d	Varix testium quid possit. 326.e
Tumores ad articulos. 354.d	Varix interior. 147.c.d
Tumores quid portendant. 355.a	Varicis curatio. 147.d
Tumores præter naturam e- leuati prauunt. 325.f	Varices tibiae. 503.a
Tussis cum febre. 312.a.b	Velocitas & tarditas vbi ad- hibenda est. 17.b.c
Tussis pueri qui discutiatur. 298.f	Vena icteralis. 139.a. 152. f. 68.a
Tussis sedatio, testium tumor & contra. 320.f	Vena splenica. 139.b. 152.e
Tussis varietas. 360.a	Vena nervosa. 69.d
Tussis sicca curatio. 327.a. 355.d. 361.a	Vena humeralis. 68.f
	Vena mammaria. 68.f
	Vena principalis. 69.a
	Vena ex sinistris partibus. 70.d
	Vena cōuulsa pcalescit. 150.a
	Vena magna. 60.e
	+++++ iiii Vena

INDEX.

Vena cordis.	67.a	68.a.69.f.70.a b c.71.a b
Vena pulmonem occupans.	69.c	Venarū quatuor paria. 67.d
Venæ costarum.	66.f	Venarum varij colores.357.b
Venæ signum cordis finistrū		Venarum descensus. 67.d
perflant,arteria verò alte-		Venarum in feminis distri-
rum.	62.a	butio. 69.c
Venæ sinistræ morbus & cu-		Venarum temporum confi-
ratio.	210.d	deratio. 355.c
Venæ iugulares.	182.c.183.c	Venulæ & arteriæ toti ⁹ cor-
Venæ crassæ.	67.c d.139.a	poris. 45.c
Venæ in spinam insertæ.	69.c	Venulæ oculorum. 71.c
Venæ capitis quadripartitæ.	68.c.71.f	Venulæ in ossē. 444.c
Venæ in linguam insertæ.	68.c	Venter humidus. 102.b
		Venter. 60.f
Venæ à ventre.	67.f	Ventris morbi. 312.g
Venæ sectio.	Ibidem	Ventris tubercula. 397.b
Venæ hepatis & aliarum di-		402.c
stributio.	325.f.326.a b	Ventris obdurati solutio. 292.a
Venæ & arteriæ pulmonis ru-		Ventris quotidiana purgatio
ptæ curatio.	203.c.204.b	quī fiat. 207.f
Venæ ruptæ signa.	147.b	Ventris diuersitas. 202.c
Venæ rhenum.	66.f	Ventris combusti curatio. 214.f
Venæ post aures sectæ sterili-		Ventrem superiorem nō mo-
tatem inferunt.	92.b	uendum. 279.a
Venæ iuxta aures incise pro-		Ventrem infernum non tur-
creationem tollunt.	32.b	bandum. 280.c
Venæ plures supra sunt quàm		Ventrem ac vrinam subducē
infra.	73.f	centia. 199.c
Venarum distributio.	27.f	Ventrem perturbantia. 211.c
Venarum natura.	Ibidem.d	Ventres quando calidiores. 509.c
Venarum multarum & neruo-		Ventres humidi quando de-
rum actio.	7.a	ficcentur,& cōtra. 510.a
Venarum ex omnibus corpo-		Ventriculus infernus qui sup
ris partibus in pudendum		purefcat. 148.d
concurfus.	31.c	Vētriculus aīalib ⁹ , quæ terra
Venarum distributio.	67.a	plantis præstat. 135.c
		Vētriculi

INDEX.

Ventriculi qualitas. Ibidem.	529.d	
Ventriculi corporis sunt plures.	6.f	Vertebrae. 66.c
Ventriculi cum hydria collatio.	135.c	Vertigo vnde. 255.a
Ventri finitio & vis.	94.f	Verticula spinæ. 480.f
Venti qui viles & qui inutilles.	109.c	481.a
Venti ab vris Riphais perpetui.	91.b	Verticula obliquata. 484.c
Venti mediterranei ficci.	109.f	Vesica. 44.e.60.e.15.d
Venti montani infalubres.		Vesicæ signa. 406.a
Ibidem.		Verita à magis. 137.d e
Ventorum natura & facultas.	109.b.511.b	Via qua medico procedendū sit. 27.d
Vetorum cum animalibus similitudo.	109.c	Victus humidus quibus conferat. 509.c
Ventorum qualitas. 83.b.135.f		Victus simplex securior ad sanitatem. 382.d
Ventorum cæterarumq; rerū necessaria observatio. 135.f		Victus ab æquinoctio ad hyemem. 20.a
136.a		Victus hyemalis. 118.d e
Venus vnde augeatur.	39.c	Victus ratio in fracturis & vlceribus. 456.e.457.d
Veratri purgatio.	358.f	Victus refocillās vires. 260.a
Veratrum quibus proffit, & cōtra.	531.a.532.a b	Victus debilis ac robustus quis? 358.a e
Veratrū quādo piculosū. 512.f		Victus ratio post portiones. 261.c
Veratro purgādi quibus à capite fluxio fertur.	393.a	Victus siccus. 201.c
Veritas in arte medica non semper attingitur.	11.e	Victus æstatis. 118.d e
Veritatis nullum testimoniū.	530.d	Victus hydropici à pituita. 211.f
Veris ac æstatis mutata tēperatura.	311.c.313.a b	Victus ratio conceptum iuvans. 303.d
Vermes stercorearij.	55.f	Victus tenuis quibus imperādus. 508.f
Versutia malorum infinitæ.	529.a	Victus consuetus etiam si malus fuerit, faciliōr, & cōtra. 583.c
Versutiarum causa avaritia.		Victus ratio somniantium. 125.c
		Vigilia. 115.e
		Vigilia

INDEX.

Vigilia immodica.	385.b	Virginibus cur interdum nec	
Vigor ætatis.	23.d	genitura nec mēstrua sint.	
Vinum Mendesium.	208.e		38.c
Vinum dulce, austerum.		Viriles & magnanimi leges	
132.b		auerfantur.	90.c
Vinum acidum.	113.a	Virtutis labor infania indi-	
Vinum alimentum.	129.e	catur.	530.e
Vinum Coum.	215.d	Vita diuersa quæ sanitatem	
Vinum Thasium.	179.f	præsignant.	126.f
Vinum Mendæum.	210.a d	Vitio Hippocratis.	524.e f
Vinum quî extenuetur.	201.	Vitus qui hebetetur.	154.c
d.202.b		Vitus quo alatur.	71.e.72.a
Vinum aquosum quas partes		Vitus causa.	47.c
inuet.	385.d	Vita hominis septem dierum	
Vini albi facultas.	385.c	est.	47.f.48.b
Vini dulcis facultas.	385.b	Vita Hippocratis.	1.a
Vini fului vîus.	385.c	Vitæ modus.	118.c
Vina quæ aluum subducunt.		Vlcus cur tardius, aut nūquā	
201.a		sanescat.	150.c
Vina alba aquosa.	179.e	Vlcus ferinum.	78.e
Vinorum differentia & fa-		Vlcus mortiferum.	79.b
cultates.	112.f	Vlcus vteri cur cito curandū.	
Vir in coitu cur maiore volu-		301.d	
ptate afficiatur.	32.e	Vlceris cum igni sacro mixti	
Vires singulorum simplicium		purgatio.	499.e
quî detrahantur & augeā-		Vlceris in capite curatio.	
tur.	114.d	447.c d.448.e.449.f	
Virgæ corneæ.	464.f	Vlceris in ore curatio.	371.c
Virgo lata manu in sinciput		Vlceris in vtero & ore ei⁹ cu-	
percussa perit.	350.d	ratio.	273.a
Virginis Larissæ historia.		Vlceris pus cum vrina confer-	
336.d		tur.	397.a b
Virginis Abderitanæ historia		Vlcere in alterutra parte exi-	
335.c		stente, quid patiat. 420.f	
Virginis à menstruâ dolen-		Vlcere sanato locus qualis.	
tis curatio.	58.a	420.f	
Virgines cur delyrent.	224.d	Vlcera ac tubercula indican-	
Virgarum numerus & dispo-		tia febres.	357.b
situs in fracturis.	465.a	Vlcera capitis vnde.	154.d
		Vlcera	

INDEX.

- Vlcera fame curanda. 79.d
 Vlcera maligna quæ. 361.b
 Vlcera ne inflammētur quid
 agendum. 498.f
 Vlcera pueris vtilia. 139.d
 Vlcera quæ non coeant.
 499.e
 Vlcera secanda quæ. 447.e
 Vlcerum curatio. 473.e
 498.e
 Vlcerum in pudendis cura-
 tio. 238.d.239.b
 Vlcerum mutilata curatio.
 18.c
 Vlcerum pudendi curatio.
 272.f.273.b
 Vlcerum quatuor viæ. 18.b
 Vmbilicus. 43.d
 Vmbilicus quando non sta-
 tim fecandus. 54.e
 Vmbilicus abruptus, aut re-
 cisus ante tempus. 54.e
 Vmbilicus trahit secundam.
 Ibidem.b
 Vmbilici tormina. 133.f
 Vmbilici vsus. 52.e
 Vmbra. 115.c
 Vnctio. Ibidem
 Ungues cur densi. 38.b
 Ungues quando puero de-
 sunt. 53.e
 Unguium generatio. 46.c
 Vocis exercitatio. 122.e
 Vocis interceptiones. 408.e
 Vocis interceptæ causa & cu-
 ratio. 388.d
 Vocis labor & cæterorū quid
 ferat. 360.a
 Vocis restitutio. 327.a
 Vocis maximæ causa.
 358.b
 Volsella. 18.a
 Volucris ad hominem colla-
 tio. 42.b
 Volucrum abundantia quan-
 do? 358.b
 Voluptas coeuntium. 69.e
 Voluulus arcuatus. 220.f
 Voluulus quādo desperatus.
 176.a
 Voluuli morbi eorumque cu-
 ratio. 220.b.c.d.175.e
 196.e
 Voluulus redit etiā post duos
 annos. 220.e
 Voluulus hæmatites. 220.f
 Vomitionis causa. 153.b.c
 Vomitionis remedium. 299.a
 Vomitionis modus. 118.f
 Vomitus. 115.d.123.e
 Vomitus bonus quis & con-
 tra. 404.b.408.c.
 409.c
 Vomitus præparatio. 327.b
 Vomitus quī fiat. 210.f
 Vomitus quomodo cietur.
 30.c.d
 Vomitus quī pronocet. 261.c
 Vomitus sanguinis quib⁹ pro-
 fit. 440.c
 Vomitus ventrem soluit & si-
 stit. 115.d
 Vrbes aquas salſas habentes.
 84.a
 Urbis calidæ situs. 83.f
 Urbium situs. 83.c.84.c.f.
 85.a.b.c
 Urina magis morbos indi-
 cat.

INDEX.

cat.	8.b	Vteri ad cor progressi cura-
Vrina delirium soluēs, qua-		tio. 238.c.295.d
lis. 359.d		Vteri ad caput conuersi signa
Vrina bona quæ. 396.c.403.c		ac curatio. 237.c
Vrina genitali femini similis.		Vteri ad crura & pedes con-
356.a		uersi curatio. 237.c. 287.a
Vrina rubra. 66.f		Vteri ad hepar conuersi cura
Vrina cruenta 342.b		tio. 279.c d
Vrina turbata quib ⁹ innoxia.		Vteri ad inguina incumben-
411.c		tis curatio. 296.b
Vrina multa vnde fiat. 154.b		Vteri ad latus allapsi curatio,
Vrina copiosior quàm propo-		235.c. 280.a
tus ingesti ratione. 333.a		Vteri ad lumbos procedentis
Vrina qualis & ex ea signa.		signa & curatio. 228.c.
415.b		280.b.295.c
Vrina crassa vnde fiat. 153.c		Vteri ad præcordia consisten-
Vrinæ diuersitas. 28.d		tis curatio. 279.b
Vrinæ crudæ. 398.b		Vteri ad sedem conuersi cu-
Vrinæ interceptio. 409.b.		ratio. 237.f.284.f
410.f. 411.b		Vteri a d ventrem nutantis
Vrinæ morbum soluentes.		curatio. 237.b
397.a		Vteri ad viscera conuersi cu-
Vrinæ clandestinæ. 408.c		ratio. 238.f. 295.c e
Vrinæ suppressæ. 354.c		Vteri affecti curatio. 82.c d e
Vrinæ malæ. 409.c		Vteri affecti causæ & signa.
Vrinæ crassæ effectus. 136.f		373.b
Vrinarum cognitio. 390.d		Vteri commoti & prolapsi cu-
Vrinarum varietas. 339.c		ratio. 236.c.238.f.281.d
Vstio quæ. 208.c. 205.f. 17.b		Vteri conclusi curatio. 238.f
Vstionis ferramenta qualia.		280.e.288.e f. 289.d
473.a		Vteri cū prociderint curatio.
Vsus egregius magister. 94.c		226.a. 280.c.286.b. 287.a
Vterus. 15.d		296.d.58.b
Vter ⁹ ad hepar accedēs quid		Vteri desiccati curatio. 230.c
faciat. 225.f. 296.a		Vteri dolentis curatio. 239.a
Vteri à grumo sanguinis affe-		b d. 290.f. 292.e
cti curatio. 236.c d. 289.d		Vteri ex partu vlcerati cura-
Vteri ab vlceribus inflamma-		tio. 256.f. 257.f. 260.c.
ti. 246.f		261.b d e f. 262.b.
		Vteri

INDEX.

- Vteri ex partu inflammati cu-
ratio. 257. a b d e. 270. b
Vteri ex partu dolentis cura-
tio. 257. c
Vteri ex partu ad dextrā con-
uersi curatio. 285. b
Vteri ad sinistram declinan-
tis curatio. Ibidem. c
Vteri transuersi vel obliqui cu-
ratio. Ibidem.
Vteri extra naturam progres-
si causa & curatio. Ibidem
e f
Vteri vlcerati & foras prola-
psi curatio. 286. e. 308. a
Vteri huc & illuc vagantis cu-
ratio. 286. f
Vteri erysipelas, eiusque cu-
ratio. 227. f. 291. a
Vteri fixi curatio. 230. a
Vteri gracilis curatio. 305. e
Vteri inflammati morbi peri-
culosi signa ac curatio.
227. d. 230. a b. 238. a. 239. a
290. b c
Vteri inflammati & aliorum
affectuum curatio. 279. e f
Vteri inflati curatio. 236. b.
238. c. 287. d. 295. e
Vteri in callum indurati caus-
æ ac curationes. 287. d e
Vteri in coxam decumbentis
curatio. 515. f
Vteri leuigati curatio. 237. a
301. c
Vteri leuitatis signa. 250. b
Vteri molestiæ. 82. b
Vteri obdurati curatio. 235. c
d. 249. f. 287. d. 288. d
Vteri obliqui curatio. 236. a
Vteri obtorti curatio. 236. d.
248. f. 301. c
Vteri oris angusti mala. 255. b
Vteri oris obdurati curatio.
229. d. 288. e. 305. f
Vteri oris pinguis curatio.
249. a.
Vteri plus æquo aperti cura-
tio. 290. a
Vteri præ duritia non conci-
pientis curatio. 241. b.
Vteri præter naturā hiantis
signa & curatio. 228. b.
289. e. 236. f. 249. a. 301. e
Vteri procidentię causa ac
curatio. 287. b.
Vteri purgatorium. 241. a.
Vteri puerperæ inflati cura-
tio. 252. f.
Vteri purgationes. 237. e. 239.
d. 248. a. 307. d
Vteri qualitas bona. 420. d.
Vteri refrigerati curatio.
292. c.
Vteri sani non concipientis
curatio. 248. c.
Vteri semen non recipientis
purgatio. 292. c.
Vteri semen non cōtinentis,
& eructātis curatio. 309. a.
Vteri siccioris & humidioris
curatio. 249. c. d.
Vteri transmoti curatio. 238.
a. f. 239. a. 284. e. 287. b.
295. f.
Vteri vlcerati signa. 254. b.
255. a. 259. e. 260. c.
Vterum gerentis victus ra-
tio.

INDEX.


tio.	228.a.	Vux passæ.	179.e.
Vterum gerentibus oſtauns		Vulnus carne replêtia.	199.d
menſis grauis.	49.c.	Vulnus quando non lauand-	
Vterû purgâtia.	57.b.c.d.e.f.	dum.	327.b.
Vteri cû adglutinati fuerint		Vulnus circa ſinciput cur pe-	
quid agendum ſit.	226.d.	riculoſus.	444.e.
Vteri quib ⁹ rebus facile prop-		Vulnus refrigerantia.	199.c.
pellantur.	285.a.	Vulnus omne quietê poſcit.	
Vteri vbi extra pudendû ex-		498.f.	
ciderint, quid agendum.		Vulneris in capite modi ac	
226.b.239.b.285.e.286.b.c		ſpecies.	445.c.d.
309.c.d.		Vulneris obſeruatio.	418.d.
Vterorum affectorum reme-		Vulnera magis lethalia quæ.	
dia.	237.c	417.c.d.	
Vterorû, cum ad coxam de-		Vulnera curanda.	417.e.
curreſit, curatio.	226.f.283.	Vulnera lethalia.	439.a.
c.284.b.d.305.f.		Vulnæra non lethalia.	439.a.
Vterorum fomenta.	241.b.	Vulnera fortia ſine tumore,	
Vterorû oris cõplicati ſigna		malum.	325.e.
& curatio.	226.e.f.286.d	Vulneratorum curatio.	199.c
Vterorû pituita oppletorû, ſi		Vxoris Hermoptolemi ægræ	
gnaet curatio.	227.c.257.f	hiforia.	366.b.
Vterorum varij morbi.	244.f		
Vterorum dolor qui ſede-		X	
tur.	297.f.	Enophanis ægri hifto-	
Vteros aperientia & purgan-		ria.	313.f.
tia medicamenta.	242.b.	Z	
Vtilitas in dignoſcendis fom-		Oilo exuſſi matura	
niis.	125.a.	quæ contigerint.	
Vua morbus.	156.a.160.c	324.C	
Vux tumor.	193.d.		

F I N I S.

HIPPOCRATIS COI

VITA EX SORANO, IAN.

no Cornario medico physico interprete.



Ippocrates genere Cous fuit, Heraclidæ & Praxitheæ filij Phenaretæ filius. Ad Herculeum autem & Aesculapium originem generis sui referebat, ab alteroq[ue] se vigesimum, ab altero decimumnum se numerabat. Eius autem genealogiæ Eratosthenes mentionē facit, & Pherecydes, & Apollodorus, Arius item Tarsensis. Cæterū parentis sui Heraclidæ discipulus fuit, deinde Herodici, & ut quidam tradunt, Gorgiam Leontinum rhetorem audiuit, & Democritum Philosophum Abderiten. Floruit temporibus Peloponesiacis, natus (velut Istomachus in primo de Hippocratis secta tradit) primo octogesi[m]æ Olympiadis anno. Soranus vero Cous: qui Coorū bibliothecas perscrutatus est, addit, sub Abriadæ monarchia, Agriani mensis septima & vicesima die, in qua etiam vsque in hunc diem Coos Hippocrati omnia sacra facere tradit. Porro quum in arte medica totoq[ue] disciplinarum orbe exercitatissimus esset, functis vita parentibus, ex patria discessit, ut quidē malignē de eo Andreas in eo quem de Medicinæ origine scripsit libro prodit, propterea quod publicam Cnidiorum bibliothecam igne concremasset. Alij autem eo proposito eum patriam reliquisse dicūt, ut rei medicæ effectus & successum per multos locos cognosceret, & in his variis modis exercitaretur. Quemadmodū vero Soranus Cous narrat, Somnus deus eum per somnium admonuit, quo se ad Thessalorum regionem inhabitandam conferret. Cæterum per omnem Græciam Medicinæ gloria omnibus admirationi fuit, adeo ut etiam à Perdicca Macedonū rege, qui tæbe laborare putabatur,

Coi singulis annis Hippocrati parcerant. Andreas Hippocratem infauit. Soranus Cous. Perdiccas phthificus creditus.

HIPPOCRATIS VITA

Euryphon medicus. batur, vocatus publice sit, ad ipsumque vnà cum Euryphon- D
 te, qui ipso ætate maior erat, peruenit, animique hunc regis affectum esse certis signisprehendit. Post mortem enim Alexandri parentis, vnâ ex pellicum eius numero Phylam nomine Perdiccas deperibat, ad quam quum rem ipsam Hippocrates detulisset, postea ex illius conspectu omnino illum mutari obseruauit, atque ita morbo depulso regem cõseruauit. Vocatus est & Abderam quo præsens ipse Democritum ab infania liberaret, atque eo sanato à tota vrbe pestem depelleret. Quin & in Illyricum plurimasque barbaras terras peste ingruente, & illarum gentium regibus ipsum ad se vocantibus, quum à legatis ipsorum qui venti in illis regionibus vigerent, didicisset, ipsos re infecta dimisit. At vero quum prudenti ratiocinatione pestem in Atticam grassaturam præuidisset, futurum id prædixit, & tum ciuitatũ, tum discipulorum curam gessit, intantumque Græciæ amator fuit, vt quum ipsius nominis celebritas vsque ad Persas diuulgaretur, atque ea gratia ab Artaxerxe per Histanidem Helleponti præfectum, magnis muneribus & precibus vt ad ipsam veniret inuitaretur, ob honestatem, argentiq; contemptum, ac Græciæ amorem, regi id denegarit, quemadmodum & hoc ex epistola eius ad illum manifeste ostenditur. Propriam porro patriam liberauit, quum Athenienses ei bellum illaturi essent, Thessalis ad auxilium ferendum rogatis. Quapropter splendidos honores apud Coos consequutus est: imò & apud Thessalos Argiuosque & Athenienses, qui eum Eleusiniis sacris secundum ab Hercule publice initiarunt, & ciuem conscripserunt, atque in Prytaneo alimenta tum ipsi, tum posteris eius dederunt. Liberaliter autem & minime inuidiose studiosos artem edocuit, decenti iureiurando prius adstrictos. Vita functus est apud Larissæos, quando & Democritus obuisse traditur, atque alij quidem nonagesimo ætatis suæ anno, alij octogesimo quinto, alij centesimo quarto, quidam vero centesimo nono, decessisse tradunt. Sepultus autem est inter Gyrtonem & Larissam, vbi vsque in hunc diem monumentum eius cernitur, in quo sanè ad multum tempus examen apum mellificantium erat, quo melle ad infantum oris vlcuscula iuxta tumulum illito, nutrices ea facile persanabant. Porro in multis imaginibus E

Artaxerxes Hellespõti hipparchos.

Quatũ ab oĩbus coleretur Hippocrates.

Mors Hippocratis.

F

- A ginibus velato capite pingitur, vt quidam aiunt pileo, quod nobilitatis signum est: nam hoc modo etiam Vlysses Pileatus cernitur: Alij autem pallio velatum dicunt, atque ex his aliqui decoris gratia id fieri asserunt, quandoquidem caluus erat: aliqui vero ob capitis imbecillitatem id fieri perhibent, aliqui autem significanter id ab eo factum volunt, nimirum quod principem rationalis animæ sedem probe munitam & cōrectam esse oporteat. Alij signum peregrinationes amantis esse ferunt: alij vero rursus obscuritatem scriptorum ipsius per hoc significari contendunt. Alij postremum in testificationem id fieri volunt, quod etiam sanitatis tempore ea quæ lædere possunt cauere debeamus. Quamquam quidam affirmant, quod in administratione rerum gerendarum, ne quid à circumfluo pallio manus ipsius impedirentur, id ipsum complicatum in caput reicere consueuerit. Cæterum de scriptis ipsius multa dissensio est, quare fit vt quum alia alij opinentur, non facile sit de ipsis certum quid pronunciare, ob multas præsertim causas quæ iudicij certitudinem obfuscant: velut est primum quidem cognomen. Secundo quod dictionis characterem possibile sit seruare. Tertio quod vnus & idem modo robustiore, modo remissiore dictione per ætatem vtatur: neque desunt etiam aliæ præter has causas, si referre libeat. Pecuniarum autem penitus contemptor fuit, moribusque sanctis, ac Græcorum amator, quare etiam gentiles suos summa diligentia curauit, adeo vt à peste omnes ipsorum ciuitates liberarit, quæ admodum supra dixi. Vnde & splendidos honores non apud Coos tantum, sed & apud Argiuos & Athenienses est consequutus. Filios à morte reliquit duos, Theissalum & Draconem, discipulorum vero magnum numerum. Clarissimi vero ipsius filij fuisse perhibentur.

*Cur capite
te tecto
cernatur.*

*Libri Hip
pocratis in
cōstruer,
siam addu
cti.*

*Theissalus
Draconem
Hippocr
tis filii.*

a ij Hippo-

HIPPOCRATIS COI

IVSIVRANDVM, IANO

*Cornario medico phy-
sico interprete.*

*Apollo
Aesculap-
pius.
Hygeia.
Panacea.*



Pollinem medicum, & Aesculapi-
um, Hygeamque ac Panaceam iu-
ro, deosque omnes itemque deas
testes facio, me hoc iusurandum,
& hanc contestationem conscrip-
tam pro viribus & iudicio meo
integrè servaturū esse. Præcepto-
rem sanè qui me hanc edocuit ar-
tem, parentum loco habiturum,
vitam communicaturum, eaque

*Que præ-
stet medi-
cus.*

quibus opus habuerit impertiturum: eos item qui ex eo na-
ti sunt pro fratribus masculis iudicaturum, artemque hanc
si discere voluerint, absque mercede & pacto edoctrurum:
præceptionum, ac auditionum, reliquæque totius discipli-
næ participes facturum, tum meos, tum præceptoris mei fi-
lios, imò & discipulos qui mihi scripto cauerint, & medico
iureiurando addicti fuerint, alij vero præter hos nulli. Cæ-
terum quod ad ægros attinet sanandos, diætam ipsis consti-
tuam pro facultate & iudicio meo commodam, omneque
detrimentum & iniuriam ab eis prohibebo. Neque vero vl-
lius precès apud me adeò validæ fuerint, vt cuiquam vene-
num sim propinaturus, neque etiam ad hanc rem consilium
dabo. Similiter autem neque mulieri talum vulux subditi-
cium, ad corrumpendum conceptum, vel foetum dabo. Por-
rò præterea & sanctè vitam & artem meam conservabo. Nec
vero calculo laborantes secabo, sed viris chirurgiæ opera-
riis eius rei faciendæ locum dabo. In quascunque autem
domos ingrediar, ob vtilitatem ægrotantium intrabo, ab
omniq; iniuria voluntaria inferenda, & corruptione cum
alia, tum præsertim operum venereorum abstinebo, siue
muliebria, siue virilia, liberorūque hominum aut seruo-
rum cor-

A rum corpora mihi contigerint curanda. Quæcunque vero inter curandum videro aut audiero, imò etiam ad medicandum non adhibitus, in communi hominum vita cognouero, ea si quidem efferre non contulerit, tacebo: & tanquã arcana apud me continebo. Hoc igitur iusiurandum mihi integrè seruanti, & non confundenti, contingat & vita & arte feliciter frui, & apud omnes homines in perpetuum gloriam meam celebrari. Transgredienti autem & peieranti, his contraria eueniant.

HIPPOCRATIS COI

LEX, IANO CORNA-

rio medico physico

interprete.



Edicina omnium artium præclarissima est. Verum propter ignorantiam eorum qui eam exercent, & ob vulgi ruditatem, quòd tales pro medicis iudicat & habet, iam eò res deuenit, vt omnium artium longè vilissima censeatur. At vero hoc peccatum ob hãc potissimum causam mihi committi videtur.

*Medicæ
artis præ
stantia.*

Soli nanque Medicinæ nulla pœna in rebus publicis statuta est, præterquam ignominia, verum hæc ipsa non afficit, neque contingit eos qui ex composito personam ipsius induerunt. Similimi enim huiusmodi Medici sunt personis quæ in tragœdiis introducuntur. Quemadmodum enim illi figuram quidem & habitum ac personam eorum quos referunt habent, illi ipsi autem verè non sunt. Sic & Medici fama quidem & nomine multi, re autem & opere valde pauci. Quisquis enim Medicinæ scientiam sibi vere comparare volet, eum his ducibus voti sui cõ-

*Quæ pœ
na malis
medicis in
rogetur.*

HIPPOCRATIS LEX.

*Necessaria medicina
eo futuro.*

*Disciplina
ne copari
ratio ad
agritulaturam.*

*Scientia
multum
differt à per-
suasione.*

potem fieri oportet, Natura, Doctrina, Loco studiis apto, In-
stitutione à puero, Industria, & Tempore. Primum quidem
igitur omnium Natura opus est. Natura enim repugnante,
irrita omnia fiunt. Si vero natura ad optima viam demon-
stret, artis Doctrina facile contingit, quam sanè cum prudè-
tia sibi comparare oportet, ita ut à puero institutio accedat,
atque id in Loco à natura ad disciplinam apto. Amplius au-
tem & Industriadhibere oportet : eamque ad multum
omnino tempus, quo disciplina ipsa insita, feliciter & cum
profectu fructus suos producat. Qualis enim eorum quæ ter-
ra producit consideratio est, eiusmodi etiam disciplinæ Me-
dicinæ per omnia similiter existit. Natura enim nostra, velut
ager est, dogmata præceptorum, velut semina sunt. Institu-
tioni à puero cum eo conuenit, quod opportuno tempore
semina in aruum cadere oportet. Locus autem in quo disci-
plina contingit, est velut ambiens aer, à quo è terra nascè-
tibus nutrimentum accedit. Industria autem, cultura est.
Tempus postremum hæc omnia corroborat, ut perfectè enu-
triantur. His igitur ad artem medicam allatis, & vera ipsius
cognitione comparata, tandem per vrbes obambulando,
non sermone tantum sed & opere medicos haberi conue-
nit. Imperitia vero malus thesaurus est & infelices opes his
qui eam repositam habent, & insomnium, aut potius som-
nium diurnum, & maxime verum, alacritatis fiduciaque ac
veræ exultationis expers, timiditatisque & audaciæ nutritrix.
Timiditas equidem impotentiam, Audacia vero Ignoran-
tiam artis significat. Duo enim sunt, Scientia & Opinio,
quarum altera quidem scire facit, altera vero ignorare. Cæ-
terum res sacræ sacris hominibus demonstrantur, prophanis
id fas non est, prius quàm scientiæ orgiis initientur.

Hippocratis

Hippocratis Coi

LIBER DE ARTE, I A-

no Cornario medico physico interprete.



Vnt quidam qui artem putant, reliquas artes turpiter incescendo dehonestare, atq; id quidem veluti putant non transigunt, vt ego sanè assero, sed propriâ cognitionem ac scientiam ambitiosè ostentant. Mihi verò inuenire aliquid eorū quæ nondum inuēta sunt, quod ipsum notum quàm occultum esse præstet, scientiæ votum ac opus esse vi-

Scientiæ votū ac opus.

detur. Similitérque & semiperfecta ad finem perducere & absoluere. At verò verborum inhonestorum arte ad ea quæ ab aliis inuenta sunt confundenda, promptum esse, nihil quidem corrigendo: eorum vero qui aliquid sciunt inuenta apud ignaros calumniando, non sanè scientiæ votū aut opus esse videtur: sed proditio magis naturæ suæ aut ignorantia artis. Solis enim artis ignaris hoc ipsum factum conuenit, qui contentiosè quidem gestiunt ac conantur, nequaquam vero possunt malicie sufficere, ad hoc vt aliorum opera quæ quidem recta sunt, calūnientur, quæ vero non recta sunt, reprehendant. Eos quidem igitur qui in alias artes hoc modo irruunt, quibus hæc curæ sunt, quorūque id interest, & præstare hoc possunt, prohibeant. Præsens vero sermo his qui medicinam eo modo inuadunt aduersabitur, confidens quidem & animatus propter vilitatem eorum quos insectatur: copiosus vero ob artem, quæ præstat & auxiliatur: potens autem ob sapientiam, quæ est eruditus. In vniuersum itaque nulla videtur mihi ars esse quæ non existat. absur-

Ignarorū graphica depictio.

HIPPOCRATIS LIBER

dum enim est aliquid esse putare quod non est, quoniam eorum quæ non sunt, quanam substantia conspecta aliquis denunciare possit quod sint? Si enim non existentia videre non datur, quemadmodum existentia, haud equidem scio quomodo quis mente concipere queat ea quæ non sunt, quemadmodum ea quæ sunt, quæ certe oculis videre est, mentoque intelligere quod sunt. Verum ut ea nec videas nec intelligas, non similiter contingere potest. Sed existentia quidem semper videntur ac cognoscuntur: non existentia autem, neque videntur neque cognoscuntur. Cognoscuntur itaque demonstratis iam artibus, & nulla est ars quæ non ex specie quadam rerum videatur, arbitròq; sanè ego etià nomina artibus ex speciebus accipi & imponi. Absurdum enim est existimare ex nominibus species rerum germinare & prouenire, immo etià impossibile existit. Nomina enim lege quadam naturæ indita sunt, Species autem rerum non lege sancitæ sunt, sed naturæ germina existunt, atque hæc quidem si quis ex prædictis non ad plenum intelligat, in aliis sermonibus fortassis clarius edocebitur. De Medicina vero, utpote de qua hic institutus est sermo, claram demonstrationem faciam, & primum sanè definiam quod sentio, Medicinam esse morbos ab ægris in totum tollere, & morborum vehementes impetus obtrudere, & eorum qui à morbis victi sunt curationem non aggredi, quum id in cōfesso sit, quod Medicina tales sanare nō possit. Quomodo igitur hæc Medicina faciat, & quali omnino facultate præstet, de hoc iam reliquum sermonem instituam. Cæterum in artis demonstratione simul etiam sermones illorum qui eam dehonestare contendunt, quatenus quisq; eorum sibi quid transgisse visus est, reuellam. Principiū itaque sermonis hoc erit, cui omnes assensuros scio. Quod quidem aliqui à medicina curati sanati restituuntur, confitetur. Quod vero non omnes ob hoc iam ars ipsa vituperatur: aiuntq; hi qui eam peius incessunt, quod hi qui à morbis apprehenduntur, eosque eundem fortunæ ope euadant, & non auxilio ipsius artis. Ego vero non priuabo quidem ipse fortunam tanquam nihil operæ præcij faciat, puto enim morbis qui male curantur, vltimum infortunium accedere: qui vero bene, eos bonam fortunam nancisci. Postea vero interrogo: quomodo possibile est sanatos aliud quam artem causari, siquidem eius vsu & mi-

Medicina quid.

Medicina mala omnia non sanat.

Quatenus medicina non probetur.

- A & ministerio sunt sanati: Nudam enim fortunæ speciem eos respicere ac sequi noluisse, ex hoc apparet, quod se ipsos arti concrediderunt quare à gratia fortunæ referenda liberi sunt: ab ea vero quæ arti debetur minime se vendicare possunt, quo minus ei sanitatem acceptam ferant. In hoc enim quod se ei commiserunt ac concrediderunt, palam est ipsos speciem eius esse contemplatos, vim vero eius patrato opere cognouerunt. Dicit sanè hic aduersarius, quod multi iam ægri etiā citra medicorum vsum sint sanati: & ego id dicentibus credo. Videtur autè mihi omnino fieri posse, vt & qui medicis non vti sunt in medicinam inciderint, non tamè vt scierint quod in ipsa rectum fuerit, & quod non rectum: alioqui contigisset
- B vt se ipsos eodè penitus modo curassent, quo curati fuissent, si medicos adhibuissent. & hoc tandem magnum signum est substantiæ ipsius artis, nempe artem esse, & quidem magnam, quando sanè etiam hi qui eam esse non putant, per ipsam seruari apparèt. Valde enim necessarium est nosse, eos qui medicis etiam non sunt vti, si ægrotauerunt & conualuerunt, quod aut facientes aliquid, aut nō facientes, sanati sunt. Aut enim inedia, aut edacitate, aut vberiore potu, aut siti, aut balneis, aut illuniè, aut laboribus, aut quiete, aut somnis, aut vigiliis, aut his omnibus promiscue vtentes, conualuerunt. Et sanè propterea quod opem senserunt, valde necessarium est ipsos nosse, quod fuerit aliquid quod opem tulerit. Et rursus si quid detrimenti acceperunt, necesse est & detrimentum nosse, & quod fuerit aliquid quod damnum dedit ac læsit. Non enim cuius cognoscere potest ea quæ commoditate & detrimento sunt disparata. Si igitur is qui ægrotauit, siue laudare, siue vituperare nouerit quid ex diætâ, per quam conualuit, omnia hæc Medicinæ esse comperiet, & sunt nihil minus ea quæ damno fuerunt, quàm ea quæ opem tulerunt, in testimonium arti, quod ars ipsa sit. Quæ enim profuerunt, ob rectum vsum profuerunt: quæ vero nocuerunt, ob id quod non rectè usurpata sunt, nocuerunt. Atqui vbi rectum, & non rectum, vtrunque suum finem habet, quomodo quis hoc artem esse neget? Hoc enim ego artis expertus esse dico, vbi neque rectum neque non rectum aliquid existit. Vbi vero vtrunque horum inest, quomodo hoc non artis opus, sed potius inartificialitatis existat? Amplius autem si ex phar-macis purgantibus

Species fortunæ nuda

Medicis nō utentes non negat posse sanari.

Qui sine medicis sanantur, aliis quare sanantur.

artē xviā.

HIPPOCRATIS LIBER

*Medici
mētā pur-
gantia, &
fistētia nō
satis sūt ad
cōualescen-
tiam.* purgantibus, & aluum sistentibus solum, tum Medicina, tum D
Medicis sanationem facerent, infirmus sanè sermo meus me-
rito iudicaretur. Nūc vero hi qui inter medicos maxime lau-
dati sunt, & diætā, & aliis medicaminum formis sanant, quas
ne idiota quidem artis ignarus si audiat, nedum Medicus,
artis esse negare queat. Vbi igitur nihil neque in ipsis bonis
medicis, neque in arte medica inutile est, sed in plurimis

*Medica
ars cur re-
felli non
possit.
Quid can-
tra eos qui
mortuos
medicis as-
signant,
dicit.* eorum quæ ex terra nascuntur, & eorum etiam quæ fiunt, spe-
cies & formæ insunt medelarum & pharmacorum: non est
quod amplius aliquis eorum qui sine medico conualuerunt,
casum spontaneum vero sermone vehere possit tanquam cau-
sam suæ sanationis. Spontaneum equidem nihil esse appa-
ret ac deprehenditur. Omne enim quod fit, propter quid fie-
ri comperitur, atque etiam in singulis adeo propter quid fie-
ri videtur, Spontaneum vero nullam substantiam habere
comperitur, sed nudum tantum nomen. Medicina autem tum
ex his quæ propter quid de industria excogitata sūt, esse ad-
paret, tum substantiam amplius habere conspicitur. Quare
his quidem qui fortunæ sanitatem acceptam ferunt, artique
derogant, hæc quæ dixi respondere quis possit. Ceter-
um eos qui ob morientium calamitatem, artem demoliri
contendunt, miror quānam memorabili ratione commoti,
intemperantiam quidem morientium causam mortis non
statuunt, scientiam vero eorum qui medicinam exercent,
accusant: tanquam sanè Medici quidem ea quæ non conue-
niant imperare possint, ægri vero quæ imperata sunt trans-
gredi non possint. Atqui longe magis rationi consentaneum
est, ægros non posse facere quæ imperantur, quā medicos

*Quid me-
dicus consi-
deret an-
te curam.* non conuenientia iubere. Medici namque sana mente sa-
nūque corpore rem aggredientes, & præsentia considerant,
& de præteritis similiter iuxta præsentia ratiocinantur, in-
tantum etiam ut aliquando palam gloriari soleant ægri, se il-
lorum opera sanitati restitutos esse. Aegri vero neque qua-

*Cur lāguē-
tes nō pa-
teant.* parte laborēt, neque ob quam causam laborent, neque quid
ex præsentibus futurū sit, neq; quid ex horum similibus fiet
scientes, medici imperio subiacent, dolētes quidem ob præ-
sentia, timentes autem futura: & pleni quidem morbo, ina-
nes autem ciborum, ea quæ morbo grata sunt, quā quæ ad
sanitatem faciūt assumere malunt, mori quidem non aman-
tes.

tes, sed tolerare tamen non potentes. Hoc modo autem affectos, vtrum verisimilius est, hos à medicis imperata facere, an alia facere quæ medici non iusserunt? aut medicos tales quales superiori sermone declaravi, non conuenientia imperare? Nõne multo magis hos quidem quæ conueniant iubere? illos autè temere & impotenter nolle obedire? atque sic inobedientes in mortem incidere? Quæ sanè qui non recte considerant, causas ad hos qui inculpabiles sunt, referunt: eos vero qui maxime accusandi sunt, à culpa liberant & defendunt. Porro sunt item quidam qui ob eos qui victis à morbis curam adhibere nolunt, medicinam ipsam reprehendunt, dicuntque quòd morbi quos sanare aggrediuntur illi, per seipfos fuissent sanati: qui vero auxilio opus habent, eos non contingūt. Oportebat autem, inquiunt, siquidem ars erat, omnibus æquè morbis sanitatem afferre. Qui igitur hæc dicunt, si medicis indignarentur, quòd ipsorum talia dictum, non vt delirantium curam habeant, meritò sanè succensuerint magis, quàm quod illa reprehendunt. Si quis enim ab arte potentiam in ea quæ non proficitur, aut à natura facultatem in ea ad quæ nata non est, exigat: is ignorat insaniam dementiae potius quàm ignorantia conuenire. Quorum enim instrumentorum siue naturæ, siue artium facultatem obtinemus, per ea sanè opifices esse possumus, per alia vero minime licet. quū igitur homo morbo afficitur qui vehementior est quàm medicinæ instrumenta, ne sperare quidem oportet vt à medicina exuperetur. Exempli enim gratia, Inter ea quæ in medicina vrendi vim habēt, ignis extreme vrit, verum eo minus etiā alia multa. An vero ex eis præstantiora leuiore morbos curare non possint nondum satis constat, valentissimos autè morbos potētissima etiam instrumenta curare non posse, quomodo non sit manifestum? Quæ enim ignis nõ efficit, quomodo ea quæ ab illo non sunt domita non ostendant, quòd alia arte opus habeāt, & non ea in qua ignis instrumentum existit? Idem sentio & de aliis instrumentis quæcunq; medicinæ opus adiuuāt, quorum omnium singulatim successum si non assequitur medicus, vim affectionis accusare oportet, mea quidem sentētia, non ipsam artem. Qui igitur eos reprehēdunt qui victis à morbo manū adhibere recusant, hortantur etiā vt ea quæ non cōueniunt attingant,

*Dānatur
ars medi
ca, quine
tiā cū de
ploratos
non curēt.*

*Deploras
tos nõ ex
pedit tan
gere.*

HIPPOCRATIS LIBER

attingant, non minus quàm ea quæ contingere interest artis, quod quum faciunt, his quidem qui nomine medici sunt admirationi sunt, ab his vero qui arte præstant deridentur. Nec vero adeo desipientes huius artis experti sunt: neque vituperatoribus neque laudatoribus indigent, sed ratione, ad quam sanè actiones opificum absolutæ, plenæ sunt, & quæ ab ea destitutæ, mancæ. Amplius vero etiam defectus

*Quædam
arti quæ
dam arti
fici dāda,* aliquos quidem opificibus imputare oportet, aliquos vero ipsis operibus. Quæ quidem igitur ad alias artes pertinent aliud tempus, aliumque sermonem requirunt, Quæ vero ad medicinam, qualia sunt, & quomodo iudicanda, partim quidē superiori sermone ostendimus, partim vero præsentī oratione docebimus.

*Mala pa
tentia pau
ca sunt, cō
tra quæ
non patēt
multa.* Sunt enim his qui hanc artem probe norunt, morbi partim non in obscuro positi, & non multi: partim non in manifesto loco hærentes, & multi sunt. Qui enim ad interna vertitur, in obscuro siti sunt, Qui vero ad superficiei corporis erumpunt aut tumescunt, manifesti sunt. exhibent enim sese ut tum visu, tum tactu, & soliditas & humiditas ipsorum percipiatur, & qui calidi sint quique frigidi sentiuntur, qui sanè singulorum aut præsentia aut absentia tales existunt. atque horum quidem omnium in omnib. certas ac infallibiles medelas esse oportet, non ob id quod faciles sint, sed quod certo inuento consent. Neque vero à quibusvis volentibus inveniuntur, sed ab his qui volunt itemque possunt. possunt autem quibus tum disciplina non eminus sed propè & largiter contigit, tum natura non infelix liberaliter accessit. Ad manifestos quidē igitur morbos hoc modo artem diuite facultate præditam esse oportet. Neque vero ad minus manifestos eam inopem ac dubiam hære cōuenit. Sunt autem morbi minus aperti, quique ad os, quique ad ventriculum sunt conuersi. Habet autem corpus non vñū ventriculum sed plures, Duo enim sunt qui cibū suscipiunt & demittunt, aliique præter hos plures, quos norunt hi quibus hæc res curæ fuit. Quæcunque enim membra carnem in orbem circumsitam habent, quam musculum adpellant, ea omnia ventriculum habent. Omne enim incōcretum & quod non coaluit, siue pellicula siue carne contegatur, cauum est. Impletur autem dum sanum est flatu, dum ægrotat sanie. Habent itaque brachia talem carnem, habēt & scœmora, habent suræ.

*Corporis
ventriculi*

- A bēt sura. Quin & in macilētis & excarnib. partibus eiusmodi caro inest, similiter vt in carnosis esse demonstratum est. Nam & qui thorax appellatur, in quo hepar continetur, & capitis circulus, in quo cerebrum concluditur: ipsumque adeo dorsum, ad quod pulmo vergit, horum membrorum nullum est quod non & ipsum vacuum sit, ac multis segmentis plenum ac quasi discriminatum existat, quæ parum abest vt vasa existant, quorum tamen aliqua habentem lædunt, aliqua vero etiam prosunt. Præter hæc autem & venæ multæ, & nerui non in carne sublimes, sed ad ipsa ossa producti ligamentum sunt articulorum: ipsi etiā articuli in quibus offitium quæ mouentur commissuræ inuoluuntur: & horū nullum est quod non subspumofum sit, & circa se forulos habeat, quos sanies prodit, quæ deductis ipsis, multa & magno multorum mœrore egreditur. Ex prædictis itaque omnibus nullum est quod oculis conspicienti videre ac cognoscere contingit, quapropter etiam obscura mihi appellata sunt: & ab arte quoque obscura esse iudicata sunt, nō tamē quod obscura permaneant & nos vincant, sed quantum possibile est cognoscantur & superentur: possibile autem est quantum ægrorum naturæ ad considerandum conferunt, & quantum eorum qui perscrutaturi sunt naturæ ad perscrutandum aptæ sunt. Cum multo enim labore, & non modico tempore præ oculis videntur & cognoscuntur. Quæcunque enim oculorum cōspectum effugiunt, ea mentis oculis obtinentur & superantur. Quæcunque vero ob id quod non statim cognoscantur ægri mala perpetiuntur, ea non ad medicos curantes ipsos, tanquam ad ipsorum autores referēda sunt, sed ad naturam ipsius ægri, itidemque ipsius morbi. Medicus enim quum non possit malum neque visu assequi, neque audiendo ex aliorum narrationib. cognoscere, ratiocinatione ipsum persequitur. Etenim ipsi quoq; ægri qui obscuro morbo laborant, si conentur medicis de morbis suis narrare, ex opinione magis quàm scientia narrant. Nam si sciuisent, in ipsos sanē medicos non incidissent, quum eiusdem scientiæ sit morborum causas nosse, & morbos ipsos omnib. medicamentis quæ auferere morbum prohibent, curare posse. Quando igitur neque ex ægri narrationib. ad infallibilem certitudinem peruenire possit, aliō certe respicere medicū necesse

Loca corporis uacua

Venæ, nerui quid faciant.

Quæ causa cur non cognoscatur morbi statim.

Causæ morborum non statim cognoscuntur.

Languentibus nossem per credendum.

HIPPOCRATIS LIBER

Quid studeat natura.

Medicus cum morbum nouit, facile perlit.

Medica ars nihil cæteris simile habet.

Natura quid agat uideat.

neceſſe eſt. Quare huius tarditatis non ars ipſa, ſed corporis natura cauſſa exiſtit. Hæc enim malum ſentiens, mederi magno opere geſtit, conſiderans tamen ne temeritate magis quàm conſilio, & ut facilitate magis quàm violentia medeatur. Medicus uero ſi quidem ſuffecerit ad cognoscendum, ſufficiet etiam ad ſanandum. Si uero is in quo morbus cognoscitur, ſuperetur, ob id ſanè quòd ſerius medicum acceſſit, aut ob morbi celeritatem peribit. Si enim ex æquo proceſſerit morbus cum medicina, uelocior non eſt. Si uero præoccupauerit, uelocior omnino exiſtit. præoccupat autem tum propter corporum anguſtiam, in qua non in conſpicio inhabitant morbi, tum propter ægrorum negligentiam. Diſferunt enim & cunctantur, atque ubi iam à morbis ipſis apprehenſi ſunt, tum demum curari uolunt ac expetunt. Quare artis potentiam magis ex merito admiremur, ſi quem ex clandeſtino morbo ægrum reſtituat, quàm ſi impoſſibilibus & deſperatis opem ferre moliat. Nequaquam uero in vlla aliqua iam inuentarum artium tale quiddam ineſt, ſed quæ ex eis igne opificium exercent, igne non præſente, ocioſæ ſunt. Vbi uero illum cõtigerunt, operoſæ. Quæ item tractabili rerum materia artem ſuam exercent, ueluti aliæ quidè lignis, aliæ coriis, aliæ ſculpendo tum ære, tum ferro, aliisq; ſimilibus rebus earum quàm plurimæ. Opera porro quæ ex hac materia, & cum huius materiæ instrumentis ſunt, tæctâ facile retractari ac corrigi poſſint, tamen non magis uelocitate quàm uelut decet perficiuntur, neque deſunctorie trãſiliuntur, uerum ſi quod instrumentum deſit, interim quieſcunt, quanquam etiam illis cunctatio & tarditas ad opus commodius abſoluendum impedimento ſit: attamen opus laudatur & præfertur. Medicina uero aliquibus quidem ex ſuppuratione thoracis, aliquibus uero iuxta hepar & rhenes, aliis autem per omnes corporis uentriculos ægrotantibus, eorum omnium inſpiciendi potentia priuata eſt: quod ipſum apud omnes in conſeſſo exiſti, alias tamen facultates coadiutrices adinuenit. Vocis nimirum claritatem & tarditatem, itèque fluxiones quæ ſingulis locis per quos exitus eis dantur, deſtillare conſueuerunt. quarum modo odores, modo colores, deinde etiam ponderatam tenuitatem ac craſſitiem obſeruat, ex ciſque ſigna tum eorum quæ ægri iam perpetiuntur, tum

tur, tum quæ perpeti possint, colligit. Quum vero hæc significationem de se præbeant, neque ipsa natura voluntaria dimittat, vires amplius ac necessitates medicina ipsa inuenit, quibus natura coacta indemnitas tamen concedat. Natura autem stimolata & impulsæ, artis peritis quæ faciendæ sunt demonstrat. Cogit autem partim coalitum in nobis calorem, pituitam per ciborum ac potuum acrimoniam diffundere, quo intelligat quid sibi visum sit de illis, quæ vt viderentur ipsa machinata est: partim vero spiritum velut delatorem, cum viis arduis, tum cursibus accusare ac prodere cogit. Quin & sudores per prædicta ducens ac excludens, humorum calidorem exhalationem perficit. Sunt præterea quæ per vesicæ pergressa magis morbum ostendere possunt, quàm quæ per carnem exhalant. Inuenit igitur & tales potiones itemq; cibos, qui calidiores alias calefacientibus. existentes, illaque & eliquant, & profluere faciunt, quæ sanè non profluxissent si non hoc modo tractata fuissent. Alia itaque ex aliis, & alia per alia prodeunt, quæ corpus pergressa morbum ipsum producant, vt nihil miri sit ipsis serius fidem haberi, & medædi conatus ac aggressiones tardiores esse, quum sic per peregrinas interpretationes ad medendi scientiam ac cognitionem medici perueniant ac erudiantur. Quod igitur & rationes in seipsa plenas & ad ferendum auxilium abundantes habeat medicina, & quod morbis qui corrigi non possunt merito auxiliares manus negat, aut si fortè opem ferre molita est, citra culpam eam exhibet, id ipsum tum iam habitus sermonis manifestum facit, tum etiam artis peritorum demonstrationes palam documentum præbent, quas sanè ex operibus iucundius quàm ex sermonibus ostendunt: vt pote qui dicendo non magnopere exercitati, multitudini fidem sinceriorè ex his quæ videat quàm quæ audiat facere malint.

Hippocratis

Lotii magis morbos indicat

Proprium artis medicæ.

HIPPOCRATIS COI LI. D.

BER - DE VETERI MEDICI-

na, Iano Cornario medico phy-
sico interprete.

Priores ar-
tis medi-
cæ scri-
ptores ta-
xantur.



Medicam
artē esse,
& ueram
esseuerat

Medicinæ
antiquitas.
Certa esse
inuenta in
hac arte

Vicunq; de medicina dicere aut scribere aggressi, dicendi scopum sibiipsis ac fundamentum supposuerūt, calidum aut frigidum, aut humidum aut siccum, aut aliud quodcūque voluerint, rem in cōpendium contrahentes, principiū causæ, tum morborum, tum mortis, hominibus omnibus idē, vnū aut duo proponentes, hi in mul-

tis quidem quæ dicunt manifesto errasse deprehenduntur.

Iustior autem querela est de arte, qua omnes in maximis vtuntur, & bonos artifices maxime colunt. Sunt autem opifices alij viles, alij longe præstantes, quòd sanè si non esset om-

nino medicina, neque in ipsa obseruationes essent, neque quicquam inuentorum, nō vtique extaret, sed omnes æqua-

liter eius ignari & inexperti essent, & per fortunam omnes ægrotorum res gubernarentur. Nunc vero res non sic se ha-

bet, sed quemadmodum aliarum omnium artium opifices multum inter se differunt, tum manu, tum mente, sic etiam in medicina. Quapropter non censeo ego ipsam inani fun-

damento indigere, velut obscura & dubia, de quibus si quis dicere conetur, necesse est fundamento vti. Velut si quis de

sublimibus in aere rebus, aut de subterraneis dicat, & quomodo habeant sciat, tamen neque dicenti, neque audienti-

bus manifestum satis fuerit verane sint an secus. Neq; enim est ad quod quis se conferat, cuique innitatur vt veritatem

cognoscat. Medicina autem iam ab antiquo existit, & principium & via inuenta, per quam inuenta & multa & probe

habentia comperta sunt, per multum adeo tempus, & reliqua deinceps inueniuntur, si quis sufficiens sit, & iam inue-

ntorum gnarus, ex his ad perquirendum procedat. Quicūque vero

vero

A vero his reiectis ac omnibus reprobatis, alia via aliaque forma inquirere conatur, & quid inuenisse gloriatur, falsus est & fallitur. Impossibile enim id est, verum ob quas necessitates impossibile sit, ego demonstrare conabor, docens ac demonstrans quòd ars existat. Ex hoc autem palam fiet, impossibile esse aliquo alio modo inueniri. Videtur autè mihi maxime, de hac arte dicturum oportere vulgo ac plebeis hominib. nota dicere, Neq; enim de alio quopià, neque querere neque dicere conuenit, quàm de affectionib. ex quibus illi ipsi ægrotant. Ipsos quidem igitur suas ipsorum affectiones condiscere, quomodo fiunt ac desinunt, & quibus occasionibus augeantur ac deficiunt, quum idiotæ sint non est facile, verum ab alio inuētas ac proditas, procliue. Nihil enim libentius quisque recordatur quàm quæ sibi ipsi accidisse audit. Si quis autem idiotarum sententia destitueretur, & audientes non afficeret, ille etiam veritatis compos non fiet, & propterea neque fundamento neque scopo opus habet. Etenim Ars medica neque inuenta ab initio fuisset, neque quæsit, Nihil enim ea opus erat ægrotis hominibus, si eadem diætā vterentur, & assumerent quæ sani edunt ac bibunt, imò etiam alterius diætæ vsus eis profuisset, si nō alia fuissent his meliora. Nunc autem ipsa necessitas homines coegit Medicinam inquirere ac inuenire. Quoniam ægrotis eadem in cibo assumentibus quæ sani solent, non fuit vtile, velut neque nunc vtile existit. Quin vt rem altius expendamus, neque ipsam sanorū diætā ac alimoniam qua nunc vtuntur, inuentam fuisse cēseo, si suffecisset homini idē cibis ac potus, qui boui ac equo, & omnib. aliis præter hominē, veluti sunt ex terra nascentia, fructusq; ac herbæ & fœnum. Ex his enim nutriuntur, & augeantur, & illæsi degunt, nō indigentes alia diætā. Quanquam ego sanè ab initio etiam hominē tali victu vsu esse putem. Quæ vero nunc inuenta sunt edulia, multa arte excogitata & multo tempore producta esse mihi videntur, quū multa & grauiā, ex forti ac ferino victu homines paterentur, qui intemperatus, & magnas vires habēs ingerebatur. qualia sanè etiam nunc ex ipso paterentur, doloribus vehementibus & morbis obnoxij, & breui etiā morti. Verisimile est autè hæc mala tūc minus perpeffos ipsos esse, propter consuetudinē; quanq̃ etiam tunc vehementer affli-

b cti sint,

*De rebus
cōmunibus
tractat me
dicina.*

*Medica
ars est de
rebus, mor
bisue uul
go notis*

*Quæ de ci
bariis di
cat aspici
to.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Multi
priori ci-
bo peris-
bant.*

*Panificia
varia.*

*Medici
huc cibum
excogita-
runt.*

*Principia
medicinæ.
Barbaro-
rum uictus.*

Cui sint, & consentaneum est plurimos & debiliore natura præ-
 ditos periisse, eos vero qui victum illum superare poterant lō-
 giori tempore durasse ac restitisse. Quemadmodum etiā nūc
 ex validis edulis aliqui facile liberantur, aliqui cum multis
 doloribus ac malis. Ob hanc itaq; necessitatē etiam illi mihi
 videntur quæsiuisse victum naturæ cōuenientem, & inuenisse
 hunc, quo nūc utimur. Ex tritico igitur macerato, & à cor-
 tice purgato, molitoq; ac cribrato, & subacto ac assato, panē
 fecerunt. Ex ordeo vero mazā, aliaq; multa ex hoc excogi-
 tantes, coxerūt, & assarunt, & miscuerunt, fortiaq; & intem-
 perata, debilioribus temperarunt, effingentes omnia iuxta
 hominis naturā ac vires, quæ quidem fortiora essent, ab ipsa
 natura non posse superari, si ingesta essent, existimantes: ab
 his ipsis quoque dolores & morbos ac mortes oriri iudicā-
 tes: cōtra ab his quæ natura domare posset, alimentū & aug-
 mentum & sanitatē. Porro inuento huic quodnā iustius aut
 magis conueniens nomen quis imposuerit quā medicinæ?
 quandoquidem ad hominis sanitatem alimentumque ac salu-
 tutem inuentū est, in permutationē illius victus ex quo do-
 lores & morbi fiunt. Si vero ars ipsa esse non putatur, nihil
 absurdi est. Nā cuius nemo ignarus est, sed scientes omnes,
 ob vsum & necessitatem, eius non conuenit aliquem artificē
 appellari. Atqui inuentum ipsum & magnum & multæ artis
 ac considerationis existit. Quinetiam in hunc vsque diem
 exercitiorum & reparandarum virium curam gerentes, sem-
 per aliquid amplius adinueniunt, iuxta eandem viam inue-
 stigantes quod quis edens ac bibens maxime superet, ac se-
 ipso fortior euadat. Consideremus itaque & cōfessam ab o-
 mnibus medicinam, eam videlicet quæ propter ægros inue-
 ta est, an & nomen & artifices habeat, & ipsa dominari ipsis
 velit, & vnde tandem initium sumpsit. Mihi equidem, velut
 in principio dixi, nemo ne quæsiuisse quidem Medicinā vi-
 detur, si idem victus & ægrotis & sanis conuenisset. Itaque
 vsque in hunc diem hi qui medicina non vtuntur Barbari ac
 Græcis confines, eodē modo quo sani victitant ad volupta-
 tem, & à nulla re quā concupiscunt abstinēt, neque quicquā
 deuitant. Cæterum qui Medicinam quæsiuerunt ac inuene-
 runt eandem cū illis de quibus superiori sermone dictū est,
 sententiam habuerunt, & primum quidem ex his ipsis cibis
 copiam

- A** copiam detraxerunt, & pro multis paucos statuerunt. Quū vero ipsis aliquando hoc ad aliquos ægros sufficeret, palāq; fieret quod prodesset, non tamen omnibus, sed essent quidā ita habentes, ut neque modicos cibos superare possent, imbecilliore sanē quopiā tales indigere illis visi sunt, sorbitionesq; inuenerunt, pauca ex fortibus multa aqua perniscen-
*Sorbitionē
& potin-
num inuē-
tio.*
- B** rint exacerbantur ipsis febres ac dolores, & manifestum fit, quod assumptū morbo quidē alimentum ac incrementum præbet, corpori vero tabes & infirmitas existit. Quicūq; vero homines in hac affectione existentes siccum cibum assu-
*Quid ob-
seruandum
medicis.*
- C** munt, aut mazā, aut panē, etiam si valde modicū, decuplo magis & manifestius læduntur, q̄ si sorbitione vti essent, ob nul-
*Cibus sano-
rū lāguē-
tib. obest.*
- lam aliā causā q̄ fortitudinem edulij ad affectionē, in quo sorbere conducit, edere autem non. Si enim plura comederit, plus utique lædatur: si vero pauca, dolebit tamen omnino. Omnes itaque dolores causā ad idē reducuntur, nimirū fortissima edulia maxime & manifestissime hominē ledere, siue sanus sit, siue ægrotus. Quid igitur aliud cogitasse videri queat hic appellatus Medicus, & confessus artifex, qui æ-
*Duorū ho-
rū nutri-
catū dis-
ferentia.*
- grotū diētā ac victū adinuenit, q̄ ille qui ab initio oībus ho-
*Medicina
in Chirur-
giā, phar-
macuti-
cam, &
Dieteticen.*
- minib⁹ victū quo nūc vtimur, ex agresti illo ac ferino reperit ac subornauit? Mihi equidē videt idē modus, & vnū quoddā ac simile esse inuētū. Hic enī ea quę natura hūana sana superare nō potuit incidētia & ingesta, ppter feritatē intēperantiāq; ille vero qualicūq; tandē vnusquisq; affectiōe teneret, ut superare nō posset, eadē detrahēre quęsivit ac istitit. Quid hoc ab illo differt? præterq̄ quod multiplicior & variegatior ac maioris negocij est hæc species. Verum principiū fuit illa quę prius est producta. Si vero quis cōsideret quę sit ægrotorum diēta, comparatione ad sanorum diētā facta, is inueniet hanc ægris nocētiorem q̄ eam quę ferarum est & aliorum animalium sanis. Etenim vir laborans morbo neq; diffi-
*Ciborum
cōparatio.*
- b ij facili &

HIPPOCRATIS LIBER

ficili & intolerabili, neque rursus leui & despicabili, si panē D
aut carnem, aut aliud quid ex his quæ sani edentes iuuatur,
comedere uolet, non multum, sed multo minus q̄ sanus po-
terat, contingat autem ut nec sit qui eum delinquere admo-
neat. Alius contra sanus naturam habens nō omnino debi-
lem, neque rursus fortem, si comederit quid eorum quæ bos
aut equus comedens iuuatur, & dat sanē eruum aut ordeū,
aut aliud quid huiuscemodi, non multum, sed multo minus
quā potest. Sanus utique qui hoc fecerit, minus & dolebit
& periclitabitur q̄ ægrotus ille, qui panem aut mazam intē-
pestiue ingessit. Hæc itaque omnia signa sunt, quōd ipsa ars
medica via ac methodo quæsitā inueniri possit. Si quidem
igitur simpliciter, uelut aliqui putant, quæ fortiora sunt no- E
cerent, quæ debiliora prodesse & nutrire, tum ægrū, tū
sanum, facilis sanē res erat, Multum enim de securo detra-
here oportebat ut ad debilissimum deduceretur. Nūc autem
non minus delictum, nec minus lædit hominē, si pauciora
& defectuosiora q̄ satis est assumantur. Fames enim magnā
potentiam in naturam hominis habet & sanandi & debili-
tandi & occidendi. Multa uero etiam alia mala, diuersa qui-
dem ab his quæ ex repletionē fiunt, non minus autem gra-
uia, vacationis sunt, quapropter multo variegatior est, &
maiores diligentia requirit. Oportet enim modum aliquē
coniectare. Modum autem neque pondus, neque numerum
aliquem, ad quem referas cognosces: certitudinem enim ex-
actam nō reperies aliam q̄ corporis sensum. Quapropter o- F
perosum est ita exacte cōdiscere, ut parum in alterutrā par-
tem delinquas: quanquā ego etiā cum medicum ueremēter
laudarim, qui parum delinquat. Certitudinem autem exactā
raro uidere contingit. Quare plerique Medici eadē quæ ma-
li gubernatores in se admittere mihi videntur. Etenim illi
quum in tranquillitate gubernantes delinquant, non fiunt
manifesti: quum uero deprehenderit ipsos ventus magnus
& tempestas, palām iam cōspicui sunt omnibus hominibus,
quod ignorantia & culpa erroris sui nauem perdiderūt. Sic
sanē etiam mali & plurimi medici, quum curāt homines ni-
hil graue patiētes, in quos si quis etiam maxime delinquat,
nihil graue faciat. Sūt autem multi tales morbi, & multo se-
pius q̄ graues hominibus accidunt. In talibus sanē delinquē-
tes, non

*Quis erret
in ægro-
tis.*

*Medicos
nauiū re-
floribus
comparat.*

- A** tes, non sunt manifesti idiotis hominibus. Vbi vero obtigerit magnus & fortis & periculosus morbus, tunc ipsorum delicta & ars omnibus in conspicuo sunt. Neque enim longe absunt singulorum pœnæ ac cruces, sed breui adfunt. Quod autem non minores afflictiones ab intempestiua vacuatione quàm à repletione hominibus contingant, probe discemus si in sanis rem expenderimus. Sunt itaque aliqui ipsorum quibus semel in die cibum capere conducit, & hoc propter vtilitatem sic observant. Alij etiam prandent, propter eandem necessitatem, sic enim ipsis conducit: Sed & quidam non propter vtilitatem, sed aut ob voluptatem, aut ob alium aliquem casum alterutrum faciunt. Plurimorum enim hominum nihil interest vtrum tandem faciant, siue semel tantum edant, siue etiam prandeant, hac consuetudine uti. Sunt autem quidam qui non possint extra vtilitatem facientes facile degere, sed contingit utrisque ipsorum, per diem vnum atque eum non otiose permutantibus, immensa afflictio. Alteri enim si pransi fuerint, idque eis non conducit, statim graues & corpore segnes fiunt, itemque mente pigri, hiatuque ac oscitatione & dormitatione & siti pleni. Si vero etiam insuper cœnauerint, & flatu, & tormina, & alius effringitur, & multis magni morbi principium hoc fuit, si eosdem cibos quos semel insumere consueuerunt, bis assumant, & nihil his amplius. Alteri vero si prandere consueuerunt, idque ipsis conducit, & non pransi fuerint, mox ubi tempus præterierit, statim impotentia vehementes, tremor, animi deliquium, postea oculi pallidi, vrina crassa & calida, os amarum, & viscera pendere ipsis videntur, vertigo, iracundia, tristitia. hæc autem omnia ubi cœnare tetauerint. deinde autem pransuri consumere non possunt quæ prius cœnarunt. atque hæc ipsa cum tormine ac strepitu descendentia aluum concludunt, ipsique ægre dormiunt, insomniæque; conturbata ac tumultuosa habent, plerisque; vero etiam horum magni morbi principium fuit. Considerare porro oportet ob quas causa hæc ipsis acciderunt. Et sanè puto his qui semel cibum sumere consueuerunt, quod non expectauerunt iustum tempus, donec ipsorum veteris pridie ingestos cibos perfecte consumpsisset & exuperasset, euacuatusque; esset ac quieuisset, sed in feruentem adhuc & fermentatum novos ingesserunt. Eiusmodi autem ventres multo tardius concoquunt, & maiori

Quando error patet.

Sumendi cibi uarietas.

Cum hora cibi præterit, quid fiat uidetur.

Cur uarie hi afficiuntur.

HIPPOCRATIS LIBER

opus habent cessatione ac quiete. His vero qui prandere as-
 sueti fuerunt, q̃ non vbi citissime alimento corpus indige-
 bat, & iam priora consumpta erant, nec habebat aliquā am-
 plius fruitionem, statim ipsi nouum alimentum suppedita-
 tum est. deficit autem & cōsumitur prę fame. Nā omnia que
 tales homines perpeti dixi, fami imputo. Dico autem etiam
 alios omnes homines, qui duos aut tres dies inediam per-
 tulerint, eadem passuros esse, quę de impransū dixi. Ceterū
 tales naturas quę cito & fortiter eiusmodi delictis offendū-
 tur, imbecilliores aliis esse censeo, proximus est autem im-
 becillis languenti: verum imbecillior est languens, & plus la-
 borare contingit ipsum, vbi iustum tempus non est assequu-
 tus. Quum itaque eiusmodi exacta certitudo circa artē exi-
 stat, difficile est semper quod rectissimum est assequi. Multę
 autem species in Medicina ad tantam certitudinem perue-
 niunt, de quibus dicetur. Non censeo itaque propter hoc artē
 velut non existentem, neque probe inuestigatā, veterē
 oportere reiici, quod non habeat circa omnia certitudinem
 exactā. Verum multo magis propterea quod propinqua est
 recto, simulq̃; ratione possit ad ipsum peruenire, admirari o-
 portere censeo ea quę ex multa ignorantia sunt eruta & in-
 uenta, quod probe & recte adinuenta sunt, & non à fortuna
 aut casu. Porro ad eos qui nouo modo artē ex scopis ac fun-
 damentis suppositis quærunt, sermonem reducere volo. Si e-
 nim calidum est aut frigidum, aut siccum, aut humidū, quod
 hominem lædit, & oportet recte medentem auxiliari, cali-
 do quidem in frigidum permutato, frigido vero in calidū,
 sicco in humidum, humido in siccum contingat mihi homo
 non fortis naturę, sed ex debilibus, hic autem triticū e-
 dat quod ex area sustulit crudum & non elaboratum, & car-
 nes crudas, & bibat aquam. Hoc victu vtens satis scio quod
 multa & grauiā perpetiatur, Nam & doloribus vexabitur, &
 corpus debile euadet, & venter corrumpetur, & multo tem-
 pore viuere non poterit. Quod igitur auxilium præparare
 oportet sic habenti? calidum an frigidum, vel siccum, vel hu-
 midū? simplex enim est quodcūque ex istis. Si enim id quod
 ipsum lædit aliquod ex his est, contrario soluere oportet ac
 liberare, quęadmodū ipsorū sermo testatur. Atqui certissimū
 & manifestissimū medicamentum est, victum quo utebatur
 auferre,

Qui diu ci-
 bo absti-
 nent, quid
 patiantur.

Cur nō sē-
 per in ar-
 te medica
 attingitur
 veritas.

Suppositū
 hominis,
 materia
 æ.

Hoc consu-
 derato.

Potissimū
 auxilium.

D

E

F

A auferre, & pro tritico panem dare, pro crudis vero carnibus coctas, in superq; vinum propinare. His permutatis impossibile est non fieri sanum, nisi penitus fuerit tempore ac victu corruptus. Quid itaque dicemus? Num quod ipsi à frigido afflicto calida hæc oblata auxilium tulerunt, aut contra? Equidem opinor me multam hæsitationem interrogato præbiturum esse. Nam qui panem ex tritico parauit, calidum, aut frigidum, aut siccū, aut humidum abstulit: panis enim & in ignem & in aquam datur, & multis aliis elaboratus est, quorum singula propriam vim & naturam habet, & aliqua quidē à natura in ipso existentia abiicit, aliis autem temperatur ac permiscetur. Sed & hoc scio, quod in corpus hominis refert,

B panis purus, aut cui nihil furfurum decessit, & ex tritico nō decorticato, aut decorticato, & multa aqua subactus, aut cōtrā, & superassatus aut crudior, aliaq; præterea infinita. Similiter etiam de maza, & singulorum adeo vires magnæ, alteraq; alteri nihil simile habet. Quicumq; autē hæc nō considerans nō nouit, haud scio quo modo ille affectiones in homine cognoscere possit: ab vnoquoq; enim horum afficitur & alteratur homo, vel hoc, vel alio modo, & ex his omnis vita & sano, & ex morbo conualescenti, & ægroto. Nihil igitur vilius neque magis necessarium quàm hæc cognouisse: quod & probe & conuenienti ratiocinatione inuestigātes, iuxta hominis naturam hæc primi inuentores inuenerunt, iudicaueruntq; artem dignam quæ deo adscriberetur, quæ admodum etiam est receptum. Non enim siccū neq; humidum, neque calidum, neque frigidum, neq; aliud quicquam ex his putauerunt hominem lædere, neq; aliquo horum homini opus esse opinati sunt, sed quod in vnoquoque forte & humana natura potentius est, quodque non possit superare, hoc ipsum lædere duxerunt, & hoc auferre quæsiuerunt. fortissimum autem est inter dulcia, dulcissimum, inter amara, amarissimum, inter acida, acidissimum. & in omnibus adeo rebus vigor ipse ac summū. Hæc enim & in homine inesse viderunt, & hominem lædere. Inest enim in homine & amarū, & salsum, & dulce, & acidum, & acerbum, & fluidum, & alia infinita, omnigenas facultates habentia copiamq; ac robur. Atque hæc quidem iuxta ac inter se temperata, neq; conspicua sunt, neq; hominem lædunt. Vbi vero quid horū secretū

Panis differentia.

Maza. Que prospicienda medico.

Quid sperant priuati artis inuētores.

Que ualētissima.

Qui humores succi uis & sapores sint in hoīe.

HIPPOCRATIS LIBER

fuerit, atque ipsum in seipso fuerit, tunc & conspicuum est, D
 & hominem lædit. Quin & ex cibis quicunque nobis incō-
 modi sunt, & ingesti hominem lædunt. horum vnusquisque
 aut amarus est & meracus ac intemperatus, aut salus, aut a-
 cidus, aut alius quis intemperatus & fortis: & propterea tur-
 bamur ab ipsis, quemadmodum etiam ab his quæ ex corpore
 excernuntur. Omnia autem quæ edit aut bibit homo, talia
 edulia palam est minime hoc intemperato, & dissidente ac
 excedente succo participare, velut sunt panis & maza & his
 similia, quibus adiuetus est homo plurimis & semper vti: ex-
 ceptis his quæ ad voluptatem ac delicias condiuntur ac præ-
 parantur: & ab his plurimis in hominem ingestis turbatio
 ac secretio corporis facultatū minime contingit. Verū robur
 & augmentum, ac alimētum præsertim, per nihil aliud cōtin-
 git quàm quod probe temperatum est, & nihil habet intē-
 peratum, neque forte, sed totum vnum factum est & simplex
 & non forte. Et valde sanè dubito ego, quoniam modo hi qui
 talem sermonem proferunt, & artem ex hac via ad scopum
 abducunt, curaturi sint homines, quemadmodum proponūt.
 Non enim est ipsis, velut ego opinor, inuentum quid, ipsum
 in seipso calidum, aut frigidum, aut siccum, aut humidum,
 quod nulla alia specie communicaret. Verum arbitror eos-
 dem potus ac cibos ipsis esse, quibus omnes vtimur. Appo-
 nunt autem alij quidem, quòd sit calidus, alij frigidus, alij
 quòd siccus, alij humidus. Quoniam illud sanè dubium est,
 imperare ægroto calidum quid assumere: statim enim inter-
 rogabit quid sit illud, vt nugas producere necesse sit, aut ad
 aliquid eorum quæ sunt cōfugere. Si autē est calidum quod-
 dam acerbum existens, aliud vero calidum fluidum, aliud ca-
 lidum tenue, sunt enim & alia calida etiam alias vires sub-
 contrarias sibi ipsis habentia, quod igitur ipsorum assumere
 oportebit? calidum & acerbum, an calidum & fluidum, aut
 simul frigidum & acerbum? Nam & hoc est, itemque frigidū
 & fluidum. Etenim quod ego scio, totum cōtrarium ab vtro-
 que ipsorum euenit, idque non solum in homine, sed etiam
 in corio ac ligno, & aliis multis rebus quæ magis stupidum
 sensum habent quàm homo. Non enim calidum est quod ma-
 gnam vim habet, sed ipsum acerbum & fluidum, & alia quæ
 à me relata sunt, tum in homine, tum extra hominem, siue
 edantur, F

*Quæ per-
turbent.*

*Qualis pa-
nis, puls,
mazaue.*

*Calidum,
hoc, uel cō-
tra ne sit,
certum nō
est.*

*Quare hoc
calidum il-
lud cōtra
putatur.*

- A edantur, siue bibantur, siue forinsecus illinatur, aut quomodocunque formata adhibeantur. Frigiditatem autem & caliditatem ego omnium facultatum minime potes esse in corpore existimo, ob has sane causas. Quo equidem tempore ipsa inter se permixta simul frigidum ac calidum fuerint, non laedunt. Temperamentum enim & moderatio contingit frigido a calido, & vicissim calido a frigido. Vbi vero seorsim vtrunque secretum fuerit, tunc affligit. In hoc itaque tempore quum frigidum intus generatur, & cito hominem affligit, primum propter hoc ipsum adest calidum inde adeo ex homine ipso, nullo alio auxilio, neque preparatione opus habens, atque hoc & in sanis hominibus & in
- B aegrotis operatur. Ita que si quis sanus hyeme corpus perfrigerare velit, aut frigida lotionem, aut alio quopiam modo, quanto id amplius fecerit, si modo non omnino corpus congeletur, ubi vestimenta acceperit, & subtegmen venerit, magis & amplius corpore calefcit. Rursus si quis fortiter cal fieri velit, aut calido lauacro, aut multo igne, inde vero eandem vestem habens in eodem loco conuersari, in quo perfrigeratus, multo apparebit frigidior, & longe horridior, quam aliquis qui praestitu ventilationem admisit, & sibiipsum frigus preparauit, atque sic ex hoc modo recreatus est. Nam qui hoc facit, decuplo maiorem aestum ac ardorem percipit, quam is qui nihil tale facit. Verum sunt adhuc testimonia multo maiora. Quicumque per niuem aut
- C aliud frigus iter facientes, excellenter frigescent aut pedibus aut manibus aut capite, ubi se continuerint in noctem, quum cooperti fuerint & in tepore extiterint, ab aestu & pruritu vexantur, quibusdam etiam bullae velut ambrustis ab igne exurgunt, neque prius hoc patiuntur quam calfiant: adeo prompte vtrunque ipsorum ad alterum accedit. possem & alia innumera recensere. Ceterum circa aegrotos, nonne quibus rigor contingit, his acutissima febris relucet? sed non adeo fortiter, verum pauco tempore quiescens, & alias ferè innoxia, & quo tempore affuerit, percalida, & per totum corpus penetrans, desinens maxime in pedes, ubi sanè rigor & frigus validissimum diutissime durauit. Rursus quum sudor prodierit & febris decesserit, multo magis frigescit aeger, quam si ne apprehendisset quidem

*Contraria
comista non
laedunt.*

*Qui calor,
& frigus
coicipiuntur*

*Quid per
niues ge-
luq; cun-
tib. eue-
niat.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Quorum mor-
borum calor
non statim
cessat.*

*Destillatio
non signa-*

*Destillatio
non oculi
lorum.*

set quidem ab initio. Cui igitur breui adeo contrarium ac- **D**
cedit, cuique vis adimitur sua sponte, quidnam ab hoc ma-
gnum aut graue fiat? aut quid opus est multo ad hoc auxi-
lio? Verum dixerit aliquis, Qui ardenti febre febricitant,
itemque peripneumonijis, & alijs fortibus morbis, non cito
ex calore liberantur, neque adest hic frigidum aduersus ca-
lidum. Atqui ego hoc maximum signum esse puto, quod
non propter calidum simpliciter homines febricitent, ne-
que hoc sit simpliciter afflictionis causa: sed est & amarum
ac calidum idem, & calidum ac acidum, & falsum ac cali-
dum, & alia infinita, & rursus frigidum cum alijs facultati-
bus coniunctum. hæc itaque sunt quæ lædunt, simul adest
autem & calidum robore participans, nimirum ducens & **E**
exacerbans & augens simul cum illis, verum nullam poten-
tiam, maiorem quam conuenit videlicet, habens. Atque
hæc quidem sic se habent. Signa porro primum quidem
manifestissima producemus, quorum omnes iam sæpe experi-
entiam sumpsimus. Itaque quibuscunque nostrum graue-
do innascitur, & fluxus per nares mouetur, hic ut pluri-
mum acrior est eo qui prius erat, & quotidie ex narib. pro-
dibat, & tumescere facit nasum, & exurit calentem & extre-
me ignitum. si vero manum admoucas, & diutius perseue-
rauerit, etiam exulceratur locus minime carnosus & durus
existens. Sedatur autem aliquo modo ardor in naribus, non
quum fluxus prodit, & inflammatio consistit: sed postquam
fluxus crassior & minus acris, concoctusque & magis per- **F**
mixtus priore fuerit, tunc sanè iam etiam ardor cessat. Rur-
sus autem alijs ex frigiditate ipsa sola manifeste grauedo
fit, nullo alio accedente. Omnibus autem liberatio hæc est,
ut ex frigiditate quidem affecti percalfiant, ex ardore vero
perfrigerentur, atque hæc breui accedunt, & concoctio-
ne nulla opus habent. Reliquæ autem omnes fluxiones
quas propter humorum acrimonias & intemperantias ego
fieri sentio, restituntur & curantur, ubi temperatæ fuerint
& concoctæ. Rursus quæcunque fluxiones ad oculos vertun-
tur, ut fortes & omnigenas acrimonias habentes, exulcerant
quidem palpebras, erodunt autem aliquorum genas, & sub
oculis partes, ad quasunque tandem influxerint, rumpunt
etiam & peredunt eam quæ oculum ambit tunicam. dolores
autem

- A** autem & ardor, & inflammatio extrema adfunt aliquandiu, donec fluxiones fuerint concoctæ, & crassiores redditæ, & lemæ ab ipsis extiterint. Fit autem concoctio, ex permixtione, temperaturaque mutua, & quasi coctura. Quinetiam fluxiones in fauces delabentes, ex quibus raucedines fiunt, anginæ, erysipelata, peripneumonix: Omnes hæc primum quidem salix & humidæ acresque descendunt, & in talibus morbi firmanantur. Vbi vero crassiores & maturiores factæ fuerint, & ab omni acrimonia liberatæ, tunc iam & febres, & alia hominem lædencia soluuntur. Oportet autem utique causas vniuscuiusque ea putare, quæ quum adfunt, talem modum fieri necesse est, quum permutantur in aliud temperamentum, cessare. Quando igitur ab ipsa caliditate sincera, aut frigiditate fluxiones contigerint, & nulla alia facultate participauerint, sic sanè sedabuntur, vbi ex frigido in calidum permutatæ fuerint, & ex calido in frigidum. Permutantur autem eo quem dixi modo. Amplius porrò etiam alia quæcunque mala homo patitur, omnia à facultatum potentiis proficiscuntur. Itaque quum amaritudo quædam diffusa fuerit, quam bilem flauam appellare solemus, quales statim anxietates & æstus & impotentix occupant? Verum vbi liberati fuerimus ab illa & purgati, aut sponte, aut per medicamentum, si modo tempestiuè quid ipsorum fiat, manifeste & à doloribus & à calore liberamur. Quanto autem tempore eadem eleuata fuerit, &
- C** cruda & meraca ac intemperata, nulla arte neque dolores, neque febres sedare possis. Et quos quidem acuta acrisque ac æruginosa bilis affligit, quales mox rabies, & morsus viscerum ac pectoris, & desperatio? Non sedantur autem hæc priusquam eadem expurgetur & prosterneatur, & aliis permisceatur. Concoqui autem & permutari, attenuarique ac crassescere in humorum speciem, per multas & omnigenas species contingit. Quapropter & iudicationes, & numeri temporum, in talibus multum posunt. Hæc vero omnia minime contingit calidum aut frigidum perpeti. neque enim hoc putrescere neque crassescere poterit. Quid autem ipsum esse diceremus? & temperamentū ipsorum est, verūtamen inter ipsa mutuo vim habens, quoniam nulli alij permixtū calidum, definit esse calidum, quàm

*Causa
Rheuma.*

*Cassa ho-
rum ma-
lorum.*

*Mala ho-
mini unde
accident.*

ἀπορία.

*Calor &
frigus non
putrescit.*

HIPPOCRATIS LIBER

Quæ in ho- quàm frigido: sic rursus non permutatur alio frigidum quàm D
mic mistio calido. Reliqua omnia in homine, quanto pluribus miscen-
bona. tur, tanto mitiora ac meliora fiunt. At vero homo omnium
Hominis optime dispositus est, ubi concoquit & in quiete est, nullam
bona dispo- peculiarem vim præ se ferens. De his igitur videor mi-
sitio. hi abunde demonstrationem fecisse. Porro Medici quidam
Quid oportet medi- itaque Sophistæ dicunt, quòd impossibile est medicinam
cos scire. cognoscere, eum qui non nouit quid sit homo, & quomodo
 primum factus & còpactus sit. Ego vero ea quæ alicui sophi-
 stæ aut Medico, de natura dicta sunt aut scripta, minus cen-
 seo medicæ arti conuenire quàm pictoriæ. Iudico autem de
 natura aliquid manifestum ac euident cognoscere, ex nulla
 parte aliunde contingere quàm ex Medicina, atque hoc tunc E
 condiscere possibile est, ubi quis ipsam medicinam totam re-
 cte comprehenderit. Verum quatenus illi prodiderunt, mul-
 ti mihi cognouisse videtur, cognouisse autem dico, narratio-
 nem scilicet hanc, Quid est homo, & ob quas causas nasci-
 tur, & reliqua diligenter. Atqui mihi necessarium esse vide-
 tur, ut omnis Medicus de natura sciat, & omni studio annita-
 tur ut cognoscat, si modo aliquid eorum quæ fieri debent re-
 cte præstare velit, Quid est homo ad ea quæ comeduntur ac
Quid sit ho- bibuntur comparatus, & quid cuique ab vnoquoque contin-
mo & quo- get & accidet, & non simpliciter sic existimare, quod malum
modo gi- edulium est caseus. Dolorem enim affert repleto ex ipso. Sed
gnatur sci- quem dolorem, & propter quid, & cui parti intra hominem
at medicus. existenti incommodum existit. Nam & alia multa edulia ac F
Caseus esu- pocula natura mala sunt, & afficiunt hominem non eodẽ mo-
malus. do. Proferatur autem mihi verbi causa aliquid, velut Vinum
Temetõbo- meracum multum potum hominem aliquo modo debilem red-
nũ non est. dit, & omnes qui viderint hoc fatentur & cognoscunt, quod
 hæc est vis vini, & quod ipsum est causa, & in quas in homi-
 ne partes maxime possit nouimus. Talem itaque veritatem
Caseus ma- etiam de aliis ostendere volo. Etenim caseus (quãdoquidem
lus est. hunc in exemplum adsumpsi) non omnes homines lædit, sed
 sunt qui ex ipso repleti, ne tantillum quidem offenduntur,
 immo gracilibus mirabiliter etiam conferre proditur. Sunt
 autem qui difficulter summoventes ipsum ab eo liberantur.
 Horum verò naturæ differunt, differuntque etiam iuxta hoc
 quod est in corpore caseo còtrarium. Nam à caseo excitatur
& com-

A & cōmouetur, in his quibus eiusmodi humor multus in corpore existit, & quo magis hic potens est, eo magis verisimile est ipsos male affligi. Si vero toti humanæ naturæ malus esset, omnes vtiq̃ læderet. Hæc autem si quis nouisset, nō incurreret ea neque sanè pateretur. In refectionibus conualeſcētium ex morbis, insup̃erque in longis ægreditudinibus, multæ conturbationes & præuaricationes fiunt, partim sua sponte, partim à quibuscumque temere admissis. Noui autem medicos multos velut idiotas, qui vbi illi die aliqua noui quippiam fecissent, velut si lauissent, aut deambulaissent, aut quid alienum comedissent, atq; hæc omnia melius esset adhibuisse quàm non, nihilominus tamen causam ignorantes, & fortassis id quod commodissimum erat damnantes. Quod ipsum certe facere nō oportet, sed scire quid balneum intempestiue adhibitum operetur, quid item fatigatio & lassitudo. Nūquam enim eadem afflictio ab his provenit, neque etiam ex repletione, neque ex cibo tali vel tali. Quisquis igitur hæc non cognoscet quomodo singula se habeant ad hominem comparata, is neque cognoscere quæ ab ipsis fiūt potest, neque recte vti. Cæterum & hæc cognoscere oportere mihi videtur, nimirū quæ affectiones homini ex facultatibus ac potentiis, quæ item ex figuris adueniunt. Quod autem dico tale est. Nempe facultatem quidem esse, humorum summas vires ac robur nosse. Figuras autem dico quæ in ipso homine insunt, Aliæ enim casuæ sunt, & ex amplitudine in arctum coactæ, aliæ expansæ, aliæ solidæ & rotundæ, aliæ latæ & peniles, aliæ extentæ, aliæ longæ, aliæ densæ, aliæ raræ & hiantes, aliæ spōgiformes ac molles. Quæ igitur ex his trahere ad sese allicereque humiditatem ex reliquo corpore maxime possunt? Num cauæ & expansæ, an solidæ & rotundæ, aut cauæ & in arctum ex amplitudine coactæ? Equidem puto tales esse, quæ ex cauitate & amplitudine in arctum sunt coactæ, Id quod ex manifestis forinsecus condiscere oportet, partim quidem quod ore hians nihil sanè humoris attraxeris, vbi vero labra foras produxeris, contraxerisq; ac compresseris, insup̃erque fistulam admoueris, facile sanè attraxeris quicquid volueris. partim vero quod cucurbitæ quæ corpori adponi solent, ex amplitudine in angustia arctatæ ad hoc factæ sunt, ad trahendum vi-

Medico
quid pro
spiciendū.

παθήματα.
τα.
δυνάμεις
χέματα.
χυμός.
Figure
schematiza-
ue.

Patētia nō
sorbent.

Cucurbitu
læ forma
cur talis.

HIPPOCRATIS LIBER

*Caput, uesi-
ca, & uer-
tus.*
D
 dum uidelicet & alliciendum ex carne. Sūt autē & alia mul-
 ta eiusmodi. Verum intra hominem natura & figura talia,
 sunt vesica, & caput, & uterus in mulieribus : atque hęc ma-
 nifeste maxime trahunt, & semper plena sunt attractę humi-
 ditatis. At uero caue & expasse figurę, influentē quidem hu-
 morem maximē omnium susceperint, nō autem similiter at-
 traxerint. Solide autem & rotundę, neque attraxerint, neque
*Lie, pul-
mo, mamma-
mæ.*
E
 susceperint : dilabitur enim & non habet sedem, in qua ma-
 neat. Spongiformes uero & molles, uelut lien, pulmo, & mam-
 mę, ubi admotę maxime fuerint & adhæserint, ebibunt, du-
 raque fiunt ac augefcunt humore accedente, maxime pulmo.
 Non enim in uentriculo inest, in quo humorem extrinsecus
 contineat ipse uentriculus in quo est humor, ut quotidie ex-
 hauriatur, sed quum biberit & susceperit ipse in seipsum hu-
 morem, & uacua & rara ac parua penitus explentur, & pro ra-
 ro ac molli, durus ac densus euadit, & neque concoquit, ne-
 que dimittit. Atque hęc patitur propter figurę naturā. Quę-
 cunque autem flatus & reuolutiones operantur in corpore,
 ea in cauis ac amplis, ueluti uentre ac pectore, strepitum ac
 sonitum facere solēt. Etenim quod non sic repleant ut stent,
 sed habēt transmutationes & motus, necesse est ut ab ipsis &
 strepitus & manifestę commotiones fiant. Quęcunque ue-
 ro carnosę sunt & mollia, in talibus torpores & excrefcen-
 tia, uelut in trucidatis fiunt. Ceterum quum inciderit flatus
 in latum ac renitens, & aliquid ipsi restiterit, idque natura
 fuerit neque forte, ut aduersus uolentiam durare possit, &
 nihil mali pati: neque molle & rarum, ut excipere ac cedere
*Hepar.
Flat⁹ quid
agat.
Dolor uni-
de.*
F
 queat : uerum tenerum & floridum & sanguineum ac den-
 sum, uelut hepar, quod propter densitatem quidem ac latitu-
 dinem resistit ac non cedit, flatus uero subiēs augefcit ac for-
 tior euadit, & aduersum reluctans maxime impetū facit. pro-
 pter teneritudinem autem & sanguineitatem, absque dolo-
 ribus esse non potest, & propter has causas, dolores acutissi-
 mi ac frequentissimi circa eum locum contingunt, suppura-
 tionēque ac tubercula plurima. Fiunt etiā circa septum
 transuersum fortiter, sed multominus. Distentio enim septi
 transuersi lata est & renitens, natura autem neruosa & ro-
 busfior, quapropter minus dolore affligitur. fiunt tamen &
 dolores & tubercula circa ipsum. Multę uero etiā alię & ex-
tra &

A tra & intra corpus figurarū species sunt, quæ magnopere inter se differunt, quod ad affectiones pertinet, tū ægroto, tum sano. velut capita parua aut magna, colla tenuia aut crassa, lōga aut breuia, ventres longi aut rotūdi, pectoris & costarum latitudines aut angustie, & alia infinita, quæ omnia nosse oportet quatenus differant, quo causas singulorum cognitas probè obserues. De potentiis autē humorum perspectum habere oportet, quid singuli ipsorum in homine facere possint quemadmodum etiam prius dictum est, quomodo cognationes inter se habeant. Quod dico tale est, An videlicet dulcis humor in aliam speciem mutetur, non à contemperamento, sed ipse desciscens & immutatus ab eo, qualis primum fuerat, amarus aut falsus, aut acerbus, aut acidus. Sit sanè acidus. Ergo acidus humor reliquos præcellens, maxime incommodus fuerit: si utiq; dulcis, omnium cōmodissimus existit. Id quod si quis forinsecus querēs consequi possit, is semper quod melius est ex omnibus eligere queat. Optimum autem est, quod longissime ab incommodo abest.


Capitis & colli differentia.

Succorū sapientie consideratione.

HIPPOCRATIS COI LIBER DE MEDICO, IANO

Cornario medico physico interprete.

C



HIC liber Medici gubernatio est, & præceptum quomodo officinam medicam instruere oportet. Medici equidem gubernationem esse putamus, vt videat quo bono colore, & bona, ac carnosā corporis habitudine præditus sit, iuxta existentem in ipso naturā. Vulgus enim existimat eos qui non sic bene dispositum corpus habent, neque aliis bene prospicere posse. Deinde vt opinionem capter apud ipsum vulgus vestitu decoro, & vnguētis odoratis, non suspectum odorem ad omnia habentibus. Inde enim

Medicus qualis esse debeat.

HIPPOCRATIS LIBER

enim ægrotos iucunde affici contingit. Postea animaduer- D
 tere ipsum oportet ut animum habeat modestum, non solum
 quod ad taciturnitatem attinet, sed etiam circa reliquam vi-
 tam probe compositum. Maxime enim ad opinionem ac au-
 toritatem comparandam conducit, bonis ac honestis mori-
 bus præditum esse. Nam quum talis fuerit, omnibus veneran-
 dus ac humanus iudicabitur. Promptitudo enim temeraria,
 & facilitas contemnentur, etiam si valde commoda existant.
 Scopus autem præfigere oportet potestatem facultatū sua-
 rum. Nam eadem ab iisdem non abundantibus boni consu-
 luntur. Figuram faciei habeat meditabundam ac subtristem,
 non tamen amarulente. Cōtumax enim esse videbitur & ho-
 mines odio habens. Qui vero in risum exolutus est, ac nimium E
 hilaris, onerosus iudicatur. Hoc itaque vitandum est vel ma-
 xime. Iustum autem ad omnem conuersationem esse conue-
 nit. Iustitia enim multum auxiliatur. Non exigua autē com-
 mercia ægris cum medico sunt. Nam seipso medicis subdi-
 tos faciunt, & omni hora vxoribus, virginibus, & opibus ma-
 ximi precij, illi occurrunt. continenter igitur ad omnia hæc
 se habere oportet animo itaque ac corpore sic dispositum es-
 se conuenit. Porro præcepta ad artem medicam, per quæ ar-
 tificiosus esse videbitur, ab initio cōsiderabimus ex quo pri-
 mum homo discere incipit. Quæ igitur in officina medica
 curantur, ferè ad discentes pertinet. Primum quidem locum
 domus habere oportet, qui sanè talis sit, ut neque ventus ad
 ipsum accedens molestus sit, neque sol, neque splendor infe-
 stet. Lux enim splendida medentibus quidem non est mole- F
 sta, non similiter autem ægrotantibus. Itaque talem splendo-
 rem penitus fugere oportet, per quem oculos ægrotare con-
 tingit. Tale igitur præceptum de luce obseruetur. Deinde ut
 nequaquam faciem aduersam splendori habeat. Infestat enim
 visum debilem, omnis autem occasio sufficiens est ad debiles
 oculos conturbandos. Luce itaque hoc modo vtendum est.
 Sellæ autē æquales altitudine sint quantū eius fieri potest, ut
 in ipsis ægri collocentur. Aeramento exceptis instrumentis,
 nullo vtatur. Ornatus enim onerosus mihi esse videtur, tali-
 bus vasis vti. Aqua exhibenda est ægris potabilis & pura. Ex-
 terforiis vtendum est puris ac mollibus, ad oculos quidem,
 linteis, ad vulnera vero, spongiis. hæc enim per se probe au-
 xiliari

*Quo gestu
adeundus
est æger.*

*Qualis de-
beat esse
medicus.*

*Quid pri-
mum obser-
uet medi-
cus.*

*Luminis ra-
tio.*

*Luxum do-
mesticum
prohibet.
Linteola.*

- A** xiliari videtur. Omnia autem rite fabrefacta ad vsum esse oportet, magnitudine, grauitate, ac tenuitate. Quæ vero offeruntur omnia considerare oportet vt conferant, maxime si ægrotæ parti adhibebuntur. Talia autem sunt, ligamenta & medicamenta, & lintea circa vulnus, & cataplasmata. hæc enim longissimo tempore circa ægrotantes locos sunt. At vero ablatio horum, refrigeratioque ac mundificatio & aquarum affusio, pauco tempore absoluuntur. Diligenter autem considerare quid horum faciendum sit oportet, & vbi magis aut minus ea adhibere conuenit. Vtrorūque enim vsus opportunus, itēque negligentia, magnam differētiā habet. Est autē propria & genuina medicinæ deligatio, ex qua æger opem sentit. Maxime autem profunt duo hæc, quibus vtendum est, comprimere videlicet vbi oportet, & remissè deligare. Iuxta horæ vero tempus, quando integere oporteat & nō, videndum est, vt neque debili, neque fortiore alterutro horum vtaris. Concinnas autem deligaciones ad spectaculum comparatas, & nihil iuuantes, reprobare oportet. Onerosæ enim sunt & omnino petulantes, sæpe vero etiam damnum dederūt. Quærit autem æger nō ornatum, sed auxilium. Ceterum in chirurgiis quæ per sectionē aut vitionem fiunt, velocitas ac tarditas æqualem laudem merentur. Est enim vtriusque vsus. Nam in quibus per vnicam sectionem chirurgia absoluitur, velocem dissectionem facere oportet. quum enim contingat eos qui secantur dolere, id quod dolorem attert, quāminimo tempore adesse conuenit, quod ipsū continget veloci sectione facta. Vbi vero multas sectiones fieri necesse est, tarda chirurgia vtendum est. Velox enim continuum & multum dolorem inducit. Tardus vero & intermit-tens, requiem aliquam his qui curantur exhibet. Idem de instrumentis quoque dici potest. Gladiolis enim acutis ac latis vti, non in omnibus similiter præcipimus. Nam partes quædam sunt corporis, quæ celerem sanguinis fluxum habent, & non facile est eum sistere, Tales autem sunt varices, & quædam aliæ venæ. Itaque in talibus angustas sectiones facere oportet, neq; enim possibile est vt fluxus in his sistatur. Conducit autem aliquando à talibus sanguinis detractionem facere. At vero ad locos non periculosos, & circa quos non tenuis est sanguis, latioribus gladiolis vtendum est: sic enim
- B**
- C**

*Instrumen-
ta.*

*Quæ uul-
nera possi-
cant.*

*Deligatio
Duo quæ
his pro-
sunt.*

*Sectio,
vstioq;*

*Celeritas
& tardis-
tas ubi ad-
hibenda est*

*Missio san-
guinis ubi
& quādo
facienda.*

c sanguis

HIPPOCRATIS LIBER

*Cucurbitu-
læ modus.* sanguis prodierit, aliter nequaquam. valde autem turpe est **D**
 non contingere à chirurgia quod velis. Cucurbitarum por-
 rò duo modi commodi existunt. Quando enim fluxus pro-
 cul ab apparente carne compactus fuerit, circulum ipsius bre-
 uem esse oportet, ipsamq; non ventrosam, sed prolixam par-
 te ad manum vergente, non grauem. Quæ enim talis est, in
 directum trahet, & serosos humores separatos ac distantes
 probe ad carnem adtrahet. Maiore autem dolore per car-
 nem disperso, in reliquis quidem consimilem cucurbitam es-
 se oportet, sed circulum magnum. Sic enim ex plurimis parti-
 bus id quod dolorem facit educere comperies, ad locum con-
 uenientem. Neque enim magnum esse circulum putant, si
 non ex pluribus locis caro comprehendatur ac contrahatur. **E**
 At si grauis sit, ad supernos locos repit, inferne autem magis
 detractionem facit, vt sæpe morbi relinquuntur. Lati itaque
 circuli, vnà cum incumbentibus fluxionibus, & longe distanti-
 bus à supernis locis, multa simul adtrahunt de alia carne. Con-
 tingit igitur humiditatem inde detractam, apponi collecto
 inferne sub cucurbita seroso humori, & quæ quidē infestant,
 relinqui: quæ vero nihil molestant, detrahi. Magnitudinem
*Cum locus
cucurbitu-
læ admo-
tæ aperis-
tur quid
ag-is.* porrò cucurbitæ quæ commoda sit, iuxta corporis partes qui-
 bus ad mouere oportuerit, coniectare oportet. Vbi vero sca-
 rificationem subter cucurbitam adhibere velis, sanguinem
 scarificandorum locorum conspicuum esse oportet, aliàs ne-
 que circulū adtractum scarificare ac pertūdere oportet. De-
 bilior enim est caro loci dolore affecti. Scalpris autem in-
 curuis, in summo non valde angustis vtendum est. Aliquan-
 do enim serosi ac saniosi humores viscosi ac crassi veniunt:
 periculum igitur est ne in fissuris subsint, vbi arctæ fuerint
 incussæ. Porrò venas in brachiis, funiculorum apprehensio-
 nibus constringere oportet. Caro enim contegens in multis
*Captatio
uenarum
brachii.* non probæ coaptata est venæ, vbi enim lubrica fuerit caro,
 non contingit sectiones vtrorumq; iuxta se ipsas fieri. Nam
 venam contactam insufflari contingit, & sanguinis fluxum
 impediri. multis vero etiā propter hoc pus cōgregatur. Qua-
 propter duo nocumenta talis chirurgia inducit, secto qui-
 dem dolorem, secanti vero multam ignominiam. Idem in o-
 mnibus venis fieri præceptum est. Hæc quidem igitur neces-
 saria sunt in officina medica instrumenta, & circa quorum
 vsu

- A vñm artificiosum esse oportet addiscentem. Volsellis autem
tum dentium, tum vuarum, quilibet vti potest. simplex enim
vñs ipsorum esse videtur. Ceterum de tuberculis & vlceri-
bus quę maiorum morborum sunt, amplius videndũ est. Tu-
bercula equidem deprehendere & dissoluere posse, maxime
artificiosum habetur, itemque collectiones ipsorum impedi-
re. Consequens est, ea in conspiciuum & quam breuissimum
locum contrahere, & compagem ipsam æqualem per totum
tuberculum facere: vbi enim inæqualiter se habuerit, pericu-
lum est vt rumpatur, & vlcus ægre curabile reddatur. exæqua-
re itaq; oportet, similiterq; totũ maturũ facere, & neq; prius
diducere, neq; sinere vt sponte rumpatur. Quę vero maturũ
facere æqualiter possint, in aliis libris relata sunt. At vero vl-
cera quatuor vias habere videtur. Vnã in profundũ, hæc aut
sunt fistulosa, & quę sanie plena sunt, ac intus excauata. Alte-
ram in altum, quę videlicet carne superexcrescunt. Tertia via
est in latitudinẽ, atque hæc sunt quę appellantur serpiginosa
Quarta via est quę sola secundum naturam motus esse vide-
tur. Carnis itaque calamitates hæc sunt, omnes autem commu-
nem rationem habent ad hoc quod ipsis conducit: & signa
quidem horum in aliis relata sunt, itemq; qua vtendum sit cu
ratione, per quę autem concretum dissoluatur, similiterque
id quod carne excrecente repletũ, aut cauum factum est, aut
quod in latitudinem iter fecit, de his omnibus in aliis scri-
ptis nostris abunde dictum est. Amplius vero de Cataplas-
matis sic res habet. Linteorum quę imponuntur ac induntur
alicubi in morbo, vñs exactus esse videtur, & est sanẽ vlce-
ri conueniens linteolorum impositio. Verum cataplasmate
per ambitum vlceris vtaris. Nam hic vñs cataplasmatũ & ar-
tificiosus est, & multum prodesse potest. Videtur enim vlceri
opitulari vis eorum quę circumponantur. Linteum autem cõ-
terendum est ac emolliendum. Verum partibus extra vulnus
circumsitis cataplasma prodest. Talem igitur ipsorum vñm
esse oportet. Porro de temporum occasionibus, quando sin-
gulis horum vtendum est, & quomodo præscriptorum vires
condiscere oporteat, in præsens relictum est. Talia enim lon-
ge præstantissima in studio Medicinę sunt, & procul in arte
iam progressi existunt. His consequens est chirurgia vulne-
rum in militia acceptorum, circa extractionẽ telorum. Nam

*Volsellæ.**Vlcerum
quatuor
viæ.**Vlcerum,
vulnorum
ac mutila
curatio**Quę præ-
termittat
perpende;**Militariũ
vulnorum
curatio.*

HIPPOCRATIS LIBER

in vrbans cōuerſationibus modicus horum vſus exiſtit. Ra- D
ro enim per omne tempus ciuiles ac hoſtiles expeditiones
ſiunt. huiuſmodi autem ſæpe ac frequentiffime circa exter-
nas militias fieri ſolēt. Qui igitur hac chirurgia vti volet, eū
militare oportet, & externos exercitus ſequi. Sic enim exer-
citatus fieri poterit ad eiufmodi vſum ac neceſſitatē. Quod
vero circa hæc artiſcioſiſſimum eſſe mihi videtur, refere-
tur. Etenim ſigna exquirere ac inuenire telorum in corpore
exiſtentium, maxima artis & chirurgiæ huc pertinentis pars
exiſtit. Vbi enim hoc cognitum fuerit, non relinqui poteſt
vulneratus ex ignorantia neglectus, quum non conuenien-
ter tractetur. Solus autem iſ qui ſignorum expertus eſt hanc
chirurgiam rite aggredietur. Verum de hiſ omnibus in aliis E
ſcriptum habetur.


*Signa in
hæretium
telorum.*

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE DECENTI

*ornatu, Iano Cornario me-
dico phyſico in-
terprete.*

*Disciplina
nulla pro-
batur, niſi
quæ ad ui-
tam huma-
nam facit.*



ON ſine ratione faciunt, qui ſa- F
piētiam ad multa vtilem eſſe præ-
tendunt, eam videlicet quæ inter
homines exiſtit. Multæ enim ad ſu-
perfluam curioſitatem factę appa-
rent, dico autem eas quæ de nulla
re vtili diſſerunt. Aſſumi autē vti-
que poſſunt etiam harum partes
ad illas, vel propterea quod neque
ocioſitas eſt, neq; malicia. Ocium
enim & ignauia maliciam quærun-
t, & ad eam diſtrahuntur, vigi-
lantia vero & mens ad aliquid intentata, trahunt ad ſe
quid eorum quæ ad vitę honeſtatem pertinent, etiam ex diſ-
putationibus nihil vtile tractantibus. Gratioſior eſt enim ſa-
pientia,

A pientia, & ab aliis quibusdam in artem constituta, artem videlicet ad parandum honestum ornatum ac opinionem. *Artes quæ probandæ* Omnes enim non cum turpi lucro & turpitudine consistunt. Et illis methodus quædam est artificialis quæ operatur: quod si non innocenter fiat, raptores sunt. adolescentes enim in ipsos incidunt, verum in vigore constituti, propter verecundiam, videntes ipsos idiotas ducunt, Senes vero propter amarulentiam, legislationem in ipsos constituunt, ex ciuitatibus videlicet expulsionem. Hi enim sunt qui fora frequentant, ruditate ac incitia sua imponentes, & in circulis ciuitatum versantes. Cognouerit autem quis ex vestitu & aliis lineamentis. Quamuis enim fuerint splendide ornati multo magis fugiendi sunt, & à conspicientibus odio habendi. Qui vero contrario modo se gerunt, frugi homines iudicandi sunt, quibus non est excogitatus apparatus, neque superflua curiositas. Ex vestitu enim cognoscēs, & decenti in ipso ornatu ac frugalitate, nō ad superfluitatem parato, sed magis ad bonam opinionem, & meditationem, animumque intra se compositum, & ad perfectionem. Imò quocunque vestitu ac ornatu, tales sunt minime diffuentes, non curiosi, amarulenti ad occursum & obuiam itiones, appositi ad responsiones, graues aduersus resistentes, ad sui similes solertes, & familiares, ac affabiles, temperati ad omnes, ad seditiones taciturni, ad tacendum animo obfirmato & continētes. ad tempus appositi, & ad occasionem arripiendam accommodati, ad victum frugales &

C contenti, patietes ad temporis expectationem, ad sermones expediti, omne demonstratum proferentes, suauiloquentia vtentes, gratiis affecti, & gloria horum omnium corroborati ac fortificati, ad veritatem ac demonstrationem audentes ac confisi. Principalissimum quidē igitur horum omnium prædictorum est Natura. Nam si hæc affuerit his qui artibus animum applicant, per omnia prædicta penetrare poterunt. Incognita enim vtilitas, tum in sapientia, tum in arte adhibita, ad principium capiendum edoceri potest. Natura autem defluit & confunditur cum sapientia, ad cognoscendum ea quæ ab ipsa natura facta sunt. Etenim in vtrisque sermonibus multi conuicti, nullatenus vtrisque rebus vsi sunt ad demonstrationem, postquam igitur quispiam ipsorum expenderit ad veritatem ea quæ retulimus, nullatenus naturæ

*Dux naturæ
et in cunctis
est.*

HIPPOCRATIS LIBER

bona ipsis procedent. Comperiuntur itaque hi non confimi
 li cum illis via progressi, quapropter denudati, omnem in-
 duunt maliciam ac ignominiam. honestus est enim ex opere
 quod quis edoctus est sermo. Quicquid enim artificiose fa-
 ctum est, ex ratione prolatum est ac productum. Quicquid autem
 artificiose dictum est, non autem factum, methodi inartificia-
 lis demonstrativum existit, Nam putare quidem non autem
 facere, ignorantie & inartificialitatis signum est. Opinio enim
 maxime in Medicina in crimen vertitur eam adhibentibus:
 his vero qui ea in se usi sunt, perniciem affert. Etenim si sibi-
 ipsis in sermonibus persuaserint, & opus ex disciplina se sci-
 re putauerint, quemadmodum aurum adulterinum in igne
 iudicatum, tales se ipsos esse demonstrant. quanquam talis
 prae dictio nihil commouet ad prudentiam eos qui sunt eius-
 dem generis. quod autem rectus sit finis, cognitio manifestum
 facit. Tempus porro etiam artem facilem ac peruiam facit,
 aut in consimilem viam incidentibus processus manifestos fa-
 cit. Quapropter singula praedicta suscipere oportet, & sapien-
 tiam transferre ad medicinam, & medicinam ad sapientiam.
 Medicus enim philosophus, est deo aequalis, Neque enim mul-
 ta est inter ipsas differentia. Nam omnia quae ad sapientiam
 requiruntur, insunt in medicina: argenti contemptus, reue-
 rentia, verecundia, habitus submissus, autoritas, iudicium,
 quies, obuiam itio, mundicia, doctrina, cognitio ad vitam uti-
 lium ac necessariorum purificationum, alienitas a mercimoniis,
 alienitas a superstitione, praeminentia diuina. Habent enim
 quaecumque; habent ad coercendam intemperantiam, incontinentiam,
 avaritiam, concupiscentiam, rapinasque; ac impudentiam. Haec
 enim est cognitio accedentium, & usus eorum quae ad amicitiam
 pertinent, & quomodo ad liberos, ac quascumque; res se gerere
 oporteat quatenus igitur cum hac societatem habet, sapientia
 quaedam est. Nam & plurima ex his etiam medicus habet. Etenim
 scientia de diis vel maxime animo ipsius implexa est. Etenim
 in aliis affectionibus, & in symptomatis accidentibus, Medi-
 cina erga deos valde reuerenter se habere comperitur. Medici
 vero deis concedunt. Non enim est potentia in ipsa redun-
 dans. Nam & hi multa quidem aggrediuntur, multa vero etiam
 per se ipsa ipsis superantur. Quae vero nunc possidet Medici-
 na, hinc exhibebit. Quae enim via ipsius sit in sapientia, ha-
 bitus

Quid ars

*Persuasio
in his peri-
culosa.*

*Cognitio
vera quid
faciat.*

*Medicus
philoso-
phus est
deo aequa-
lis.*

*Sapientia
qualis.*

*Medicus
deos potius
seu colit.*

- A** tenus dictum est. Nam & illis ipsis hoc modo se res habet. *Medicinæ*
 Quæ vero putant, & confitentur ac profitentur, sic habent. *uiæ par-*
 Quæ circa corpora adsunt & adueniunt, quæ sanè per om- *tésue.*
 nem ipsam artem procedunt, dū illa transformātur aut trās-
 mutantur. Quæ item per chirurgiam sanant. Et quæ auxiliis
 & medetis aut victu curantur. Summa vero horum omnium
 tendat ad horum cognitionem. Quū igitur relata omnia tali
 modo se habeant, conuenit vt Medicus comitatem quandā
 sibi adiunctā habeat. Austeritas enim & sanis, & ægris, diffi-
 cilem accessum præbet. Maxime vero adseruare ipsum seip- *Medico*
 sum conuenit, vt ne multas corporis partes ostēdat, neque cū *quid obser-*
 imperitis multa fabuletur, sed necessaria. Hoc enim violen- *uandum.*
 tia esse cōsuevit, ad curationis prouocationem. Facere autē
B nihil horū debet valde curiose, neque ex imaginatione. Hęc
 vero omnia cōsiderato, quo tibi præparata sint ad abundan-
 tiam, prout opus fuerit. Sin minus, instante necessitate sem-
 per penuria fuerit. Procurare autem oportet hæc in medici-
 na, cum omni submissione: de frictione, & illitione, & perfu-
 sione, ad manū cōcinnitatem: de linamentis vulsis, de sple- *Quæ pos-*
 niis, de ligamentis, de his quæ pro temporis cōstitutione re- *tissimum*
 quirūtur, de medicamentis ad vulnera, & ocularia, & ex his *curet.*
 ea quæ ad singula genera pertinent: quo tibi præparata sint *Instrumen-*
 & instrumenta, & machinæ, & cōsequenter ferrum. Nā in his *ta medico*
 penuria detrimetosa est, & artem mancā facit. Sit autem ti- *in prōptu*
 bi alter apparatus simpliciter ad peregrinationes instruat⁹, *esse des-*
C ad manus prōptus. Expeditissimus autē per methodi ratio- *bent.*
 nem. Neq; enim fieri potest vt medicus omnia percurrat. Fir-
 ma item memoria teneto medicamēta, & simplices faculta-
 tes, & descriptas, si modo tales extāt. Sint & in memoria tibi
 morborum curationes, & harū modi, quotupliciter & quo-
 modo in singulis se habēt. Hoc enim principium est in Me-
 dicina, & medium, & finis. Præparata quoq; tibi sint malag-
 matū genera ad singulos vsus. Portiones quæ incidere pos- *Portiones*
 sunt, ex descriptione preparatæ iuxta genera. In prōptu sint *in prōptu*
 & quæ ad medicationem pertinent ad purgationes, sumpta *habendæ.*
 de locis congruis, & parata eo quo cōuenit modo, iuxta ge-
 nera, & magnitudines, ad vetustatem ferendam curata. Re-
 centia vero iuxta temporis occasionem: & alia iuxta ratio-
 nem. His autem tibi præparatis hoc commodi erit, vt vbi ad

HIPP. DE DECENTI ORNATV.

*Quid præ-
cogitādū.* ægrotum introieris, animo incertus non sis, quā appositè ha-
beas singula ad id quod faciendum est. Antea vero hoc co-
gnitum habeas quod facere oportet, q̄ ad ægrum ingredia-
ris. Pleraque enim neq; ratiocinatione, sed auxilio rerū op^a
habent. Itaque euentum ex experientia prius discernere o-
portet. Est enim hoc gloriosum, & facile cognosci potest. In
ingressu vero meminisse cōuenit & sessionis, & habitus sub-

*Quæ præ-
stare de-
beat me-
dicus.*

*Medicus
ægros cre-
bro inui-
serit de-
bet.*

*Culpa æ-
grotantiū
medicis
sepe ascri-
bi solet.
Habitat-
iones lā-
guentium
pro uarie-
tate mor-
borū eli-
gendæ
sunt.*

missi, amictus cōpositi, auctoritatis, breuiloquentiæ, ut nihil
cum perturbatione facias, assensus, diligentia, responsionis ad
ea quæ occurrunt, & ad tumultus fientes cōpescendos con-
stantiæ apud teipsum, increpationis ad turbas castigandas,
prōptitudinis ad ministeria. Et ad hæc memor sis primi ap-
paratus. Sin minus, reliqua citra errorem fiant, quæ ad prō-
ptitudinem parandam præcipiuntur. Ingressu vt re frequē-
ter. visita diligentius, his quæ à deceptis per errorem fiunt
occurrens, ut mutantur. Facilius enim cognosces, simulq;
expeditior eris. Instabilia enim sunt quæ in humidis cōsistunt.
Quapropter etiā facile & à natura, & à fortuna transmutan-
tur. Neglecta enī ea quæ circa temporis occasionem admini-
strare oportebat, impetu suo progressa occupant ac peri-
mūt. Nō enim est quod opem ferat. Multa enim sunt quæ si-
mul mali aliquid faciunt. Nā quod singulatim iuxta conse-
quentiā fit, magis opportunum & frequentius est. Obseruare
autem oportet ægrotorum quoque peccata, per quæ multi
sepe mentiti sunt, in assumendis his quæ ingerenda exhibē-
tur, postquā exosas potiones nō accipientes, aut pharmacis
datis, aut alia curatione adhibita, perempti sunt. Et factum
quidem hoc nō ad ipsorum cōfessionem vertitur, verū Me-
dico culpa imputatur. Cōsiderare vero oportet etiā decubi-
tus, quosdā ex ipsis iuxta anni tempus, quosdā iuxta genera.
Quidā enim in altis sedibus, quidā in subterraneis ac tene-
brosis decubunt. Strepitus quoque & odores, maxime vini,
deterior enim hic est: fugere ac transmutare oportet. Et om-
nia hæc facere placide, expedite, cum ministerio, ita ut ple-
raque egroto occultes, & hilari ac sereno vultu ipsum cōso-
leris: quo à suis illum cupiditatib; auertas, simul cum amaru-
lencia & cōtraria instantia increpando, simulq; cum cōmo-
nestatione ac dexteritate suscipiendo ac cōsolando, nō ta-
men ut quicquam futurorum aut præsentium ipsis indices.
Plerique

A Plerique enim ob hanc causam, in vtranlibet partem cōpul-
fi sunt, propter relatum videlicet prēdictionem prēsentiū
aut futurorū. Sit autem ex discipulis aliquis prēsens, qui in-
stet vt prēceptis nō amarulentē vtatur, & quod mandatū est
faciat. Deligito autem ex ipsis eos qui iā in arte progressum
fecerunt, quo ea quę vtilia sunt addant, aut secure offerant,
vt & in interuallis nihil te lateat. At vero imperitis nunquā
quicquam procurandum cōmittes. Sin minus, eius quod ma-
le factum est, vituperium in te recidet, si nō ambigue res ha-
beat. ex quibus id quod recta methodo tractatum est, proce-
det, & vituperationem tibi nō afferet. Sed & quod factū fue-
rit, ad genus referetur. Proinde omnia hęc pradicito in his
quę sunt, his quibus ea cognouisse propositum est. His igitur
ita habentib⁹, ad bonā existimationem ac decentem orna-
tum, & in sapientia, & in medicina, & in aliis artib⁹: oportet
medicum distinctis partib. de quibus diximus, semper v-
trisque amictum, ea cōseruare ac custodire, & tradere ac fa-
cere. Quum enim apud omnes homines incluta sint, cōser-
uantur. Et qui per ipsa procedunt, celebres sunt à parentib⁹
& liberis. Et si quidam ipsorum non multa cognitione prę-
diti sint, ab ipsis tamen rebus ad intelligentiam deueniunt.


Quales mī
nistri æ-
grotis dñi
di sint.

HIPPOCRATIS COI

PRAECEPTIONES, IANO

Cornario medico physico

interprete.



Tempus est in quo occasio est, Oc-
casio vero in qua tempus nō mul-
tum. Medela tempore, aliquando
etiam occasione contingit. Hęc sa-
nē nosse oportet, & nō ratiocina-
tioni prius probabili intentum cu-
ram aggredi, sed exercitationi cū
ratione. Ratiocinatio enī memo-
ria quardā est, quę cōponit ea quę
per sensum sunt percepta. Imagi-
natione

Tempus
quid. Oc-
casio.

Ratiocina-
tio.

HIPPOCRATIS

natione enim concepta est euidenter. Sensus autem perpeffus iam delegator est eorum quæ subiacent ac obueniunt, ad ipsam cogitationem. Qui vero sensus sæpe mala perpeffus est, & suscepit, quibus, quando, qualiter, læsus sit obseruans, & in seipsum reponens recordatur. Collaudo quidem igitur etiã ratiocinationem, si quidem ex fortuita occasione initium faciat, & delationem in morbum ex apparentibus persequatur. Si enim ex his quæ palam perficiuntur, ratiocinatio initium fecerit, in mentis potentia esse cõperitur, ita ut ipsa ab aliis singula assumat. Proinde statuendum est, naturã à multis ac omnigenis rebus moueri ac doceri, ita ut violentia quædam subfit. Mens autem ubi ab ipsa accepit, velut dixi, postea ad veritatem perducit. Si vero nõ ex euidenti aggressione, verum ex probabili rationis figmento, sæpe grauem & molestantam inuehit affectionem. Tales autem inuiam viam arripiunt. Quid enim tandem erat mali, si mercedem auferret hi qui medicine opera male administrat? Nunc vero ægrotis qui extra culpã sunt, nõ sufficiens esse apparet violentia morbi, nisi Medici quoque imperitia accedat. Et de his quidẽ hæc dicta satis sint. At his quæ ex sola ratione perficiuntur, frui nõ datur: verum his quæ ex operis indicatione. Fallax enim est & ad errorem procliuis affirmatio, quæ fit cum garrulitate. Quapropter in vniuersum his quæ fiunt inhærere oportet, & circa hæc vel maxime versari, si quis facilẽ ac minime delinquentem habitũ, quẽ sanẽ Medicinã appellamus, sibi comparare volet. Valde enim magnã vtilitatem afferet, tum ægrotantibus, tum horũ artificib. Nõ tamẽ cunctandũ est & ab idiotis inquirere, si quid cõferre visum fuerit ad curationis occasionẽ. Sic enĩ arbitror vniuersam artẽ cõmonstratã esse, eo quod ex vnoquoque sine obseruatio facta est, & cõsonantia in idem cõcurrerit. Attẽdere igitur oportet fortuitæ occasioni, quæ plerumque se offert, atque hoc cum vtilitate ac leni progressionẽ potius, quã cũ promissione, & excusatiõe ea quæ fit cũ actione. Vtilis est autẽ & varia prædestinatio eorũ quæ ægroto offeruntur. Nõ enim asseuerare oportet, quod aliquid solũ exhibitũ proderit. Omnes enĩ affectiones, propter multas casuum circumstantias ac mutationes, mora quadam diutiorẽ adhærent. Et hoc sanẽ admonitione opus habuerit, ad diligentem considerationem faciendam. Si enim à mercede inceperis:

*Qua via
medico
proceden-
dum sit.*

*Medicus
rudes etiã
sciscitari
debet
Quid pot-
tissimũ ob-
seruandũ.*

Merces

A inceperis: cōducit enim hoc vniuerso negotio: ægroto quidem huiusmodi cogitationē inducis, q̃ videlicet nō ipso relicto abibis. Si vero non pacisceris, q̃ ipsum negliges, & de quibusdam in rem præsentem nō admonebis. Curare igitur oportet de cōstituenda mercede. Inutile enim esse putamus eiusmodi ægroti ipsius cogitationē, multo aut̃ magis in morbo acuto. Morbi autem celeritas tēporis occasionem nō præbens ad reuersionem, nō impellit bonum Medicum ad querendū suā cōmoditatem, sed vt magis existimationis suæ rationem habeat. Itaq; tunc melius est vt seruatis exprobre, quàm vt letaliter affectos præcōturbet. Quāq̃ aliqui ægroti id experunt, hospitij ius, & faciem mali depulsionē produbcent, digni quidē qui negligantur, nō tamen qui affligantur. Quapropter his te merito oppones, cum bolidis iactu in maris turbati fluctibus iter facientib. Qui enim bonus Medicus est, is per Iouē fide magis q̃ duricia medetur. Quare in principio totā affectionem indagare oportet, & quādā suggerere conducentia ad curationem, curareq; ægro, & non negligere. At vero remunerationis exigendæ acerbicatem, abq; preparante ad disciplinā cupiditate, hortor vt ne valde inducas, sed & ad opulentiā & facultates respicias. Quādoq; vero etiā gratis cures, ita vt gratitudinis memoriā potiorē, q̃ præsentem existimationē auferas. Si vero occasio ferendæ opis se obtulerit, & peregrino, & egeno, maxime talibus opituleris. Si enim affuerit erga homines amor, adest etiā amor erga artem. Quidā enim ægrotantes vbi perceperunt affectionem circa se nō esse in tuto, per Medici probitatem ac mansuetudinem gloriantur sanitati restitutos se esse. Laudabile est autem, ægrorum quidem curā gerere, gratia sanitatis: sanorum vero curam suscipere, ea gratia vt sine morbis degant. Sed & sanorum cura habenda est, gratia boni ac decori ornatus. Qui igitur in profundo ignorantie artis versantur, prædicta minime perceperint. Nam hi quū sint non initiati, miserabilesq; ac subito exaltati: fortunę tamen indigi, à diuitibus quibusdam, ex angustiis remissionem acquirunt, semperq; ob opera gloriantes, & in deterius dilabentes deliciantur, artis sinceritatē negligētes, ob quā bonus Medicus, qui ab artis cōiunctiōe socius artis appellat̃, in vigore esse possit. Hic aut̃ medelas citra delictū facile pficiēs,

cōstituēda medico.

Gratis nō nunquā curandum.

Quid maius medicus agat.

nihil

HIPPOCRATIS

nihil horum transilierit, non præ facultatis inopia. Non enim infidus est velut in iniustitia. Nam ad curationē hi non accedunt, vbi affectionem perniciosam esse vident, vitantes aliorum medicorum superinductionem, laudantes ægrotos propter prauū auxilij odium. At ægotantes afflicti nant in vtraque improbitate, eo quod potiori in arte curationi seipsos non commiserunt ad finem vsque. Remissio enim morbi alicuius magnū ægroto refugium præbet. Quapropter sanam affectionem cupientes, eundem vsum semper admittere non volunt, medici varietati se assimilantes. Sumptuum equidem opulentia ægroti carent, morū improbitate adorantes, & ingrati fientes. Quum autem consequi possunt vt ditentur, de mercede asseueranter affirmant, sani esse volentes, quæstum nimirum ex vsura, aut agricultura affore producentes, & postea de ipsis quæstum facere negligentes. Et de huiusmodi quidē declaratione hæc sufficiat. Remissio enim & intensio ægotantis, medicam administrationem requirunt. Nec vero indecore se ille geret medicus, qui in rei præsentis angustia circa ægrum aliquē, & imperitia tenebras offundente, alios quoque accersere iusserit, quo ex communi consideratione, res circa ægrum inquirentur ac cognoscantur, & illi cooperatores fiant ad auxilij ferendi facultatem. Nam in afflictionis assiduitate, augeſcente affectione, ob consilij inopiam, plurima ad rem præsentem effugiunt. In eiusmodi igitur temporis occasione confidendū est. Nunquam enim ego tale quid decerno, quod ars ipsa iudicat. Et de hoc nunquam contendere oportet affirmando, ac mutuis inter se conuiciis decertando. Hoc enim iureiurando affirmare possim, quod Medici ratiocinatio nunquam alteri inuidere poterit. Imbecillis enim hoc modo apparuerit. Sed hæc magis expeditè faciunt hi qui circa forensia negotia ac quæstus versantur. Quanquam neque falsū hoc cognitum fertur, quod in omni copia, inopia inest. At vero cū his omnibus magnum signum substantiæ artis apparuerit, si quis recte medicans, ab eiusmodi compellatione non destiterit, iubens ægrotos mente non turbari, in eo quod ad salutis tempus peruenire gestiunt. Hoc enim non inutile esse ducimus, & hoc sanè præcapiens non peccabit. Ipsi enim ægroti propter dolorificam affectionē desperantes, seipsos vita exuūt.

Qui vero

*Languen-
tis cupidi-
tas,*

*Medici
plures cur
cōuocādi.*

*vt bene
speret hor-
tandus æ-
grotus.*

- A Qui vero ægrū sibi cōmissum habet, si artis inuenta demōstrauerit, cōseruans nō mutans naturā, præsentē auferet remunerationem, aut cōtrā, fidem suam itatim amittet. *inuestiga natura quædam est* Hominis enim bonus habitus natura quædā est, quæ motū non alienum ex natura acquisiuit, sed valde cōgrua est, & spiritus, & calore, & humorū concoctione vndiquaq; & vniuersā virtus ratione, & aliis omnibus cōposita ac constructa: si nō aliquis ex natiuitate, aut ab initio defectus fuerit. Si vero etiā quis fuerit, is si exilis est, conandū est vt subiectæ naturæ assimiletur. præter naturā enim est id quod imminutū est, etiā per tempus. Porro fugiēda est & frictio per lintea sudaria, *Frictio.* propter parandā medendi autoritatem. Itemq; odor curiosē
- B ascitus. Propter multā enim peregrinitatem, in calūniam incidēs: propter modicam vero, decētem ornatū consequeris. In parte enim dolor modicus: in toto, multus. Gratiitudinē autem qua hominibus cōplaceas, non tollo. Digna enim est medico præsidio. At vero appositionis per instrumēta, & indicationis eorum quæ significāt, & eiusmodi rerū memoriā adesse oportet. Si vero etiam vulgi gratia velis dissertationē ad audiendum te facere, non valde gloriose id captes: nō tamen cum testimonio ac ostētatione poetica. Impotētiam enim industrij laboris ostēdit. Auerfor enim ad alium vsum transferri industriā cum labore partam, quæ propterea in se ipsa sola gratiosæ sectæ electionem habet. Consequeris enim instar fuci promptā cum comitatus deductione elationem.
- C Optanda est & eiusmodi dispositio quæ aliena sit ab eo quod quis grādus iam natu discat. Hoc enim præsentium quidē nihil perficit, absentium vero tolerabilis memoria existit. Fit itaq; omnia tentans infortunium, cum recēti pernicie, quæ negligit decorum, & in præfinitis terminis, & in professione, & in maximis iuramētis deorum gratia factis: dum Medicus præest morbo, cū assidua lectione, instructioneq; imperitorum fugitiuorū, ita vt sermones trāslatitios imitetur, qui etiam antea q̄ in morbo incertus animo esset, collecti fuerunt. Taliū igitur vbi etiā præfectus essem, nō sanē in collectitia curatione id facerē. Verum cōfidenter auxilium peterem. Cognitionis enim decoræ scientia in his dispersa est. Quū igitur hi necessario sint inscij ac imprudentes, hortor eos vt cōmodam habeāt exercitationē, post dogmatū cognitionis

HIPPOCRATIS LIBER

tionis penuriâ. Quis enim multâdam dogmatû sectionē se D
vere cognoscere posse sperarit, citra exercitationis cōstan-
tiam? Quapropter hoc admoneo, vt dicentibus quidē atten-
dant, faciētibus autem incūbant, & contrāctâ victus rationē
nō diu præscribant. Aegrotātis enim diuturnâ concupiscen-
tiam erigit indulgētia quoq; in morbo diuturno. Si quis cē-
co animū aduertat, velut res magni timoris cauendus est, &
gratia desperāda, per quā vnitas cōstat. Aeris repentina tur-
batio vitāda est. Vigor ætatis omnia habet gratiosa, Decre-
pita vero ætas, vice versâ. Obscuritas linguæ non satis claræ
fit, aut propter affectionē, aut propter aures, ita vt priusquā
priora enunciarit, alia adiiciat: aut priusquā id quod mente
cōcepit dicat, alia insuper cogitet. & quæ quidem citra affe-
ctionem visibilē appellatam, cōtingit linguæ obscuritas, his
maxime qui artium studio tenentur accidit. Aetati etiā quū
paruum est aliquando subiectum, valde magna vis inest. In
morbo tranquillitas, longitudinem significat. Iudicatio vero
est morbi exolutio. Parua causâ medelis exfoluitur, nisi quid
circa locum principalem affectum fuerit. Quādoquidem af-
fectio per consensum à tristitia inducta vexat, quidam sanē
ex alterius consensu vexantur. Vociferatio affligit. Fortis la-
boris studium subterfugiendum est. Maritimus locus ad sa-
nitatem commodus est.

*Vigor æ-
tatis.*

*Linguæ
obscuritas
unde.*

in pios qd


*Que ne-
xet ægro-
tum*

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE NATURA HO-

minis Iano Cornario medico

physico interprete.



Vicunque de natura humana am-
plius differentes audire consue-
uit, quàm eius ad medicinam per-
tinet, huic non est cōmodum hūc
meum sermonem audire. Neque
enim omnino ex toto aerem dico
hominem esse, neque ignē, neque
aquā, neque terram, neque quic-
quam aliud, quia non manifestū
est vnum

- A** est vnum in homine esse. sed volentibus tamen hæc dicere *Sētentia* permitto. At vero talia dicentes mihi non recte rem cognoscere videntur. Sententiam enim eandem omnes ineunt, *variae de* verum non eadem dicunt, sententiæ tamen epilogum eundem faciunt. Aiunt enim vnum quid esse, quodcunque tandem est, & id ipsum esse vnum ac totum, iuxta nomina autē non consentiunt. Etenim alius ex ipsis aerem esse, hoc vnum ac totum dicit, alius ignem, alius aquam, alius terram, & addit vnusquisque ad sermonem suum testimonia ac signa, quæ nullius momenti existunt. Quia enim eadem sententia omnes vtuntur, dicunt autem non eadem, manifestū facit quod neque cognoscunt ipsa. quod ex eo vel maxime quis cognouerit, qui ipsorum disceptationibus interfuerit. Nam quum
- B** iidem viri inter se disceptant, iisdem auditorib. presentibus, nunquā ter consequenter idem homo vincit in eodē sermone, sed modo hic, modo alius superat, cuiusq; fuerit lingua maxime fluida ac populo grata. Atqui iustū erat, vt is qui de rebus se recte cognoscere pronunciaret, semper sermonem suum victorē statueret, siquidem vera cognosceret, ac recte sentiret ac iudicaret. Verū huiusmodi homines vidētur mihi seipso oppugnare in verbis sermonū suorū, præ stultitia, & Melissi sermonē approbare. De his igitur sufficiūt mihi quæ *Melissus.* retuli. At vero ex Medicis quidam dicunt, quod homo sanguis solum est, alij ex ipsis bilem aiunt hominem esse, aliqui *Medicorū* pituitam, epilogum autem & ipsi omnes eundem faciunt. *opinio.*
- C** Vnum enim quid esse dicunt, quodcunq; cuique ipsorū nominare visum est, & id ipsum vnum existens, speciem ac vim transmutare, coactū à calido ac frigido, fieriq; & dulce, & amarum, & album, & nigrum, & omnigenū quid aliud. Mihi vero neq; hæc sic se habere vidētur. Plurimi quidē igitur talia quædā, & amplius his proxima pronunciant. Ego autem dico, si vnū esset homo, nunquā sanē doleret. Neq; enim esset vnde doleret vnum existens. Si vero etiā doleret, necesse esset & quod mederetur ac sanaret vnū esse. Nunc vero plura sunt. Multa enim sunt in corpore existentia, quæ quum mutuo præter naturam calfiunt & frigesunt, siccanturque & humectantur, morbos pariunt. Quare multa quidem species morborū sunt, multaque etiā medela ipsorū existit. Atq; ego sanē censeo eum qui hominē sanguinē solum esse dicit, & nihil

*Si re una
homo cō-
staret non
lāgueret.
Morborū
caussa.*

HIPPOCRATIS LIBER

& nihil aliud, demonstrare debere, ipsum non transmutare D
speciem, neque omnigenum fieri, vel saltem horam aliquam
anni, aut hominis ætatem, in qua sanguis solus in homine in-
esse appareat. Verisimile est enim vnum aliquod esse tem-
pus, in quo appareat ipsum in seipso vnum existens. Eadem
censeo etiam de eo qui pituitam solam esse dicit, & qui bi-
lem. Ego enim demonstrabo ea quæ hominem esse dixerō,
& iuxta receptum morem, & iuxta naturam, quòd semper ea
ipsa similia sint, & in iuvene, & in sene, & tempore frigidum
æque ac calidum. Exhibebo insuper signa, & necessitates o-
stendam, per quas vnumquodq; augetur ac minuitur in cor-
pore. Primum quidem igitur, necesse est generationem fieri
Qui omnia non ab vno, Quomodo enim vnum existens, aliud quid ge- E
gignatur. nerarit, si non alicui misceatur? Deinde neque generarint,
si nō eiusdem generis existentia misceantur, & quæ eandem
vim habeant, neque sanè nobis similia perficerentur. Et rur-
sus, Si nō calidum ac frigidum, & siccum ac humidum, mode-
rate ac æqualiter inter se haberent, sed alterum alterum multum
præcelleret, & fortius debiliore præstaret, generatio fieri nō
posset. Proinde quomodo verisimile est, ab vno quid gene-
rari, quum neque à pluribus generetur, nisi habuerint tēpe-
ramentum inter se probe cōueniens? Necesse itaque est tali
existente natura, cum aliorum omnium, tum humana, non
vnum esse hominem, sed singula quæ ad generationem eius
conferunt, vim quandam in corpore habere, eam videlicet
quam contribuerunt. Et rursus necesse est secedere singula F
in suam ipsorum naturam, homine moriente, humidum ni-
mirum ad humidum, siccum ad siccum, calidum ad calidum,
frigidum ad frigidum. Talis autem & animalium est natura,
& aliorum omnium, generanturque similiter omnia, & oc-
cidunt similiter omnia. Constat enim natura ipsorum ex his
prædictis omnibus, & definit iuxta prædicta, in id vnumquod-
que vnde est compactum secedens. At vero corpus hominis
Que in cor habet in seipso sanguinem, & pituitam, & bilem duplicem,
pore sunt. flauam videlicet & nigram, atque hæc sunt ipsi corporis na-
Langui- tura, & per hæc & ægrotat, & sanus est. Sanus equidem maxi-
ris causa me est, vbi temperamentum hæc inter se habuerint mode-
Sanus qd. ratum, tum facultate, tum copia, & vbi maxime fuerint per-
Ægrotus. mixta. Ægrotat autem quum horum quid minus aut am-
plius

a plius fuerit, aut separatur in corpore, & non fuerit reliquis
 omnibus contemperatum. Necesse est enim quum quid ho-
 rum secretum fuerit, & per se steterit, non solum eum locum
 vnde secessit morbidum fieri, sed etiam eum in quo stat, &
 in quem propter nimiam copiam diffusum est, dolore ac mor-
 bo vexari. Etenim quum quid horum extra corpus effluxe-
 rit amplius quam redudat, euacuatio ipsa dolorem exhibet.
 Rursus itaque si idem intus fecerit euacuationem, & transi-
 tionem, ac ab aliis secretionibus, geminatum dolorem exhibe-
 re necesse est, velut dictum est, nempe & vnde secessit, & ubi
 receptum redundat. Dixi porro, quaecumque hominem esse di-
 xero, semper demonstraturum me esse, quod talia sint & iux-
 ta receptum morem ac opinionem, & iuxta naturam. Et dico sa-
 nē esse sanguinem, & pituitam, & bilem flauam ac nigram:
 & horum primum quidem iuxta receptam opinionem nomi-
 na distincta esse dico, & nulli ipsorum idem nomen esse. deinde
 species iuxta naturam separatas esse, & neque pituitam simi-
 lem esse sanguini, neque sanguinem bili, neque bilem pituitae.
 Quo enim modo haec inter se similia sint, quorum neque colores
 similes videntibus apparent, neque ad manuum tactum simili-
 tudo aliqua esse deprehenditur? Neque enim similiter ca-
 lida sunt, neque frigida, neque sicca, neque humida. Quum
 itaque intantum inter se discrepēt, tum specie, tum faculta-
 te, necesse est ipsa non vnum esse, quandoquidem neque ignis
 & aqua idem sunt. Quod autem haec omnia non vnum sunt,
 sed vnumquodque ipsorum vim & naturam suam habet, vel
 hinc cognoscere licebit. Si enim homini alicui medicamen-
 tum dederis, quod pituitam ducit, pituitam tibi vomet, & si
 pharmacum dederis bilem ducens, bilem tibi vomet, Eadem
 ratione & bilem atram purgabit, si medicamentum exhibue-
 ris quod bilem atram ducit. Quod si ipsi partem aliquam sa-
 uciaris, ut vulnus fiat, effluet ipsi sanguis, atque haec omnia fa-
 ciet tibi totam diem ac noctem, & hyeme & aestate, donec
 spiritum in sese trahere potens fuerit, potens autem erit do-
 nec aliquo horum congenitorum fuerit priuatus. Congenita
 autem sunt praedicta. Quomodo enim non congenita es-
 sent? Primum etenim manifestum est hominem in seipso
 haec omnia semper habere, donec vixerit. Deinde nata sunt
 ex homine haec omnia habente. Postea nutrita sunt in ho-
 mine

HIPPOCRATIS LIBER

mine hæc omnia habente, quæ videlicet ego nunc dico ac **D**
demonstro. Qui vero dicunt, quod vnum est homo, videntur mihi hoc consilio vti esse. Nimirum quum viderint eos qui medicamenta hauserunt in superpurgationibus interiisse, alios quidem bilem vomentes, alios pituitam, vnumquodque horum hominem esse putauerunt, quod vidissent his purgatum interiisse. Et qui sanguinem dicunt hominem esse, eodẽ consilio vtuntur. Nam quum vident iugulatos homines, & sanguinem ex corpore ipsorum effluentem, hunc ipsum animam in homine esse putant. atque his testimoniis sanè omnes vtuntur in sermonib. suis. Atqui primum quidem in superpurgationibus, nemo vnquã mortuus est bile sola purgatus. Verum quum quis pharmacum biberit, quod bilem deducit, primum bilem vomet, deinde pituitam, postea per vim etiam atram bilem, postremum moribundus etiam sanguinem purum vomet. Eadem perpetiuntur à medicamentis pituitam ducentibus. Primum enim pituitam voment, deinde bilem flauam, postea atram, morientes autem sanguinem purum, & in hoc mox vitam finiunt. Etenim pharmacum vbi corpus intrauerit, primum quidem ducit id quod ex omnibus in corpore existentibus, sibi maxime secundum naturam familiare fuerit, deinde vero etiam alia trahit ac purgat. Quemadmodum ex terra nascentia & in ipsam plantata ac seminata, vbi in terram peruenerint, vnumquodque trahit id quod naturæ suæ familiare in terra existit. Inest autem in terra & acidum, & amarum, & dulce, & salsum, & omnigenum. Primum itaque plurimum eius trahit in seipsum, quod sibi ipsi iuxta naturam maxime familiare fuerit, deinde trahit etiam reliqua. Huiusmodi sanè quiddam etiam pharmaca in corpore faciunt. Quæcunque enim bilem ducunt, primum meracissimam bilem purgant, postea vero mixtam. Et rursus pituitæ pharmaca, primum meracissimam pituitam ducunt, postea mixtam. Et iugularis primum quidem sanguis calidissimus & ruberrimus profluit, deinde pituitosior ac biliosior. Porro pituita in homine hyeme augetur. Hæc enim hyemi maxime secundum naturam conuenit ex omnibus in corpore existentibus. Frigidissima enim existit. Signa autem quod pituita frigidissima est, hæc sunt. Si enim pituitam & bilem & sanguinem contingere libuerit, pituitam sanè

*Pharmacū
quid agat.*

*Pituita cur
hyeme ui
geat.*

A tam sanè frigidissimam esse comperies, quanuis viscosissima sit, & per vim maxime post bilem atram trahatur. quæ vero per vim trahuntur calidiora fiunt, à violentia coacta, sed tamen supra hæc omnia, frigidissima esse apparet pituita ex sua ipsius natura. Quod autem hyems corpus pituita repleat, inde cognoscere datur, quod homines pituitosissima & spuunt & emugunt hyeme, & tumores laxi albissimi fiunt maxime hoc tempore, itemque reliqui morbi pituitosi. Cæterum Vere pituita quidem adhuc fortis in corpore manet, sed sanguis augetur. Nam & frigora remittunt, & imbres superueniunt. Sanguis autem iuxta hæc augetur, ab imbribus videlicet & calidiorum dierum tepore. Hæc enim anni pars maxime iuxta naturam ipsi conuenit, vt quæ calida & humida existat. Signa autem hinc colligere licet. Quod homines Vere & æstate maxime dysenteris corripiuntur, & sanguis ex naribus ipsis fluit, & calidissimi ac ruberrimi. At vero æstate sanguis adhuc viget, & bilis in corpore eleuatur, & vsque in autumnum porrigitur. In autumnum vero sanguis modicus fit, contrarium enim eius naturæ id tempus existit. Bilis autem per æstatem ac autumnum corpus possidet, id quod inde cognoscere potes: quod homines sua sponte hoc tempore bilem vomunt, & in medicamentorum potionibus biliosiora purgantur. Manifestum fit & febribus, & hominum caloribus. Pituita autem æstate debilior seipsa est. Contrarium est enim naturæ eius id tempus, calidum enim est & siccum. Sanguis vero autumnum paucissimus fit in homine, Siccus enim est autumnus, & hominem iam frigefacere incipit. Atra porro bilis autumnum & plurima & fortissima est. Postquam autem hyems apprehenderit, bilis flaua perfrigerata modica fit, & pituita rursus augetur, tum ob pluuiarum copiam, tum propter longitudinem noctium. Corpus quidem igitur humanum hæc omnia semper habet, verum pro temporis circumstantia, aliquando plura seipsis fiunt, aliquando pauciora, singula tum iuxta partem ac copiam, tum iuxta naturam. Quemadmodum enim annus omnis omnium particeps est, & caliditatum & frigiditatum, & siccitatum ac humiditatum, Neque enim quicquam horum ne minimo quidem tempore consisteret ac duraret, citra omnia ea quæ in hoc mundo insunt, verum si vnū aliquod deficeret,

Qui humores per singula tempora uigent.

Bilis corpori domi natur.

HIPPOCRATIS LIBER

omnia sanè abolerentur: ex eadem enim necessitate omnia D
 consistunt & mutuo aluntur: Sic etià si quid ex homine de-
 ficeret ex his quæ ipsi congenita sunt, nò sanè viuere posset
 homo. In anno autem aliquando quidem hyems maxime vi-
 get, aliquando ver, modo æstas, modo autûnus, Sic etiam in
 homine, aliquâdo pituita præualet, aliquâdo sanguis, aliquâ-
 do bilis primû quidem flaua, deinde etiam nigra appellata.
 Quorum omnîû euidentissimum testimoniû hinc habes. Si
 enim eidem homini idem pharmacum quater in anno dare
 velis, vomet tibi hyeme quidè pituitosissima, Vere autè hu-
 midissima, æstate biliosissima, autumno nigerrima. Itaque
 quum hæc sic se habeant, quicumq; morbi hyeme augescunt,
 æstate desinere solent, quicumq; vero æstate augescunt, hye- E
 me finire cõsueuerunt, nisi certo dierum circuitu discedant.
 de circuitu autem rursus dicam. Quicumq; autem morbi Ve-
 re fiunt, ad autûnum eorum discessum fore expectare opor-
 tet, Quicumq; postremû autûnales morbi sunt, eorum disces-
 sum necesse est Vere fieri. Quicumque vero morbus hæc tẽ-
 pora trásgressus fuerit, eum annum fore scire oportet. Por-
 rò Medicum sic aduersus morbos instare oportet, prout vnû-
 quodque horum in corpore præualet, iuxta tempus sibiipfi
 maxime natura conueniens existens.

*Medicus
 hæc omnia
 cõsiderato*

Addititia sunt hæc, non genuina Hippocratis, ut ait Galenus.

Quin & hæc insuper ad illa nosse oportet, q̃ quoscûque mor F
 bos repletio parat, euacuatio sanat: & quicumq; ex euacuatio-
 ne fiunt morbi, repletio sanat. quicumq; vero à labore fiunt,
 quies sanat, qui autem ab ocio gignûtur, labor sanat. In sum-
 ma Medicum scire oportet, opponere se contrarium instan-
 tibus & morbis, & naturis, & temporibus, & ætatibus, & di-
 stendentia soluere, & soluta distendere, Sic enim vel maxime
 morbum sedauerit, & mihi sanè hoc ipsum sanatio esse vide-
 tur. Morbi partim ex diætis, partim ex spiritu, quem adtra-
 hentes viuimus, fiunt. Vtrorunq; cognitionem sic facere o-
 portet. Quando ab vno morbo multi homines corripuntur
 eodem tempore, causam ad id quod communissimum est, &
 quo maxime omnes vtimur, referre oportet. Est autem hoc
 spiritus & aer quem inspirando trahimus. Manifestum est
 enim

*Observa-
 tiões mor-
 borum.
 Morbi un-
 de oriâtur*

A enim iam, quod diætā vniuscuiusque nostrum, causā nō est, quum morbus omnes consequenter contingat, & iuniores, & seniores, mulieresq; ac viros, & tam vinolētos quā aq̃ue potiores, & tam mazam edentes, quā pane vescētes, & tam multum laborātes, quā parum. nequaquā igitur diætā causā fuerit, quum homines diuersa victus ratione vtētes ab eodem morbo corripiuntur. Quum vero omnis generis morbi fiunt eodem tempore, palām est victus singulos singulis causas esse, & curam sanē facere oportet ex contrario instando aduersus morbi causā, quemadmodum & alibi à me relatū est, & victus rationem permutare. Conspicuum est enim diætā qua homo vti consuevit, non esse ipsi cōmodā, aut in totum, aut magna ex parte, aut vnum saltem quoddam ex ipsa: quod vbi cognoueris transmutare oportet, habitāque consideratione naturæ hominis, & ætatis, & speciei, horæque anni & modi ipsius morbi, curationem facere, aliquando detrahendo, aliquando apponendo, & quemadmodum iam dudum à me dictū est, ad singulas ætates, & horas, & species, ac morbos respiciendo, tum in exhibendis pharmacis, tum in constituenda diætā. At vero quum vnius morbi popularis grassatio consistit, manifestum est diætā non esse culpabilē, sed quē trahimus spiritū in causā esse: palāmque est insuper eum ipsum spiritum siue aerem morbosā aliquam exhalationem habere. Eo itaque tempore homines in hunc modum commonefacere oportet, Nimirum vt diætā non permutent, quia morbi causā non existunt, verum vt videant quo corpus habeant quā minimæ molis ac debilissimum: detrahendi insuper sunt cibi ac potus quibus vti consueuerunt, idque paulatim facere oportet: Nam si quis cito diætā permutet, periculum est etiam à permutatione aliquid in corpore nouatū iri. Quapropter victu solito quidem vtendum est, vbi hominem nihil lædere videtur. prouidendum vero vt quā paucissimus aeris influxus in corpus ingrediatur, & vt ille ipsi: quā peregrinissimus existat. Regionum etiam locos in quibus morbus consistit, quantum eius fieri potest, permutare oportet, & corpora attenuare: sic enim minime multo ac densō spiritu homines opus habuerint. Porro quicumque morbi à fortissima corporis parte fiunt, grauissimi existunt. Etenim si isthic vbi initium sum-

Medela
morbi pas
sim uigen
tis.

d iij pferint

HIPPOCRATIS LIBER

perferint permanferint,neceffe eft fortiffima parte laborante,torum corpus laborare. Et fi à validiffima ad quãdam debiliorem transferint,difficulter foluuntur. Quicunque à debilibus partibus ad fortiores transferint, commodius folui poffunt. Nam influentia à vi ipfarum facile confumuntur.

De uenarũ natura.

*Quatuor paria uenarum, Miffio fan-
guinis.*

Venæ craffiffimæ fic fe habent. Quatuor paria ipfarum funt in corpore. & vnum quidem à capite retro per ceruicem, forinfecus ab vtraque fpinæ parte ad coxendices & in crura progreditur, deinde per furas & malleolos forinfecus ad pedes peruenit. Oportet igitur venæ fectiones, in doloribus dorfi ac coxendicum, de poplitibus facere & de malleolis forinfecus. Alterum par principium ex capite iuxta

aures habet per ceruicem, & fphagitides appellantur, hoc eft iugulares. deferunturque vtrinque iuxta fpinam intrinfecus ad lumbos, in testes ac femora, & per poplites ex interna parte, deinde per furas ad malleolos intrinfecus & in pedes. Quapropter in doloribus lumborum ac testium, venæ fectionem de poplitibus ac malleolis facere intrinfecus.

Tertium par venarum ex temporibus per ceruicem fub fcapulas tendit,& ad pulmonem defertur, altera quidem à dextris ad finiftram partem, altera vero à finiftris ad dextram, & dextra quidem fub mammam abit & in fplenem, & in rhenem,finiftra vero in dextram partem tendit à pulmone fub mammam & in hepar, & in rhenem. Vtraque autem in

*Ventrum
digestio.*

rectum inteftinum ac podicem definit. Quartum par à prior capitis parte & oculis, fub ceruicem ad clauiculas deuenit, deinde fuper brachia fuperne in flexuras, poftea per cubitos in manuum iuncturas ac digitos. deinde à digitis rurfus, per cubitos ac manus fuperne in flexuras, & per brachiorum infernam partem ad alas, vnde fuperne à lateribus altera in lienem peruenit, altera in iecur, poftea fupra ventrem vtraque in pudendum definit. Et craffiffimæ quidem venæ fic fe habent. Sunt autem & ex ventriculo venæ per corpus multæ & omnigenæ,per quas corpori alimentum accedit. ferunt autem à craffis venis, in ventriculum ac reliquum corpus, & ab externis & ab internis, & inter fe mutuo diftribuunt internæ extrinfecis, ac viciffim extrinfecæ internis. Venæ igitur fectiones iuxta prædictum fermonem facere oportet. Enitendum eft autem vt fectiones

quàm

- A quàm lōgissime à locis faciamus, vbi dolores fieri, & sanguis colligi solet. Sic enim mutatio minime magna de repēte fiet, & consuetudinem remouebit, vt non amplius in eundem locum colligatur. Quicunq; pus multum spuunt, citra febrem, & quibuscūque in vrina pus multum subfidit, citra dolorem, & quibuscunq; alui recrementa cruenta, velut in dysenterijs, & tarde ac diutine prodeuntia, velut in iuuenibus quinque & triginta annorum, atque etiam senioribus, his omnibus ex eadem causa morbi sunt. Neceffe est enim hos labori deditos, ac exercitationis studiosos, & corpore operarios in iuuentute fuisse, postea vero relictis laboribus, molli carne & multum à priore differente carnosos redditos esse, & corpus multum discrepans habere, vt id quod prius extitit
- B cum eo quod nunc adepti sunt, nulla parte cōsentiat. Quum igitur morbus aliquis corripuerit sic dispositos, euestigio quidem effugiunt, postea autē à morbo progressu temporis corpus colliquefcit, & serosi ac saniosi humoris species per venas, qua parte maxime amplæ fuerint, fluit. Siquidē igitur in inferiorem ventriculum processerit, ferē qualis in corpore inest, tale etiam recrementum prōdit. Quum enim decliuus sit via, non multo tempore hæret in intestino. Quibuscunq; autem in pectus influxerit, suppurati fiunt. Nimirum purgatione accliu existente, & multo tempore in pectore immorans putrescit, & purulenta redditur. quibuscunq; vero eadem serosi humoris species in vesicam proruperit, à loci caliditate, calida & alba fit, & segregatur, & quod quidem rarissimum
- C est, superstat, crassissimum vero infra mergitur, quod sanē pus appellatur. Fiunt autem & calculi pueris, propter huius loci caliditatem itemq; totius corporis. Viris autem calculi non generantur, propter corporis frigiditatē. Nam id probe nosse oportet, quod homo primis diebus calidissimus est sui respectu, vltimis frigidissimus. Neceffe est enim augefcens & ad vim procedens corpus calidum esse, Vbi autē inceperit marcescere corpus, delabens in ocium, frigidissimum euadit. Et iuxta hanc rationē, quanto amplius primis diebus homo augefcit, tanto calidior existit, & quāto plus vltimis diebus marcescit, tanto frigidior esse neceffe est. Sani autem fiūt sua sponte illi prædicto modo dispositi ac affecti, plurimi quidem ab hora qua liquefcere incipiunt, quinto & quadragesimo

*Calculi
cur pueris
fiant.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Lotii di-
uersitas.*

*Quatuor
febrium
species.*

*Qualis
atra bilis
Quo tēpo-
re & qua
etate*

mo die. Qui vero hoc tempus transgressi fuerint, anno finito sua sponte conualeſcunt, niſi quid aliud mali grauioris hominem infeſtet. Quicumque morbi ſenſim ex modici temporis cauſa ſunt, & quorum cauſæ cognitu faciles ſunt, ſecuriſſimi appellari poſſunt. Curationem itaque ipſorum inſtituere oportet, vt cauſæ morbi nos opponamus. Sic enim ſoluitur vtiq; id quod morbum in corpore fecit. Quibuſcunque are noſa aut toſi in vrinis ſubſident, hiſ initio tubercula circa craſſam venam enata ſunt, & ſuppurata. Poſtea vero tuberculis non cito effractis, toſi ex pure coalti ſunt, qui per venâ foras exprimuntur vnâ cum vrina. Quibuſcūq; vero cruentæ vrinæ ſunt, hiſ venæ laborât. Quibuſcunq; autē in vrina craſſa exiſtente, carūculæ parux capilliſformes ſimul prodeunt, eas à rhenibus prodire noſſe oportet, & ab arthriticis. Quibus vero pura vrina eſt, & aliàs atque aliàs velut furfures in vrina innatant, horum veſica ſcabioſa exiſtit. Febres plurimæ à bile ſunt. Species ipſarum quatuor ſunt, præter eas quæ ab occultis doloribus generantur. Nomina ipſarum ſunt: Continens, Quotidiana, Tertiāna, Quartana. Continens itaque appellata, à plurima ac meraciſſima bile prouenit, & iudicationes quā breuiſſimo tempore facit, Corpus enim nullo tempore perfrigeratum cito colliqueſcit, nimirum à multa caliditate calfactum. Quotidiana vero poſt continentem à plurima bile generatur, & præ reliquis celerrime diſcedit, verum longior eſt continente, quanto à pauciore bile prouenit, & propterea quòd requiem habet in ipſa corpus, In continente vero non quieſcit vilo tempore. Tertiāna autem longior eſt quā quotidiana, & à pauciore bile gignitur. Quanto vero longiori tempore in tertiāna corpus quieſcit quā in quotidiana, tanto diuturnior hæc febris eſt quā quotidiana. At vero quartanæ reliquæ iuxta eandem rationem habent, ſed tertianis diuturniores ſunt, quanto pauciore bilis parte participant, vnde caliditas augetur, & propterea quòd corpus in ipſis plus perfrigeſcit, id quod ab atra bile ipſis contingit ſuperflue adeò vt ægre frigus depelli poſſit. Atra enim bilis inter omnes corporis humores viſcoſiſſima eſt, & ſedes diuturniſſimas facit. Quod autem quartanæ febres atræ bilis participes ſint, vel hinc conſciſcere licet. Autumno enim maxime homines à quartanis corripiuntur, & in ætate à quin-
que &

que & viginti annis, vsque ad quadragesimum quintum. Hęc *quartana*
autem ætas præ omnibus aliis maxime à bile atra infestatur *ingruit.*
& autumnus tempus omnium anni temporum ad eandem a-
pissimum est. Quicumque autem extra hoc tempus & æta-
tem à quartana corripiuntur, pro certo scire oportet eam fe-
brem non fore diuturnam, nisi quid aliud grauioris mali ho-
minem infestauerit.

DE SALVBRI DIAE- TA LIBER IANO COR- nario medico physi- co interprete.

*Addititius est ad librum De natura hominis, Polybi.
Hippocratis discipuli, ait Galenus.*



Liotas & priuatos homines *Priuatores*
hac diæta uti oportet. Hyeme *hominum*
quidem comedere quàm pluri *uictus in*
ma, bibere autem quàm parci- *hyeme.*
fime. Sit potus vinū quàm me-
racissimū; cibi, panis, & obso-
nia assata omnia. Oleribus q̃
paucissimis hoc tempore uten-
dum est, Sic enim corpus ma-
xime siccum ac calidum redde-
tur. Vbi vero ver apprehende-
rit, tūc sanè potum ampliorem

In Vere.

assumere oportet, vinum dilutius & paulatim: cibis quoque
mollioribus ac paucioribus tum utendum est: & ablato pane,
mazam exhibere, & iuxta eandem rationem obsonia detra-
here, & ex assatis omnia cocta facere. Oleribus vero paucis
tunc

HIPPOCRATIS LIBER

tunc vti oportet, donec ad æstatē perueniat homo, cibis mollioribus vtendo, & obsoniis coctis, & oleribus, tam crudis quàm coctis, similiterque potibus quàm dilutissimis ac plurimis. ita tamen vt paulatim non de repente his vtatur, ne videlicet magna mutatio fiat. At vero æstate maza molli nutriatur, & potu aquoso ac multo, obsoniis omnibus coctis. Sic autem his vbi æstas fuerit vti oportet, vt frigidum sit corpus & molle. Tempus enim callidum est & siccum, & facit corpora æstuosa ac squallida. Quapropter tali studio auxiliari oportet. Iuxta eandem vero rationem, quemadmodum ex hyeme ad ver, sic ex vere ad æstatem deducendum est, cibo quidem detracto, potu vero aucto. Sic quoque contraria faciendo ex æstate ad hyemē perducatur. In autumnu vero rursus cibi plures exhibendi sunt & sicciores, & obsonia iuxta eandem rationem, potus vero pauciores & meraciores, quo etiā hyems bona fiat, & homo in ipsa vtatur potibus meracioribus ac paucis, cibis vero quàm plurimis ac siccissimis. Sic enim & maxime sanus fuerit, & minime frigore impetetur. Nam tēpus hoc valde frigidum ac humidum existit. Porro habitibus corporum carnosorum carnosus & mollibus ac rubris, plurimo anni tempore siccioribus diætis vti conducit. Humida enim est ipsorum natura. Verum duros & graciles, fuluosque ac nigros, humidior diæta maiore temporis parte victitare oportet. Corpora enim talia sicca existunt. Sed & iuuenibus corporibus, mollioribus & humidioribus diætis vti confert, Nam ætas ipsorum sicca est, & corpora compacta sunt. Seniores autem sicciorē victus modo, maiori temporis parte degere oportet. Corpora enim in hac ætate humida sunt, & mollia ac frigida. Oportet igitur & ad ætatem, & ad tempus anni, & ad corporum species ac habitus, diætas constituere, ita vt consistentibus & caloribus, & frigoribus nos opponamus, Sic enim maxime sani fuerint. Quin & ambulandum hyeme quidem velociter est, æstate autem leniter, nisi per solis æstus iter faciendum sit. Oportet autem & carnosos citius ambulare, graciles vero tardius. Balneis quoque multis æstate vtendum est, hyeme paucioribus, Gracilibus autem magis expedit lauari, quàm carnosis. Vestes autem puras induere hyeme oportet: oleo imbutas ac sordidas, æstate. Cæterum pingues, & qui graciles fieri volunt, omnes labores

- A** bores ieiuni facere debent, & cibos assumere anhelantes adhuc ex fatigueatione, & non refrigerari, præporo vino diluto, & non valde frigido, & obsonia præparata assumere ex sesamis, aut condimentis hortensibus, & aliis huiusmodi. Sint autem obsonia pingua quæ offeruntur, sic enim à quàm paucissimis impleri poterint. Sed & semel in die cibum sumere, & illorum manere, & stratum durum habere, & nudum deambulare oportet, quantum eius maxime fieri potest. Quicunque vero graciles sunt, & pingues fieri volunt, tum alia his quæ dixi contraria facere, tum ieiunos nullum laborem subire oportet. At vero vomitibus, & alui per infusa elotionibus hoc modo vtendum est.
- B** Sex menses hybernos vomendum est, Hoc enim tempus pituitosius est æstiuo, & morbi circa caput fiunt, & regionem eam quæ est supra septum transversum. Quum vero æstas ac calor fuerit, infusis vtendum est. Hora enim hæc æstiuosa est, & corpus biliosius, & lumbi ac genua grauantur, & calores oboriuntur, & in ventre tormenta fiunt. Quapropter corpus perfrigerare oportet, & quæ in sublime eleuantur, inferne subducere ex istis locis. Sint autem infusa pro crassioribus ac humidioribus falsiora & tenuiora, pro siccis vero & gracilibus ac debilioribus, pinguiora ac crassiora. Crassa autem & pingua infusa sunt quæ ex lacte fiunt, & cicerum decoctum, & alia huiusmodi. Tenuia vero & falsa, sunt muria & aqua marina, & eiusmodi. At vero vomitus sic facere oportet. Quicunque homines crassi ac pingues sunt, & non graciles, ieiuni vomant à cursu aut ambulatione cita, iuxta meridiem. Sit autem dimidia hemina hyssopi in aqua congio contriti, atque hoc ebibat affuso aceto & adiecto sale, quo iucundius euadat. Bibat autem primum sensim ac lentius, postea amplius & citius. Qui vero graciliores sunt ac debiliores, à cibis vomitum faciant hoc modo. Lotus calida præbibat meri heminam, deinde cibos omnigenos edat, & neque dum cibum sumit, neque à cibo bibat, sed contineat se donec quatuor stadia quis percurrat, deinde vina eria permixta ipsi in potu offerantur, austerum, dulce, ac acidum, primum quidem meracius, & paulatim, & per multum temporis spatium. deinde vero dilutius, & citius, & multum.
- Quicunque

*Gracilium
& macilentorum visus*

*Vomitur
qui cietur.*

HIPPOCRATIS LIBER

Quicumque autem bis in mense vomere consuevit, huic melius est ut consequenter in duobus diebus vomat, quam per quintum & decimum. Verum aliqui penitus contrarium faciunt. Quibuscunque vero commodum est reuomere cibos, aut quibus alui non probum transitum habent, his omnibus conducit sæpe in die comedere, & omnigenis eduliis uti, & obsoniis variis modis præparatis, vinumque bibere duplex aut triplex. Qui vero reuomunt cibos aut aluos habent humectas, his omnibus contrarium huiusmodi facere cõducit. Cæterum puerulos infantes per multum tempus in aqua calida madefacere oportet, & vinum bibendum dare aquosum, & non penitus frigidum. Dandum est & id vinum quod minime ventrem eleuet ac inflat. Hæc autem facere oportet, ut & conuulsionibus minus corripiantur, & maiores fiant, ac meliorem calorem adipiscantur. Mulieres porro siccioris modi diætæ uti oportet. Nam & cibi sicciores ad muliebriũ carniũ molliciem cõmodiores sunt, & meraciores potus præstabiliiores sunt ad vteros ac fœtum nutrimenta. Qui exercitiis vtuntur, hyeme currere ac luctari debent. Aestate vero luctari quidem parum, currere autem minime, sed multum deambulare secundum ventum ac frigus. Quicumque ex cursibus fatigati fuerint, eos luctari oportet. Qui vero ex lucta fatigantur, eos currere expedit. Sic enim laborans, fatigata corporis parte vel maxime calferi componique ac recreari queat. Quoscunque exercitiis vtentes alui profluvia corripunt, & recrementa ciborum speciem referentia ac cruda habent, his exercitiorum nõ minus quàm tertiam partem detrudere oportet, & ciborum dimidium saltem exhibere. Palsam est enim quod ventriculus confouere non potest, quo ciborum multitudo concoquatur. Sint autem his cibi, panis quæ maxime assatus in vino intritus, & potus quæ parcissimi ac meracissimi, & deambulationibus à cibo ne vtantur. Oportet autem sub hoc tẽpus semel duntaxat in die cibũ sumere. Sic enim quàm maxime concalescit ventriculus, & ea quæ ingesta sunt exsuperauerit. Fit hic profluuij alui modus maxime his corporib. quæ densam carnem habent, quum ad carniũ esum homo cogitur, natura eiusmodi existente. Venæ enim densatæ cibos ingestos non suscipiunt. Est autem hæc natura acuta, & in ytrâque partem vertitur, & ad modicum tempus viget bo-

*Muliebris
uictus.*

Exercitia.

A viget bona habitudo in talibus corporib. At vero rariores ac hirsutiores corporum species ac habitus, tum carniū e-
sum suscipiunt, tum labores magis tolerant, & bonę habitu-
dines ipsi fiunt diuturniores. Quicunque postridie cibos
eructant, & præcordia ipsis eleuantur, utpote cibis crudis &
incoctis existentibus, his longiori quidem tempore dormi-
re cōducit, verum & aliis laboribus corpora ipsorum coge-
re oportet, Vinum autem meracius & amplius bibant, & ci-
bis paucioribus sub id tempus vtantur. Palam est enim quod
ventriculus præ imbecillitate ac frigiditate, ciborum multi-
tudinem concoquere non potest. Quoscuque vero sitis cor-
ripuerit, his & cibi & labores detrahendi sunt, & vinum bi-
B bant aquosum & quàm frigidissimum. Quibuscunque autem
dolores fiunt ex visceribus, siue ex exercitiis, siue ex aliquo
alio labore, his quiescere conducit cibis abstinentes, potio-
ne autem vtantur, quæ quàm parcissime in corpus assumpta,
plurimam vrinam ducat, quo venæ visceribus insitæ non di-
stendantur repletæ. Ex talibus enim tubercula oboriuntur,
ac febres. Quibuscunque vero morbi à cerebro fiunt, torpor
primum caput occupat, & frequenter mingit æget, & reliqua
velut in vrinæ stillicidio perpetitur, atque hæc sanè ad dies
nouem patitur. Et si quidem erumpat per nares aut aures a-
qua siue mucus, à morbo liberatur, & vrinæ stillicidium se-
datur. Mingit autem multum, & citra dolorem, idque albū,
donec viginti præterierint dies, & capitis dolor hominem
C relinquit. Intendenti autem oculos splendor occultatur. Por-
ro virum prudentem id secum reputare oportet, quod res
preciosissima est sanitas, & proinde scire ut ex suo ipsius cō-
silio in morbis vtilitatem percipiat.

HIPPOCRATIS LIBER
HIPPOCRATIS COI
 LIBER DE GENITVRA,
 Iano Cornario medico phy-
 sico interprete.

Hic à Galeno Polybi esse perhibetur.

*Providens
 natura
 quantum
 possit hinc
 perspicito.*



Ex quidē omnia corroborat. Verū
 genitura viri provenit ab omni
 humido, quod in corpore existit,
 ita vt id quod robustissimū est se-
 cernatur. Argumentum autem e-
 ius, quod robustissimum secerni-
 tur, hoc est: quod à Veneris vsu
 paucula adeo re emissā, imbecilles
 reddimur. Habet autem res hoc
 modo. Venæ & nerui ab omni

corpore in pudendum vergunt, quibus dum aliquantulū te-
 runtur, & calescent ac implentur, velut pruritus incidit, & ex
 hoc toto corpori voluptas ac caliditas accedit. Quū vero pu-
 dendum teritur, & homo mouetur, humidum in corpore ca-
 lescit, ac diffunditur, & à motu conquassatur, ac spumescit:
 quemadmodum etiam alij humores omnes conquassati spu-
 mescent. Sic autem in homine ab humido spumefcente, id
 quod robustissimū est ac pinguiissimū secernitur, & ad me-
 dullam spinalem venit. Tēdunt enim in hanc ex omni cor-
 pore viæ, & diffundunt ex cerebro in lumbos, ac in totum
 corpus, & in medullam: & ex ipsa medulla procedunt viæ, vt
 & ad ipsam humidum perferatur, & ex ipsa secedat. Postquā
 autem ad hanc medullam genitura peruenit, procedit ad
 rhenes, hac enim via tendit per venas: & si rhenes fuerint
 exulcerati, aliquando etiam sanguis simul defertur: à rheni-
 bus autem transit per medios testes in pudendum. Procedit
 autem non qua vrina, verum alia ipsi via est illi contigua. Et
 sane qui somnia venerea habent, propterea per somnum ge-
 nituram effundunt, quum humidum in corpore diffusum &

calfactum

*Cū semē
 spumescat*

*Pars ualē,
 lentissima
 cur in coi-
 tu exceri-
 natur.*

*Non eadē
 uia semi-
 nis & lo-
 tii.
 Sōnia Ve-*

- A** caſactum fuerit, & ſiue ex labore, ſiue alia quapiam re ſpū- *neris cur*
muerit, dum ab ipſo ſecernitur, coitus imaginem repræſen- *fiant.*
tat. Habet enim humiditas hæc ſimiliter vt in coeuntibus.
Sed non eſt mihi de his qui per ſomnum ſemen emittunt, &
de toto morbo quid eſt, & quæ operatur, & quare coitus lo-
cum expleat, ſermo. atque hæc quidē de hoc dicta ſufficiunt.
Cæterum eunuchi propterea non coeunt, quia genituræ *Castrati*
transitus ipſis ſublatus eſt. Eſt enim per ipſos teſtes via eius, *cur non*
& nerui tenues ac crebri ex teſtibus in pudendum tendunt, *cocant.*
quib⁹ & eleuatur, & demittitur: atq; hi nerui in exſectione
dum caſtrantur, reſcinduntur, quapropter non ſunt vtilēs
eunuchi. Nam neruis ipſorum extritis, genituræ via obtu-
rata eſt. Callus enim obducitur teſtibus, & nerui duri ac
B torpentes à callo facti, pudendum neque tendere, neque la- *Secundum*
xare poſſunt. Quibuſcunque vero iuxta aures venæ ſectæ *aures ue-*
ſunt, hi coeunt quidem & genituram emittunt, verum mo- *næ incisæ,*
dicam & debilem ac infœcundam. Nam plurima genituræ *procrea-*
pars à capite iuxta aures in ſpinalem medullam procedit. Ip- *tionē tol-*
ſe autem tranſitus, cicatrice ſectioni inducta, cōſolidatus eſt. *lunt.*
At vero pueris venulæ tenues & repletæ exiſtentes, genitu- *Cur pueri*
ræ tranſitum impediunt, & pruritus ipſis non ſimiliter acce- *& puellæ*
dit, & propterea neque conquaſſatur in corpore humidum, *nihil des-*
ad genituræ ſecretionem. Quin & virginibus quouſque iu- *mittunt.*
uenculæ fuerint, menſes non procedunt, propter eandem
cauſſam. Poſtquam autem adoleuerint & virgo & puer, ve-
C næ in pudendum pueri tendentes, itemque virginis in vte-
rum, amplæ fiunt præ augmento, & oſcula ipſarum aperiu-
tur, & via ac tranſitus per anguſtias contingit, & humidum
tunc etiam agitationem habet, Nam ſpatioſitas ipſi tunc ab
agitatione ac conquaſſatione contingit: & puero ſanè pro-
cedit genitura vbi plene puber fuerit ob hanc cauſſam, item-
que virgini menſes. Atque hæc mihi ſic demonſtrata ſunt.
Porro genituram dico à toto corpore ſecerni, & à ſolidis,
& à mollibus partibus, & ab humido omni in toto corpo-
re. Sunt autem humidi ſpecies quatuor, Sanguis, Bilis, *Quatuor*
Aqua, & Pituita. Tot enim ſpecies congenitas homo in *corporis*
ſeipſo habet, & ab his morbi fiunt, aut etiam ex morbis *humores.*
diſcretionēs. Et hæc quidem dicta ſunt à me, de genitura,
vnde fiat, & quomodo, & quare, & quibus genitura non
eſt, &

HIPPOCRATIS LIBER

*Qui fœmi-
nis in coi-
tu fiat.* est, & quare non est, & de mensibus virginum, & quòd mu-
lieribus in coitu, dum confricatur ac teritur pudendum, & vteri mouentur, velut pruritus in ipsos incidat, & quòd reli-
quo corpori voluptas ac caliditas accedat. Emitterit autem & mulier à corpore genituram, aliquando in ipsum vterum, qui sanè inde humidus euadit: aliquando foras, si vterus magis

*Coitus uo-
luptas u-
trorūque
est.* quàm opportunum est hiarit. Et delectatur mulier vbi coire inceperit per omne tempus, donec vir semen emiserit. Et si quidem appetit viro commisceri, prius quàm vir emittit, & de cætero non similiter delectatur. Si vero nō appetit, simul cum viro delectari desinit. & habet res hoc modo, quemadmodum si quis in feruentem aquam, alteram frigidam infundat, illa feruere cessat. Sic genitura viri in vterum illapsa, caliditatem & voluptatem mulieris extinguit. Exilit autem voluptas & caliditas simul cum genitura in vteros illabēte, deinde desinit. quemadmodum si quis in flammam vinum infundat, primum quidem contingit flammam exilire, & per modicum tempus augeri, ad vini infusionem, deinde desinere. Ita etiā mulieri caliditas exilit ad genituram viri: deinde desinit. Cæterum multo minus delectatur fœmina q̄

*Maiore
uir in coi-
tu uolus-
tate affi-
citur.* vir in coitu, & vir etiam tempore longiore. Propterea autem quòd vir magis delectatur, secernitur ipsi de repente ab humido, fortiori turbatione ac agitatione q̄ mulieri. Habet autem & hæc res hoc modo. Mulieres si cum viris coeant, magis sanæ sunt: si non, minus. Nam & vteri simul humidi fiunt in commixtione: qui enim sicci sunt magis q̄ conuenit, fortiter contrahuntur: vbi vero fortiter contrahuntur, dolorem corpori afferunt: & simul coitus sanguinem calfaciens ac humectans, viam faciliorem mensibus facit. Mensibus autē nō procedentibus, corpora fœminarum morbosa sūt. Quapropter autem morbosa fiant, in muliebribus morbis referetur. Et de his quidem hætenus. Postquam autem coiuit mulier, si quidem conceptura non est intra seipsam, præ more foras procedet genitura ab vtriusq; vbi fœmina volet. Si vero conceptura est, non procedit foras, sed manet in vtero genitura. Nam vteri susceptam & conclusam in sese continent, osculo nimirum ipsorum præ humiditate contracto ac concluso, simulque permiscuntur, tum quæ à viro venit, tum quæ à muliere emissa est. Quòd si fœmina partus perita sit, & cognouerit

*Cur fœmi-
na si cre-
bro cocat,
magis ua-
leat.* na si crebro cocat, magis va-
leat.

*Conceptus
signum.* Conceptus signum.

A verit quando genitura non exciderit, sed intus manserit, sciet qua die intra seipsam concepit. Habet autem & hoc sic. Quandoque quidem fortius est semen à muliere emissum, aliquando vero debilius. Similiter etiam quod vir emisit. Et est tum in viro foemineum itemque masculum semen, tum itidem in muliere. Fortior autem masculus foemina est. necesse igitur est ipsum à fortiore semine generari, habetque res hoc modo. Si ab utriusque semen fortius prodierit, masculus erit partus: si vero debile, foemina nascetur. Vtrum autem multitudine ac copia preualuerit, iuxta illud ipsum partus nascetur. Si enim multo plus fuerit debilis seminis quam fortioris, superatur forte, & debili permixtum, in foeminam transit. Si vero plus fuerit fortis seminis quam debilis, superatur debile, & in marem transit. Quemadmodum si quis ceram & adipem misceat, & de adipe tamen plus coniiciat, eaue ad ignem liquefaciat, Quandiu quidem liquida fuerint, non apparet vtrum tandem horum superet, vbi vero congelata fuerint, tunc iam conspicuum est, quòd adeps ceram copia exuperat. Sic habet etiam masculi ac foeminae genitura. Quòd vero & in foeminâ, & in viro, genitura foeminea sit ac mascula, ex manifestis factis coniectare licet. Multae enim mulieres iam foeminas pepererunt ex propriis viris, verum ad alios viros transgressae, masculos genuerunt. Et viri illi ipsi apud quos mulieres foeminas pepererunt, ad aliarum mulierum mixturam progressi, masculos genuerunt. & quibus masculus sexus gignebatur, aliis foeminis permixti foemineam sobolem genuerunt. Atque hæc sanè ratio declarat tum virum, tum foeminam, & foemineam, & masculam genituram habere. Nam apud quos viros, foeminas pariebant, superabatur fortius semen à copia debilioris, & gignebantur foemelæ. Apud quos vero masculos pariebant, superabatur debilius, & gignebantur mares. procedit autem non semper ab eodem viro genitura fortis, sed neque semper debilis, sed aliàs alia, atque sic etiam in muliere res habet, vt minime mirandum sit, easdem foeminas, eosdemque viros, sobolem masculam & foemineam producere. Habet autem & in brutis geniturae foeminae ac masculae ratio eodem modo. Et in ipsa genitura egreditur & foemineum, & masculinum,

Semen masculum & foemineum in utroque inesse.

Cur mares modo, foeminae modo gignantur.

Cur permutato coniugio permiscetur & soboles.

HIPPOCRATIS LIBER

*Partus si
militudi-
nis varie-
tas.*

ab omni corpore, & à debilibus debilis, & à fortibus for-
tis: & necesse est sic in partum distribui. Et ex quacunque
corporis viri parte plus prodierit in genituram, quàm mu-
lieris, partus ille magis similis erit patri. Vndecunque vero
à corpore mulieris plus venerit, magis assimilabitur matri.
Est autem impossibile, partum per omnia matri similem ef-
se, & patri nihil: aut vice versa, neque alteri quicquam si-
milem esse: sed vtrisque necesse est in aliquo similem esse,
siquidem ab vtrisque corporibus semen in partum procedit.
Vter autem tandem plus contulerit ad similitudinem, & à
pluribus corporis regionibus, illi magis similis est. Contin-
gitque aliquando vt filia nata maiori ex parte, magis simi-
lis sit patri quàm matri, & filius natus aliquando magis si-
milis est matri quàm patri. Atque hæc tam multa à me rela-
ta declarant superiorem sermonem, Quod & in muliere, &
in viro, tum mascula, tum fœminea genitura existat. Con-
tingit autem & hoc. Quandoque partus tenues & debiles

*Cur nō va-
lidi ex va-
lidis ge-
gnantur.*

*Cur oēs
partus nō
validi e-
dantur.*

generantur, ex patre & matre crassis ac robustis: & si qui-
dem multis iam generatis pueris tale quid contingat, ma-
nifestum est quod fœtus in vtero ægrotauit, & ab vtero
quid de suo ipsius incremento foras produiuit, vtero nimi-
rum amplius hiante: & propterea debilis factus est. Vnum-
quodq; autem animal iuxta proprium robur ægrotat. Si ve-
ro omnes pueri nati debiles fuerint, vteri ipsi in causa sunt,
angustiores quàm oportet existentes. Si enim non habue-
rint spaciositatem, in qua fœtus nutriri possit, necesse est
ipsum tenuem fieri, vtpote qui non habeat satis amplum lo-
cum ad incrementum capiendum. Si vero habeat satis am-
plum locum, & non ægrotet, verisimile est ex magnis pa-
rentibus magnam sobolem generari. Habet autem res hoc

*καρὰ-
δελύμα
à cucume-
re.*

modo, Quemadmodum si quis cucumerem qui iam deflo-
ruit, sit autem adhuc tenellus, & in cucumerario adhuc ad-
hæreat, ponat ac immittat in vas angustum, æqualis ac simi-
lis euadet cavitati ipsius vasis. Si vero quis eundem in vas
amplum indet, quod verisimile sit cucumeris capax esse, sed
non valde multo maius quàm pro cucumeris natura, æqua-
lis itidem ac similis erit cucumis vasis ampli cavitati. Nam in
augefciendo cum vasis cavitare contendit. & ferme omnia
nascentia sic habent, quo modo quis ipsa cogat. Sic sanè &
in pue-

A in puero se res habet. Si enim spatiositas ipsi contigerit in
 augeſcendo, maior euadet: ſi vero anguſtia, minor. At ve-
 ro mutilum in vtero puerum, ſentio aut contuſum ex ma-
 tris vterum geſtantis plaga, aut eiufdem lapſu, aut alio quo-
 piam violento affectu matri accidente, mutilatum eſſe. Qua
 vero parte mater plagas acceperit, ea puer mutilatur. Si ve-
 ro amplius contundatur fœtus, ita vt pellicula ipſum con-
 tinens rumpatur, perditur fœtus. Quin & alia huiuſcemo-
 di cauſſa pueri mutilantur. Quum in vtero iuxta locum in
 quo mutilatus eſt fœtus, anguſtia fuerit, neceſſe eſt corpus
 quod in anguſtia mouetur mutilari, iuxta illum locum.
 Quemadmodum etiam arbores quæcunque in terra ſunt, &
 non habent ſatis amplum locum, verum à lapide, aut ali-
 qua alia re impediuntur, quum emergunt obliquæ ac tor-
 tuoſæ ſunt, aut hac parte craſſæ, altera tenues. Sic accidit
 etiam circa puerum, ſi in vtero iuxta aliquam corporis par-
 tem, anguſtior altera vteri pars altera fuerit, Ceterum quòd
 ex mutilatis hominibus ſani & integri gignantur pueri, vt
 plurimum contingere ſolet. Habet enim multilatum, nu-
 mero omnia quæ ſanum. Vbi vero morbus aliquis ipſis, &
 humido ipſorum acciderit, à quo ſemen prouenit(quatuor
 ſanè quum ſpecies ſint humidi, quæ naturaliter in corpore
 exiſtunt) genituram non totam exhibent, debiliorem au-
 tem, iuxta mutilatam partem. Quare nihil miri mihi vide-
 tur, ſi etiam mutilentur, quemadmodum parens. Et hæc
 mihi de hoc dicta ſufficiant. Redibo autem rurius retro ad
 ſermonem quem dicere reliqui.

*Cur mutis
 lati.*

*Sæper feri-
 me ſani
 & inte-
 gri ex mu-
 tilis naſcu-
 tur.*

e ij Hippocra-

HIPPOCRATIS LIBER
HIPPOCRATIS COI
 LIBER DE NATURA
pueri siue fœtus, Iano Cor-
nario medico physico
interprete.

Et de hoc Galenus dubitat Hippocratisne an Polybi sit.

*Quid agat
 semen in
 uulua cum
 remansit.*



*Omnia
 ardentia
 spiritum
 emittant.*

*Ligna ui-
 ridia cū ar-
 dent cur-
 flatum spi-
 ritumne
 emittant.*

I genitura ab vtrisque permanse-
 rit in vtero mulieris, primū qui-
 dem simul miscetur, vtpote mu-
 liere non quiescente, coacerua-
 turque ac crassa per calorem eua-
 dit. Deinde spiritum concipit,
 nempe in calido existens, & po-
 stea matre spirante. Deinde vbi
 spiritu repleta fuerit, viam hic ip-
 se sibi ipsi foras facit, & per mediā
 genituram spiritus erumpit. Quum autem spiritui calido
 via foras facta est, rursus alius frigidus à matre inspirat, at-
 que hoc facit per omne tempus. Calescit enim vtpote in ca-
 lido existens, & frigidum spiritum concipit à matre spiran-
 te. Omnia autem quæ calescunt spiritum habent. Spiritus au-
 tem erumpit & sibi ipsi viam facit, ac foras procedit. Id autē
 quod calescit rursus in seipsum alium spiritum frigidum tra-
 hit, per fissuram vnde nutritur. Atque hoc contingit etiam
 in lignis, & in foliis, cibisque ac potibus, si fortiter caleant.
 Eius rei notionem ligna ardentia exhibent: omnia enim li-
 gna hoc faciunt, maxime vero subuiridia. Emittūt enim spi-
 ritum iuxta sectionem. Spiritus autem quum foras procedit
 circum cæsuras volutatur, id quod semper fieri videmus. Ma-
 nifesta igitur est ratiocinatio de spiritu, quod calidus existē-
 in ligno, attrahit alterum frigidum à quo nutritur, & à seip-
 so dimittit. Nam si non alterum pro eo quem à se dimittit
 attraheret

A attraheret, non volutaretur spiritus foras prodiens. Omne enim calidum frigido moderato nutritur. Et ubi percalfactum fuerit humidum quod est in ligno, in spiritum mutatum foras procedit, & qua parte foras exit, ea ipsa calidus qui inest adhuc in ligno, alterum frigidum spiritum eius loco attrahit, à quo nutritur. Idem faciunt & folia viridia. Quum enim incenduntur spiritum concipiunt, deinde erumpit spiritus & viam facit, forasque prodit & circumvolutatur, procedens autem strepitum facit, qua parte inspirationem præbet. Quin & legumina & frumenta, & arborei fructus nunc generis calefacta spiritum habent, qui fissura facta foras prodit, & si humida fuerint, ampliorem spiritum emittunt, & rimam maiorem faciunt. Et quid multis verbis opus est? Omnia quæcunque calefiunt, spiritum emittunt, & aliud frigidum vicissim eius loco attrahunt, à quo nutrimentum sumunt. Atque hæc necessitates ea gratia à me productæ sunt, ut cognoscatur quod genitura in utero calefacta spiritum habet, & emittit. Simul autem & à matre spirante, genitura spiritum habet. Quum enim mater frigidum attraxerit ex aere in seipsam, fruitur eo etiam genitura. Calida autem est, utpote in calido existens, & tunc sanè spiritum habet, ac emittit, atque ipsa genitura inflata pelliculam acquirit. Circundatur enim quod forinsecus circum ipsam est, continuūque euadit, utpote viscosum existens. Quemadmodum in pane dum torretur, tenue quiddam pelliculæ specie in superficiem abscedit ac extat. Calefcens enim panis & inflatus eleuatur, qua parte vero inflatur, isthuc pelliculæ species excitatur & consistit. Genituræ autem calefactæ ac inflatæ ex toto, pellicula forinsecus circundatur. Verum iuxta medium genituræ, spiritui transitus extra ac intro fit per pelliculam, & hac parte tenuitas pelliculæ à genitura distat, & paucissimum quid de genitura inest. Ipsa autem reliqua genitura rotunda est in pellicula. Atqui genituram quæ sex diebus in utero mansit, & foras prolapsa est, ipse vidi, & qualis tum animo meo obuersabatur, ex illis ipsis reliquorum coniecturam facio. Ut vero ego viderim genituram sex dierum existentem enarrabo. Mulieris nobis familiaris famula cantrix magnæ existimationis ex virorum consuetudine erat, quam in ventre concipere non conueniebat, ut ne minoris existi-

Folia uiridia cū cōburuntur spirant.
Legumina & poma similiaque calefacta spiritū cōcipiunt.
Quid agat semen cura in uulua remansit

Quali specie fuerit semē quod sex dies in

HIPPOCRATIS LIBER

*mulua mā-
serat.*

*Semen in
mēbrana
molli tan-
quā ouum
cōtinetur.*

*Fœtus in
utero quō
crescat.*

*Quo sen-
sim crescit
fœtus.*

mationis redderetur. Audierat autem cantrix ipsa, quæ alia mulieres inter se dicunt, quod quando mulier conceptura est in ventre, genitura non egreditur, sed intus manet. Auditis autem his atque intellectis, hoc semper obseruauit, & quam quandoque sentiret genituram non exeuntem, dominæ exposuit, & sermo statim ad me peruenit. Ego vero quum audissem, iussi ipsam ad terram saltare, & postquam septies iam exiliisset, genitura in terram profuxit, & strepitus factus est, atque illa conspecta ipsa ammirata est. Qualis autem erat ego referam: velut si quis ouo crudo externam testam circum circa adimat, in interna vero pellicula inclusus liquor pellucescat. Modus quidem talis erat, & ut abunde dicam, ruber erat liquor & rotundus. In pellicula vero fibræ quædam albæ ac crassæ inesse videbantur, cum cruore crasso & rubro obuolutæ: circum autem pelliculam foris cruenta vestigia instar sugillatorum, iuxta medium vero tenue quid eminebat, quod mihi vmbilicus esse videbatur, & per illum sanè spirationem extra & intro primum facere apparebat: quin & pellicula genituram ambiens ac complectens, tota ex illo tendebatur. Talem sanè ego genituram sex dierum existentem vidi. Referam autem & aliam dinotionem, omni cupienti de hoc scire, qui mihi paulo post hanc manifeste apparuit, & testimonio esse potest omni meo sermoni, quod verus est, quantum homini de huiusmodi re dicere datur. Atque hæc mihi de hoc dicta sunt. Quod genitura in pellicula est, & spiritum habet intro & foras, & augefcit à matre sanguine in vterum descendente. Menses enim non prodeunt, vbi mulier conceperit intra seipsam, si puer sanus fuerit, & permanere debet, nisi in quibusdam primo mense modicam sui indicationem faciant. Verum sanguis à toto corpore mulieris descendens, in orbem forinsecus pelliculam circumstat, Simulque cum spiritu sanguis intra per pelliculam trahitur, qua parte perforata est, & à genitura distat, congelaturque & futuro animali augmentum præbet. Quum autem tempus accesserit, rursus alix pelliculæ intra primam pelliculam tenues & multæ circuntenduntur, eo modo quo prima pellicula facta fuit. Sunt autem & hæc ab vmbilico extentæ, & inter se

mutua

- A** mutua ligamenta habent. Quū vero iam hoc factū est, ex descendente à matre sanguine & congelato, caro fit. Iuxta mediam autem carnem umbilicus distat, per quem spirat, & alimentum ac incrementū capit. At vero mulier quum vterum gerit, à mensibus non prodeuntibus propterea non dolet, quod sanguis non conturbatur, acervatim abire solitus singulis mensibus, sed procedit sensim & modice citra dolorem, quotidie in vterum ipsum, & quod inest intus in vtero augetur. Singulis autem diebus ea gratia procedit, & non semel per mensem, quod genitura in vtero existens semper à corpore trahit, prout vires, tum ipsa, tum spiratio habet. Et primum quidem modica spiratio fit, & sanguis modicus à matre procedit. Quum vero spiratio amplior redditur, magis sanguinem trahit, & vberior is in vterum descendit. Atqui vterum non gestantibus, ubi menses non prodierint, propterea dolor oboritur. Primum quidem sanguis in corpore singulis mensibus turbatur ab huiusmodi necessitate, quod mensis à mense multum differt, & secundum frigiditatem, & caliditatem. atque hoc percipit mulieris corpus, humidius enim est quam virile. Vbi autem turbatus est sanguis, & venas implevit, ab ipso descendit, qualis ab initio naturæ fuit. Quare si quidem euacuatur à sanguine mulier, in ventre concipit. si vero repleta fuerit, non. Nam vacuis vteris, & venis à sanguine factis, mulieres in se foetus concipiunt. Etenim post mēstrui sanguinis purgationem mulieres in ventre concipiunt. Causa iam dicta est. Quando autem conturbatus & secretus sanguis foras non procedit, sed in vteros, vteri autem non hauerint, tunc sanè à sanguine diutius immorante vteri calefcentes, reliquo corpori calorem transfunt, quandoque etiam sanguinem in venas corporis distribuunt, ut & venæ repletæ doleant, & tumores laxos producant. Quandoque etiam periculum est ne claudicatio ex hoc inducatur. Aliquando & vesicam obfidunt, premuntque ac claudunt vesicam, & urinæ stillicidium inducunt. Aliquando pleni quoque sanguinis existentes vteri procidunt, aut ad coxendices, aut lumbos, & dolorem exhibent. Aliquando ubi sanguis quinque aut sex menses in vteris moram traxit, putrefactus pus fit, & quibusdam pus per pudendum exit. Sunt etiam quibus circa inguen velut tuberculum
- Fœmina cum uterum gestat menses cur non laquet*
- Mulieres quæ gravidæ non sūt, & menses cur male habent.*
- Fœminæ menstruis carētes non concipiunt.*
- Sanguis in utero retentus totum corpus afficit.*
- Menstruum diutius retinentibus.*
- e iiij culū

HIPPOCRATIS LIBER

*que æpri-
tudinē cō-
tingant.* culum sit, illicque suppuratum exit. Sed & alia multa huius-
modi mala mulieribus fiunt, ubi lunares purgationes non
procedunt. Sed quid opus est ea hic recensere? Referen-
tur enim in muliebris morbis. Verum iam repetito eo

*Caro cum
gignitur
quid fiat.*

*ἡ ὁμοί-
οσις
τοῦ σώματος
πρὸς τὴν
ἐκείνου.*

*Similitu-
dine hanc
considera.*

quod reliqui, sermonem absolvam. Quum autem genera-
tur caro, tunc pelliculae augescere in utero sanguine, etiam
ipsae augentur ac sinuantur, & praesertim externae. Et san-
guis à matre descendens, quem sanè caro spirans attraxerit,
in incrementum cedit, & si utilis non sit, in sinus pellicula-
rum secernitur: & ubi sinuatae factae fuerint, ac sanguinem
susceperint, tunc iam secunda appellatur. Et tantum de hoc
mihi dictum sit. Cæterum caro augescens à spiritu articu-
latur, & abit in hac unumquodque simile ad simile, densum ad
densum, rarum ad rarum, humidum ad humidum, & unumquod-
que in propriam regionem abit, iuxta cognationem, ad id
à quo genitum est. & quaecunque à densis genita sunt, densa
sunt: & quaecunque ab humidis, humida: & reliqua iuxta
eandem rationem fiunt in incremento. Et ossa durefcunt à
calore conglutinata. Et sanè ramificantur velut arbor, &
tum interna, tum externa corporis, adhuc melius articulan-
tur: Ipsumque caput distantiam acquirit ab humeris, & bra-
chia ac cubiti à lateribus: & crura inter se disparantur: & ner-
vi exiliunt circum naturas articulorum: & os per se diduci-
tur, & nasus, & aures eminent in carne, ac perforantur. & oculi
implentur humore puro, & pudendum conspicuum fit utrum
tandem sit: & viscera coarticulantur: & iam etiam supernis
partibus spirationem facit, tum ore, tum naribus: & venter
inflatur, & intestina inflata supernè, per umbilicum spiritum
assumant, ac disperdant: & in podicem via sit à ventre ac in-
testinis foras, & in vesicam via foras. Atque hæc omnia à spiri-
tu coarticulantur, Nam inflata disparantur omnia, iuxta co-
gnationem. Etenim si velis fistulam vesicae alligare, & per fi-
stulam immittere in vesicam, terram & harenam, & plumbi
tenuia ramenta, in superque infusa aqua in fistulam inflare,
primum quidem illa aquae permisceantur, deinde vero tem-
poris progressu inflata secedent, & abibit plumbum ad plu-
bum, harena ad harenam, terra ad terram. Et si quis ipsa a-
refieri permittat, & diffracta vesica contempletur, inueniet
simile ad simile progressum esse. Sic sanè etiam genitura &
caro

A caro coarticulatur, & vnumquodque in ipsa simile ad simile abit. Atque hæc mihi de hoc dicta sunt, & factus iam est puer, & ad hoc peruenit foemella quidem in quadraginta & duobus diebus vt longissime, primam coagmentationem ac coarticulationem accipiens. Masculus vero vt longissime, in triginta diebus. Vt plurimum enim hoc tēpore, aut paulo breuiore, aut paulo longiore, articulatio ipsis contingit. Nā & purgatio fit à partu vt plurimum, in foemellis quidem, diebus quadraginta & duobus: atque hæc tardissima est, & perfecta. Vacauerit autem periculo, etiam si in viginti quinque diebus purgetur. In masculo vero purgatio fit diebus triginta: atq; hæc tardissima est, & perfecta. Citra tamē periculum

B fuerit, etiam si in viginti diebus mulier purgetur. Postremo autem tempore purgatio quàm paucissima procedit, & in iunioribus paucioribus diebus purgantur, in senioribus vero pluribus. Cæterum maxime laborant ac dolent in partu, & partus purgationibus mulieres primiparæ, & quæ rarius pariunt magis dolent, quàm quæ sæpius. Atqui purgationes à partu mulieribus ea gratia sunt, quòd primo tempore vsque ad dies quadraginta duos in foemella, in masculo vero ad dies triginta, paucissimus sanguis in augmentum pueri descendit. Ab hoc autem tempore copiosior, donec pariat. Oportet itaque purgationem reddi in toto puerperij tempore, & foras exire ac respondere pro dierum ratione ac proportionem. Principium autem huiusmodi purgationis tale mulieri fit. Dum ex partu laborat, conturbatur sanguis mulieri, & à forti pueri motu vehementer calefcit. Conturbatus autem, primus quidem foras prodit. Deinde puer, post puerum vero, mucus crassus sanguinolentus, & deductio contingit huic, quemadmodum aquæ effusa in mensa. Postea post illum per omnes dies purgatio procedit, vsque ad prædictum tempus, copia Atticæ heminæ vnius & dimidiæ primum, aut paulo plus minúsque, pro eius temporis ratione, donec desinat. Procedit autem sanguis velut à victima, si sana est, & sana futura est mulier, & statim congelatur. Si vero mulier sana non est, neque sana futura est, purgatio paucior procedit, & specie deterior, & non cito congelatur. Id vero hoc modo habet. Si mulier vterum gestans morbum habuerit non cognatum, in puerperij purgatione perit.

*Tēpus cō
formatiōis
in utero.*

*Quæ fe-
minæ plus
minúsque in
partu, puer-
periorū
laborant.*

*Quo pacto
factus erit
pāt.*

Si vero

HIPPOCRATIS LIBER.

Si vero nō purgetur in prioribus diebus vterum gerens, sta- D
tim sana existens, aut etiam non, commoueatur autem ip-
sa purgatio siue à pharmacis, siue sua sponte de repente, iu-
xta dierum rationem procedet, quibus non vna vice proce-
dit. Si enim non purgetur mulier à purgationib. partus, mor-
bus magnus ipsam corripiet, & periculum vitæ incurret, nisi
cito curetur, & quis conuenientem ipsi purgationem indu-
cat. Hæc propterea produxi vt ostenderem quod in pueris
membrorum discretio longissima contingit, in foemella in
quadraginta duobus diebus, in masculo in triginta. Argu-
mento est purgatio à partu, quæ in foemella fit in quadragin-
ta duobus diebus, in masculo in triginta, vt tardissime con-
tingat. Repetam autem iterum eandem rem iisdem verbis,
maioris lucis ac declaratiōis gratiā. Dico enim talionem re- E
pendi, quod genitura in vtero existenti paucissimus san-
guis à matre in vterum venit, si foemineam genituram ha-
beat, in quadraginta duobus diebus, in his enim coarticula-
tur puerorum membra: ab hoc vero tempore copiosior san-
guis venit. Et in masculo rursus iuxta rationem dierum tri-
ginta. Quod vero hæc vera sint, etiam alterum testimonium
adeft, hoc modo habens. Primis diebus vbi genitura in vte-
ros illapsa est, paucissimus sanguis à muliere in vteros venit.
deinde copiosior. Si enim acruatim & multus semel veni-
ret, genitura spirationem habere non posset, sed sanguine
multo accedente suffocaretur: Rependitur autem in pur-
gatione vice versa, purgatio enim puerperij in primis die-
bus plurima procedit, deinde paucior, donec desinat. Mul- F
tæ autem mulieres puerum masculum iam perdiderunt pau-
lo ante trigessimum diem, & inarticulatus apparuit. Qui
vero posterius perditum sunt, aut simul cum trigesimo die,
omnes articulati apparuerunt. In foemella itidem iuxta ra-
tionem quadraginta duorum dierum habet, Nam vbi his ab-
solutis perditur, articulatio membrorum apparet. Siue autē
prius siue posterius perdetur puer, iuxta hanc rationem ap-
paret. Nam & secundum rationem, & necessitatem, articula-
tio contingit in foemella, in diebus quadraginta duobus, in
masculo, in triginta. Testimoniū enim præbent abortus pue-
rorum, & à partu purgationes. Quod autem foemella poste-
rius conformatur ac coarticulatur, causa hæc est: quod ge-
nitura

*Puerpe-
ræ cū non
pene pur-
gatur, pe-
riclitatur.
Purgatio-
nes quot
dieb⁹ fiat.*

*Quādo ab-
ortus in-
formes.*

*Puella cur-
tardius cō-
formetur.*

- A** nitura fœminea debilior est ac humidior quàm mascula, & iuxta hanc rationē necesse est posterius conformari fœmelam quàm masculum, atque ea gratia etiam purgatio diuturnior est in fœmella quàm masculo. Redibo autem rursus retrò vnde digressus sum. Postquā iam articulatus fuerit puer, speciebus membrorum ipsius augescantibus, tunc & ossa duriora fiunt, & cauātur, atque hæc à spiritu fiunt. *Cava ossa existētia trahunt ad sese à carnibus quod in sanguine est pinguis- quid agāt.*
- B** guissimum; & progressu temporis ramificantur rursus extremitates ossium, quemadmodum arboris extremitates postremum ramos spargunt, sic & in puero digiti manuum ac pedū inter se disparātur. In ipsis autem extremitatibus vngues enascuntur. *Digititā- quā ramus sculi postremo disceruntur.*
- C** Desinunt autē venæ hominis omnes in digitos manū ac pedum. Et crassissime quidē sunt venę totius corporis, venæ capitis, deinde crurū, & brachiorum ac cubitorum. In pedibus autē & manibus, tenuissimæ ac dēssimæ & plurimæ venę sunt. Nerui item tenuissimi ac dēssimi & plurimi, & ossa magnitudine minima, atq; hæc maxime in digitis manū ac pedum existunt. Verū ex digitis, utpote ossa densa ac parua habētibus, venas itidem ac nervos, sic etiam vngues tenues ac densi nascuntur, & intercipiunt ac cōcludunt venarū extremitates, ut ne amplius augeant, neq; altera alteri præmincat: ut nihil miri sit vngues in extrema corporis parte dēssimos esse, ex dēssimis enim cōstant. *Cur densi ungues.*
- Simul autē cū vnguibus, etiā capilli in capite radicātur. Ceterū *Capillus, pilus & quo loco frui- cet.*
- C** pilorū natura hoc modo se habet. Oriuntur equidē maximi ac plurimi, qua corporis parte cuticula rarissima est, & vbi pilus moderatum humorem in alimentū habet: & vbi cuticula posterius rara fit, ibi etiam pili posterius nascuntur, velut in mento, & pube, & sicubi aliās pili nascuntur. Simul enim vix genitura prodit, etiam caro rarefcit, & cuticula & venæ aper- *Seminis per uenas uis quan- do fiat.*
- riuntur magis quàm priori tempore. Nam dum adhuc puer est, & venæ tenues existunt, non procedit per ipsas genitura, eadem ratio de mensib. virginum est, Simul autem ut via fit & genituræ, & mensuris virginibus, etiam pilos emittit pubes, tum pueri, tum virginis, rara nimirum cuticula reddita, *Virgæcu- lis cur in- terdū mē- ses nō sint.*
- simulque pilus moderatam humiditatem in alimentum habet, & non pauciorē. Sic vero & in mento viri cōtingit. Rara enim fit cuticula, procedēte in ipsam de capite humiditate, *Puberta- tis causa.*

HIPPOCRATIS LIBER

**Cute us-
lata pilus
nō fruticat
Eunuchi
quare non
pubescant.**

**Caluiti
caussa.**

**Eunuchi
non calui-
scunt.**

**Canicis
cur**

**Canis cur
in ortu.**

**Quotus in
utero for-
mouetur.**

Simul enim & in coitu, simulq; interiecto tempore, pilus mo-
 deratam humiditatem in alimentum habet, & tunc maxi-
 me, quum tempus contingit humiditati de capite descenden-
 ti in coitu, ad mentum à pectore distans. Signum autem eius
 quod in rarissimis cuticulæ partibus pili enascuntur: si quis ve-
 lit inurere cutem, & pustulam tantum facere, eamque sanare,
 cutis densa reddita per cicatricē pilos nō producet. Quicun-
 que vero Eunuchi dum pueri sunt fiunt, propterea neque in
 pube, neque in mento pilos producant, leuēq; toti existunt,
 quod via genituræ non facta, cuticulam non rarefacit per to-
 tam superficiē. Intercepta est enim ac conclusa genituræ via,
 quemadmodum paulo ante à me relatum est. At vero mulie-
 res leues fiunt, & mento, & corpore, quod in coitu ipsarum
 humiditas non similiter agitata velut viri, cuticulam raram
 non facit. Quicūque autem calui fiunt, hi sanē pituitosi sunt.
 & pituita in capite ipsorum simul cum coitu agitata & calfa-
 cta, ad cuticulam allabens pilorum radices exurit, & defluunt
 pili. Verum Eunuchi propterea calui non fiunt; quod vehe-
 mentem motum non faciant, neque pituita in coitu calfacta
 pilorum radices exurit. Ceterum cani ob id fiunt quod lon-
 go tempore pertransiente in homine humiditate, albissimū
 eius secernitur, & ad cuticulam allabitur, & pilus albidiorē
 humiditatem trahēs albidior fit quàm priori tempore, itē-
 que ipsa cuticula, præsertim vbi cani sunt, albidior alia eu-
 dit. Et quicunque ex natiuitate canum quid in capite habēt,
 etiam illis cuticula summa vbi cani sunt, reliqua albidior exi-
 sit. Illic enim albissima est humiditas. Habet autem res hoc
 modo. Qualemcunque humiditatem caro attraxerit, siue al-
 bam, siue rufam, seu nigram, tali colore etiam pilus inficitur.
 Atq; hæc de hoc dicta sunt, Redibo autem rursus ad sermo-
 nem relictum. Quum itaque extremitates corporis pueri fo-
 ras ramos sparserint, & vngues ac pili radices egerint, tunc
 iam etiam mouetur, & tempus ad hoc fit, masculo quidē men-
 ses tres, foemellæ vero quatuor. Sic enim vt plurimum contin-
 git. Sunt autem aliqui pueri qui ante hoc tempus mouentur.
 Mouetur autem primum masculus, quia fortior est quàm foe-
 mella; & primum quoque conformatur masculus. nam à forti-
 ore & crassiore genitura fit. Quum autem mouetur foetus,
 tunc sanē lac indicationem sui, matri præbet. Mammæ enim
 attolluntur

- A attolluntur, & papillæ gliscunt ac turgent, Lac vero non prodit: & in mulieribus densam carnem habentibus, lac posteriori significationem de se præbet ac prodit, in rarâ vero carnem habentibus, prius. Lac autem ob huiusmodi necessitatē *Lac cur fiat.* Quum uteri tumidi præ puero sunt, ventrem mulieris comprimūt: eius autem pleni ubi compressio cōtigerit, pinguiſſimum de cibis ac potibus foras proſilit, in omentum ac carnem. Quæmadmodū si quis corium illinat multo oleo, & imbibere permittat, & ubi imbibit, corium ipsum premat, oleum *Th ô μολοῖς οὐτ' ὀρθῶς* utique exilierit foras ex corio compresso. Sic etiam si venter pinguitudinē in se habeat à cibis ac potibus, comprimaturq; ab uteris, pinguitudo proſilit in omentum ac carnem. Et si rarâ carnis mulier fuerit, citius percipit eius perſultationem: si non, posterius. *Pecora grauida potu & cibo magis piguescūt.* Quin & pecora prægnantia si non ægrotēt, ab eodem potu ac cibo pinguiora propterea fiunt. Similiter autē & mulier. Et à pinguitudine calfacta ac alba existente, quod edulcatum est à caliditate, quæ ab uteris accessit, expresſum venit in mammas, & in uteros quoque parum venit, per easdem venas. Tendunt enim & in mammas & in uteros venulæ hæ, & conſimiles aliæ. Et ubi peruenerit in uteros de lacte, puer ipſo paululum fruitur, Mammæ vero suscepto lacte impletæ attolluntur. Et ubi peperit mulier principio motus facto, lac in mammas ipsas procedit, si lactauerit. Sic enim res habet. Dum mammæ lactant ac exuguntur, venulæ in mamas ampliores fiunt, ampliores autē factæ, à ventre pinguitudinē *Lactis corpora quado.* trahentes, in mammas distribuūt. Nam & vir si multū coeat, venæ ampliores redditæ, Venerē magis inducunt. Habet autem & hoc eo modo. Alimentum & augmentum puerorū fit, ubi ea quæ à matre veniunt, in uteros proceſſerint, & prout mater habet iuxta ſanitatē aut debilitatē, sic & puer habet. Quæmadmodum etiam quæ in terra crescent, à terra nutriuntur, & prout terra habuerit, sic etiam nascentia in terra habent. Etenim semen ubi deiectum fuerit in terram, humiditate quadam ab ipsa impletur. Habet enim in se terra omnigenum humorem, ut nascentia nutrire possit: impletum autem humore semen, inflatur & intumescit, & vis quæ in semine leuiſſima est, ab humore condensari cogitur, condensata autem à spiritu vis, & humore folia producente, semen rumpit, & primum folia foras emergūt. Ubi vero emerſerint, quæ *Quomodo ſata nascentur.*

HIPPOCRATIS LIBER

non amplius ab humore in semine existēte folia nutriri possunt, rumpitur inferne semen, itemque folia, & semen à foliis coactum, vim suam ad inferna demittit, quę videlicet in ipso restat propter gravitatem, & fiunt radices ex foliis distentę. Postquam autem planta iam firmiter radices inferne egerit, & alimentum à terra sumit, tunc sanè totum evanescit, & in plantam cōsumitur, præter corticem, qui solidissimus existit. Rursus autem cortex in terra putrefactus progressu temporis evanidus fit, & quędam folia ramos producant. Ex semine itaque tanquam ex humido nata plāta, donec quidem te-

*Quę terra
gignitur,
quomodo
procedant*

nera & aquosa fuerit, in augmentum superne ac inferne procedens, fructum excludere non potest. Non enim vim habet fortem ac pinguem, ex qua semen condensari queat. Vbi vero solidior facta est, & progressu temporis radices egerit, tunc iam & venas habet amplas, tum ad supernam, tum ad infernā partem; & tunc sanè nō amplius aquosum ex terra trahit alimentum, sed crassius & pinguius ac copiosius quod calfactū à sole efferuescit in extremitates, & fit fructus iuxta cognationem, ex quali etiam generatus est. Multus autem ex modico propterea fit, quod singula ex terra nascentia maiorem vim ex terra, quam ex eo unde generata sunt, trahunt, & efferuescunt non secundum vnum, sed secundum multa. Quum autem fructus prodierit, à planta sua nutritur. Planta enim à terra trahens, fructui transmittit. Sol autem fructum coquit, & solidum facit, quod aquosius in ipso est, ad sese trahens. Atque hæc mihi dicta sunt de his quę ex semine nascuntur à terra.

*Cur multa
ex uno gignantur.*

& aqua. Cæterū ex plantariis ab arboribus arbores fiunt, hoc modo. Ramus vulnus habet, qua parte ab arbore defractus est, in infima ad terrā parte, unde radices prodeunt. Pangitur autem, & in terram demittitur, hoc modo. Quum planta quę in terra existit, humorem acceperit à terra, tumescit & spiritum habet, quę vero pars supra terram eminet, nondum. Spiritus autem & humor condensans in inferna plantę parte vim, quantum eius grauissimum est, in infernam partē erumpit, & ex ipso radices tenerę fiunt. Postquam autem in infernam partem receptus fuerit, tunc iam ex radice humorem trahit, & parti supra terram eminenti transmittit: & tunc sanè rursus superna pars intumescit, ac spiritum habet, & quantum ex vi in planta leve inest, id ipsum congregatum germinat,

*Arbor quę
placetur,
crescitur.*

ac fo-

- A ac folia producit, & iam in supernam partem augmentum facit, itemque in infernam. Sic itaque contrarium contingit circa germinationem, in his quæ ex semine, & in his quæ ex plantariis proueniunt. Ex semine enim prius folium emergit, deinde radices in infernam partem demittuntur. Verum arbor primum radices agit, deinde folia acquirit, propterea quod in semine ipso humoris copia inest, & in terra quum totum insit, alimentum inest primum folio sufficiens, vnde folium nutritur donec radicetur. Verum in ramo non sic fit. Non enim gignitur ex altero, vnde folium primum alimentum habeat, sed ipse ramus est, & velut arbor habet, & multa ei⁹ pars supra terram eminet. Quare quum supra terram existat, humore impleri non potest, nisi ex inferna parte magna quædam vis procedens, in supernam humorē distribuatur. Et plantarium primo necesse est sibi ipsi alimentum sufficere à terra in radices, deinde vbi sic à terra attraxit, sursum distribuere, & folia ad germen & augmentum concitare. Quum autem augmentum cepit planta, à tali necessitate ramos spargit, quam referam. Quum plus humoris ipsi accesserit ex terra attracti, erumpit præ multitudine, qua parte quàm plurimus fuerit, & hac parte planta ramos emittit. augetur autem & in amplitudinem, & in supernam, & in infernam partem, propterea quod inferna terræ pars hyeme quidē calida est, æstate autem frigida. Atque hoc propterea contingit, quod terra humida est in hyeme, præ aqua de cœlo delabente, & comprimitur in seipsam, utpote humore grauiore existente: densior autem ab hoc ipso est, & nullam transpirationem habet. Non enim amplius magna raritas ipsi inest: & propter hoc inferna terræ pars hyeme calida est. Nam & finum densius accumulatum, intus calidius est, quàm quod rarum existit & aliàs, humecta ac compressa, à seipsis concalescunt, & breui à calore valde exusta putrescunt, neque enim permeat spiritus per ipsa, nimirum quum densa existunt. Si vero sicca fuerint, ac rarè posita, multominus calescunt ac putrescunt. Atque sic sanè frumentum ac hordeum humidum, ac madefactum, intus calidius est, quàm si siccum sit, & rare positum. Et vestes pelliceæ colligatæ ac fortiter compactæ, à seipsis comburuntur, velut ego vidi, quemadmodum ab igne exusta. Sed & alia si quis velit considerare, Omnia quæ comprimuntur à seipsis, calidiora

*Cur heri
ba & ar-
bores con-
trario mo-
do coale-
scunt,*

*Cur terræ
inferiora
hyeme cal-
lida, æsta-
te frigida
sint.*

*Cur humi-
da cū coar-
cescunt
calescant,*

HIPPOCRATIS LIBER

calidiora reperiet, quàm quæ rarè posita sunt. Non enim ha-
bent vnde frigiditatem inspirent à ventis. Sic etiam inferna
terræ pars quum plena sit, & ipsa à seipsa comprimatur, nimi-
rum grauis ac densa existens, ab humiditate in hyeme cale-
scit, nullam enim caliditatis perspirationem habet. Sed vbi
de cœlo aqua cadit in ipsam, quum spiritus prodierit ab ipsa
in terra, non vterius penetrat, vtpote terra densa existente,
sed spiritus retrò ad aquam abit: & propterea fontes ac ma-
rinae aquæ, hyeme calidiores sunt, & auctiores quàm æstate,

*Mare &
fontes cur
hyeme ca-
lescant, &
turgeant.*

quia spiritus dum exhalat, retrò abit ad aquam, quum terra
densior existat, & per se spiritum nō transmittat. Et aqua multa
existens quæ contingerit, ea perrumpens procedit, & viam si-
bi ipsi ampliorem facit quàm si modica existat. Aqua enim in
terra non consistit, sed semper in decliue procedit. Si autem
spiritum ab aqua prodeuntem terra per se hyeme transmit-
tat, paucior aqua ex ipsa procederet, & fontes hyeme magni
non essent. Atq; hæc omnia in hoc dicta à me sunt, quòd ter-
ræ inferna pars calidior esse apparet hyeme, quàm æstate.
Nunc autem dicere volo, quòd æstate frigidior quàm hye-
me, inferna terræ pars esse videtur. Terra æstate rara est & le-
uis, nimirum sole vehementius irruente, & ab ipsa humidita-
tes ad sese attrahēte. Habet autē terra in se semper aquā plus
aut minus. Spiritus autē omnes nobis sunt ab aqua. Id quod
sic se habere, vnde coniectare possis demonstrabo. Etenim ab
omnibus fluminibus ac nebulis spiritus semper procedunt.

*Nebula
quid.*

Est autem nebula aqua in aere cohærens & continua. Et tunc
sanè terra rara est ac leuis æstate, & aquā in se habet, & aqua
in decliue fluit, procedente autem aqua, semper inde alius ex
alio spiritus exhalat. Qui vero exhalat, per terram abit leuem
ac raram existentem, & frigiditatē terræ inducit, & ipsa aqua

*Non quicquid
est confir-
mat.*

simul perfrigeratur. Habet autem sic, Quemadmodum si quis
aquam in vtre existētem fortiter comprimat, & per punctu-
ram acus, vel paulo maiorem, perspirationem aquæ faciat, &
ipsum vtre in sublimi suspendat, nullus spiritus per foramen
procedat, sed aqua, non enim habet spaciositatem per quam
aqua spiritum emittat. Sic sanè se habet etiam hyeme aqua in
terra. Si autem aquæ in vtre locum satis amplum feceris, &
vtre in sublimi suspenderis, spiritus per foramen procedet.
Locum enim spiritus habet ab aqua mota, procedendi per
vtre,

A vitem, & propterea per foramen spiritus trāsit. Sic sanè se habet etiam æstate aqua in terra. Satis amplum enim locum habet, nimirum terra rara existente, & sole ab ipsa humorem ad se trahente, & pertransit spiritus, vtpote qui frigidus existit, ab aqua per ipsam raram existentem ac leuem. Ob hoc itaq; inferna ipsius pars æstate frigida existit, & aqua ipsa adhuc magis quàm spiritus, qui in terra frigidus existit, & ipsa in se ipsam, & in terram, spiritum emittit. Sed & aqua quæ hauritur in puteo spiritum semper mouet, velut flabellum, atq; hoc ipsum aquæ frigiditatem inducit. Quæ vero non hauritur æstate, sed stans densa existit, non similiter spiritum in se à terra suscipit, neque in terram à seipsa distribuit. & simul à sole, & aere in puteo non disperso, sed stante ac firmato, primum superficies ipsius calefit, deinde alia eius pars ad aliam deorsum caliditatem distribuit. & propterea aqua quæ æstate non hauritur, calidior est ea quæ hauritur. Quin & fontes valde profundi æstate semper frigidi existunt; & aqua hausta hyeme, terra calida existente, ex tali fonte, statim quidem calida est, vbi vero tempus progressum fuerit, frigida est ab aere videlicet frigidus existēte talis facta. Perflatur enim à vento, & spiritus per ipsam pertrāsit. Quemadmodum etiam aqua quæ æstate hauritur, vbi hausta fuerit, statim frigida est, calida autem fit postea, propterea quod terra rara existente, & spiritu in ipsa existente, perfrigeratur: Vbi autem haustæ tempus accesserit, stabilis fit, & calida conspicitur. Calefit enim ab aere calido existente, quemadmodum & aqua quæ non hauritur in puteo æstate, ob hoc ipsum calida redditur. Atq; hæc à me de hoc dicta sunt. Repetam autem rursus quod æstate inferna terræ pars frigida est, hyeme vero calida. Superna autem vice versâ. Et oportet arbori non duo calida simul accedere, neque duo frigida simul, si sana esse debet. Verum si quidem ex superna caliditas accesserit, ex inferna frigiditatem ipsi accedere oportet, & vice versâ, si ex superna parte accedat frigiditas, ex inferna caliditatem ipsi contingere oportet. Et radices vbi attraxerint, arbori transmittunt, & arbor vicissim radicibus. atque sic & frigidi & calidi conseruatio contingit. Quemadmodum homini ingestis cibis in ventrem, qui dum concoquuntur calefaciunt, perfrigerationem à potu facere oportet. Sic & arbori contrarium rependi oportet, ex infer-

*Cur aqua
hyeme ca-
lida, æsta-
te friget.*

*Fontis alti
qualis a-
qua.*

*Homines
sicuti arbo-
res nutri-
cantur.*

f na parte

HIPPOCRATIS LIBER

na parte ad supernam, & vicissim, & augetur arbor & in supernam, & in infernam partem, propterea quod alimentum ex inferna & superna ipsi accedit. Et quandiu quidem vehementer tenera fuerit arbor, fructum non producit. Non enim est in ipsa pinguis vis, neque crassa, quæ ad fructum conferre possit. Progressu autem temporis venæ in ipsa dilatata, pinguem ac crassam influxionem ex terra in ipsam faciunt, sol autem ipsam diffundens, ebullire facit utpote leuem existentem, in extremitates, & fructum producere. & tenuem quidem humiditatem à fructu sol auferit, crassam autem concoquens & calefaciens edulcat. At vero arbores non fructiferae, in se pinguitudinem tantam non habent, quantum eius in fructum est expendendum. Omnis autem arbor quum per tempus solida facta fuerit, & ex inferna parte radices firmit, iam penitus constanter augetur definit.

*Cur insitas
sua fructu
ferant.*

Quicumque vero in arbores, ab aliis arboribus oculos indiderit, & arbores in arboribus enatae viuunt, & fructificant non similem fructum arboribus, quibus insitas sunt, id ipsum tali modo contingit. Oculi primum quidem germinat. Alimentum enim habet primum ab arbore, ex qua ablatus est, deinde ab ea in quam insitus est. Vbi autem germinauerit, sic in arborem radices tenues à se demittit, & primum humore fruitur in arbore, in quam insitus est, existente, deinde tempore accedente, demittit radices in terram, per eam in quam insitus est, & fruitur humore, quem à terra trahit, & alimentum inde ipsi contingit, ut non mirum sit, insitas arbores, alios fructus producere, à terra enim viuunt. Hæc mihi de arboribus & fructibus dicta sunt ea gratia, quod indignum mihi factum videbatur, & ne poteram quidem, hanc tractationem semiperfectam relinquere. Redibo nunc rursus retrò ad illum sermonem, cuius gratia à me hæc de istis relata sunt.

*Partus ter-
renis com-
paratur.*

Censeo enim terræ nascentia omnia viuere ex terræ humore, & qualem terræ humorem in seipsa habet, talem etiam nascentia ex ipsa habere. Sic etiam puer uiuit de matre in utero, & quali mater sanitate prædita est, talem etiam puer habet. Quod si quis considerare velit ea quæ de his dicta sunt, ab initio usque in finem, inueniet naturam omnem consimilem esse, & ex terra nascentium, & hominum. Et hæc mihi de hac dicta sunt. Cæterum puer in utero existens manus apud genas habet, caput autem prope pedes: & non datur probe

*Pueri filius
in utero.*

ac certo

- A** ac certo cognoscere, etiam si puerum in vtero videas, vtrū caput sursum habeat, an deorsum. Verum ex vmbilico pelliculæ tentæ sunt ipsum continentes. Nunc autē referam dīnotionē, quam paulo ante me demonstraturum dixi, quantum humanæ menti possibile est manifestum existentem, omni qui de hoc cognosse velit, quod genitura in pellicula est, & quod iuxta medium ipsius vmbilicus est, & per illum sanē, primo spiritum in seipsam trahit, & foras emittit. & quod ex vmbilico pelliculæ tentæ sunt. Sed & aliam pueri naturam, quam dixi, sic totam habere vsq; in finē reperiet, quomodo videlicet à me in his sermonib; declaratū est, si quis testimoniis, & ocularibus inspectionibus à me producēdis vti velit. Etenim
- B** si quis oua viginti aut plura, quo pulli ex ipsis excudantur galinis duabus aut pluribus subiicere velit, & singulis diebus à secūda exordiēdo, vsque ad vltimam qua excudetur pullus ex ouo, subtrahere, confringere, ac videre, inueniet omnia se habere iuxta meum sermonem, quomodo volucris naturam, ad humanam conferre oportet. Quod enim pelliculæ ex vmbilico tentæ sunt, & reliqua quæ de puero dicta sunt, sic se habere in ouo volucris reperiēs, ab initio in finē. Atqui si quis nondum vidit, mirabitur in volucris ouo vmbilicum inesse. Atque hæc sic habēt, & sic à me relata sunt. Quando vero mulieri partus appropinquat, tunc puero se mouēte, & manibus ac pedibus calcitrante, pelliculam quandam internam rumpi contingit, rupta autem vna, etiam aliæ debiliorem vim habent, & rumpuntur primum quidē illi contiguæ & coherentes, postea extrema. Quum autē ruptæ fuerint pelliculæ, tunc fœtus à vinculo exoluatur, & agitated foras procedit. Neq; enim amplius robur habet pelliculis amissis, neq; vteri amplius puerum continere possunt, pelliculis velut dixi amissis, & ab ipsis abruptis. Cohærent enim pelliculæ etiam vteris, vbi circum puerum obuoluuntur, nō adeo vi valida ac multa. Quando autem procedit puer, violat & dilatat vteros in exitu, utpote teneros existentes. Procedit autem in caput, si secundū naturam prodierit. Grauiissime enim sunt ipsi superne partes, si ex vmbilico perpendantur. Quum autem in vteris est, magis cōtinens existit vsque ad pellicularū rupturam simul cum decimo mense, quando partus matri propinquat, & adest. Si vero violentam affectionem perperiarum puer, etiam ante
- f ij præfinitum

*Per ouum
hoc confire
mat.*

*Quo pacto
puer erū-
pit.*

*Caput
prius exit
si naturaliter
exeat.*

HIPPOCRATIS LIBER

præfinitū tempus ruptis pelliculis prodit. Quin & si alimen-
tum à matre prius puero defecerit, etiā sic partus matri prius
aduenit, & ante decimum mēsem puer prodit. Caterum quæ
longius quàm decem mēsum tempus vterum gestare sibi vi-
se sunt: nam hoc iam sæpe audiui, illæ ipsæ hoc modo quem
dicturus sum deceptæ sunt. Quum vteri spiritū acceperint in
seipsos, à ventre flatum exhibente, eleuantur ac intumescunt,
contingit enim hoc, Videntur sanè sibi mulieres tunc conce-
pisse. Præterea si menses non procedentes, congregati fue-
rint in vtero, & diutius manserint, semper perfluunt in vteros,
aliquando vnà cum flatu à ventre, aliquando etiam calescen-
tes, & sanè tunc quoq; in vtero habere mulieres sibi videtur,
nimirum mensibus non prodeuntibus, & vteris eleuatis. De-
inde aliquando menses sua sponte erumpunt, aut aliis super-
uenientibus à corpore in vteros, & priores protrudentibus,
& status egreditur, & multis iam statim post mensium purga-
tionem vteri hiant, & ad pudendum vertuntur, & tunc viris
permixtæ, ad se genituram concipiunt, eadem die aut om-
nino in paucis. Existimant autem in expertæ harum rerum
ac rationum, etiam illo tempore se in vtero habuisse, quando
menses non prodibant ipsis, & vteri erant eleuati ac tumen-
tes. Quòd autem non diutius quàm decem mensibus contin-
gar vterum gestare, ego demonstrabo. Alimentū & augmen-
tum quod à matre descendit, non amplius sufficiens est pue-
ro, vbi decē menses præterierint, & fœtus auctus fuerit. Tra-
hit enim quod dulcissimum est in sanguine ad sese, simulque
etiam lacte modice fruitur. Quum autem hæc ipsi rariora ac
pauciora sint, & puer plenus ac maturus existat, copiosius a-
limentum desiderans calcitrat, ac pelliculas rumpens, ini-
tium partus matri inducit. & hoc perpetiuntur magis mu-
lieres primiparæ: deficit enim pueris alimentum, vt ad deci-
mum usque mensem sufficere non possit. deficit autem per
hunc modum. Sunt quædā mulieres quibus sufficientes men-
ses purgantur, quædam quibus pauciores: hoc ipsum si sem-
per fiat, in natura, & genere, maternum ipsis existit. Quæ ve-
ro menses paucos demittunt, hæc etiam pueris postremo tem-
pore, vbi iam maturi fuerint, alimentum rarius exhibentes,
ipsos calcitrare faciunt, vt & ante decimum prodire festi-
nent. Modicus enim sanguis à iuueniculis ac nouellis matri-
bus pro-

- A** bus procedit: vt plurimum vero contingit tales mulieres etiā sine lacte esse, quæ paucos menses demittunt. Sicciores enim sunt, & densiorem carnem habent. Huic autem rationi, quod videlicet deficiente alimento prodit puer, etiam si nō aliqua violenta affectio ipsi accidat, etiā hoc testimonio esse potest. Volucris ex oui luteo nascitur, hoc modo. Incubante matre ouum calefcit, & quod in ouo inest à matre mouetur, calefcens autem id quod in ouo inest, spiritum habet, & alterum frigidum ab aere per ouum attrahit. Ouum enim adeo rarum est, vt spiritum qui attrahitur iussicientem ei quod intus est transmittat: & augetur volucris in ouo, & coarticulatur modo eodem ac consimili velut puer, quemadmodum iam antea à me relatum est. Nascitur autem ex luteo oui volucris, alimentum vero & augmentum habet ex albo, quod in ouo est. atque hoc iam omnibus manifestum factum est, qui animum aduerterunt. Vbi autem deficit alimentum pullo ex ouo, non habens id sufficiens vnde viuat, fortiter mouetur in ouo vberius alimentum quærens, & pelliculæ circum dirumpuntur, & vbi mater sentit pullum vehementer motum, putamen excalpens ipsum excludit. atque hæc fieri solent in viginti diebus, & manifestum est quod ita se habet. Vbi enim exclusa est volucris, nullus humor in oui testis inest, qui sanè memorabilis existat, expensus est enim in pullum. Sic etiam vbi auctus fuerit puer, mater non amplius sufficiens alimentum ipsi exhibere potest. Vberius itaque præfente alimentum puer quærens, calcitrando pelliculas dirumpit, & à vinculo exolutus simul foras prodit. atque hæc vt longissime in decem mensibus fiunt. Et secundum hanc rationem etiam pecorib⁹ ac feris partus aduenit, in tempore quo singula pariunt, non tardius. Etenim vnique animali necesse est tempus esse, in quo alimentum foetui rarius erit, & deficiet, & partus adest. Et quæ quidem paucius alimentum pueris præbent, citius pariunt. Quæ vero vberius, posterius. Atque hæc mihi de hoc dicta sunt. Porro diruptis pelliculis, si pueri momentum in caput inclinatum prædominabitur, mulier facile parit. Si autè obliquus, aut in pedes procedet, contingit enim hoc sæpe si momentum huc inclinarit, siue præ vterorum spaciositate, siue si mater in labore ex partu primum non quieuit: & si sic procedet, mulier difficulter pariet.

*Quæ paræ
lactis ha-
beant.*

*Hoc cōtra
Pliniū &
Aristotele
esse videtur.*

*Part⁹ quæ
do accedes-
rat.*

*Pecora si-
militer co-
nituntur.*

*Cur quæ-
dā tardius
quædā cer-
terius par-
riant.*

*Partus
qualis.*

HIPPOCRATIS LIBER

Quando in enixu matres par-tus per-eunt. riet. Multæ autem vel ipsæ perierunt, vel puer, aut simul ma-
tres vnà cum foetibus. Cæterum ex parientibus ac puerperis
maxime laborant primiparæ, propter inexperiencem dolo-
rum, & dolent quidem totū corpus, maxime vero lumbos ac
coxendices. Nam coxendices ipsarū disparātur. Verū exper-
te iam partus, minus primiparis dolent. Quæ vero multoties

Cur pri-miparæ magis in enixu la-borant. pepererūt, multominus dolent. Si porro in caput processerit
puer, caput primū foras prodit, deinde alia membra cōsequū-
tur, postremus aut vmbilicus. Ex vmbilico autē secunda tenta
est. Post hæc aquositas & mucus sanguinolentus tum à capite,
tum à reliquo corpore secretus, præ violentia & dolore ac calo-
re, atq; hic viā struit purgationi à partu cōsequenti. Post exi-
tum aut eius muci cructi, purgatio fit per tēpus antea relatū.

Caput prius exit, deinde cæ-tera. Et tum māmæ, tum reliqua mēbra quæ humidiora sunt, mulie-
ribus rūpūtur, minime quidē in primo partu, postea vero, put
plures pariūt, ita amplius rūpuntur, euacuatis venis præ part^o
purgatione. Atq; hæc à me de hoc dicta sunt. Gemelli autem
nunt ab vno coitu, hoc modo. Vteri sinus frequētes & curuos
habēt, alios remotiores, alios propinquiores pudendo. Et ani-
malia quæ multa gignūt, plures sinus habent, q̃ ea quæ pauca.

Qui gi-gnantur gemelli. Similiter aut habent & pecora & feræ, & volucres. Vbi itaq;
contigerit geniturā findi, & in duos sinus peruenire, & vteri
geniturā susceperint, & sinus alter ad alterū nō hiauerit, nec
dimiserit, segregata genitura in vtroq; sinu pelliculas induit,
& viuificat eodē modo quo vn^o foetus, quapropter vero id fiat
diximus. Quod vero ab vno coitu gemelli gignātur, hoc testi-

Canes & fures hoc cōfirmant. monio conitat. Est canis, & sus, & alia animalia, quæ ab vno
coitu pariūt & duo, & plura, & vnūquodq; animal in vtero, in
sinu ac pellicula existit: atq; hæc ipsi fieri videmus, & hæc om-
nia eadē die vt plurimū pariunt. Sic autem & mulieri ab vno
coitu gemelli facti, vterq; in sinu & pellicula est, & eadē die
vtrunq; parit, & alter prius foras procedit, & pellicula ipsius
siue secunda. Quod autē gemelli, foemella & masculus gene-
rātur, hoc causæ esse sentio. In muliere & in viro, & in omni
animali, in singulis & debilior, & fortior genitura inest, & nō
semel ac simul genitura procedit, sed & bis & ter ebullit ac
eiaculatur: & non est possibile omnem esse fortem, tum qua
prius exiuit, tum quæ posterius. In vtrum autē sinum, crassio-
rem ac fortiorem genituram ingredi contigerit, illic mascu-
lus gi-

A lus gignitur. In vtrum vero rursus humidiorē ac debiliore; illic foemella generatur. Si vero in vtrunque fortis ingreditur, ambo masculi fient. Sin debilis, ambo foemellæ. Atque hic sermo sic relatus totus finem habet.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE CARNIBVS,

Iano Cornario medico physico interprete.



B Go ad hūc vsque sermonem communibus sentētiis vtor, tum aliorum qui me præcesserunt, tum etiam meis. Necessē enim est commune principium sententiis supponere eum qui velit hanc de arte medica tractationem componere. Verum de rebus sublimibus in aere ac cœlo, neque opus habeo dicere, nisi quod quantum ad hominem & reliqua animantia, quæ sunt, & nata sunt, pertinet, demonstrabo, & quod anima sunt, & quod sanitas, & quod morbus, & quod in homine malum ac bonum, & unde moritur. Nunc autem ipse meas sententias profero. Et
C videtur sanè mihi id quod calidum vocamus, immortale esse, & cuncta intelligere, & videre, & audire, & scire omnia tum præsentia, tum futura. Huius igitur plurima pars, quum turbata essent omnia, in supernam circumferentiam secessit. Et videntur mihi ipsum veteres Aethera nominasse. Altera pars inferna, appellatur Terra, frigidum quid & siccum, & multis motionibus obnoxium, & in hac sanè multum calidi inest. Tertia pars aeris, medium locum occupauit, calidum quid ac humidum existens. Quarta vero pars terræ proximum locum cœpit, humidissimum quid ac crassissimū. Hæc itaque quum turbata essent, & in orbem circunvoluerentur, multa calidi pars in terra conclusa est, alibi maior, alibi minor, alibi valde pauca, alibi copia multa: & temporis pro-

Calidū calorū sol & æther quid possit.

Terra.

Aer.

Aqua.

HIPPOCRATIS LIBER

ris progressu terra à calido arefacta, hæc conclusa in ipsa pu-
tredines faciunt veluti tuniculas, & quantum quidem ex pu-
tredine terræ pingue fuit, & minimum humoris habuit, id
ipsum per multum tempus calefcens, celerrime exustum est,
& in ossa mutatum. Quæ vero glutinosiora fuerunt, & frigi-
ditate participarunt, ea calefacta exuri non potuerunt, ne-
que vero liquida fieri, propterea speciem alieniorem ab aliis
acceperunt, & nervi solidi facti sunt. Neque enim mul-
tum frigiditatis ipsis inerat. Verum venæ frigiditatis mul-
tum habebant, atque eius frigidi quantum circuncirca glu-
tinosissimum erat, à calido exassatum, membrana euasit. fri-
gidum vero quod erat, à calido superatum, dissolutum est,
& ob id liquidum factum. Iuxta eandem autem rationem
etiam fauces, & stomachus siue gula & venter, & intestina
in podicem vique, caua facta sunt. Quum enim frigidum
semper calefcet, quantum eius circuncirca glutinosum e-
rat, exassatum est, & membrana tunica facta est. Quod ve-
ro intra frigidum erat, colliquatum est, & factum est liqui-
dum. Non enim erat in ipso neque pingue, neque glutino-
sum multum. Iuxta eandem rationem etiam vesica. Multum
frigidum quod ipsam circuncirca conclusit, à calido calfa-
ctum, dissolutum est, & euasit liquidum, quum neque pin-
gue, neque glutinosum in ipso esset: quod vero supererat, tu-
nica euasit. Sed & de aliis quæ caua sunt eodem modo res se
habet. Vbi enim plus glutinosi quam pinguis erat, membra-
na tunica facta est. Vbi vero pinguis plus quam glutinosi, of-
sa facta sunt. Eadem ratio & ossium est. Vbi quidem non in-
erat glutinosi, verum pinguis & frigidi, citius exusta sunt
propter pinguitudinem, atque hæc ossa durissima & rigidis-
sima existunt. Vbi vero pingue & glutinosum similia sunt,
hæc ossa antrofa sunt. Et de his quidem sic habet. Frigidum
quidem congelat, Calidum autem diffundit, in multo vero
tempore etiam exsiccat. Vbi autem pinguitudinis aliquid
affuerit, citius exurit & ficit. Vbi vero glutinosum affuerit
frigo, citra pinguitudinem, exuri non vult, sed tempore ca-
lescens congelatur. Cæterum cerebrum sedes & metropolis
est frigidi ac glutinosi. Calidum vero pinguis sedes & me-
tropolis est. Quod enim calefcit primum omnium quum dif-
funditur pingue sit. Et propterea cerebrum, quia minimum
pingui-

Ossa unde

*Nervi quomodo
facti.*

Membra.

Fauces.

Stomachus, inter-

stina, ven-

ter usque

ad antrum ca-

ua cur.

Vesica.

Ossa qui-

fiunt cauas

que.

Cerebrum

quale.

A pinguitudinis habet, plurimum vero glutinositatis, à calido exuri non potest, sed tempore tunicam, membranam crassam accepit, circum membranam vero ossa, quantum calidum superauit, & in quibus pinguitudo erat. Sed & *Medulla spinæ cur proprie medulla non sit.* medulla spinalis appellata, à cerebro descendit, & non est in ipso, neque pinguis, neque glutinosi multum, quemadmodum & cerebro. & propterea neque nomen medullæ iuste possidet. Non enim est alij medullæ similis, quæ in aliis ossibus inest. Sola enim membranas habet, quas alia medulla non habet. Signa porro horum manifesta sunt. Si quis enim nervosa & glutinosa, itemque alia assare velit, alia quidem cito assantur, Verum nervosa & glutinosa assa-

B ri non volunt, minimum enim pinguitudinis habent. Pinguißimum autem & vnguinosum celerrime assatur. At vero viscera sic mihi constituta esse videntur: nam de venis prius à me dictum est. Cor multum glutinosi ac frigidi habet, & à calido calfactum, caro euasit dura & viscosa, & membrana circum ipsum, & cauum factum est, non quemadmodum venæ: & situm est in capite venæ cauißimæ. Duæ enim sunt cauæ venæ à corde, alteri nomen est arteria, alteri vena caua, iuxta quam cor situm habet. Et plus habet calidi arteria, quàm vena caua, & spiritum condit ac conseruat. Verum præter has duas venas, etiam aliæ in corpore sunt. Cauißima autem vena, ad quam cor situm est, per ventrem omnem transit, & per septum transversum, & in

C vtrunque rhenem finditur, & in lumbis finditur, & exilitum in alias partes, tum in crus vtrunque, Sed & supra cor ad ceruicem, partim in dextram, partim in sinistram, & tunc in caput ascendit, & in temporibus finditur vtrunque. Possunt autem & numero maximè venæ dici. Verum in summa, à vena caua, & ab arteria, aliæ venæ per totum corpus fissæ sunt, cauissimæ autem sunt prope cor, & ceruicem ac caput, & infra cor usque ad coxendices. Et calidum plurimum in venis ac corde inest. & propterea spiritum cor habet, vtpote quod omnium intra hominem membrorum calidissimum existat. Procliue est autem condiscere, quòd spiritus calidus est. Cor & venæ cauæ semper mouentur, & plurimum calidi in venis inest, & propterea spiritum cor trahit, ex omnibus in homine maxime calidum existens.

Potest

Cordis natura.

Arteria uenæque altera magna unde

Venule corporis unde ueniunt.

Cor calidum est.

Cor & venæ semper agitantur.

HIPPOCRATIS LIBER

- τῆ δ' ὁμοι-
ωσα.
cōprobat.* Potest etiam aliter cognosci. Si quis ignem in domo accen-
dere velit, quum ventus non inspirat, flamma mouetur a-
liquando magis, aliquando minus, Sed & lucerna accensa
& ardens, eodem modo mouetur, modo magis, modo mi-
nus, vento nullo mouente, quem sane nos spirantem co-
gnoscere possimus, & alimentum calido frigidum existit.
- Frigus ca-
lorem nu-
trit.* Caterum puer in vtero comprimens labra ex vtero matris
fugit, & tum alimentum, tum spiritum, cordi intro trahit,
vbi sanè mater respirarit. Est enim hoc calidissimum in pue-
ro, & hoc calidum etiam reliquo corpori, & aliis omnibus
partibus motum præbet. Si vero quis interroget quomodo
hoc quis sciat, quòd puer in vtero trahit & fugit: illi sic re-
spondendum est. Pueri nascuntur stercus in intestinis ha-
bentes, & vbi nati fuerint celerrime ventrem, tum homi-
nes, tum pecora exonerant. Atqui non haberent stercus,
nisi in vtero suxissent, Imo neque mammam statim vt na-
tum est sugere nosset, si non in vtero suxisset. Et de motu
cordis ac venarum sic habet. Porro pulmo iuxta cor ita na-
tus est. Cor ex humido quod glutinosissimum erat calfaciès
cito exsiccauit, veluti spumam, fecitque antrosus, & ve-
nulas multas in ipso. Venulas autem ideo fecit. Quantum
enim in glutinoso inerat frigidi, id ipsum quidem à calido
colliquatum est, & liquidum euasit. Ab ipso vero glutino-
so, tunica facta est. At vero Iecur sic compactum est. Quum
vna cum calido multum humidi conclusum esset, citra glu-
tinofum ac pingue, frigidum superauit calidum, & conge-
latum est. Huius signum hoc est. Quando quis victimam
mactat, donec calidus fuerit, liquidus est sanguis, postquam
autem perfrigeratus est, congelatur. Si vero quis ipsum con-
quasset, & fibras eximat, non congelatur, fibræ enim fri-
gidæ sunt & glutinosæ. Splen autem hoc modo constitutus
est. Cum calido & glutinoso conclusum fuit, calidum qui-
dem plurimum, frigidi autem minimum, tantum solum-
modo quantum ad glutinosi compactionem satis erat: sunt
autem id fibræ in splene existentes, & propter has fibras,
mollis est splen, & fibrosus. Rhenes porro sic producti sunt.
Parum glutinosi, parum calidi, multum frigidi conclusum
fuit, & ab hoc congelatum est, & durissimum viscus eua-
sit, & minime rubrum, quia non multum calidi simul con-
stitit.

stitit. Eadem de carnibus ratio est. Frigidum quidem constituit & compegit ac fecit carnem, glutinosum autem in foramina transit, in foraminibus autem his humidum est, velut in venis magnis. Calidum autem in toto corpore est, plurimum vero & humidi in corpore est, & frigidi multum in humido: tantum autem est frigidi, quantum congelare humidum ac liquidum potest, sed superatur à calido, quare etiam ab ipso diffunditur: Quod vero humidum calidum est, hac demonstratione confirmatur. Si quis corpus hominis secet, vbicunque velit, sanguis calidus fluat, & quandiu sanè calidus fuerit, liquidus erit, postquam vero refrigeratus est, tum ab intrinseco frigido, tum extrinseco, pellicula fit & membrana, & si quis hac pellicula detracta, modico tempore sinat, aliam pelliculam factam videbit; si vero quis hanc semper adimat, alia rursus pellicula à frigido generatur. Cæterum ea gratia plura dixi, vt ostenderem, quod extremum corporis ad aerem conuersum, necessario pelliculam induit, præ frigido & ventis impetentibus. At vero articuli sic generati sunt. Quum ossa facta essent, quæcunque quidem ex ipsis pingua erant, celerissime exusta sunt, quemadmodum etiam prius dictum est superiore sermone. Quantum autem ex ipsis glutinosum erat, id ipsum exuri non poterat, sed medio inter vsum & siccatum loco contentum, à calido in nervos, & saliuam ac mucum transiuit. quantum autem ex glutinoso liquidissimum erat, hoc calfactum crassius redditum est, vtpote liquidum existens, & ex hoc saliuæ facta est. verum ex illo glutinoso vngues producti sunt. Etenim ab ossibus & articulis semper liquidissimum ipsorum discedens, glutinosum redditur, & à calido siccatum ac arefactum, foras in vngues delegatur. Dentes autem posterius generantur ex hac causa. Ex ossibus capitis ac maxillarum incrementum fit glutinosi, & quod ex pingui inest, à calido siccatum exurit, & fiunt dentes reliquis ossibus duriores, quia nihil frigidi inest. Et primi quidē dentes nascuntur à victu in vtero, & postquam natus fuerit, puero lactenti à lacte. Vbi vero hi exciderint à cibis & potibus, excidunt autem, vbi ad annos primi alimenti peruenierint, quibusdam etiam prius, si à morbido alimento nati fuerint. Plurimis vero quū septē annos impleuerūt. Qui vero postea

*Caro.**Humidum liquidum-ue caloris quid habet.**Tuniculā spiritus aeris & frigus semper superius inducit. Articuli iuncturæ.**Nervi.**Vngues.**Dentes.**Dēti cur nascantur.*

HIPPOCRATIS LIBER

postea enascuntur simul consenescent, nisi præ morbo perforentur. Cæterum dentes propterea posterius aliis nascuntur. In maxilla venæ sunt, & hæ huic ossi soli inter omnia ossa, ex inferno ventre alimentum præbent. Ossa vero tale augmentum dant, qualia existunt, sed & alia omnia tale augmentum reddunt, qualia ipsa existunt. Etenim venæ ex ventre ac intestinis, in quæ cibi ac potus colliguntur, postquam hi fuerint calfacti, tenuissimum ac liquidissimum trahunt, crassissimum autem & fex isthic relinquitur, computrescitque & fit sterminus in inferioribus intestinis. Tenuissimum vero trahunt venæ ex ventre ac intestinis, quæ supra ieiunum intestinum existunt, atque hoc calfactis iam cibus. Vbi autem ieiunum intestinum transferint, & in inferiora intestina collecti fuerint, sterminus fiunt. At vero alimentum ubi accesserit, vnumquodque talem speciem unicuique reddit, qualia sanè erant. Singula enim ab alimento irrigata augmentum capiunt, calidum, & frigidum, & glutinosum & pingue, & dulce & amarum, & ossa & alia vniuersa quæ in homine insunt. Et ob id dentes posterius nascuntur. Dictum autem à me prius est, quod solæ ex ossibus maxillæ, ipsæ in seipsis venas habent; & ob id alimentum amplius in ipsas quàm in alia ossa trahitur, & quia vberius alimentum, & densiorem influxum habent, augmentum ipsæ à seipsis tale pariunt, quales sanè ipsæ existunt, atque hoc donec homo integer augeat: augeat autem ubi conspicuus euadit, conspicuus vero fit maxime à septennio, vsque ad decimum quartum annum. & in hoc tempore, tum maximi ex dentibus, tum alij omnes nascuntur, postquam exciderint hi qui ab alimento in vtero nati sunt. Augeat autem & in tertium annorum septenarium, in quo adolefcent fit, vsque ad quartum & quintum septenarium. Quin & in quarto septenario dentes enascuntur, plerisque hominibus duo, qui sapietia dentes appellatur. Porro capilli sic nascuntur. Ossa sunt & cerebrum à quibus tale augmentum venit, utpote glutinoso circumcirca existente, quemadmodum & neruis, & pinguitudinis nihil inest. Si enim pinguitudo affuisset, ex calido sanè exusta esset. Fortassis autem mirabitur quis quod etiam sub alis & in pube pili multi, & quibusdam in toto corpore existunt. Verum hic sermo de eo est, quod ubicunque in corpore glutinosum est, ibi pili à calore

*Maxillæ
solæ ossia
uiculus ha
bent, uetri
culusq;*

*Sterminus
quæ fiat.
Cibus &
potus oia
irrigat, cõ
seruat &
augent.*

Capilli.

- Alore sunt. Auditus autē inde cōtingit, foramina auriū ad os *Auditus quī fiat.*
durum & siccum lapidi simile pertingūt. Iam vero ad ipsū os est cauitas antrofa. Strepitus autem ad durum firman-
tur, os autem cauum resonat per durum. Pellicula vero in aure
iuxta os durum tenuis est, velut aranei tela, & omnium pel-
licularum siccissima. Quod autem id quod siccissimū est ma-
xime resonat, multa signa sunt. Quum igitur plurimum reso-
nuit, maxime audimus. Et sunt quidam qui de natura scribē-
tes prodiderunt, quod cerebrum est quod sonum edit. hoc
autem fieri non potest. Ipsum enim cerebrum humidum est,
& membrana siue tunica circum ipsū humida est & cras-
sa, itemque circum tunicam ossa. Nullum igitur humidum
B resonat, sed sicca, resonantia autem auditum faciunt. Olfacit
porrō cerebrum humidum existens, aridorum odorem vnā
cum aere, per corpuscula chartilaginosa ipsum trahens. Cere-
brum enim in cauitatem nasi pertingit, atque hac parte non
est ante ipsum os aliquod, sed chartilago mollis velut spon-
gia, neque caro, neque ossiculum: & vbi quidem cauitas nasi
sicca fuerit, ipsū seipso exactius arida olfacit. Aquam enim
non olfacit, humidior est enim quā cerebrum, nisi sit pu-
trefacta. Putrefacta enim aqua crassior fit, & alia omnia. Quū
vero nares humectæ fuerint, olfacere non possunt. Nō enim
aerem attrahit cerebrum ipsum ad seipsum. Similiter etiam
vbi cerebrum ipsum de seipso plurimum liquefecerit, in pa-
latum, & fauces, & pulmonem, ac reliquum ventrem: cogno-
C. scunt autem hoc homines, & ex capite destillare dicunt, de-
stillat autem & in reliquū corpus. Et est modus eius calidus.
At vero visus propterea contingit: à cerebri membrana ve-
na in vtrunque oculum per os descendit: per has duas venu-
las, quod est glutinosissimi tenuissimum de cerebro perco-
latur & propterea ipsam circum ipsū oculum tunicam ta-
lem facit, quale est ipsum oculi pellucidum, quod ad aerem
vergit, ad quod venti ac flatus irruunt, eadem planē ratione
quemadmodum de aliis membranis ac tunicis dixi. Sunt au-
tem multæ hæ tunicae præ oculis pellucidæ, quales ipsi exi-
stunt. Huic enim pellucido lumen & omnia splendida relu-
cent, per hoc igitur relucens videt: quod vero non splendi-
dū est, neque relucet, per hoc nō videt. Verum reliquū quod
circum oculos est album, caro est. Quæ vero pupilla oculi
Pupilla qualis.
appellatur

HIPPOCRATIS LIBER

appellatur, nigra apparet, ob id quod in profundo est, & tunica circum ipsam nigra sunt: tunicam autem appellamus id quod velut pellicula inest. Est autem non nigra si quis inspiciat, sed alba ac pellucida, humidum vero oculi, glutinosum existit. Sæpe enim vidimus, in oculo rupto exire humorem glutinosum, & si quidem adhuc calidus fuerit, liquidus est. Postquam vero perfrigeratus est, siccus euadit, velut thus transparēs. Atque hoc & in hominibus & in brutis similiter habet. Caterum oculum molestia afficit omne quod incidit, & venti irruentes, & alia quæ splēdidiora sunt, quàm ipse est. Et si quis interroget respondere licet, propterea quod consimilis coloris existunt. Quemadmodum os, & lingua, & reliquis venter, humida sunt. Sermonis porrò facultas inde est. Totum corpus spiritum intrò trahit, plurimum vero in cavitates sibi ipsi accumulāt. Is autem qui per inane foras currit, strepitum facit. caput enim resonat, lingua vero articulat, occurrens in faucibus, obturansque ac pellens ad palatum & dentes, claritatem eius facit. Si autem lingua semper occurrens non articulet, non posset homo clare differere, sed singula à natura vnā vocem haberent. Huius signū est. Muti ex natiuitate differere non possunt, sed vnā tantum vocem sonant, etiam si quis spiritum efflans sermonem proferre conetur. Manifestum autem hoc est. Homines ubi voluerint magnā vocem edere, attrahentes spiritum forinsecum, eum foras propellunt, & magnā vocem edunt, prout spiritus durat, postea vero vox contabescit. Sed & citharædi, quum ipsos vocem intendere oportuerit, spiritum quā plurimum intrò trahentes pronunciationem extendunt, & vociferantur ac vocem magnā edunt, prout spiritus durat. Vbi vero spiritus defecerit, desinunt. Ex quibus manifestum est quod spiritus est qui vocem edit. Vidi autem iam quosdam qui sibi ipsis manu illata guttur penitus præsecuerant, atque hi viuunt quidem, verum nullā vocem edunt, nisi quis guttur constringat, hi autem sermonem proferunt. Manifestum vero, & hoc est, quod præfecto gutture spiritum attrahere intrò in cavitates non possunt, sed per præfectā partem exhalat. Sic sanè res de voce ac sermone se habet. Porrò vita hominis septem dierum est. Primum etenim postquam genitura in vteros peruenit, in septem diebus

Oculi humor qualis.

Sermo unde.

2 muti hoc confirmat.

Cantorum exemplū Virruuius hinc sūpsit

Spūs locutionē & vocē præbet.

Cōceptus in utero quotus.

- A** diebus habet quæcunque corpus habere debet. Mirari autem quis possit, quomodo ego id sciam. Verum multa ego vidi hoc modo. Meretrices publicæ quæ sæpius de seiphis *Meretrix quæ docuerat.* periculum fecerunt, vbi cum viris rem habuerint, sciunt quando in ventre concipiant, & postea conceptum intra se perdunt. Postquam autem iam perditus est, elabitur velut caruncula. Hanc carunculam in aquam coniectam si conspiciatus consideraueris, omnia membra habere reperies, & oculorum regiones, & aures, & manus & manuum digitos, & crura, & pedes & pedum digitos, & pudendum, & reliquum totum corpus manifestum. Satis etiam manifestum est harum rerum peritis, quod mulier quum in ventre concepit, *Cōceptus signa.* statim horret, & calor, & dentium stridor consequitur, & *Quota inedia.*
- B** conuulsio occupat tum articulos, tum totum corpus, & veteram segnitias ac torpor. Et quæ puræ sunt, hoc perpetiuntur. Quæ vero crassæ & mucosæ hoc perpetiuntur, pleræque ex his mulieribus non percipiunt, nec cognoscunt: Certe quatenus mihi ostenderunt, hoc ipsum se cognouisse, eatenus scio ac prodo. Quod vero vita hominis septem *Quota inedia.* dierum sit, etiam ex hoc manifestum redditur. Si quis in septem diebus nihil edere aut bibere velit, plerique quidem in ipsis moriuntur. Sunt autem qui ipsos transmittunt, & tamen moriuntur. Sunt etiam quidam qui persuasi sunt ut ne desperarent seipso fame conficientes, sed comederent ac biberent: verum venter non amplius suscipit. Ieiunum enim *Septimestris partus.*
- C** intestinum in his diebus concreuit, moriunturque etiam illi. Sed & ex hoc coniectare licet, hominis vitam septem dierum esse. Puer septimestri partu natus, pro ratione *Septimestris partus.* natus est, & viuit, & rationem talis habet, ac numerum ad hebdomadas ac septenarium exactum. Octimestris autem natus nullus vnquam vixit. Nouem vero mensium & decem dierum partus fit, & viuit, & habet ad hebdomadas numerum exactum. Quatuor enim denarij hebdomadam, dies sunt ducenti & octoginta, In denarium autem hebdomadam septuaginta dies incurrunt. Habet autem & septimestris partus tres denarios siue decadas hebdomadam, & in vnaquaque decade septuaginta dies. Tres vero hebdomadam decades, ex toto sunt dies ducenti ac decem. Quin & morbi *Prænotis morborum.* acutissimi sic hominib⁹ fiunt, præteritis diebus hebdomadis dimidiæ,

HIPPOCRATIS LIBER

*Capitis
ulcera.*

*Dentes pue-
ris quādo
renascun-
tur.*

dimidia, aut vnus, in quibus iudicatur, & moriuntur aut sa-
ni euadunt: & tertij generis in vndecim diebus, hoc est vna
& dimidia hebdomade: & quarti in duabus hebdomadis. &
quinti in duodeuiginti diebus, hoc est duabus & dimidia
hebdomadis. At vero alij morbi non habent vt certa senten-
tia pronunciari possit, quanto tempore homines ab ipsis sa-
ni euadant. Ad eundem modum etiam vlcera magna in ca-
pite ac reliquo corpore: quarto die inflammari incipiunt, in
septem autem inflammatio sedatur, aut etiam quatuor & de-
cem, aut duodeuiginti. Si quis autem diligenter medeatur,
& vulnera in capite magna in hoc tempore non sedentur,
homines moriuntur. Cæterum inexpertus quispiam mira-
ri queat, quòd septimestris puer nascatur. Ego quidem igitur
hoc ipsum vidi, & quidem frequenter. Si quis autem hoc
deprehendere vult, facile est obstetrices adire, quæ parien-
tibus adsunt, & ex ipsis percunctari. Est autem & aliud si-
gnum. Pueri septem annis præteritis dentes explent. Et in
septem annis sunt & ratione & numero exacte hebdomades
trecentæ ac sexaginta. Necessitatem autem naturæ, qua-
propter in septem hæc singula dispenſentur, ego aliis lo-
cis declarabo.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE SEPTIME

*stri partu, Iano Corna-
rio medico physico
interprete.*

*Macrobi-
& Gale-
nus in Epi-
demiari
cōmenta-
riis hoc dis-
serit.*



Septimestres autem nascuntur die-
bus centum & octuaginta duobus
ac dimidio, & insuper accedente
diei particula. Si enim primi
mensis dies quindecim supputaueris,
deinde quinque mēsum, dies centum
quadraginta septem ac dimidium:
In vndesexaginta enim diebus quàm proxime duo
mensēs

- A **menfes perficiuntur.** his igitur sic habentibus, ad septimum mensem supersunt dies non plures quàm viginti. Et est tota summa dimidij anni, vnà cum aliquantula diei parte. Quum itaq; ad hoc perfectionis principium partus peruenit, maturefcente fœtu, & robore multo augefcente, in perfectione magis quàm aliis temporibus, pelliculæ in quibus ab initio nutritus fuit, quemadmodum spicarum membranæ laxatur, ad id coactæ anteaquam fructus perfecte maturefcat: & fortissimi ac plenissimi fœtus violantes ac dirumpentes pelliculas, partum fieri cogunt, & plurimi ex his pereunt. Quum enim parui sint, transmutatione maiore quàm alij vtuntur, & quadraginta dierum afflictionem perferre coguntur, ex vtero egressi, id quod etiam ex decimestribus multos peremittit. Sunt autem ex his septimestribus qui etiam superstites manent, ex multis pauci. Propterea quòd ratio & tempus in quod eautriti sunt in vtero, constitit, vt omnium participes sint, quorū etiam perfectissimi participes existunt, maxime qui superstites manent, & processerunt de matre prius pariete, vtpote in octauo mense ægrotaturi. Si enim in his laboribus succedant, vt in conspiciuum prodeat puer, impossibile est superstitem esse, ob prædictas affectiones, quas ego octimestres perimere dico, Immo etiam multos decimestres. Cæterum multi fœtus septimestris ætatis, quum pelliculæ laxantur, secedunt in id quod cedit, & hic alimentum sumunt, primos quidem quadraginta dies laborantes, alij plus, alij minus: propter permutationem autem ex locis & pelliculis quæ ipsos aluerunt, transmutantur, & pro vmbilico, trahunt & transumunt etiā per matrem labores. Pelliculæ enim dum tenduntur, & vmbilicus cōuulsus, dolores matri inducunt. Et fœtus ex antiquo vinculo exsolutus, grauior redditur. Multæ vero mulieres etiam febricitant his cōtingentibus, quædam etiam pereunt vnà cum fœtibus, verū omnes in breui ex hoc contaminantur ac inquinantur. Aiunt autem & octonos menses difficilime vteros ferre, recte id dicentes. Est autē octauus mensis non solū hoc tempus, sed & dies accedunt à septimo mense, & à nono, & ab ipso anno. Verum dies non similiter, neq; dicunt, neq; cognoscūt mulieres. Decipiūtur enim ex eo quòd non eodem modo fiunt, sed aliquādo à septimo mense plures dies accedunt ad quadraginta, aliquādo

Cur septimestres edantur.

Cur pauci septimestres uiuant.

Cur plus minusue quidā septimestres partus asficiantur.

Cur octauus mensis grauis sit. Cur sæmine in cōceptu errent.

HIPPOCRATIS LIBER

à nono. Tunc enim fieri necesse est, prout contigerit mulie-
 rem in ventre concipere, tum mense, tum tempore. Mensis
 autem octauus minime dubius est, secundum hunc enim cōtin-
 git, vt iudicatio difficilis existat. Et mea sententia pars etiā
 in vndecimo mense, mensis est, vt hic satis memorabilis exi-
 stat. Porro mulieribus de partibus fidem derogare nō opor-
 tet, dicunt enim omnia, & semper dicunt, & semper profe-
 runt. Neq; enim aut opere, aut sermone persuasæ sunt, sed ex
 eo quod cognouerunt in corporibus suis cōtigisse. Licet au-
 tem & volentibus aliud dicere, Quæ vero iudicio præditæ
 sūt, & victoriā de hac sententia pronunciant, semper dicūt
 ac testātur, nasci septimestres, & octimestres, & nouimestres,
 & decimestres, & vndecimestres: & ex his octimestres non
 superstitēs manere. Dicunt autem & abortus plurimos in
 primis quadraginta diebus fieri, sed & reliqua conscripta his
 accidere, in quadragenariis, ac in singulis mensibus fieri di-
 cunt. Quum autem septimo mense pelliculæ dirumpantur, &
 fœtus secesserit, labores qui circa octauum mēsem, & sextū
 quadragenarium, in partu fieri traduntur, corripunt. hoc au-
 tem tēpore præterito, quibus bene futurū est, inflāmationes
 tum fœtus, tum matris exoluūtur, vt venter molliatur, & tu-
 mor à præcordiis & laterū mollitudine descendat ad locos
 inferiores, ad facilem partus tempore progressionem. & se-
 ptimo sanē quadragenario plurimo tēpore fœtus isthic exi-
 stunt. Nam loci ipsis molles sunt, & transmotiones ipsis faci-
 liores ac frequentiores fiunt, & propterea ad partum magis
 solubiles consistunt, & mulieres per hos vltimos dies ex toto
 quadragenario facilius vteros ferunt, donec cōtigerit fœtū
 verti. Postea vero dolores partus ac labores incumbunt, do-
 nec à puero & à secunda mulier liberetur. Quæcunq; vero
 mulieres multos pueros pepererunt, & quidam ex ipsis clau-
 dus natus est, aut cæcus, aut aliud quoddā malū habens, aiunt
 in hoc puero octauum mensem ipsas difficiliter transegisse,
 quàm in his quos pepererunt nihil mali habētes. Fœtus enim
 mancus in octauo mense fortiter ægrotauit, vt etiā morbus
 abscessum ac ablationem siue mutilationē alicuius partis fe-
 cerit, quemadmodum etiā viris fortes morbi faciunt. Qui ve-
 ro fœtus in alio tempore fortiter ægrotant, pereunt prius q̃
 ipsis abscessus eiusmodi fiat. Quicunque autem octimestres
 fœtus

Quid agat
 partus se-
 ptimo mē-
 se.

Quare
 claudi, cæ-
 cius par-
 tus edū-
 tur.

A fœtus non valde ægrotant, sed iuxta vnam aliquam partem, ex secessu afflictionem pertulerunt, quadraginta quidē dies in imbecillitate transigunt, vt plurimū in vtero, propter prædictas necessitates, sani autem fiunt. Quicūque autem natus fuerit in his quadraginta diebus, eum impossibile est superstitem manere. ægrotanti enim adhuc ipsi in vtero transmutationes & afflictiones post partum accedunt. Quicunq; vero ægrotans in vtero ad nonū mensem peruenerit, & in hoc mense natus fuerit, superstes erit. Et superuiuit quidē non minus hi quā septimestres. verum pauci etiam ex his educantur. Neq; enim crassitudinem habent, quam perfectissimi habent, & labores in vtero non diu ante tolerauerunt, vt tenues euaserint. Seruabitur autem vel maxime talis puer, si nouem mensium fuerit in exitu. fortior autem euadet etiam is, qui plurimum abest à morbis, qui octimestribus accidere solent. Qui enim in septem quadragenariis nascuntur, decimestres appellati, ob id maxime educantur, quod fortissimi sunt, & plurimū à vulgariū puerorum tempore absunt, in quo affliguntur quadraginta ægrotantes diebus, circa octauum mensem. Declarant autem de morbis & afflictionibus octimestrium, etiam nouimestres tenues nascētes. Iuxta multitudinem enim temporis, etiam magnitudo corporis cōtingit, ex morborū afflictione progressis, & non velut septimestres carnosī gignuntur, & crassitudinem probe coalitam habentes, vt qui tempus quo in vtero gestabantur sine morbis transegerunt. Verum enimvero conceptus, & abortus, & partus mulieribus in eo tempore, in quo etiam morbi, & finitas, & mors omnibus hominib⁹ fiunt. hæc vero omnia partim secundum dies, partim secundum menses, partim secundum dierum quadragenarios, partim secundum annum, significationem sui præbent. In omnibus enim his temporibus insunt ad vnumquenque, & vtilia multa, & hostilia multa. Ex vtilibus igitur, sanitas & augmentum contingit, ex contrariis, morbi & mors. Dies quidem igitur maxime insignes in plurimis sunt, primi & septimi, multum potentes in morbis, & multum in fœtibus. Nam plurimi abortus in his diebus fiunt, nominantur autem tales effluxus, nō abortus. Verum alij dies intra quadragesimum insignes quidem minus sunt, multi vero iudicant. Cæterum in mensibus, eadem quæ

Qui post
enixum ui
uant.

Cur maci
lētī fiant.

Decimo
stres cur
educētur.

Cōceptus
& cæte
rorum de
cretoriū.

Quæ faciē
hæc.

Dierū ob
seruatio.

Quātū di
es & mē
ses possint.

HIPPOCRATIS LIBER

in diebus fiunt, iuxta rationem insunt. Menses enim mulie-
ribus sanis singulis mensibus apparent, tanquam peculiarem I
in corporibus vim mensis habeat. Vnde sanè septimi men-
ses his quæ vterum gestant, fœtus in principium perfectio-
nis constituunt. Pueris vero ubi septem menses à natiuitate
impleuerunt, tum alia vtilia in corporibus fiunt, tum dentes
in eo tempore apparere incipiunt. Eadem ratio est etiam in
Dierū pa- decretoriis diebus, si quidē fortassis vnā cū his quos recē sui
rium ob- cōiungere, quis velit historiæ ac cognitionis gratia referen-
seruatio. tur. Etenim medicum qui ægrotorum salutem recte conie-
ctare volet, animaduertere quidem oportet & contemplari
omnes dies, ex paribus vero decimū quartum, & vigesimum
octauum, & quadragesimum secundum. Hic enim terminus E
ponitur à quibusdā pro harmoniæ ratione, & integer ac per-
fectus numerus, verum ob quā causam, longius fuerit in præ-
senti exequi. contemplari autem sic oportet per ternarios ac
Cōforma- quaternarios, ternariis quidem omnibus copulatis, quater-
tionis tē- narios autem, duobus ad duos connexis. At vero quadre-
p° i utero. narij primū in fœtibus iudicant. Quisquis enim primos qua-
draginta dies transmiserit, abortus effugit ex omni causā cō-
tingentes, plures autem fiunt in primo quadragenario abor-
tus, quā in aliis omnibus. Hoc autem tempore præterito,
fœtus fortiores sunt, & ipsorum corporis per singula mem-
bra discretio fit: & masculorum quidem partes omnes valde
conspiciæ fiunt fœmellæ vero in hoc tempus, carnes appa-
rent exortus ac processus solum habentes. Similia enim lon- F
gius tempus in simili sunt, & tardius discernuntur, propter
consuetudinem & amicitiam: quanquam aliās quum à matre
segregatæ fuerint, filiæ citius quā filij pubescant, & sapiāt,
ac senescant, propter corporum imbecillitatem, & victus ra-
tionem. Alter quadragenarius est, in quo circa octauū men-
sem fœtus in vtero ægrotant, de quibus hic totus sermo in-
stitutus est. Tertius est, in quo ubi nascantur pueri etiam ma-
le afflicti, si effagerint quadraginta dies, apparent magis ro-
busti ac sapientes. Nam & splendores clarius vident, & stre-
pitum audiunt, quod prius non potuerunt, tanquam incre-
mentum habeat hoc tempus, cum iuxta alia, tum iuxta sapi-
entiam ex corpore elucescentem. peculiarem quidem sapi-
entiam in corpore inesse manifestum est, in prima sanè die.
Nam

*Quæ puel-
læ à pue-
ris differe-
rant.*

*Quid sus-
pte natu-
ra pueri
faciant.*

A Nam in somnis, statim ubi nati sunt pueri, ridere & plorare videntur. Vigilantes quoque sua sponte statim rident ac plo-
rant, prius quàm quadraginta dies transeant. Non rident au-
tem, etiam si titillentur ac irriterentur, priusquam hoc ipsum
tempus transeat. hebetantur enim vires in muccis: quan-
tum mors etiam per fatum sit sorte designata. vt hoc ex-
emplo omnibus sit, quòd omnia existentia quæ naturam ex-
iisdem habent, transmutationes per tempora venientia ha-
beant. Declaratur autem in singulis, quum alia nascantur, a-
lia corrumpantur. Porro anno finiente multi quidè morbi
fiunt, multæ etiam sanitates, iuxta temporis rationē, ad men-
ses, & ad singulos dies. Septenariis autem annorum, cum alia
B multa insignia corporibus fiunt, tum dentes pueris excidūt,
& alij nascuntur. Quæ enim in corporib. fiunt, ea scribam.

*Mors &
cætera
cur fiant.*

*Septima-
na in cor-
poribus
præalèt.*

*Principium autem huius septimestris in aliis
codicibus sic habebatur.*

DE septimestribus autem quidam sic dicit, quod ne-
gocium oculis nondum vidi, sed tantum audiui.
Quo autem modo mihi fieri posse videatur decla-
rabo. Multæ naturæ mutationes, conuersiones, &
excessus in animalibus & arbutis, cæterisque satis, sponte ve-
nascentibus æuo perpetuo, longoque fiunt: nam alicubi iam
fœmina & mas multis manibus, oculis auribusque confor-
Cmati, nati que sunt, variisque aliis formis, concreta ora, & os-
sa alij habentes mirandam naturæ præuaricationem, muta-
tionem, & excessum. cuncta enim temporibus labentibus &
discreta, & confusa & peculiaria perficiuntur. Nam secun-
dum priscam generationem, cum omnia animantia condi-
ta & creata sunt, sic cõformata fuerunt. Scitoque etiam nunc
eodem modo & per eadem secundum leges & rite cuncta
conformari nascique posse. Mihi vero (quemadmodum ho-
mini circa septimestria definienti datur) hæc statuta specie,
pro cœli, terræque benignitate, quemadmodum fructus ori-
ri videntur. Quod videre est in Aegypto, ubi omnia perfecta
nascuntur, & perficiuntur, multa etiam & per annum totum
omni que tempore terræ benignitate, calorisque circumag-
geratione, Nilive inundatione scaturiunt. Simili modo &

*De mœbris
agniscen-
tibus.*

*Terræ Ae-
gyptiæ
fœcunditas.*

HIPPOCRATIS LIBER

Quid ad similitudinem faciat. circa animantia septimestriaque perfecta vitaliaque illic omnia nascuntur. Quamobrem si quæ cōceptura est, uti sibi successione pariat, bene habeat, virque ad eam rem demittendam promptus, præstoque sit, corpus siue corporis alueus creatur & perficitur. Collatio enim & concordia, validaque necessitas & vis cogit, uti perficiatur & adolescat suo satori non dissimile. Nam si maior minorue, & dissimilis forma & figura sit, illi vnde orta est perfecta non haberetur. Quare dicito, statuiturque, medium quid esse in magno negotio, conformationem rymónue. Si ergo conformatio aliqua ad homines peruentura est, leni & miti modo perueniat necessesse est, perque hominum commoda: si minus, quidam præpubescunt & præsenescunt, quemadmodum qui præsenescunt, & si rite & secundum legem fiat. Conformatioque cōtabescit, & ad ossium commoda, fibrarum venarum, nervorum, viscerum, intestinorum, uteri, cæterorumque perfectionem conuertitur. Sed forsitan aliqui petent, cur octimestria, & trimestria non viuant? quoniam fluxi paruulique sunt, quædam enim sic æuum, & ætatem nactæ sunt & per similia conformari & discerni consueuerunt, quemadmodum quæ in terra feruntur & plantatur. quædam enim pluribus, quædam paucioribus diebus nascuntur secundum tempus. Tempus autem solis & lunæ circuitu perficitur, & sequitur, nec etiam vndecimestres, nec duodecimestres secundum eandem rationem horum viuent, donec pueruli sunt: nihil enim præter sua vestigia & naturam sit, aut adolescit, nec etiam si quid fabulentur. Sed cuiusque conformatio, forma figuræ, & similitudo, siue rymos, secundum naturalem legem perficitur, & rite finitur. Nam naturalis machinatio cuncta in oculos, vel aures, vel nares, vel os transfert: quæ conformationibus his continetur, vel per alias concrectiones, syncrifæ absumit. Quare nunc periti cum sint, conceptus omnes noscent quæ prius excogitaui.

Hippocratis

HIPPOCRATIS COI LI

BER DE OCTIMESTRI PARTV,

Iano Cornario medico phsy-
co interprete.

E octimestri partu sic sentio. Im-
possibile esse vt duas consequēter
succedentes afflictiones pueri fer-
re possint, & ppter ea octimestres
non superstites manere. Cōtingit
enim ipsos consequenter affligi,
tum ea quæ in vtero fit afflictione,
tum ea quæ in partu accedit, & ob
id nullus octimestris vitalis est. In-
super & decimestres appellatos, in

Cur octi-
mestria nō
uiuant.

septem quadragenariis dierum magis in lucem edi sentio, &
maxime cōtingere vt educentur. Nam perfectissimus est fœ-
tus in primis quadraginta dieb⁹, vbi vero plures accefferint,
perit. Coguntur enim multa in pauco tempore assumentes
ac perferentes, multum ægrotare, ex quibus mors consequi-
tur. Incipit autem laborare puer ante partum, & interitus pe-
riculum subit, quum in vtero vertitur. Producentur enim om-
nes sursum habentes caput, pariuntur autem multi in caput,
& securius discedunt ac liberantur his qui in pedes pariun-

Quādo par-
tus pericli-
tatur.

tur. Flexibiles enim corporis partes non impedimento sunt,
puero in caput exeunte. Verum quum in pedes prodierit, ob-
turaamenta contingunt. Versiones scilicet in vtero, & alia pe-
ricula, & vmbilici puerorū iam sæpe circa colla apparuerunt.
Si enim iuxta partem quamcunque vmbilicus fuerit in vtero
porrectus, magis hac parte puer vmbilici circūaactionem, dum
vertitur, faciet, quàm circa ceruicem. Si vero iuxta humerū,
vmbilici circūaactionem retrahit. hoc autem vbi fit, etiam
matrem magis laborare necesse est, & puerum aut perire, aut
difficilius exire. Quare multi iam pueri principium morbi
intus nacti prodire, & consequenter alij perierunt, alij mor-
bidi superuixerunt. Quicunque vero probe ac tuto prodie-
rint, & in conspicuum exierint, de repente ex necessitate in

Melius in
caput exe-
unt.

Multi de
uētre mor-
bos trahūt

HIPPOCRATIS LIBER

Qui probe coalescât. ventre liberati, & crassiores ac maiores, quàm pro ratione statim existunt, his non ex augmento, sed laxo tumore id contingit, & multi sani ex his pereunt. Si enim tumor non resdat citius quàm tertio die, aut paulo serius, morbi ex ipso fiunt. Quare etiam alimenta ac respiraciones periculose mutantur. Si quid enim morbidum inducunt per os & per nares inducunt, & pro eo quòd tanta ingerantur edulia quanta sufficiunt, & ea etiam non superentur, multo plura ingeruntur: ut necesse sit & cogantur præ ingestorum copia, & præ ipsa adeò affectione, qua pueri corpus afflictum est, alia quidem per os & nares rursus exire, alia vero per intestinum ac vesicam inferne transire, antea nullo horum ita contingente. Sed & pro flatibus ac spiritibus, & humoribus ita cognatis, cum quibus necesse est in utero consuetudinem ac beniuolentiam habuisse omnibus peregrinis utitur, crudioribus ac siccioribus, & minus matueris, ut necesse sit dolores abortiri multos, plerisque etiam mortes: quandoquidem etiam viris transmutationes locorum ac victus, morbos faciunt. Eadem ratio est & de vestibus. Pro eo enim quòd carne & humoribus induti fuerunt, iisque tepidis ac liquidis & cognatis, tales vestes pueri induunt quales ipsi viri. At vero umbilicus per què alimèti ac spiritus ingressus pueris contingunt, solus ex omni corpore utero adhæret, & per huc introitus ac ingressus ingreditium particeps fit, reliquæ partes coniungunt, & non prius apertæ sunt, quàm ubi in exitu fuerit puer ex ventre. Quum autem in exitu fuerit, reliquæ omnes aperiuntur, verum umbilicus attenuatur, & coniungit ac resiccatur. Quemadmodum autem in his quæ ex terra nascuntur, fructus pleni ac maturi secernuntur, ac decidunt, iuxta discriminationem qua parte inheret. Sic etiam pueris maturis ac perfectis, umbilicus quidem coniungit ac clauditur, reliqua vero aperiuntur, ut & ingredientia suscipiant, & exitus habeant secundum naturam quibus necesse est viuentes uti. Singula enim separantur, iuxta modum quo agmina congregantur repentina; optima autem sunt, quæ maxime soli connutrita sunt. Cæterum decimestres & undecimestres partus, ex septem quadragenariis eodem modo fiunt, velut ex dimidio anno septimestres. Plurimis enim mulieribus necessarium est in ventre concipere, post menstrua parturientia, ubi ab his exoluta fuerint. Oportet igitur mulieri

tempus

A tempus dare mensis, in quo ipsa purgatio continget: & hoc *quando pa-*
tempus quibus breuissimum sit, tres sunt dies. Plerisque au- *riantur.*
tem multo plures. Sunt autem & alia multa impedimenta e- *Conceptus*
tiam in viris, ex quibus conceptus retardatur. Oportet au- *uarietas.*
tem vel maxime hoc considerare. Quod nouilunium quod
dies vnus existit, exactissime trigesima mensis pars est. duo
autem dies, fermè quindecima mensis pars sunt. Tres vero
dies, pars mensis decima sunt, & reliqua iuxta horum ratio-
nem. & non est possibile in paucioribus partibus fieri, neque
menstruorum solutionem, neque foetuum conceptionem. Ex
his igitur omnibus necessarium est plerasque mulieres circa
plenilunium, & vltra in ventre concipere, vt ducēti & octo-
B ginta dies, saepe vndecimum mensem apprehendere vide-
antur, tot enim dies septem quadragenarios cōstituunt. Nam
quum vltra plenilunium mulier concipit, necesse est eum cō-
ceptum vndecimum mensem attingere ac apprehēdere, quo
ad vltimum circuitum perueniat.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE SUPERFOE-

tatione, Iano Cornario me-

dico physico in-

terprete.



QUVM superfœtarit mulier, si pri- *Que sa-*
mum puerum in medio vteri ha- *perconci-*
buerit, superfœtatio elabitur, à pri- *piant.*
mo ac veteri expulsa. Si vero in al-
tero cornu superfœtationem ha-
buerit, posterius ipsam insuper pa-
rit non vitalem, nimirum vitalita-
te vbi vterus laxatus & humectus
fuerit exsoluta. Si vero non statim
secedat superfœtatio, dolores ex-
hibet, & fluxum foetidum, ac febrem: & facies intumescit, ti-
biæque

HIPPOCRATIS LIBER

biaque ac pedes, & si pereat, cibum auersatur donec excide- **I**
 rit. Superfœtant autem mulieres, quarum stomachus id est v-
 teri os, post primum conceptum non clauditur ita valde, id-
 que apparentibus signis constat, clauditur autem post super-
 fœtationes quæ posterius insuper pariuntur. Si superfœtatio
 nondum partium discriminationem habeat, sed caro sit, non
 quidem intumescit, sed putrescit donec ex vtero exeat. Si cui
Que nō fa- exeat secunda pueri in vtero, priusquam puer foras procede-
cile & cō re incipit, ægre parit: & magis adhuc periculose, si caput non
trapariāt. præcedat. Si vero alicui vna cum secunda puer foras exierit,
Stomach⁹ & ad stomachum, id est os vteri progressus, rupta secunda e-
uulue. merferit, magis facile parit. Itémq; si puer quidem foras pro-
Quādo un- dit, secunda vero adhærescit, & seipsam retrahit, atque isthic
gues de- manet. Quum puer non vitalis futurus nascitur, caro ipsius
sūt puero. vngues supereminet, vngues vero tum in manibus, tum in
Quo passō pedibus deficiunt. Quum vitali puero nascente manus præ-
partus e- minuerit, primum retro retrudenda est, donec retruseris: &
ducatur. si ambæ præminuerint, ambas retrudes, Et si crus præminu-
 erit, etiam hoc repelles. Vbi vero ambo crura in propatulo
 manserint, neque aliò processerint, fomento vtj opus est, à
 quo humectissimus vterus reddatur. habeat autem odorem
 ipsum fomentum. Et quum caput in propatulo fuerit, reli-
 quum vero corpus intus erit, etiam sic fomento vteris. Et
 quum pars corporis in vtero, pars in pudendis, pars ex-
 tra pudenda intumescit ac manet, etiam sic fomentum adhi-
 bebis. Et si quidem à fomento processerit, satis est: sin minus,
 os vteri elaterio crasso aqua diluto oblines, quo partum pro-
 ducat. Sed & à potibus ac cibis partus promouendus est, &
 pudenda ipsa cerato illinenda, si ficciora quàm ex re est, esse
 tibi videbuntur. Quum pueri capite ex stomacho apparente,
Quomodo reliquū corpus procedere non vult, puer autem mortuus est,
part⁹ mor- digitos aqua madefactos inter stomachum ac caput immit-
tus edu- tito, & in orbem circunducito, deinde subditum sub mētum
etur. digitum in os intrudito, ac foras trahito. Quum vero reliquū
 corpus extra pudenda fuerit, caput autem intus, in pedes vi-
 delicet prodeunte fœtu, postquam digitos in orbem circun-
 duxeris, ambas manus inter stomachum ac caput aqua præ-
 madefactas immittito ac extrahito. Si vero extra stomachū
 fuerit, verum intra pudenda, immixtis manibus apprehen-
 sum ca-

A sum capite educito. Si porro fœtus intus maneat mortuus, & non possit neque sponte, neque per medicamenta iuxta naturam excidere, manu cerato maxime lubricante vncta, deinde in vterum intrusa, humeros à collo magni digiti conamine deducito. Oportet autem ad huiusmodi etiam vngnem instrumentum in magno digito habere, & distractione facta manus educere, deinde rursus immissa manu, ventrem diffindere, & ex diffisso intestina sensim eximere: deinde his exemptis latera confringere, quo confidens corpusculum leuius ac expeditius fiat, & facilius exeat non tumidum existens. Caterum si secunda non facile excidat, maxime quidem ad fœtum appendere sinenda est, & puerpera velut super sella ventri exonerando destinata, lasanum graeci vocant, locanda. Sit autem in altum extructa sella, vel simile quiddam, quo fœtus dependens grauitate sua secundam simul extrahat. Sensim autem hoc faciendum est, non violenter, ne præter naturam diuulsa, inflammatione inducat. Substernere igitur lanas molles quàm maxime recēs carminatas fœtui oportet, quo paulatim remittant ac confidat. Aut vtres duos copulatos aqua plenos supponere, & supra vtres lanas insternere, & supra has puerum. deinde vtrumque vtrum stilo perforare, quo paulatim aqua effluat, effluente autem aqua, vtres remittunt ac confidunt, confidentibus autem vtribus, fœtus vmbilicum attrahit, vmbilicus vero attrahit secundam. Si vero supra lasanum, vel simile quiddam puerpera sedere nequeat, super reclinatam sellam perforatam collocetur. Si vero adeò debilis est, vt omnino sedere non possit, lectum, quàm erectissimum à capitis partibus struemus, vt deorsum declinet ac repat, & sic fœtus grauitas quàm maxime simul secundam trahat. Verum puerperam sub alis, foris ad lectum fascia, aut loro lato ac molli, alligare oportet, vt ne quum erectus sit lectus, corpus ipsius deorsum feratur. Iuxta eundem autem modum etiam si vmbilicus abruptus sit, aut etiam ante tempus recisus, moderate grauibz ponderibus appensis, secundæ educationem facere oportet, Optima enim hæc curatio in talibus existit, & minime lædit. Si cui puer in vtero immoriatur, & non egrediatur humido vtero existente, & quum iam non habeat amplius humiditatem, sed siccatus fuerit vterus, primum quidem intumescit

*Secunda
quæ extra-
hatur.*

*Quid faci-
at umbili-
cus ruptus,
vel antequam
p^o abscisus*

puer,

HIPPOCRATIS LIBER

puer, deinde colliquescunt ac putrescunt carnes, forasque effluunt, postremum autem ossa procedunt; & fluxus aliquando corripit, si non prius moriatur. Quum puer immortalis fuerit, tum aliis signis coniectare id licet, tum iubere, ut aliquando in dextro latere iaceat, aliquando in sinistrum transmutet. Translabitur enim in utero puer eo quod mulier se vertit, velut lapis aut aliud quiddam, si mortuus fuerit, & pectine frigidum mulier habet. Si vero viuat, & pecten calidus est, & venter totus translabitur una cum reliquo corpore extensus, & in ipso nihil translabitur absque reliquo corpore. Si cui ex partu laboranti fluxus multus sanguinolentus citra dolorem, ante puerum prodeat, periculum est puerum mortuum exoluendum esse, & non vitalem processurum. Prægnantibus mulieribus plerisque stomachus uteri prope extat ante partum. Mulier prægnans si non coitu utatur, facilius à partu liberabitur. Quæ gemellos gestat, eadem die parit velut concepit, habet autem utrosque pueros in una secunda. Muliere ægre pariente, si puer in genitalibus locis hæreat, & non facile exeat, sed cum labore ac medici machinamentis, tales pueri modicæ vitæ sunt. horum umbilicum secare non oportet, priusquam mingant, aut sternutent, aut vociferentur, sed sinendi sunt, & mulier proxime apud puerum permaneat, & si sitierit, aquam mulsam bibat, & si umbilicus infletur velut stomachus, & moueatur aut puer sternutet, aut vocem rumpat, tunc sanè secetur dum puer respirat, si vero non infletur umbilicus, neque moueatur tempore accedente viuet. Prægnantem mulierem si aliter non cognoscas, oculi tracti & cauiore sunt, & candidum oculorum albedinis naturam non habet, sed liuidius existit. Si qua partui vicina sit, & oculos cauos habeat, & facies intumescat, & ipsa tota itemque pedes tument, ut velut à pituita alba apprehensa appareat, & habeat aures albas, & summum nasum album, & labia liuida, ea ipsa mortuos gestat quos pariet, aut viuos praeue, & non vitales, & exangues, utpote morbosos, aut prius peperit non vitales. Huic sanguis in aquositate conuersus est. Oportet igitur tali post partum odorata in vuluam apponere, & comedere ipsam ac bibere odorata. & primum in facie nasus summus insignis euadit, ac colorem recipit. Si qua prægnans terram edere concupiscat, aut carbones, eaquæ edit, in

Partus immortui signa.

Cum fluore cruentus partu præcedit, periculum est.

Quæ facile pariat.

Quando umbilicus non statim secundus est.

Signa grauidæ.

Quæ partui mortui gestet.

Quæ grauidæ ter-

- A** edit, in capite pueri ubi natus fuerit, signum à talibus appareret. Mulierem id nosse expedit, vtra māmā ipsi maior est, illic enim fœtus existit. Similiter autem & oculum considerabit. Maior enim & splendidior omnino erit intra palpebram, etiam eius partis cuius mamma maior existit. Si cui ab appositis in vuluam non valde fortibus, dolores in articulos perueniant, & stridor dentium corripiat, & membris tēdatur, ac oscitat, hanc magis concepisse spes est, quā eā que nihil tale patiatur. Mulier quæ præter naturam crassa est, ac pinguis, & pituita repleta, non concipit hoc tēpore. Quæ vero ex natura talis est, horum gratia concipit, si non aliud quiddam ipsā impediāt. Mulieribus plerisque quum mē
- B** ses apparituri sunt, stomachus vteri in seipsum contrahitur, magis quā alias. Mulier quæ facile concipiebat, si prægnans esse desit, bis per annum à manibus ac cruribus venā secari finat. Si cui dolores in coxendice, aut in capite, aut manibus, aut aliqua alia corporis parte fuerint: quum vero prægnans est desinunt, conceptu autē ab vtero exoluti rursus insunt, odorata & bibere, & ad vteri os apponere conducit. Quum mulieri alicui conceptus gratia medeberis, ubi purgata esse videbitur, & os vteri recte habuerit, lauetur, & caput confricetur, nullo autem vngvine illinatur. deinde linteum inodorum lotum circum capillos ipsos circumdatum, reticulo loto aut nihil olenti obliget, ita vt p̄mum linteum ipsum capiti imponatur, postea quiescat galbano ad vteri stomachum appposito, quod coctum ac mollitum sit ad ignem, & non ad solem. Deinde mane deposito reticulo cum linteis; verticem suum alicui olfaciendum exhibeat, & si quidem oluerit, probe purgata est, sin minus, male. Hæc autem ieiuna faciat, & si non fœcunda fuerit, nunquam olebit, neque purgata, neque aliās, & si prægnanti idem medicamentum apponatur, neque sic probe olebit. Quæ vero prægnans futura est frequenter, & facile concipit, ac sana existit, etiam si non apposueris neque purgaueris, vertex ipsius olebit, aliud vero nihil. Vbi autem omnia probe videbuntur, & ad virum accedere oportuerit, mulier ipsa ieiuna sit: Vir autem non ebrius, frigida lotus, & commodo alimento nutritus. Et si cognouerit mulier genituram se concepisse eo tempore virum non accedat, sed quiescat. Cognoscet autem si quidem vir se
- Crassæ præter naturam cur non concipiant. Conceptus qui peritur.*
- rā uel car bones edunt, quid eueniat. Quæ parte sit partus.*
- emisse*

HIPPOCRATIS LIBER

emississe dixerit, ipsa vero præ siccitate ignorauerit. Si vero D
 vterus rursus in pudenda genituram reddat, ipsaque hume-
 Cur quæ- eta fiant, rursus cum viro coeat, donec concipiat. Mulier
 dâ partus quæ concipit quidem, perdit autem fœtus bimestres, exacte
 bimestres, in eodem tempore, & neque prius, neque posterius, atq; hoc
 uel maio- iterum atque iterum perpeffa fuerit, immo si etiâ trimestres
 res per- aut quadrimestres, siue vetustiores perdiderit, iuxta eundem
 dant. modum, Talibus vteri pucro augescente, & bimestre aut tri-
 mestrē, aut quântūcūque tempus transgrediente, si quando
 etiam aliâs augescit, in maiorem amplitudinem non porri-
 guntur, ita vt non amplius sufficiant capiēdo fœtui, sed pro-
 pterea perditur eodem tempore. Huic cucumerarium medi-
 camentum in vterum dare oportet, ipsumque distendere ac
 Medela. inflare pharmacis appositis hisce. Cucumeris syluestris
 medulla contundatur ac cribretur, deinde modicum de ipsa
 melle cocto copiosiori misceatur, addito silphio modico: fit
 autem velut dixi, mel coctum. hoc circum specillum oblinat-
 ur, crassitudine formata quantam vteri stomachus suscipere
 potest: apponatur autē ad os vteri, & impellatur quo in in-
 ternam vteri partem penetret. Quum vero colliquuerit me-
 dicamentum, specillum extrahatur. Sed & elaterium hoc mo-
 do præparatum apponere potes, Similiterque colocynthidē
 syluestrem. Per hoc autē tempus edat alia quàm plurima, &
 silphij caulem, & quicquid flatum in ventre inducit. Hoc ap-
 posititium pharmacum per tertiam diem apponatur, donec,
 probe habere visa fuerit, copia quantam vterus admittit. In-
 teriectis diebus, mollientibus vtendum est: postquam autem
 Purulētæ ex mollientibus præparatum fuerit os vteri, post mensium
 uulue apparitionem vbi sicca fuerit, cum viro commisceatur. Si cui
 cussæ & vterus suppuratus fiat, aut post partū, aut ex abortu, aut quo-
 modocūque aliâs, & non in vase alio ac tunica, velut in tu-
 modela. berculo solet, pus fuerit: huic conducit specillum vnctoriū
 in vteri os demittere. Minus enī opus fuerit vstura, si ad spe-
 cillum processerit. deinde erucas à tithymalide colliges: ha-
 Erucæ ti- bent autem velut aculeos quosdam, quos leniter rescindes,
 thymalis- ne pabulum internum ex ipsis elaboratur. deinde siccabis ipsas
 dis. in sole, ac teres. Vermes quoque stercorarios similiter in so-
 Scarabæi. le siccabis ac teres, & erucæ quidem pondus duorum obolo-
 rum Aeginæorum, vermium vero duplum miscebis, modico
 aniso

- A** aniso addito, aut aliquo eius generis. Nam mali odoris medicamentum euadit. Hæc autem leuia facta ac contrita vino albo odorato diluito, Et postquam biberit, grauitas accedit, & torpor in ventrem irruit. Si itaque accedit, aquam mulsam modicam insuper bibat. Si qua liberis carens, imprægnatione ac puerorum generatione indigeat, atque ea iam prægnans fuit ac peperit, & hoc ipsi contingat, aut quum stomachus vteri ficcus, aut summa parte affectus, aut conclusus fuerit, aut non recte habuerit, sed ad coxendicem alterum distortus, aut ad rectum intestinum occultatus, aut in seipsum contractus fuerit, aut labium stomachi sibiipsum vtcunque incubuerit, aut stomachus vteri asper & callosus fuerit: durus autem fit, & à conclusionem, & à callositate: his menses non apparent, aut pauciores quàm oportet, & per longius tempus apparent. Sunt autem in quibus etiam menses iuxta corporis sanitatem, & vterorum exitum reperiuntur, immo consueti & iusto modo, & stomacho vteri præ caliditate ac humiditate mensium non valde laso. Verum genituram non suscipit propter hanc læsionem, quæ impedit susceptionem, stomacho non recte habente. Huic per totum corpus fomentum adhibere oportet, & pharmacum bibendum dare, ac corpore primum purgatam ac mundam reddere, siue superne & inferne opus habuerit, siue superne solum. Et si quid superne purgans medicamentum dederis, fomentum ante purgationem non præmittes. Verum fomentum adhibebis inferne purgaturus. Si vero superne purgante medicamento non egere videbitur, præmisso fomento, inferne purgans bibendum dato. Quum autem probe purgatum esse corpus videbitur, postea vtero fomentum adhibeto, frequentes infusus ipsis adornans, si ita conferre videbitur. Immittes autem in fomentum, cupressi rameta, & lauri folia còtusa, lauabisque multa & calida aqua. Vbi vero recens lota fuerit, & fomentum admisserit, vteri os dilatabis specillo stanneo, corrigesque; vbi opus fuerit: potes & plumbeo vti, initio per paruam factò, deinde crassiore adhibito si suscipere potest, donec recte habere videbitur. Intinges autem specilla in mollitorio quopiam diluto, aut etiam liquido reddito, si conferre videbitur. Specilla ipsa retro caua facienda sunt, deinde circum ligna longiora adaptanda, sicque; ipsis utendum. Ceterum hoc tempore bibat, in vino albo odorato dulci &

*Concepus
reparatio.*

*Quæ cœci
ptu impe
diant.
Medela:*

*Specillum
quale in
his uelit
esse, uide
to.*

HIPPOCRATIS LIBER

dulci & q̄ suauissimo decoctam tēdam q̄ pinguiſſimam, in D
 tenuia ſegmenta conciſam, & apij ſemen contuſum, & cumi-
 ni Aethiopici ſemen, & thus q̄ optimum. ex hoc bibat ieiuna
 copia quanta moderata eſſe videbitur, tor diebus quot ſa-
 tis habere videbitur. Et edat catulos coctos, & polypum in
 vino dulci coctum, auſculumq̄e ipſum bibat, & braſſicam co-
 ctam, Vinum autem album inſuper bibat, & ne ſitiat, & cali-
 da bis per diem lauet. A cibis autem hoc tempore abſtineat,
 ab eo vero tempore ſi quidem proceſſerit per ſtomachum, &
 quid purgationis foris apparuerit, adhuc de potionē biben-
 dum eſt vnum atque alterum diem, & à ſpecillorum vſu de-
 ſiſtendum, ac conandum vt vteri appoſitiis medicamentis
 purgentur. Cuicumque autem ſtomacho recto, ac magno & E
 ſano exiſtente, ac probe habente, & in loco vbi conuenit &
 oportet ſito, menſes non apparuerint ex toto, aut pauciores,
 & per longius tempus, & non ſani, morbum ipſum inueſtiga-
 bis quemcunq̄e tandem vteri habent, & ſi corpus quoque
 aliquid conferat, cauſam perſcrutaberis ob quam non con-
 cipit: & hæc ſic habeant, & curationem facies ſi medelam
 ſuſcipere volet, initio à fortibus factō, prout opportunū vi-
 ſum fuerit, ita vt definiſ in molliorum vſu, donec vterus vi-
 ſus tibi fuerit probe eſſe purgatus, & ſtomachus recto ſtatu
 eſſe conſtitutus, & rite ſitus. Si vero à potu ac medicamento
 menſes non proceſſerint, etiam ſi moderato tempore id bi-
 berit, nequaquam à potu ceſſandum eſt: vbi vero probe ha-
 buerit, ſpecillorum vſu os ſtomachi molliēdum eſt, & faciē- F
 dum vt hiet, ac viam præbeat appoſitio medicamento, idq̄;
 pharmacis ſuffitui aptis ac mollientibus perſicies. Quum au-
 tem ſatis ſuffitum ac mollitum eſſe videbitur, appoſito me-
 dicamento ſubditio vteri purgationem facies, donec rite
 habere videbitur, à mollibus ad fortiora progreſſu factō, ita
 vt rursus in mollibus ac odoratis definiſ. Nam pleraque ex
 fortibus medicamentis ſtomachum exulcerant ac corrodūt.
 Deinde vero tum ſtomachum ad rectum ſtatum ac ſanitatē
 redigito, quo aptus ſit ad ſuſcipiendam genituram, tum vte-
 rum ſiccū reddito, & ſtatum immittito. Si mulier præ pin-
 guitudine vterum ad concipiendum læſum habere videatur,
 attenuatio q̄ maxime, & gracilitas inducatur, ſupra reliquā
 curam. Tempus porro vernum aptiſſimum eſt ad concipien-
 dum. Vir

Stomachus locellorum.

*Cum pin-
 guedo cō-
 ceptū im-
 pedit, quid
 agendum
 ſit.*

A dum. Vir autem non fit ebrius, neque vinum albū bibat, sed quod fortissimum est ac meracissimum, itemq; edulia fortissima, & calida non lauet: robustus autem sit, & sanus, & à cibis abstineat ad rem non conferentibus. Et vbi marem generare voluerit, mensibus desinentibus aut defectis misceatur, & quā penitissime intrudat, donec defæuiat. Vbi vero fœmellam generare volet, quum plurimi menses prodierint mulieri, & dum adhuc eunt, coeat, ac dextrum testem obliget, quantum id tolerare poterit: sed si marem generare expetat, sinister testis obligandus erit. Stomachus vteri à suffimentis quidem, vbi conclusus fuerit, hians redditur, ab emollientibus vero mollescit. Suffire autem oportet, loti corticem, lauri semen siue baccas, & folia eiusdem viridia contusa, thus, myrrham, artemisiæ semen aut folia: item anisum & adipem aut ceram simul contusa, sulphur, cupressi semen, peucedani radicem, myrti folia viridia contusa, fibri testem, asini masculitercus, allia, styracem, adipem suillum. sed & si distortum os vteri fuerit, his suffiendum est. Sic quidē igitur hians redditur ac conuertitur. Mollire autem per hæc vteri os oportet, sandaracham videlicet, adipem caprinum, fici succum, filiphij succum, cyclamini succum, Thapsiam, succum tithymalli, cardamomi semen, herbam quæ pep'os appellatur, fibri testem, lini semen, nitrum, ari radicem, staphidem syluestrem, calaminthæ folia viridia, herbæ lanariæ siue struthij semen, scillæ internam partem.

*Quo modo
mas fœmis
nāus ge-
nerandus.*

*Simile
quid præ-
cipit Colu-
mella in
ouibus.*

*Que le-
miam, aspe-
rent, clau-
dant aper-
riantque
nulnam, lo-
cellasue.*

*Medica-
mina pure-
gantia lo-
cellos.*

C Medicamenta emollientia, & ad ciendum idonea, quo fortis purgatio fiat.

T Hapsiæ radicem, medullam bouis, adipem anserinum, rosaceum, hæc trita ac feruefacta per quatrimum apponat, & bibat porri succum, ac vinū dulce album. Item resinam, & oleum tepidum, cuminum, nitrum, mel, sordida lana excipiat, & per quatrimum vtatur, bibatque apij semen, & thuris nucleos quinque, & cuminum Aethiopicum in vino albo meraco dulci, lauetque bis per diem. Item myrrham, thus, fel bouis, resinam terebinthinam, aut netopon siue metopium vnguentum, horum singulorum æqualem mensuram misceat, & in lana pura, aut linteo tenui apponat. Intingat autem linteum in vnguento albo Aegyptio odorato, & filo obligatum, à balneo subdet. &

*Discreta
locellorum
purgamē-
ta.*

h polypum

HIPPOCRATIS LIBER

polypum plagis mollium edat, & apij ac asparagi semen ac vinum album bibat, ter in die ieiuna existens. Aut myrrham, casiam, thus, cinamomum, netopum, singulorum æquas portiones lana exceptas, aut in glandes redactas apponat.

Aut cucurbitæ sylvestris interiora, cuminum tostum, anethi semen, cupressi radicem, trita ac melle cocto subacta in glandes cogito, easque subdendas exhibeto, & bibat Peonie radicem, apij semen, ac filphij succum, cum vino. Sed & Bulbium ipsum subditum purgat. Item myrrham primariam, & florem æris modicum in vino albo odorato subdat.

Medicamenta subditiua ad vterum purgandum conuenientissima.

Accipe æris florem ac nitri tertiam partem, melleq; cocto subacta in glandulas iustæ magnitudinis ac crassitudinis redige, atque sic ad vteri osculum appone. si vero fortius facere velis, elaterium ammiscere, ad florem solum, & hoc modo coactas glandulas subdendas præbe. Potes & ramulorum fici corticem derasum ac tenuiter tritum ammiscere, quum os vteri siccius esse videbitur, dimidia portione eodem modo. Aliud. Elaterium & æris florem trita, duabus floris partibus, vna elaterij acceptis, dilue, & cyclaminū tritum prout opportunum videbitur ammiscere, & in lana simul coacta subde.

Glandulæ album fluxum purgantes.

Artemisiam herbam, nitrum, cyclaminum semiaridum, cuminum, subde. Alia. Artemisiam herbam viridem tritam, & myrrhæ tertiam partē, ammixto vino odorato, in lana alba obuolue, eamque vino tinctam apponendam præbe. Vbi vero hauerit vterus, nitrum, cucumeris sylvestris medullam, cyclaminum semiaridum, in lana appone.

Subditiua omnis generis purgare potentia.

Staphidem sylvestrem viridem tritam, artemisiæ herbæ folia trita, melle cocto excipe, & in umbra siccata in glandulas coge, ac subdendas exhibe. Aliud. Florem æris, & alumē Aegyptium cum cyclamino dilue, & velut priora melle cocto excipe, aut in caricam inde, cum modica myrrha. Aliud. Cyclaminum tritam vino albo odorato ammixto, in linteo tenuissimo puro obliga, & subdendam

A dendam præbe. Aliud. Cyclaminum semiaridum, nitrū, cantharidas, adipem, sandarachem, subde.

De virgine.

S I virgini menses maturi non prodeant, multum & febricitat, & dolet, & fitit, & esurit, & vomit, & furit, & rursus resipiscit: vterus mouetur, & quum ad viscera vertitur, vomit, ac febris, & delirium accedit. vbi vero sedatur vterus, & hæc quiescunt, esurit, ac fitit, & febris lenis, hepialon græci dicunt, tenet, Huic pelles agninas calidas ad ventrem apponere oportet, & suffitum facere in ipsa pudēda quàm penitissime, ita vt super amphorę collo desideat, & fumum admittat. Fiat autem suffitus ex myrrha magnitudine fabæ, & thuris duplia portione, ammixta etiam zea fresa. hæc simul suffire debet, & in ignem immittere maxime dum ieiuna est, & multa calida lauare.

Medicamentum subdititium.

A Lumen Aegyptium emollitum lana inuolutū subdat. Aliud. Artemisiā tritam, & vino albo subactā, apponendam præbe.

Puerperæ recens enixa.

R OSACEUM, myrrham, ceram, mixta in lana apponenda præbe. Vbi autem vterus ipsi prociderit, acida & acerbata offerenda sunt, tum potanda, tum foris adhibenda. Item ficum nigram, allium, nitrum, cuminum, hæc omnia tenuiter trita in lana apponenda dato. Aliud. Sepiæ testam tusam, & vino imbutam, cum leporinis pilis, lana excipe, & apponendam præbe. Si vero post partum vterus doleat, ptisanam, & porrum, ac adipem caprinum coquat, indeque modicum forbeat. Subdititium medicamentum. Nitrum, cuminum, ficum, omnium æquas portiones subde.

Subdititium purgans & molliens.

N ETOPUM, rosaceum vnguentum, adipem anserinū, linteis tenuibus excipe. Si menses multi prodeunt, Præoniæ grana nigra bis septem numero, in vini cyathis duobus bibenda præbe. Si vero uteri frequenter prolabantur, vteros aqua tepida mades facies, ipsam vero mulierem supinam reclinabis, miscebisque mali corium, gallam, & rhoem rubram, hisque in vino albo

*Fabius
Caluus le-
git, Si mē-
ses multi
non pro-
deunt.*

h ij tritis

HIPPOCRATIS LIBER.

trititis vteros illines, ac immittes. Postea lauri folia in vino au-
stero bibenda dabis. Quum autem mulier prægnans menses
profluos habet, sterminus sicum, & rubricam, ac sepiæ tes-
tam, trita simulque linteo illigata apponat, si vero secunda
non purgetur, elaterij oboli Attici pondus in vini albi Cya-
thi mensura tritum bibendum præbe, & purgabitur.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE EXECTIONE

foetus, Iano Cornario medico

physico interprete.

*Partus fru-
stulatim
extractio.*



E his qui non iuxta naturalem mo-
dum pariuntur, sed excinduntur,
hoc modo se res habet. Primū qui-
dem Sindone supra mulierem in-
iecta, eam supra mammas circun-
dato, & caput obuelato, ne videns
quod facturus es timeat ac exhor-
rescat. Si itaque foetus oblique pro-
lapsus manum protensam habue-
rit, manu apprehensa foras produ-

cere quàm maxime conare, & brachium ipsum excoriato, at-
que ubi os brachij denudaueris, squatinæ pellem circū duos
manus digitos obligato, ne caro lubricitate sua elabatur. De-
inde vero carnem circa humerum rescinde, ipsumque iuxta
iuncturam exime, post ea caput iuxta naturam protrusum fo-
ras producere tenta. foetum vero ipsum intro protrudito, fer-
ramento per latus & costas, siue claviculam adacto, quo fla-
tum emittat foetus, & confidat ac contrahatur, atque ipsi fa-
ciliior exitus pateat. Cæterum caput si fieri potest iuxta na-
turam extrahe, sin minus, confringe: atque sic foetus vnà sub-
extrahe. Postea calida large perfusam, & oleo illitam decū-
bere iubeto, pedum situ alternatim variato. Bibat autem vi-
num dulce, album, meracius temperatum. Sed & resina mel-
le trita ac vino ammixta, in potu præbeatur. De cætero vero
curanda est, velut dixi, iuxta ea quæ relata sunt. Quum vero
parienti

- A** parienti mulieri foetus oblique prolapsus fuerit: id quod contingit dum vertitur puer, & vmbilicus circum collum obuoluitur, & exitum foetus impedit, & caput in coxendicem incumbit, & manus vt plurimum foras prominet, quod ipsum mortui foetus signum est. Quibus autem manus non exerta est, vt plurimum viuunt foetus, periculum autem etiam hoc modo est. Aliquæ enim purgamenta ante partum mittunt, & necesse est cognoscere ex eo partum siccum, & cum dolore laboriosum esse. Quibus autem purgamenta ante partum non prodeunt, hæ in pariendo facilius liberantur. Concute-re porro oportet hoc modo. Sindone subfrata mulierẽ reclinabis, & aliam superiniicies, quo pudendum ipsius sit obuclatum, obuoluesque sindonem circum vtrũque crus & circum vtranque manum. Mulieres autem duæ vtrunque crus apprehendant, & aliæ duæ vtranque manum, deinde concutiant valide ipsam tenentes non minus quàm decies. Postea in lectum reclinetur mulier in caput, ita vt crura sursum vergant, & mulieres omnes ipsum pedibus corripiant, manibus dimissis, sæpeque concutiant, ac reiectionem in humeros faciant in lecto, quo foetus in spaciosiorem locum retrusus vertatur, & naturaliter prodire possit. Et si dictamnũ creticum habueris, ipsum bibendum dabis: sin minus, fibri testem in vinum chium derades. Si vero vteri foras prodierint, siue ex dolore, siue ex partu, si quidem iuenculę fuerint, aggressiõnem facito: sin min⁹, finito. Aggressio autem hoc modo fiat.
- C** Pelliculam vteri iuxta naturalem modum & oblique incisam, linteo confricato donec inflammetur, & illinito phocæ oleo siue adipe, aut pice, aut mali punici flore integito, & molles spongas vino resperfas apponito, & ex humeris ipsas alligato. Mulier vero decumbat cruribus quàm maxime iursum versus porrectis. Moderatis autem eduliis vescatur.

HIPPOCRATIS LIBER
HIPPOCRATIS COI
 LIBER DE DENTITIONE,
*Iano Cornario medico phy-
 sico interprete.*

*Carnosi,
 minus lac-
 tis hauri-
 unt.*

*Dentitionis
 uarietas.*



Veri natura habitiores, non pro carnositatis ratione etiam lac sugunt. Voraces vero & multum lactis trahentes, non pro ratione carnosii fiunt. Pueri sugentes si multum mingant, minime anniculi fiunt. Quibus alius multum profuit, & bene concoquant, hi saniores sunt. Quibus modice profuit, & voraces sunt, & non pro ratio-

ne similiter nutriuntur, morbofi. Quibus multum lactosum reuomitur, his alius supprimitur. Quibus in dentitione alius amplius subducit, minus conualluntur, quam quibus parum. Quibus in dentitione febris acuta accedit, parum conualluntur. Quicumque dentientes habitiores manet, & altiore somno vtuntur, periculum est ne conuulsione corripiantur. Qui hyeme dentiant, reliquis similibus existentibus, melius liberantur. Non omnes in dentitione conuulsi moriuntur, sed multi etiam feruantur. Qui cum tussicula detiunt, tardius dentes producant, in perpunctione autem magis gracilescent.

Quicumque in dentiendo hyemem habent, si attente tractentur, dentitionem facilius ferunt. Qui plus mingunt quam egerunt, pro ratione habitiores sunt. Qui non pro ratione mingunt, verum alius frequenter cruda a pueris egerunt, morbofi sunt. Qui bene dormiunt, & habitiores sunt, multum alimentum adsumunt, idque adiacet, non sufficienter distributum.

Qui dum sugunt interim cibum adsumunt, facilius ablactatione ferunt. Qui saepe cruenta ac cruda per aluum egerunt, plurimi in febre somniculosi sunt. Ulcera in tonsillis citra febre facta, securiora sunt. Quibus infantibus in sugendo tussis instat, vna maiorem habere solet. Quibus cito in tonsillis
 vlcera

*Tonsillarum
 ulcera.*

A vlcera serpentia confidunt, febribus ac tussi permanentibus, periculum est rursus generanda esse vlcera recurrétia. Vl-cera tonsillarum in infantibus periculosa. Pueris memora-bilis magnitudinis, si vlcera in tonsillis sint, & deglutire pos-sint, salutis signum est. Quum vero maiores prioribus, deglu-tire in tonsillarum vlceribus non possunt, his multam bilem reuomi, aut per aluú prodire, periculosum est. In vlcerib⁹ tóssillarum si quid araneosum inest, nō bonum. In tonsilla-rum vlcerib⁹ post prima tempora, pituitam per os effluere, si prius non fuit, cōmodum est, & tamen reducenda est. Si vero incipiat, & omnino remittat, gaudendum est. Si autem non sic effluat, vereri oportet. Qui tonsillas destillatione vexa-tas habent, his aluus amplius subducta, siccas tusses sol-u-it. Verum pueris si quid concocti superne prodierit, am-plius soluit. Vl-cera multo tempore in tonsillis citra aug-mentum manentia, ante quintum aut sextum diem periculo-sa non sunt. Sugentes qui multum lactis adsumunt, vt plu-rimum somniculosi sunt. Sugentes qui non probe alun-tur, macilenti fiunt, & egre vires recolligunt. Vl-cera in tō-sillis ætate facta, peiora sunt quàm aliis temporibus, citius e-nim proserpunt. Vl-cera in tonsillis circa vnam proserpen-tia, in his qui feruantur vocem alterant. Vl-cera proser-pentia circa fauces, grauiora & magis acuta, vt plurimum spi-randi difficultatem inducunt.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE CORPORVM

resectione, Iano Corna-

rio medico physico

interprete.

h iiii

Arteria

HIPPOCRATIS LIBER

Arteria.

Pulmo.



Magna

vena.

Hepar.

Rhenes.

Vesica.

Gula.

Stomach⁹

Septum.

Lien.

Venter.

Colon.

Rteria extraq; fauciu parte exor
tum faciens, in summitatē pulmo-
nis definit, circulis cōposita confimilibus rotundis, in superfieie se
mutuo cōingentibus. Ipse autem
pulmo testitudinem coadimplet,
in sinistram cōuersus, quinque apices habēs, quos lobos & summitates vocant, cinereo colore præditus, notis cauernosis compunctus,

Cor. naturaq; antrosus existens. Ad medium vero ipsius cor situm est, rotundius ac oblongius quàm in omnibus animalibus. A corde vero ad hepar multa charitilaginosa arteria procedit, & cum ipsa vena magna appellata, per quam totum corpus nutritur. Hepar autem similitudinem quidem cum omnibus aliis habet, verum sanguinolentius quàm alia existit, apices habens duos, quos portas appellant, in dextris locis sitas. Ab hoc vero obliqua vena inferne ad rhenes tendit. Rhenes autem confimiles colore, malorum speciem præ se ferunt. Ab his canales obliqui ac ferme triangulares in summum vesicæ apicem tendunt. Vesica autem tota nervosa est, magna que ac late se extendens capacitas intra eam à natura disposita est. Et has sex partes intus per medium corpus natura disposuit. Gula autem à lingua principium faciens, in ventrem definit, quam sanè Græci etiam cesophagum, & stomachum, id est os ventris, significanter appellant. Cæterum à spina retro hepar, septum transversum productum est. Ex latere vero nostro, sinistro videlicet, lien initio sumpto extensus est ad humani vestigi similitudinem. Venter autem hepatis adiacens iuxta sinistram partem, totus quidem est nervosus. A ventre vero extat intestinum ventri consimile, longum cubitorum non minus duodecim, pampino formiter in sinibus inuolutum, quod aliqui colum vocant, per quod alimenti delatio contingit. A colo autem situm est rectum ac princeps intestinum postremum, carnem copiosam habens, & in summum anum definens. Reliqua porro natura ipsa ordinavit ac disposuit.

Hippo-

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE CORDE, IANO

Cornario medico phy-
sico interprete.

Or figura velut pyramis est, colo-
re autem abundè puniceum, & tu-
nicam leuem circūdatam habet, &
est in ipsa humor modicus velut
vrina, vt putare possis in vesica cor
diuersari. Facta est autem ea gra-
tia, vt sanum in custodia floreat.
Habet autem humiditatem tātam
quanta satis est estuanti in mede-
lam. Cæterum hunc humorem cor

Cor quale
Cordis tui
nucula.

Paulo cor
humescit.

emingit, bibendo ipsum assumens ac consumens, pulmonis
nimirum potum lambens. Etenim homo multo maximā par-
tem in ventrem bibit, Gula enim siue stomachus velut infun-
dibulum, potus copiam & quæcunque volumus excipit. Bi-
bit autem & in guttur ac arteriam, minus vero & quantū la-
tere possit per rimam illapsum, Operculum enim exactum
epiglossis, lingula siue minor lingua appellata, ne permiserit
quidem aliquid amplioris potus penetrare. Signum autem

Stomachi
effigies.

Epiglossia.

Beſcia-
cis ab exo
emplo.

huius rei, hoc est: Si quis enim aquam caruleo colore, aut ru-
brica temperatam, sitienti valde bibendam dederit, maxime
sui, hoc enim pecus non est curiosum, neque mundicie de-
ditum. Deinde dum adhuc bibit ipsius guttur refecet, hoc co-
lore ipsum tinctum reperiet: sed non est cuiusvis hæc chi-
rurgie aggressio. Nequaquam igitur fides nostra suspecta ef-
se debet de potu, quod homini in guttur vergat. Sed quomo-
do aqua acervatim irruens, turbationem ac tussim multam
exhibet? propterea inquam, quod contra respirationem fer-
rur. Quod enim per rimam illabitur, tanquam iuxta parie-
tem delabens, aeris elationi nō instat, sed leuem ac lubricam
quandam viam humectatio ipsi præbet. Hunc itaque humo-
rem cor de pulmone vnā cum aere abducit. Aerem quidem
igitur ubi in medelam cecidit, necessario oportet retrō per
eandem

HIPPOCRATIS LIBER

eandem viam qua adduxit reicere. Verū humorem partim in culeum ac vaginam suam expuit, partim rursus vnā cum aere foras propellit. Quapropter etiam palatum eleuat, quū spiritus recurrit. Merito autem recurrit. Non enim humanæ naturæ alimentā hæc sunt. Quomodo enim hominis alimētum sint ventus & aqua cruda? sed sunt magis cognatæ affectionis castigatio & medela. Porro vt ad institutū sermonem reuertamur. Cor musculus est valde fortis non neruo, sed densitate ac constrictione carnis, & duos ventriculos

Cor quid.

Cordis vtriusculi, siue

sinus.

habet discretos in vno amiculo, ab vtraque parte vnum. Nichil autem inter se similes sunt. Alter enim in dextris ad osculum situs est, contingens alteram venam. Alter in sinistris. Totum enim cor in his sedem suam firmavit. Sed ille etiam omnino amplioris ventris, & magis inanis quā alter est, neque extremitatem cordis attingit, sed caudam eius ambit, solidus item est, veluti extrinsecus affusus. Alter autem iuxta sinistram mammam maxime in directum situs est, vbi etiam saltus ipsius significationem sui præbet. Amiculum autem habet crassum itemque foueam. Foueæ enim speciem præ se fert similem mortario. Sed enim hic etiam

Pulmo cor

dis calore

modera-

tur.

Cordis si-

uus quales

separata-

est.

Oscula autem

ipsis non sunt

aperta, nisi si

quis cordis

auriculas præ-

fecerit, aut caput

cordis præ-

cidat. Si autem

quis præ-

fecerit, appare-

bunt duplicia

oscula in duobus

ventriculis.

Crassa enim

vena ex altero

excurrrens visum

decipit, si fue-

rit resecta. Hi

fontes sunt

pulmonem subit cum mansuetudine, & circuniectu ipsius, caloris intemperantiam castigat. Etenim pulmo natura frigidus est, sed & inspiratione perfrigeratur. Ambo autem densi ac asperi sunt interna sui parte, & velut subcorrosi, magisque sinister quā dexter. Nam insitus à natura ignis non est in dextro. Quare mirum est sinistrum asperiores fieri, vbi intemperatum aerem inspirauerit. Quapropter etiam roboris caloris custodiendi gratia crassius intus constrictus est. Oscula autem ipsis non sunt aperta, nisi si quis cordis auriculas præfecerit, aut caput cordis præcidat. Si autem quis præfecerit, apparebunt duplicia oscula in duobus ventriculis. Crassa enim vena ex altero excurrrens visum decipit, si fuerit resecta. Hi fontes sunt humanæ naturæ, & hic flumina sunt quibus totum corpus irrigatur: atque hi etiam vitam homini cōferunt, & vbi resiccati fuerint, homo moritur. At vero prope exortum venarum, corpuscula circum ventriculos consurgunt, mollia, cauernosa, quæ auriculæ appellantur. Non sunt autem foramina aurium, non enim clamorem exaudiunt. Verum sunt organa quibus natura aerem rapit. Et sanè

A sanè videtur mihi boni ac præstantis artificis opificium esse.

Quum enim considerasset figuram solidam futuram ipsius *Creatoris optimi sumum opificiū cor.*

visceris, propter sanguinis ex venis effusi collectionem ac concretionem, deinde attractorium ipsum esse totum vidisset, folles ipsi apposuit, quemadmodum fabri ferrarij fornacibus solent, quo per ipsos spiritum apprehenderet. Signum autem sermonis hoc est. Etenim cor videas ex toto ventila-

ri, aures vero priuatim tum inflari, tum confidere ac contrahi. Et propter hoc etiam dico, quod venæ quidem operantur

Venæ sinum sinistru pñat.

respirationem in sinistrum ventriculum, arteria autem in alterum. Molle enim magis attrahit, & incrementum capit.

Arteria magna dextræ.

Oportebat autem nobis magis incumbentia cordis tegmina perfrigerari. Est enim calor non in dextris: quare pro-

pter hanc affectionem, non acceperunt amplum organum, ut ne in totum ab ingrediente aere superarentur. Restat

Cordis reliqua.

dicendæ cordis pelliculæ latentes, opus dignissimum cognitione. Sunt enim & aliæ quædā in ventriculis pelliculæ,

velut araneorum telæ extensæ, quæ undiquaque oscula cingunt, & strias ac segmenta in solidū eor inferūt. Hæ mihi nerui ipsius visceris & vasorū principia aortis esse videtur, est au-

Vena aorta.

tem ipsarum par vnum. Cæterum osculis singulis tres pelliculæ subornatæ sunt, rotundæ in summo, velut circulus semisectus. Et qui rei intelligentes sunt admirantur, quomodo oscula & aortarum fines claudunt. Et si quis veteris, eximendi cor mortui, moris gnarus, aliam auferat, al-

Cor nihil afficitur.

liam reclinet, neque aqua, neque flatus immixtus in cor penetrarit, atque hæ magis in sinistri ventriculi osculis exactius, & merito sanè subornatæ sunt. Mens enim hominis in sinistro ventriculo insita est, & reliquæ animæ imperat.

Mentis situs.

Nutritur autem neque cibus neque potibus à ventre, sed pura & illustri substantia ex sanguinis discretionem nata.

Adsumit autem alimentum ex proxima sanguinis cisterna, radios suos eò immittens, & depascens, velut ex ventre intestinorum alimentum non naturale existat. Quo vero nō in mora sit, qui in arteria est in fluctuatione constitutus ci-

Arteria magna utrum depascitur.

bibus, iam in ipsam occludit. Magna enim arteria ventrem depascitur ac intestina, plenaque est alimento non principali. Quod autem non nutritur sanguine apparente, & quæ videmus, arteria ipsa magna, ex hoc manifestum existit.

Mactato

HIPPOCRATIS LIBER

Arteria
parua.

Maçtato enim animali, & sinistro vetriculo dissecto, tota de-
solata apparet, modico seroso humore excepto, flauaque bi-
le, ac pelliculis, de quibus iam mihi dictum est. Arteria autē
altera sanguine non est destituta neque ventriculus dexter.
Hoc quidem igitur vas causa fuit, mea sanē sententia, vt pel-
liculæ producerentur. Id vero quod ex dextro fertur ventri-
culo etiam ipsum quidem commissura pellicularum claudi-
tur, verū non valde salit præ imbecillitate. Sed aperitur qui-
dem in pulmonis vasa, sanguinem exhibens ipsis in alimen-
tum, clauditur autem in cor, non tamen confestim, quo ingre-
diatur quidem aer, nō autem multus. Debilis enim est hic ca-
lor, frigiditatis facultate superatus. Sanguis enim non est na-
tura calidus, neque enim alia aliqua aqua, sed calescit, Multis
autem videtur natura calidus esse. Et de corde sanē talia di-
cta sint.

Sanguis ca-
libus natu-
raliter nō
est.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE GLANDVLIS,

Iano Cornario medico phy-
sico interprete.

Glandulæ
quales.



Sanguis ali-
bus de glā-
dulis ma-
nat.

E Glandularum tota natura
sic habet. Natura ipsis est spō-
giosa, Sunt enim raræ & pin-
gues, & neque carnes sunt re-
liquo corpori similes, neque
aliud quid simile corpori, Sed
friabiles sunt, & venas multas
habent. Si vero disseces, san-
guis largus erumpit, specie al-
bus & velut pituita. Tangen-
ti autem velut lanē apparent.
Et si multa vi ipsas digitis cō-

prefferis, glandula humorem oleosum remittit qui & ipse cō-
teritur vt plurimum, ac disperit. Aegrotant autem non val-
de, sed vnā cum reliquo corpore. Quam vero proprio morbo
ægrotant:

- A** agrotant: nam parū etiā cum reliquo corpore agrotāt: morbi tubercula fiunt, & strumę resultat, & febris corp^o occupat. *φύματα.*
 Perpetiuntur autem hæc, vbi humiditate repletæ fuerint, ex reliquo corpore in ipsas influente. Influit autem ex reliquo corpore per venas, quæ per ipsas extentæ sunt multæ & cauæ, vt humor quemcunque tandem traxerint, facile in ipsas sequatur. Et si multa ac morbosa fuerit fluxio, glandulæ reliquum corpus in se distendunt, atque sic febris incenditur, & eleuantur ac inflammantur glandulæ. Cæterum glandulæ in corpore sunt plures siue maiores, in cauis ipsius partibus, quàm in articulis, & quæcunque in aliis humectis ac sanguinolentis locis consistunt: atque illæ quidem, vt quod superne
B in cauas partes influit, suscipientes in se trahant, hæc vero vt rursus nascentem præ laboribus humiditatem in articulis, si quam articuli remittant, eius multitudinem susceperint: & sic nimia humectatio in corpore non inest. Nam si etiam quid gignatur humiditatis, non statim nimia humectatio inde successerit. Refleçitur enim & consumitur tum multa, tum modica, in ipsas glandulas, atque sic reliqui corporis redundantiam glandulæ sibi lucrifaciunt, & alimentum hoc est ipsis coalescens. Quare vbi cœnosa partes sunt & humectæ, ibi etiam glandulæ. Cuius signum est. Quod vbi est glandula, ibi etiam pili. Natura enim facit glândulas & pilos, vtraque eadem utilitate participant. illas quidem vt quod influit, velut antea dictum est, suscipiant. Pili vero ex glandulis opportunitatem habentes nascuntur & augetur, colligentes id quod in extremitates redundat ac efferuescit. Vbi autem corpus siccum est, neque glandula, neque pilus inest. At vero teneræ & exercitiis deditæ & humectæ partes, glandulosæ sunt ac pilosæ. Glandulæ porro sunt ab vtraque aurium parte iuxta iugulares colli venas, & pili etiam ibidem. Item sub alis vtrinque & glandulæ & pili sunt. Inguina & pubes similiter vt alæ, & glândulas & pilos habent. Et hæc quidem canx corporis partes sunt, & ad humoris redundantiam expositæ. Nam & laborant hæc, & ex omnibus corporis partibus maxime mouentur. Reliquæ vero glandulas tantum habent, velut intestina. Habent enim & hæc glandulas in omentum maiores: pilos autem non habent. Nam & in cœnosis ac humectis terræ locis, semen non nascitur, neq; supra terram ascendere conatur, *Quæ parte sunt glandulæ.*
Sata ubi non nascitur.

HIPPOCRATIS LIBER

natur, sed per redundantiam putrescit ac suffocatur. Violat **D**
enim semen, violat aut & in intestinis copia ac multitudo hu-
moris, & pilos enasci non sinit. Glandulæ autem in intesti-
nis maiores sunt, quam alibi in corpore, & pascuntur hume-
stationem nimiam ex intestinis exprimentes. Intestina vero
ex vasis in omentum suscipiunt ac remittunt humiditatem.
Omentum autem in glandulas distribuit. Habent præterea
etiam rhenes glâdulas, Nam & hi multa humiditate exsati-
antur. Maiores vero etiam hac parte quam aliæ glandulæ exi-
stunt. Influxus enim humor in rhenes non imbibitur, sed per-
fluit infra in vesicam. Quare quicquid eius lucrificiunt de ca-
nalibus, hoc ad se trahunt. Sed & aliæ in corpore glandulæ
sunt parvæ valde, Verum non volo hunc sermonem longius **E**
euagari permittere, Nam earum quæ alicuius momenti sunt
gratia, hoc scriptum institutum est. Nunc itaq; sermone pro-
gressum faciam, & dicam de tota natura glandularum colli.
Collum ab utraque sui parte hinc & hinc glandulas habet,
& vocantur hæ glandulæ tonsillæ, in hunc usum atque vtili-
tatem. Caput supra situm est, sursum cauum ac rotundum
existens, & humiditatem ex reliquo corpore complectens, &
corpus simul vapores omnis generis sursum in caput demit-
tit, quos caput rursus retro dimittit. Non enim immorari ac
manere potest id quod influit, non habens ubi sedem firmet.
Nisi sanè caput ægrotet. Tunc enim non remittit, sed isthic
retinet. Postquam vero attractionem remiserit in glandulas
fluxio vergit, & nihil molestat, donec pauca & moderata flu- **F**
xio fuerit, & ipsæ glandulæ validæ ac potentes extiterint. Si
enim multa & acris influxerit, manseritque acris & glutino-
sa, inflammatur ac intumescit & collum distenditur, atque sic
ad aurem progreditur, & si quidem in utranque partem pro-
cesserit, utraque auris: sin ad alteram, altera tantum ægrotat.
Si autem pituitosa, & multa ac lenta fuerit fluxio, etiam sic
inflammatur, & inflâmatio quum stabilis humor existat, fru-
mas pessimum colli morbum generat. In alas autem etiam
tunc quid confluit. Sed ubi copiosi fuerint acres & serosi hu-
mores, etiam sic in ipsis tubercula producuntur. Sed & in in-
guinibus glandula à partibus supra sitis humiditatem trahet,
sed ubi multitudo eius occupauerit, inguina intumescunt,
& suppurantur ac inflammantur, similiter ut alæ ac collum.
Atque

*Viscerum
glandulæ
magnæ
sunt.*

*Renum
glandulæ.*

*Tonsillæ.
Caput quæ
le.*

*Quando
glandulæ
vexant.*

- A Atque hæc sanè tum bona, tum mala glandulæ exhibere videntur. & de his quidem hæc suffecerint. Porro intestina multam facietatem ex cibis ac potibus habent, & præterea humiditatem sub cuticula habent. Sed & hæc tota reflectitur ac consumitur in glandulas, similiter velut superior. Morbos autem non facit ferè, quemadmodum in articulis cōtingit. Frequentes enim glandulæ & expassæ, ac non cæcæ sunt, & altera alterius multitudine non multum fruitur, & aliàs si qua etiam plus habere velit, copiam eius habere non potest, Sed quod in paucas ac singulas confluit in articulis, id in multas hic diuiditur, & æqualitas ipsis existit. Caput etiam ipsum glandulas habet, cerebrum nimirum simile glandulæ. Est enim cerebrum album ac friabile, quemadmodum etiam glandulæ. Et ob id in commoditatem capitis glandulas facit, & per relatas à me cerebrum auxilium ferens humiditatem aufert, & in extremitates foras ablegat, per fluxiones ex magna parte. Maius autem est cerebrum quàm aliæ glandulæ, & capilli etiam maiores quàm alij pili. Maius enim est cerebrum, & in amplo spacio in capite situm est. Facit autem morbos & minores, & maiores, quàm aliæ glandulæ facit autem quum in infernas corporis partes redundantiæ ac superfluitatem suam ablegarit. Fluxiones porro de capite vsque ad secretionem contingunt, per aures secundum naturam, per oculos, per nares, atque hæc tres sunt, & aliæ per palatum in guttur, & in gulam, & alia per venas in medullam spinalem, & in sanguinem. Quæ omnes septem numero existunt, hæc fluxiones cerebri fordes ac purgamenta discedentes existunt, & si non discefferint, morbus ipsi inde oboritur. Sic autem & reliquo corpori aliqui morbi accedunt, si intrò abierint ac discefferint hæc fluxiones, & non foras. Et rursus turbatio multa oboritur, si hianter ac affatim attrahat, & acrem quidem fluxionem cerebrum demittat, quæ in fluxiones corrodit & exulcerat. Et si id quod cerebro influit copiosum fuerit, fluxio descendens non desinet, donec multitudine influentis exhauserit atque sic id quod influit foras demittens, & aliud suscipiens, ac semper in consimili statu consistens, & humores trahit, & morbos facit. Ambo autè magno tædio ac molestia naturam frangūt, quæ si fuerit affecta, dolorosa afflictio existit. Affectiones enim na-

*Viscerum
mala unde*

*Glandulæ
intestine
quales.*

*Cerebrū,
glandulæ
simile.*

*Septem ca
pitis mea
tus fluores
que.*

HIPPOCRATIS LIBER

nim naturæ sunt prædictæ fluxiones, & multitudinem mole- D
 ste ferunt, & morium ac rosionē perceptant, ex eo quod præ-
 ter rationem & non consuetum existit. Cerebrum autem cla-
 dem perfert, etiam ipsum non sanum existens, sed si quidem
 rodatur, turbationem multam sustinet, & mens desipit, & ce-
 rebrum conuellit ac distrahit totum hominem, qui in seipso
 vocem nō edit, ac suffocatur, & hæc affectio sideratio, ac græ
 Sidratio, ce apoplexia appellatur. Aliquando vero acris quidem nō est
 ἀπὸ πλῆ- fluxio, sed copiosa in cerebrū irruens, ipsum affligit, & mens
 ξία. perturbatur, & homo circum ambulat, aliena cogitans, & alie
 Morbus i- na videns, perferēs morbi mores, visis, risu, & peregrinis ima-
 ginosus ginationibus. Alia fluxio ad oculos ophthalmia Græcis,
 ἐφθάλ- latine lippitudo appellatur, & oculi in ipsa intumescunt. Si
 μία. vero ad nares defluxio fiat, arroduntur nares, & nihil E
 aliud graue accedit, nam viæ ipsarum amplæ sunt, & sibi au-
 xiliari possunt, insuperque non compactum est quod ab ipsis
 discedit. At vero aures intortus quidē meatus & angustus,
 Purulētæ cerebri, aures. cerebrum autem prope ipsum ipsis auribus apprimitur. Ae-
 grotans vero hoc morbo, plurima excernit, & auris à frequē-
 ti fluxione per tempus vexatur, & pus graueolens effluit. Sic
 etiam fluxiones ad oculos foris conspicuæ sunt, & nō lethā-
 les in totum. Si vero fluxio retrò processerit per palatum,
 Palati de- & in ventrem pituita peruenerit, fluunt quidem horum ven-
 fluitatio. tres, non autem agrotant. Si vero inferne maneat pituita, af-
 fectiones voluolosa fiunt diuturnæ. Aliis autem si per pa-
 Tabes. latum in guttur multa fluxio contingat, vt plurimum morbi
 Pulmo qui tabis oriuntur, replentur enim pulmones pituita, atq; ea ipsa F
 consuma- pus fit, id quod pulmones exedit, & ægroti non facile super-
 tur. stites manent, & mens medici si bonus & prudens est, vt plu-
 rimum causam intelligit. Alius morbus oritur ex defluxio-
 Phthisis. ne capitis per venas in spinalem medullam. Inde autem in sa-
 crum os impetum facit, quo medulla ipsa fluxionem perdu-
 cit, & in coxendicum acetabula siue iuncturas deponit. & si
 tabem fecerit, homo marcescit, atque hoc modo contabescit,
 & viuere non expetit. Statim enim scapulæ dolent, amboque
 pedes ac crura consequuntur, & semper tandem pereūt mul-
 to tempore curati. atque sic deflorescit homo ac moritur.
 Cerebri Hæc mihi de fluxionibus capitis dicta sunt. Sunt autem af-
 alia mala. fectiones cerebri, etiam alij morbi, deliria, insanix, omnia
 periculosa,

A periculosa, & ægrotat cerebrum, & aliæ glandulæ. Habet enim & dolorem, & alius congressus corporis hic contingit. Quin & glandulæ in pectoribus mammæ appellantur, & attolluntur ac lac faciunt, aliquibus vero lac non faciunt. Et faciunt quidem lac mulieres, viri vero non faciunt. Mulieribus enim rara est glandularum natura, quemadmodum etiam reliquum corpus rarum habent, & alimentum quod in se trahunt, in lac permutât. Et ab vtero accedit ad mammas, quod post partum puero cessurum est in alimentum, quod ipsum sanè exprimit ac sursum mittit omentum, ad supernas partes ab ipso foetu coarctatum. Verum maribus locorum angustia, & corporis insuper densitas conducit ad hoc, vt glandulæ non sint magnæ. Mas enim plenus est, & velut pallium densus, tum ad visum, tum ad tactum. fœmina vero rara & laxa, & velut fluida, tum ad visum, tum ad tactum. Quare humiditatem non remittit id quod est rarum & molle. Mas autem non amplius quid eius susceperit, quum densus existat ac coherens & cōpactus, sed & labor corpus ipsius corroborat, vt non sit locus vbi redundantia ac superfluitates recipiat. Atque hoc modo cogit ac concludit hæc ratio, & pectora, & mammas, & reliquum corpus mulieribus laxa ac mollia esse, tum ob ocium ac segniciem, tum ob alia prædicta, Viris autem vice versa. Porro faciunt etiam mamme tubercula ac inflammationes, lac ipsum putrefaciêtes. Cōmoda autem habent superioribus similia, & reliqui corporis redundantiam auferrunt, testimoniū abunde præbent mulieres, quibus morbus, aut alia quædam calamitas mamas adimit. Nam & vox ipsarū aspera redditur, & humores in gulam feruntur, & multo spuito vexantur, & caput dolent, & ab his ægrotant. Lac enim proficiscens ac influens ab vtero, quemadmodū etiam antea in superna vasa transibat, quum propria vasa non habeat, nec reperiat vtpote ipsis per mammarum ademptionem priuatum, in principales corporis partes incurrit, cor videlicet ac pulmonem, atque sic suffocantur.

*Mammæ,**Marii corpus quale.
Fœminæ corpus.*

HIPPOCRATIS LIBER
HIPPOCRATIS COI LI- D
 BER DE OSSIVM NATVRA
mochlicus, id est uectiarius, Iano
Cornario medico physi-
co interprete.

Manus pe-
disq; ossa
articuli.



SSIVM natura hæc est. Digito-
 rum quidem ossa ac articuli simpli-
 cia sunt. Manus autē & pedis mul-
 ta alia, alio modo coarticulata. Ma-
 xima vero suprema parte. Calcanei
 vero vnū, velut extra apparet. Ad
 ipsum autem posteriores tendines
 tendunt. Tibiæ vero duo sunt, quæ
 superne ac inferne cohæret. Iuxta
 medium vero distant. Paruum est

quod extrinsecus est, iuxta paruum digitum paulo tenuius.
 Plurimum autem hac parte distant, & minore momēto iuxta
 genu: & tendo ex ipso enascitur, qui circa poplitem foris est.
 Habent autem inferne communem appendicem, ad quam pes
 mouetur. Aliam vero superne habent appendicem, in qua fe-
 moris articulus mouetur simpliciter, & expedite in longitu-
 dinem, specie nodosa, patellam habens. Ipsum autem femur
 foras, & in anteriore parte incuruum est. Caput autem eius
 appendix est rotunda, ex qua neruus, qui in coxæ acetabulo
 est, nascitur. Subobliquus autem etiam hic annexus est, mi-
 nus vero quàm brachium. Coxa vero magno verticula, quod
 iuxta os sacrum est, ex ligamento cartilagineo ac neruoso
 adhæret. Spina vero à sacro osse, vsque ad magnum verticu-
 lū gibbosa est, & vesica, & genitura, & recti intestini pars in-
 clinata, in hac parte est. Inde vero vsque quo ad septum trans-
 uersum peruenit, in directum repanda est. & musculi lumba-
 res hac parte existunt. Hinc vero vsque ad magnum verticu-
 lum, quod supra supernas humeri partes est, è directo gibbosa
 est. Immo magis esse videtur quàm est. Nam posteriores ossiū
 propagines hac parte altissimæ sunt. Ceruicis autem articu-
 lus re-

Patella.

Coxa.

Os sacrum

Spina.

Cervix.

- A** lus repandus est. Verticula vero intrinsecus inter se æqualia sunt: ab externis autem chartilaginibus ac nervis continentur. Coarticulatio vero ipsorum in posteriore medullæ spinalis parte est. A posteriore autem parte exortum acutum habent, qui appendicem habet chartilaginosam, unde nervorum propago prona fertur: quemadmodum etiam muscoli à ceruice ad lumbos adnascuntur, costarum ac spinæ medium explentes. Costæ vero iuxta discriminationes verticulorum, nervo annexæ sunt à ceruice vsque ad lumbos intrinsecus. Ab anteriore autem parte, iuxta pectus, laxam ac mollem summam partem habentes, specie præ cunctis animalibus maxime obtorta. Hac enim parte angustissimam molem homo habet. Qua vero parte costæ non sunt, exortus obliquus, brevis & latus, ad singula verticula nervo annexus est. At vero pectus coherens ipsum sibiipsum, discriminationes habet obliquo, qua parte costæ annexæ sunt. Laxum autem est & chartilagineum: claviculæ vero rotundæ sunt ad anteriorem partem, ad pectus quidem breves motus habentes, ad summum vero humerum frequentiores. Summus autem humerus ex scapulis nascitur, in plerisque dissimiliter. Scapula ad spinam chartilaginea est, reliqua parte laxa, inæqualem partem foras habens. ceruicem vero & acetabulum habet chartilagineum, ex quo costæ motum habent. Facile autem ut inter ossa exolvitur, brachio excepto. Huius autem caput ex nervo ex acetabulo dependet, chartilaginis laxæ rotundam appendicem habens. Ipsum vero brachium incurvum foras, & anteriore parte obliquum, non rectum est ad acetabulum. Pars vero ad cubiti gibbum lata est, & nodosa, & repagulo similis, & solida, posteriore parte caua, in qua cornix inest ex cubito, quum manus fuerit extenta. Ad hanc etiam torpidus nervus, qui ex cubiti ossium discriminatione media enascitur, perficitur ac terminatur. Ossa manus viginti septem sunt, pedis viginti quatuor. Colli vsque ad magnum verticulum septem, lumbi quinque, spinæ viginti, capitis una cum oculorum ossibus octo. In uniuersum nonaginta unum, cum unguibz vero centum ac vndecim. Cæterum ut nos ipsi ex hominis ossibus didicimus, verticula supra claviculam una cum magno septem sunt. Iuxta costas autem tot quot costæ sunt, duodecim videlicet. Iuxta laterum mollitudinem

Costæ.

Pectus.

Claves pectoris.

Scapulæ.

Caput humeri.

Nervus torpidus.

Manus, pedis, cætorumque ossa.

Vertebræ Costæ.

HIPPOCRATIS LIBER

Semen ge vero forinfecus vbi coxendices, in lumbo quinque. *Semen D*
nitale fa- porrò velut fauus ab vtraque vesicæ parte est. Ex ipsis au-
uo simile. tem rhenibus venæ ab vtraque meatus vrinæ parte, in puden-
Potus quò dum tendunt. Potus per fauces ac gulam; larynx enim qui
tendat. caput arteriæ est, in pulmonem ac arteriam tendit: ab his in
Larynx. summam vesicam. Hepatis extremitates quinque sunt. su-
Hepar. per quarta autem extremitate fel incumbit, quod osculum
Fel. ad septum transuersum, & cor, ac pulmonem profert. Cir-
Cor. cum cor pellicula est. Intestina crassa homo maiora quàm
Mesocolò. canis habet, dependent autem ex Mesenterij membrana,
Rhenes. quæ Mesocolon hac parte vocatur, Mesocolon autè ex neruis
Arteriæ. de spina sub ventrem. Rhenes ex neruis de spina. Arteriæ
 fons cognatus cor est. Vena tendit per septum transuersum, *E*
 hepar, splenem, rhenes, ad coxendicem, circa suram ad sum-
 mum pedem. Altera autem ex corde sub alas, clauiculas, iu-
 gula, caput, nasum, frontem, iuxta aures, humeros, dorsum, pec-
 ctus, ventrem per cubitum. Aliæ vero per alias ad cubitum
Nerui. ad summam manum. Neruorum exortus ab occipitio vs-
 que ad spinam, ad coxendicem, in pudenda, in femora, pe-
 des, tibias, in manus. Alij in brachia, partim in carnes, par-
 tim ad fibulam, in magnum digitum, partim ex carnibus in
 alios digitos. Alij ad scapulas, pectus, ventrem, ossa, ligamen-
 ta. A pudendo vero ad princeps intestinum ac podicem, ace-
 tabula coxarum, partim supra femur, partim infra ad genua.
 Inde alius ad genu extentus ad tendinem, pernam, pedes. a-
Venæ rhe- lius ad fibulam, alius in rhenes. Ipsæ porrò venæ in vtran- *F*
num. que partem bifariam maxime finduntur, partim ab vna vtri-
 usque rhenis parte, partim ab altera: & perforatæ sunt in rhe-
 nes. Habent autem cordis formam ipsi rhenes. Nam etiam
 ipsi ventriculos habent. Ad vero Rhen cauiam sui partem ad
 venas magnas habens situs est, Vnde enascuntur ex ipso ve-
 næ in vesicam, qua parte potus trahitur per venas in rhenes,
 & per ipsa intestina per quæ procedit. Deinde vero velut per
 qualum, per rhenes aqua percolatur. Spongiforme enim est
 ipsoꝝ corpus ad vesicam, & hic percolatur ac secernitur à
Vrina qua sanguine vrina, quapropter etiam rubra existit. Neque enim
re rubeat. in rhenes aliæ procedunt venæ quàm quæ dictæ sunt, neque
 est alius locus vbi potus colliqueſcat, quantum ego noui.
Venæ co- Venæ circa costas tendentes, subter vnamquaque costam
 sunt,

A sunt, non à capite, inferius etiam ab arteria. Arteria quidem *starum.*
 igitur subtermeans in costas distribuit. A crassa vero vena à
 corde recurrit vna in sinistram partem inclusa. Deinde hæc *Vena cor-*
 quidem per medias vertebrae vsque ad summas costas meat, *dis.*
 non ex æquo distribuens costis à dextris ac sinistris ramos
 ac segmenta sua. Alia vero æquos quidem, verum superne in
 dextris finditur. Cæterum iuxta vtranque claviculam due
 venæ sursum, duæ sub pectus, partim ad dextras, partim ad
 sinistras, ramos siue segmenta, spargunt, illæ quidem magis
 ad ceruicē, duæ vero alteræ magis ad cor, partim ad dextras,
 partim ad sinistras, ab vtraque parte iuxta costas, & sub ip-
 sis velut inferiores scinduntur, donec recurrenti inferne à
 corde commiscantur. At vero sanguiflua vena ab arteria *Arteria.*
B hac, propterea finditur, quod sublimis hic est per cor means.
 Infra vero costas vena sanguiflua crassa appellata, verticulis
 rursus seipsam ingerit, & hic adhæret, & non amplius pen-
 det, velut superne per hepar means. Est autem iuxta lumbum
 quidem superne arteria, infra autem sanguiflua, ab hepate
 per septum transversum sublimis veniens, & ad dextram
 cordis fertur vsque ad claviculas simplex, præterquam quan-
 tum cum corde communicat, iuxta vasa quidem in ipso ma-
 gis in superficie fissa, verum iuxta vasa in ventriculo cordis
 penetrans, postea à corde ad sinistram se demittit, & sim-
 plex ad spinam rursus currit, ad superna quidem corporis vs-
 que ad supremas costas, & ramos à seipsa habet iuxta vnam-
C quanque costam extensos iuxta naturam vsque ad pectoris
 commissuram, & in sinistram, & in dextram, & rectitudo ip-
 sius magis ad verticulum est, quam arteriæ extensio, itemque
 venæ ab hepate venientis. Ad inferiorem vero cordis par-
 tem, recta extensio ab ipsa magis ad verticulum est, quam ar-
 teriæ extensio altera, quæ iuxta cor & in infernas partes se-
 pti transversæ ad spinam appensas conuersa est. Inde vero ra-
 mi in vnamquanque rectitudinem inferuntur, per ossa & car-
 nes mutuo transeunt. At vero venæ crassæ sic habent. Ex
 oculo iuxta supercilium per dorsum iuxta pulmonem sub pe-
 ctore, altera ex dextra in sinistram, altera ex sinistra in dextram
 transit, & quæ quidem ex sinistra venit, per hepar in renem
 ac testiculum descendit, Quæ vero ex dextra, in splenem &
 renem ac testem, his autem osculum est ipsum pudendum.

HIPPOCRATIS LIBER

A dextra vero mâma in sinistram coxendicem, & in crus descendit, & rursus à sinistra in dextram. Oculus vero dexter, ex sinistro venam suscipit, itemque testiculus. Iuxta eundem **D**
Venarum modum rursus sinister ex dextro. Crassissimæ porro venæ
quatuor in hunc modum se habent. Quatuor paria sunt in corpore.
paria. & aliquæ quidem ex ipsis, à capite retrò per ceruicem foris
Venarum iuxta spinam ab vtraque parte ad coxendices perueniunt, &
descensus. ad crura, deinde per tibias ad malleolorum partes externas, ac in pedes procedunt. Oportet igitur venæ sectiones in doloribus in dorso, ac in coxendicibus, à poplitibus facere &
Secundæ. à malleolis forinsecus. Alteræ vero venæ ex capite iuxta aures per ceruicem, sphagitides, id est iugulares appellatæ, intrinsecus iuxta spinam, ab vtraque parte iuxta lumbos procedunt in testes, & in femora, & per poplites ab interna parte, Deinde per tibias ad malleolos intrinsecus, & ad pedes. **E**
Oportet igitur venæ sectiones facere ad dolores lumborum ac testium, à poplitibus ac malleolis intrinsecus. Tertiæ venæ ex temporibus per ceruicem in scapulas procedunt, deinde in pulmonem deferuntur, & perueniunt altera quidem à dextris in sinistras sub mammam, in splenem & in renem. Altera vero à sinistris in dextras ex pulmone sub mammam in hepar & in renem, desinunt autem ambæ hæ in intestinum rectum ac podicem. Quartæ autem venæ ab anteriore capitis parte ac oculis, sub ceruicē & sub clauiculas procedunt. Deinde à brachiis superne sub curuaturas, postea per cubitos, ad manuum iuncturas ac digitos. Postea rursus à digitis, per manuum pectora, hoc est volas, & per cubitos in curuaturas, & per brachiorum infernam partem ad alas, & ex costis superne, altera quidem in splenem procedit, altera in hepar, deinde supra ventrem ambæ in pudendum desinunt. Et crassæ quidem venæ hoc modo se habent. Sunt autem & à ventre venæ per corpus multæ & omnigenæ, per quas alimentum corpori venit, procedunt autem & à crassis venis in ventrem ac reliquum corpus, & ab extremis, & ab intimis, & inter se mutuo distribuunt, internæ foras, externæ intro. **F**
Venæ à Venæ igitur sectiones facere oportet iuxta hos modos. Oportetamque dare oportet, ut quàm longissime à locis, ubi dolores fieri solent ac sanguis colligi, secemus. Sic enim minimè mutatio magna de repente fiet, & consuetudinē transuleris, ut

- A leris, vt ne amplius in eundem locum colligatur. Cæteri Hepatitis vena in lumbo vsque ad magnum verticulum, inferne etiam verticulis se ingerit, inde sublimis eleuata per hepar, & per septum transuersum in cor: & hæc quidem recta ad clauiculas procedit. Inde vero alię quidem ad collum, alię ad scapulas, alię deorsum reflexę iuxta verticula ac costas declinant, à sinistris quidē vna prope clauiculas, ex dextris autem in quendam ipsarum locum. Alia vero vtrinque deflexa. Alia paulo inferius deflexa, vbi quidem illa deficit, costis se ingerit, donec ad venam in ipsum cor accefferit ad finistras deflexa. Infra autem decuruata ad vertebrae descendit donec perueniat, & inde incipit eleuari, ingerens se costis reliquis omnibus, & hinc atque hinc ramos iuxta singulas spargens quum vna existat, à corde quidem in locū quēdam in sinistris magis existens, deinde infra arteriam, donec consumatur & perueniat eo, vbi hepatitis eleuata est, priusquam autem eo venit, iuxta extremas duas costas bifida sit, & altera pars hinc, altera inde ad vertebrae progressa consumitur. Altera vero recta à corde ad clauiculas tendens, supra arteriam est, & ab hac (quemadmodum & ea quę iuxta lumbum infra arteriam est) in hepar exilit, partim in portas, & extremitatem, partim in reliquum consequenter procedit paulo infra septum transuersum. Septum autem transuersum hepatis adnatum est, vt non facile separari possit. Duplices autem venę à claniculis, alterę hinc, alterę inde, sub pectus ad pubem ac pectinem tendunt, quò vero inde, nondum noui.
- C Septum vero transuersum iuxta verticulum infra costas, ea parte qua rhen ex arteria confurgit, Arterię vero ex rhe-
ne oriuntur, hinc & hinc ab arteria neruum habētes. Et hac parte in recurrente à corde hepatitis desinit. Ab hepatitide vero per septum transuersum maximę duę, altera hinc, altera inde sublimes feruntur. Multifidę autem per septum sunt, & circum ipsum innascuntur. Verum supra septum hæ magis conspicuę sunt. Duo autem crassi nerui, à cerebro sub os magni verticuli superne, & magis ad gulam, ab vtraque arterię parte vterque progrediens, inter se committuntur, vt vni similes existant, Deinde verticula ac septum transuersum hic sunt vbi desinunt. Et quidam dubij, ad hepar & splenem ab hac societate tendere ipsos putauerunt. Alius

Hepatis
vena.Venarum
distributio
varia.

Arterię.

Nerui à
cerebro.

HIPPOCRATIS LIBER

neruus vtrunque ex verticulis iuxta clauiculam ad spinā tē- D
dit, ex obliquo verticulorum, & se in costas ingerit: atque hi
quemadmodum venæ per septum transfuersum ad mesente-
rium mihi tendere videntur. vbi autem hæc deficiunt, rursus
hinc vbi septum exoritur, ab eo continui ac coherentes exi-
stentes, iuxta medium infra arteriam, de cætero ad verticula
se ingerunt quemadmodum venæ, donec totum sacrum os

*Quid ossa,
nerui, caui
ro, cutis,
uene cor-
pori præ-
stent.*

pergressi consumuntur. Ossa corpori stabilitatem, & re-
ctitudinem, ac speciem exhibent. Nervi flexionem & cō-
tractionem ac distentionem. Carnes & cutis omnium col-
ligationem ac constructionem. Venæ per corpus diffuse
spiritum & fluxum ac motum exhibēt, ab vna multæ germi-
nantes, atque hæc vna vnde oriatur, & vbi desinat, non scio, E

*Vena ca-
pitis.
Capitis ue-
næ quadri-
partitæ.*

Circulo enim factō principium non inuenitur. Cæterum ra-
mi ac germina ipsius vnde pendeant, & qua parte corporis
desinant, & quod vna his consentit, & in quibus locis corpo-
ris extentæ sunt, ego declarabo. Circa caput iuxta mediū
ex obliquo circumfusa est vena lata & tenuis, non multi san-
guinis, In cerebrum enim iuxta commissuras multæ tenues
venulæ radices egerūt, & circum totum caput extentæ sunt,
vsque ad frontem ac tempora. Ipsa autem in rectum extē-
ditur retro caput forinsecus iuxta spinæ cutem, inde vero
circa externam ac internam venā ex his quæ in iugulis sunt
demittitur. Ultra aures autem subfissa à gena forinsecus tē-
dit crassa. Ab hac in linguam multæ & tenues procedunt, F

*Vena sub
lingua.*

excepta ea quæ sub linguam & sub maxillares dentes fertur.
Ipsa autem crassa per clauiculam descendit sub scapulas: &
hac parte ab ipsa germinat per neruum subter summam hu-
meri partem siue cuticulam, Vena humeralis appellata. Ipsa
autem sanguiflua est & sanguine plena, & ægre curatur, si rū-
patur aut conuellatur. Ab altera enim parte neruus latus ip-
sam ambit, ab altera chartilago, medium vero locum ipsa te-
net, & pellicula spumosa. Quum igitur locus non sit carno-
sus, facile rumpitur, & carnem circum nasci non contingit, &
si sanguis in hanc partem subtercurrat, nactus spaciosum lo-
cum non discedit, sed induratur. Induratus autem morbum
& dolorem exhibet. Atque hæc quidem finit vbi prius dixi.

*Pellicula
spumosa.*

*Māmarā
uena.*

Illā vero sub scapulas germina emittit sub mammas densa-
rum & tenuium ac varie implicatarum inter se venularum,
& per

A & per humeralem venam, prætergrediens chartilaginem, ipsam subter subattingens ad brachium tendit, musculum in sinistra habens. Dextra autem ipsa finditur circa humerum, & cubiti supernam partem. Inde vero cubitum vtrunque penetrans, postea manus iuncturam, inde autem defluens per totam manum varie vagans radices agit. Ceterum principalis vena iuxta spinam sparsa, per dorsum, & iugulū, ac guttur, in cor inseritur, & de seipsa venam magnā multorum ossiculorum in corde producit, inde vero in os procedens fistulam facit, quæ sanè arteria appellatur, per pulmonē transiēs, pauci sanguinis ac multi spiritus existens. Propter spaciositatem enim ac raritatem visceris, multis locis per pulmonē

Vena principalis.

Arteria magna.

B deriuatur, cætera vero chartilaginosa facta est. Quapropter sanè etiam si quid in has vias pulmonis delatum fuerit ex insuetis, vel in potu, vel in spiritus ac sanguinis transitu, utpote venis talibus existentibus, & viscere spongiformi, ac multum humorem suscipere potente, & sursum procedente: tum humorum ingressorum lex constituta est, tum sanguis amplius per has venas non multus continetur, neque multū constringitur, & non cito procedens, illabentia non educit. Ipsis autem non subeductis, sed intus manētibz, callosa cōcrescit duricies. Sic autem destruitur alimenti accessio ac ingestio, quum hac parte arteriæ capitis accessus ad externas partes existat. Interceptis vero transitibz. per callosam duriciem, velocitas ac difficultas spirandi oboritur, quum neque

C emitte neque attrahere spiritum facile possint. Ex huiusmodi autem tales morbi fiunt, velut sunt anhelationes, & tabes sicca. Si verò humor amplior in ipsis cōsistens prævaluerit, ut crassifactus spissari non possit, & pulmonem putrem facit, & vicinas ipsi partes, fiuntque suppurati ac tabidi.

*ταχύ-
πνοια
δύσπνοια.*

Tabes sicca.

Fiunt autem hi morbi etiam ob alias causas. Inde porro hæc vena pulmonē occupat, & per extremitates duas magnas intro conuersas, sub septum transversum extēta est ad spinam, alba ac nervosa, venulas per reliquum condensatum corpus spargens. hinc autem per verticula densis venulis in spinalem medullam inseritur, ac instar hederæ implicatur.

*Vena quæ
pulmonem
petit.*

Et aliæ quidem venæ in corpus distributæ ex omnibz. partibus ad spinam tendentes, vnaquæque quod tenuissimū ac sincerissimum est colligens hic eructat. Hæc vero velut præ-

fes im-

HIPPOCRATIS LIBER

ses imposita per demissas plicationes in idem cogit. Inde D
vero etiam in rhenes radices agit, tenuibus ac fibrosis venulis iuxta spuriam costam. hinc autem tendens condensatur, po-
steaque etiam nervosa fit ad princeps intestinum ac podicē,
Vena ner- compressusque musculos adstrictorios ipsi inseritur. In ve-
vus fit. ficam etiam, & testes, ac adstites radices agit, multiplicibus
Caulis pu- implicatis tenuibusque ac solidis & fibrosis venis. Inde ve-
dendorum ro crassissima ac rectissima ipsius pars rursus conuersa in cau-
Pecten. lem transit, hoc est pudendum. In reflexu autem in illa ipsa
adaptatur. Et per pectinem supra subter cutem ventris & ip-
sius venæ, procedunt venæ ad eas quæ deorsum tendunt,
quæ in seipsas mutuo deriuantur. Penetrant autem & per pu-
dendum venæ crassæ, & tenues, & densæ, & curvæ. At ve-
ro in foeminis illa ipsa in vteros tendit, & in vesicam ac vri-
næ meatum. hinc autem recta procedit, & mulieribus qui-
dem circa vteros pendet, masculis vero circa testes diffemi-
natur. Ob hanc autem naturam ipsa vena etiam plurima
foecunda ac genitalia concipit. A plurimis enim ac sinceris-
simis partibus connutrita, paucique sanguinis existens ac ca-
ua, & densa instar nervi, ac spiritu referta, intentaque à pu-
dendo, demissas ad spinam venulas cogit: hæ vero velut cu-
curbita medicinali in seipsas coactæ, omnia in supernam ve-
nam emittunt. Confluit autem & ex aliis corporis partibus
in hanc, verum multo maxima pars velut dictum est, de me-
dulla hac colligitur. Voluptas vero accedit, vena hac ge-
nitura expleta, Quum igitur soleat reliquo tempore modici
sanguinis ac multi spiritus esse, repleta & calfacta & semine
deorsum confluyente, ea quæ in seipsa habet constringit. Spi-
ritus autem in ipsa existens, & præsens violentia, & caliditas,
& venarum vndiquaque concitatio, titillationem inducit.
Illa autem quæ à seipsa germinauit, per dorsum & iugu-
lum iuxta spinam sparsa, multis venulis costas intertexit, &
verticula per carnes alternatim condensat, vt & probe nutri-
ta & sanguine plena existat. Ipsa autem iuxta coxendicem ac
nates meat, per musculum sub femore submersa, à natibus ve-
ro iuxta acetabulum femoris iuxta caput in venam perfora-
ta est, quæ femori respirationem exhibet, trans femur autem
iuxta flexuram ad genu. Alteram vero iuxta inguina de-
mittit frequentibus radicibus, & ægre transeuntem. Hæc ve-
ro per

E

F

A ro per musculum tendens, & circa genu disseminatur, & per ossis tibialis summitatem venam de se in fistulam cauat, quæ medullam nutrit, & deriuatur per infimam tibiā, iuxta pedis illigationem ac connexionem. Ipsa autem per patellam genu ad interna per tibiæ musculum submersa extenditur, & per malleolum implicatur, intus crassa & sanguine plena, atque hic circa malleolum, & tendinem, venas ægre cognobiles producit ac inuoluit. Ipsa vero infra ad pedem, sub summum pedem decurrit, & hic se implectens, & in magnum digitum innitens, duplam sanguine refertam venam superne sub cutem ex summo pede reflectit, & apparet sanè crassifecta iuxta externam malleoli partem, ac sursum spargitur iuxta oppositum tibiæ radium. Iuxta suram autem velut fundam facit, Inde extenditur iuxta internam genu partem. Immittit etiam patellæ venas, & iuxta internam patellæ partem quæ caua est, venam implicat, quam si quis doleat, celerrime biliosum serosum ac saniosum humorem colligit. procedit autem ipsa iuxta internam genu cavitatem. Distribuit etiam de se in poplites multas implicatas venas, Quæ inde tendentes iuxta neruos sub femore, radices agunt in testes, & in rectum intestinum ac podicem, & circa os sacrum attenuatæ vnitæ circuntenduntur. Illa vero procedens iuxta internam genu cavitatem, sursum iuxta internam femoris partem, in inguen transit, & per coxendicem vltra ad spinam & lumbum foras veniens, crassa & lata ac sanguine plena sursum porrigitur ad hepar, & vbi bifidam produxit sanguine refertā venam, dextram hepatis extremitatem, ad rhenem occupat, Rursus vero subter hepar dispersa in venam crassam finditur. Fissa vero in crassitudinem hepatis inseritur, & altera quidem ipsius pars in superficie visceris extat, in qua etiam est fel, habetque multas radices instar cirrorum ac plicationum per hepar dispersas. altera vero pars per internas ipsius partes deriuatur.

Fcl.

Dux autem venæ inter duas latas extremitates explicantur, & vna quidem per vertices ac cutem penetrans ex vmbilico effertur. Altera vero premens spinam, in rhenem, ac vesicam, & pudendum, velut ancoris iactis inseritur. Verum ex coxendice incipiens ascendere ad pubem, multas vagabundas producit venas, & costas ac verticula ad spinam illigat, & propa-

HIPPOCRATIS LIBER

& propagines suas multipliciter per venas transmittit, & D
 intestina ac ventrem inuoluit. Et aliæ quidem à pube ad
 mammas, & supra mentum, & summos humeros expositæ
 diuagantur. Alia vero procedens iuxta crassitudinem he-
 patis, vbi fel in fistulam coegit, sursum sub spinam disper-
 gitur, per septum transversum itinere facto. Cæterum ve-
 na ex sinistris partibus, in reliquis quidem iuxta eandem
 naturam, velut ea quæ in dextris, radices agit. Verum ex fini-
 stris emergens in hepar non se ingerit, sed in splenem inse-
 ritur, iuxta caput quod in crassitudine ipsius consistit. In-
 de vero internas splenis partes subit, ipsasque venulis san-
 guinolentis instar aranearum telæ intertextit. Hic vero to-
 tus ex omento eleuatur, venulis ex seipso sanguine plenum E
 ipsum reddens. Quæ vero à capite splenis ad spinam acce-
 dunt, per septum transversum penetrant. Inde vero sursum
 & dextra & sinistra sub pulmonem extenduntur. Quæ au-
 tem sanguine plenæ sunt, sub ipsum & in ipsum corriuan-
 tur. Quæ vero pauci sanguinis & tenues à pulmone intrin-
 secus procedentes, qui natura rarus existit, utpote ab ip-
 so emulcæ, in cor frenantur circa auriculas ipsius, & in ca-
 uitates internas diffuunt. Ingerunt autem & priores in ip-
 sum. Etenim in angustia transitus situm est, velut ex omni
 corpore habenas habens. Quapropter ex omni corpore
 maxime circa thoracem sensus existit. Colorum quoque
 mutationes corde adstringente venas ac laxante fiunt. La-
 xante quidem igitur rubicundi colores fiunt, & bene colo-
 rati ac pellucidi, constringente vero, virides cum pallore &
 liuidi. Verum tales euariant iuxta præsentis in vnoquo-
 que colores.

*Venaque
de sinistris
dextra te-
dit.*

Lien.

*Sensus cor-
poris to-
tius cur in
pectore.*

Hippocratis

A HIPPOCRATIS COI

LIBER DE LOCIS IN

*homine, Iano Corna-**rio medico physico**interprete.*

Ihi quidem videtur principium *Membra*
 corporis nullum esse, sed omnia *hominis*
 similiter principium, & omnia *qualia.*
 nis. Circulo enim scripto princi-

pium non reperitur. Similiter etiā
 morborum in toto corpore. Quod *Corp^o sic-*
 enim siccius est, morbos magis *cū magis*
 recipere, ac magis dolere, à natura *morbo ob-*
 solet. Humidum vero minus. Mor- *noxium*
 bus enim qui in sicco est, stabilitur *quā hū-*
midum.

& nō cessat. Qui vero in humido, diffluit, & aliās aliam cor-

poris partem occupat, & semper transmigrans requiem facit,
 & citius quoque sedatur, vtpote non stabilitus. Corporis au-

tem singulæ partes altera alteri, vbi hinc aut illinc processerit,
 morbum statim facit, venter capiti, caput carnibus ac vē-

tri, & reliquæ omnes iuxta eandem rationem, quemadmo-

dum venter capiti, & caput carnibus ac vētri. Etenim quū

venter egestionem moderatam non fecerit, & in ipsum ci-

bis ingeratur, humiditate ciborum ingestorum corpus irri-

gat. Ipsa autem humiditas à ventre obstrueta, aceruatim ad

caput viam facit, & vbi ad caput peruenierit, à vasis in capite

non recepta, fluit quocunque contigerit, & circum circa ca-

put, & in cerebrum per os tenue, & partim quidem os ipsum

subit, partim vero circum cerebrum per os tenue. Et si qui-

dem in ventrem rursus peruenierit, ventri morbum inducit.

Si vero ad aliam aliquam partem incubuerit, illi ipsi morbū

facit. Ita etiam reliquæ partes altera alteri morbum inducit,

& optimum fuerit sic curare ægrotas per has quæ morbos fa-

ciunt. Sic enim quā optime principium ægrotantis quis sa-

nauerit.

HIPPOCRATIS LIBER.

Corp⁹ q^{le}. nauerit. Corpus porro ipsum sibiipſi idem ac ſimile eſt, & ex iſdem cōpoſitum eſt. Similiter autem habet & paruas & magnas partes, itemq^{ue} infernas ac ſupernas. Et ſi quis minimam corporis partem acceptam male afficere velit, totum corpus affectionem ſentiet, qualiſcunq^{ue} tandem ea fuerit: propterea quod minima corporis pars omnia habet quæcunq^{ue} & maxima. Inſuper quicquid tandem minima pars pertulerit, ad gentilitatem refert ac tranſfert, vnaquæque ad ſuam, ſiue bonum ſiue malum id fuerit, & propterea corpus & dolet, & lætatur, cum minima gente, quia in minima omnes inſunt partes, & hæc ad gentiles ſibiipſis ſingula tranſferunt, & omnia denunciant. Cæterum natura corporis, principium ſermonis in arte medica, primum perforata eſt qua parte audimus. Etenim vacua circum circa aures, non aliud inaudiunt quam ſtrepitum & clamorem, Quicquid autem per membranam in cerebrum peruenerit, id liquido & clare auditur. Ob id etiam foramen ſolum per membranam circum cerebrum extantam eſt, In nares autem non ineſt foramen, verum mollis laxitas velut ſpongia & propterea per longiorem diſtantiā audit quā olfacit, odor enim ab olfactu longe diſpergitur. Et in oculos venulæ tenues aduiſum ex cerebro per ambientem membranam feruntur. Hæ autem venulæ viſum alunt humore de cerebro puriſſimo, qui etiam in oculis apparet. Eadem venæ etiam viſum extingunt, vbi fuerint reſiccatae. Membranæ autē tres ſunt quæ oculos cuſtodiunt. Superna quidem craſſior, media tenuior, tertia tenuis, quæ humorem cōſeruat. Ex his ſuperna & craſſiſſima ſi lædatur ac mutiletur morbos facit. Media vero etiam ipſa periculosa eſt, & vbi rupta fuerit prominet foras, velut veſica. Tertia autem tenuiſſima omnino periculosa eſt, quæ humorem conſeruat. Membranæ cerebri duæ ſunt. altera ſuperna craſſior, altera tenuis cerebrum attingens, non amplius eadem permanens, poſtquam fuerit vulnerata. Venæ autem tranſeunt ad verticem per carnem venientes ad officulum. feruntur & per carnem duæ ex vertice rectæ, qua parte ſupercilia clauduntur, & definiunt ad angulos oculorum. Vna autem à vertice ad naſum fertur, & in vtranque naſi cartilaginem ſinditur. Aliæ vero duæ venæ iuxta tempora feruntur, in medio temporum & auriū, quæ

- A** quæ premūt oculos, & semper pulsant, Solæ enim hæ ex venis sanguine non rigātur, sed auertitur ex ipsis sanguis. Qui autem auertitur influenti occurrit, & qui quidem auertitur volens discedere, qui vero superne influit volens infra procedere, hic impelluntur ac diffunduntur ac mutuo circagitantur, & pulsus venis exhibēt. Visus humore de cerebro nutritur, quum autem quid eius de venis acceperit, fluxione turbatur, & humor ipse non apparet, & ob oculos moueri ipsi videntur aliquando velut auicularum imagines, aliquando velut lentes nigrae, & nihil exacte iuxta rei veritatem videre potest. Aliæ duæ venæ in medio aurium & aliarum venarum, quæ feruntur ad aures, & premunt aures. Aliæ duæ venæ ex ossis conclusionem in aures feruntur. Quædam vero infra ad corpus conuertuntur: duæ quidem venæ iuxta tendines colli feruntur & iuxta verticula, & desinunt in rhenes, hæ autem etiam in testes penetrant, & quum hæ affectæ fuerint homo sanguinem mingit. Aliæ duæ venæ à vertice ad humeros feruntur, & sanè humerales vocantur.

*Quæ imā
gunculas
præ oculis
curritates
creant.*

*Venarum
digestio.*

- Aliæ duæ venæ à vertice, iuxta aures, ab anteriore colli parte vtrinque ad cauam appellatam venam feruntur. Caua autem vena finitur quidem velut gula, consistit autem inter gulam & guttur siue arteriam, ferturque per septum trās uersum & per cor, & inter septum, & finditur ad inguina, & ad femora intrò, & disparationes in femoribus facit, & ad tibias intus fertur ad malleolos. Hæ & infœcundum faciunt hominem, quum fuerint sectæ, & in magnos digitos desinunt. Ex caua autem vena producitur quædam in sinistram manum, fertur autem subter splenem ad sinistri lateris mollitudinem, vnde splen propagatur, per omentum, & finem fortitur ad thoracē. Producitur autē iuxta septum, & cum humerali cōmittitur subter cubiti articulum. atq; hæc splenis gratia secatur. Alia etiam ad dextram manū eodē modo à caua producitur. Communicāt autem omnes venæ, & confluunt inter se mutuo, & aliæ quidem sibiipsis per se committuntur ac coincidunt, aliæ vero per venulas à venis extentas. Quæ autē carnes nutriunt, ea parte inter se cōfluūt. Et quicumque morbus à venis oritur leuior est quàm qui à neruis. diffluit enim vnà cū humore qui in venis inest, & nō quiescit. Et natura venis in humore est, in carnib⁹. Nerui autē

*Nerui
sicci
qualitas.*

HIPPOCRATIS LIBER

ficci sunt, & ventriculos siue cavitates non habent, & ad ossa consistunt, & maxima ex parte ab cossibus nutriuntur. Nutriuntur & à carnibus, & colorem ac robur inter ossa ac carnem medium habent. & humidiores quidem sunt ac carnosiores quàm ossa, sicciores autem ac magis ossei quàm carnes. Quicumque autem morbus in ipsos peruenerit, roboratur & quiescit in eodem loco, & difficile est ipsum educere. Maxime vero impetunt ipsos distentiones, & alij morbi à quibus tremor corpus occupat, & qui tremere ipsum faciunt. Nerui autem premunt articulos, extētiq̃ue sunt per totum corpus. Robusti autem maxime & semper crassissimi sunt in illis corporis partibus, in quibus paucissimæ carnes sunt.

Nerui ubi nō sunt. Et corpus quidem omne neruis plenum est. Verum circa faciem & caput non sunt nerui, sed fibræ consimiles neruis, inter ossa & carnes, tenuiores & solidiores. *Capitis futurae.* Capita futuras habent, alia tres, alia quatuor. & quæ quidē quatuor habent, his sunt vtrinque iuxta aures, & tertia ab anteriore, quarta à posteriore capitis parte. Sic quidem in capite quod quatuor habet, in eo vero quod tres, iuxta aures vtrinque sunt, & ab anteriore parte tertia. Posteriore vero parte futura nulla est, velut in eo quod quatuor habet. Saniore autem capite

Supercilia Mandibularia. sunt, qui plures futuras habent. Inter supercilia os descendit ac transit, & mandibularum clausura in medio mento, & superne ad caput est. Verticula alij plura, alij pauciora habent. Qui pauciora habent, his duodeuiginti sunt. horum

Costæ. alia sursum ad caput, alia deorsum ad sedem tendunt. Costæ septem à posteriore corporis parte, ad verticula connectuntur, anteriore parte in pectore inter se committuntur. Clauiculae articulos habent, alios in medio pectoris iuxta gut-

Clauiculae pectoris. tur, atque hic coarticulatæ sunt, alios vero ad humeros, reclinatos ad scapulas, qui humeris semper adherent. *Scapulae.* Scapulae vero ad membra brachij siue totius manus coarticulantur, incumbentes in ipsum os quod in mēbro est. Iuxta os autem

Appendices appendices duæ prodeunt, altera intrinsecus, altera forinsecus, quæ ad scapulas ossi adnascentes, infra coarticulatæ sunt. Quæ vero in cubiti flexura sunt, infra quidem radio coarticulatæ sunt, iuxta os natura cauum existens, supra autem radium paululum, in cubiti gibbum. & tunc tum os, tum radius in idem commissæ, articulum in cubiti gibbo faciunt.

Iuxta

A iuxta vnam vero appendices prodeunt tenues valde quatuor, duæ sursum, duæ deorsum, & ad cubiti gibbum quidem duæ appendices consistentes, supra ex osse hærent, hæc cū osse cohærentes, iuxta ossis articuli in cubiti gibbū coarticulantur. Quæ vero infra sitæ sunt, & intus reclinatæ, hæc vtræque cōmittuntur ad radium ex supernis à membro procedentē, & intus ad membrum coarticulantur, & radium appellatum faciunt hæc sibiipsis intus in cubito cōmissæ. Infra autem ad manum os articulum habet. Appendices vero hac parte teneræ existentes, duæ quidem non exeunt in articulum. Superna autē & inferna cū osse coarticulantur ad manū. Ceterum manus articulos multos habent. Quæcunq; enim ossa inter se cōmittuntur, omnia articulos faciunt. **B** Digniti articulos habent multos, vniquisque tres. Vnum ad vnguem, in medio vnguis & nodosæ prominentiæ, alterum in ipsa nodosa, prominentia, qua parte etiam digitos consecretunt. Tertium qua parte digitus à manu exoritur. At vero in coxendicibus articuli duo sunt, quæ acetabula appellantur, & femora in hos inarticulata sunt. Iuxta femora autem appendices duæ protenduntur, altera intus, altera foris, & in articulum neutra procedit, neque ab altera parte, sed ad os ad femur inferuntur. Femur autem superne vbi in acetabulum ingruit, bifidum est huiuscemodi bicipitate. In ea quidem parte quæ intro inclinata est, in summitate rotundum est ac leue, quæ etiam in acetabulum ingreditur. Altera autem bicipitatis pars exterior, magis foras prominet, & inferius apparet ad nates, & coxendix appellatur. Ad genu vero os femoris taliter biceps est. Bicipitio autem huic os tibia appellata, velut in cardine adaptatum est, supra adaptatum autem Mola siue patella incumbit, quæ humiditatem à carne in articulum expassum descēdere prohibet. Iuxta tibiā autē appendices duæ procedunt, quæ inferne ad malleolos pedis finiunt, superne ad genu non autē perueniunt ad articulum.

Appendices quatuor.

Manus articuli. Digniti.

Coxendices

Femur.

Genu. Tibia.

Ad pedē vero tibia iuxta malleolos articulū habet, & aliū infra malleolo. Et in pedibus articuli multi quæadmodū & in manibus sunt. Quot enim ossa, tot sunt articuli, & in digitis pedū eodem numero sunt, ac pari modo habent. Articuli insuper multi in corpore parui sunt, nō similiter omnibus, sed alij aliis. Hi autē qui scripti hic sunt, omnib⁹ simi-

Pedum articuli.

HIPPOCRATIS LIBER

Mucus. liter habent. Alia etiā venæ aliis sunt, sed nō memorabi- D
les. Mucus omnib. à natura est, & quū hic purus fuerit, ar-
ticuli sani sunt, & bene moueri possunt, utpote lubrici inter
se ipsos. Labor autem & dolor fit, ubi à carne humiditas flu-
xerit vitiosa. Primū enim articulus stabilitur, Non enim lu-
brica est humiditas quæ de carne influxit. Dinde ut multa, &
valde sparsa, & ex carne nō irrigata, semper resiccatur. & ut
multa existens, & articulo ipsam nō capiente, effluit: & male
stabilita eleuat nervos, quibus articulus colligatur, ipsosque
inconnexos ac dissolutos facit. & propterea claudi fiunt,
quum hoc magis fit, magis: quum minus, minus. In ventrem
porrò ea quæ comeduntur ac bibuntur procedunt. Ex ven- E
tre autem, fibræ in vesicam, qua parte humorē percolat, ex-
tentæ sunt. Fluxiones autem, & perfrigerata valde carne,
& percalsacta fiunt, ac superinflāmata. Fluxiones propter
frigus sunt, quum caro in capite, & venæ tensæ fuerint, Hæ-
enim horrente carne, & ad angustias perueniente, adstri-
ctæque ac excludente, humiditatem exprimunt. Et simul car-
nes ipsæ contra exprimunt, ad angustias peruenientes: & ca-
pilli sursum erecti fiunt, utpote simul vndiquaq; fortiter cō-
pressi. Quicquid igitur inde expressum fuerit, id ipsum quo-
cunque contigerit fluit. Fluit autem etiam propter calidi-
tatem, quum carnes rarefactæ transitus præbuerint, & hu-
mor calefactus tenuior redditus fuerit. Omnis enim humor
calefactus tenuior fit, & omne cedens fluit, Maxime vero
ubi valde fuerit inflammatum propter hanc fluit causam. F

Carnes valde plenæ factæ quum capere non possint, fluit
humor qui capi non potuit, fluit autem quocunque conti-
gerit. Vbi vero semel fluidæ factæ fuerint fluxiones, diffu-
unt ad locum quò tādē contigerit, donec transitus fluxio-
nis compressi fuerint propter gracilitatem. Quum autem
corpus fuerit resiccatum, & alioqui corpus ipsum sibiip-
si communicans sit, etiam quum siccum est, diducit, & concipit
ac ducit, ubicunque humor tandem obtigerit: ducere au-
tem ipsum non difficile est, utpote corpore vacuo, & non
intumescēte, præ gracilitate. Aliquando autem infernæ
partes siccæ fiunt, supernæ vero humidæ. Magis autem su-
perna vasa humida sunt. Venæ enim plures supra sunt quàm
infra, & carnes in capite minori humiditate opus habent.

Ducit

- A** Ducit itaque sicca corporis pars humiditatem ex capite, & simul transitus magis ducenti patent, quàm ei quæ ducitur. Nam ipsi transitus, utpote sicci existentes, eam sibi lucrificiunt, & simul humores à natura deorsum procedere solent, si vel modica quædam necessitas contingat. Fluxiones de capite septem sunt, in nares, in aures, in oculos, atque hæ ex capite fluxiones ob oculos conspicuæ existunt. Postquam autem in thoracem fluxerit præ frigore, bilis fit. Magis autem in thoracem præ frigore fluit, propterea quòd facilis est fluxio ad guttur, utpote non contextum. præ frigore vero à bile infestati propterea lassitudine affliguntur, quia carnes quum bilem habuerint, non quiescunt, sed concutiuntur, & concussæ laborant ac delassantur, utpote velut in itinere faciendi concussæ, & suppurati fiunt quum in thoracem fluxerit, itemque tabidi. Quum vero in medullam fluxio conrigerit, tabes occulta ac inconspicua oboritur. Quum autem retro ad vertebrae, & in carnes defluerit, hydrops fit. Id quod ex hoc cognoscere datur. Siccae enim anteriores partes sunt, caput videlicet, & nares, ac oculi: & oculis amplius hebetudo accedit, fiuntque cum virore pallidi, itemque reliquum corpus: & nihil expuit homo, etiamsi multum fluat. Fluxus enim per mediam carnem retro fluens, & ab anteriore auersus, anteriores partes siccas facit, posteriorum vero carnem irrigat, & magis eam quæ intus est ad ventrem, quàm quæ foris est ad nasum. Et propterea corpus foris magis solidum est, quàm intus, & angustiores meatus ac foramina habet. Quare sanè quum tenuia sint foramina constringuntur, ipsaque sibiipsis medentur, & fluxus nullus hac transire potest. Intus vero foramina ampliora sunt, & intermedia tenuiora habent. fluxus vero utpote ab altioribus procedens, & tenuia impedimenta contra se habens, influit & carnes humiditate replet. Sed & humiditas à cibus in idem procedens corrumpitur, corrupta autem ipsa præ ammixtione, & simul cum ipsa ea quæ à capite defluit, corpus nutriunt. Carnes vero multo humore nutritæ, & morbofo augescentes, hydropes plenæ sunt. Si autem modicus fluxus fuerit, coxendicum & articulorum diuturnam affectionem facit, ubi fluere cessauerit. Nam ut modicus, & vndiquaque ab omnibus fortioribus depulsus, ad articulos refugiū facit. Fiunt præ-

*Septē fluxio-
ris descen-
sus.*

*Siliostoma-
gis lassitudo
dine affliguntur.
Purulenti.
Tabidi.
Hydrops.*

HIPPOCRATIS LIBER

terea articularum ac coxendicium affectiones, à talibus morbis sanatis, quum morbum quidem efficiens sanatur, in carne vero quid relictum fuerit, cui non sit exitus, neque rursus intrò, neque foras, sed ad cutem egressum tuberculum utique fecerit, fugit autem in id quod cedit, articulos videlicet, & aut articularum, aut coxendicum affectiones iuducit.

Cum nares tument.

Si porrò intumuerint nares, & pituita plenæ fuerint, atque ea compacta, oportet pituitam compactam ac congelatam attenuare aut fomentis, aut medicamento, & non auertere. Si enim fluxus auersus aliò procedet, omnino maiorem morbum faciet.

Cum aures fluxio peius sit.

Quum vero in aures fluxerit, primum dolorem exhibet, violenter enim procedit: dolorem autè exhibet, donec in fistulam reductus fuerit. Vbi autem fluere cõfueuerit, non amplius dolorem facit. Ei vero quem dolor affligit medicamentum natura calidum, tepidum factum & netopo dilutum, infundendum est, & retrò cucurbita medica affrigenda, si sinistra auris doluerit, ad dextram, si dextra, ad sinistram. non autem scarificando pertundere oportet, sed ut trahat solum sinenda est. Si vero per hæc dolor non sedetur, frigefacientia à natura frigida infundantur, & medicamentum potandum præbeatur, quod secessum deorsum faciat, sursum autem non, quandoquidem vomitus non auxiliatur: & de cætero frigidis utendum est, & semper non sanantem variare oportet modum, & si quidem peius reddiderit malum, ad contrarium te conuerte: si vero ad sanitatem tendat, omnino nihil ab his quæ adhibentur auferre oportet, neque quicquam aliud addere aut apponere.

Cucurbitula quo loco in hoc danda.

Quæ potio

Si vero iam in fistulam reductus fuerit, & multa purulenta sanies fluxerit, quæ graueolens sit, sic facere oportet. Spongiam siccante quopiam sicco medicamento imbue, & in aurem quàm penitissime inde. & in nares purgatorium medicamentum mitte, quo ea quæ prius in aures fluebant, in nares ferantur, & non id quod morbosum est in caput rursus recedat.

Cum oculi fluore uexantur.

Cæterum ubi in oculos fluxio processerit, oculi inflammantur & tument. Sic autem affectum hominem medicamento liquido, aut sicco inspersili curare oportet. Si vero statim inflammati fuerint, nihil omnino illine, sed aut fortissimo quàm infime vrito, aut alio quopiam aluum subducente medicamento attenuato, vitando ne vomitum facias. Si vero la-

ro la-

Aro velut lapilli subtruncurrerint, medicamentum illines quod plurimam lachrymam ducere potest, & reliquum corpus humectabis ac tumidum facies, quo oculi humidiores fiant ac colluantur, vt lachrymam adstrictam ac compactam decurrere facias. Quum autem in oculos paulatim fluxerit, & pruritus fecerit, sic affectum molli medicamēto illines, quod siccare potest, simulq; modicam lachrymam ducere, & ad nares medicamentum adhibebis, aut singulis diebus, aut alternis eodem vtens. Sit autem tale medicamentum, quod non plus quā acetabulum per nares deducat, idque paulatim; quod vero oculis adhibetur resiccet, vt quod oculorum pharmacum resiccarit ac obstruxerit, id ipsum ad nares feratur.

*Profundū
oculorum.*

B Medicamenta caput purgantia, quæ quidem fortia sunt, à toto capite ducunt. quæ vero debilia, ab oculis & hinc à vicinis naso partibus. Si autem à carne & osse, muco inter os & carnem subsistente, fluxus ad oculos fiat, ex hoc manifestum fit quod inde profluit. Cutis in capite compressa cedit, & vlcerata in capite enascuntur, & oculi lachrymantur, & palpebræ non exulcerantur, nec mordax est fluxus, nec visum hebetat, sed homo ipse acutius videt. Fluxus enim non est falsus, vt pote non de cerebro, sed magis mucosus. Hunc sic sanare oportet. Medicamento caput purgandum est non forti, & corpus attenuandum, & cibis & medicamentis infra corpus subducentibus, donec attenuato corpore fluxus resiccet, aut medicamento in nares indito emoueat. Verum ad ipsos oculos nullum pharmacum adhibendum est. Si vero neque sic sanus fiat, caput secare donec ad os perueneris oportet, nō superficialibus neque transuersis aut obliquis fissuris incussis vsquequo ad os ipsum pertigeris. frequenter autē secare oportet, vt cōpactus humor citius prodeat per vlcerata effluens. & simul vt frequentes sectiones, extensionem carnis ad os faciant. Sic mederi oportet, si huic hoc modo res succedat. Si vero hæc non comoda fuerint, & fluxus non eluitur, vt elutus acutē cernere faciat, semper ab incumbente oculi magis splendescentes fiunt, & acutus visus hominis extinguitur. Si in visum, in humorē purum cruentus aliquis humor ingrediatur, huic visus intra oculum non rotundus esse apparet, propterea quod in quocunque ineat cruentus humor, id ipsum non ap-

Medela.

*Cum sal-
gēt oculi.*

HIPPOCRATIS LIBER

Medela.
Tumor oculorum.
Peripneumonia, pleuritis, qui differunt.
Suppurati
D
E
F

paret. huic itaque deficit ut visus rotundus appareat, & ante oculos aliqua moveri ipsi videntur, & nihil reuera videt. Hu-
 ius venas visum prementes exurere oportet, quæ videlicet
 semper pulsant, & inter aurem ac tempora consistunt: & v-
 bi has obturaueris, oculis pharmaca quæ humectant adhi-
 be, & lachrymam quàm plurimam prolecta, quo id quod in
 oculis compactum est, & morbum facit, eluatur. Si vero o-
 culus rupatur, mollioribus medicamentis & acerbis utendum
 est, ut vlcus adstrictum in angustum coeat, & cicatrix te-
 nuis fiat. Si autem adhuc humoribus plenus fuerit, lachry-
 mare oculo conducit. At vero quum in thoracem fluxe-
 rit, & bilis fuerit, ex hoc manifestum fit. dolor lateris mol-
 litudinem occupat, & claviculam eiusdem partis, & febris
 adest, & lingua superne pallida ac viridis fit, & excreat
 compacta. huius morbi periculum septima aut nona die in-
 stat. Alia bilis. Quum ambo latera doluerint, reliqua
 autem similia velut in priore fuerint. Hæc quidem peri-
 pneumonia est. Illa vero pleuritis. Hæc autem propterea
 fiunt. Quum in pulmonem fluxerit ex capite, per guttur,
 & aortas appellatas appendentes partes pulmonis, pulmo
 tanquam natura rarus & ficcus, trahit in se humorem quan-
 tum eius capere potest, & ubi influxerit maior fit: & ubi
 quidem in totum fluxerit, extremitas eius maior reddita v-
 trunque latus contingit, & peripneumonia pulmonis ap-
 pellatum morbum, facit. quum vero alterum tantum, pleuritis
 id est costalis morbus fit. Peripneumonia multo periculo-
 sior est, & dolores multo fortiores sunt, qui ad laterum mol-
 litudinem & ad claviculas tendunt, & lingua multo viridior
 ac pallidior, & fauces præ fluxione dolent, & lassitudo for-
 tis occupat, & spiritus sexta aut septima die corripit. hunc si
 non septima die febris dimiserit, moritur aut suffocatur,
 aut vtrunque. Si vero nona die, duabus diebus interposi-
 tis, corripiat, ut plurimum etiam hic aut moritur, aut sup-
 puratus euadit. Si vero duodecima die, suppuratus fit. Si
 quarta & decima, sanus fit. Et quicumque præ peripneumo-
 nia aut pleuritide suppurati fiunt, non moriuntur, sed sani
 fiunt. Suppurati ut plurimum fiunt, quum fluxus in idem ve-
 lut in bile contingit, sed in bile quidē multū defluit, & ubi de-
 fluxit sedatur. Suppuratis vero minus defluit, & nō sedatur.
 Fiunt

- A** Fiunt etiam suppurati, quum minus excreât quàm influit in pulmonem. Hoc enim quod in pulmone consistit, & quod influit, pus fit. Pus autem in pulmone & in thorace cōsistens ac congregatum, vlcerat & putrefacit, & postquam exulcerata fuerint, ab vlcerato influit, & quum excreat caput simul concussum magis fluit, simulque ex vlcerato in thorace ac pulmone magis fluit, & vlcera agitata refringuntur, vt etiam si fluxus à capite cesset, is qui ab ipsis vlceribus venit sufficiens fit morbum facere. Fit præterea etiam ab vlcere suppuratus, & leuior hic morbus existit. Fit etiam extra pulmonē, maxime quidem à ruptura, & vbi caro contusa fuerit. Iuxta hanc enim pus congregatur, & congregatum fluctuat, si quis corpus concutiat, & strepitum facit, & hæc vruntur. *Tabes au* **Tabes.**
- B** tem fit quū in idem, velut in suppurato, fluxio fit per guttur, & appendentes pulmonis partes, appellatas aortas, quæ pulmonem & guttur continent ac coniungunt. Fluit autē in pulmone frequenter & paulatim, & humiditatem in pulmone non multam facit. Resiccatur enim id quod influit, & in gutture cōpactum, vtpote quod non eluitur, sed paulatim influit ac detinetur, tussim excitat, & in aortis id quod influit detentum, vtpote quum angusta foramina aortæ habeant, angustū spiritui locum exhibet, & talem spiritum habere facit, qui velut defectus semper respirare concupiscit. Et in pulmone velut non vehementer humido existente, pruritus contingit. Quum vero multum de capite fluxerit, pruritus in pulmone non fit. Multum enim est quod in ipsum influit, & suppurati
- C** ex his tabidis siue phthificis græce appellatis sūt, vbi corpus humectius factum fuerit. & contrā vbi siccus fuerit factum, ex suppuratis tabidi. Suppurati hoc modo cognoscuntur. Lateris mollitudinem à principio dolor occupat. Quum vero iam pus collectum est, & dolor similiter habet, & tussis fit, *Pus intus quid faciat* & pus excreat, & spiritus corripit, Si vero nondū erupit pus, in lateris mollitudine concutitur, & velut in vtriculo strepitum facit. Si vero horum nihil adsit, suppuratus autem sit, ex his coniectare oportet. Spiritum multum habet, subrauco susque loquitur, & pedes ac genua intumescūt, magis autem ab ea lateris mollitudinis parte, in qua pus est, & thorax concurruatus est, & membrorum dissolutio fit, & sudor per totum corpus disfluit, & aliquando sibi ipsi videtur callidus esse, ali-
- k iij quando

HIPPOCRATIS LIBER

*Tabes spi-
neæ.*

quando frigidus, & vngues circumtenfi sunt, & alius calida **D**
fit. Ex his suppuratos cognoscere oportet. Porro quum re-
trò in spinam fluxio processerit, huic tabes fit eiusmodi.

Lumbos dolet, & anteriores capitis partes vacuæ videntur
ipsi esse. Bilis autem periculosa est, si icterus siue regius mor-
bus in oculis accedat, & in vnguibus liuiditas si fiat, & si cor-
pus vlcera habeat, & partes circa vlcera liuidæ sint, & quum
sudor non toto corpore erumpit, sed vna aliqua corporis par-
te, & quum febre adhuc existente excreat æger pallidum vi-
ride, aut si dum adhuc in pulmone inest pallidum viride, ex-
creatione cesset. Sic autem quum inest, & non inest, cognosce-
re oportet. Quum inest, in faucibus respirantis strepit, & spi-
ritus periculosus est, & singultus adest, & febris discedit, ex-
creatione adhuc in pulmone hærete, & alius debili iam exi-
stenti secessum facit. Hæc pleuritis & peripneumoniæ pe-
riculosa indicia existunt. **E**

*Pleuriti-
dis curatio
Acetū mul-
sum quib⁹
datur.*

curare oportet. Febris sedanda non est per septem dies. Po-
tu triduum aut aceto mulso, aut aceto & aqua hæc autem quàm
plurima offerre oportet, quo humectatio fiat, eaque facta ex-
creationem faciat: & dolor sedandus est calfactoriis medi-
camentis, & absorbendum dandum est quicquid excreatio-
nem facit, & balneis vtendum quarta die, quinta autem &
sexta oleum illinendum est. Septima lauandum est, si febris di-
mittere non velit, quo præ balneo sudor contingat. Insuper-
que & quinta & sexta fortissimis vtendum est excreatoriis
medicamentis, quo septimam diem quàm facillime transi-
gat. Si vero neque septima die febris cesset, nona cessabit, si **F**
non aliud quid periculosum accedat. Postquam autem fe-
bris dimiserit, sorbitiones quàm debilissimæ offerantur. Si
vero euacuatio oboriatur, si quidem iuuenile adhuc est cor-
pus, potus auferendi sunt. Si vero febris dimisit, triticeis sor-
bitionibus vtaris. Et eodem modo peripneumoniam curato.

*Purulento-
rum me-
dela.*

At vero suppuratis, caput purgare oportet nõ fortibus me-
dicamentis, sed paulatim auertere in nares. & simul eduliis
ventrem subducentibus vti. Et quum principium morbi
nondum est, sed eò fluxus vertitur ac vergit, excreationem
facere, & tussim excitare, & medicamentis infusilibus in na-
res vti, & cibus simul ingestis. Quum autem excreationem
facere oportet, pluribus cibus & salis ac pinguibus vtendum
est, &

- A** est, & vino austero, & quum sic habet tussis inducenda. Tabidos item eodē modo quod ad reliqua attinet curabis, praterquam quod cibi non multi simul ingerendi sunt, & obsonia non plura quā cibaria frumentacea, & vino inter edendum utendū est aquoso, ut ne calfaciat, & corpori debili existenti caliditatem exhibeat, & simul ambo calfaciant in eodem tempore, & caliditate multum fluxum inducāt. Quum porro per gulam fluxus in ventrem processerit, morbus infra fit, aliquando etiam superne. Huic si quidem in ventre dolor inerit, subducendus est primum medicamento aut succo, deinde pharmaco fortiore utendum est, cibis vero aluum subducentibus, donec dolor perseueret. Vbi vero dolor sedetur, cibis validioribus utatur. Eodem modo ubi morbus multos dies hæserit curabis. Si vero debilis fuerit, & præ imbecillitate hæc offerri nō possint: primum quidem prisana succo per clysterem infuso, aluus eluenda est, post ubi per hunc purgaris, aliquo ex adstringentium numero. Quum autem retrō in carnē iuxta vertebra fluxus illapsus hydropem fecerit, sic mederi oportet. Caro in collo inter venas crustis tribus vratur, & ubi vsseris, constringatur, & cicatrices quā tenuissimæ inducantur, & ubi fluxum obturaris, medicamentum in nares adhibe, ut eō vertatur, & aliud rursus, donec auertatur. & anteriores quidem capitis partes calfacito, posteriores vero perfrigerato. Et postquam anterioribus capitis partibus excafactus fuerit, cibos edat quā pituitosissimos, ac minime ventrem subducentes, quo fluxionum meatus in anteriore capitis parte quā maxime dilatentur. Postea ubi obturaris & auerteris influxionem, si quid prius quā curaris fluxum, in corpus peruenerit, sic mederi oportet. Si quidem magis ad cutem secesserit, externis partibus fomentum adhibebis. Si vero intrō ad ventrem, foris autem non conspicium sit medicamentum bibendum dabis. Si vero in vtranque partem, ab vtraque detrahes. Verum hoc studio habere oportet, ut proximum exitum facias, siue inferne siue superne, aut etiā aliqua corporis parte, ubi exitus sunt. Quū coxædium morbus à fluxione fiat, cucurbitam medicam affigere oportet, & foras trahere, & nō scarificādo pertundere. & calfactoriis medicamentis in potu exhibitis intus calfacere, quo exitus fiat tum foras ad cutem per cucurbitæ tractionem, tum

Tabis curatio.

Hydrops qui curetur.

Ischias medela.

HIPPOCRATIS LIBER

nem, tum intus ad ventrē per caliditatem. Nam quum ob-
 turatus fuerit fluxus, & non habeat quò iter faciat, viam ad
 articulos facit, & in id quod cedit influit, & sic coxendicum
 morbum inducit. *Tabes ex fluxione retrorsum.* Qui hac
 affectus est, ei caput est purgandū debili medicamēto, donec
 fluxus auertatur, diæta autem vtēre velut in tabe superiore.
 Medicamentum potandum præbe Elaterium deorsum pur-
 gans, & inferne aluum lacte infuso elue, de cætero fomen-
 tis vtēre. Quum splen præ febre magnus factus fuerit, fit
 autem quum corpus attenuatur. Ex iisdem enim & splen flo-
 rescit, & corpus contabescit. Quum autem corpus tenue
 fuerit, & splen floruerit, & omentum simul cum corpore at-
 tenuatum fuerit pinguitudo in omento colliquefcit. Vbi ve-
 ro vasa pinguitudine vacua facta fuerint, & à splene flore-
 ac augescēte in omentum defluerit, vtpote vicinum valde
 existēs, & vt vasa habens eaquē vacua, excipit, & vbi morbus
 semel in corpore factus fuerit, ad id quod est morbosum ver-
 titur, nisi quis probe disponat ac curet. Nam etiam si quis be-
 ne tractet, periculo non vacat. Hunc sic sanare oportet. Me-
 dicamenta in potu exhibenda sunt quæ aquam purgent, &
 edulia quàm pituitosissima offerēda. Si vero neque sic leuior
 fiat, inuren dē sunt crustę quàm tenuissimæ, & quàm maxime
 in superficie quo aquam continere possis, circum circa umbi-
 licum, & vnā in umbilicum, & emittere singulis diebus. Quū
 enim morbus periculosissimus sit, in his periclitari oportet.
 Si enim successerit, sanum facies: sin minus, quod etiam aliās
 futurum erat, id ipsum perpetitur. Cæterum in puero hy-
 dropem sic curare oportet. Partes tumidæ & aqua plenæ ape-
 riendæ sunt scalpello, & frequenter ac parum educēdum est.
 Educendum autem est à singulis corporis partibus, & fomen-
 tis vtendum, & semper locum apertum vnde eduxeris cal-
 factorio medicamento illines. Pleuritis sicca citra fluxum
 fit, quum pulmo valde exsiccatus fuerit præ siti necessaria.
 Pulmo enim natura ficcus existēs, vbi amplius quid quàm pro
 natura siccatu fuerit, gracilis fit, & impotens redditus, & ad
 latus præ impotentia reclinatus, latus contingit, & postquam
 contigerit ipsum humidum existens, cohæret & adglutina-
 tur, & pleuritidem hoc est lateris morbum facit. Tūc vero &
 dolor fit in latere, & in clauicula, & febris, & album excreat.

hunc

- A** hunc multis potibus curare oportet, & lauare, & doloris medicamentum præbere, & alia quæ excreationem faciunt. hic in septem diebus sanus fit, & morbus minime periculosus est, & cibos præbere non oportet. Febres porro propterea fiunt, quum corpore superinflammato carnes intumuerint, & pituita ac bilis cõclusa quicuerint, & neq; refrigeretur quicquam, neque exeat, neque moueatur, neq; aliud quid subeat. Quum itaque lassitudo occuparit & febris ac repletio, lauare multa aqua oportet, & oleo illinere, & quàm maxime calface re, quo caliditas aperto corpore, præ sudore egrediatur. consequenter autem hæc faciēda sunt per tres, aut quatuor dies: & si non sedetur ac cesset, pharmacum in potu exhibendum est quod bilem educat, & febris perfrigeranda est, præterquàm si quartana existat. Medicamentum tamē donec corpus floridum est ne propinato, non enim vacuantur, nisi parum, utpote corpore turgente. Quum autem gracilis ac macilentus fuerit, tunc bibendum exhibe, & euacuabitur. Febrienti cibum ne offeras, neque sorbitionibus subtrus aluum ducas. In potu dabis aquam calidam, & aquam mulsam, & acetum cum aqua, hæc autem quàm plurima bibat. Si enim non frigidus ingressus fuerit potus calidus existens ac manens, ex corpore ægroto detrahet, & vel per vrinam eiiciet, vel exsudabit. Undiquaque autem apertum, & respirans, ac motum corpus, id quod conducibile est faciet. Quum vero gracilem existentem febris vrar, manifestum est quod non propter corporis tumorem febris occupet, & si non cesset, nutrire oportet ac tumidum facere, & si neque sic conducatur, palàm est quod nõ oportuerit febrem inducere. Hunc itaque medicamentum potare oportet quod educat, qua parte febris magis hæret, siue superne siue inferne, & si quidem superne hæreat, superne, sin inferne, inferne. Nihilo autē minus oportet etiam debiles fortia medicamenta potare, sed similiter: aut solum sic, ut fortibus quidem forte, debilibus vero debile exhibeas. Ardores vero potionibus & sorbitionibus, quemadmodum febrem frigefactorio medicamento exoluere oportet, cammaro videlicet, aut alio quopiam huiusmodi: & si nauseam cõtrahat à frigefactorio, calfactoriis vtire cõsequenter. Vbi vero non cesset, frigefactoriis rursus vtire. Isterum siue regiū morbū sic curare oportet. Quum susceperis nutrito, & balneis,

*Cl. febris
uocat quid
agas.*

*Quæ medi
camēta sin
gulis dan
da.*

*Morb⁹ re
gius quī
curatur.*

HIPPOCRATIS LIBER

balneis, & pinguefacientibus, potibusque ac cibis humectato, per tres aut quatuor dies. Postquam autem humectatum fuerit corpus, purgato & resiccato ipsum, pinguitudinemque derepente exhausto, & vndiquaque si possibile sit medicamentum adhibens, humiditatem educito, ad caput vero purgatorio debili utitor: & urinam cientia bibenda dato, eaque ante cibos hoc tempore quo turbatam humiditatem purga-ueris in potu præbe, ne ab eo tēpore corpus nutriatur. Quū vero attenuatum fuerit, etiam balneis purgato, & contusa cu-
Cucumeris
sylvestris
radix.
 cumeris sylvestris radice, eaque in aquam coniecta, inde lauato. Cæterum medicamēta bilem ducentia ne propinato, ne corpus magis conturbes. Vbi vero siccu fuerit id quod conturbatum fuit, nutrito, nullo aluum subducente medicamento, neque urinā ciente vtens, sed vino vinoso, & his quæ rubicundiores hominem faciunt. Si vero viridis ac lute⁹
Ferinum
ulcus.
 sit, rursus exhausto, nequaquam vero siccato, vt ne is color stabilis reddatur. Vlcus ferinum in corpus propterea venit. Postquam caro tumida & inflammata circū circa fuerit, & margines vlcis magni extiterint, & vlcus ipsum humidum, & in vlcere sanies resiccata inerit, aut vlcus constrictum fuerit. Sanies computrefaciens ab vlcere defluens, foras prodire à constricto ad carnem vlcere prohibetur. Caro autem suscipit, vtpote eleuata existens ab inflammatione. & quum in ipsam peruenerit sanies subterfluens, putrefacit & attollit. Hunc medicamenti humectantibus ipsum vlcus illinere oportet, vt ex humectato vlcere fluxus foras effluat, & non subter carnem. Influentia etiam in vlcus frigefacientibus pharmacis illinēda sunt, quo perfrigerata caro existat, & non dirupta rursus fluxionem immittat. Sed & alia vlcera frigefacientibus oblinenda sunt, & super ipsa humectantia imponenda. Angina quam cynanchen græci vocant à sanguine fit, quum sanguis in venis quæ in collo sunt compact⁹ fuerit. Sic affectis à venis quæ in brachiis sunt, sanguinem detrahes, & simul aluum inferne subduces, quo id quod morbum exhibet detrahatur. Lingua quoque quum magna vlcera habuerit, similiter curanda est. Morbos à principio curare oportet, & si quidem à fluxionibus sunt, primum fluxiones sedare. si vero ab alia causa, principium morbi sedare ac curare; deinde id quod influxit, si quidem multum fuerit educere,

Cucumeris
sylvestris
radix.

Ferinum
ulcus.

Angina.

- A** educere, sin modicum, per diætam moderari ac componere. Capitis fracturæ. Si quidem os fractum fuerit ac contritum, periculo vacat, & curare oportet hunc humectantibus medicamentis. Si vero rumpatur, & fissura fiat, periculolum est. Huic ferram adhibere oportet, ne in ossis scissuram sanies influens membranam cerebri putrefaciat, Nam vt per angustum intrans, non autem exiens, affligit, & furere hominem facit. Huic itaque ferram adhibere oportet, vt sanies exitum habeat, non solum ingressum, ampla ferratura facta. Medicamentis autem vtendum quæ humoré in sese trahunt, & lauandum. Febricitanti caput ne purgato, vt ne furiosus fiat. Calfaciūt enim caput pharmaca purgatiua. & sane ad caliditatem febrilem accedens ea quæ in medicamento est, insaniam facit. Ex quacunque causa male affligente quis atram bilem reuomuerit, moritur qui vulnus habet. Et qui ab euacuatione detinetur, & debilis est, & tenuis existens derepente siccus subsidit, moritur. Quum à caliditate detento, vlcuscula eruperint debili existenti eircum circa liuida, moritur. Quum à morbo quopiam detento, debili iam existenti, liuida vlcuscula enata fuerint, mortale. Quum quis à medicamenti potu superægrotarit, & inferne ac superne ab ipso secesserit, vinum sorbeat primum quidem dilutum, deinde meracum frequenter, & sanabitur. Medicamentum autem neque euacuatium, neque vomitorium sumat. Bilis vbi sua sponte eruperit, aut inferne, aut superne, difficilius sedatur. Quæ enim sponte procedit, præ violentia corpori facta impellitur. Si vero à medicamento fluat, non à gentilitatis cognatione violatur. Quum susceperis vinosum & vomentem, vomitum ne sedato. Vomitus enim euacuationem sedat. facilius autem vomitus postea sedabitur. Si vero debilis fuerit qui hæc patitur, somnificum medicamentum à vomitu præbebis. Sanguis quum morbum facit, dolorem exhibet, Pituita autem grauitatem vt plurimum. Morbum si quis non cognoscat, medicamentum bibendum præbeat non forte. Si itaque leuior inde fiat, demonstrata via est, quòd gracilitatem inducendo curandus est. Si vero non leuior reddatur, sed peius habeat, contraria facienda sunt. Si non profuerit gracilem facere, tumidum facere conduceret, & frequenter permutare, ita vt hoc consilio utaris. Si

*Quæ vnt-
ncta mas-
la.*

*Quod me-
dicamentū
nō dandū.*

*Quæ medi-
camenta
danda.*

HIPPOCRATIS LIBER

ris. Si quis in morbis quid permutaturus est, forti quidem **D** ægroto, debili autem morbo, tunc quidem confidenter fortiore quàm morbus est medicamêto vtendum est. Nam etiã si quid de sano abducatur vna cum debili ac ægroto, nullũ detrimêtum est. Si vero morbum fortiozem, ægrotum autem debilem acceperis, debilibus pharmacis curabis, quæ ipsum morbum superet & abducant, verum ægrotum nihilo debiliorem reddant. Ars exercitadi corpora, & Medicina cõtrariæ sunt. Ars enim exercendi corpora: gymnastice græcis appellata: non opus habet permutatione, sed Medicina. Sano enim nõ auxiliatur trãsmutatio ex præsentis statu, verũ ægroto. Morbi quicunque vlcera sunt, & super reliquum corpus eminent, eos simul cum medicamentis etiã fame curare oportet. Fluxione ex capite fluente vomitus conducit.

*Medica
ars & ex
ercitator
ia gym
nicæ cõ
trariæ.
Capitis flu
xio.*

*Morbi uer
tusti & re
centes qui
curentur.*

Antiqui morbi difficilius curantur quàm recentes, verum morbos antiquos primum recentes facere oportet. Vlcus callosum factum, eiecta primum duricia per putrefactorium medicamentum, confringere deinde oportet. Pharmaca quæ tumefacere maxime solent, ea pura vlcera adstringunt. Quæ vero attenuant, ea purgant. Si vero quis confringat vlcera nondum matura, corpus ægrotum nutrit quod vlcus habuerit. Et si quidem adstringere oporteat vlcus ac implere, tumefacere prodest, etiã si in capite carnem velis. Renutrita enim à cibis caro, propulsat eam quæ à medicamento putrefacta est, & simul cum natura debellat. Verum eleuatam aut leuem carnem, cibis gracilem reddere oportet.

*Mori stas
tuêtes qui
cures.
Conuulsio
nis mede
la.*

Tristes anxios & ægrotos, ac se strangulare volentes, mândragoræ radice mane in potu data minore pondere quàm quod insanire facit, curabis. Conuulsioni sic mederi oportet. Ignis ab vtraque lecti parte succendatur, & mandragoræ radix in potu præbeatur minore pondere quàm quod insaniam facit. Et ad tendines posteriores sacculi calidi imponantur. A cõuulsione si febris inuaserit, sedatur eadem die, aut sequenti, aut omnino tertia.

Ruptura.

*Manus pe
desq; si tor
queantur
quid por
tendant.*

A ruptura febris non corripit amplius quàm tres aut quatuor dies. Si vero corripiat, & quis putat se à ruptura habere, ab alia sanè quapiam causâ corripitur, & non oportet ipsam velut à ruptura curare. Quum homo manibus ac pedibus distentus ac tortus fuerit, insaniam sibi ipsi facit. Venam porro sic vrere cõuenit commodam ad mor-

A ad morbum, ex quocunque tandem quis ægrotarit. Si vltus fuerit homo, & fluxerit sanguis, ita vt hoc non periculofum fit ipfi, ambo hæc facere licet. Si vero percufferis ipsam in dolore, cuius gratia vrebatur, nō coalescit, verum fluxui prodest. Si enim perusta fuerit, non fluit. Nam postquam perusta est, extremitas vtræque venæ recurrit, qua parte perusta est, & exarescit. Si vero quid relictū fuerit, præ relicto persuente fluxū humectatur. At si sanguis ex vena fluit, per transfuersum perurito. Si vero non cesset, ad hæc supra ac infra vtrinque diffecato, quo sanguinis fluxus auertatur. Diductum enim facilius est medicamento sedare, quàm coaceruatum.

B Doloris in capite gratia, sanguinem de venis detrahito. Si vero non sedetur, & diuturnus sit, perure venas, & sanus euadit. Si vero caput purgaueris, magis affliges. Medicinam cito discere nō est possibile, propterea quod impossibile est statam ac certam doctrinam in ipsa fieri, velut verbi gratia, Qui scribere didicit, iuxta vnum modum, quem omnes docent, nouit, & scientes omnes similiter nouerunt, propterea quod idem & similiter factum, & nunc, & non nunc, non potest fieri contrarium, sed semper exacte simile est, & non opus habet occasione. Medicina vero & nunc, & statim, nō idem facit, & ad eundem contraria facit, & hæc etiam contraria sibiipsis. Primum aluum subducentia nō semper hoc faciunt, & aluum subducentia vtrunque faciunt. Fortassis autem neque sic se habent aluum subducentia, velut aluum sistentibus contraria. Restitante enim aluo, propter vehementem stabilitatem corpus intumescit, pituita in ventrem perueniente, sic stabilitas secessum facit. Vbi enim pituita in ventrem ingressa fuerit, euacuatio contingit. Insuper vero aluū subducentia ex natura, stabilitatem faciunt in ventre, si quidem non subducentia feceris, Si autem exoluator & humectetur id quod morbum facit, postquam exolutum fuerit, sanus euadit. Et sic ventrem sistentia, subducentibus stabilitatem ventris faciunt, & vicissim subducentia ventrem, sistentibus. Eodem modo res se habet circa rubicundos & pallidos. Nam & pituitosa ac tumefacientia & pallidos faciunt, & boni coloris, Itemque attenuantia. vtriusque autem medicamentum sunt contraria contrario. Verbi causa, Quum intumuerit pallidus existens, exoluitur sanè si quod medicamentum

Capitis doloris medela.

Medicina cur penis nō scitur.

Pallor.

mentum

HIPPOCRATIS LIBER

mentum attenuans adhibitum fuerit . atque hic tumenti at-
tenuans opitulatur . Rursus autem quod aliquando utilitatē
cepit, nunc hic opitulanti opitulatur, quum sanè præ graci-
litate decolor & pallidus factus fuerit. Si quis enim pituitosum
ac tumefaciens medicamentum exhibuerit, pallor sedatur.
Insuper vero etiam dolor, & propter frigiditatem fit,
& propter caliditatem; & propter valde exuperans, & propter
imminutum. Et in perfrigeratis quidem natura extra
corpus ad cutem, propter calfaciens valde, dolor fit. In cali-
dis vero natura, propter frigidum. Et in siccis natura, si hu-
meantur, & in humidis natura, si resiccentur. In singulis e-
nim quorū natura permutatur ac corrumpitur dolores fiūt.
Sananturque dolores cōtrariis, idque etiam vnicuique mor-
bo proprium est. Nam in calidis natura propter frigiditatem
ægotantibus, dolores calefiunt. & reliqua iuxta hanc ratio-
nē fiunt. Alius porro modus hic est, per similia morbus fit,
& per similia adhibita ex morbo sanantur. Velut, vrinæ stil-
licidium idem facit, si nō fit, & si fit, idem sedat. Et tussis eo-
dem modo, velut vrinæ stillicidium, ab iisdem fit & sedatur.

*Febris &
vomitus
medica
mentia non
certa.*

Alius rursus mod⁹ hic est. Febris quæ propter tumefactionem
ex pituita fit, aliquando quidem ab iisdem fit, & seda-
tur, aliquando autem à contrariis. Aliquando enim si quis
vult aqua calida lauare, & multum potum exhibere, sanus æ-
ger fit, & febris quæ propter tumefactionem facta est, pitui-
tosis ac tumefactionem facientibus oblatis & adhibitis fa-
nescit. Et si quis vult medicamentum bibendum dare, aliu
subducens & vomitorium, eodem modo & à facientibus se-
datur, & à sedantibus fit. Nam si quis homini vomenti, aquā
multam bibendam dare velit, eluentur ea propter quæ vo-
mit, vnā cum vomitu. Et sic quidem per vomitum vomitus
sedatur. Rursus autem propterea quod sedatur, quia inferne
procedere ipsi fecit, ex illo id quod intus est vomitum facit,
& ambobus contrariis modis homo sanus fit. Et si quidem sic
in omnibus haberet, stata sanè ac certa medicina esset. Ita a-
lia quidem contrariis curare oportet, qualia tandem sint, &
à qua causa fiant: alia vero similibus, qualia tandem sint, &
à qua causa fiant. Huius autem rei causa corporis debilitas
existit. Corpus enim à cibis æqualibus æqualiter nutritur, à
corpore vero cibi superatur. Postquam vero plus aut minus
in ipsum

Causa.

- A in ipsum ingestum est, aut alia quæpiam transmutatio facta est superatur, superant autem cibi. Et quum sanè superatur corpus ab his quæ ipsi offeruntur, florere hæc ipsa facit, & superant hæc simul corpus, & contraria ipsi faciunt. Et calida lauari, donec quidem corpus superat eius exhibitionem, florere corpus facit. Quum vero superatū fuerit, gracile corpus facit. Et conuiuari similiter vt lauari facit. Hæc enim donec superatur florere corpus faciunt, Vbi vero superauerint, & alui secessus & varia vitia inducunt. Quum aut id quod offertur, transmutatur, necesse est & id cui offertur, transmutare. Etenim corpus transmutatum parum efficax ac potens est, & ab omnib. offensiones percipit. Hoc autem faciunt, & aluum subducentia: & florere ipsum facientia, gracile corpus faciunt, & reliqua omnia contraria his facientia. At vero Medicina breuem occasionem habet: & qui hoc nouit, illa statim ac certa habet, & scit quæ consueta sint, & quæ non consueta, ad quæ cognoscenda non est occasio in medicina, & quod aluum subducentia, non subducentia sunt, & reliqua quod contraria sunt, & contrariissima non contrariissima. Occasio autem hæc est, vt cibos offeramus ea copia, quantam corpus cui offeruntur superare valeat. Nam si quis sic fecerit, omnino necesse est cibum aluum subducentē oblatum, subducentem esse, & pituitosum, pituitosum. Si igitur superauerit corpus ipsos cibos, neque morbus, neque contrarietas fit ex his quæ offeruntur, & hæc est occasio quam medicum nosse oportet. Quum vero occasionem supergressus fuerit, contrarium fit, & antequam ei excessum factū esse putat, consequens est vt caleseat. Donec enī corpus id quod oblatum est superauerit, corpus nutritur. Vbi vero hanc occasionem transmiserit, contrarium fit, nam attenuatur & gracilescit. Sed & alia omnia, & quæ tumefaciunt, donec quidem superauerit corpus, ampliusque pro occasione offeruntur, etiam iuxta naturam suam singula faciunt, & pituitosa siue tumefaciencia tumefaciunt. vbi vero occasionem transmiserint, contraria sunt. Medicamenta sunt omnia quæ præsentem statum transmouent. Omnia autem fortiora transmouent. Licet autem si velis, medicamento transmouere, & rursum si velis, alimento ac cibo. Omnia vero ex præsentī statu transmouere, ægrotanti optulatur. Si enim id quod morbum
- Quæ corpus inuenit & contra.*
- Qualis medica ars.*
- Quando oīa suā naturā conseruant.*
- Medicamenta quid faciunt.*

HIPPOCRATIS LIBER

facit non transmoueri, augeſcit. Medicamenta fortia à natura, in debilibus morbis dare non oportet, neque paucitate medicamenti, debilitas ipſius facienda eſt, Sed fortibus natura, fortibus pharmacis vtendum eſt, debilibus vero, pharmacis non fortib. Neque partiendum eſt medicamentum, ſed ſingulis ſecundum naturam, debilibus quidem debilia à natura, fortibus vero morbis, fortis naturæ pharmaca exhibenda ſunt. Caterum morbi ea parte qua proximi ſunt educendi ſunt, & qua parte ſingulis exitus quàm proximus eſt extrahendi. Aluum autem ſubducentia talia ſunt, quæcūque lubrica & inciſiua ſunt, & quæcūque in calidis attenuantur, Venter enim calidus eſt; & reliqua quæ ſalſuginosa ſunt, & quæcūque ex talibus plurimum participant. Contra aluum non ſubducentia, ſed ſiſtentia ſunt, quæ ſtatum exhibent, humida enim reſiccata ſtatum faciunt: & quæ adſtringunt, & quæ à calore compacta ſunt, & friabilia, & ſicca.

Acida pituitosa.

Omnia autem quæ foris extenuant, intra corpus aſſumpta tumefactionem inducunt, eadem autem & ventrem ſiſtētia, & pituitosa, ac tumefaciētia exiſtunt. Et quæ aluum ſubducunt ac extenuant, cum caleſciētibus eadem ſunt. Insuper autem etiam acida pituitosa ſunt. Omnia vero quæ frigefaciunt ea quæ in ventre ſunt, talia aluum ſubducunt, Item quæ frigida ſunt, & quæ humida. Quum autem nō aluū ſubducentia fuerint, calfaciunt. frigefaciunt autem & calida in ventrem aſſumpta, & cito ſeceſſum faciunt. Si vero ſeceſſum non faciant, calida in ventre exiſtunt. Ex his quæcūque repletionem faciunt, maxime pituitosa ſunt. Quæ vero plurima aſſumpta repletionem non faciunt, aluū ſubducūt.

Medicina quæ.

Medicina itaque mihi iam tota inuenta eſſe videtur, quæ ſic habet, & quæ docet ſingulas & conſuetudines, & occaſiones. Qui enim ſic Medicinam nouit, minime fortunam reſpicit aut expectat, ſed & citra fortunam, & cum fortuna, recte faciet. Conſtans enim ac firma eſt tota medicina, & doctrinæ optimæ in ipſa compositæ, minime fortuna egere apparent. Nam fortuna ſui iuris eſt, & nullius imperio ſubeſt, neque optantis eſt ad ipſam peruenire. Scientia vero imperata facere cogitur, & facile eſt ipſam feliciter aſſequi, ſi quis ſciens vti velit. Deinde vero quid opus eſt Medicinæ fortuna? Si enim morborum medicamenta clara ſunt & manifeſta, velut

Fortuna in his parū facit.

equidem

A equidem arbitror, non expectant sanè fortunam ad sanādos morbos si quidem sunt medicamenta. Si vero cum fortuna exhibere ipsa prodest, non magis medicamenta quàm ea quæ non sunt medicamenta, vnà cum fortuna adhibita sanos faciunt. Quicumque vero fortunā ex Medicina, aut alia quamiam arte expellit, dicitque eos qui probe rem aliquam sciunt fortuna non vti: is contrarium mihi iudicare videtur. Mihi enim soli hi fortunate assequi, itemque infortunate non assequi videntur, qui recte quid, & male facere sciunt. Fortunata enim assequi, est recte facere. hoc autem hi qui sciunt faciunt. Non assequi autem hoc est, si quis non sciat, hoc non recte faciat. Indoctus autem qui est quomodo fortunate assequi possit? Si quid enim etiam assequatur, non memorabilem sanè successum habebit. Qui enim non recte quid facit, non fortunate assequi poterit, quum reliqua quæ æquum est facere non faciat.

*Medica-
mēta sine
fortuna
funant.*

*Quæ ad
uersa vel
secūda for-
tuna huic
videtur.*

B Morbi muliebres. Vteri omnium morborum causæ sunt: hi enim vbi ex natura transmoti fuerint, morbos exhibent, siue ascenderint, siue descenderint. Et quū quidem vteri osculum suum non demittentes, & pudendi eminentias non contingentes, transmoti fuerint foras, leuissimus morbus est. Quum vero in anteriorem partem promoti fuerint, & osculum in pudendi eminentias ac labra immiserint, primum quidem ipso contactu dolorem vterus percipit ac exhibet: deinde obturatus, & velut operculo contectus, ex eo quod pudendi eminentiis incumbit, fluxus non contingit, qui mensium nomine venit. Hic vero fluxus congregatus, tumorem ac dolorem exhibet. Et si quidem infra descendens & auersus, in inguen se immiserit, dolorem exhibebit. Si vero sursum ascendens auersus & obturatus fuerit, etiam sic propter raritatem ac coarctationem dolorem exhibet. Quum vero propter hoc ægrotarit, coxendicum ac capitis dolorem facit. Vbi vero vteri impleti intumuerint, nihil fluit, & pleni sunt: quum autem pleni facti fuerint, coxendicesque contingunt, dolores exhibent, & in coxendices, & in inguen, & velut pilæ in ventre discurrent, & caput dolore affligunt, modo altera ipsius parte, modo totum, prout contingit ipsi morbus. Hæc itaque sic curanda sunt.

*Vteri om-
nium mor-
borū caus-
æ foras
nis.*

*Vteri mor-
bi sic.*

C Si quidem descenderit solum, & illini possit, vtere quocūque libet ex graucolentium genere, aut cedro, aut alij intri-

Medica-

HIPPOCRATIS LIBER

to, myttoto græcis appellato, aut aliquo alio ex graniter & male olentium numero, eoque suffutum facito, & fomenta ne adhibeto, neque cibo neque potu urinâ ciente hoc tempore vtor, neque calida lauato. Si autem sursum ascenderit, & non auersa fuerit, medicamentis apposititis bene olentibus, & quæ simul calfaciunt vtere. Velut sunt myrrha, aut vnguentum, aut aliud quoddam odoratum simulque calfactorium. Et his quidem subdititiis vteris, fomentum autem ex infernis ex vino adhibebis, & calida aqua lauabis, & urinam cientibus vteris. Ex hoc autem manifestum sit auersa sit necne. Si enim sursum progressa auersa non fuerit, fluxus procedit. Si vero auersa sit, fluxus, menstrua appellata, non contingit. Hunc morbum fomento primum tali curare oportet. In vinum grossos immittito, ipsumque vinum calfacito, & cucurbitam circû osculum vasis in quo calefit addito, hoc modo. Cucurbitam per medium dissectam euacuato, & summitate ipsius modice rescissa, velut in vtriculis fieri solet, hanc ipsam vasi velut operculum circumdato, quo odor per angustiam means ad vterum perferatur. Insuper autem & calida aqua fouere, & calfacientibus medicamentis subdititiis vti oportet. Calfacientia autem sunt ea quæ ducunt ex superius relatis, itemque hæc. Stercus bubulum, fel bubulum, myrrha, alumen, galbanum, & si quod aliud eiusmodi est. Plurimis etiam ipsarum per purgantia inferne medicamenta aliis subducenda est, & per debilia quæ vomitum faciunt, ne euacuatio ex superuacuatione fiat. Cæterum subdititias glandulas sic facere oportet, si fortes facere velis. Mel semicoctum facito, & ex præscriptis subdititiis pharmacis ea quæ valde efficacia sunt immittito, & ubi immiseris, glandulas formato instar earum quæ in sedem induntur, verum longas facito has ac tenues. Mulierem vero supinam reclinato, locis à pedibus lecti altius instratis, deinde apponito, & panniculo intecto, aut alia quadam re consimili calfacito, donec colliquefcat. Si vero debiliore glandulam subdere velis, in linteolum illigato. Sed & si humore pleni vteri osculum tumidum habuerint, & non fluxerint, fluxionem facere oportet, & subdititiis pharmacis sanare, itemque fomentis velut scriptum est, ita faciendo velut in priore fluxione suppressa. Quin & si in anteriorem partem procedens

*Calida appo-
sita.*

A procedens vterus auersus fuerit, fluxionem facere oportet, velut in superiore fluxione suppressa. Quum vero fluxus nimius fuerit, neque calida aqua, neque alio quopiam calfacere oportet, neque vrinam cientibus vti, neque cibis aluum subducentibus. Lecti autem partes à pedibus altiores esse oportet, vt ne declinatio fluxui facilitatem præbeat. Vtere autem simul etiam subdititiis adstringentibus. Fluxiones porro quum confestim venerit purgatio statim subcruenta fiunt, quum vero tardius prodierit, purulenta. Et iunioribus subcruenta magis prodeunt. Seniores vero magis mucosa menstrua habent.

B **HIPPOCRATIS COI**
LIBER DE AERE, AQVIS
& locis, Iano Cornario medi-
co physico interprete.



Vicunque artem medicā integre adsequi velit, primum quidem temporū anni rationē habere debet, quantum potētia quodlibet eorū valeat: nō enim simile quicquam in illis existit, verum differunt inuicē propter varias quæ in eis sūt mutationes. Deinde ventorum calidorumq; & frigidorum, maxime qui ex his oībus hominibus sunt communes, & mox qui in vnaquaque regione sunt indigene & proprij. Neq; vero negligentio rem se circa aquarum facultates cognoscendas exhibere conuenit. Quemadmodum enim gustu differunt, & pondere ac statione, sic quoq; virtute aliæ aliis longe præstāt. Quare si quis ad vrbe[m] sibi incognitam perueniat, circumspicere oportet eius situm, quo modo scilicet ad ventos, & solis exortus iaceat: nō enim æquales vires sunt, ad Septétrionem sitæ, & vergētis ad Austrum: neq; eius quæ solem exorientem, & quæ eundem occidentē

Que pro-
spicienda
sunt medi-
co.

Venti.

Situs ur-
bium.

HIPPOCRATIS LIBER

Aquarum qualitas. spectat. Hæc itaque diligenter oportet perscrutari, ac simul D
quo modo habeant circa eam aquæ: num ne palutribus utatur & mollibus, aut duris & ex sublimi loco prolagentibus,
Terræ qualitas. & scaturientibus ex petris, siue salis, & crudis. Terra etiam
ipsa consideranda, nudane sit & aquis carens, aut densa &
aquosa, & an concaua sit & æstuosa, vel alta & frigida, ho-
Minum uictus præ noscendus. minum insuper diæta perquirenda, qua maxime capiantur.
An bibuli sint & lurcones & ocio dediti, aut exercitiis variis
utentes, & tolerantes laborum, ciborumque plus adpeten-
tes quam poculorum. Ex his enim singula sunt inuestigan-
da. Nam qui hæc omnia probe, quantum fieri potest, cognou-
Prænotio futurorum quomodo paretur. erit, aut horum plurima, eum non latere possunt quum in
urbem etiam ignotam sibi peruenerit, neque morbi regioni
peculiares & patrij, neque communis regionis natura, qua-
cunque tandem ea fuerit, ut non possit in cognoscendis mor-
bis dubius hære, aut errare sicubi ad morborum medica-
tionem adhibeatur. Quæ ambo illis euenire solent, qui non
prius prouidi hæc diligenter cognouerunt. Quare qui ea
studiose rimatus fuerit, vniuscuiusque temporis, ac anni
futuri constitutionem prædicere poterit, qui uidelicet mor-
bi communi adfectione ciuitatem sint inuasuri tum æstate,
tum hyeme, & quæcunque pericula vnicuique sint timenda
ex diæta ac victus immutatione: quum enim temporum mu-
tationes, & astrorum ortus ac occasus obseruauerit, quem-
admodum singula horum eueniant, prænoscet utique & de
Astrorū cognitio ad artē medi- cam facit. anno, qualis hic sit futurus: hoc nanque modo si quis rima-
tus fuerit ac præcognouerit temporum occasiones, maxime
de singulis sciet, ut plurimumque sanitatem adsequetur, &
recta via procedet, non minima artis suæ gloria. Quod si cui
hæc sublimiora videantur, is si ab hac sententia discedat, di-
scet sanè non minimam partem conferre ad rem medicam
ipsam Astronomiam, sed omnino plurimam, quum vnà cum
temporibus & ventriculi in hominibus mutantur. Quomo-
do autem singula quæ diximus scrutari ac explorare opor-
teat, deinceps dicam manifeste. Quæcunque quidem ciui-
tas ad ventos sita est calidos, puto autem eos qui inter bru-
malem solis exortum itidemque occasum perflant, huic hi
venti sunt peculiares. A Septentrionalibus autem ventis
tuta ac protecta ea ciuitas existit. Aquæ vero eius mul-
ta &

A *ta* & sub*sa* sunt, & necessario nō sublimes, æstate quidem *Quæ ur-*
 calidæ, hyeme frigidæ. Et quæ quidem vrbes bene sitæ sunt *bes salsas*
 ad solem, & ad ventos, & aquis bonis vtuntur, hæ minus à ta *aquas ha-*
 libus mutationibus afficiuntur. Quæ vero aquis palustribus *bent.*
 ac lacustribus vtuntur, & non bene sitæ sunt ad ventos, & ad
 solem, hæ magis. Et si quidem æstas sicca fuerit, citius sedan-
 tur morbi. Si vero pluuiosa, diurni fiunt : & phagedænas
 ad edentes ex omni occasione oboriri verisimile est, si vi-
 cus fiat. Si vero hyems frigida sit, homines capita humida *Hyems fri-*
 ac pituitosa habere par est : & ventres ipsorum frequenter *gida quæ*
 exturbari, pituita à capite influente : & formas ipsorum vt- *mala in-*
 plurimum debiliores esse : ipsosque ad edendum ac bibend- *uchat.*
 um non appositos esse. Nam qui capita debilia habent,
 B non fuerint boni potores. Crapula enim magis grauat. Mor-
 bi vero hi ipsis vernaculi sunt. Primum quidem mulieres
 morbose, ac fluxionibus obnoxie sunt. deinde multæ steri-
 les sunt ex morbo, nō à natura, & frequenter abortiunt. Pue-
 ris vero incidunt conuulsiones ac anhelationes, quæ morbus
 puerorum, & facer esse putantur. Viris autem dysenterie, &
 alui profluvia, & febres lenes, diurnæ, hybernæ, & pustulæ
 nocturnæ multæ, & hæmorrhoides in sede. Pleuritides au-
 tem, & peripneumonie, & febres ardentes, & quicunque a-
 cuti morbi putantur, non multum proueniunt. Non enim
 fieri potest vt isti morbi vigeant, vbi alui liquidæ existunt.
 Lippitudines vero oboriuntur humidæ, non graues, nec
 C diurnæ : si non ex mutatione temporum morbus aliquis
 omnibus communis occupet. Et vbi quinquagesimum an-
 num transgressi fuerint, defluxiones ex cerebro accedentes,
 homines semisyderatos faciunt, vbi caput derepente insola-
 tum, aut frigore correptum fuerit. Atque hi quidem morbi
 ipsis vernaculi sunt: præterquam si morbus aliquis omnib.
 communis ex temporum mutatione oboriatur, nam & hu-
 ius participes fiunt. Quæcunque vero ciuitates his ex op-
 posito sitæ sunt, ad ventos frigidos, inter occasum solis æsti-
 um, & orientem æstium: etiam ipsis hi venti vernaculi ac
 indigenæ sunt, ab austro vero & calidis ventis proteçtæ sunt.
 Et de his vrbibus sic se res habet. Primum quidæ aquæ & du-
 ræ & frigidæ vt plurimum dulcescunt. Homines autem vege-
 tos & siccos esse necesse est: & plures ventres infernos cru-

HIPPOCRATIS LIBER

dos ac duros habere, supernos vero fluidiores: biliososq; ma D
 gis quàm pituitosos esse. Capita vero sana ac dura habent. &
 plerunq; vasa ipsis rumpuntur. Morbi autē populares ipsis hi
 sunt, pleuritides & quos acutos esse receptū est. Necesse est
 autem ita habere, quum alui duræ existant. & suppurati mul
 ti ex omni occasione fiunt. Huius autem causa est, corporis
 extensio, ac ventris duricia. Siccitas enim & aquæ frigiditas
 facit vt vasa rumpantur. Edaces autem tales naturas esse ne
 cesse est, & nō multū bibaces. Non enim fieri potest vt simul
 multum edant ac bibant. Lippitudinesq; his fieri ex tempo
 ris interuallo necesse est, duras autē ac vehemētes, & statim
 oculos rumpi. Sanguinis item ex narib. fluxiones vehemētes
 æstate fieri iuniorib. triginta annis. Morbos etiā sacros appel E
 latos, paucos quidem, verum vehementes. Longæ vero vitæ
 magis quàm alios, hos homines esse par est: & vlcera non pi
 tuitosa oboriri, neque efferari. Mores vero magis feros quàm
 mansuetos. Ac viris quidē hi morbi vernaculi sunt: præter
 quam si quis omnib. cōmnis ex temporum mutatione in
 gruât. Ex mulierib. vero, primū quidem multæ steriles fiunt,
 propter aquas quæ duræ sunt ac crudæ, & frigidæ. Purgatio
 nes enim mensium non contingunt cōmodæ, sed paucae ac
 prauæ. Deinde pariunt difficulter, & non valde abortiunt.
 Vbi vero pepererint, pueros nutrire non possunt. Lac enim
 ab aquarum duricia ac cruditate extinguitur: & tabes fre
 quentes à partu fiunt. Præ violentia enim ruptiones ac vul
 suras habent, pueris autem hydropes in testibus fiunt, quan F
 diu parui fuerint. deinde ætatis progressu euanescunt. Pubes
 cunt autem serò in hac ciuitate. Et de calidis quidem ventis
 ac frigidis, & vr̃bib⁹ ad hos sitis, hoc modo velut dictum est,
 res se habet. Quæcunque vero ciuitates sitæ sunt inter æ
 stiuos ac hybernos solis ortus: & quæcunque ex opposito
 harum, de his ita habet. Quæ quidem ad orientem solem si
 tæ sunt, eas par est esse salubriores his quæ ad septentrionem
 conuersæ sunt, & his quæ ad calidos ventos sitæ sunt, etiam
 si stadium solum interfit. Primum enim moderatio est cali
 ditas ac frigiditas. deinde aquas quæ ad solis ortus sunt, om
 nes splendidas esse necesse est, & odoratas, & molles, & ama
 biles oriri in hac ciuitate. Sol enim emergens ac illustrans
 ipsas castigat. Matutinum enim tempus ipse aer vt plurimum
semper

- A** semper occupat. Et hominum formæ boni coloris sunt, & magis floridæ, si non quis alius morbus prohibeat. Et clara voce præditi sunt homines; & ad iram ac intelligentiâ præstantiores septentrionalibus; si quidem & alia: quæ in ipsa nascuntur meliora existunt. Et ciuitas quæ hoc modo sita est veri maxime similis est, iuxta caliditatis ac frigiditatis moderationem. Et morbi pauciores sunt ac debiliores, similesque sunt morbis, qui in ciuitatibus ad ventos calidos cōuersi oriuntur. Et fœminæ isthic valde fœcundæ sunt, ac facile pariunt. Et de his quidem ita habet. Quæ vero ad occasus sitæ sunt, & ipsæ à ventis ab oriente spirantibus protectæ sunt, & tum calidi venti leuiter afflant, tum frigidi ab Vrbs
- B** præterflant: eas vrbes necesse est situ morbosissimo positas esse. Primum enim aquæ non sunt splendidæ. Causa vero est quòd aer matutinum tempus vtplurimum occupat, qui aque immixtus claritatem eius disperdit. Sol enim priusquam eleuetur, non illustrat. Aestate vero, mane quidem auræ frigidæ spirant, & ros decedit. de cætero vero sol ad ipsas occidens, quàm maxime homines percoquit. Quapropter etiam decolores ac infirmos ipsos esse par est, & ex omnibus prædictis morbis participare. Nulla enim re ab ipsis separantur. Verisimileque est ipsos graui voce præditos ac raucosos esse, propter aerem, eo quòd impurus plerunque isthic est, & morbosus. Neque enim ab aquilonaribus valde expurgatur. Non enim perseverant venti. Qui vero perseverant ac ipsi incumbunt, aquosissimi existunt. Nam venti occidentales, similes sunt autumnis. Et huiusmodi ciuitatis situs est ad diei mutationes, eo quòd multum temporis inter matutinum ac vespertinum intercedit. Et de ventis quidem qui commodi sunt ac incommodi ita se res habet. Cæterum de aquis deinceps narrare volo, quæ morbosæ sint, & quæ saluberrimæ: & quæ mala ab aqua fieri verisimile est, itemque quæ bona. Plurimam enim partem conferunt ad sanitatem. Quæcunque igitur palustres sunt, & stabiles ac lacustres, eas necesse est æstate esse calidas, ac crassas & olentes. Quum enim non defluant, sed aqua pluuiæ semper noua inferatur, & sol vrat, necesse est ipsas decolores esse, & prauas ac biliosas. Hyeme vero glaciatas & frigidas ac turbatas præ niue ac glacie, vt pituitosissimæ ac raucosissime existant:
- Bibentibus

HIPPOCRATIS LIBER

Bibentibus autem splenes semper sint magni ac pleni: & vé- **D**
 tres duri, tenues ac calidi. Humeri vero & clauiculæ & facies
 attenuata. In splenem enim carnes colliquantur, quapro-
 pter graciles existunt. Edaces autem esse tales ac siticulo-
 sos par est, ventresque tum supernos, tum infernos, calidif-
 simos habere, ut etiam fortioribus medicamentis opus ha-
 beant. Atque hic morbus ipsis & æstate & hyeme familiaris
 est. Ad hæc etiam hydropes plurimi ac letalissimi fiunt.
 Aestate enim dysenteria multæ ac alui profluuia incidunt,
 & febres quartanæ diurnæ. Hi autem morbi prolongati,
 tales naturas ad hydropas deducunt ac occidunt. Et hi qui-
 dem morbi ipsis æstate fiunt. Hyeme vero iunioribus qui-
 dem peripneumoniæ, & infantiæ morbi, Senioribus vero, fe- **E**
 bres ardentes, propter ventris duriciem. Mulieribus autem,
 tumores oboriuntur, & pituita alba, & vix in ventre conci-
 piunt, ac difficulter pariunt, & fœtus magnos ac tumidos. de-
 inde ex alimentis tabescentes ac deprauati fiunt. Et purga-
 tio commoda post partum mulieribus non contingit. Pueris
 vero herniæ accedunt, & viris varices, & vlcera in tibia. Qua-
 re fieri non potest ut tales naturæ longæ sint, sed ante
 temporis aduentum senescunt. Præterea fœminæ se in vte-
 ro habere putant, & ubi partus tempus adest, ventris moles
 illa ac plenitudo euanesceat. Hoc autem contingit ex aqua quæ
 vteri ex aqua cōcepta laborant. Atque has quidæ aquas ad om-
 nem rem improbas esse censeo. Secundo vero loco eas qua-
 rum fontes è petris scaturiunt. Duras enim esse necesse est: **F**
 aut isthic ubi calidæ aquæ existunt: aut ferrum nascitur,
 aut æs, aut argentum, aut aurum, aut sulphur, aut alumen,
 aut bitumen, aut nitrum. Hæc enim omnia præ violentia
 caloris nascuntur. Non itaque ex huiusmodi terra aquæ bo-
 næ prodeunt, sed duræ & æstuosæ, quæ & difficulter min-
 guntur, & ad alui egestionem contrariæ sunt. Optimæ ve-
 ro sunt quæ ex sublimibus locis, ac terreis collibus fluunt.
 Hæ enim & dulces sunt, & albæ, & vinum modicum ferre
 possunt. & hyeme calidæ fiunt, æstate vero frigidæ. Tales
 enim fuerint ex profundissimis fontibus. Maxime vero lau-
 dare eas oportet, quarum fluxiones ad solis exortus erum-
 punt, & præsertim ad æstiuos. Necesse est enim odoratas
 esse ac leues. Quæcunque vero salsæ, & crudæ ac du-
 ræ sunt,

*Aquæ quæ
optimæ.*

*Aquæ sal-
sæ.*

A ræ sunt, ad hoc quidem vt eas omnes bibant, non bonæ sunt.

Sunt tamen aliquæ naturæ, & morbi, quibus tales aquæ in potu commodæ sunt, de quibus statim dicam. Habet

autem & de his hoc modo. Quæ quidem aquæ fontes suos ad orientes habent, hæ præ omnibus optimæ sunt. Secundum ab his locum habent, quæ inter æstiuos solis exortus ac occasus emergunt, & magis hæ quæ ad orientes. Tercio loco sunt, quæ inter occasus æstiuos ac hybernos scaturiunt. Pessimæ vero quæ ad austrum, & quæ inter æstiuum ortum & occasum. Et hæ quidem ad australes partes valde prauæ sunt, ad boreales vero meliores. His autem hoc modo vti conuenit. Quisquis sanus est ac valet, is nullum di-

B scrimen faciat, sed semper eam quæ præsens est bibat. Quicunque vero morbi gratia, eam quæ commodissima est bibere volet, is si ita fecerit, maxime sanitatem assequi poterit.

Quorum quidē ventres duri sunt, & idonei ad hoc vt amburantur, his dulcissimæ & leuissimæ ac splendidissimè conducunt. Quorum vero molles ventres, & humidi ac pituitosi sunt, his durissimæ & crudissimæ, ac subsalæ aquæ conferūt. Sic enim maxime resiccari poterint. Quæcunque enim aquæ optimæ coctæ sunt, ac facillime liquefcunt, eas par est & ventrem maxime exoluere ac eliquare. Quæ vero crudæ sunt, & minime coctæ bonæ, hæ magis constringunt ventres ac resiccant. At enim mentiuntur homines de falsis aquis, propter imperitiam, in eo quòd per aluum secedere eamq; soluere pu-

C tantur. Maxime enim contrariæ sunt ad alui egestionem ac secessum. Sunt enim crudæ, & coqui non possunt. Quare vèter magis ab ipsis adstringitur quàm eliquatur. Et de fontanis quidē aquis hoc modo res se habet. De pluuiialibus autem, & quæ à niue fiunt, vt habeat, deinceps dicam. Aquæ igitur pluuiiales leuissimæ & dulcissimæ, & tenuissimæ ac splendidissimæ sunt. Primum enim sol quod tenuissimum ac leuissimum est in aqua educit ac sursum rapit. Clarum autem hoc, ipsum mare facit. Quod enim salsum est isthic relinquitur, præ crassitudine ac grauitate, & fit mare. Quod vero tenuissimum est sol sursum rapit, præ leuitate. Rapit autem tale non solum ab aquis stagnantibus, sed etiam ex ipso mari, & ex omnibus in quibus aliquid humoris inest. Inest autem in omnibus rebus. Et ex ipsis hominibus tenuissimum ac leuif-

HIPPOCRATIS LIBER

ac leuissimum humorem ducit. Eius rei maximū signum in- D
 de sumere licet, vbi homo vestibus indutus in sole iter fece-
 rit, aut sederit. Quascunque enim corporis partes sol aspicit,
 hæ non exudant. Sol enim quicquid comparet sudoris sur-
 sum rapit. Quæ vero sub veste contextæ sunt, aut sub aliqua
 alia re, hæ exudant. Educitur enim ac domatur à sole sudor.
 Seruatur autem ex tegmētis, vt ne disperdatur à sole. Quum
 vero in vmbra deuenerit, totū corpus similiter sudore per-
 fluit. Non enim amplius sol affulget. Quapropter etiā ex om-
 nibus aquis hæ citissime putrescunt: & odorē malum pluuiā-
 lis aqua habet, eo quod ex plurimis cōgregata est ac permi-
 xta, vt citissime putrescat. Ad hæc vero, vbi rapta est & in su-
 blime eleuata, dum circūfertur & ad aerē permiscetur, quod E
 turbidum est in ipsa, ac noctem refert, id excernitur, ac dece-
 dit, & fit aer, & nebula. Quod vero tenuissimum est ac le-
 uissimum in ipsa, hoc relinquitur ac dulcescit, dum à sole vri-
 tur ac coquitur. Fiunt autem & alia omnia quæ coquuntur
 semper dulcia. Quandiu igitur dispersa fuerit, & nondum cō-
 gregata, fertur sublimis. Vbi vero coaceruata fuerit, ac simul
 congregata derepente à ventis inter se aduersariis: tunc de-
 orsum prorumpit, qua parte plurima collecta fuerit, Tunc e-
 nim hoc magis fieri verisimile est, quum nebulas à vento sta-
 bilitatē non habente concitatas ac procedentes, derepente
 ventus contrarius, ac aliæ nebulæ reliserint: atque tunc qui-
 dem prima ipsius pars cōgregatur, quæ vero à posteriore par-
 te sunt, insuper accedunt, & sic crassescunt, & nigrescunt, ac F
 simul congregantur, & præ grauitate deorsum prorumpunt,
 & pluuiæ fiunt. Atque hæ quidem aquæ optimæ sunt secun-
 dum hanc rationem. Verum opus habent vt decoquantur, ac
 excolentur. Sin minus, odorem prauum habēt, & rauedines
 & vocis grauitatem bibentibus inde accedere par est. At
 vero aquæ ex niue ac glacie fientes, omnes male sunt. Quum
 enim semel concretæ fuerint, non amplius in pristinam natu-
 ram restituantur. Sed quod quidem in ipsa clarum ac leue, &
 dulce est, excernitur ac disperditur. Quod vero turbidissimū
 est ac ponderosissimū, relinquitur. Hoc vero cognoueris hoc
 modo. Si enim volueris hyemis tempore, vasculū certa aquæ
 mensura infusa, sub dio exponere, quo maxime congeletur:
 deinde postridie in locum calidum deportatum sinere, quo
 maxime

- A** maxime glacies liqueſcat, & vbi exoluta fuerit, aquam metiri: reperies aquam multo pauciorẽ. Atque hoc ſignum eſt, quod à congelatione id quod leuiſſimum ac tenuiſſimum eſt diſperditur, & nõ quod grauiſſimum ac craſſiſſimum exiſtit. Nõ enim hoc diſperdi poterit. Hac igitur de cauſa has aquas quæ à nuẽ ac glacie eliquantur, peſſimas eſſe puto ad omnes res: Itemquẽ eas quẽ ad has ſequuntur. Atque ſic quidem de pluuialibus, & niualibus, ac glacialib⁹ aquis res ſe habet. Calculo vero maxime laborant homines, & ex rhenum affectionibus, & vrinæ ſtillicidio, & coxendicum morbo corripiuntur, & herniæ ſiunt, vbi aquas omnigenas bibunt, & de magnis fluuminib⁹ in quæ alia deferunt: & de ſtagno, in quod fluxiones
- B** multæ ac omnis generis deueniunt. Et qui aquis inuectitiis vtuntur, quæ ex lōgo, & nõ breui locorũ interuallo afferuntur. Non enim fieri poteſt, vt alia aqua ſimilis ſit alijs. Sed alię dulces ſunt, aliæ ſalſæ, & aluminosæ, aliæ de calidis fluunt. Vbi vero hæ ſimul inter ſe miſcentur, diſſident: & quæ fortiſſima eſt, ſemper ſuperat. Præualeat autem non ſemper eadem, ſed aliàs alia. Sed & ex ventis, alijs quidem Boreas robur exhibet, alijs vero Auſter. & de reliquis eadẽ ratio exiſtit. Talibus igitur neceſſe eſt limum & arenam in vaſis ſubſidere, & ab his ſi potentur, morbi prædicti ſiunt. Quod autem non omnibus, conſequenter declarabo. Quorum quidem alius ſatis fluida eſt ac ſana, & veſica non ardens, neque ſtomachus veſicæ valde coardeſcit, hi facile vrinam eiiciunt, & in veſica nihil ipsis congregatur. Quorum vero alius ardens ac feruida fuerit, in his neceſſe eſt etiam veſicam idem perpeti. Quum enim magis quàm pro natura fuerit calefacta, ſtomachus ipſius inflā-matur. Vbi vero hæc perpetitur, vrinam non dimittit, ſed in ſeipſa cōcoquit & adurit: & quod quidem tenuiſſimũ in ipſa eſt, excernitur: & quod puriſſimum eſt, tranſit & emingitur. Quod vero craſſiſſimum ac turbidiſſimum eſt, coaceruatur, & concreſcit primum quidem parum, deinde maius fit. Dum enim voluitur ab vrina, quicquid craſſum compactum fuerit, ad ſeipſum adaptat, atque ſic augeſcit, & in toſum concreſcit. Et quum vrinam emittit, ad veſicæ ſtomachum allabitur ab vrina impulſum, & vrinæ emissionem impedit, & dolorem vehementem exhibet. Quare pueri calculoſi fricant ac trahunt pudenda. Videtur enim ipsis cauſa miſtionis eo loco eſſe.

Signum

HIPPOCRATIS LIBER

Signum autem eius quòd hæc ita se habent, hoc est. Vrinam **D**
splendidissimam calculosi mingunt ad similitudinem seri, eo
quod id quod crassissimum est ac biliosissimum isthic manet,
& coaceruatur ac concrescit. Et plerique sanè hoc modo la-
pidem & calculum contrahunt. fit autem pueris etiam ex la-
cte, si non salubre id fuerit, sed valde calidū ac biliosum. Ven-
trem enim percalefacit, & vesicam. Quare vrina dum aduri-
tur hæc patitur, & sanè sentio melius esse pueris vinum quàm
aquosissimum dare. Minus enim venas adurit ac resiccat. Mu-
liebribus autem pudendis non similiter contingit. Meatus e-
nim vrinæ in vesica brevis est & amplus, vt facile vrina im-
pellatur. Neque enim manu pudendum fricat, veluti mascu-
lus, neque vrinæ in vesica meatum contingit. Ad pudenda e-
nim perforatus est. Et quia meatus sunt ampli, etiam plus bi-
bunt q̃ pueri. Et de his quidem sic res se habet, aut his quàm
proxime. Cæterum de annis hoc modo consideratione fa-
cta quis cognoscere possit, qualis nam annus sit futurus, salu-
bris ne an morbosus. Si enim secundum rationem fiant signa
in astris occidentibus ac orientibus: & in autumno aquæ fi-
ant: & hyems sit moderata, & neque valde clemens, neq; mo-
dum excedens frigiditate: & in vere ac in æstate tempestiue
pluat: sic sanè saluberrimum esse annū par est. Si vero hyems
quidem sicca sit, & borealis, ver autem pluuiosum & austra-
le, necesse est æstatem febriculosam fieri, & lippitudines in-
ducere. Quum enim æstus derepente accedat, terra humida
existente à vernis imbribus, & ab austro: necesse est æstū du-
plicatum esse, & à terra irrigua ac calida, & à sole vrente: quū
ventres in hominibus nondum constrikti sint, neque cerebrū
resiccatum. Non enim fieri potest, quū ver tale existat, vt cor-
pus & caro non humore fluida fiant, adeò vt febres acutissi-
mæ in omnes irruant, maxime autem in pituitosos. At dysen-
terias par est fieri & mulieribus, & viris humidioribus. Et si
quidem circa canis exortum accedat aqua ac tempestas, &
Ætesia spirauerint, spes est cessationis, & vt autumnus salubris
fiat. Sin minus periculum est ne & pueri, & mulieres morian-
tur: Minime vero senes: & ne qui superstites euadūt, in quar-
tanis desinant, & ex quartanis in hydropas. Si vero hyems au-
stralis fiat, & pluuiosa, & clemens, ver autem boreale & sicciū
& tempestuosum, primū quidem mulieres quæ vterū gestant,
& partus

*Prognosti-
ca ex tem-
poris qua-
litate.*

- A** & partus ipsis ad ver instat, abortum facturas esse verisimile est. Quæ vero etiam pepererint, impotentes ac morbosos pueros parere, ita ut aut statim pereant, aut tennes & debiles, ac morboſi uiuant. Atque hæc quidem mulieribus, reliquis vero dysenterias & lippitudines ficas; & aliquibus defluxiones à capite in pulmonem. Pituitosis igitur dysenterias fieri verisimile est, & mulieribus, pituita de cerebro defluente, propter naturæ humiditatem. Biliosis vero lippitudines ficas, propter carnis caliditatem ac siccitatem. Valde autem senibus defluxiones, propter raritatem ac eliquationem venarum, adeo ut aliqui quidem derepente pereant, aliqui vero semisiderati, aut dextra aut sinistra parte fiant. Quum enim hyems sit australis, & pluuiosa, ac calida, & corpus non adstringatur, neque venæ: vere accedente boreali & sicco ac frigido, cerebrum postquam ipsum dissolui ac purgari contigit, à grauedine ac raucedine, tunc simul cum vere stabilitur ac constringitur. Quare derepente æstate accedente, & ardore ac mutatione contingente, hi morbi incidunt. Et intestinorum leuitates & aqua intercus fere reliquis morbis desinentibus superueniunt, quum non queant facile ventriculi à concepta humiditate exsiccati. Si autem æstas pluuiosa sit & austro multum perſletur similisque sequatur autumnus, necesse est hyemem morbidam esse, & his qui pituita abundant, & qui quadragesimum annum excesserunt febres ardentes fieri verisimile est, qui vero bile abundant, costarum inflammationes & pulmonis, pleuritidas ac peripneumonias dictas. Si vero æstas sicca existat, & borealis, sequens vero autumnus pluuiosus & australis, capitis dolores ad hyemem expectare conuenit, & cerebri corruptiones, ampliusque raucedines, grauedines, & tusses, aliquibus etiam tabes. Quod si borealis sit autumnus ac siccus, & neque sub caniculam, neque sub Arcturi occasum pluuiosus, cōfert pituitosis natura, & maxime qui natura sunt humida, & mulieribus. Biliosis autem infestissimum hoc tempus existit. Valde enim exsiccantur acciduntque eis lippitudines aride, & febres acutæ, ac diurnæ, & aliquibus bilis atra, siquidem quod liquidissimum & aquosissimum in bile est cōsumitur dēfissimum vero & acerrimū relinquitur, quod idem accidit secundum eandem rationem & circa sanguinem, unde hi morbi his accidunt, pituitosis autem hæc omnia com-
- moda

HIPPOCRATIS LIBER

moda sunt. Exsiccatur enim & in hyemem perducuntur, mi-
nime humecti, sed resiccati. Hæc igitur si quis mente concipiet & considerabit, is præcognoscet plurima omnino quæ ex
Mutationes tempo- rum obser- uandæ. huiusmodi mutationibus sint futura. Maxime autem obser-
uare oportet magnas temporum mutationes, ut neque medi-
cinas in illis libentes exhibeamus, neque vramus quæ circa
ventrem, neque secemus, priusquam prætereant dies decem
aut plures, & non pauciores. Periculosissima sunt etiam am-
bo solstitia, maxime vero æstium Periculosum etiam æqui-
noctium utrunque, magis vero autumnale. Oportet autem &
Canicula astrorum exortus considerare, præcipue canis, deinde arctu-
Arcturus ri, & Pleiadum occasum. Morbi enim in his maxime diebus
Pleiades iudicantur, aliique perimunt, alij vero desinunt, aut in aliam
speciem, aliūmq; statum transmutantur. Et circa hæc quidem fi-
Differētia cut dixi habet. Volo autem & de Asia & Europa demonstra-
inter Asiā re, quantum differant inter se per omnia, & de gentium for-
& Europā mis quid distent, & nihil inuicem simile habeant. Verum de
omnibus si quis dicere velit in immensum excresceret sermo,
quare de maximis, & plurimum differentibus diuersita-
tibus dicam, quantum saltem mihi in ea re est compertum. Ac
dico quidem plurimum differre Asiam ab Europa secundum
naturas omnium ex terra nascentium, itemque hominum.
Pulchriora maiora que sunt Asiana, & cur. Longe enim pulchriora & maiora omnia nascuntur in Asia.
Estque regio ipsa, hac nostra multo mansuetior, sunt etiam ho-
minum mores benigniores & cultiores. Causa vero horum
est temporum anni temperata mixtura. Siquidem in medio
solis exortu sita est ad aurorā, à frigiditate ac caliditate om-
ni remotior. Incrementum autem & benignitatem inde pro-
ficisci omnibus in confesso est, quum nihil sit præcellens &
cogens violenter, sed per omnia æqualitas vigeat, quanquam
Varietas rerum in Asia. non habeant ubique per omnem Asiam omnia secundum eun-
dem modum. Quæcunque enim in ea regio in medio sita est
calidique & frigidi, ea omnium fertilissima existit, & arbori-
bus refertissima & maxime serena, aquisque, vitur & cœlesti-
bus & ex terra promanantibus. Neque enim à calore combu-
cæli cle- sta est valde, neque à squalore & aquarum inopia exsiccatur,
mentia & foli uber- neque à frigore oblaeditur. Verum austris perflatur & irrigua
tas in Asia. est, tum propter imbres multos, tum propter niues. Fructus
autem suo tempore maturos multos in ea nasci par est, siue ex
sparsis

- A sparsis seminibus hi proueniant, siue terra ipsa per se sponte producat eorum plantas, quarum fructibus vtuntur homines, eas ex agrestibus cicures & domesticas facientes, & pro commoditate sua transplātantes. Pecora etiam ipsa pleniora proueniunt, quæ & pariunt sæpius & pulcherrime educantur. Quin & homines habitiores esse ac specie pulcherrimos, & magnitudinis eximiæ, minimeque differentes, quantum ad formam ac corporum proceritatem attinet, constat. Certumque est hanc regionē proxime accedere ad naturam ac temperaturam optimæ constitutionis, verum virilitatem, laboris tolerantiam, ac audaciam non verisimile est huic naturæ in nasci, Sicut neque eiusdem neque diuersi generis constantes
- B ac perpetui sunt amatores. Vincit enim in ipsis voluptas, quæ ratio est multiformes generari partus, præcipue in feris. Atque sic quidem de Aegyptiis ac Libycis mihi habere videtur. Qui vero ad dexteram hyberni ortus solis vsque ad Maërotidem paludem habitant: hic est enim Europæ & Asiæ terminus: sic
- C habent. Multo maior diuersitas est inter illas ipsas gentes, quàm de quibus iam dixi, quum propter varias temporū mutationes, tum ob regionis naturam, Habet autem eodem planè modo, quemadmodum & circa aliorum hominum terras accidit. Vbi enim tempora magnas mutationes faciunt & frequentissimas, illic & regio agrestis & maxime inæqualis existit, inueniasque & montes plurimos & densos, itemque campos & prata. Vbi autē non valde variant tempora, illic æqualissima regio est, quod idem & de hominibus ipsis est intelligendum. Si quis enim recte consideret, videbit quorundam naturam, montanis, syluosis ac asperis locis similem esse aliorum vero aquosa ac exilia loca referre: sicut quidam pratorum ac paludum naturam præ se ferunt, atque alij sunt à quorum planitiebus nudisque ac siccis terris constitutio similis existit. Tempora enim quæ formarum naturam variant, sunt diuersa: quum ergo inter sese fuerint maxime diuersa, varias & multiplices formas producant. Porro quæ parum inter se differunt gentes relinquam, Quæ autem plurimum non natura solum, sed & legibus ac consuetudinibus discrepant, de illis referam quomodo habeant. Ac primum omnium de Macrocephalis, quum nulla omnino alia gens sit, quæ similia ca-
- m tam lon-

*Asiatici
corporis
bore non
præstant.*

*Europe et
Asie ter-
minus.
Gentes cur
inter se
differant.*

*Macroce-
phali.*

HIPPOCRATIS LIBER

tam longis capitibus essent. Nūc autē natura ipsa cum cōsue- D
tudine cōspirauit, Si quidē generosissimū apud eos putatur,
caput habere quā maximē longum: cōsuetudinis autē hoc
initium fuit. Quum recens infans natus est, caput eius adhuc
tenerum ac molle existens quā celerrime constringunt ma-
nibus, coaptantesque cogunt in longitudinem augeri, quin
& vinculis connectunt, ac aptis instrumentis colligant, quo
rotunditas capitis prohibeatur, ac longitudo augeatur. Ea
cōsuetudo tantum effecit vt eiusmodi natura capitum exi-
steret. Temporis vero progressu natura quoque tales produ-
xit, vt non esset necesse cōsuetudine priore cogere. Quum
enim semen genitale ab omnibus corporis membris proce-
dat, à sanis quidem sanum, à morbidis morbosum, fiatque vt E
ex caluis calui gignantur, ex cæsis cæsi, & vt plurimum di-
stortus distortum generet, eademque ratio sit circa reliquas
formas, quid prohiberet vt non ex Macrocephalis Macroce-
phali gigneretur? Nunc autem non nascuntur ita magnis ca-
pitibus quemadmodum prius, quum cōsuetudo nō amplius
duret, per incuriā hominū intercepta. Et de his quidem hæc
sufficiant. De illis autem qui phasim accolunt adiiciam. Re-
gio eorum palustris est, calida, aquosa & densa, imbresque in
eam decidunt omnibus temporibus & magni & impetuo-
si, homines vero ipsi vitam agunt in paludibus domos-
que ligneas & ex arudinibus in ipsis aquis habent extructas,
neque multum inde prodeunt, vt adeant vel emporia vel vr-
bes. Verum nauculis ex vno ligno febre factis permeant sur- F
sum ac deorsum, habent enim fossas ac ductus aquarum plu-
rimos. Bibūt autem aquas calidas & stagnantes, quæ & à sole
sunt putrefactæ, & ab imbrium casu auctæ. Ipseque fluuius Pha-
sis omnium fluuiorū stagnantissimus est, & qui lentissimo cur-
su profluit: fructus autem qui illic nascuntur omnes insalu-
bres sunt, euirati imperfectique præ multitudine aquarum,
neque vnquam maturescūt. Atque quum multus aer ab aquis
regionem occupet, ob hanc ipsam causam, quod ad formam
ac corporum speciem attinet, Phasiani sunt à reliquis homi-
nibus longe diuersi. Sunt enim magnitudine ingenti, ac cor-
pulentia valde excellenti, neque iuncturæ eorum vllæ, neque
venæ comparent. pallidūque præ se ferunt semper colorem,
quemadmodum qui regio sunt obnoxij morbo: loquuntur
autem

*Phasis ac-
colit.*

*Phasis qua-
liter fluat*

*Phasiani
quales.*

A autem ut si qui alij omnium hominum grauissime, nimirum aere vtentes non sereno, sed obscuro, & maxime humectato. Sunt insuper ad laborem à natura ipsa segniores, anniq; tempora non varias habent, neque ad æstum, neq; ad frigus permutationes. Ventii autem eis sunt plurimi austrini omnes, præter vnū eius regionis propriū & indigenam, qui aliquando violentior ac molestior calidus existens spirat, quem Cenchrona patrio vocabulo appellant. Verum Boreas non valde ad eos pertransit, quòd si aliquando spiret, debilis tamen existit ac valde lenis. De natura ergo ac diuersitate & forma eorum qui Asiam & Europam incolunt, ita habet. Quòd autem timidiore, effœminatiores, ac imbelles præ Europæis

Cur Asiani imbelles.

B Asiani existant, morib;q; mansuetiores, tempora ipsa anni in causa sunt, quæ non magnas permutationes faciunt, neq; caloris, neque frigoris, sed semper æqualia permanent: vnde neq; mentes stupore percelluntur, neq; corpora fortem transmutationem incurrunt. A quibus verisimile est iram exasperrari, cognitionemq; & calorem amplius excitari, quàm si semper in eodem statu quis persistat. Mutationes enim sunt quæ

Mentem quæ excitent.

hominis mentem semper excitant, neque sinunt quiescere. Propter quas sanè causas imbelles vniuersum Asianorū genus existit, atque adhuc amplius propter leges. Multo maxima enim Asiæ pars sub regibus est. Vbi autem non in sua potestate viuunt homines, neq; sui iuris sunt, sed dominis subiecti, ibi non multum curiosi sunt quo modo se ad bellū adparent,

Asiani cur non bellicosi.

C imò magis hoc curant, ut ne bellicosi videantur. Pericula enim eis non æqualia instant. Nam hi in militiam proficisci, laboresque perferre, ac mortem oppetere pro dominis suis coguntur, relictis interim domi liberis, vxorib; ac reliquis amicis: atque siquidem viriliter & feliciter bellum gesserint, dominis inde commoda accedunt, eorumq; facultates inde augentur. Verum ipsis præter pericula & cædes nihil demeritur. Proinde neque his hominibus regionem frequenter habitatam esse necesse est, Imò eam propter inertiam bellicam ac otium à plerisque relinqui. Ut enim quisque maxime à natura virilis & magnanimus est, ita plurimum eius animus le-

Fortes, leges auersantur.

non subsunt, sed iure suo degunt, sibiipsisque omnes labores

HIPPOCRATIS LIBER

lucrifaciunt, illi bellicosissimi omnium existunt. Periclitatur enim ipsi sibi, virilitatisq; præmia ipsi reportat, sicut timiditatis ac ignauie poenā luunt pariter. Inuenias autem & Asianos ipsos inter se plurimum differentes, generosiores alios, alios degeneres, quorum omnium causa ad temporum mutationes est referenda, quemadmodum & in præcedentibus di-

*Quare nō
nulli ab a-
liis differe-
rant.
Scythica
gens.
Mæotis
palus.
Sauromata-
te.*

xi. Atq; sic quidem habet in Asia. In Europa vero genus hominum est Scythicum, circa paludem habitas Mæotim, quod à reliquis gentibus maxime differt, Sauromatæ appellantur, Horum fœminæ equites sunt, arcubus vtuntur, ac sagittas iaculantur ex equis, cum hostibus congrediētes, dum virgines existunt, neque deuirginantur prius, quàm hostium tres confecerint, neque prius maritis cohabitant, quàm sacra deo patrio more fecerint. Quod si qua sibi virum acceperit, ab equitatu libera est, nisi necessitas cogat cōmuni expeditione omnes exarmari. Dexteram autem mammam non habent. Nam puellis adhuc infantibus matres æreo instrumento in hunc vsum parato, igneque candefacto eam auferunt, ac exurunt, ne iterum succrescere contingat, atque vt omnis vis ac robur in dextrum humerum & brachium deferatur. Cæterum reliqui Scythæ quod ad formam adinet, ipsi sibi similes sunt, aliis dissimiles. Sicut quoque Aegyptij ipsi inter se, præterquam quod hi à vehementi calore, illi ab inteso frigore sunt compressi. Verum solitudo quæ Scythica dicitur, in planitie sita est, pratis abundans, sublimis & mediocriter aquosa. Sunt enim fluuij in ea magni, in quos aqua ex cāpis per riuos deducitur. In hac itaque Scythæ degunt, qui Nomades vocantur, propterea quod nullas habeāt domos, sed in curribus habitant. Sunt autem currus ex quibus minimi quatuor rotis, reliqui sex circumaguntur. Sunt etiam luto obturati ac instar domorum fabrefacti, aliqui simplici, aliqui etiam triplici tabulato, Vnde robur illis inest aduersus omnes iniurias aquarum, niuis ac ventorum propellendas. Trahunt currus aliquos quidem bouum paria duo, aliquos tria, atque hi cornibus carent, quum præ frigore regionis cornua eis non enascantur. In his itaque curribus degunt mulieres. In equis autem vehuntur viri. Sequuntur autem simul oues, boues & equi. Tandiu deinde in vno subsistunt loco, dum sufficit ipsis pecoribus pabulum, quo deficiente in aliam regionem commi-

*Aegyptii
cur inter
se similes.
Scythæ
Nomades
quomodo
viuant.*

grant.

- A** grant. Vescuntur autem ipsi carnibus coctis, bibuntque lac equinum, comedunt etiam Hippacen, id autem est caseus equinus. Haftenus ergo de victu & moribus diximus, temporibusque anni ac formis, quæ à reliquis hominibus longissime sunt Scythiæ genti diuersæ. Ipsa enim sibi inter se gens similis existit quemadmodum & gens Aegyptiorum. Minime autem fecunda ea gens est, regioque ipsa minimas feras enutrit, neque numero, neque specie insignes. Sub ipsis enim Vrsis Riphæisque montibus sita est, unde Boreas spirat, Solque ipse supremo æstiuo solstitio deficiens proxime accedit, ac tum quidem exiguo tempore calefacit. Neque vero venti à calidis locis spirantes valde ad eam regionem penetrant, nisi parumper & debiles. Verum ab Vrsis venti procedentes sunt illic perpetui frigidi à niuibus, glacie imbrisque condensati. Qui nunquam à montibus decedunt, ut propterea etiam inhabitabiles fiant. Aerque ipse totum ferè diem nubilus campos occupat. Ipsi vero in humidis locis degunt. Et ferè perpetua est ipsis hyems, æstas autem paucissimis diebus atque illis non valde multa, Sunt enim planities eminentiores, & nudæ, neque ullis montibus circumsæptæ, sed ferè sub ipsis Vrsis accliuës. Neque feræ nascuntur illic magnæ, sed quales possibile est sub ipsa terra cõtegi. Prohibet enim hyës & nuditas terræ, quæ & diuerticulis & vmbraculis caret, propter temporum anni mutationes, neque multas neque fortes, sed similes semper, vel parum admodum diuariantes, unde
- C** & formas corporum inter se similes habent, quum eodem vrantur victu & amictu, æstatis & hyemis tempore, attrahuntque aerem aquosum condensatum, aquam insuper bibentes à niuibus & glacie resolutam, nullo etiam corporis exercitio accedente, quum non verisimile sit corpus aut animum ullis exercitationibus apta fieri, vbi non mutationes temporum fiunt fortes. Propter quas causas formæ eorum sunt crassæ & carnosæ, Iuncturæ vero humectæ & inefficaces, ventriculi que humidi omnes, maxime omnium tamen inferior aluus, Nequit enim ipsa exsiccari in eiusmodi quum regionis, tum naturæ & temporis constitutione. Sed pinguedine & nuditate carnis formæ inuicem sunt similes, masculorum masculis, & foëminarum foëmellis. Tempora enim quum sint inter se similia, nullas corruptiones, neque malignitates inferunt

*Hippace
quid.*

*Riphæi
montes.
Qui uenti
hic spirēt.*

*Cur nō ma
gna ani
malia illic
gignātur.*

*Cur oēs hi
carnosi pin
gue sūt.*

*Cur inter
se dissimiles,*

HIPPOCRATIS LIBER

in feminis genitalis mixturam ac compactionem, nisi quid-
dam aliud fortuito vel casu contingat, aut à morbo. Magnum
autem argumentum humiditatis corporum Scytharum hoc
exhibebo. Multos enim ipforū, præcipue qui Nomades sunt.
reperias exustos humeros ac brachia habentes manuumque
iuncturas, pectora, coxas, & lumbos, nullā sanē aliam ob cau-
sam, nisi ob humoris & molliciei naturæ detractionem. Nam
neque arcus intendere, neque telum torquere possunt præ im-
potentia humiditatis humerorum, quum autem vruntur, hu-
mor ipse à iuncturis exoluitur, fiuntque corpora ipforum va-
lidiora, melius nutriuntur, & magis redduntur articulorum
vfu potētia. Fluida vero fiunt ac lata primum propterea quòd
fasciis non colligantur, quemadmodum fieri solet in Aegy-
pto. Deinde quòd non animaduertunt quomocunque in-
ter equitandum equis infideant. Postremum etiam propter
desidiā perpetuam. Masculi enim eorum antequam poten-
tes fiant equos conscendere, atque in illis vehi, plurimū tem-
poris desident in curribus, raroque prodeunt vt inambulēt,
propter exilia ac perpetuas circulationes. Muliebrium autē
corporum formæ ad miraculum vsque fluxæ existunt. Porro
Scytharum gens fuluivalde coloris existit propter frigus in-
gens. Non enim vehemens accedit ad eos sol, à frigore vero
albedo, exurit & fit fulua. Neque vero possibile est fœcun-
dam esse eorum naturam, quum viri minime cupidi sint cum
fœminis commisceri, ob nimiam corporis liquiditatem, ven-
trisq; mollitiā ac frigiditatem, quæ causæ adparent mini-
me viros ad coitum incitari. Accedit his lassitudo ex conti-
nua equitatione contracta, quæ eos ad commissionem reddit
impotentiores, atque hæ sunt causæ cur viri infœcundiores
putentur. Mulieres pinguedo carnis & humiditas steriles fa-
cit, præ quibus vteri earum genitale semen nequeunt con-
tinere. Lunares namque purgationes eis non eueniūt quem-
admodum est necesse, sed minus & intempestiue per lon-
gius tempus. Ipsumque amplius vteri os præ pinguedine con-
cluditur, vt nequeat semen suscipere. Sunt enim ociosæ & pin-
gues, ventresque earum frigidi & molles, vnde necessario se-
quitur non multum fœcundam Scytharum gentem esse, cuius
rei famulæ earū indiciū exhibent. Nam hæ viris misceri plu-
rimū gaudēt, in vteroq; conceptū continent, propter corpo-
ris exer-

*Mulieres
Scythæ
mollissimæ*

*Quid conti-
nua equita-
tio faciat.
In Scythia
cur mulie-
res steri-
les.*

*Sterilita-
tis altera
caussa.*

Aris exercitium frequens carnisque gracilitatem. Amplius autem plurimi Scythæ Eunuchi sūt, & muliebria officia obeūt, instarque scēminarum omnia faciunt, & loquuntur, vocanturque hi effcēminati. Et regionis quidem incolæ causam ad deum referunt, coluntque hos ipsos homines & adorant; sibiipfis timentes ne quid tale accidat. Mihi vero hi affectus diuini quidem esse videntur, sicut & reliqui omnes, neque vllum aliquem alio esse diuiniorē aut humaniorē, sed diuinos omnes, verum vnusquisque eorum suam propriam habet naturam, neque aliquis citra naturam accidit. Quare quomodo hic affectus contingat, vt mihi videre videor, narrabo. Ab equitatione ipsa diuturni eos corripunt articulorum dolores. Nimirum propendentib. semper ex

B equis eorum cruribus, deinde claudi fiunt, contrahunturque coxendices quum inualuerit morbus. Medicantur autem sibiipfis hoc modo. a principio morbi vtranque venam retro aures incidunt, quo facto sanguine multo promanante, somnus eos corripit præ imbecillitate, sicque obdormiscunt: quorum quidem aliqui depulso somno sani exurgunt, aliqui vero minime. Atque mihi sanè videntur ea medicatione se ipsos perdere. Venæ enim retro aures sunt, quas si quis secet sterilitatem inferat his quibus secantur, quare id etiam ipsis ex earum incisione accidere certum est.

*Que uer
ne scilicet
sterilem
reddunt.*

C Quando igitur postea vxores adeunt impotentesque se factos vident cum illis coire, primum quidem nihil molestius cogitantes quiescunt, quum autem bis aut ter, aut amplius frustra opus tentarunt, neque quicquam proficiunt, mox putant se deum offendisse, in quem culpam reiciunt. Induuntque se veste muliebri, palam se euiratos esse confidentes, ad mulierumque contubernia transeunt earum opera tractantes. Hoc itaque malo ditissimi Scytharum afficiuntur, minime vero infimi. Imo qui maxime & genere & potentia prævalent ex nulla alia, quàm continuæ equitationis causâ hoc perpetiuntur. Pauperes vero minus, quum non multum equirent. Vnde si hæc affectio aliis diuinior censenda esset, non nobilissimis, non ditissimis Scytharum ferè solis accideret. Sed esset omnibus, æqualiter peculiaris. Imò magis inuaderet pauperes circa cultum decorum negligētiore, si saltem gaudent dij in hominū ad-

*Cur ditiores
res potius
quàm pauperes
hoc patiantur.*

HIPPOCRATIS LIBER

miratione constitui, & pro hoc beneficia hominibus retri- D
 buunt. Diuites enim sæpius diis sacra faciunt, victimas offe-
 runt, statuas erigunt, coluntque, quum pecuniis abundant,
 pauperes autem minus id faciunt, quum nō habeant. Quin-
 etiam aliquando deos detestantur, qui eis opes non suppe-
 ditent, vt verisimilius esset, pauperes ac parum abundantes
 hoc malo propter crimina sua puniri, quàm diuites & qui
 opibus abundant. Verum sicut & prius dixi, diuinus qui-
 dem hic affectus est, secundumque naturam accidit simili-
 ter vt alij omnes, neque alia eius causa quàm ea quam dixi,
 Scythis existit. Simili autem modo & reliquis hominibus e-
 uenit. Vbi enim frequenter & continue homines equitant:
 ibi plurimi à diuturnis doloribus articularum, coxendicu- E
 que maxime & pedum corripiuntur, ad coitumque fiunt im-
 potentes, quæ omnia mala Scytharum genti adfunt. Atque
 propterea Scythæ omnium hominum minime sunt ad coi-
 tum valentes. Et quod Anaxyridas (braccarum siue scemi-
 naliū id genus est) semper habent, & plurimum temporis
 in equis desides degunt, vt neque manu tractare pudenda
 liceat, atque præ frigore & lassitudine voluptatis ac iucun-
 ditatis coeundi obliuiscantur, neque prius aliud sibi facien-
 dum putent, quàm vt euirati fiant. Hactenus ergo de Scy-
 tharum gente recensui. Reliquum autem in Europa homi-
 num genus valde inter se dissimile est & diuersum, tū quod
 ad magnitudinem adinet, tum quod ad formam, atque id
 propter temporum mutationes contingit apud eos magnas F
 & frequentes. Sunt enim eis calores vehementes, & hye-
 mes fortes, pluuiæ multæ, rursusque siccitas diutina, &
 venti plurimi, ex quibus multæ & omnimodæ fiunt trans-
 mutationes. Neque à vero discrepat circa generationem has
 ipsas mutationes sentiri, inque seminis genitalis coactione
 aliam, neque ex eodem etiam eandem, æstatis pariter vt
 hyemis, pluuioso vt sicco tempore, progigni. Eaque causa
 est, cur putem Europæos magis quàm Asianos secundū cor-
 porum formas inter se discrepare, & magnitudines diuer-
 sissimas in singulis adeo vrbibus prouenire. Plures enim cor-
 ruptiones contingunt in seminis coactione, quum tempo-
 ra frequenter variant, quàm si eadem sunt & similia. Eadem
 autem morum ratio in vtrisque existit. Feritas, integritas, &
 audacia

*Continua
 equitatio
 ubique no-
 cet.*

*Cur in Eu-
 ropa homi-
 nes inter
 se dissimi-
 les sint.*

*Semini-
 genitalis
 uarietas
 varias for-
 mas red-
 dit.*

*Cur seui-
 res in Eu-
 ropa.*

- A** audacia à natura Europæis innascitur. Frequentes enim multis perculsiones feritatem inducunt, mansuetudinem contra & benignitatem extirpant. Quare etiam magnanimos magis eos qui Europam incolunt Asianis iudico. Siquidem similitudo & æqualitas segnitiei parit. Mutatio autem & animum & corpus ad exercitationem excitat. Augetur itaque à desidia & ocio timiditas, ab exercitio vero & laboribus crescit virilitas. Vnde bellicosiores quoque Europæi extant, non ob hanc solum causam, sed & propter leges. Non enim regibus obediunt quemadmodum Asiani. Vbi enim sub regibus viuitur, ibi necesse est homines timidissimos esse, quæ admodum & supra ostendi. Seruitute nanque animi eorum
- B** pressi non libenter, neque volentes temere pro aliis se periculis exponunt. Europæi autem suo iure viuentes, quum pro seipsis pericula belli subeant, magna cupiditate feruntur, volentesque ac alacres difficultates omnes adgrediuntur, ipsique sibi ex re bene gesta præmia reportant, ut certum sit leges plurimum ad magnanimitatem conferre. Tota itaque & vniuersa res de Europa & Asia sic ut retuli habet. Cæterum Europa ipsa adhuc habet gentes inuicem differentes, non magnitudine & forma solus, sed & magnanimitate ac fortitudine. Quæ vero in eis hanc diuersitatem faciant, in præcedentibus dixi dicamque amplius magis manifeste. Quicumque regionem montanam, asperam, nudam & non aquosam incolunt, his mutationes temporum contingunt magnæ & diuersæ, vnde & hominum formas magnas progigni conuenit, qui & ad laborem & ad viriliter agendum à natura præstent, quibusque feritas & immanitas non mediocriter à natura sint congenita. Qui vero loca concaua, pratensis & æstuosa habitant, ventosque calidos plus sentiunt quam frigidos, & aquis vtuntur calidis, hi magni quidem esse non possunt, neque bene compositi & longi ac erecti, sed in amplitudine à natura producti carnosissimi sunt, & capillis nigris. Imò & ipsi toti nigri magis quam albi, & qui minus de pituita habeant quam de bile. Virilitas autem & tolerantia laboris non æque ipsis à natura inest, nisi consuetudo accedat, & hæc in eis efficiat. Quod si flumina extent in ea regione, quæ stagnantes & pluuias aquas euehant, homines ipsi incolumes ac splendidi viuent. Si vero flumina desint, aquasque puteorum

*Segnities
ubi magis
uigeat.
Europæi
cur bellis
cosiores
quàm Asia
ni.*

*Locorum
uarietas
uarios ho-
mines cre-
at.*

*Quæ flus-
mina salus
bria.*

rum

HIPPOCRATIS LIBER

Quales gignat alta regio.
Sterilis quales.
Quales ubi tēpestates uariāt.
Pinguis regio quos gignat.
Montosa quales.

rum stagnantes & olentes bibant, necesse est ab ipsis illis aquis & ventrem lēdi & splenem. Quicunque autem altam habitāt regionem, planam, ventis expositam & aquosam, eorum formæ magnæ ac inuicem similes & erectæ. Animi quoque eorum existunt mansuetiores. Qui vero macra, aquis carentia, & nuda loca tenent, & quæ temporum mutationibus non sunt permixta, horum formas necesse est esse asperas & vegetas, flauas magis quàm nigras, mores etiam eorum rigidi sunt, pertinaces & contumaces. Vbi enim mutationes temporum contingunt frequentes, & plurimum inter se diuersæ, ibi & formas, & mores, & naturas reperias plurimum differentes. Temporū itaque varietates potissimæ sunt, quæ naturam ipsam permutant. Deinde etiam regio in qua multæ variationes fiunt, postremum autem aquæ. Inuenias enim ferè semper & formas hominum & mores regionis naturæ compares. Nam ubi terra pinguis est & mollis, & aquosa, aquæ autem valde sublimes, ita ut æstate calidæ sint, & hyeme frigidæ, & temporum ratio alias probe conueniat, ibi & homines carnosī, articulis non adparentibus, humidi, laboris intolerantes, & ut plurimum maligni nascuntur. Segnitieque & somnolentia eis inest multa. Suntque ad artes tractandas crassi, non acres aut subtiles. Vbi autem regio est nuda, natura munita & aspera, quæque & à frigore hyberno prematur, & à sole æstiuo exuratur, ibi duros & robustos, & articulis probe diffunctis, vegetosque & hirsutos reperias homines, & in quibus à natura laboris tolerantia, & vigilantia inest. Quicunque mores habeant pertinaces, ad iram procliuēs & contumaces, magisque feritate participantēs quàm mansuetudine. Insuper ad artes etiam acutiores & plus solertes, & ad res bellicas gerendas aptiores. Quin & omnia quæ à terra proueniunt, terræ ipsius naturam respiciunt & sequuntur. Atque hætenus quidem maxime contrarias corporum naturas & formas diximus, è quibus coniectura facta, si quoque reliqua cōsideraueris, nunquam à vero aberrabis.

Hippocra-

A HIPPOCRATIS COI

LIBER DE FLATIBVS,

Iano Cornario medico phy-
sico interprete.

Vnt quædam artes, quæ illis qui-
bus earum cognitio cõtigit, mul-
tum laboris ac molestiarum exhi-
bent: illis vero qui earum vsu indi-
gent, iucundæ ac vtiles existunt.
Imo ignaris etiam ac plebeis ho-
minib⁹ commune quoddam sunt
bonum. His vero qui eas exercent
planè molestæ. Ex harum artium
numero est & ea quæ medicina

*Medicine
qualitas.*

appellatur. Medicus enim oculis perlustrat singula pericula,
contrectat etiam nulla voluptate, & ex alieno malo proprias
sibi demetit molestias. Aegrotantes autem artis beneficio, à
maximis malis liberantur, à morbis, à doloribus, à tristitia, à
morte. Omnibus enim his euident medicina auxiliatrix re-
peritur. Huius autè artis quæ vilia vulgo putàtur, cognosce-
re difficile est. Quæ vero alicuius precij existunt, facile: atq;
C vilia quidè soli medici norūt, vulgus ignorat. Nō enim cor-
poris, sed animi opera existunt. Quæcunq; quidem manuū
operam exigunt, ad ea consuetudine perueniendum est. Est
enim vsus ipse egregius manuū exercitator & magister. Ve-
rum de nō adparentibus & difficillimis ægritudinib⁹. planè
opinio magis q̃ ars ipsa iudicat. In his ergo plurimum refert
expertusne sit quis, an omni experientia carens. Vnum autè
est horum omnium iudicium, hoc scilicet, Quæ tandè causa
sit morborum, & quod principium ac quasi fons sit, ex quo
corpori mala omnia scaturiant. Si quis enim causas corporis
affecti probe cognouit, potēs est valde ea adferre, quæ corpo-
ri cōmodent, nimirū contraria corporib⁹ morborum natura
perspecta. Est enim maxime secundum naturam ipsa medi-
cina. Quare statim vbi fames molestat, morbus fit. Quicquid

*Vsus pe-
ritiæ do-
ctor &
magister
summus.*

*Morbi las-
tentes gra-
uesque op-
pinione nō
arie cen-
sentur.*

*Quid pri-
mum in
morbis &
quæ me-
dela.*

*Contraria
tollunt cō-
traria.*

enim

HIPPOCRATIS LIBER

enim homini molestiam ac tristitiam infert, hoc morbus vocatur. Quod ergo est famis remedium? hoc scilicet quod famem sedat, id autem facit cibus, eo ergo malum illud medicandum. Amplius autem ubi sitis urgeat, bibere compefcit: & rursus, repletioni euacuatio, euacuationi repletio, labori quies succurrit, & quietis medelam ex labore reperias: atque ut breuiter dicam, contraria cōtrariorum sunt medicamina.

*Medicina
quid.*

Medicina enim nihil aliud est nisi adpositio & ablatio. Ablatio quidem eorum quæ excedunt, adpositio vero eorum quæ deficiunt: qui autem istud optime facere potest, is optimus medicus censebitur, quantumque quis ab hoc præstando deficit, tantum deficit quoque ab ipsa arte. Atq; hæc quidem præter institutum futuri sermonis à me dicta sunt.

*Loci mor-
bos diffini-
les faciūt.*

horum autem omnium vnus & idem modus est. Locus vero ipse eorum differentiam facit. Quare videntur quidem morbi inter se nihil simile habere, propter diuersitatem scilicet locorum, quum sit tamen vna morborum omnium & species & causa quoque eadem. Quæ autem hæc ipsa sit, in sermonis

*Tria sunt
quæ corpo-
ra hominū
& aīaliū
cunctorum
sustentāt.*

huius progressu manifestum facere conabor. Corpora enim omnia tum hominum, tum reliquorum quoque animantium à triplici nutrimento sustentantur. Horum autem nutrimentorum nomina hæc sunt, cibus, potus, spiritus. Ac spiritus quidem qui in corporibus sunt, flatus vocantur: qui vero extra corpora existunt, aer. Qui sanè maximus est in omnibus quæ corpori accidunt & autor & dominus. Quare operæ precium

*Vētus qd,
& quid
possit.*

est eius potentiam diligentius perspicere. Ventus enim ipsius aeris fluctus & vnda existit. Quando igitur multus aer fortes fluctus facit, tū & arbores radicitus euelluntur, & mare vndis exæstuat, spirituum potentia ita cogente, & naues onerarias etiam & ingentes in altum disiciente. Talem itaque vim in ista exercet, etiam si oculis minime sit conspicuus, & tantum consideratione cognoscatur, & effectu suo fiat manifestus. Quid autem sine hoc sit tandem aut cui rei nō adest? Omne enim quod inter cælum & terram est, spiritu repletum est. Hic & hyemis & æstatis causa est. In hyeme quidē frigidus & condensatus. In æstate autem mitis & trāquillus. Quin & solis & lunæ, & astrorum omnium cursus per spiritū procedunt. Etenim igni spiritus nutrimentum præbet, quo si ignis priuatur, viuere non possit. Et solis perpetuum cursum,

aer

- A** aer perpetuus & tenuis cōseruat. Verum neque mare ipsum spiritus exors esse omnibus manifestum esse puto. Nō enim viuere natantia animantia possent, si non spiritu participarent: quomodo autem participarent, si non per aquam & ex aqua spiritum adtraherent? Et Lunæ hic fundamentum est, & terræ vehiculum, neque quicquam vsquam est spiritu vacuum. Atque hæcenus quidem quantum aer aliis commodet diximus. Mortalibus autem vitæ, & morborum ægrotis, solus is est autor. Tantaque omnibus corporib. spiritus necessitas extat, vt siquidem omnibus aliis abstineat homo, neque cibū sumat, neque potum, possit tamen dies duos vel tres & plures ducere, Si cui vero spiritus in corpus viæ intercipientur, in breui parte vnius diei intereat, vt vel hinc quanto vsui spiritus corpori sit liceat æstimare. Amplius autem ab omnib. operibus aliquādo immunes quiescunt homines: multæ enim sunt mutationes in vita, verum ab hoc opere nulla omnibus mortalibus animantibus requies contingit, vt cessent spiritum adducere, ac rursus exhalare. Vides ergo ex his quæ dixi quanta communiō omnibus animantib. in fruendo aere existat. Subiiciam igitur mox & illud, quod non aliunde vquam verisimile sit morbos euenire quā inde, si is aut plus, aut minus, aut cumulator, aut morbidis ffordib⁹ inquinatio in corpus se ingerat. Sed hæc de vniuersa hac re dicta sufficiant. Ad ipsa nunc opera sermonem conuertens demonstrabo, omnes morbos ex hoc oriundos corporib. innasci, ac generari. Primum autem à cōmunissimo morbo febrili exordiū sumam, & qui omnium morborum comes est: præcipue tamē ex inflammatione & tensione abscessuum. Quod satis indicant sequentia offendicula, statim enim cum inflammatione inguinum abscessus & febris consequitur. Sunt autem febrilium genera duo, vt hoc quoque nunc attingam, quorum alterum commune omnib. pestis adpellatur, alterum propter malam diætā priuatim his contingit qui ea vtuntur, vtriusque autem generis aer autor & causa existit. Communis ergo febris propterea omnibus accidit, quod eundem spiritum omnes adtrahunt, sitque vt simili corpori similes spiritus similiter permixti, similes gignant febres. Sed est fortasse qui dicat vt quid ergo non omnibus animantibus, sed alicui eorum generi incidant hi morbi? Cui ego sic respōderim, Differt cor-

*Spūs usus
quā nē-
cessari⁹ sit.*

*Spūs sem-
per trahi-
tur uel e-
mittitur.*

*Morbi un-
dē.*

*Febrilium
genera.*

*Cōis pecu-
liaris & fe-
bris causa*

HIPPOCRATIS LIBER

pus à corpore, natura à natura, & nutrimentum à nutrimento. **D**
 Non enim omni animantium generi eadem aut non conferunt, aut commoda sunt, sed sunt alia aliis magis conuenientia. Quando igitur aer eiusmodi inquinamenti plenus est, quibus humana natura offenditur, homines ægrotant. Quando vero alteri cuiuspiam animantium generi aer inconueniens est, tum morbus illud genus corripit. Qui ergo populares sint morbi hæcenus dictum sit, & quare, & quomodo, & quibus, & unde gignantur. Quomodo autem propter malam dietam febris accidat deinceps exponam. Est autem mala dieta hæc.

Febris mali nutritiva. Primum quidem quum quis plures cibos, liquidos aut siccos ingerit in corpus, quàm ipsum corpus ferre queat, neque laborem aliquem ciborum saltem multitudini parem adiungit. Deinde quum varios & dissimiles inter se cibos adsumit, seditione enim mouent quæ sunt inæqualia, aliquaque citius, alia difficiliter concoquuntur. Cum multorum autem ciborum ingestione necesse est & multum spiritum ingredi. Omnia enim quæ eduntur & bibuntur, spiritus in corpus inferunt, aliquando plures, aliquando etiam pauciores. Id autem inde manifestum fit, quod plurimis eructationes post cibos & potus euenire solent, discurrunt nimirum aere incluso, ubi perfruerit bullas quibus fuerat inclusus. Quando igitur corpus cibis expletum est, ac spiritus quoque multitudo vehementer excellit, cibi quoque ventri diu immorantur, quum præ multitudine exire nequeant, & inferior venter vel aluus ipsa sit obturata, per vniuersum corpus permeant flatu, sanguine quoque plenas corporis partes maxime petentes eas infrigidant: in frigidatis autem his locis unde fontes & radices sanguinis prodeunt, per vniuersum corpus horror consequitur: vniuerso autem sanguine refrigerato, totum corpus horret. Quæ ratio est cur primum horrores ante febres corpus concutiant, quantoque maiore impetu multitudinis & frigiditatis ipsi flatu præcelluerint, tanto maior fit & horror, à pluribus videlicet & frigidioribus fortior, à paucioribus ac minus frigidis, minus etiam fortis. Cum horribus autem & tremores corporis accidunt, secundum eundem planè modum. Sanguis enim præsentis horribus timore perculsus concurrit, ac penetrat per omne corpus ad locos maxime calidos. Hi enim sunt eius saltus. Decedente itaque ab extremis corporis partibus sanguine, viscera

- A** viscera contremiscunt & carnes. Sunt autem quædam corporis partes sanguine plenæ, quædam vero exangues. Exangues itaque propter frigus non tremunt, sed parumper commouentur quum calor ex eis defecerit. Sanguine autem abundantes propter sanguinis multitudinem & tremunt, & inflammationes suscitant. Nequit enim fieri ut sanguinis multitudo conquiescat. Hiatus etiam præcedere solet febres, siquidem multus aer coaceruatus, cumulatim superne petens commouet ac diducit os, quum per hoc facillimus ei exitus pateat. Quæmadmodum enim ab aquis in lebe te feruentibus vapor multus eleuatur: Sic & corpore calefacto penetrat per os aer conuolutus, & quadam vi erumpens. Amplius autem &
- B** articuli exoluuntur ante febres, calefacti enim nervi diducuntur. Quando autem cõgregatus fuerit cumulatim plurimus sanguis, calefit rursus ipse aer, qui antea sanguinem in frigidauit. Nimirum à calore multo victus, accensusq; ac velut igneus factus per omne corpus calorem spargit, cooperante ei in hoc etiã ipso sanguine. Liquefit ergo quicquid ignea vis illa adtigerit, fitq; inde spiritus. Qui cū ad meatus corporis irruerit, sudores fiunt. Siquidem spiritus compactus in aquam transmutatur, & per meatus penetrans extra prorumpit, eodem planè modo, quo à feruentibus aquis vapor eleuatus, si obstaculum habeat, ad quod impingere oportet, pinguefit ac condensatur, guttæque destillant ab his corporibus quibus vapor ipse fuit impactus. Insuper autem & dolores
- C** capitis simul cum febre accidunt, cuius rei hæc causa est. Sanguinis transitus in capite magna angustia coarctantur. Repleti enim sunt multo aere. Cuius abundantia ac conclusio dolorem excitant in capite. Sanguis enim ipse natura calidus existens, vi coactus per angustam viam transire celerissime non potest, quum multa impedimento sint obstacula, & oppilationes, quapropter etiam pulsus fiunt circa tempora, Hoc ergo modo, ut dixi, febres fiunt, & cum febribus dolores, ac aliæ quædam ægritudines. Porro sunt aliquæ aliæ infirmitates utpote voluuli, agitationes intestinorum, tormina atque opilationes: quod autem hæ ipsæ omnes à flatibus caussentur, nemini puto nõ manifestum esse. Omnium enim horum causa est spiritus transitus. Nam is quum contingit locos teneros, inconsecutos, ac prius intactos, quæmadmodum
- spiculum

*Hiatus.**Sudores
quæ cres-
tur.**Capitis do-
lor cū fe-
bre cur-
fiat.**Pulsus tẽ-
porũ cur.*

HIPPOCRATIS LIBER

Calor fo-
mēti foris
appositi
qd faciat.
Diffusio
nis causā.
Fauces qui
exaspere-
tur tussisq;
fiat.
Sanguis cū
putruit pus
efficitur.

spiculum infixum penetrans per carnem perrumpit, aliquā-
 do præcordia petens, aliquando illa. Immo quandoque vtra-
 que simul adfigens. Quare solent quidam calida fomenta
 extra adhibentes dolorem mitigare. Rarefacto enim corpo-
 re à calore fomentum spiritus inde exhalat, vt quies inde a-
 liqua & mitigatio contingat dolorum. Sed dixerit fortassis
 quispiam, Quomodo ergo fluxus generatur per ipsos flatus?
 Et quonam modo sanguinis rupturarum circa pectus flatus
 autor & causā existit? Opinor autem ego me ista per hæc
 manifeste declaraturum. Quum igitur venæ circa caput aere
 repletae sunt, primum quidem caput ipsum propter flatus in-
 clusos aggrauatur, deinde conuoluitur spiritus cum sangui-
 ne propter angustiam viarum, tenuissimum autem ipsius san-
 guinis per venas excluditur, atque id ipsum tenuissimum li-
 quidum quum coaceruatur, per alios meatus fluit, & vbi tan-
 dem cumulatim progrediens constitit, ibi constituitur &
 morbus. Si itaque ad oculos peruenerit, sequitur eorū dolor.
 Si ad aures, morbus & illas occupat. Si ad nares, grauedinem
 generat. Si ad pectus, raucedinem. Pituita enim ipsa acribus
 humoribus permixta, quocunque proruperit, maxime in
 non consuetos locos, eos exulcerat. Quod si fauces teneras
 aliās fluxus petiuerit, eas exasperat: spiritus enim qui fauces
 ingreditur, ad pectus vsque procedit, ac rursus effertur per
 eandem viam. Quum autem spiritus ingrediens in fluxum
 qui intus est inciderit, tussis gignitur, & repellitur sursum pi-
 tuita. Quæ quum sic habeat, fauces exulcerantur, exasperan-
 tur & inflammantur, adtrahuntque calefactæ humorem de
 capite, caput autem rursus ab aliis corporis partibus adtra-
 hens his transmittit. Quum igitur hic fluxus cōsueuit sic ma-
 nare, implentur meatus, & transmittunt in pectus. Acris au-
 tem quum sit pituita carnem penetrans, exulcerat ac perfrin-
 git venas. Ex quibus sanguis effusus in alienos sibi locos vbi
 moram traxerit putrescit, ac in pus conuertitur, & neq; sur-
 sum potest conscendere, neque infra exire. Sursum nō, nam
 non facilis est via humori ad ardua prodire, sicut neque aliis
 rebus, quæ aliquam admixtam secum habent grauitatem. In-
 fra autem procedere prohibet septum transuersum. Quare
 sanè contingit fluxum aliquem citra spiritum rumpi, & ali-
 quando quidem sua sponte, quandoque etiam propter dolo-
 res. Ac

A res, Ac sponte quidem quum aer in venas vltro receptus sanguinis meatus coarctat. Multitudine nanque sua compressus sanguis meatus perfringit, qua ei⁹ copia maxime prorumpit. Effusione autem eius facta, venæ rursus spiritu complentur, & ex eo dolor sequitur. Necesse est enim affectum locum spiritu occupari, aliaque dictis similia fieri. Rupturæ autem omnes fiunt hoc modo. Quum violentia quadã inuicem discedunt & finduntur carnes, fissuram subtercurrit spiritus, ac dolore adfligit: quum autem ipsi flatu carnes pergressi, meatus corporis rarefecerint, sequitur post flatu humiditas, cui viam iam antea aer præstrauit. Irriguo itaq; corpore ab humiditate facto, liquefiunt carnes, tumoresque in suras descendunt, atq; morbus fit, qui aqua intercus adpellatur. Maximũ autem signum est, morbum hunc à flatibus generatum esse, quod iam sæpe aliqui hoc malo affecti exoluti sunt, & ab aqua euacuati. Atque his quidam subito aqua ex ventre prorumpens multa adparet, post moram autem paucior fit. Cur vero hoc fiat satis manifestum est. Nam primum subito prorumpens aqua aere plena est, is tumorem ac aceruum præ se fert ingentem: quũ autem aeris spiritus euauerit, remanet planè eadem aqua, & adparet quidem paucior, verũ penitus eadẽ existit. Adiciam autẽ aliud adhuc signum. Si quis vniuersum ventrẽ penitus euacuet, nõ tres procedunt dies rursus plenus fit. Quid ergo aliud quod impleat putandum est quàm spiritus? Quid enim aliud tam repẽte impleffer? Nam

C neque tantum potuunt in corpus ingestũ est, neque carnes in causa esse possunt, vt pote antea liquefactæ. Superfunt autẽ ossa, nerui, chordæ, fibræ, à quorũ nullo vllũ aliquod aque augmentũ potest prouenire. Ergo quomodo aqua intercus fiat iam sit dictũ, quod vero stupor attonitus vel syderatio à flatibus fiat, deinceps demonstrabo. Quum ergo flatu frigidi multi penetrent ac inflent carnes, partes corporis stupida fiunt, & siquidẽ plurimi flatu per vniuersum corpus discurrant, totus homo syderatur. Si per partẽ, pars illa percutitur, atq; vbi abierint flatu, cessat & morbus: quãdiu autẽ permãserint, cõsistit & morbus, idq; sic habere indicat perpetuus syderatorũ hiatus. Videtur autem mihi amplius & sacrũ adpelatum morbum ab ipsis flatibus gigni: quibus autem rationibus ego persuasus sum, illis ipsis & auscultaturos persuade-

Locus affectus spiritui uocat.

Scissura carnis frangimẽtũ quĩ fiat & hydrops.

Syderationis apoplexie causæque

Sacer morbus comitialis quĩ fiat.

HIPPOCRATIS LIBER

Sanguis qd possit. re conabor. Opinor autem inter omnia quę in corpore sunt, nihil magis ad prudentiā conferre quā sanguinē. Hic ergo quū in constāti habitu persistit, cōsistit & prudētia: sanguine vero permutato, cōcidit simul & prudētia. Quod autē hec ita habeant, multa sunt testimonia. Ac primum quidem, qui om-
Somnus qualis. nibus animantibus cōmunis est, hæc confirmat somnus, Quū enim corpus inuasērit somn⁹, sanguis frigeſcit. A natura enim somno frigeſcendi vis est. Infrigidato autem sanguine, languidiores fiunt eius meatus: quod hinc palām fit, quod corpora adgrauata reclinantur, Omnia enim grauiā natura ad fundum deferuntur: & oculi ardent, & prudētia permutatur, opinionesq; peregrinæ mentem occupant & exercent, quę sanē insomnia adpellantur. **Insomnia.** **Temulentia quoque sensus uariet.** Quin & in temulentis per ebrietatem aucto repente sanguine percellitur animus, & in animo prudentia, fiuntq; præsentium malorū obliuioſi, ac futurorum bonorū fœcunda spe beantur. Possem autem plurima eiſmodi cōgerere, in quib⁹ sanguinis permutationes, animi quoq; prudentiam permutāt. Siquidem igitur penitus totus conturbatus est sanguis, penitus & prudentia proſternitur. Affectus enim & cognitiones à consuetudine contingunt: quum autem à consuetudine solita recedimus, aufertur nobis prudentia. Dico itaque & sacrum morbum tum fieri, **Sacer mor b⁹ qui fiat** quum plurimus spiritus per omne corpus vniuerſo sanguini fuerit permixtus: tum enim multæ oppilationes fiunt multifariam per omnes venas, quumq; in crassiores & pleniores sanguine venas aer prodierit, progressusq; diutius maneat, **Sanguis qd possit & faciat.** prohibet sanguinis curſum, atq; alio quidem loco consistit, alio lentius penetrat, alicubi adhuc tardius. Qua sanē inæqualitate tranſitus sanguinis per corpus facta, omnigenæ inæqualitates per omne corpus contingunt. Omne enim corpus vndiquaque contrahitur ac turbatur, nimirum corpore partes suas ad tumultum ac conturbationem sanguinis subministrante: continguntq; ex sanguinis peruerſione, totius omnino corporis subuerſiones. Eo enim quo corripiuntur à morbo, tempore, neque sentiunt quicquā, neque audiunt quę dicuntur, neque vident quę fiunt, neque vllōs aliquos dolores percipiunt. Sic nanque aer conturbatus sanguinem turbauit, ac conspurcauit. Spumaq; etiam per os illis excurrit, neque id ab re est. Nam per iugulares venas aer tranſiens, penetrat

A penetrat. quidem ipse, adducit autem simul secum quod tenuissimum est in sanguine, id ipsum quum humidum sit, multa permixtione albescit. Tenuēs enim membranas purus permeans aer pellucet, quapropter & albę spumę omnes apparent. Porro liberantur aliquando huic morbo obnoxij, maxime accedente hyeme. Quomodo autem id fiat, dicam. Quando variis laboribus exercitatum corpus calefactum est, calefit & sanguis, qui calefactus, rursus calefacit & flatus, hi vero calefacti, dissoluuntur & ipsi, & compactum sanguinem dissoluunt simul, proceduntque è corpore partim cum spiritu, partim cum pituita eiectioni. Deferuente itaque spuma, & consistente sanguine, tranquillitateque per omne corpus facta, quiescit etiam morbus. Quare, vt dixi, flatus ipsi vere omnium istorum morborum omnimodę existunt causę. Ceteraque omnia quę causę videri queant, vel hos adiuuant, vel consequenter post hos in corporibus morbos generant. Hactenus ergo morborum omnium causas flatus esse demonstravi. Id enim à principio receperam me facturum. Recensui autem spiritum ipsum, quum in aliis omnibus rebus potentem, tum maxime in animantium corporibus plurimum posse. Deduxi autem sermonem vsque ad morborum cognitionem, atque adeo ægritudinum singularum, in quibus verum argumentum huius sermonis est à me manifestatum. Quod si pergerem singula ægritudinum genera recensendo amplius corroborare, longius quidem sermo ipse extenderetur. Verus autem nihilominus futurus esset, & qui fidem suam omnibus probaret.

Flatus quę faciunt.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE MEDICAMENTIS

purgantibus, Iano Corna-

rio medico pbysi-

co interprete.

n ij

Medicamentorū

HIPPOCRATIS LIBER I.



Medicamentorum purgantium res **D**
non ita se habet, quemadmodum
vulgo putatur. Eodem enim medi-
camento purgantur & non purgā-
tur. Quandoque vero alia pur-
gat quàm quæ purgare solet. Ali-
quando nimium purgat. Aliquan-
do ea quæ debet facit. Quare fie-
ri non potest vt quis medicamen-
tis confusus, ea temere exhibeat.

*Cibi qua-
ten⁹ nobis
medetur,*

Nam & cibos nos alentes, medicamenta esse putandum est,
verum minus quàm illa. Homines enim qui his recte in cibo
vtuntur, sani sunt: qui nō rectè, ægrotant: qui vero modum
excedunt, purgantur quidē velut à sinceris medicamētis, ve-
rum minus & tardius q̃ à sinceris medicamētis. Clarū igitur
est, q̃ & hi medicamenta existunt. At vero hi tardiores, qui
& familiares nobis sunt, & quotidie in corpus ingrediuntur,
si temere & negligenter exhibeantur, temere homines tur-
bant, & quodāmodo morbos inducunt. Quin & sinceros &
acidos cibos si quis citra delectum ac incōsiderate exhibeat,
nihil cōmodi perficient.

*Medica-
mēta pro
natura cu-
iusq; dāda.*

Oportet igitur primum biliosis
dare quod bilem purgat. Pituitosis quod pituitam. hydropicis
quod aquam. atrabiliaris quod bilem atram. Si vero extra
hæc purgaueris, quæ quidem purgari debent, nō purgabis:
quæ vero non debent, ea euacuabis. Quare in vtranque partē
peccabis. Quum itaq; pharmacum alicui dare voles, siue de-
orsum siue sursum purgans, interrogare ipsum oportet, an
prius biberit medicamentum, & an alius ex deorsum pur-
gantibus cita sit, & celeriter obediat, aut dura. Et si citam ac
facilem solutu esse dixerit, mollioribus & paucioribus medi-
camentis opus habet. Si vero dura fuerit, fortiorib⁹ indiget.
Idem modus in sursum purgantibus requiritur. At si nunquā
neque sursum, neque deorsum, se purgatum esse dixerit, ne-
que medicamentum bibisse: cognoscere oportet an ad ea
quæ sanius in corpus ingessit, alius deorsum solutu facilis fue-
rit, aut sursum versus apposita ad vomitionem, & an ad re-
pletionem aliquam alui profluuium ipsi successerit. Hæc om-
nia interrogare oportet, quo recte consulere possis. Tur-
pis enim est calamitas, medicamento purgante dato homi-
nem occi-

*Pharmacū
daturus
quid prius
agat.*

A nem occidere. Quicumque igitur à febris fortibus cor- *Febricitan*
 ripiuntur, his medicamenta purgatoria dare non oportet, *ti qualia*
 donec remiserit febris. Sin minus, saltem nō intra quatuor- *medicame*
 decim dies. Carnes enim ipsorum & ventres, quum calidi *ta danda.*
 sint, medicamentum assument, & nihil depurgantur, & fe-
 bris maior fit, & color eueritur, & morbi regij speciem præ-
 se ferunt. Commota enim bile, & nō purgata, non sorbere
 vult æger, neque bibere, sed omnia abominatur, & plerunq;
 perit. Si vero desinet medicamentum, ante meridiem nihil
 purgatur: à meridie vero nimium purgatur, & perit. At si
 hac die superstes maneat, & vnà cum purgatione remittat fe-
 bris, sanus fit. Quapropter in febris vehementibus medi-
 camenta purgatoria exhibere non oportet. Verum si alicui
B opus fuerit, infusum per clysterem adhibere potes, quoties-
 cunque volueris. Hoc enim minoris periculi est. Iuxta ean-
 dem rationem etiam tempore æstatis, à canis ortu, per dies
 quinquaginta vitare oportet, & non dare medicamentum,
 sed infusis per clysterem vti. Idem enim periculum imminet.

HIPPOCRATIS COI

DE DIAETA SIVE VICTVS

ratione, Liber I. Iano Cor-

nario medico physico

interprete.



I quis mihi ex prioribus, qui de *Ratio cur*
 diæta humana ad sanitatem con- *de huma-*
 ferente scripserunt, recte cogno- *no uisū*
 uisse ac omnia per totum, quātum *scribat.*
 humanæ menti possibile est, con-
 scripsisse videretur: satis esset mi-
 hi aliorum laboribus, quos nossem
 recte habere, vti, prout singula vti-
 lia esse viderentur. Nunc vero mul-
 ti quidem iam scripserunt, nullus
 n iij autem

HIPPOCRATIS LIBER I.

*Potius lau-
dādi, quā
uitupera-
di, qui ali-
quatenus
vitā adiu-
uant.*

*Quæ scire
oportet
qui de hu-
mano vi-
tū scribit.*

*Quæ ob-
seruanda.*

autem recte nouit, quidnam fuerit ipsis scribendum. Et alij **D**
quidem aliud assequuti sunt, Verum totum nullus adhuc ex
prioribus. Immerito autem vllus aliquis ipsorum reprehē-
datur, propterea quod inuenire non potuerunt. Imò laudā-
di potius omnes quod inuestigare conati sunt. Itaque redar-
guere ea quæ non recte dicta sunt, minime institui, Verum
his quæ sufficienter cognita sunt, testimonium præbere ani-
mus est. Quæcunque quidem igitur recte à prioribus di-
cta sunt, vt non sit possibile me aliter conscribere, recte con-
scribam. Quæcunque vero non recte dixerunt, si quidem re-
darguam hæc quod non sic se habent, nihil perfecero. verum
exponendo qua de causa singula ipsorum recte mihi habe-
re videntur, declarare volo. Propterea vero hunc sermo- **E**
nem præpono, Quod multi homines vbi audierint aliquem
prius de re aliqua exposuisse, eum qui de his posterius disse-
rit non recipiunt, non cognoscentes quod eiusdem intelli-
gentiæ est, ea quæ recte dicta sunt posse iudicare. Ego
igitur velut dixi, recte quidem dictis testimonium præbe-
bo, quæ vero non recte dicta sunt ac cognita, qualia sint de-
clarabo. Quæ autem nullus ex prioribus explanare tenta-
uit, ea etiam ipsa qualia sint demonstrabo. Porro eum qui
de victu humano scripturus est, censeo primum quidem to-
tius hominis naturam nosse ac diiudicare oportere. Nosse
quidem ex quibus ab initio constitutus est, diiudicare vero
quæ in ipso partes dominium obtineant, Si enim constitu-
tionem ab initio non cognosceret, & id quod in corpore do- **F**
minatur, non poterit ea quæ homini conducunt offerre.
hæc igitur scriptorem cognoscere oportet. Deinde vero ci-
borum ac potuū omnium, ex quibus victū habemus, faculta-
tem, quā tandem singula habent & secundū naturam, & se-
cundum necessitatem ac artem humanā. Oportet enim scire
quomodo fortitū natura vim detrahare oporteat, & quomo-
do debilibus robur per artem addere oporteat, prout sin-
gulorum occasio se obrulerit. Et si relata iam etiā cognoue-
rit, nondū sufficiens est hominis curatio, ppter ea quod homo
edens sanus esse nō potest, nisi etiā laboret. Contrarias enim
inter se vires habet cibi & labores. Verū inter se mixti cōse-
runt ad sanitatem. Labores enim ea quæ insunt cōsumere so-
lēt, cibi autē & potus ea quæ euacuata sūt explēt. Oportet autē
velut

- A** velut par est laborum vim pernoscere, tum naturalium, tum eorum qui per vim fiunt, & qui ex ipsis carnes in augmentum præparant, & qui in defectum. & non solum hæc, sed etiam mensuram ac proportionem laborum ad multitudinem ciborum, & hominis naturam, & corporum staturas ac ætates, & ad tempora anni, & ad mutationes ventorum, & ad situs regionum in quibus degunt, & ad anni constitutionem ac statum. Sed & Astrorum ortus & occasus cognoscere oportet, quo mutationes & excessus ciborum ac potuum, & ventorum, & totius mundi, ex quibus sanè morbi hominibus oriuntur, observare sciat. *Astrorum ratio cognoscenda me dico.*
- Q**uum autem hæc omnia cognoverit nondum sufficiens inuentum est. Siquidem enim supra hæc inuenta fuerit ciborum mensura, & laborum ad unamquamque naturam numerus, ita ut excessus neque supra, neque infra modum fiat, inuenta sanè exacte fuerit hominibus sanitas. Nunc vero prædicta quidem omnia inuenta sunt, qualia sint, hoc vero invenire impossibile est. Si quidē igitur præsens quis sit, & inspiciat, cognoverit utique hominem exeuntem & in gymnasiis exercitantem, ut custodire sanum possit, alia detrahendo, alia apponendo. Verum non præsentem impossibile est cibos ac labores exacte præscribere. Nam quantum possibile est invenire à me iam relatum est. At enim etiam si valde parum defectuosiora quàm alia fiant, in multo tempore necesse est corpus ab excessu superari, & ad morbum peruenire. Alij itaque hucusque inquirere conati sunt, & neque hæc dixerunt ac prodiderunt. A me vero hæc inuenta sunt priusquàm homo ægrotet, ut ab excessu in utram tandem partem factus fuerit, prænotio contingat. Non enim derepente morbi hominibus accedunt, sed paulatim collecti, acervatim apparent. Priusquàm igitur in homine sanitas à morbo superatur, quæ perpetuantur. *Morbi sensum pullulant.*
- C**onstitutum autem ubi accesserit ad ea quæ scripta sunt, ratiocinationum huius doctrinæ conatus perficitur. Constituantur quidem igitur tum animantia alia omnia, tum homo ipse ex duobus differentibus quidem facultate, concordiis vero & commodis usu, igne inquam, & aqua. *Ignis & aqua cunctis gignunt.*
- Hæc autem ambo simul sufficientia sunt, tum aliis omnibus, tum mutuo sibi ipsis. Vtrumvis vero seorsum, neque sibi ipsis, neque ulli alteri sufficiens est. Vim igitur ac facultatem utrique

HIPPOCRATIS LIBER I.

ipforum talem habet. Ignis enim omnia per omnia mouere potest, Aqua vero omnia per omnia nutrire, Particulatim vero vtrunque superat & superatur, ad summum ac minimum, quantum eius fieri potest. Neutrum enim superare penitus potest, ob hanc sanè causam. Igni quidem vbi ad extremitatem aquæ peruenit, deficit alimentum. auertitur igitur eò vnde nutriri potest, Aquæ vero vbi ad extremitatem ignis peruenit, deficit motus. Siftitur itaque in hac, quum vero fterit, non amplius potens est, sed ab illabente igne in alimentum consumitur. & propterea neutrum penitus superare potest. Si vero etiam alterutrum superetur, nihil sanè ex his quæ

Potestas ignis & aquæ. nunc sunt fuerit velut nunc habet. Quum autem sic semper se habeant, erunt & eadem & neutra, & neque simul deficiet. Ignis igitur & aqua velut à me dictum est, sufficientia sunt omnibus per omnia ad summum ac minimum similiter.

Quæ ignis & aqua inter sese permutet. Cæterum vtrique horum hæc adsunt, Igni quidem caliditas & siccitas, aquæ vero frigiditas & humiditas. Habent autem inter se mutuo, ignis ab aqua humiditatem. Inest enim ab aqua humiditas. Aqua vero ab igne siccitatem, Inest enim in aqua ab igne siccitas. Quum autem hæc sic habeant, multas & omnigenas formas ac species, tum seminum, tum animalium, à seinuicem secernunt, quæ nihil inter se simile habent, neque visu, neque facultate. Etenim quum nunquam simul in eodem consistant, sed semper alterentur, necessarium est etiam ea quæ ab ipsis secernuntur ac producuntur diffimilia fieri. Equidem nullum omnino corpus perit, neque fit quod prius non erat, Verum permixta & discreta alterantur. Homines autem putat hoc quidem ex orco in lucem auctum generari, illud vero ex luce in orcum imminutum perire ac corrumpi. Oculis autè magis credere oportet quàm opinionibus. Ego vero hæc ex sententia exponam. Animalia enim sunt & illa & hæc, & neque animal mori possibile est nō cum omnibus, Vnde enim moriatur? neque quod non est generari, quum non sit vnde generetur. Sed augentur omnia ac minuuntur, ad summum & ad minimum, quantum eius fieri potest. Quid vero dicam generari & perire, vulgi gratia interpretabor. hæc autem commisceri & discerni significare declaro. Habet autem res hoc modo. Generari & perire siue corrumpi, idem est. Idem est commisceri & secerni. Generari idem

Quid generari & perire.

Asi idem est quod commisceri. Perire corrumpique ac minui idem est quod secerni. vnumquodque ad omnia, & omnia ad vnumquodque idem sunt. Consuetudo enim in his naturæ contraria est. Seorsim autem omnia & diuina & humana sursum ac deorsum vicissitudinem habent ac transeunt, dies & nox ad summum ac minimum, Sic & Luna ad summum ac minimum. Ignis accessus est & aquæ. Sol ad longissimum ac breuissimum. Rursus hæc, & non hæc. Lux Ioui, tenebræ orco. Lux orco tenebræ Ioui. Accedunt & transmutentur illa huc, hæc illuc, Omni tempore transigunt illa res horum, hæc autem illorum, & quæ quidem faciunt, non sciunt, quæ vero faciunt, scire sibi videntur. & quæ quidem vident, non cognoscunt, attamen omnia ipsis fiunt per diuinam necessitatem, & quæ volunt, & quæ non volunt. Accedentibus autem illis huc, his vero illuc, & inter se permixtis, vnumquodque destinatum satû explet, & ad maius, & ad minus. Corruptio autem omnibus mutuo inter se est, maiori à minore, & minori à maiore. Et augetur maius à minore. Reliqua autem omnia, & hominis anima, & corpus velut anima, ornantur ac gubernantur. Irrepunt autem in hominem partes partium, tota totorum temperaturam habentia, ignis videlicet & aquæ, partim acceptura, partim datura, & quæ quidem accipiunt, plus faciunt, quæ vero dant, minus. Secant homines lignum per ferram, alter trahit, alter protrudit, Idem autem hoc faciunt, & minus facientes, plus laborant ac faciunt. Sic & hominis natura, aliud protrudit, aliud trahit, aliud dat, aliud accipit, & alij dat, ab alio accipit, & alij quidem tanto plus dat, ab alio vero nihil minus accipit. Locum autem vnumquodque suum seruat, & quæ quidem ad minus eunt, ad minorem locum fecernuntur, quæ vero ad maius vadunt, permixta in maiorem ordinem mutantur. Peregrina vero non eosdē mores habentia, ex aliena regione protruduntur. Semper autem anima & maiora, & minora habens, suas ipsius partes circumambulat, non appositione, neque detractione partium indigēs, verum augmento & decremento earum quæ iam sunt opus habens. Locum vero vnicuique perficit, ad quem perueniant, & allabentia suscipiant. Non enim potest id quod non similes mores habet, in discordibus locis permanere. Oberrant enim velut ignota, permixta vero inter se cognoscunt. Concors enim
concordi

HIPPOCRATIS LIBER I.

concordi adhæret ac assidet, discordia autem rebellât, & pu-
gnant, atque inter se dissident. Quapropter anima hominis,
in homine augetur, in alio vero nullo, & aliorum magnorum
Qualis ho- animalium similiter. Quæcunque vero aliter ab aliis per vim
minis ani- secernuntur, de aliis quidem animalibus prætermittâ, de ho-
ma perspi- mine vero declarabo. Irrepat in hominē anima, ignis & aquæ
rito. temperamentum habens, partem corporis humani. Fœmel-
læ autē & masculi, & multi & omni generis nutriuntur. Nutriun-
tur autem & auferuntur per dietam qua homo utitur. Neces-
se est autē omnia quæ ingrediuntur partes habere, Cuiuscun-
que enim pars nō inerit a principio, augeri non poterit, ne-
que multo, neque modico alimento ingrediente. Non enim
habet quod auferere faciat. Id vero quod omnia habet, au-
gescit, unumquodque in suo loco. Alimento autē ingredien-
te ab aqua & igne, sicco & humido, alia quidem intro cogun-
tur, alia vero foras protruduntur. Quemadmodū fabri ligna-
rij lignum serra dissecant, & alter quidem trahit, alter protru-
dit, idem sanē facientes, & qui deorsum premunt, superiore tra-
hit, neque enim aliās admisteret deorsum ire. Si vero violent-
er cogant, toto opere aberrabūt. Similiter & circa hominis
alimentum se res habet. aliud trahit, aliud protrudit. Intro au-
tem coactum, foras repit. Si vero importune & violententer co-
gatur, omni successu priuabitur. Singula autē tanto tempore
eundē ordinē habent, donec locus nō amplius suscipiat, neque
alimentum aquarum ac ignis sufficiens ad summū habeat. Po-
stea ad externam regionem transeunt & fœmellæ & masculi,
eodem modo præ violentia & necessitate impulsī. Quæcunq;
autem destinatum fatum expleuerint, ea primū secernuntur,
ac simul commiscuntur. Singula enim secernuntur, omnia au-
tem hæc commiscuntur. Postquam vero regionem permuta-
uerint, & nacti fuerint harmoniam recte habentem sympho-
nias tres comprehensim penetrantes per omnia, viuunt & au-
gescunt iisdem quibus etiam antea, Si vero harmoniam non
assequuti fuerint, neque graui acutis consona fiant, prima
symphonia perit. Et si etiam secunda generetur, propterea
quod vnus per omnia corruptus est, omnis tonus vanus est.
Non enim concentum habuerit, sed transitio fit ex maiore
ad minus, ante destinatum fatum, quod qui faciunt, nō sciunt
quid faciant. Cur autem ytrique tum masculus, tum fœmina
fiant,

A fiant, in sermonis progressu declarabo. Vter autem ipsorum *Partus cō*
 harmoniam assequetur humidus existens mouetur ab igne, *positio.*
 motus autem viuificatur, & alimentū attrahet ab ingredien-
 tibus in mulierem cibis ac spiritu, primum quidem vndiqua-
 que similiter, donec recenter rarus est. à motu autem & ignis
 ficcatur ac consolidatur, consolidatus autem & firmatus cir-
 cum circa densatur. Et ignis inclusus non amplius sufficiens
 alimentum attrahere potest, neque spiritum expellit, propter
 ambiētis corporis densitatem. Consumit enim humorem in-
 tus existentem. Quę igitur solida natura sunt in compacto ac
 sicco, ea non consumuntur ab igne in alimentum: sed valida
 ac robusta fiunt, & consistant humore deficiente, atque hæc
 sanē ossa ac nerui nominantur. Ignis autem ex commixto ac
 moto humore corpus secundum naturam ordinat ac dispo-
 nit propter talem necessitatem. Nam per solidum & siccum
 non potest diutinos transitus facere, quia alimentum non ha-
 bent, per humida vero & mollia potest, hæc enim ipsius sunt
 alimentum. Inest autem & in his siccitas, quæ ab igne non cō-
 sumitur, Hæc autem inter se congregantur mutuo. Ignis igitur
 penitissime ad intima obturatus, & plurimus est, & maxi-
 mum exitum facit. Plurimus enim humor in ea parte inest, *Venter.*
 quæ venter appellatur, & excidit inde vbi alimentū non ha-
 bet foras, & exitum facit. Plurimus autem humor in vêtre in-
 est, tum propter alimēti ingestionem, tum propter cōcoctio-
 nem. Qui vero in reliquū corpus cōclusus est ignis, triplices
 circuitus facit. Etenim quod humidissimū est in igne, in his
 locis quæ venæ cauæ appellantur, existit. In media autē ho- *Venæ.*
 rum id quod reliquum est aquæ congregatū stabilitur, atque
 ea vocantur carnes. In summa, ignis omnia quæ in corpore *Caro.*
 sunt, secundū suū ipsius modū exornauit, ad vniuersi imitatio- *Mūdi imi-*
 onē, parua ad magna, & magna ad parua, Ventrē quidē maxi- *tatio.*
 mū, sicco & humido prōptuariū, vt det omnib⁹, & accipiat ab
 omnibus, iuxta maris facultatē qđ est animalium in ipso nutri-
 torū ac nutriti solitorū alimentū, discordiū vero pernicies.
 Circū hunc autē aquæ frigida & humida cōgregatio, transi-
 tus spiritus frigidi & calidi, ad terræ imitationē, omnia quæ
 in ipsum incidunt alterantis, Et alia quidem consumens, alia
 vero augens, aquę tenuis ac ignis dispersionē fecit, in superq;
 non obscuri & apparētis à cōpacto secretionē, in quo delatā
 omnia

HIPPOCRATIS LIBER I.

Partes i
gnis.
Leges cur
sibi fece-
runt nei
sciunt.
Vaticina-
tio & me
 omnia in apertum perueniunt, singula iuxta destinatum fa-
 tū. In hoc vero triplices circuitus ignis fecit, inter se mutuo
 intro ac foras terminantes, alios quidem ad cavitates humo-
 rum lunæ facultate, alios vero ad externam circūferentiam,
 ad ambientem soliditatem astrorum facultate. Medij vero &
 intro & foras terminantes, calidissimum ac fortissimum ignē
 habent, qui sanē omnibus dominatur, omnia secundum na-
 turam gubernans, sine strepitu, tum ad visum, tum ad tactum.
 In hoc Anima, Mens, Prudentia, Augmentum, Motus, Immi-
 nutio, Permutatio, Somnus, Vigilia. Hic omnia per omnia go-
 bernat, & hæc, & illa, nunquam quiescens. At vero homi-
 nes ex manifestis obscura considerare non nouerunt. Quum
 enim artibus vtantur similibus humanæ naturæ, id ipsum i-
 gnorant. Diuina enim Mens edocuit ipsos sua ipsorum imi-
 tari, ita vt cognoscant quæ faciunt, & non cognoscant quæ
 imitentur. Omnia enim similia sunt, dissimilia existentia, &
 omnia concordia, discordia existentia, quæ comprobamus,
 nō comprobamus, æquitatem habentia, iniqua sunt. contra-
 rius est modus singulorum ei quem consistunt. Lex enim &
 natura, quibus omnia transigimus, non consistunt quæ con-
 sistunt. Legem enim posuerunt ac tulerunt homines ipsi
 sibiipsis, non cognoscentes de quibus tulerunt. Naturam ve-
 ro omnes dij exornauerūt. Quæ igitur homines sancierūt,
 nunquam eodem modo habent, neque recte, neque non re-
 cte. Quæ vero dij sancierunt, semper recte habent. Et recta
 ac non recta intarum differunt. Ego vero Artes hominis ma-
 nifestas, affectionibus & manifestis, & obscuris, similes esse
 declarabo. Vaticinatio tale quid est. Ex manifestis quidem
 cognoscere obscura, ex obscuris vero manifesta, & ex præ-
 sentibus futura, & ex mortuis viuentia. Et ea quæ intelligi
 non possunt, vates intelligūt, qui quidem doctus est, semper
 recte, qui vero non doctus est, aliàs aliter. Naturam hominis
 etiam hæc quantum possibile est imitantur. Vir mulieri con-
 cumbens puerum facit, Hoc manifesto obscurum cognoscere
 datur, quod sic futurum est. Mens hominis obscura, cognos-
 cens manifesta, ex puero in virum transit, hoc præsentī fu-
 turum cognoscit. Non simile à morte vllum aliquod animal
 existit, neque mortuo animal viuum. Venter quod intel-
 ligi non potest nouit. per hunc enim intelligimus quod fitit
 aut esu-

- A** aut esurit. Hæ artis vaticinandi & humanæ naturæ affectiones, cognoscentibus quidem semper recte habent, verum non cognoscentibus aliâs alter. Artis fabrilis ferrariæ instrumenta ferrum circumliquant, flatu ignem fabri cogunt, & alimentum iam præsens auferunt, vbi vero rarefecerint, feriunt ac tundunt. Aquæ autem alimento ferrum rursus roboratur. Eadem patitur homo à pædotribus, præsens enim alimētum igne detrahitur, quum præ spiritu homo cogatur, rarefactus autem tunditur, atteritur, subuertitur. Aquæ autē aliunde accessione corroboratur ac fortis euadit. Et fullo-nes idem transigunt, calcitrant, feriunt, destruentes, tundunt, trahunt destruentes, robustiora faciunt, deradentes supereminentia, & attexentes pulchriora reddunt. Eadem etiā homo perpetitur. Sutores coriarij tota in partes dissecantes, scindentes & pungentes, marcida ac lacera, sana & integra, faciunt, Et homo idem patitur. Ex totis partes secantur, & ex partibus compositis tota fiunt. Punguntur & secantur à medicis marcida, sananturque ac viuunt homo. Medicina id quod molestat tollit, & id à quo homo ægrotat aufert, sanum facit. Natura eadem sua sponte nouit. Desidens conatur resurgere, currens conatur requiescere, & alia eiusmodi natura habet quæ medicinæ sunt. Fabri lignarij ferra secantes, alter trahit, alter protrudit, Idem autem vterque facit, & in vtranque partem tendit. Idem terebrant, alter trahit, alter protrudit, & qui premit, superiorem deorsum trahit, & minus facientes plus faciunt, naturamque hominis imitantur. Spiritus alter trahit, alter protrudit, Idem autē vterque facit, & in vtranque partē tendit. Cibi partim deorsum premuntur, partim sursum vergunt. Ab vna anima diuisa, plures & maiores, & minores & pauciores fiunt. Aedificatores ex diuersa rebus vnā concordem facientes, sicca quidem humectantes, humida vero siccantes, & tota diuidentes, diuisa vero componentes, Si enim non sic contingeret, nihil priuatim ac proprium constitui posset: dietam humanam in hoc imitantur. Nam & in hac sicca humectantes, & humida resiccantes, tota quidem diuidunt, diuisa vero componunt. Hæc omnia diuersa ac discordia existentia, cum natura cōcordant. Musices autem organum primum producere oportet, in quo harmonia quæ vult declarabit. Constructiones

*dicina
re similes
sunt.*

*Cibariorū
potestas
multis cō-
paratur.
Domorū
structura.*

Musica.

HIPPOCRATIS LIBER I.

Instructiones ex iisdem non eadem sunt, ex acuto, ex graui, no-
 mine quidem similibus, sono autem non similibus. Quæ plu-
 rimum diuersa sunt, maxime concordant, & quæ minimum
 diuersa sunt, minime concordant. Si vero quis similia omnia
 faciat, non inest delectatio. Plurimæ ac multiformes trans-
 mutationes, maxime delectant. Coci obsonia hominibus
 parant, omnis generis diuersa commiscentes, ex iisdem non
 eadem, ad hominum cibum ac potum. Quod si omnia simi-
 lia facerent, non haberent delectationem, & si in eodem et-
 iam omnia construerent, non utique recte haberent. Pulsan-
 tur toni in musica partim superne, partim inferne. Lingua
 musicam imitatur, cognoscens quidem dulcedinem & acoré
 eorum quæ allabuntur, itemq; dissonantia. pulsat autem so-
 nos superne ac inferne, & neque ea quæ superne pulsantur,
 si inferne pulsantur recte habent, neque quæ inferne, si su-
 perne. Quum autem lingua probe fuerit attemperata, sym-
 phonix delectatio contingit. Si vero discors fuerit ac incô-
 grua, molestia. Pellium tinctiores tendunt, terunt, pectinant,
 lauant. Eadem est puerorum curatio. Plicatores ac textô-
 res ducentes in orbem fila plicant, à principio in principium
 desinunt. Idem circuitus in corpore est, unde incipit, in hoc
 desinit. Aurum operantes, tundunt, lauant, molli igne li-
 quant, forti autem non conflatur, Vbi vero elaborarunt, ad
 omnia vtuntur. Homo frumentum tundit, lauat, molit, &
 vbi igne coxit, vtitur, & forti quidē igne in corpore nō con-
 flatur, verum molli ac lento. Statuarij imitationem corpo-
 ris faciunt, anima excepta, mentem autem habentia non fa-
 ciunt. ex aqua & terra humida siccantes, & sicca humectan-
 tes, ab his quæ superabundant detrahunt, & ad ea quæ defi-
 ciunt apponunt, ex minimo ad maximum augentes. Eadē
 patitur homo, augefcit à minimo ad maximum, ex superabū-
 dantibus detrahens, & deficientibus apponens, sicca hume-
 ctans & humida siccans. Figuli rotam versant, & neque re-
 trorsum, neque antrorsum procedit, sed simul in vtranque
 partem, Vniuersi hæc imitatrix circularis existit. In eadem
 autem quum iam circūfertur, omnis generis opera efficiūt,
 vt alterum altero in nulla re simile existat. Ex iisdem homi-
 nes eadem patiuntur, itemque reliqua animalia in eadem
 circumferentia omnia operantur, & ex iisdem nihil simile,
 iisdem

- A** iisdem instrumentis ex humidis sicca facientes, & ex ficcis humida. Grammatica tale quid est, figurarum compositio, *Literaria.* quæ signa ac notæ sunt humanæ vocis, facultas reuocandi in memoriam præterita, & quæ facienda sunt declarandi. Per septem figuras noticia contingit. Eadem omnia homo trahit, siue sciens literas, siue literarum rudis. Per septem figuras etiam sensus hominibus contingit. Auditus sonorum, *Sensus humani.* Visus manifestorum, Nasus odoris, Lingua voluptatis & iniuriarum, Os sermonis, Corpus tactus calidi aut frigidi, Spiritus transitus intro ac foras. Per hæc cognitio hominibus contingit. *Palæstra,* *& puerorum institutio.* Palæstra & pædotribæ tale quiddam docent. præuaricari secundum leges, iniuriam facere iuste, defraudare, furari, rapere, violare honestissima ac turpissima. Qui hæc non facit, malus, qui hæc facit, bonus est. Ostentatio multorum ac vulgi est, desipientiæ hæc esse vident, & vnum ex vniuersis bonum iudicant, reliquos vero malos. Multi mirantur, pauci cognoscunt. Homines in forum progressi eadē perpetrant, defraudant vendentes & ementes, *Hypocritæ.* Qui plurimū defraudauit in admiratione est. Bibentes & inaniētes eadem perpetrant, currunt, luctantur, pugnant, furantur, defraudant. Vnus ex omnibus præfertur. Simulatores & deceptores alia ad scientes dicūt, & alia sentiunt, iidem ereptāt, & irrepunt non iidem. Inest autem homini, alia dicere, alia facere, & eundem non esse eundem, & nunc aliam habere mentem, nunc rursus aliam. Sic quidem artes omnes cum humana natura comunicāt. *Procreatio.* Cæterum anima hominis, quem admodum etiam antea à me dictum est, ignis & aquæ temperamentum habens, partes autem hominis, irrepit in omne animal quod sanè spirat, itemque in omnem hominem, & iuniorem, & seniore. Non autem similiter in omnibus augescit, sed in iuuenibus corporibus, utpote celeri circinuatione existente, & corpore auctili, expansæ & attenuatæ partes illæ animæ, in corporis augmentum consumuatur. In senioribus autem, utpote tardo existente motu, & corpore frigido, in decrementū hominis cōsumunt. Quæcūq; autē corpora in vigore sunt, & in ætate forēda, eas nutrire & augere possunt. Potētes autē homines, ut quisq; plurimos homines alere potest, ita fortis iudicatur ac potēs, ubi vero defecerint quos alat, imbecillior censetur. Sic etiā circa singula corpora res se

HIPPOCRATIS LIBER

res se habet. Quæcunque plurimas animas nutrire possunt, D
ea fortiora sunt, ubi vero hæ discesserint, imbecilliora.

Quicquid igitur in aliud corpus ingressum fuerit, non au-
gescit. Quicquid vero in foemina, augefcit, si ea quæ ipsi cõ-
grua sunt contingant. Discriminantur autem partes & au-
gescunt simul omnes, & neque prius alteræ alteris, neque po-
terius. Verum maiores natura priores apparent minoribus,
quum non priores existant. Non autem in æquali temporis
*Conformatio mem-
brorum* spatio omnes fœtus exornantur, sed alij citius, alij tardius,
prout singuli & ignem & alimētum fuerint nacti. aliqui ita-
que in quadraginta ac tribus diebus scaturiunt ac forman-
tur, aliqui in quatuor mensibus. Similiter etiam vitales fiunt
ac gignuntur, aliqui citius, septimo mense perfecte. aliqui E
tardius, perfecte nono mense in lucem prodeunt, & osten-
dunt se temperamentum habere, quod semper habebunt. Ma-
sculi igitur & foemellæ hoc modo gignuntur, quantum eius
fieri potest. Cæterum foemellæ ab aqua magis, & à frigi-
dis ac humidis & mollibus augefcunt tum cibus, tum potibus,
itemque studiis ac exercitiis. Masculi vero magis ab igne, à
ficcis videlicet ac calidis cibus & reliqua diata. Si igitur fœ-
mellam parere velit, diata ad aquam vergente vtendum est.
Si vero masculum, exercitiis ac victu ad ignem tendente vte-
tur. Et nō solum virum hoc facere oportet, sed etiam mulie-
rem. Non enim solum quod à viro fecernitur auxiliare est, sed
*Quid in
conceptus
cupidine
agendum.* etiam quod à muliere, ob hæc sanè causam. Vtraque quidem
pars sufficientem motum non habet ad humoris multitudi-
nem, vt quod influit consumat, & propter ignis debilitatem
coagmentantur. Quum vero ambe in idem coinciderint, mu-
tuo inter se incurrunt & obuoluuntur, ignis ad ignem, & a-
qua similiter. Siquidem igitur in sicco loco circunuoluitur
ignis, coillapsum aquam superat, & ab hoc ignis augefcit, ne
ab illabente vnda extinguatur, aliumque accedentem susci-
piat ac sibi consociet. Si vero in humorem inciderit, statim
ab initio extinguitur ab illabente vnda, & in minorem or-
dinem dissoluitur. In vna autem die vniuscuiusque mensis,
consociare ac superare ea quæ accedunt potest, & hoc si co-
inciderint ab vtrisque in vnum locum. Consistere autē pos-
sunt inter se & foemella & masculus, propterea quod anima
*Procrea-
tio diuer-
sa.* quidem idem est in omnibus animatis. Corpus autem vniuf-
cuiusque

A cuiusque differt. Anima quidem igitur semper similis, & in maiore, & in minore. Non enim alteratur neque per naturā, neque per necessitatem. Corpus autem nunquam idem in ullo aliquo est, neque secundum naturam, neque ex necessitate, propterea quod partim secernatur in omnia, partim permisceatur ad omnia. Si quidem igitur mascula corpora ab utrisque secreta fuerint, augescunt pro re præsenti, & fiunt hi viri animis splendidi, & corpore fortes, si non à diæta postea detrimentum sentiant. Si vero à viro quidem masculum secernatur, à muliere vero foemineum, & superauerit si ita contingat masculum, (Genitura enim ammiscetur ad fortiorem aut debiliorem, Non enim habet ex præsentibus aliquid ad quod familiarius secedere possit. Suscipit enim parua maiorem, & maior minorem. In commune autem super hæc quæ ad sunt dominium exercent) corpus sanè masculum augetur, foemineum vero minuitur, & in aliam sortem secernitur. Et hi quidem minus prioribus splendidi fiunt, tamen quia masculum à viro superauit, viriles euadunt, & hoc nomen merito habent. Si vero à muliere quidem masculum secretum fuerit, à viro autem muliebri, superauerit autem masculum, augetur eodem modo sicut prius, foemineum vero minuitur. Et fiunt hi Androgyni, id est viri effœminati, atque sic recte appellatur. Tres quidem igitur hæ sunt generationes hominū, differentes in eo quod magis aut minus tales sint, propter partium aquæ temperamentum, & alimenta, & institutiones, ac cōsuetudines. declarabo autem in progressu sermonis etiam de his. Ceterum foemella eodem modo gignitur. Si enim ab utrisque foemineum secretum fuerit, foeminosissimæ ac ingeniosissimæ fient. Si vero à muliere quidem foemineū, à viro autem masculum, superauerit autem foemineum, audaciores quidem prioribus fient, veruntamen ornatae ac moderatae etiam ipsæ. Si vero à viro quidem foemineum, à muliere vero masculum secretum fuerit, & foemineū superauerit, augetur eodem modo, & fiunt hæ audaciores adhuc prioribus, & viriles ac viragines nominantur. Si autem quis nō credat animam animæ admisceri, demens est. Si quis enim carbones ardentes ad ardentes adiiciat, fortes ad debiles, & alimentum ipsis præbuerit, simile corpus omnes exhibebunt, & alter præ altero non cognoscitur, sed in qualicumque corpore ignē

*Clarus vir
quando gignatur.*

*Semina
res.*

*Fœmelle
procreatio.*

*Similitudo
animæ.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Gemellorum pro-
creatio.*

Cur similes.

*Superfec-
tationes
quò fiant.*

*Qui san-
duntius
perseuer-
rent.*

pore ignem susceperint, tale in omnibus erit. Vbi vero præ-
tens alimentum consumpserint, secernuntur ac obscurantur. D
Idē hoc anima hominis patitur. At vero quomodo gemi-
ni nascatur, hoc sermone declarabo. Equidem natura vtero-
rum in foeminis ut plurimum in causa est. Si enim similiter
in vtrāque partem iuxta osculum dispositi à natura fuerint,
& similiter hauerint, & à purgatione siccātur, alere possunt,
si semen viri cōceperint ita ut statim discindatur. Sic enī ne-
cesse est dispergi in vtrunque vterum similiter. Siquidē igi-
tur multum semen ab vtriusq; & forte secretū fuerit, in vtriusq;
locis augeri potest, dominium enim habet in alimentū quod
accedit. Si vero aliter contingat, gemini nō fiunt. Quū itaq;
masculum ab vtriusq; secretum fuerit, necessariū est in vtriusq; E
masculos gigni, quum vero foemineum ab vtriusque, foemellæ
fiunt, quum autem alterum foemineum, alterum masculū fue-
rit, vtrū altero præualefcet, id ipsum augefcet pro ea ratione.

Similes porro inter se fiunt gemelli, ob hanc causam. Pri-
mum quidem q̃ æquales sunt loci in quibus augefcunt. De-
inde q̃ simul secreti sunt. Postea quòd iisdem alimentis au-
gefcunt, vitalesq; in lucem prodeunt. Caterum superfæ-
tationes hoc modo fiunt. Quum vteri calidi & sicci natu-
ra fuerint, ipsaq; mulier eiusmodi, & semen calidum ac siccū
illapsum fuerit, non fit amplius villa aliqua humiditas in vte-
ris, quæ semen superillabens contineat. Quapropter consistit
ab initio ac vivit, perseverare autē non potest, sed etiam id F
quod iam adest insuper corrumpit, quia non eadem vtriusq;
conferunt. Etenim quod tenuissimū est in aqua, & quod ra-
rissimum in igne, si in hominis corpore temperamentū ac-
ceperint, sanissimum habitum constituunt. Propterea quod
neq; in temporū anni maximis mutationibus, neq; in regio-
num permutationib⁹, neq; in ciborum ac potuum alterationi-
bus, aqua densissima euadit in aquæ impetuosis incurfib⁹,
neq; ignis in ignis impetu. Possunt enī ambo & generationē
& satietatem plurimam suscipere. Aes molissimum ac ra-
rissimum, plurimum temperamentum suscipit, ac optimū eua-
dit. Eodem modo etiā quod tenuissimū est in aqua, ac rarif-
simū in igne, vbi temperamētum acceperint. Qui igitur hāc
naturam habēt, sapi perseverant omni tempore vsq; ad qua-
dragesimum annū, aliqui vero etiam vsq; ad extremam sene-
ctutem

A Autem. Qui vero à quadragesimo anno, à morbo aliquo correpti fuerint, nunquā ferme euadunt. Quęcunq; autē corpora ignis fortissimi, & aquę densissimę temperamentū acceperint, fortia & robusta fiunt, verū multa custodia opus habent. Magnas enim transmutationes in vtrāq; partē habēt, & in aquę incurfibus in morbos incidunt, & in ignis cōsimiliter. Qui igitur eiusmodi naturam habet, cum victu vti cōducibile est temporibus anni contrario. Et aquę quidem incurfu cōtingente, vti oportebit eū ab his quę ab aqua sunt, paulatim pro temporum ratione discedendo. Porro vbi aque crassissimę & ignis tenuissimi in corpore mixtura facta est, talia contingunt, ex quibus frigidam & humidā naturam cognoscere oportet. Talia enim corpora in hyeme morbosiora sunt, quā in æstate, & in vere q̄ in autumno. Cæterum

quod ad ætates attinet, Sanissimi ex talibus pueri sunt. Deinde adolescentes. Morbosissimi autem senes, & his vicini. & hæ naturę cito senescunt. Talibus in victu cōferunt quę cal-

*Que etas
sana uel
contra.*

faciunt ac siccant, tum in cibis, tum in exercitiis, & externas corporis partes magis q̄ internas exercere cōducit. Si vero humidissimū in igne, & densissimum in aqua, in corpore mixturam acceperint, ex his humidā ac calidam naturā cognoscere oportet. Laborant quidē ex morbis huiusmodi maxime in vere, minime in autumno, quia in vere excessus est humiditatis, in autumno vero symmetria & moderatio siccitatis. Ex ætatib. vero morbosissimę sunt iuniores. Corpora autem cito augefcunt, & tales distillationibus obnoxij sunt.

C His conducit exhibere quęcunq; siccant ac frigefaciūt, & in cibo, & in potu ac laboribus. Verum labores intra corpus his facere maxime confert. Si vero mixturam acceperint fortissimum in igne, & tenuissimū in aqua, sicca & calida est natura, & talibus morbus in ignis accessionibus contingit, sanitas vero in aquę. Et in ætatibus vigentibus ad carnis bonam habitudinē, morbosissimi sunt, sanissimi autem senes. Ita etiā vtrīq; proximi. Diætę quę frigefaciunt ac humectant, & ex laboribus qui minime excalfaciunt ac colliquant, plurimam frigiditatem exhibebunt. Huiusmodi naturę viuacissimę ac sanissimę existunt. Si autē mixturam acceperint corpora ignis rarissimi, & aquę siccissimę, sicca & frigida talis natura est, morbofa quidē in autumno, sana vero in vere, & vicinis

*Que cuiq;
ætatī consueuiant.*

*Naturarū
cognitio.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

tēporibus. Similiter ætates ad annos quadraginta morboſæ, D
pueri ſaniſſimi, Ita & vtriſq; proximi. Diætæ his conferunt
quæ calidæ exiſtentes humectât, & labores ſenſim adhibiti
leniter calfacientes, & nō multum ab his quæ adſunt auferē-
tes. De naturæ igitur cognitione ſic à prima cōſtitutione co-
gnoſcere oportet. Caterum ætates ipſæ ad ſeipſas hoc mo-

*Cognitio
ætatum.*

do habent. Puer itaq; ex calidis & humidis temperat⁹ eſt,
quia ex his cōſtitutus eſt, & in his augmentū accepit. Humi-
diſſima igitur & calidiſſima ſunt corpora proxima genera-
tioni, & augeſcunt q̄ plurimum, & quæ his proxima ſunt eo-
dem modo. Adoleſcēs autem calidus quidē eſt, quia ignis
impetus aquæ dominatur. Siccus autem, quia humidū ex pue-
ro cōſumptum eſt, partim in augmentum corporis, partim in E
motum ignis, partim præ laboribus ac exercitiis. Vir quū ſte-
terit iam corpus, ſiccus eſt & frigidus, quia caliditatis impe-
tus nō amplius dominatur, ſed ſtat corpus ab augmēto quie-
ſcens, ac perfrigeratum. Verum ex adoleſcenti ætate ſiccitas
ineſt. Ab inſequenti autem ætate & aquæ accēſſu, humidita-
tem nō habet. quapropter ex ſiccis & frigidis exuperatus eſt.

*Quō inter
ſe æta-
tes diſſe-
rant.*

*Cur ma-
res fœmi-
nis calidi-
ores ſint.*

Senes autem frigidi ſunt & humidi, Quia ignis quidē re-
ceſſus contigit, aquæ autē accēſſus, & ſiccorum quidē ſubla-
tio, humidorum autem ſtatus. Ex omnibus autem maſculi
calidiores ſunt & ſicciores, fœminæ vero humidiores ac fri-
gidiores. Propterea q̄ ab initio vtriq; in talibus geniti ſunt,
& à talibus augeſcunt. Vbi vero in lucem editi ſunt maſculi,
victu ac diætā laborioſiore vtuntur, vt excaleſcant ac reſic-
centur. Fœminæ vero humidioribus ac pigrioribus diætis v-
tuntur, & caliditatis purgationem ex corpore ſingulis men-
ſibus faciunt. Porro de animæ ſapientia ac deſipiētia, hoc

*Prudentia
qui præ-
ſtent.*

modo ſe res habet. Quod humidiffimū eſt in igne, & ſic-
ciſſimū in aqua, ſi in corpore temperamentum acceperint, ſa-
pientiſſima ſunt. Quia ignis quidem habet humiditatem ab
aqua, aqua autem ſiccitatē ab igne. vterq; autem ſic ſufficiē-
tiſſimus eſt. Neq; ignis alimēti indigentior multū procedit,
neque aqua motus indiga multum levis redditur. Sic itaque
vtraque & per ſe ſufficientiſſima ſunt, & inter ſe permixta.
Quod enim minime vicinis indiget, hoc maxime præſenti-
bus obtemperat, velut ignis qui minime mouetur, non præ
neceſſitate: & aqua quæ maxime, nō præ violētia. Ex his aut
anima

Qui pru-

A anima temperata, sapientissima est, & memoria valentissima prædita. Si vero aliquo ascitamento vtens, alterutrum horum augeat aut contabescat, desipientissima redditur, propterea quod quum sic habeant sufficientissima existunt. Si autem ignis sincerissimi, itemq; aquæ temperamentum anima fortiatur, sit autem ignis paulo inferior ac defectuosior q̄ aqua, sapientes quidem sunt etiam hi, verum defectuosiores q̄ in priore temperamento: propterea quod ignis ab aqua superatus, & tardior motum faciens, segnius sensibus allabatur. constantes autem cum mansuetudine sunt eiusmodi animæ, ad quancunq; tandem rem animum applicuerint. Si vero recto victu vtantur, & sapientiores & acutiores præter naturam fieri queant. Talibus confert victu vti ad ignem magis tendente, & nō repletionibus, neque ciborum, neque potuum. Cursum itaque vtendum est velocibus, quo & corpus humore euacuetur, & humor amplius citius sistatur. Lucis autem & fricationibus & eiusmodi exercitiis vti non conducit, vt ne meatus cauiore redditi repleantur. A talibus enim animæ motum grayari necesse est. Confert & deambulationibus vti, tum à cœna, tum mane, itemque à cursibus. A cœna quidem, quo alimentum siccius anima suscipiat ab ingredientibus ac ingestis. Mane vero, quo transitus humoris euacuentur, & meatus animæ non obturentur. Ab exercitiis vero, vt ne in corpore relinquatur quod secretū est à cursu, neque animæ commisceatur, neque transitus obturet, neque alimentum conturbet. Confert & vomitibus vti, quo corpus depurgetur, si quid defectuosius labores transegerunt. à vomitu autem paulatim adiiciendo cibus offerendus est, minimum ad quatuor dies. At vero vngi conducibilis est q̄ lauari. Coitu vtendum est, aquæ accessibus contingentibus, frequentiore, in ignis autem impressionibus, pauciore. Porro si in aliqua anima defectuosiore vim ignis accipiat q̄ aqua, eam tardiorē esse necesse est, & appellantur tales stolidi. Nam vt tardiore existente circuitu, sensus paulatim allabuntur, & qui acuti existunt parum commiscuntur, propter circuitus tarditatem. Sensus enim animæ qui per visum ac auditum contingunt acuti sunt, qui vero per tactum, tardiores & facilius percipiuntur. hos quidem igitur percipiunt etiam tales nihilominus, velut sunt frigida & calida ac consimilia,

o iij Quæ ve-

*dētissimus
memorias
que tenacis-
sima
præditus.*

Constāter.

*Horum vi-
tus &
exercitatio.*

*Cur his
plurimū la-
bor adū sit.*

*Diuerse
nature,
ignis &
aque tēpe-
ratura di-
uersa sūt.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

*nutricas
tus multū
facit.* Quæ vero per visum aut auditum percipere oportet, quæ nō prius sciunt, percipere non possunt. Si enim non commota fuerit anima ab igne allabente, non percipere poterit quale quid tandem sit. Tales igitur animæ non perpetiuntur hoc ob celeritatem, Si autem recta diætā vtatur, etiam talis homo melior fieri possit. Conferunt itaque huic eadem quæ priori, Verum siccioribus ac paucioribus cibis vtetur, laboribus autem pluribus & acutioribus ac velocioribus. Confert & fomentis vti, & vomitibus à fomentis, & exhibitionibus ciborum à vomitibus ex longiori tempore, si defectuosius contigerint vomitus. Et sanè hæc faciens, sanior ac sapientior fuerit. Si vero amplius adhuc superetur ignis à præsentī aqua, hos iam alij desipientes, alij attonitos siue stupidos appellant. Et hæc insanix quædam species tardior existit. hi plorant nemine molestante aut verberante, formidantque non formidanda, & tristantur in rebus nihil ad se pertinentibus, & sentiunt ea quæ nō conueniunt sapientibus. Confert itaque his fomentis vti, & à fomētis veratris expurgari, ac diætā vti quam prius dixi, indigetque talis homo attenuatōe pulmonis ac siccitate. Si autem aqua defectuosiore vim accipiat quàm ignis, quum alias sincerum temperamentum habeant, sani sunt homines corporibus, & sapientes. Talis autem anima cito percipit allabentia, & non sæpe ab vna re ad aliam transit. Natura quidem igitur talis, animæ bonæ est. Melior autem reddetur rectæ diætæ vsu, & peior prauæ. Confert huic, diætæ vsus ad aquam magis vergentis, ita vt excessus vitet & ciborum, & potuum, & laborum. Vtetur & cursibus curuis & rectis reuertentibus, luctisquæ ac reliquis exercitiis, ita vt in nullo excessum faciat. Si enim sanum fuerit corpus, & non ab aliquo alio perturbetur, animi temperamentum sapiens existit. Si vero amplius aquæ vis ab igne superetur, tali homini necesse est tanto acutiorem animam esse, quanto citius mouetur, & ad sensus citius allabi, verum minus constantem priore, propterea quod iudicat ea quæ obueniunt, & in pulmonem procedit ob celeritatem.

*Attoniti
sue stu-
pidi.
Tardus
furor.* Conferunt tali homini diætā vti magis ad aquam vergente, quàm priori, & maza magis quàm pane, & piscibus magis quàm carnibus, & potu aquosiore, & Venere rarius vtetur, & laboribus qui sunt maxime secundum naturam quàm

*Nature
huius nu-
tricatus.*

*Diuerse
nature &
nutricatio.*

- A** quàm plurimis, violentis autem vti non est necesse. Vtetur & vomitibus paucioribus ex repletionibus, quo corpus quidem euacuetur, quàm minime vero caleſcat, Conducit etiam talibus ad ſapientiam, vt minime carnoſi ſint, Nam ad carnis bonam habitudinem, ardoris inflammationem fieri necesse est. Quum autem tale quid huiusmodi anima per-
petitur, ad inſaniam adigitur, ex ſuperata aqua adaſta. Tali-
bus confert actiones obire ac tranſigere à cibo accepto ma-
gis quàm ieiunis. Stabilior enim redditur anima alimēto cō-
modo ammixto, quàm alimenti indiga. Si vero adhuc am-
plius ſuperetur aqua ab igne, talis anima valde acuta eſt, &
tales necesse eſt ſomnia videre, vocant autem ipſos ſubfurio-
ſos. Nam res valde propinqua inſaniæ eſt, Etenim à breui &
B incōmoda inſlāmatione inſaniunt, & in ebrietatibus, & car-
nis bona habitudine, & præ carniū eſu. Verum talem oportet ab his omnib. abſtinere, itemque à reliqua repletionē, ac
exercitiis violentis. In viſu vtendum eſt Maza vino dulci
non ſubaſta, & oleis coctis, ſed non purgantibus, & piſci-
culis ex muria, & aquam bibere præſtantiffimum eſt, ſi fieri
poſſit, ſin minus, vinum molle & album quod aquæ ſit proxi-
mum. Deambulationibus quoque multis mane vtendum, à
cœna vero ſatis eſt exſurgere, quo cibi quidem non reſiccen-
tur à deambulationibus poſt cœnam, corpus autem euacue-
tur à matutinis. Lauare autem magis conducit aqua tepi-
da circumaffuſa, quàm vngi. Confert & in æſtate interdium
ſomno vti breui non multo, vt ne corpus ab anni tempore
reſiccetur. Conueniens eſt etiam verè veratris purgare, fo-
mentis antea præparatos, deinde ſenſim ad diætā inducere,
& neque hunc ieiunum actiones obire oportet. Et ex
hac ſanè cura, huiusmodi anima ſapientiffima fuerit. Sa-
pientis quidē igitur ac deſipientis animæ hoc temperamen-
tum cauſſa eſt, quemadmodum à me ſcriptum eſt, poteſtque
ex diætā & melior, & deterior fieri. Cæterum curſus im-
petu igne præualeſcente, impoſſibile forte fuerit aquæ ali-
quid apponere, Similiterq; aqua præualeſcente in temperamē-
to, ignem augere. Ex his vero & ſapientiores & deſipientio-
res animæ fiunt. At vero talium nō amplius temperamentum
eſt, qualis eſt, Iracūduſ, Segniſ, Dolofuſ, Simplex, Infeſtuſ, Be-
neuoluſ. Taliū omnium natura meatuum per quos anima

Quam u-
ria hæc
natura à
cæteris.

Qui nutri-
catus.

Quæ nul-
la cura nu-
tentur.

HIPPOCRATIS LIBER II.

meat' causa est, per qualia enim vasa secedit, & ad qualia al- **D**
labitur, & qualibus ammiscetur, talia sapiunt. Ob id itaque
impossibile est talia ex diæta trāsmutare. Naturam enim ob-
scuram transformare non est possibile. Similiter autem &
voci qualiscunque tādē fuerit, meatus spiritus causa sunt,
per qualescunque enim aer mouetur, & ad qualescunq; alla-
bitur, talem necesse est esse vocem: & hanc quidem tum de-
teriorē, tum meliorem facere possibile est, quia leuiorē ac
breuiorē meatus spiritus facere possibile est. Verum illa ex
diæta alterare impossibile existit.

HIPPOCRATIS COI **E**

DE DIAETA SIVE VICTVS

ratione, Liber II. Iano Cor-

nario medico physico

interprete.

*Regionū
qualitas.*



Egionum singularum situm & na-
turam hoc modo cognoscere opor-
tet. Et in summa res hoc modo se
habet. Regio ad meridiem sita
calidior est, & siccior, quā ea quæ **F**
ad septentriones iacet, propterea
quod soli propinquior est. Et in
his regionibus necesse est & ho-
minum genera, & nascentia ex ter-
ra, sicciora ac calidiora & fortiora

Loca alta.

esse, quā in contrariis. velut Libyca gens ad ponticam, & v-
triusque vicinar. Ipsa autem loca iuxta seipsa hoc modo ha-
bent. Alta & squallida & ad meridiē sita, sicciora sūt quā
cāpestria & æqualiter sita, propterea quod pauciores humo-
res habent, Illa enim stationem pro aqua pluuiā non habent,
hæc habent. At vero lacustria ac palustria humectant & cal-
faciunt. Et calfaciunt quidem quia caua sunt & circūdāta, &
non persflantur. humectāt autem, quia nascentia ex terra qui-
bus ho-

A bus homines aluntur, humidiora sunt, & spiritus quem attrahimus crassior est, propter aquæ stationem ac immobilitatem. Verum caua loca & non aquosa, siccant & calfaciunt. Et calfaciunt quidem quia caua sunt & circumdantur. Siccant autem, tum propter alimenti siccitatem, tum quod spiritus quem inspiramus siccus existens, humorem ex corporibus trahit in alimentum sibiipsi, quum non habeat alium humorem ad quem allapsus nutriatur. Vbi autem regionibus montes adiacent ad austrum, in his squallidi austri & morbosi afflant. Vbi autem ab Aquilone montes adiacent, in his aquilones perturbant ac morbos faciunt. Vbi vero ab Aquilone caua loca urbibus adiacent, ab æstiuis ven-

B tis calida & morbosæ hæc regio existit, propterea quod neque aquilo persflans puram spiritus inductionem exhibet, neque ab æstiuis ventis perfrigeratur. Caterum insulæ *Qualitas insulari.*

propinquæ continenti tempestuosiores sunt & ægre in ipsis hybernamus. Marina vero hyeme tepidiores sunt, propterea quod niues & glacies in continenti stationes habent, & ventos frigidos in vicinas insulas mittunt. Verum insulæ intra pelagus positæ non habent in hyeme niuium stationem. Porro de ventis quam naturam ac facultatem singuli habent, hoc modo cognoscere oportet. Naturam qui-

Ventorū natura.

C dem habent omnes venti humectandi ac frigefaciendi, tum animalium corpora, tum nascentia ex terra, ob hanc causam. Necesse est omnes ventos spirare à niue, à glacie, & gelu vehementi, & fluminibus, & stagnis, terraque humectæ ac perfrigeratæ. Et fortiores quidem ventos, à maioribus & fortioribus, debiliores vero à minoribus & debilioribus.

Quemadmodum enim animalibus spiritus inest, Sic etiam aliis omnibus, aliis quidem minor, aliis vero iuxta magnitudinem. Naturam quidem igitur habent humectandi ac frigefaciendi omnes venti, Verum propter situm regionum ac locorum, per quæ venti ad singulas regiones accedunt, diuersi inter se sunt, frigidiores, calidiores, humidiores, sicciores, morbosiores, salubriores, Singulorum autem causam sic cognoscere oportet. Boreas siue aquilo frigidus spirat ac humidus, quia progreditur à talibus regionibus, meatque per tales locos, ad quos non accedit sol ipse, neque aerem resiccans, humorem ebibit ac exhaurit, Quare ad terram

Septentria.

HIPPOCRATIS LIBER II.

ad terram habitabilem accedit suam ipsius vim habens, ubi D
non per regionis situm corrumpitur. & his quidem qui pro-
xime habitant frigidissimus est, qui vero remotissime, mini-
me. *Auster.* Auster autem à similibus aquiloni natura regionibus
spirat. Ab Australi enim polo spirans, & à niue multa gla-
cieque ac gelu fortibus procedens, necessario his qui prope
ipsum illic habitant talis spirat, qualis nobis est Aquilo.
Verum omnem non item similis accedit regionem. Nam
quum per solis iter & in meridiem spiret, humiditas ipsius
à sole ebibitur, & resiccatus rarefcit. quapropter necesse
est ipsum calidum ac siccum huc accedere. In proximis igitur
regionibus necesse est ipsum talem vim calidam ac sic-
cam exercere. & hoc sanè in Libya facit, Nam & terræ na-
scentia exarescunt, & homines latenter resiccant, Quum e- E
nim non habeat nec mare, nec fluuium vnde humiditatem
accipiat, ex animantibus ac plantis humorem exhaurit. Vbi
Qualis sit
auster. vero pelagus transit, tanquam calidus & rarus existens, mul-
ta humiditate regionem in quam illabitur implet, & neces-
se est ipsum calidum ac humidum esse, ubi non regionum si-
tus alterius qualitatibus causa existat. Eodem modo etiam
aliorum ventorum facultates se habent. Cæterum iuxta
Qui venti
boni sint. singulas regiones venti hoc modo se habent. Venti ex ma-
ri in regiones illabentes, sicciores quodammodo sunt. Qui
vero à niue aut glacie, aut stagnis aut fluminibus procedunt,
omnes humectant ac frigefaciunt, tum plantas, tum animã-
tia, & sanitatem corporibus exhibent qui non frigiditate su-
perexcellunt. Hi enim lædunt, propterea quod magnas muta- F
tiones calidi ac frigidi in corporibus inducunt. Hæc au-
tem perpetiuntur hi qui in regionibus habitant palustribus
ac calidis, prope flumina magna. Reliqui vero venti qui à
Loca non
sana. prædictis spirant vtilis sunt, tum aerem purum ac sincerum ex-
hibentes, tum animæ calori humiditatem præbentes. Quicun-
Cur medi-
terranei
venti sicci. que vero venti ex terra accedunt, eos necesse est sicciores es-
se, tum à sole, tum à terra resiccatos. Quum autem nō ha-
beant venti vnde alimentum trahant, à viuētibus humorem
trahentes, & plantas & animalia omnia lædunt. Et qui-
Mantani
venti. cunque venti relictis montibus ad vrbes accedunt, non so-
lum siccant, sed etiam turbant spiritum quem inspiramus, &
corpora hominum morbosa faciunt. Naturam quidem igitur

Atque vim singulorum sic cognoscere oportet. Quomodo autem ad singulos se preparare oporteat, in sermonis progressu declarabo. At vero ciborum ac potuum singulorum vim, tum eam quæ secundum naturam est, tum eam quæ per artem accessit, hoc modo cognoscere oportet. Quicunque igitur in summa dicere aggressi sunt, aut de dulcium, aut pinguium, aut salforum, aut alterius cuiusdam consimilis facultate, non recte iudicant. Non enim eandem vim habent, neque dulcia inter se, neque amara, neque vlla aliqua eiusmodi. Multa enim ex talibus sunt quæ & aluum emolliunt, & fistunt, siccantque & humectant, Similiter autem etiam in reliquis omnibus. Sunt & quæ adstringunt, itemque aluum moueat, & urinam cient. Sunt quæ neutrum horum faciunt. Similiter & ex calfacientibus ac reliquis omnibus, alia aliam facultatem habent. De omnibus quidem igitur impossibile est qualia nam sint declarare, Verum quam vim singulatim habeat, docebo. Ordeum natura quidem frigidum est & siccum. Inest & purgatorium quiddam à succo palearum. Eius signum habebis si voles ordeum non purgatum coquere, Purgat enim is succus fortiter, Si vero decorticatū coxeris, perfrigerabit magis ac aluum fistet. Quum autem tostum fuerit, humor quidem purgatorius præ igne perit. Frigiditas autem & siccitas relinquitur. Quæcunque vero perfrigerare ac siccare oportet, id ipsum polentæ transfigunt. Maza omnis generis sic vtimur, facultatem autem habet maza hæc talem.

C farina ex toto collatæ alimentum quidem minus habent, verum magis per aluum secedunt. Puræ autem magis nutriunt, minus vero per aluum secedunt. Maza prius subacta, respersa, vino dulci non emollita, leuem facit, & per aluum secedit, ac frigefacit. Et frigefacit quidem, quia frigida aqua madefacta est, per aluum autem secedit, quia cito concoquitur. leuem vero facit, quia multum alimenti cum flatu foras excernitur. Quum enim transitus alimenti angustiores sint, aliud insuper accedens non suscipiunt, & quod quidem cum flatu attenuatum est, foras excernitur, quod vero intus manet, flatum inducit, & partim superne eructatur, partim inferne secedit. Multum itaque alimenti à corpore diffatur. Si vero velis mazam statim vt subacta est exhibere, talis rescicatoria est. Quum enim polenta sicca existat, & aqua sit madefacta

*Quæ non
ritè prio-
res diges-
sere.*

Ordeum

Maza

HIPPOCRATIS LIBER II.

madefacta, atque sic præparata in ventrem illabatur, humorem ex ipso trahit calidum existentem. Solet enim calidum attrahere frigidum, & rursus frigidum calidum. Consumpto autem humore ex ventre necesse est ficcari. Aqua vero quæ vnà cum maza ingressa est, frigefacit. Quæcunq; igitur siccare oportet aut frigefacere, aut vëtris profluuiò diffusum, aut alia quapiã eiusmodi caliditate, maza efficax existit. At vero sicca, vino dulci emollita ac trita maza, siccatur quidem non similiter, propterea quòd vehementer est adstricta, alimentum vero plurimum corpori præbet, Nam vt leniter liquefcentis alimentum transitus suscipiunt. Per aluum quidem igitur tarde secedit, flatum autem non inducit, neque eructatur. Quæ vero & aqua, & vino dulci emollita ac prius subacta est, nutrit quidem minus, per aluum autem secedit, & flatum magis inducit. *Cyceon* autem solum in aqua quidem frigefacit ac nutrit, in vino vero calfacit ac nutrit, & aluum sistit. In melle autem calfacit quidem minus ac nutrit, per aluum vero magis secedit, si non meracum mel fuerit; sin minus, nõ secedit, sed aluum sistit. In lacte vero bene alunt omnes *Cyceones*, hoc est farina. Veruntamẽ ouillum aluum sistit, caprinum vero magis per aluum secedit. Bubulum vero minus. Equinum autem & aspinum magis secedunt. *Triticum* fortius est ordeo & magis nutrit, minus autẽ per aluum secedit, tum ipsum, tum succus. Panis autem ex tota farina collata, siccatur & per aluum secedit. Purus autem magis nutrit, minus vero secedit. Ex ipsis porrò panibus, fermentatus quidem leuius est & secedit. Et leuis quidem est, quia à fermenti acore humiditas consumpta est, quæ sanẽ alimentum existit, secedit autẽ, quia cito concoquitur. Non fermentatus secedit quidem minus, nutrit autem magis. Qui succo subactus est, leuior est, & multum nutrit, ac per aluum secedit. Nutrit, quia purus est, leuis est, quia leuissimo subactus est, & fermentatus ac tostus ab eodem est, per aluum secedit, quia passus, & aluum mouente tritici parte, permixtus est. Ex ipsis autem panibus maximi maxime alunt, propterea quod minime exuritur humiditas ab igne. Ex furnacei panes magis alunt quàm focarij & veruarij, propterea quod minus exuruntur ab igne. Clibano autem cocti & subcinericij siccissimi sunt, hi quidem propter cinerem, illi vero per testam humore priuati.

Similaginei

- A** Similaginei omnium horum fortissimi sunt, Et adhuc magis qui ex alica fiunt, valdeque nutriunt, verum non similiter secedunt. Farina pura in aqua pota frigefacit, & lotura pollinis tritici. Furfurum succus coctus, levis, per aluum secedit, *Farina.*
- Verum farinæ in lacte datæ magis per aluum secedunt, quàm in aqua, propter serum, & maxime inter aluum mouentia numerantur. Quæcunque vero farinæ cū melle & oleo coquantur, aut assantur, omnes æstuosæ sunt, & ructum cient. Et ructum quidem cient, quia probe alentes non secedunt. Aestuosæ autem sunt, quia pingua, & dulcia, & inter se concordia, non eadem coctura indigentia, in eodem sunt. Similago & alica cocta, fortia sunt & alunt, nō tamen per aluū *Similago.*
- B** secedunt. Trygis, id est, Tragus siue olyra, leuior est tritico, & quæ ex ipsa fiunt similiter vt ea quæ ex tritico paratur, & magis per aluum secedunt. Avena comesta humectat ac perfrigerat, itemque in sorbitione accepta. Polentæ ac farinæ recentes sicciore sunt vetustis, quia igni & præparationi propinquiore existit. Vbi vero vetustæ sunt, calor exhalat, & frigiditas inducitur. Panes calidi siccant, frigidi minus, *Trygis.*
Avena.
Polētæ recentes.
- gracilitatem autem quandam inducunt. Fabæ alunt, aluum sistunt, & inflant. Inflant, quia meatus aliud insuper accedens alimentum non suscipiunt. Aluum sistunt, quia totam alimentum fecem habent. Pisæ inflant quidem minus, per aluū autem magis secedunt. Ochri siue eruiliæ, & dolichi siue phasoli ac siliquæ, his magis per aluum secedunt, minus inflant, & probe alunt. *Panes calidi.*
Fabæ.
- C** Cicer album per aluum secedit, & per vrinam eiicitur, & alit. Et alit quidē, carnosum in ipso. Per vrinam vero eiicitur, dulce, per aluum autem secedit, sanguinosum. Milij grana ac paleæ siccant, & ventrem sistunt, & cum ficubus, fortibus doloribus conferunt. Ipsum autem Milium coctum alit, non tamen aluo secedit. Lentæ æstuosæ sunt & turbatiuæ, & neque per aluum secedunt, neque ipsam sistunt. Eruium aluum sistit, & robustum est, & crassifacit, & explet, & boni coloris hominē facit. Lini semen comestum aluum sistit. habet & quiddam frigefactoriū. Hormini semen consimilia lini semini facit. Lupini natura robusti sunt & calidi, verū per præparationē leuiore ac frigidiores sunt, & aluo secedunt. Irio humectat & aluo secedit. Cucumeris semen per lotium magis abire quàm secessum. *Pisum.*
Ochri.
Cicer.
Milium.
Lens.
Eruium.
Linum.
Horminē.
Lupinum.
Irio.
Cucumis.
- Explet

HIPPOCRATIS LIBER II.

Explet autem & crassescit. Et secedit quidem per aluum, pro- D
pter paleam externam, explet autē & crassescit, propter car-

Cnicus.

Papauer.

nem. Lotum vero secedit quidem verum minus, crassescit au-
tem & explet magis. humectat autem & vrit, propter pingue
& oleosum. Cnicus aluum mouet. Papauer aluum sistit,
magis autem nigrum hoc facit, sed & album idem agit, alit
autem & robustū est. Horum porro omnium succi carnis
aluum mouet. oportet itaq; in præparatione id obseruare, vt
que siccare velis, ab his succos detrahas, & carne vtaris. Quæ
vero aluum mouere velis, vt succo copiosiore, carne vero pau-
ciore & succulentiore vtaris. Caterum de animalibus que

**Carnis cuius
que ani-
malis.**

in ciborū vsum veniunt, sic cognoscere oportet. Carnes Bu-
bulæ robustæ sunt, & aluum sistunt, & ægrè in ventre conco-
quuntur, propterea quod crassi ac multi sanguinis est hoc ani-
mal, & carnes graues, itemque sanguis, ac lac. Quorum au-
tem animalium lac tenue est, & sanguis similiter, eorum etiā
carnes consimiles sunt. Caprinæ carnes his leuiiores sunt,
& magis aluo secedunt. Suillæ robur quidem magis quàm
hæ corpori inducunt. multum autem aluo secedūt, propterea
quod tenues & modici sanguinis venas fues habent, carnem
verò multam. Agninæ leuiiores sunt ouillis, & hedinæ ca-
prinis, quia exanguiiores sunt & humidiores. Quum enim sic-
ca & robusta natura sint animalia, dum quidem teneræ sunt,
aluo secedunt, vbi vero augmentum sumpserint, nō similiter.
Et vitulinæ carnes eodem modo se ad bubulas habent. Ve-
rum porcinae suilis grauiiores sunt. Quum enim animal sit na-
tura carnosum & exangue, humiditatis excessum in tenella
ætate habet. Quum igitur meatus superaccedens alimentum
non suscipiant, intus manens calfacit ac perturbat ventrem.
Asininæ carnes aluo secedūt, & pullorū adhuc magis. Equi-
næ leuiiores sunt. Caninæ calfaciunt ac siccant & robur indu-
cunt, non tamen aluo secedunt, catulinæ vero humectant &
secedunt. Suis siluestris caro siccatur & robur exhibet, ac se-
cedit. Cerui siccatur, minus autem secedit, magisque vrinam
prolicat. Leporinæ siccae sunt & aluum sistunt, vrinæ autem
citamentum quoddam faciunt. Vulpinæ humidiores sunt
& vrinam cient, Et erinaceorum terrestrium carnes humidi-
ores sunt ac vrinā cient. Porro de volucrum generibus sic
res se habet. Omnia ferme volucrum genera ficiora sunt
quàm

A quàm quadrupedia. Quæcunque enim vesicam non habent, neque mingunt, neque sputum aut saliuam fundunt, omnino sicca sunt. Propter caliditatem enim ventris, humiditas ex corpore consumitur in alimentum caliditatis, quare neque mingunt, neque sputum aut saliuam fundunt. Cui autem tales humiditates non insunt, id ipsum necessario siccat, Siccissima igitur caro est palumbis, deinde columbæ. tertio loco perdicis, ac galli, & turturis. humidissima vero anseris. Seminileges autem volucres prædictis sicciores sunt. Verum anatis carnes, & reliquarum auicularum quæ in paludib⁹ degunt, aut in aquis, omnes humidæ sunt. At vero ex piscibus siccissimi sunt hi, scorpius, draco, callionymus, cuculus,

Pisces.

B glaucus, perca, thrissa. Leues autem sunt petrosi ferme omnes, velut turdus, phuca, elephetis, gobio. Tales autem & prædicti itidem, leuiiores sunt erronibus, Nam hi vt quiescentes raram ac leuem carnem habent, Errones autem & vndas verberantes laboribus fracti, solidiorem carnem habent. Torpedines autem & squatinæ ac Rhombi, & huiusmodi, sunt leuiiores. Quicunque vero pisces in lutosi & aquosi locis alimenta habent, velut capitones, mugiles, anguillæ, & reliqui eiusmodi, grauiiores sunt, propterea quod ab aqua & luto, & in his nascentibus, alimenta habent, à quibus etiam spiritus in hominem ingrediens ipsum lædit ac grauatur.

Pisces errones.

Pisces grauiiores, & contra.

C Fluuiatiles autem & palustres his adhuc grauiiores sunt. Polypi vero & sepiæ, & eiusmodi pisces, neque pisces velut videntur sunt, neque per aluum secedunt. quapropter etiam oculos comesti grauant. Inscula tamen horum aluum mouent. Caterum conchylia velut sunt pinæ, purpuræ, patellæ, buccina, ostrea, ipsa quidem sicca sunt, succi autē ipsorum aluum mouēt. Mituli vero & peccines ac tellinæ magis aluo secedunt. Vrticæ autē & chartilaginosi generis pisces, maxime humectant ac aluum mouent. Caterū Erinaceorum oua, & locustarū humor, & musculi & vrse, ac cancri, magis quidē fluuiatiles, sed & marini, aluum mouent & vrinā cient. Salsamēta siccant & attenuant, pleraq; etiā aluum leniter mouent. Ex salsamētis siccissima sunt marina, deinde fluuiatilia. Humidissima autē sunt palustria. Ex ipsis autē salsamētis pisces, perca appellati valde sicci sunt. Animalium porro cicurū ea quæ in syluis & agris pascuntur, sicciora sunt his quæ intra

Conchylia

Saliti pisces.

Animalia & carnis diuersitas.

ædes

HIPPOCRATIS LIBER II.

ædes nutriuntur, quia labore reficcantur, itemque præ sole ac frigore, & spiritu ficcior nutriuntur. Verum syluestria ficciora sunt mansuetis, & crudiura ac sylvarum materie pasta, itemque parum edacia, ficciora sunt edacibus. Et frugiuora herbiuoris ficciora sunt, Et frugiuora non frugiuoris, & paucibiliba multibilibis, & sanguine referta exanguibus ac paucum sanguinem habentibus, & quæ in vigore sunt vetustis valde ac iuuenulis, & mascula foemineis, & castrata non castratis, & nigra albis, & hirta nudis. Contraria vero his humidiora sunt. Ex ipsis autem animalibus carnes hæ fortiores sunt, quæ optime exercentur ac sanguinolētissimæ sunt, & in quibus recumbunt, Leuissimæ autem carnes sunt, quæ minime exercentur, & in umbra degunt, & in intimis animalis partibus sitæ sunt. Exanguium autem partium robustissimæ sunt, cerebrum & medulla. Leuissimæ vero carniū partes sunt capitales, & sub ventre, musculi, pectines, pedes. Ex piscibus ficcissimæ sunt supernæ partes, leuissimæ sub ventre, Et capita ipsorum humidiora sunt, propter pinguedinem ac cerebrum, Oua volucrum robustum quid habet, & alunt, & inflant. Robustum quid habent, quia generatio est animalis. Alunt, quia hoc est pulli lac. Inflant, quia ex parua mole in multam diffunduntur. Caseus robustus est & aestuosus & alit, Robustus quidem, quia proximus est generationi. Alit autē, quia carnosæ reliquæ sunt lactis. Aestuosus est, quia pinguis. Aluum autē sistit, quia succo & coagulo cōpactus est. Aqua frigefacit. Vinum calidum est & siccum, Habet & purgatorium quiddā à materia. Vina nigra & austera ficciora sunt, & aluum non mouent, neque vrinam cient, neque salinam faciunt. Siccant autem & calefaciunt, humiditatem ex corpore consumentes. Mollia vero nigra humidiora sunt, & inflant atque aluum magis mouēt, Dulcia nigra humidiora sunt, calefaciunt autem & inflant humiditatem inducentia. At vero alba & austera calefaciunt, magisq; vrinam cient, quàm aluum mouent. Noua vina aluum magis mouent, quia propiora musto sunt, itemque alunt, & odorata magis quàm inodorata eiusdē ætatis, quia magis concocta sunt: & crassa magis quàm tenuia. Verum tenuia dulcia magis vrinam cient, & aluum mouent, & humectant corpus & sanguinem debilem faciunt, & aduersarium corporis sanguinem in corpore augent.

Oua qualia.

Caseus.

Aqua.

Vinum nigrum.

- A** re augent. Mustum inflat, & subducit, ac conturbat feruens in ventre, & aluo secedit. Inflat quidem, quia calfacit. subducit autem ex corpore, quia purgat. conturbat autem, quia feruet in vêtre, atq; ita aluo secedit. Vina acida frigefaciunt, attenuant & humectant. Frigefaciunt quidem & attenuant humiditatis euacuationem à corpore facientes. humectant autē per aquam vnā cum vino ingrediētem. Acetum frigefacit, quia colliquans humiditatē in corpore consumit. Siftit autem magis quā mouet aluū, quia non alit & acre est. Sapa calfacit & humectat ac subducit. Calfacit, quia vinosa est. humectat, quia alit. subducit quia dulcis est. Vinum recens sub torculari expressum & nondum excolatum, humectat, subducit, & inflat, quia etiam mustum idem facit. Mel calidum est & siccum, si meracum sit, cum aqua autem humectat & aluum mouet biliosis, pituitosis vero sistit. Dulce vero vinum pituitosis magis aluo secedit. De oleribus porro hoc modo res se habet. Allium calidum est, & aluum mouet & vrinam ciet corpori, oculis vero non est commodum. Multam enim corporis purgationem faciens, visum hebetat, aluum autem & vrinam mouet, propter vim purgatoriam, coctum debilius est quā crudum, flatum autem inducit, propter spiritus intentionem. Cepa visui cōmoda est, corpori vero mala, quia calida & æstuosa est, & aluo secedit, & alimentū quidem nullum corpori præbet neque vtilitatem, calfaciens autem siccatur propter succum. Porru calfacit quidem minus, vrinam vero ciet, & aluum mouet. habet & quid purgatoriū. humectat autem & ructum acidum sedat. Præstat à reliquis cibis postremum ipsum edere. Raphanus siue radícula, humectat pituitam diffundēs sua acrimonia. folia minus prosunt, præterquam ad articulare morbum. Radix vitiosa est, innatans ac ægre concoctilis. Nasturtium calidum est, & carnem liquat. sistit autem pituitam albam, quare vrinæ stillicidium inducit. Sinapi calidum est & aluum mouet, sed & hoc vrinæ difficultatem facit. Quin & Eruca idem facit. Coriandrum calidum est, & aluum sistit, & ructum acidum sedat, & somnum conciliat, si postremum edatur. Lactuca frigidissima est, prius quā succum habeat, debilitatem autem quandā corpori inducit. Anethum calidum est, & aluum sistit, & sternutamenta sedat olfactatum. Apium magis vrinam ciet

Mustum.

Vinum acidum.

Acetum.

Sapa.

Mel.

Allium.

Cepa.

Porrum.

Raphan⁹.

Nasturtiū.

Sinapi.
Coriandrū.

Lactuca.

Anethum.
Apium.

HIPPOCRATIS LIBER II.

quàm aluum mouet. & radices magis quàm ipsum, aluum mo-
Ocymum. uent. Ocymum siccum est & calidū, & aluum sistit. Ru-
Ruta. ta vrinam magis quàm aluum mouet, Habet & vim quandam
condensandi, & ad medicamenta noxia commoda est pra-
Asparag⁹ potata. Asparagus siccus est & aluum sistit. Salvia sicca
Salvia. est & aluum sistit. Solanum frigefacit, & semen in somnis
Solanum. effundere non permittit. Portulaca fluuiatilis frigefacit,
Portulaca sale vero condita ac seruata, calfacit & purgat. Calamin-
Calamintha tha calfacit & purgat. Mintha calfacit & vrinam ciet, & vo-
Mintha mitus sistit. Et si quis semen eius saepe comedat, colliquefa-
cit vt quis diffuat, & arrigere prohibet, & corpus debile fa-
Rumex. cit. Rumex calfacit ac aluum mouet. Atriplex humida
Atriplex est, non tamen aluum mouet. Blitum calidum est, non mo-
Brassica uens aluum. Brassica calfacit ac aluum mouet, & biliosa
ducit. Betæ succus quidem aluum mouet, ipsum autem o-
lus comestum sistit. Radices vero magis aluum mouent.
Cucurbita Cucurbita frigefacit & humectat, & aluum mouet.
Rapum Rapum aestiuoium est, humectat autem & conturbat cor-
pus, non tamen aluo secedit, & vrinæ difficultatem indu-
Pulegium cit. Pulegium calfacit & aluum mouet. Origanum cal-
Origanū facit, & biliosa subducit. Thymbra similia origano effi-
Thymum cit. Thymum calidum est, per aluum secedit & mingi-
Hyslopum tur, ducit & pituitosa. Hyslopum calidū est & pituitam du-
Herbarū cit. Porro syluestria olera, quæ os calfaciunt, & odorata
uires. sunt, ea calfaciunt & minguntur magis quàm per aluum se-
cedunt. Quæ vero humidam habent naturam frigidamque
ac fatuam, & odores graues, magis per aluum secedunt, quàm
per vrinam. Quæ autem acerba & austera sunt, aluum si-
stunt. Quæ acria & odorata sunt, vrinam ciet. Quæ acria
& sicca in ore sunt, ea omnia siccant. Quæ acida sunt, frige-
faciunt. Cæterum succi vrinam cientes sunt, crethmi, a-
pij, alij cremor, cytisi, sceniculi, porri, adianti, solani, qui &
frigefacit. Item scolopendrium, mintha, fefeli, caucalides, hy-
pericum, vrticæ. Aluum autem mouent & purgant, cicer,
lenticula, ordeum, beta brassica, mercurialis, sambucus, cni-
cus. Hæc omnia aluum magis mouent quàm vrinam. At ve-
ro de pomis hoc modo se res habet. Quæ quidem semini-
bus referta sunt, ea magis aluum mouent, Item viridia magis
quàm sicca. Verum vis & facultas ipsorum referatur. Mora
calfaciunt

A calfaciunt & humectant ac aluo secedunt. Pira matura calfaciunt & humectant ac aluum mouent. Dura vero sistunt. Pira syluestria, hyberna, matura, aluum mouent ac purgant. Cruda vero sistunt. Mala dulcia ægre concoquuntur. Acida vero & matura, minus. Cydonia aditringunt, & non mouent aluum. Succi autem malorum, vomitus sistunt & urinam cient. & ante vomitum odores ipsorum idem præstant. Mala syluestria aluum sistunt. Cocta comesta magis aluum mouent. Verum ad respirationem quæ erecta ceruice fit & succi ipsorum, & ipsa quoque, hausta profunt. Sorba, Mespila & Corna, & quæcunque alia huius generis poma, aluum sistunt & acerba sunt. Mali punici dulcis succus aluum mouet, habet autem quid æstuosum. Mala punica vinosa, minus æstuosa sunt. **B** Acida vero magis frigefactoria. Nuclei autem omnium aluum sistunt. Cucumeres crudi, frigidi sunt & ægre concoctiles. Maturi autem & pepones, minguntur & per aluum secedunt. verum flatuosi sunt. Botri uuarum calidi sunt & humidi ac aluum mouent, maxime albi. Dulces quidem igitur calfaciunt fortiter, propterea quod multum iam caliditatis habent. Immaturæ vero minus calfaciunt, magis autem purgant potati. Ficus & uux passæ æstuosæ sunt, sed aluum mouent. Ficus viridis humectat & aluum mouet, ac calfacit. humectat, quia succo plena est. Calfacit, propter succum itidem, aluum mouet, propter succi dulcorem. Primæ ficus pessimæ sunt, quia succulentissimæ. optimæ autem sunt postremæ. Ficus aridæ æstuosæ sunt, sed aluo secedunt. Amygdalæ æstuosæ sunt, verum probe nutriunt. Aestuosæ quidem sunt propter pinguitudinem, nutriunt autem propter carnositatem. **C** Noces rotundæ similes his sunt. Latæ vero maturæ probe alunt, & aluum mouent. Depuratæ vero etiam flatum inducunt. Tunicæ vero ipsarum aluum sistunt. Acyli ilicis glandes, & quercinæ ac fagineæ glandes, aluum sistunt crudæ & assatæ, coctæ vero minus. Pingues carnes æstuosæ sunt, sed aluum mouent. Carnes conditæ ac asseruatæ in vino quidem siccant & alunt, & siccant quidem propter vinum, alunt autem propter carnem. In aceto autem asseruatæ calfaciunt quidem, verum minus propter acetum. multum autem nutriunt. At vero sale seruatae minus quidem alunt, humiditate per sale priuatæ, attenuant autem & siccant, ac sufficienter aluum mouent.

Pira

Mala dulcia.

Cotona.

Sorba.

Mesp. Corna.

Mala punica.

Cucumis

Pepones

Uux

Ficus

Amygdala.

Noces.

Castanea.

Carouarie condita

quid possit

Qui vires deuantur & augeantur. uent. Cæterum vires singulorum detrahare, & addere ac D
augere, hoc modo oportet. Ex igne & aqua omnia consti-
tuuntur, & animalia, & terra nascentia, & ex his augeſcunt, &
in hæc ſecernuntur ac reſoluuntur. Fortium quidem igitur
eduliorum vim ſæpe coquendo ac frigefaciendo detrahare
oportet, & vice verſa augere. Humidorum autem torrendo
ac aſſando humiditatem eximere. Siccorum vero rigando
ac madefaciendo. Salſorum rigando & coquendo. Amaro-
rum & acrium dulcium mixtura. Acerborum pinguium tem-
peramento, & de reliquis omnibus ex prædictis iudicium fa-
cere oportet. *Toſta.* Quæcunque toſta aut aſſata ſunt, aluum ma-
gis ſiſtunt quàm cruda, propterea quòd humiditas itemque
pinguitudo per ignem ablata ſunt. Quum itaque in ventrem
inciderint, humiditatem ex ventre trahunt, & oſcula venarum
concludunt ſiccantque ac calfaciunt, quare tranſitus humidi-
tatis ſiſtunt. *In ſiccis locis nati.* Quæ vero ex inaquoſis ac ſiccis & æſtuoſis lo-
cis veniunt, ea omnia ſicciora ac calidiora ſunt, & robur am-
plius corpore exhibent, propterea quod pari mole ac copia
grauiora ſunt & denſiora, & maiorem redditum tribuunt, quàm
quæ ex humidis & riguis ac frigidis. Hæc enim humidiora ſunt
& leuiora ac frigidiora. Non igitur ſolùm ipſius cibi & potus,
& animalium ipſorum vim noſſe oportet, ſed etiam patriæ vn-
de ſunt. Quum igitur forte alimentum corpori offerre vo-
les, & ex iſdem cibis, his quæ ex inaquoſis locis veniunt uten-
dum eſt, & cibis, & potibus, & animalibus. Vbi vero leuiore
& humidior, his quæ ex riguis veniunt vteris. *F*
Dulcia & acria, & ſalfa, & amara, & auſtera, & carnoſa calfacere ſolent.
Item quæ ſicca ſunt, & quæ humida. Quæcunque igitur de
ſicca parte plus in ſe habent, ea ſiccant & calfaciunt. Quæ ve-
ro humida partis plus habent, ea omnia calfacientia hume-
ſcant, & aluum magis mouent quàm ſicca. Nam ubi alimentum
amplius corpori præbuerunt, reuulſionem in ventre faciunt,
& humectantia aluo ſecedunt. Quæ autem ex calfacientia
ſiccant, tum edulia, tum pocula, neque ſaliuam, neque vrinam,
neque ſecreſſum facientia, corpus ſiccant, idque ob hanc cauſ-
ſam. Corpus calfactum humore vacuatur, & pars eius ab ipſis
cibis, pars in alimentum caloris ipſius animæ coſumitur. Pars
etiam calfacta & attenuata per ipſum corpus expellitur. Dul-
cia & pingua ac oleoſa replent, quia ex modica mole mul-
tum dif-

A tum diffunduntur. Calfacta autem & diffusa, caliditatem in corpore replent ac tranquillam esse faciunt. At vero acida, & acria, & austeri, & acerba, & ex toto collata, & sicca, non replent: propterea quod oscula venarum aperiunt & expurgant, & partim siccantia, partim mordentia ac adstringentia, humiditatem carnis horrere ac confidere & in modicam molem contrahi faciunt, atque ita vacuum multum in corpore fit. Quum igitur voles à modicis implere, aut à pluribus euacuare, talibus utaris. Recentia omnia maiorem quam alia fortitudinem habent, propterea quod propinquiora viuo sunt. Verum antiqua & marcida, magis quam recentia aluum mouent, quia propiora putredini sunt. At vero cruda alunt & ructus cient, propterea quod quæ ignem coquere oportebat, ea venter transigit, debiliior quàm ingesta sunt existens. Ceterum obsonia ex variis intritis præparata, æstuosa & humida sunt: propterea quod pingua, & tosta, & calida, & inæquales inter se vires habentia, in eodem cohererent. Verum quæ in muria præparantur meliora sunt, & non æstuosa. Porro de balneis hoc modo habet. Aqua potabilis humectat & frigefacit, exhibet enim corpori humiditatem. Salfum autem balneum calfacit ac siccit. Quum enim natura calidum sit, trahit à corpore humiditatem. Calida autem balnea ieiunum attenuant ac frigefaciunt: per caliditatem enim humiditatem de corpore auferunt, euacuata autem de carne humiditate, corpus perfrigeratur, à cibo accepto eadem calfaciunt, ac humectant, ea quæ supereminet in corpore diffundentia in maiorem molem. Balnea autem frigida vice versa, vacuum quidem corpore præbent quandam caliditatem. Vbi autem cibus ingestus est, ab humido existente detrahunt, & frigidum existens siccitate replent. Non lauari siccit quum humiditas consumatur. Similiter etiam vnctionis neglectus. Vnctio vero calfacit, humectat, ac molliet. Sol & ignis siccant, propterea quod quum calida sint & sicca, humiditatem ex corpore trahunt. Umbra & frigus moderate humectant, dant enim magis quam accipiunt. Sudores omnes abeuntes siccant & attenuant, humore ex corpore deficiente. Coitus attenuat, humectat & calfacit, Calfacit quidem propter laborem & excretionem frigiditatis. Attenuat autem propter euacuationem. humectat, propter colliquationis reli-

Qui pauca
satiunt.

Obsonia
ex intritis
uariis con-
dita.

Balnea

Balnea ca-
lida.

Frigida.

Vnctio.
Sol, ignis
Umbra.
Sudores.
Coitus.

HIPPOCRATIS LIBER II.

- Vomitus.** quias in corpore præ labore. Vomitus attenuant propter D
cibi euacuationem, non tamen siccant, si quis postridie re-
cte curet, sed humectant, propter repletionem & colliqua-
tionem carnis præ labore. Si vero quis sinat hæc postridie
consumi in alimentum caliditati, & dietam sensum adhibeat,
- Vomitus** siccant. Ventrem autem compactum vomitus soluit, & e-
ventrē mo
uet, & mo
ratur. gerentem magis quam oportet, sistit, illum quidem hume-
ctans, hunc vero siccans. Quum igitur aluum quis sistere
volet, auide deuoratum cibum euomere oportet, priusquam
humescat & infra detrahatur: & magis acerbis & austeris e-
duliis uti. Vbi vero soluere aluum quis velit, plurimo tem-
pore cibis immorari cōfert, & acribus, ac salis, & pinguibus,
- Somnus.** ac dulcibus, tum cibis, tum potionibus uti. Somni ieiun E
num attenuant & frigefaciunt, si non longi fuerint, præsen-
tem humiditatem euacuantes, Qui vero magis calefaciant,
colliquant carnem, & corpus diffundentes exoluant, ac de-
biles faciunt, à cibo vero sumpto calfacientes humectant, ali-
mentum in corpus diffundentes. à matutinis autem deambu-
lationibus somnus maxime siccatur.
- Vigilia.** Vigilia in exsatiatis ci-
bo noxia est, non permittens cibum liquari ac concoqui. Ie-
iunos autem attenuat quidem, verum minus lædit.
- Segnicies** Segnicies ac ocium humectat, & corpus debile facit. Anima enim
- Labor.** quiescens humiditatem ex corpore non consumit. Labor
- puerosi-*
tia. siccatur, & corpus robustum facit. Semel in die cibum cape-
re attenuat, & siccatur, & aluum sistit, propterea quod per ani-
mæ caliditatem humiditas ex ventre & carne consumitur. F
- Prandium.** Prandium cōraria facit. Aquæ potus calidus attenuat,
- Pot⁹ aquæ** similiter & frigidus. At vero & spiritus, & cibus, & potus, hu-
miditatem in corpore congelant, si excellenter frigida fue-
rint, & per congelationem ac frigiditatem aluos sistunt. Nā
- Quæ refri-** animæ humiditatem superant. Rursus autem etiam cali-
gerent. ditatis excessus eandem congelant, in tātum ut diffundi ne-
queat. Quæcunque vero calfacientia corpus, & alimentū
non præbentia, carnem humiditate euacuant etiam exces-
sum non facientia, ea frigiditatem homini exhibent. Nam
præsentem humiditatem mora, flatu ab ipsa repletur ac perfri-
geratur. Cæterum quam vim labores habeant nunc expo-
nam. Sunt enim alij naturales, alij violenti. Naturales igitur
sunt, Visus labor, auditus, vocis, curarum. Visus quidem igitur
ralis

A talis vis est. Anima in id quod videtur intenta, mouetur & calefcit. Calfacta vero, euacuata humiditate ficcatur. Per auditum vero allabente sono, anima concutitur & laborat, laborans autem calefcit & ficcatur. Quęcunque fiunt hominibus in cura, anima etiam ab his calefcit ac ficcatur, & humiditatem confumens laborat, & carnes attenuat, & hominē euacuat. Quicunque labores vocis fiunt, velut fermo, aut lectio, aut cantus, omnes hi animam mouent, Mota autem ficcatur & calefcit, & humiditatem in corpore confumit. At vero deambulationes etiam ipſę maxime prę reliquis naturales fiunt, Habent autem quid violentum. Vis ipſarum talis eſt. Deambulatio à cœna & aluum, & corpus, & ventrem ficcat, ipſumque amarum fieri nō finit, ob hanc cauſam. Quū mouetur homo, caleſcit corpus, itemque cibi. Attrahit igitur humiditatem caro, & aluum amaram fieri non finit. Corpus quidem igitur repletur, aluus vero attenuatur. Siccatur autem eadem, ob hanc cauſam. Quum corpus mouetur & calefcit, quod tenuiſſimum eſt alimenti confumitur, partim per inſitum calorem, partim vero vna cū flatu foras excernitur, partim etiam per lotium eiicitur. Quod vero ficciſſimum eſt de cibis relinquitur, Quare vnā cum aluo etiam caro reſiccatur. Matutinę deambulationes attenuant, & partes circa caput leues, & agiles, ac promptas reddunt, & aluū ſoluūt. Attenuant quidem, quia motum corpus calefcit, & humiditas attenuatur ac purgatur, partim per ſpiritum ac flatū, partim vero emungitur & exſcreatur: ſed & aliqua pars in alimentum caliditatis animę confumitur. Aluum autem ſoluūt, quia quum calida ſit, frigido ſpiritu ſuperne allabente, caliditas frigiditati cedit. Leues autem partes circa caput faciūt, ob hanc cauſam. Quum euacuata eſt aluus, ex reliquo corpore & capite humiditatem in ſeipſam attrahit, nimirum calida exiſtens. Euacuato autem capite, & viſus & auditus depurgantur, & homines agiles fiunt. Deambulationes autē poſt exercitia, corpora pura reddunt, & attenuant, non permit- tentes carnis colliquationem fieri prę labore, ſed ipſam depurgant. Ceterum curſus longi ac curui ſenſim facti, calfacientes carnem, concoquere ac diffundere poſſunt, & vim ciborum in carne concoquunt: verum corpora tardiora ac craſſiora reddunt quā curſus circulares. Et multa comedē-

*Deambu-
lationes.*

*Matutinę
deambu-
lationes.*

*Deambu-
lationes
poſt exerci-
tia.
Curſus.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

tibus commodiores sunt, & hyeme magis quàm æstate.

Cursus ue-
stri.

Qui vero in veste fiunt, eandem vim habent, magis autem exalfraciunt, & corpora humidiora faciunt, & decoloratio-
ra : quia sincerus spiritus allabens ipsa non depurgat, sed in
eodem spiritu exercentur. Conferunt itaque & siccis, & car-
niosis qui carnem deinoliri & abolere volunt, itemque senio-
ribus, propter corporis frigiditatem.

Cursus re-
cti.

Cursus autem recti reuertentes, & equestres indefiniti, carnem minus diffun-
dunt, attenuant autem magis, propterea quod externis ani-
mæ partibus hi labores sunt, & humiditatem ex carne reuel-
lunt, & corpus attenuant ac siccant.

Cursus cir-
culares.

Circulares vero cursus carnem minime diffundunt, attenuant autem & distendunt
carnem & ventrem maxime, propterea quod acutissimo spi-
ritu vtentes, humiditatem in seipsos celerrime trahunt. At
vero concussiones siccant quidem derepente, non sunt au-
tem idoneæ, neque commodæ. nam conuulsiones inducunt:
quia exalfractum corpus, cutem quidem fortiter attenuat,
carnem vero minus coagmentat quàm cursus circulares, car-
nem autem humore euacuant. Commotiones & alleua-
tiones carnem quidem minime exalfraciunt, corpus autem

Lucta;

& animam irritant, & spiritu euacuant. Lucta & fricatio,
externis corporis partibus magis laborem exhibent. calfa-
ciunt autem carnem, & corroborant ac augeri faciunt, ob
hanc causam. Quæ ex natura solida sunt, conficta consi-
dunt ac coagmentantur, quæ vero caua sunt, auferunt.

ἀλινδύ-
σις.

Quod itaque densum est in carne, id confictum coagmen-
tatur, caua vero auferunt, itemque venæ. Nam carnes cal-
factæ ac siccata, alimentum in seipsas per venas trahunt, de-
inde auferunt. Volutatio in puluere consimilia luctæ ef-
ficat. Magis autem siccatur propter puluerem, & minus incar-
nat.

ἀεροχέ-
ρις.

Micatio per summas manus attenuat, & carnes sur-
sum trahit. Foelis, & manuum ad rythmum motus, con-
similia faciunt. Spiritus detentio, meatus disparare; & cu-
tem attenuare, & humiditatem sub cutem extrudere potest.

Κορυνο-
μαχίς, ἢ

χειρονο-
μία.

Πυλὺς ὁ
ὀλεῖν

quar-
le.

Exercitia in puluere & oleo in tantum differunt, quod
pulus quidem est frigidus, oleum autem calidum. In hyeme
igitur oleum corpus magis auget; propterea quod frigus
prohibet à corpore quid auferre. In æstate vero caliditatis
excessum faciens, carnem liquat; quum & à tempore, & o-
leo, ac

A leo, ac labore, corpus calefiat. At vero pulvis qui inter exercendum accedit, in æstate quidem magis auget. Nam frigefaciens corpus, in excessum calferi non permittit. In hyeme vero frigus & algorem inducit. Morari in pulvere post exercitia in æstate, modico tempore, confert frigefaciendo. Verum longior mora superreficcat, & corpora dura ac lignosa efficit. Friccio ex oleo & aqua mollit, & non vehementer exalfieri finit. Porro de lassitudinibus quæ in corpore fiunt, hoc modo res se habet. Homines inexercitati ab omni labore lassantur. Nulla enim corporis pars exercitata est ad ullum aliquem laborem. Corpora autem exercitata, ab insuetis laboribus delassantur. Aliqua vero **B** etiam à consuetis exercitiis lassantur, si modum excefferint.

Confricatio olei & aqua.

Species quidem igitur lassitudinum eiusmodi sunt. Vis autem ipsarum sic habet. Etenim inexercitati humidam carnem habentes, quum laborauerint corpore calefacto multam colliquationem remittunt. Quicquid igitur exsudauerit, aut cum corpore depurgatum fuerit, non exhibet magis laborem in corporis parte præter consuetudinem euacuata. Quicquid vero ab excretionem intus remanserit, non solum huic laborem exhibet, sed etiam ei parti quæ humiditatem suscepit. Non enim commoda est corpori, sed infesta. Et in carnes quidem corporum non similiter congregatur, Verum in carnosas partes, quare his laborem exhibet, donec exiuerit. Tanquam enim circuitum non habes, quies-

Defidiosi quid patiuntur.

C scens calefit tum ipsa, tum quæ allabuntur. Si igitur multum fuerit quod excretum est, etiam sanum corpus exsuperat, ut totum concalescat, & febrem fortem inducit. Calefacto enim sanguine & attracto, celerem circuitum faciunt ea quæ in corpore sunt, & tum reliquum corpus præ spiritu purgatur, tum quod compactum est calefcens attenuatur, & simul ex carne foras sub cutem extruditur, atque hoc sudor calidus vocatur. Hoc autem excreto, & sanguis in naturalem statum restituitur, & febris remittit, & lassitudo sedatur maxime tertia die. Cæterum eiusmodi lassitudinem sic curare oportet, ut fomentis & balneis calidis id quod compactum est dissoluamus, & deambulationibus vehementibus depurgemus, & modico cibo ac attenuationibus carnis euacuationem cogamus ac coagmentemus, & oleo sensim multo tempore

HIPPOCRATIS LIBER II.

tempore fricemus, vt ne violenter excalescat. Vnguentis etiā D
tum exudatoriis, tum mollientibus, vngere ac mollire con-
ducit. At vero exercitatis, ab insuctis laboribus propterea
lassitudo contingit. Quum corpus nō fuerit laboribus exer-
citatum, necesse est carnem humidam esse ad eum locum, ad
quem non est aduersus se laboribus exercere, quemadmodū
etiam ad singula exercitationum genera. Carnem igitur ne-
cesse est colligari, & excerni, confidereque ac contrahi, ve-

Curatio.

lut priori. Confert autem hoc modo curari. Exercitationi-
bus vtendum est consuetis, quo id quod compactum est cale-
scens extenuetur ac depurgetur, & reliquum corpus non hu-
meetur, neque in exercitatum maneat. Vtile est & hunc bal-
neis calidis vtī, itemque frictione similiter vtī priorem. Ve-
rum fomentis nihil habet opus. Labores enim calfacientes E
sufficiētes sunt attenuare & depurgare id quod compactum
est. Lassitudo autem à consuetis exercitiis hoc modo fit.

Medela.

A moderato quidem labore lassitudo non mouetur. Quum
vero maior quā oportet labor fuerit, carnem superresiccāt,
euacuata autem humore caro, calefit, & dolere, & horret, & ad
febrem perducitur longiorem, si non quis recte curet. Opor-
tet autem primum quidem ipsum balneo non valde multo,
neque nimis calido lauari. deinde exhibito à balneo molli
vino, in cœna offerre plurima & omnigena edulia, & potu a-
quoso, vino vero molli ac multo vtī. Postea longo tempore
his immoretur, donec venæ repletæ attollantur. Deinde ve-
ro vomat, & post modicam stationem, molliter dormiat. Po-
stea per dies sex sensim ad cibos & labores consuetos adhi-
beat, atque ita ad consuetum cibum ac potum perducatur. F
Vim autem habet hæc curatio talem. Resiccātum excellen-
ter corpus, humectare potest citra excessum. Si quidem igitur
possibile esset, laboris excessum nosse, quantus is esset,
commodum foret ipsi per moderatum cibum mederi. Nunc
vero illud impossibile est, hoc vero facile. Corpus enim re-
siccātum, ab ingestis omnigenis eduliis id quod conducibili-
le sibi ipsi est sumit, vnaquæque pars de singulis cibis. reple-
tum autem & humectātum, alio per vomitum euacuata, rur-
sus excessum remittit. Alius autem vacua existens reuellit.
Excedentem itaque humiditatem caro eruat, moderatam
vero non remittit, nisi per vim, aut labores, aut medicamen-

*Curatio
nis eius
uis.*

ta, aut

A ra, aut aliam quādam reuulſionem. Qui autem additione cibi ſenſim creſcente utitur, is corpori diætā placide conſtituit. *Qui apte nutritur bit.*

HIPPOCRATIS COI

DE DIAETA SIVE VI-

*etus ratione, liber III. Iano**Cornario medico phy-
ſico interprete.*

E diætā humana exacte quid conſcribere, vt ad ciborum copiam, laborum commēſuratio ac ſymmetria fiat, nō eſt poſſibile, quemadmodum etiam antea à me relatum eſt. Multa enim ſunt impedimēta. Primum quidem hominum naturā, diuerſā exiſtentes. Nam & ſiccæ ipſæ ad ſeipſas, & ad alia collatæ magis ac minus ſiccæ ſunt & hu-

*Quid uet-
tet perfe-
ctā uictus
rationem.*

midæ. Similiter etiam aliæ omnes. Deinde ætates non iſdē indigentes, Inſuper & regionum ſitus, & ventorum mutationes, & temporum alterationes, & anni cōſtitutiones.

Eſt & inter ipſos cibos multa differentia, Triticum enim à tritico differt, & vinum à uino, & reliqua omnia ex quibus uictum facimus diuerſā exiſtentia, impediunt quo minus poſſibile ſit exacte de diætā conſcribere. At enim prænotiones inuētæ ſanè à me ſunt eorum quæ in corpore dominantur, ſiue labores cibos, ſiue cibi labores ſuperent, & quomodo ſingulis mederi oporteat, prædiſcereque ſanas naturas, & vt non accedant morbi, niſi quis valde multum delinquat ac ſæpe. hæc autem medicamentis iam opus habent. Sunt autem quæ neque per medicamenta ſanari poſſunt. Quantum quidem igitur inueniri poſſibile eſt quæ maxime ad rem faciunt, à me inuentum eſt. Verum exacte à nullo.

*Qui modus
nitæ.*

Primum igitur multis ac vulgo hominibus conſcribam, ex quibus maxime utilitatem

HIPPOCRATIS LIBER III.

tatem capere possint, qui sanè cibis vulgaribus vtuntur, ac la-
boribus necessariis, profectionibusque necessariis, ac operis
marinis ad vitam degendam repertis: quique caleſcunt plus
quàm expedit, perfrigeranturque præter commoditatem, &
reliqua diæta inconstanti vtuntur. His itaque ex præsentibus

*Anni qua-
tuor par-
tes.*

ſic victum facere conducit. Annum equidem in quatuor
partes diuidunt, quas plerique omnes nouerunt, hyemé, ver,
æſtatem, autûnum. Et hyemem quidem à pleiadum occaſu, vſ-
que ad æquinoctium vernum. Ver autem ab Aequinoctio vſ-
que ad pleiadum exortum. Aæſtatem vero à pleiadum ortu
vſque ad Arcturi exortum. Autumnum ab arcturi ortu, vſque
ad pleiadum occaſum.

*Victus hy-
bernus.*

In hyeme quidem igitur temporis
frigido & compacto ſe opponendo, hoc victu vti conducit.

Primum quidem ſemel tantum in die cibum capere conue-
nit, niſi quis valde ſiccum ventrem habeat. Id vero ſi fieri nõ
poſſit, modicum prandere. Victu autem vtendum eſt ſicco &
auſtero, & calfactorio, & ex toto collato, ac meraco. Pane au-
tem magis vti expedit, & obſoniis aſſatis potius quàm coctis.
Et potionibus nigris meracioribus ac paucioribus. Oleribus
minimum, præterquam calefacientibus & ſiccis. Succis item
ac ſorbtionibus minime vtendum eſt. Laboribus auté multis
omnibus, curſibusque curuis ſenſim creſcente acceſſione, &
lucta in oleo longa, à leuibus ordiendo ac ſenſim addendo.
Et deambulationibus ab exercitiis, acutis ac celeribus. à cœ-
na vero, tardis in tepore. Matutinis autem multis, leni initio
facto, ac ſenſim creſcente acceſſione, ita vt placide rurfus de-
ſinas.

Vtendum eſt & ſtrato duriore, & nocturnis itineri-
bus, & ſynambulationibus, ac curſibus per funem vti cõfert.
Omnia enim hæc attenuant ac calfaciunt. Vtendum etiam
nauigatione. Vbi autem quis lauari velit, ſi quidem in palæ-
ſtra ſe exercuerit, frigida lauatur. Si vero alio quopiam ex-
ercitio vſus fuerit, calida commodior exiſtit.

*Vomitio-
nis
modus.*

Vtendum & vo-
mitibus, ſi humidiores ſint ter in mēſe, ſin ſicciores, bis à ci-
bis omnis generis. à vomitibus ſenſim perueniendum eſt ad
conſuetum cibum per dies tres, eoque tempore laboribus le-
uioribus ac paucioribus vtendum. à bubulis autem & porci-
nis carnibus, aut aliis, quicquid tandem modum exceſſerit,
repletus vomat: & à caſeoſis & dulcibus ac pinguibus, eum
qui non eſt adſuetus repleri, vomere conducit: & ab ebrie-
tate,

- Atate, ac ciborum mutatione, & regionum alteratione vomendum est. Oportet autem frigori seipsum purum exhibere, præterquam à cibis ac exercitiis. Sed & in matutinis deambulationibus vbi corpus calefieri cœperit, itemque in cursibus etiam in alio tempore, excessum vitare oportet. Melius est enim corpori hyemem ferre, quàm exerceri hoc tempore. Nam neq; arbores quæ hyemem non pertulerunt hoc tempore, fructum ferre possunt, neque ipsæ sanæ esse. Utendum est & laboribus hoc tempore multis vsque ad excessum, nisi lassitudines succedant. Signum autem docebo idiotas, ostendamque quapropter hæc ita se habent. Tempore existente frigido ac compacto, consimilia patiuntur etiam animalia ipsa. Neceffe igitur est corpora tarde calefieri à labore, & modicam quandam humiditatis præsentis partem excernere. Deinde modicum tempus concessum est quo laborarent, multum autem quo quiescant. Dies enim brevis est, nox vero longa. propterea igitur neque tempus, neque labor excessum habet. Ob hanc itaque causam hoc tempore sic dietam instituere oportet, à pleiadum occasu vsq; ad solstitium hybernium diebus quadraginta quatuor. Circa solstitium autem maxime in custodia ac tutela esse, & à solstitio alios totidem dies eadem dieta vti. Postquam autem tempus adduxerit fauonium, & mollius factum fuerit, oportet etiam eum tempore dietam sequi, diebus quindecim, quum arcturus oritur & hirundo volat. Sequens vero tempus magis varie transigere oportet vsque ad æquinoctium diebus triginta duobus. Oportet igitur etiam dieta vti hoc tempore variegatiore, mollioreque ac leuiore, & cibo, & potu, & labore, atque ita sensim ad ver perducere. Quum autem æquinoctium iam factum fuerit mollius, & dies longiores, ac noctes breuiiores, & tempus calidum ac siccum constiterit, etiã præsens victus probe nutriendus ac meracius sit. Quemadmodum igitur arbores rationem non habentes, hoc tempore præparant sibi ad æstatis commoditatem, tum incrementum, tum umbram: Sic oportet hominem, quum sanè mente ac ratione præditus sit, carnis incrementum salubre sibi præparare. Oportet igitur vt ne derepente dieta transmutetur, tempus in sex partes diuidere, per octo dies. In prima itaque parte, & labores detrachere oportet, & reliquis quoque velocioribus.

*Plus ocii
quàm la-
boris hys
me datur.*

*Vergilia
rū occasus
Solstitiū.*

*Fauonius.
Arcturi
ortus.*

Hirundo.

*Æquina-
ctium.*

*Hoies ar-
bores imi-
tentur.*

*Diuisio tē-
poris in
sex partes*

HIPPOCRATIS LIBER III.

vti. Cibis autem mollioribus, & potibus aquosioribus. ac al-
bioribus, & lucta cum oleo in sole vtendū est. In singulis au-
tem temporibus singulas dietas paulatim transmutare oportet,
& deambulationes detrahre à cœna plures, matutinas
pauciores: & mazam pro pane offerre, & olera cocta exhibere,
& obsonia cocta assatis adæquare, & balneis vti, & parum
prandere, & re venerea pauca vti, & vomitib. primum quidē
quarto quoque die, deinde per longius tempus, quo & corpus
pura carne incarnatum cōstituas, & diætā in hoc tempore
mollem, vsque ad pleiadum exortum. Et in hoc iam
æstas adest, & ad hanc nunc diætā instituere oportet.

*Vitus æ-
statis,*

Quum itaq; pleias exorta fuerit, cibis mollioribus ac pau-
cioribus vti oportet. Deinde maza magis quàm pane, atque
ea prius subacta, & vino dulci non emollita. potibus autem
mollioribus albis aquosis, prandio modico, & somnis à prandio
breuibus, & repletionib. ex cibis ac potibus quàm minimis.

Potu inter edendum vtendum est sufficiēte, per diem ve-
ro minime bibendum, nisi necessaria aliqua siccitate corpus
vtatur. Vtendum est & oleribus coctis, exceptis æstuosis ac
siccis. Vtendum etiam crudis, exceptis calfacientibus ac sic-
cis. Vomitibus nisi si qua repletio contingat, vtendum non
est. Re autem venerea minime. Balneis autem tepidis vti li-
cet. At vero poma fortiora sunt quàm pro humana natura.

Poma.

*Per æstā-
tem exer-
citatio.*

Melius est igitur à pomis abstinere. Si vero quis cum cibis
vtatur, minime deliquerit. Laboribus quoque ac cursibus
circularibus exerceri oportet, & cursibus rectis reuertentib.
modicis multo tempore, & deambulationibus in vmbra, lu-
cta autem in puluere, quo quàm minime excalescat. Verū
volutationes in puluere meliores sunt quàm cursus circula-
res. Frigefaciunt enim corpus humore euacuantes. à cœna
deambulandum non est, sed saltem surgendū. Mane vero de-
ambulationibus vtendum. Soles vitandi sunt, itēque frigo-
ra, tum mane, tum vespere, quæ flumina, aut stagna, aut niues
exhalant. Hanc autem diætā tolerare oportet vsq; ad sol-
sticiū æstiuū, quo in hoc tempore adimas omnia quæ sic-
ca sunt & calida & nigra ac meraca, itēque panes, præter-
quam si parū quid voluptatis gratia concedere velis. Sequen-
ti vero tempore vtetur mollioribus & humidis & perfrigeranti-
bus ac albis, vsq; ad arcturi exortum ac æquinoctiū per dies
nonaginta

- A** nonaginta tres. Cæterum ab æquinoctio sic diætā instituerē oportet, per autumnum ad hyemem adducendo, ita ut mutationes frigorū ac teporis vires vestitu crasso. Utendū autem hoc tempore motu in veste, frictioneque ac lūctā in oleo, ita ut sensim accessio crescat. Deambulationes quoque in tepore faciendæ sūt, & calidis lauacris utendum, & somni diurni detrahēdi. Cibus autem utendum est calidioribus, ac minus humidis, & puris, & potibus nigrioribus, verū mollioribus & non aquosis. Oleribus vero minus. Reliquam item diætā omnem sic consonam adhibere oportet, ut ab æstiuis detrahas, hybernīs autem utaris nō ad summum, quo hybernū victum quā proxime cōstituas, in diebus duodequingaginta, usque ad pleiadum occasum, ab æquinoctio. Hæc porro multitudinis commonendæ gratia ac vulgi hominū, causa prodo, qui ex necessitate vitam temere transigunt, neque licet ipsis aliorum negligentes esse, ac suā ipsiorū sanitatem curare. Quibus vero iam hoc certum ac percognitum est, quod neque diuitiarum, neque corporis, neque vilius alterius rei vlla utilitas est, citra sanitatem, ad hos inuenta est à me diætā, quantum possibile est, ad veritatem ac certitudinem possibilium rerum adducta. Hanc itaque in sermonis progressu declarabo. Inuentum autem hoc honestum quidē mihi repertori, vtile vero discipulis, nullus adhuc priorum ne attentauit quidem componere, quod ad omnia alia magni æstimandum duco. Est autem præcognitio antequam æ-
- C** grotent cognitio, quid corpora perpetiantur, vtrum cibus superat labores, aut labores cibos, aut moderate inter se habeant. Vtrum enim tandem superetur, morbi fiunt, ab æqualitate autem inter ipsā mutua, sanitas adest. Ad hæc sanè commemoranda accingor, & demonstrabo qualia sunt hominibus qui sani sibi esse videntur, & iucunde comedunt, laborareque possunt, & corporis ac caloris satis habent. Nares citra causam apertam à cœna implentur, & repletæ esse videntur, emungunt autem nihil. Vbi autem deambulare mane incipiunt ac exerceri, tunc emungunt ac spuant. & progressu temporis etiam palpebras graues habent, & pruritus frontē occupat, & à cibis abstinent, & bibere minus possunt, & color fit decolor, & aut destillationes mouentur aut febres horridæ, iuxta quodcunque tempus repletio fuerit mota. Quic-

*Victus aut
tumni.*

Sine sanitate nihil iuuat.

Quæ inuenit Hip.

*Quid præcognitio
& cognitio.*

quid

HIPPOCRATIS LIBER III.

*Plemitudi
nis signa.*

Medela.

*Diurna
dormitio
bona nō est
Morborū
alia caussa*

quid autem eo tempore fecerit, in id ipsum culpam ac cau-
sam reiicit, quum id ipsum causa non sit. Huic enim cibi su-
perant labores, & repletio paulatim collecta in morbum ip-
sum adduxit. Sed non huc usque differre oportet, verum ubi
prima signa cognouerit, scire quod cibi labores superant, &
paulatim collecta repletio existit. Mucus enim & salua re-
pletionis indices sunt ac signa, & quiescente quidem corpo-
re, meatus spiritus obturant, multa repletionem existente. ubi
vero calefactū est præ labore, attenuata excernuntur. Ta-
lem autem sic curare oportet. Exercitātū in consuetis ex-
ercitiis citra lassitudinem, calidaque lotum, cibis omnigenis
expleto, ac vomere facito. à vomitu vero os & fauces colluat
vino austero, quo oscula venarum constringantur, & nihil at-
trahāt, velut à vomitu fieri solet. deinde surgens modice de-
ambulet in tepore. Postridie vero deambulationibus qui-
dem vtendum est. exercitiis autem paucioribus & lenioribus
quàm prius. & si æstas fuerit impransus degat, sin minus, pa-
rum comedat, & de cœna quam sumere solebat, dimidium
detrahat. Tertia autem die labores quidem obeat omnes
consuetos ac deambulationes, verum cibos sensim ingerat,
quo quinta die à vomitu consuetum cibum assumat. Et si
quidem ab hoc satis bene habuerit, de cætero cibis quidem
paucioribus, laboribus autem pluribus curetur. Si vero signa
repletionis nō quieuerint, interpositis duobus diebus ab ea
qua consuetos cibos assumpsit, rursus vomat, & eodem mo-
do sensim ad consuetos cibos redeat. Quod si non successerit,
etiam tertium eadem repete, donec à repletionem libere-
tur. Sunt autem homines qui ubi labores superantur à ci-
bis, talia patiuntur. Incipiente quidem repletionem somni lō-
gi & dulces ipsis contingunt, & interdiu etiam dormiunt.
Somnus autem cōtingit carni, & sanguis funditur, & spiritus
diffusus tranquillus est. Quū vero non suscipiat amplius cor-
pus repletionem, secretionem iam remittit intro, præ circui-
tus violentia, quæ sanè secretio contraria alimento à cibis,
animam perturbat. Quo tempore non amplius iucundi ipsis
sunt somni, sed necesse est hominem perturbari, & videtur si-
bi cum aliquo pugnam committere. Qualiacunque enim pa-
titur corpus, talia videt anima, visu iam concluso. Quum igi-
tur ad hoc peruenerit homo, prope iam est vt ægrotet. Quod
autem

- A** autem veniet morbus, valde manifestum est, Qualis enim secretio venerit, & quancunque partem superauerit, eam ipsam morbo affligit. Verum non oportet ita desipientem esse & hucusque differre, sed statim ubi prima signa cognouit, curam contingere, & hunc velut priorem curare. longiori autē tempore, ac fame opus habet. Sunt præterea etiam talia repletionis signa. Dolet corpus aliquibus totum, aliquib. pars quædam, quęcunq; tandem. Dolor autem est velut lassitudo, & delassati esse sibi videntur, segnicieq; ac repletionē curatur donec ad febrem perueniant. & adhuc nondum hoc cognoscunt, sed balneis ac cibis vtentes, ad pulmonis inflammationem, peripneumoniam Gręcis dictam, morbum deducunt, & ad extremum periculum deueniunt. Verum oportet
- B** prouidere antequā ad morbos perueniant, & hoc modo curare, vt maxime mollibus fomentis hominē foueamus, aut si id fieri nequeat, multa calida lauem⁹, ac corpus dissoluamus, & à multis ingestis cibis, primū quidem acerbis ac plurimis, deinde salsis, probe vomere faciamus. quo facto exurgat ac modico tempore deambulet in tepore. deinde dormiat. Mane vero deambulationib. sensim crescētib. vtēdū est, & exercitiis leuib⁹, & ciborū exhibitioib. sensim crescētib. velut pri⁹. Attenuatione autē plurima opus habet, itemq; deambulationibus. Si vero prouidentia non adhibita ad febrem peruenierit, nihil aliud offerre oportet præter aquam per dies tres. Siquidem igitur ex hac sedetur, bene est: sin minus, pituitæ succo curandus est, & aut quarta aut septima die decedet febris, si exsudabit. Bonum autem est & vnguentis exsudatoriis vtī, sub iudicationes: exsudare enim cogunt. Quidam vero etiam talia à repletionē perpetiuntur. Caput ipsis dolet ac grauatur, & palpebrę ipsis à cœna cōcidunt, & in somnis turbantur, & calor inesse ipsis videtur, & aluius aliquando sistitur. Et talis ubi venere vtitur, leuior statim esse sibi videtur, postea vero magis grauatur. His caput repletionem reuellens, & aluius sistit, & ipsum grauatur. Periculum autem subest, vt quod erumpat ipsa repletio id ipsum corrumpat. Verum prouidere hoc modo oportet. Si curam celere facere velit, veratro purgandus est. deinde exhibendi cibi leues ac molles ad dies decem, atque hi aluius mouentes, quo vter inferior superet, & de capite reuellere valeat.

*Repletio-
nis signa.*

Curatio.

*Morb⁹ a-
lius plenit-
tatis.*

Curatio.

HIPPOCRATIS LIBER III.

Utendum & cursib. tardis ac matutinis, & deambulationib. **B**
 multis. Item lucta in oleo, & prandio, & somno à prandio nō
 longo: à cœna vero exurgere satis est, & partim balneis, par-
 tim vñctione utendum, balneis vero tepidis, à venere autem
 abstinentum. Hæc quidem velocior cura est. Si vero medi-
 camentum bibere nolit, multa calida lotus, à cibis dulcib. ac
 falsis vomat. à vomitu vero satis est ut exurgat: mane autem
 deambulationib. adhibendus est, & exercitiis præscriptis ad-
 dies sex. die septima repletionem corporis facta à similibus ci-
 bis vomitum faciat, & eodem modo cibi rursus sensim adhi-
 ciendo exhibeatur. atque his hoc modo ad quatuor hebdo-
 madas utatur. In tanto enim tempore maxime sedatur. De-
 inde cibi exhibendi quo corpus reficiatur, & diæta paulatim **E**
 ad consuetum morem redigenda est. Fiunt etiam talia à
 repletionem. Quibusdam venter quidem concoquit cibum,
 carnes autem non suscipiunt. Alimentum autem intus ma-
 nens flatum inducit. Vbi vero pransi fuerint sedatur. Nam à
 fortiore id quod leuius est expellitur, & videntur sibi libera-
 ti esse. Verum malum multo maius postridie accedit. Quum
 autem quotidie angescens fortius inualuerit, id quod prius
 inest superingesta superat, & calfacit ac perturbat corpus, &
 profluuium vêtis facit. Sic enim nominatur quàm diu ipsum
 solum alimentum putrefactum secedit. Vbi autem corpore calefa-
 cto purgatio acris fiat, tunc & intestinum raditur ac exulcera-
 tur, & sanguinolenta egeruntur. hoc autem dysenteria, à ma-
 la intestinorum affectione appellatur, morbus grauis & pe- **F**
 riculosus. Sed providere oportet, & prandium detrahere, &
 cœnæ tertiam partem. Cursibus autem pluribus, & luctis ac de-
 ambulationibus uti, tum ab exercitiis, tum mane. Quum vero
 dies decem præterierint, dimidiū cibi detracti apponere, ac
 vomitu uti, atq; sic ad dies quatuor cibum exhibere: vbi autem
 alij decem dies præterierint, etiam reliquū cibum apponere,
 ac vomitum facere: atq; sic ad consuetū cibum reducēs, & ta-
 lem laborib. confidenter premens ac vrgēs, in hoc tempore sa-
 num facies. Fit etiam talis repletio. Postridie cibum e-
 ruçant crudum, citra ructum acidum. Alius autem egerit,
 pauciora quidem quàm pro ratione ciborum, attamen multum.
 Dolor vero nullus intus est. His ventriculus frigidus exi-
 stens, cibos in nocte concoquere non potest. Quum igitur
 motus

Cum potio-
nes nō ad-
mittit.

Plenitatis
varia ma-
la.

Dysente-
ria.

Curatio.

Plenitas
alia.

A motus fuerit, cibum crudum eructat. Oportet itaque huic præparare ventriculi caliditatem, tum ex victu, tum ex laboribus. Primum quidem igitur vtendum est pane ex tota farina collata, fermentato, diffracto in vinum nigrū, aut in tusculum suillæ carnis. piscibus vero coctis in muria acri. Vtēdum etiam carnosīs, velut extremitatibus percoctis, & suillis carnis coctis pluribus, & porcinis non multis, & catulorum, ac hædorum. Ex oleribus vero porro & allio cocto ac crudo, blitoq; cocto & cucurbita. Potionibus vero meracionibus, somnisq; longis citra prandium prima die, itemq; somnis ab exercitiis, cursibus aut curuis sensim accessione augescēte, luctaq; molli in oleo, balneisq; modicis. Est & ficus cum cibus bona, & meracum vinum ab ipsa. Ex hac autem curatione aliis citius, aliis tardius repletio sedatur. Alij porrò quidā talia patiuntur. Faciem decolorem habent, & vbi comederint, paulo post eructant acida, & acor in nares proserpit.

*Medela
per nutri-
catum.*

*Quibus fi-
cus post ci-
bū profit.
Plenitatis
aliis mor-
bus.*

His corpora pura non sunt, & plus est quod de carne colliquatur præ labore, quàm quod depurgatur præ circuitu. Et hoc sanè intus manens alimento contrarium est, ipsumque violat ac acidum facit. Alimentum quidem igitur eructatur, illud ipsum vero sub cutem expellitur, & hominem decolorē facit, & morbos similes aquæ inter cutem parit. Verum providere oportet hoc modo. Velocior quidem curatio est porto veratro, exhibere cibos quemadmodum à me scriptum est. Verum tutior à diæta, hoc modo. Primum quidem calida lotus vomitum faciat, deinde septem à vomitu diebus cibum consuetum capiat, decima autem à vomitu die rursus vomat, & similiter cibum assumat, & tertium similiter faciat. Et cursibus quidem circularibus paucis ac velocibus vtatur, & motibus, ac frictione, & mora longa in gymnasio ac exercitio. Vtatur & volutatione in puluere, & deambulationibus multis ab exercitiis, sed & à cœna. Plurimis autem matutinis in puluere vtatur. Quum autem lauari vult, calida lauetur, & eo tempore impransus degat. Et si quidem vno mense restituitur, de cætero convenientibus curetur. Si vero quid reliquum fuerit, medela vtatur. Sunt autem quidam quibus posttridie ructus acidi fiunt. His in nocte secretio præ repletionē fit. Quum igitur motum fuerit corpus ex somno densiore spiritu vsum, calidum ac acidum vna cum spiritu

*Medela
que.*

HIPPOCRATIS LIBER III.

foras expellit, & ex hoc morbi fiunt, nisi quis prouidentia D
utatur. Conducit autem etiam his facere velut priori. Verum
laboribus pluribus hos uti oportet. Quibuldam etiam ta-
lia fiunt. In corporibus densa carne præditis, quum cibi co-
calescunt ac diffunduntur, & à primo somno, & præ cibus
carne calefcente, secretio per somnum fit à carne multæ hu-
miditatis. Deinde caro densa existens alimentum non sus-
cipit, Id vero quod à carne secretum est alimento contra-
rium ac foras protrusum, hominem suffocat ac calcacit, do-
nec euomerit. Postquam autem leuior factus est, dolor
nullus in corpore manifestus inest, sed decoloratur. Pro-
gressu vero temporis, & dolores, & morbi fiunt. His con-
similia patiuntur etiam qui inexercitati derepente labora-
uerunt, & colliquationem carnis violentam ac multam fe-
cerunt. Hos autem sic curare oportet. De cibo detrahen-
da est tertia pars. Utendum autem cibus acerbis, & siccis, &
austeris, ac odoratis, & urinam cientibus. Cursibus vero plu-
rimis curuis in vestitu, rectis autem reuertentibus & circu-
laribus, exutis vestib⁹, frictione & lucta modica. Micatio per
summas manus commodior est quam follis. Utendum & de-
ambulationibus ab exercitiis multis, itemque matutinis. A
coena vero etiam vocis exercitatio valde comoda est. hu-
miditatis enim euacuationem faciens rarefacit carnem. Cō-
ducit & impransum degere. His autem cibus utendum est per
dies decem, deinde dimidium ablati apponendū est ad dies
sex, & vomitus faciendus. ab vnoquoque vero vomitu, ad dies
quatuor sensum adiiciendo exhibendus est cibus. Quum au-
tem dies decem à vomitu transierint, omnem detractū cibū
assumat, laboribusque ac deambulationibus deditus sit, & sa-
nus euadet. Talis autē natura copiosiore labore quam cibo
opus habet. Quidam etiā talia perpetiuntur. Secedit ipsis ci-
bus per alium liquidus inconcoctus, velut ex intestinorum
leuitate, & dolorem nullum exhibet. patiuntur autem hoc
ventres maxime qui humidi ac frigidi sunt: & propter fri-
giditatem quidem non concoquunt. propter humiditatem
vero secessus fit. Corpus igitur contabescit, alimentum con-
ueniens ac debitum non accipiens, Ventresque corrup-
puntur, & in morbos incidunt. verum prouidere oportet.
Conferat huic de cibus tertiam partem auferre. Sint autem
cibi,

*Carnosa
corpora
quæ pa-
tiuntur.*

*Desidio-
forū mor-
bus.*

*Curatio.
Quæ ex
exercitatio-
nes.*

*Vocis ex-
ercitatio.*

*Morbus
alius.*

Curatio.

A cibi, panes non fermentati ex tota farina collata, clibano cocti, aut subcinericij calidi, in vinum austerum tincti, & pisciū partes ex dorso ac cauda. Verum capitales & sub ventre finendæ sunt velut humidiores. & coctos quidem pisces in muria edere oportet, assatos autem in aceto. Vtendum etiā carnibus sale & aceto inueteratis, & caninis assatis, & de palumbæ ac reliquis eiusmodi volucribus, assatis ac coctis. Oleribus vero minime. Vino vtendum est nigro, & deambulationibus à cœna ac matutinis, à deambulatione autem dormiat. Cursibus vero curuis sensim accessione augesciente vtatur. Sit & frictio multa, & lucta tarda, & in oleo, & in puluere, quo caro concalescens reficcetur, & humiditatem ex ventre reuellat. Vngui autem magis conducit quàm lauari, impransus vero degat. Quum autem dies septem transierint, di midium cibi apponatur, & ad quatuor dies exhibeatur, & vomat. Post alios vero septem dies, omnem cibum assumat, & vomitū rursus facto, cibus eodem modo exhibeatur. Quibusdam vero aliis talia sunt. Secessus non putrefactus per aluum abit, & corpus contabescit cibus non fruens, hi vero progressu temporis in morbos incidunt. His ventres frigidi ac ficci sunt. Quum itaque neque conuenientibus cibus, neque exercitiis vtuntur, talia perpetiuntur. Conducit autē sic affecto, panibus puris furnaceis vti, & piscibus coctis eū intritis, & carnibus coctis suillis, & extremitatib⁹ percoctis, & plurimis assatis, & ex acrib. ac falsis his quæ humectāt, & saluginosis. Vinis autem nigris mollibus, & inter cibos vuis ac ficibus impleri confert. Oportet & modicum prandere, & exercitationib. plurib. vti, cursibusq; curuis sensim crescentibus, postremum aut cursib. circularibus, & post cursum lucta cum oleo: deambulationib. vero non multis ab exercitiis, à cœna vero satis est exurgere. Matutinis autem pluribus deambulationib. vtatur. Lauetur calida, & vtatur laborib. ac vntionib. somnoq; longiori indulgeat, & molliter cubet. Oportet & venere aliquo modo vri. Verum de cibus quarta pars detrahenda est, & post dies decem rursus ad consuetos cibos reducendus est. Sunt etiam quibus secessus liquidus ac putrefactus per aluum abit, & qui alijs sani sunt ac exercentur, nullum dolorem res exhibet. Quibusdam vero excluduntur ea quæ cōueniebant, progressuque temporis venter per ca-

*Morbis
alius.*

Curatio.

*Qui cibus
& exerci
citatio.*

*Morbis
alius.*

HIPPOCRATIS LIBER III.

Medela

Cibus qui

Beta res

frigerat.

Que exer-
citatio.

Vomit.

Semel cō-
edere his
confert.

Morbus
alius qui
stercoris
vomitum
facit.

lilitatem carnes attrahit, & dolorem exhibet, & cibi excluduntur, & venter exulceratur, & ipsum sistere iam operosum ac difficile est. Verum prius providere oportet, ac nosse ventrem calidum ac humidum magis quam debet esse, laborumque incommodorum excessum factum esse. Per diartam igitur frigefacere ac ficcare oportet, & primum quidem exercitia ex dimidia parte detrahare, & de cibis tertiam partem. Utatur autem Maza antea subacta, ac vino dulci emollita, & piscibus siccissimis coctis, & neque pinguib. neque falsis. Utatur & carnibus assatis volucrum, coctis quidem, palumbis ac columbæ, assatis autem perdicum & gallorum, citra condimenta. Leporinis vero coctis in aqua, itemque ferinis omnibus. Ex olerib. autem quæ frigefactoria sunt, velut beta cocta acida. Vino vero nigro austero. Gymnasis autem, cursibus circularibus velocibus, verum frictio non multa adhibeatur, sed modica, neque lucta. Micatio per summas manus, & manuum ad rythmum motus, & follis, & Volutatio in pulvere, commoda sunt, sed non multa. Deambulationibus ab exercitiis utatur sufficientib⁹ iuxta laborem, & à cœna pluribus, iuxta cibum, & mane moderate, iuxta habitum. Lauet autem tepida, ac quiescat. Sic ubi in hac diarta trāsegit dies decem, apponatur cibi dimidium, & laborum tertia pars, & vomitum faciat à cibis siccis & acerbis, & in cibo ne moretur, sed quàm celerrime vomat. à vomitu ad dies quatuor & cibus, & labor partitus exhibeatur. Vbi autē dies decem præterierint, reliquum cibi apponatur, & vinum potabile, verum labores pauciores, & ubi vomitum fecit, cibus velut scriptum est exhibeatur. Hoc vero tempore semel tantum in die cibum capere cōducit, donec malum sedetur. Aliis porro quibusdam siccus & perustus secessus fit, & os siccum, & progressu temporis etiam amarum fit, & aliud sistitur, itemque vrina. Quum enim non habeat intestinum humiditatem circa excrementum, intumescens transitus obturat, & dolorem exhibet, & calor occupat, & quicquid biberit aut edarit homo, id ipsum reuomit. Postremum vero etiā stercus vomit, atque hic nō superuiuet, quum ad hoc peruenit. Verum providere oportet ac nosse, quod caliditas & siccitas in homine prædominantur. Victum igitur ipsi constituere oportet ex maza prius subacta respersa, & pane

A ex tritico trimestri, succo furfurum fermentato. Oleribusque vtendum, exceptis acribus & siccis, atque illis coctis, & piscibus leuissimis coctis, & partibus capitalib⁹ tum piscium, tum locustarum, & mitilis, & herinaceis, & cancris, & conchyliorū succis, ipsisque liquidissimis. Carnibus autem tuillis, & extremitatibus anterioribus coctis, & hædorum & agnorum ac catulorum coctis. Piscium vero fluuiatilium ac in stagnis degentium coctis. Vino molli aquoso. Laboribus autem vtendū est non multis, neque velocibus, sed omnibus quietis. Deambulationibus vero mane vtatur, iuxta habitū sufficiētibus, & ab exercitiij laborib⁹, moderatis. à cœna verò ne deambulet

Qui nutritus.

Balneis vtatur & somnis mollibus, & prandio, & somno à prandio non longo. Pomis etiam humectantibus vnà cum cibis vtatur, & cicere viridi, ac sicco in aqua macerato. De laboribus vero prioribus dimidium detrahat etiam hic à principio, & vomitum faciat à dulcib⁹ & pinguibus ac salis, hisq; plurimis. moretur autem plurimum tempus in cibis vsque ad vomitum. Deinde cibum exhibeat ad triduum, & nō maneat impransus. Quum vero dies decem præterierint, labores sensim adiciendo augeat. & si quidem repletio inerit à cibo, aut ventris vitio, vomat: sin minus, sic reliquo tempore curetur.

Fiunt insuper etiā talia. Horrores à deambulationibus matutinis accedunt, & caput grauat⁹. Huic plures sunt deambulationes quàm modus requirit. Corp⁹ enim & caput humore euacuatum hortet ac grauat⁹. Progressu vero temporis ad febrem perueniūt horrores. Sed non hucusque differre oportet, verum prius curare hoc modo. Quamprimum aliqua signa apparuerint, vnctus ac frictus modice prandiū amplius solito faciat, & vinum multum bibat molle, deinde somno vtatur à prandio sufficienter. ad vesp⁹am vero vbi exercitiis leuibus vsus est, calidāque lotus, consueto more cœnet. deambulationib⁹ autem à cœna ne vtatur, verum ad tempus differat. Postridie in aqua lauetur, & somnis mollibus tempus transigat. Et per dies quinque paulatim ad consuetos cibos ac labores procedat. Sunt aut quidam qui horret ex gymnasiis, & quum se exuunt donec decertent, vbi vero perfrigerati sunt, rursus horrent, & fridor dentium tremulus corpus occupat, somnūque talis grauat⁹. Vbi autem expergiscitur, sæpe oscitat, & à cœna palpebra ipsi graues sunt. progressu vero tem-

Morbus alius.

Medela que.

Morbus alius.

HIPPOCRATIS LIBER.

ro temporis etiam febres malignæ accedunt. Verum cauere D
oportet, & non hucusq; differre, sed prius curare hoc modo.
Curatio. Primum quidem ab omnibus exercitiis dimidium auferatur.
Cibis vero omnibus humidioribus ac frigidioribus vtatur, &
potibus mollioribus ac dilutioribus. Vbi vero præterierint
dies quinque, tertia pars laborum ablatorum apponatur. Ci-
bis vero iisdem vtatur. Post alios autem quinque dies, dimi-
dium reliquorum laborum apponatur. Et rursus post alios quin-
que, oēs labores & leuiiores & pauciores reddito, vt ne rursus
Cur hæc excessus fiat. Nam his qui hæc signa perpetiuntur, labores ma-
fiant. iores sunt quàm cibi. Ad æquare igitur hæc oportet. Quidam
vero non hæc patiuntur, sed aliqua ex his, aliqua vero non. In
omnibus autem his signis, labores superant cibos, & curatio
eadem est. Et confert his calida lauare, ac molliter cubare, &
semel atque iterum inebriari, verum non vique ad excessum,
& venere vti, vbi excessus contigerit, & segnem esse ad labo-
res. Deambulationes autem in totum non sunt faciendæ.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE INSOMNIIS,

Iano Cornario medico phy-
sico interprete.

*Que per
somnia sūt*



Visquis de his quæ in somnis ob-
ueniunt recte coniectat, is magnā
habere vim ad omnia, ipsa repe-
riet. Anima enim vigilat, & quum
quidem corpori inseruit, in multas
partes distributa, non sui iuris est,
sed partem aliquam singulis cor-
poris partibus siue sensibus distri-
buit, auditui, visui, tactui, gressui,
actioni, ac omni corporis faculta-
ti. Ipsa autem animæ cogitatio sui iuris non est. Quum autem
corpus quiescit, anima in motu est, & corporis partes perre-
ptans, de-

- A**ptans, domum suam gubernat & omnes corporis actiones ipsa perficit. Nam corpus dormiens non sentit, ipsa vero vigilans cognoscit, ac visibilia videt, & audibilia audit, vadit, tangit, tristatur, animaduertit. In summa, quaecumque corporis aut animæ munia, ea omnia anima ipsa in somno obit. Quicumque igitur hæc recte iudicare nouit, magnam sapientiæ partem nouit. Quaecunque quidem igitur somnia diuina sunt, & quedam euentura significant, aut urbibus, aut populo priuato, siue bona, siue mala, non ob ipsorum delictum, de huiusmodi sunt qui iudicant certam artem habentes. Quæcunque autem corporis affectiones sunt, & anima per ipsas repletionis aut euacuationis rerum à natura insitarum excessum, aut contruentionum mutationem præmonstrat, de his quidem itidem iudicant, & partim assequuntur, partim aberrant, & de neutris recte sentiunt, cur nam fiant: neque sciunt quando assequuntur, neque quando aberrant, cauere admonentes ne quid mali accidar. Atque hi non docent quomodo cauere oporteat, verum diis supplicare iubent. Et supplicare quidem decorum ac valde bonum est. Oportet autem etiam ipsum opitulari, & deos inuocare. De his igitur res hoc modo se habet. Quæcunque Insomnia mens hominis in noctem per somnum offert de diurnis actionibus, & reddit quo modo facta sunt, ea quæ seria ac iusta in re per diem facta sunt, aut de quibus consiliū initum est: hæc homini bona sunt, sanitatem enim significant propterea quod anima in diurnis consiliis perseuerat, neque repletionem, neque euacuationem, neque aliqua alia forinsecus allapsa re, victa. Quum autem Insomnia diurnis actionibus aduersantur, & de ipsis pugna oboritur, quum sanè hoc contigerit, turbationem in corpore significat. Et si quidem fortis fuerit, forte est malum: si vero leuis, debilius. De actione quidem igitur, an auertenda sit, siue non, nihil decerno. Verum corpus hominis curari consulo. Repletionem enim aliqua intus facta, secretio quædam contigit quæ animam perturbauit. Si igitur fortis fuerit contrarietas, vomitū facere conducit, & cibos leues exhibere sensim adiiciendo aliquid ad dies quinque, & deambulationibus multis ac velocibus sensim augescentibus uti, & exercitiis exerceri moderatis, pro ciborum assumptorum ratione. Si vero debilior fuerit contrarietas, detractio vomitu, tertiam cibi partem adime, atque hanc sensim

*Quantū sit
somnia nos
uiffe.*

*Quæ cōic-
tiones non
assequan-
tur.*

*Sōnia per
spicito.*

*Quæ bona
& contrā.*

Curatio.

HIPPOCRATIS LIBER.

Sol luna
st: ille quid
portendat
in somno
uise.
D
 sensum rursus ad dies quinque adice, & deambulationibus
 preme. Sed & vocis exercitiis utatur, & diis supplicet, & tur-
 batio ipsi sedabitur. At vero solem & lunam, & cælum ac stel-
 las, pura atque agilia solito more videre, singula bona sunt.
Que nutri-
catio.
Luna per
somni pa-
ti uise
quid por-
tendat.
Quid sol.
E
 Sanitatem enim corpori significant ab omnibus præsentibus.
 Verum talem habitum præsentis diæta cõseruare oportet. Si ve-
 ro quid cõtrarium his fiat, morbum quendam corpori significat:
 à fortibus quidem, fortiorem: à debilioribus vero, leuiorem.
 Et astrorum quidem exterior est in corpore circuitus, solis ve-
 ro medius, lunæ autem ad cauitates, Quodcunque igitur ho-
 rum astrorum extingui, aut lædi, aut disparere, aut sisti à cir-
 cuitu suo videtur, iuxta illam ipsam partem morbum redun-
 dare significat: & si quidem ab aere, aut nebula, aliquod ex ip-
 sis astris pati quid horum videt, debiliorem: si vero ab aqua,
 aut grandine fortiorem. Significat autem secretionem in
 corpore humidam ac pituitosam factam esse, & in externam
 circūferentiam illapsam esse. Conducit itaque huic & cursi-
 bus in omni vestitu uti multis, sensum augescentibus, ut quàm
 maxime exudet. Item deambulationibus ab exercitio multis
 citra prandium uti, & detracta ciborum tertia parte, ad dies
 quinque, sensum adiuciendo rursus exhibere. Si vero fortius vi-
 deatur malum esse, etiam fomentis uti. nam per corporis cuti-
 culam purgationem facere expedit, propterea quòd in exter-
 na circūferentia offensa ac læsio existit. Cibis vero vtendum
 est siccis, acribus, austeris, meracis, & laboribus maxime siccā-
 tibus. Si vero quid horum luna patiarur, reuulsionem intro-
 facere conducit, utique vomitu ab acribus, & saluginosis, ac
 mollibus cibis, cursibus autem circularibus celeribus, & deam-
 bulationibus velocibus. Vtendum & vocis exercitiis, & pran-
 dium auferendum, cibi quæ detractiōe, ac rursus appositione,
 eodem modo vtendum est. Ob id autem intro reuellendum
 est, quia ad cauitates corporis offensa apparet. Si autem sol tale
 quid pati videatur, fortius iam malum est, & difficilius exigi
 potest. Oportet autem in vtranque partem reuulsiones face-
 re, & rectis cursibus, & curuis, & circularibus uti, & deambu-
 lationibus, & aliis laboribus omnibus. Ciborum autem detra-
 ctione, ac rursus appositione, eodem modo. deinde vomere,
 & rursus sensum cibos augere, ad dies quinque. Si vero fe-
 renitate existente premantur hæc, & debilia esse videantur,
& præ

- A** & præ ficitate à circuitu suo impediri, periculum significant delabendi in morbum. Verum oportet labores detrahere, & diata humectiore ac molli uti, & balneis ac ocio ampliori, & somno longo ac multo, donec malū sedetur. Si autem igneū ac calidum esse videatur quod se illis opponat, bilis secretionem significat. Si vero superata hæc dispareant ac evanescent, periculum est ad mortem perueniendi ex morbo. Si vero verfa ac mutata hæc esse videantur, præsentem statum in fugam verti significant. Fugere autem ipsa celeriter, esseque qui ea persequantur, periculum denunciant futuræ infantiæ hominis, si non curatus fuerit. Omnibus autem his conducit, ut veratro purgati, optimā victus rationem instituāt. sin minus, ut victu ad aquam tendente utantur. vinum vero non bibāt, aut omnino album, tenue, molle & aquosum. Abstineant autē ab acribus, resiccantibus, calfacientibus, ac saluginosis. Laboribus secundum naturā plurimis utantur, & cursibus in vestitu plurimis. Frictio vero ne fiat, neque lucta, neque volutatio in pulvere. Somnis utatur mollibus, & in ocio degat, exceptis laboribus naturalibus, à cœna deambulet. Bonum est & fomentis uti, à fomentis vero vomere, per triginta vero dies nō repleatur. Quum autē repletus fuerit, bis in mense vomat à dulcibus & aquosis ac leuibus. Quæcunque autem ex his aliās aliō præ nulla necessitate errant, animæurbationem quandā præcure significant. Confert autem huic ocium, & animum conuertere ad spectacula, maxime risum mouentia: quod si fieri nō possit, ad id ex quo ad biduum aut triduum maxime voluptatem capiat, & sedabitur. Sin minus, periculum est delabendi in morbum. Quæcunque astra ex circūferentia excidere videntur, suntque pura & splendida, & ultra ac prorsum ferri videntur, sanitatem significant. Quicquid enim in corpore parū ex circuitu excernitur secundū naturā, à vespere in aurorā: id ipsum recte habet. Nā & quæ in vêtre secernunt, & quæ in carnē eructantur, omnia ex circuitu ac circūferentia excidunt. Quæcunque vero nigra & obscura sunt, & ad vespere ac occasum ferri videntur, aut in mare, aut in terrā, aut sursum, ea magis morbos significant. Et quæ quidē sursum feruntur, fluxum capitis significant. Quæ vero in mare, ventris morbos. Quæ in terram, tubercula maxime significant ex carne enascentia. His conducit tertiā cibi partē detrahere, & à vomitu, ad dies quinque

Diversitate somnorum observato.

Pura videri astra quid portendat.

HIPPOCRATIS LIBER

quinque eandem rursus sensum adiiciendo exhibere, in aliis D
autem quinque diebus cibos omnes assumere, & vomitu fa-
cto, rursus eodē modo cibus sensum auctus exhibeatur. Que-
cunque vero ex his pura & candida in cœlo herere videbū-
tur, sanum esse significant, quia quod in hominem descendit
ex æthere est. Tale autem videt anima, quale sanè descende-
rit. Quæ autem nigra fuerint, & non pura, neque conspicua,
morbum significāt, nō propter repletionem, neque euacua-
tionem, sed forinsecus inductum. Huic confert cursib. cir-
cularibus velocib⁹ uti, quo quā minima corporis colligua-
tio fiat, & spiritu quā densissimo vtens, id quod inductum
est excernat à cursibus autem deambulationibus celeribus
utēdum est. Viētus autem mollis & leuis ad dies quatuor of-
feratur. Quicquid porrò à deo accipere quis sibi videtur E
purum, bonum est ad sanitatem. Significat enim ea quæ in
corpus ingesta sunt pura esse. Quicquid vero huic contrariū
videre quis putat, non est bonum. Morbum enim in corpus
venisse significat. Oportet igitur velut priorem etiam hunc
curari. Si quis se complui putet clementi cœlo, aqua mol-
li, & non valde madefieri, neque vehementem tempestatem
ingruere, bonum est, significat enim moderatum ac purum
spiritum ex aere ingressum esse. Si vero vice versa, valde
complui quis sibi videatur, & tempestatem ac turbinem esse,
idquæ aqua non pura, morbum designat à spiritu qui in ipso
est. Verum oportet etiam hunc simili diætā uti, & omnes
hos pauco cibo ali. De significationibus quidem igitur a-
strorum sic iudicare oportet, prouidereque ac diætā statue-
re, & diis supplicare, in secundis quidem rebus Soli, Ioui cœ-
lesti, Ioui possessori, Mineruæ opulentæ, Mercurio, Apollini. F
In contrariis vero, diis malorum auerforibus, & terra, & he-
roibus, quo mala ac grauiā omnia auertant. Cæterū & hæc
sanitatem præsignant. Nimirum ea quæ in terra fiunt, acute
videre, & audire, & secure iter facere, & secure ac citra ti-
morem currere. & videre terram leuem ac probe cultam, &
arbores florentes, fructuosasque ac satiuas, & flumina solito
more fluentia, & aqua pura, neque copiosiore, neque paucio-
re quā cōueniens est. Item fontes & puteos eodem modo.
Hæc omnia sic visa, sanitatem homini designant, & corpus
recte habere, omnesque circuitus, & exhibitiones ciborum,
ac secre-

*Quid puri-
tas acris.*

*Cum deus
quid dat.*

*Quid plu-
uia secre-
na.*

*Quibus
diis suppli-
candum.
Diuerſa ui-
ſa.*

A ac secretiones, integras esse. Si vero quid his contrarium videatur, detrimentum aliquod in corpore significat. Et visus quidem ac auditus læsus, morbum circa caput significat.

Itaque matutinis deambulationibus, itemque à cœna pluribus utendum est, ad superiorem diætam. Cruribus vero læsis, vomitibus reuellendum est, & lucta ampliore utendum, ultra superiorem diætam. Terra autem aspera, carnem nõ puram significat. quare deambulationibus ab exercitiis pluribus utendum est. Arborum vero sterilitas, seminis humani corruptionem indicat. Si igitur folia arboribus decidant, ab humidis ac frigidis corpus læditur. Si vero floridæ sint arbores, verum infructuosæ, à calidis & ficcis. hæc igitur per diæt-

Medela.

B tam frigefacere ac humectare oportet, illa vero siccare ac cal facere. Flumina autem non solito more fluëtia, sanguinis circuitum significant, & auctiora quidem fluëtia, excessum; imminuta vero, defectum. Oportet itaque per diætam hũc quidem augere, illum vero imminuere. Non pura autem fluenta, turbationem significant, quæ à cursibus circularibus & deambulationibus, corpore per densum spiritum moto, purgatur. Fontes vero & putei commoti conspecti, flatus circa vesicam significant, quos medicamentis urinæ cientibus expurgare oportet. Mare perturbatum, ventris morbum significat, sed oportet alium mouentibus, leuibusque ac mollibus expurgare. Terram aut domum moueri videre, sano quidem viro debilitatem significat, ægrotanti vero sanitatẽ,

Cursus fluminis per somnũ visus quid uelit.

Fontes, putei.

Mare.

Motus terræ uel domus.

C & ex præsentī statu transmotionem. Sano itaque transmutare diætā conducit, Itaque primum vomat, & rursus, ubi paulatim cibum assumpsit. à præsentī enim diætā totum corpus mouetur. debili vero eadem diætā uti conducit. Nam corpus ex præsentī statu transit. Terram ab aqua aliqua aut mari inundatam videre, morbum significat, humiditate multa in corpore existente. Verum oportet vomitibus, & prandij detractione, & laborib⁹ & sicco victu uti, deinde sensim adiiciendo, ac modico cibo renutrire. Sed neque nigram, neq; cõbustam terram videre bonum est, sed periculum est delabendi in fortem ac lethalem morbum. Siccitatis enim excessum in carne esse significat. Verum oportet & labores detrahare; & cibos qui sicci & calidi, & acres ac urinam cientēs sũt; nutrireque pitãne succo decocto, & omnibus mollibus ac leui-

Terræ inundatio.

Terræ nigrae perustaeque solum bonum non est.

bus mo-

HIPPOCRATIS LIBER

bus modicis: & potu uti aquoso, albo, copioso: & balneis multis calidis, sed ieiunus ne lauet, molliter cubet ac dormiat, & in ocio degat. frigus & solem vitet. Supplicet autem terra, & Mercurio, & Heroibus. Si vero in stagno, aut in mari, aut in fluminibus natare quis sibi videatur, non est bonum, humiditatis enim excessum significat. Cōfert autem huic & diætā sicca, & laboribus uti. febricitanti vero id bonum est, extinguatur enim caliditas ab humoribus. Quicquid porro quis circa seipsum videt solito more fieri, ad naturam suam ipsius, neque maius, neque minus, bonum est ad sanitatem. Et vestitum album indutum esse, & calciamentum pulcherrimum, bonum est. Quicquid vero membris maius fuerit, bonum non est, sed neque quodcumque tandem fuerit minus: & oportet hoc quidem per diætā augere, illud vero minuere. Nigra autem morbosiora sunt, & periculosa. Mollire itaque oportet & humectare. Noua quoque transmutationem significant. Mortuos videre puros in vestibus albis, bonum est, & accipere aliquid ab ipsis purum, bonum est. Sanitatem enim significat corporum, & salubritatem ingestorum. à mortuis enim nutrimenta, & incrementa, ac semina fiunt. Hæc autem pura in corpus irrepere, sanitatem significat. Si vero contra quis videat ipsos nudos, aut nigris vestibus indutos, aut non puros, aut aliquid accipientes, aut ex domo portantes, non est commodum. Morbum enim significat, quæ enim in corpus ingeruntur, nociua sunt. Verum oportet cursibus, circularibus & deambulationibus depurgari, & alimēto molli ac leui à vomitu sensum nutriri. Quæcunque vero formæ peregrinæ corpora in somnis apparent, & hominem perterrent, ciborum in consuetorum repletionem, & secretionem, & bilis superne ac inferne eruptionem, & morbum periculosum significat. Verum oportet vomitum facere, & ad dies quinque cibos quæleuissimos non multos, neque acres, neque siccos, neque calidos sensim adiiciendo accipere, & laboribus naturalibus maxime uti, exceptis deambulationibus à cœna. Utendum etiam balneis ac calidis lauacris, & ocio. Solem vero & frig⁹ vitet. Si vero quis per somnum edere aut bibere consuetos cibos ac potus sibi videatur, inopiam alimenti significat, & animæ tristitiam. Et si carnes robustissimas quis edere se putet, maximum alimenti excessum designat. Si vero debilissimas,

A. firmas; minorem. Quemadmodum enim id quod editur bonū est, Sic etiam id quod videtur. Cibos igitur detrahare conducit. Nam alimenti excessum hoc significat. Sed & panes ex caseo ac melle facti per somnum comesti, similiter significant. Aquam autem puram bibere bonum est, reliqua omnia nociua sunt. Quæcunque homo ex consuetis ac familiaribus se videre putat, ea animæ concupiscentiam significant. Quæcunque vero fugit perterrefactus, tanguinem fisti ac præ siccitate coerceri significant. Confert itaque frigefacere ac humectare. Quum vero quis pugnat, aut pungitur, aut ab alio ligatur, secretionem circuitui contrariam corpori contigisse significat. Conducit igitur vomere, & attenuare ac deambulare, & cibis leuibus uti, & à vomitu ad dies quinque sensim renutrire. Quin & oberrationes & ascensus in somnis visi, grauius significant. Fluminum transitiones, & hostes armati, monstra formæ peregrinæ, morbum aut insaniam significant. Confert itaque his qui talibus insomniis vexantur, cibis modicis uti leuibusque ac mollibus, itemque vomitibus, atque sic sensim rursus ad dies quinque cibum exhibere. Utendum & laboribus naturalibus multis, præterquàm à cœna, Calida lauacra, & ocium, frigusque ac solem vitent. Qui igitur his quemadmodum conscripta sunt utetur, vitam sanus deget, & inuenta est sanè à me hæc ipsa diæta, quantum possibile est humano ingenio excogitare, diis auxiliantibus.

Aque potio.

Diuersa somnia aspicito.

Inuentum Hippocratis.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE ALIMENTO,

Iano Cornario medico physico interprete.

Hunc librum Galenus Hippocratis esse negat. Sed tamen non alicuius plebei ac vulgaris hominis esse dicit, & fortassis ipsius Thess. li. Quidam Herophilum autorem putant.

Alimentum



Limentum & alimenti species, vñũ & multæ, vñũ quidem, quatenus vñũ genus est. Species vero humiditate ac siccitate finitur. & in his formæ, ac quantitas est, & ad quædam, & ad tot. Auget autẽ, & corroborat, & incarnat, & assimilat, & dissimilia facit quæ in singulis sunt, iuxta vñuscuiusque naturam ac facultatem quæ ab initio

adeft. Assimilat autem pro viribus, quum id quod superingeritur superatur, id vero quod prius inest superat. Exile autem fit aliquando quidem prius, in tempore dissolutum aut insuper appositum, aliquando vero posterius, in tempore dissolutum aut appositum. Destruit autem vtrunque in tempore & post tempus, id quod extrinsecus assiduo superingestũ est, & per multum tempus omnibus membris solide implicatum est, & propriam quidem formam producit, priorem vero, aliquando autem & priores, destruit. Facultas porrò alimenti peruenit & ad ossa, & ad omnes partes, & in neruum, & in venam & in arteriam, & in musculum, & in pelliculam, & carnem, & pinguedinem, & sanguinem, & pituitã, & medullam, & cerebrum, & medullam spinalem, & interanea, omnesque ipsorum partes, & sanẽ etiam in caliditatem, & spiritum, & humiditatem. Alimenti vero & id quod hoc nutrit, alimentum est, & quod velut nutrimentum est, & quod nutrimentum futurum est: Principium autem omnium vñũ est, & finis omnium vnus. & idem finis est atque principium: & quæ particulatim in alimento probe & male distribuuntur. Probe quidem, quæ prædicta sunt. Male vero, quæ contrarium his ordinem habent. Succi varij, & coloribus, & viribus, & in detrimentum, & in vtilitatem, & neque lædentes, neque commodantes, & multitudine, & excessu, & defectu, & implicatione, aliquorum quidem, aliquorum vero nõ. Et omnium caliditatem lædunt ac iuuant, & frigiditatem lædunt ac iuuant, & facultatem lædunt ac iuuant. Facultatis autem varix naturæ sunt. Succi corrumpentes & totum, & partem, & forinsecus ac intrinsecus, spontanei & non spontanei, Nobis quidem spontanei, causæ vero non spontanei.

Rursus

*Ciborum
vis.*

*Succorum
vis.*

- A** Rurſus autem cauſæ, aliæ manifeſtæ, aliæ obſcuræ, & aliæ poſſibiles, alię impoſſibiles. Natura omnibus ſubuenit. Ad hanc vero forinſecus quidem cataplaſma, Illitio, Vnguentū, Nuditas & totius & partis. Caliditas & frigiditas, iuxta eandem rationem & Adſtriſtio, & vlceratio, & morſus, & corroſio. Intrinſecus vero & quædam ex prædictis, & ſupra hæc cauſa obſcura, & parti & toti, & alicui & non alicui, excretiones ventris ſecundum naturam, item vrinarum, ſudoris, ſaliæ, muci, vteri, iuxta hæmorrhoidas, verrucam, lepram, tuberculum, carcinoma, ex naribus, ex pulmone, ex ventre, ex ſede, ex cole, ſecundum naturam, & præter naturam. diſcrimina horum aliis iuxta aliam rationem, aliquando etiam aliter. Vna natura ſunt hæc omnia, & non vna. Multæ naturæ ſunt hæc omnia, & non vna. Medicina ſurſum & deorſum, & neque ſurſum, neque deorſum. In alimento medicina, optimum. In alimento medicina malum. Malum & optimum ad aliquid. Vlcus, cruſta, ſanguis, pus, ſanies, lepra, furfur, vlcera capitis manantia, impetigo, vitiligo, lentigo, aliquando lædit, aliquando prodeſt. aliquando neque lædit, neque prodeſt. Alimentum, non alimentum. Si nutrire nō poteſt, nomen eſt alimentum, non opus. Opus & res eſt alimentum, nō nomen. In pilos alimentum, & in vngues, & in extremam ſuperficiē intrinſecus peruenit. Forinſecus alimentum ex extrema ſuperficie, ad intima peruenit. Confluxio vna, conſpiratio vna, Conſentientia omnia. Iuxta totius quidem corporis naturæ omnia, iuxta partem vero, partes in vnaquaque parte ad op^o. Principium magnum ad extremam partem peruenit. Ex extrema parte ad magnum principium peruenit. Vna natura, eſſe, & non eſſe. Morborum differentiæ, in alimēto, in ſpiritu, in calore, in ſanguine, in pituita, in bile, in humoribus, in carne, in pinguedine, in vena, in arteria, in neruo, musculo, pellicula, oſſe cerebro, medulla ſpinali, ore, lingua, ſtomacho, ſiue gula, ventre, inteſtiniſ, ſepto tranſuerſo, peritonæo membrana aluum ac inteſtina amplectente, hepate, ſplene, renibus, veſica, vtero, cute. Hæc omnia & ſingulatim & particularim. Magnitudo ipſorum magna, & non magna. Signa, titillatio, dolor, ruptura, mens, ſudor, vrinarum ſubſidētia, quies, iactatio, viſus, imaginationes, morbus arquatus, ſingultus, morbus comitialis, ſanguis integer, ſomnus. & ex his,
- r & ex aliis

Cauſæ
uariæ.Cauſa nō
ſemper pa
tet.Medicina
uariæ.

Alimentū.

Mira &
breuis di
ſcurſio mē
brorum.Signa lē
guentis.

HIPPOCRATIS LIBER

Signa ob- & ex aliis naturalibus, & quæcunque alia huiusmodi ad de- **D**
seruanda. trimentum & vtilitatem procedunt. Labores totius & par-
tis. Et magnitudinis signa, alterius ad maius, alterius ad mi-
nus, & ab utrisque ad maius, & ab utrisque ad minus. Dulce
non dulce. dulce ad potentiam, velut aqua. Dulce ad gustum,
velut mel. Signa vtrorunque, vlcera, oculi, & gustus. & in his
magis & minus. Dulce ad visum, & in coloribus, & in aliis
mixturis. Dulce magis & minus. Raritas corporis ad perspi-
rationem, quibus amplius aufertur, saniores sunt. Densitas
corporis ad perspirationem, quibus minus aufertur, morbi-
diores. Qui probe perspirant, debiliores & saniores sunt, & à
morbis facile reconualescunt. Qui male perspirant, priusquàm
ægrorent, fortiores sunt. Vbi autem ægrotarunt, difficilius à **E**
morbis reconualescunt. Hæc autem & toti & parti. Pulmo
contrarium corpori alimentum trahit, reliqua vero omnia
idem. Principium alimenti spiritus, nares, os, guttur, pulmo,
& reliqua respiratio. Principium alimenti & humidi &
ficci, os, gula, venter. Verum antiquius & primordiale ali-
mentum, per abdomen vmbilicus. Radicatio venarum he-
par. Radicatio arteriarum cor. ex his aberrant in omnia fan-
guis & spiritus, & calor per hæc meat. Vis vna & non vna,
qua omnia hæc & alia gubernantur. alia quidem ad vitam
totius & partis, alia ad sensum totius & partis. Lac nutriti-
um, quibus videlicet secundum naturam alimentum est, a-
liis vero non. Aliis autem vinum alimentum est, & quibusdā **I**
non alimentum. Et carnes, & aliæ multæ alimenti species, &
iuxta regionē & iuxta consuetudinem alunt, partim ad aug-
mentum, & ad esse. partim ad esse solum, velut in senibus.
Quædam vero supra hæc, etiam ad robur. Dispositio A-
thletica non est à natura. Habitus sanus melior in omnibus.
Magna res est quantitas ad vires solerti ratiocinatione, ado-
prata. Lac & sanguis alimenti sunt redundantia. Circuitus
ad multa consoni sunt, ad foetum eiusque alimentum. Rursus
autem sursum repit in lac, & in alimentum, & ad infantem.
Viuiificantur non animalia, viuiificantur animalia. Viui-
cantur partes animalium. Naturæ omnium nullo doctore
vsæ sunt. Sanguis alienus vtilis. Sanguis proprius vtilis. Sâ-
guis alienus nocius. Sanguis proprius nocius. Humores
propriij nociui. Humores alieni nociui. Humores alieni cō-
ducibiles.

A ducibiles . Humores proprii conducibiles. Cōsonans dissonans est. Dissonans consonans est. Lac alienum bonum . Lac proprium nocium . Lac alienum nocium . Lac proprium commodum. Cibus iuuenibus facile ac leuiter putrefactus . Senibus vero ad summum transmutatus . His qui in vigore ætatis consistunt impermutabilis. Ad figurationem, soles triginta quinque . Ad Motum , septuaginta . Ad perfectionem, ducenti & decem. Alij tradunt. Ad formam, quadraginta quinque. ad motum , septuaginta sex. ad exitū, ducenti & decem. Alij sic. Ad formam, quinquaginta. ad primum saltum, centum. ad perfectionem, trecenti. Alij sic. Ad discriminationem, quadraginta . ad transitum, octoaginta. ad elapsum , ducenti quadraginta. Non est , & est. Gignuntur autem in his & plures & pauciores, secundum totum, & secundum partes. Nō multo autem plures aut pauciores. pauciores vero tot, & quæcunque alia his similia.

*Lac uari-
riat.
Digestio
per ætas-
tes.
Partus cō-
formatio.*

B Ossium alimentum ex contractione. Naso bis quinque. Maxilla & clauicula, & costis duplicia . cubito triplicia. Tibiæ & brachio quadruplicia. fœmori quintuplicia. Et si quod in his plus aut minus potest. Sanguis humidus & sanguis solidus . Sanguis humidus bonus . Sanguis solidus malus.

*Quota esse
suum coas-
lescentia.
Sanguinis
alia uari-
tio.
Cibariorū
uariatio.*

C Ad aliquid omnia mala & bona sunt. Via sursum deorsum vna . Potentia alimenti melior quàm moles . Moles alimenti melior quàm potentia . Et in humidis & in siccis detrahit & apponit idem. & alteri quidem aufert, alteri vero apponit idem. Venarum pulsationes, & respiratio spiritus, iuxta ætatem, & consonantia & dissonantia sunt, & morbi & sanitatis signa . & sanitatis magis quàm morbi, & morbi magis quàm sanitatis. Alimentum enim etiam spiritus est.

*Pulsus spi-
ritus, si-
gni sani-
tatis &
morbi.*

Humidum alimentum magis facile transmutatur quàm siccum. Siccum alimentum facilius transmutatur quàm humidum. Alimentum quod ægre alteratur, ægre consumitur. Quod facile apponitur, facile consumitur. Et quicunque veloci appositione opus habent, his humidum ad reficiendas vires medicamen optimum. Quicunque vero adhuc velociori indigent, per olfactum. Qui autem tardiore appositione opus habent, solido alimento vtantur. Musculi solidiores ægre magis quàm alia colliquesunt, excepto osse & neruo. Quæ denudata sunt ægre transmutantur, & secundum ge-
r ij nus ipsa

HIPPOCRATIS LIBER

nus ipsa seipsis fortiora sunt quam pro re ipsa: propterea ipsa seipsis ægrius colliquefunt. Pus ex carne, purulentum ex sanguine, & ex alia humiditate. Pus vlcis alimentum ossis, propterea callo obducuntur. Facultas & potentia omnia auget & nutrit, & germinare facit. Humiditas alimenti vehiculum est.

HIPPOCRATIS COI


LIBER DE HUMIDORVM

siue liquidorum usu, Iano

Cornario medico phy-

sico interprete.

Aqua.



*Oculorum
medela.*

Qua potabilis, saluaginosa, mare, potabilis quidem in officina medica optima. Nam & fermentis & æramenis optima, & medicamentis plurimis inueteratis communissima. Verum ad corpus nosse oportet, quod hæc aut madescit, aut frigefacit, aut calfacit. Aliter vero nulli commodat aut detrimento est potata. Vbi modica potabili in spongia vteris, optimum oculis est. Cutis ipsa superne exulceratur calidæ aspersione. Fomentum corporis totius aut partis. Cutis duræ mollitio, distentæ laxatio, neruorum, carnium, humorum sub cutem effusio, sudoris secretio. Humectare prolatione, velut nares, vesicam, flatus. Incarnare, attenuare, liquefacere, minuere, colorem reuocare, colorem dispergere. Somaiferum & in caput, & in alia. conuulsionum, tensionum, mitigantium dolores stupefacit auris, oculorum, & quæcunque talia. frigida calfacere, velut pix vlcibus, præterquam à quibus sanguis erumpit, aut erupturus est, fractis, luxatis, reliquis quibus linteola sunt medicus, Capitis grauitati. Moderatio in vno quoque, ne vltra torquea-

A torqueamus, velut calida corpori, ex excessu in vtrâque partem, vt ab vtrâque non aberret, coniectatione ex deiectione, aut inutili facta, velut in tepida. Oportet enim deiectionis aut vtilitatibus etiam si sint vti, visquequo iuuent, aut donec lædant. Madefactio itaque & humectatio, debile quid est. Frigefactio vero & calfactio, forte: velut ex sole.

Madefactio.

Frigefactio.

Calfactio.

Verum frigida calida existens, velut potabilis aqua, debile quid est. Calida autem ne vltius pergat, vt vratur. Iudicat autem de his ipse ægrotus, exceptis mutis, aut leuiter syderatis, aut stupefactis, aut velut in vulneribus, perfrigeratis, aut nimio dolore vexatis. his enim hæc sensu non percipiuntur. Nam non sentiunt hi perusti. Itemque profundæ ac magnæ luxationes. iam vero etiam pedes deciderunt perfrigerati, ex calidâ perfusione. Sed his corpus perfusi iudex est, similiter etiam frigida. Harum aut vtrarumque paucitas, debile quid est. Multitudo vero, forte, veruntamen finire oportet, donec fiat id cuius gratia fiunt. antea vero quam postremum fiat, cessandum est. Harum porro vtrâque lædit, & calida quidem amplius ea videntibus has læsiones inducit, carniū effeminationem, neruorum debilitatem, mentis stuporem, sanguinis eruptiones, animi deliquia hæc ad mortem. Frigida vero conuulsiones, tensiones, nigrores, rigores febriles. Mediocritas quidem extra noxam est. Reliqua vero lædunt ac profunt, velut relatum est. Voluptatibus, & iucunditatibus, & doloribus ac molestiis, prout singula ex ipsis conueniunt, ita facili apparêt. Corpus tegi ac velari aduersum, quicquid insuetum est, quicquid longissime à familiari calore abest, & peregrino frigori propinquissimum, id ipsum auersatur: & propterea sanè calida gaudet, & ferre potest. Cerebrum & quæ ab hoc oriuntur, frigida quidem tristantur, calida vero gaudent, si sanè frigidius & solidius à natura fuerit. Propterea ossibus, dentibus, neruis frigida inimica. calida vero amica, quia ab illa conuulsiones, tensiones, rigores febriles, quæ sanè frigida facit, calida vero sedat. Ob id etiam à calida voluptates, & illecebræ, à frigida vero dolores & uersiones. Ideoque spina, pectus, dorsum, præcordia, magis frigida aggrauantur. calida vero gaudent, & ferre ipsam possunt. propterea sanè spina, pectus, dorsum, præcordia contraria perpeffa sunt, quia sunt contraria. Propterea sanè in hoc loco an-

Calida corporis profundi uultus quid patitur.

Ossibus, dentibus, neruis frigida inimica.

HIPPOCRATIS LIBER

xietatem ex calida obortam, frigida sedat. propterea sanè D
 frigida potu gaudet. propterea sanè cibis calidis delectatur.
 propterea sanè & in animi deliquiis frigida extremis parti-
 bus affundere prodest. Quod autem posteriores partes cali-
 dam magis fufferūt quàm anteriores, quæ relata sunt in cau-
 sa sunt. Quod verò etiam frigida, recte habet. Nam & extre-
 mæ partes anteriores sunt, & tegi non adueta: velut etiam
 interna pars se habet ad externam. Cogitandum autem quod
 vtraque in vnoquoque corpore potior est externa cute, quæ
 & sibi ipsi, & neruo sanguineo cõtina ac cohærens, eo quod
 extra proprium calorem, in externo frigore est, ab vtrisque
 frequenter superatur, & vtrisque frequenter opus habet, fre-
 quentius autem calida ad voluptatem. Per petiuntur autem E
 & extremæ partes tale quid, quare cito multa percipiunt, tar-
 de autem primum attolluntur. Et venæ quoque aliæ prius,
 aliæ posterius. Atque sic omnia apparent, & vbi frigesunt
 extremæ partes, & vbi calefiunt, in vasorum euacuationibus,
 in animi deliquiis. Et iuxta rationem merito etiam venas se-
 quuntur, ea quæ ab his eueniunt. Et calefacit primum calida,
 velut in manibus, internas partes. At viscera calida gaudent
 ex confesso, quia tegi adueta sunt. Merito itaque altera gra-
 uatur. Merito igitur & ipsæ venæ, quia sunt in calido. Merito
 etiam ipse thorax, & ventriculus ipse à frigida superatus, mo-
 leste fert, & mortem minatur, quia maxime desuetus est. Ve-
 rum plurimum abest ab eo vt patiatur: propinquissima autè F
 inter se sunt, egere, & pati. Merito igitur frigida potu dele-
 ctatur. Et sic consentiunt inter se omnia hæc. Quod verò o-
 mnia desquamata & ambusta in superficie, nō valde tegi ad-
 ueta, maxime frigida moleste ferunt, par est. Citissime enim
 superantur. Et profundissima si superentur, maxime vtiq-
 ue grauentur. deinde etiam natura neruosa participat. Quo-
 niam imus venter calida delectari videtur, considerandus lo-
 cus est, & postea extremæ partes, & vesica, & genitales par-
 tes, & virilis membri glans natura frigidior est, quàm quis pu-
 tat. Sursum enim non deorsum exilit caliditas: & propterea
 calida delectatur. Considerandum etiam, quod post calidam
 frigescit corpus magis perfrigeratum: post frigidam vero re-
 calefcit magis cõtarium: velut etiā aquæ frigefaciendæ & ca-
 lesfaciendæ sunt, propter tenuitatē. Et q̃ post calidā durefcit
 corpus

Corpus fri-
 gescere
 magis post

- A** corpus magis reficcatum, velut oculi post frigidam. Altera enim similis est aeri ambienti, altera non. Mare pruriginosis, & qui ab acribus humoribus vellicantur prodest, vt & lauēt, & foneāt ex calido. Qui vero nō adfueri sunt, aliquantū laxdūtur. Verū ad vlcera, & ambuſta, ac deſquamata, & quæcūque talia, contrarium eſt. Aptum eſt autem puris. Bonum eſt & ad attenuandū, & ad piſcatorum vlcera. Hæc enim neque ſuppurantur, ſi non vellices: & ad vlcera tuniculoſa, & depaſcentia proſerpendo ſedat ac ſiſtit, velut ſal, ſalſugo, nitrum. Omnia autem hæc ſi quis parum vtatur, iritant: ſi excellenter, bona ſunt. Melius autem eſt calidum ad plurima. *Acetū quā uim habet.* Acetum ad corpus & articulos, ſimile eſt mari, & potentius, ad perfundendum & ad fomentum: & ad vlcera recens vulneratis, & ad ſanguinis grumos, vbi nigredines ſunt in pudendis. collutio eſt ad aures, & ad dentes. Calido autem hæc ſiunt, & alia, ſed & ex tempore coniecturam facere oportet. Eliquat velut ſal, & vt alia quæ impetigini, lepris ac vitiliginibus conducunt, affuſum ad calidū ſolem. maxime vero cōducit vnguibus leproſis. Superat enim poſt tempus. verrucas formicarias attenuat, & ſordes in auribus ſanat. Mollit autem & corpus, & multos alios locos, ſi non odor offenderet, & maxime mulieres. Valuerit & ad podagram, ſi non corpus vulneraretur. Eadem etiam ſex acetī facit. *Vinū dulce.* Vinum dulce ad diurna vulnera cōmodum eſt aſſidue vtenti. Sed & ad medicamentorū potionem. Auſterum autem & album, & nigrum vinum, frigidum ad vlcera commodum eſt, frigidum propter caliditatem. *Aqua frigida.* Lanæ quæ frigiditatis gratia, aut perfunduntur, aut induuntur, aut intinguntur, aquam frigidiffimam poſtulant. Quæ vero adſtriſtionis gratia, vinum nigrum etiam lanas aſpergere poteſt, velut etiam betarum folia, aut linteola intinguntur, in plurima quibus adſtriſtio ineſt, velut ſunt hederæ albæ folia, & quæ acerbiora ſunt, aut friabiliora, velut hederæ & rubus, rhus coriarius, ſaluia: & in ea quæ mollire oportet, velut farina cocta. Aqua frigida prodeſt papulis rubicundis, quales alia atque alia parte ſublata erumpunt, quales per ſplenia attractoria emergunt: In carnoſis vero & tenera carne præditis ſubrubicundæ ſunt: in nigris autem rotundæ, dothienes hoc eſt furunculi appellatæ, & quales in ipſis calidis lauacris oboriuntur, &

HIPPOCRATIS LIBER

**Tumores
articularū**

Calida.

Frigida.

mulieribus ex mensium sub cutem recurſu fiunt, & ab irri- D
tamentis cutis, aut inſolita veſtimentorum aſperorum ge-
ſtatione, & ex ſudoris exitu, aut ubi quis ex frigore, dere-
pente ad ignem, aut calida lanacra acceſſit. Nam ſi hæc po-
ſterius fecerit, nequaquam amplius erumpunt. Alioqui quæ
ex frigore fiunt, aut quæ exaſperantur inſtar milij, deinde
exulcerantur, eas frigida lædit. Calida vero prodeſt. Tu-
mores in articulis, & dolores ſine vlcere, ac podagricos, &
conuulſa, plurima ex his frigida multa aſuſa leuat ac exte-
nuat, & dolorem torpefacit. Torpor autem moderatus, do-
lorem ſoluit. Sed & calida aqua attenuat ac mollit. Po-
dagricis, reſolutis, ante ac retro diſtensis, conuulſis, talia
accedunt, diſtentiones, tremores, leues ſiderationes: Tali-
bus laxatis, claudicationes, torpores, vocis interceptiones, F
ad talia, excretiones per infernas partes ſuppreſſæ. Cauen-
dum autem eſt in frigida uſu, ne modum excedamus. Ar-
ticulos induratos, aut ab inflammatione aliquando obor-
ta, aut à diſtortione, operæ precium eſt ſanare, aqua calida in
vtriculū inſuſa. Manum deligare, & oculos, lachrymas le-
nit, ita vt ad acres, ſtillamentum lene inſundat quis, vt ne ſal-
ſuginosa contactu lædat. Et ſoſſulis vlcerib. oculorū elotio
prodeſt, & repletio ad naturā reducens. Calida oculis cō-
uenit, doloribus, ſuppuracionibus, lachrymiſ mordacibus, ſic-
cis omnib. Frigida doloris exortibus, valde rubicundis, &
qui collectiones tuberculorū iuxta venas habere ſolēt, qualia
ſunt vlcuſcula capitis manantia, circa thoracem, & alia dura. F
Verum podici & vtero. non valde commoda eſt, neque ſan-
guinem in frigore mingentib. Vlceribus quidē frigida mor-
dax, cutem obducat, doloroſa non ſuppurari facit, liuefacit,
nigrefacit, rigores febriles facit, cōuulſiones, ante ac retro di-
ſtentiones. Quandoq; vero in hac diſtentione, ſine vlcere iuueni
carnoſo, media ætate, multæ frigida aquæ effuſio, caloris
reuocationem facit. Calor autem hæc ſoluit. Calida ſup-
puratoria eſt, non in omni vlcere, maximum ſignum ad fe-
curitatem, cutem mollit, attenuat, dolorem eximit, rigores,
conuulſiones, ante ac retro diſtentiones lenit, capitis gra-
uitatem ſoluit, plurimum autem conducit offium fracturis,
magis autem denudatis, & ex his maxime hiſ qui in capi-
te vlcera habent, & quæcunque præ frigore, aut moriun-
tur, aut

A tur, aut vlcerantur: itemque in vlcerationibus voluntariis ac inuoluntariis, qualia sunt desquamata: herpetibus serpendo adedentibus, denigratis aut in gingiuis, aut in aure, aut in sede, aut vtero. His omnibus calida amica est ac iudicatoria. Frigida vero inimica & occidens, præterquam in quibus sanguinem fluxurum esse timor est. Atque hoc modo vtendum est liquidorum perfusionibus, inunctiliis illitionibus, foliorum impositionibus, aut linteolorum cataplasmatibus, quæcunque aut frigiditate, aut caliditate prosunt, aut nocent.

B **HIPPOCRATIS COI**
 LIBER DE HVMORI-
bus, Iano Cornario
medico pbyfico
interprete.

Genuinum Hippocratis librum hunc esse Galenus dicit. Verum quædam insunt ad extremam dictionis breuitatem contracta: quædam rursus ultra modum extenta.

C



Lmpetus & ferocitas humorum, vbi non reciprocatio humorum est, & lut florum, ducendus est quâ repit per convenientes ac commodas regiones, exceptis his quorum maturitas tempore contingit. Maturationes extra aut intro repunt, aut aliò quò oportet. Cautio, infinita magnitudo, experiendi difficultas, pilorû nuditas, viscerû vacuitas, infernis repletio, supernis alimentû, mutatio sursum, mutatio deorsum. Spôtanea sursum & deorsum. quæ prosunt & lædunt. Cognata species, regio, mos, ætas, tempus, constitutio morbi, excessus, defectus. Quibus quantum deficit, aut non

Difficilis humorum dissertatio.

Consideranda me dico.

HIPPOCRATIS LIBER

non, medela, declinatio, deriuatio, in caput, in obliqua, & quā maxime repit, aut reuulsio, in supernis deorsum, in infernis sursum. aut siccare, aut aliquibus inferna, aut aliquibus superna, aut eluitur, aut quibusdam mitigabitur. humores effusi ne intro reuellantur, sed secretiones siccentur. Turbatio, infusio per sedem, pelluium, quibus abscedit ad sedem, vnde exoluitur aut medicamentum, aut vlcus, aut humor aliquis compactus, aut eruptio pustulosa, aut flatus, aut cibus, aut animalculum, aut æstus, aut alia quædam affectio. Consideranda hæc, spontanea desinentia, aut velut ab exustione excitatæ bullæ, in quibus qualia lædunt aut profunt. Figuræ, motus, eleuatio, & rursus subsidentia, somnus, vigilia. Quæ facienda, aut impedienda, cito assequi. Castigatio per vomitum, inferne per exitum, aut sputum, mucum, tussim, ructum, singultum, flatum, vrinam, sternutationem, lachrymas, pruritus, euulsiones, contactus, sitim, famem, repletionem, somnos, labores, ocium, corpus, mentem, disciplinam, memoriam, vocem, silentium, vteri purgationem. Quæ superne erumpunt ac torquent, pingua, intemperata ac meraca, spumosa, calida, mordacia, æruginosa, varia, ramentosa, seculenta, cruenta, flatus expertia, cruda, cocta, sicca. Quæcunque circumfluunt, ferendi facilitatem cōtemplari oportet, itemque difficultatem, priusquam periculū veniat. Item quæ sedare non oportet. maturatio, descensus eorum quæ infra sunt, redundantia & fluctuatio eorum quæ supra: & quæ ex vteris, & in auribus sordes, concitatio ac permixtio, apertio, euacuatio, calfactio, perfrigeratio, intrinsecus, forinsecus. horum quidem, horum vero nō. Quum infra vmbilicum fuerit id quod torquet, tardum & molle est torment. Vice versa, contra. Quæ per aluum egeruntur quæ repunt, non spumosa, matura, cruda, frigida, foetida, sicca, humida. Quæ olfactum male afficiunt. Sitis quæ prius nō adfuit, neque æstus, neque alia causa. Vrina, nasi humectatio, lactationem. Siccitatem. & non esse contractum ac arefactum, & spiritum turbulentum. præcordia, extremitates, oculos male affectos. coloris transmutatio. Pulsus, frigiditas, palpitationes, cutis duricies, neruorum, articulorum, vocis, mentis, figura voluntaria, pili, vngues. facile ferre, aut non, qualia oportet. Signa hæc. Odores corporis, oris, secessus, auris,

*Tormentū
vmbilici.*

*Quāta sit
hæc obser-
uatio ui-
deto.*

- A auris, flatus, vrinæ, vlceris, fudoris, sputi, nasi. Corpus falsuginosum, aut sputum, aut nasus, aut lachryma, aut alij humores. Penitus similia, iuuantia, lædencia. Insomnia qualia videat, & in somnis qualia faciat, an acute audiat, & obedire paratus sit animo, an magis fortia sint ac plura quæ commoda sunt ac seruant, quàm alia, an sentiant omnia omnibus sensibus, & ferant, veluti odores, sermones, vestitus, figuras, & huiusmodi patienter, quæ sanè & sua sponte comparentia profunt, & quando etiam talia iudicationem inducunt. Item tot, & talia, veluti sunt flatus, vrina, qualis, & quanta, & quādo. Quæ vero contraria sunt, auertere, ipsisque aduersari. Quæ propinqua & communia sunt affectionibus, prima & maxime affliguntur. Constitutionem autem ex primis incipientibus, quicquid tādē excernatur ex vrinis, qualēs nam fuerint, & qualis sit corporis collapsio, coloris immutatio, spiritus imminutio, & reliquæ cum his victus rationes. Scire etiam oportet an similia sint quæ decedunt, transitus, vrinæ, per vteros, sputa, per nares, oculi, sudor, ex tuberculis, ex vulneribus, ex pustulis, quæ sua sponte, quæ arte. Quod similia sunt inter se omnia quæ iudicant, & quæ profunt, & quæ nocent, & quæ perimunt, quo hæc quidem fugiens auertat, illa vero accersat, & ducat, ac suscipiat. Sed & alia eodem modo, cutis, extremarum partium, præcordiorum, articulorum, oculorum, oris, figurarum, somniorū, qualia iudicant, & quando, talia machinari. Insuperque qui tales abscessus sunt. Qualia profunt cibis, potibus, odoribus, visu, auditu, cogitatu, secretionibus, humorib⁹, calefactione, frigectione, siccitatibus, humectando, siccando, vnguentis, illitionibus, cataplasmatibus, emplastris, insersionibus, denique & epithematis quæ imponuntur. Figuræ, defricio, curatio, labor, ocium, somnus, vigiliæ: spiritibus superne, inferne, communibus, propriis, arte paratis. In exacerbationibus neque præsentibus, neque futuris, neque pedum frigiditate, sed in declinante deorsum morbo. In exacerbationibus per circuitus fientibus, ciborum oblationes dandæ non sunt, neque cogere oportet, sed auferre de appositionibus ante iudicationes. Quæ iudicantur, & iudicata sunt integre, neque mouere oportet, neque nouare, neque medicamentis, neque aliis irritamentis, sed sinere. Concocta medicamentis aggredi

*Que per
exordia di
gnosceda.*

*Hæc eadē
in Apho-
rismis di-
xit.*

HIPPOCRATIS LIBER

aggredi oportet, & mouere non cruda, neque in principiis, **D**
 si non turgent. Multa vero non turgent. Quæ ducere oportet,
 quò maxime repunt per conuenientes locos, eò ducere
 oportet. Quæ prodeunt non multitudine æstimare oportet,
 sed quâdiu prodeant qualia oportet, & facile æger ferat. Vbi
 vero opus est, debilitare etiâ, aut animi deliquiū inducere o-
 portet, donec hoc feceris, cui⁹ gratia hoc fit, interim alio ver-
 tere, aut siccare, aut humectare, aut reuellere, si sufficiat æ-
 ger, id quod ex his coniectabis. Sicca quidē calida erunt, hu-
 mida vero frigida. Quæ vero aluum mouent, plerūque con-

*Conuulsio-
nes & de-
cretoria
quæ fiunt.*

traria. Hæc imparibus diebus, sursum, si & circuitus, & con-
 stitutio talis sit ex exacerbationibus. Fiunt autem plurima pa-
 ribus diebus, deorsum: sic enim & sua sponte profunt: si non **E**
 circuitus faciant exacerbationes in paribus. In talibus au-
 tem, in paribus sursum: in imparibus deorsum. Tales autem
 pauci sunt. Et tales constitutiones etiam difficiliter iudican-
 tur. Quin & ulterius tempore progressa sic fieri necesse est,
 velut ad decimamtertiam, ac decimamquartam diem. Deci-
 matertia quidem deorsum, decimaquarta vero sursum. Ita
 enim ad iudicationem conducit. Et quæ ad vigesimam,

Ceterum quæ infra prodeunt, multum purgare oportet,
 & hæc non prope iudicationem, sed longius ab ea. Raro au-
 tem in acutis, multa ducere oportet, in delassatis, totum.

In febribus ad articulos, & circa maxillas maxime absces-
 sus fiunt, prope sanè dolores vniuscuiusque, ad supernam par-
 tem magis & in totum. Si vero lentus fuerit morbus & de- **F**
 orsum tendens, inferne etiam abscessus fiunt. Maxime autem
 pedes calidi, inferne significât: frigidi superne. Quibus vero
 ex morbis se erigētibus statim in manibus aut pedibus dolo-
 res fiunt, in his abscessus contingunt. Sed & si quid doluerit
 quis antea quæ ægrotet, ad eas partes firmatur. Quemadmodū
 etiam tussientibus & anginosi in Perintho. Faciunt enim
 tusses abscessus, velut etiam febres. Iuxta eandem rationem
 contingit ab humorum aut corporis colliquatione & frigi-

Perinthus

*Humoru
obseruatio*

ditate. Proinde nosse expedit, in quibus temporibus humo-
 res florent, & quales in singulis morbos faciunt, & quales in
 vnoquoque morbo affectiones: & reliquum corpus ad quem
 morbum maxime natura repit: & quale quid splen intume-

Lienosi qd

scens facit. Horum sanè & natura, & fermè colores deterio-
 res

- A** res sunt, & corpora tument. Et si quid aliud est, in his exercere se prodest, velut est animi intemperantia circa cibos ac potus, somnum, vigilias, aut ob amores quosdam, velut tesserarum, aut propter artes, aut propter necessitates: tolerancia laborum, & quorum ordinata est, aut inordinata: Mutationes ex qualibus ad qualia: ex moribus animæ industria, aut quærens, aut meditans, aut videns, aut dicens, aut aliud quid, velut tristitia, iracundiæ, cupiditates, quæ ex casu contingunt. Molestiæ animi aut per oculos, aut per auditum, velut etiam corporum, Molis quidem ad seipsas attritis, dentes stupefunt: Ambulanti vero circa cauum locum, crura tremunt: quum autem quis manibus ea quibus opus habet leuat, hæ tremunt: Serpens de repente conspectus pallorem cum virore inducit. Timores pudor, mœror, voluptas, ira, aliaque huiusmodi quomodo obediunt. Vnicuique autem pars corporis ad actionem pertinens in his obedit. Sudores, cordis palpitatio, & eiusmodi potentiæ. Quæ extrinsecus profunt aut nocent, vinctio persasio, illisio cataplasmatum vsus, deligatio lanarum & talium rerum: & internæ partes talibus obediunt, non solum externæ his quæ intro assumuntur: Sed & quæ in lanis ab ouili succidis adhibentur, & quod à rege nomen habet cuminum, videntibus & olfacientibus. Quæ de capite ducunt, turbant, sermones, vox, & huiusmodi, mamma, genitura, vterus, & quæ signa in ætatibus, & in suffocationibus, & tussi, & quæ ad testiculos. Quemadmodum arboribus terra, ita animalibus ventriculus: & nutrit, & calefacit, & frigefacit. Frigefacit, dum euacuatur. calefacit, dum impletur. Quemadmodum terra stercoreata hyeme calida est, ita etiam ventriculus. Arbores corticē tenuem siccum habent, intrinsecus autem carne sicca, sanæ, non putridæ, diurnæ. Ita & ex animalibus testudines, & quicquid eiusmodi est. Aetatibus, temporibus, annis, similia animalia, non deteruntur si moderate melioribus vtantur. Quemadmodum hydria quod recens est transmittit, quod inueteratum retinet. Sic & ventriculus transmittit alimentum, & fecem retinet, velut vasculum. Modi morborum hi sunt, partim quidem cognati sunt, de quibus interrogando discere oportet: partim à regione, familiares enim sunt per multas, & multi ipsos noscunt: partim ex corpore, & victus ratione,

patiantur.

Mole dentes collisunt.

Quæ cruciat tremor, & palpitatio.

Quæ foris uel intus officiant.

Terra sancta, uentriculus animalia nutrit.

Ventriculus qualitas. Quid animalia tuentur.

Morborum naturæ.

HIPPOCRATIS LIBER

Morbosū
quorundā
caussā.

tione, ac temperiei constitutione, aut à temporibus. At re-
 giones ad tēpora male dispositæ, tales morbos pariant, qua-
 li tempori similes fuerint, Verbi gratiā. Inæqualis calor aut
 frigus eadem die quum talia fuerint, morbos autumnales fa-
 ciunt. Et in aliis temporibus secundum rationem, alij ab o-
 doribus cœnosis aut palustribus: alij ab aquis, calculosi, sple-
 nici: alij à ventis bonis & malis incipiunt. Qualia vero sunt
 tempora tales erunt etiam morbi, & constitutiones ex ipsis.
 Si tempora tempestiue, & ordinate se habuerint, morbos iu-
 dicatu faciles faciunt. Vernaculi autem temporum morbi iu-
 dicant mutationes, & prout euariauerit tempus, similes aut
 dissimiles erunt morbi, qui in hoc tempore oriuntur. Si ve-
 ro similiter procedat, eiusmodi quoque fuerint morbi, & ad
 talem modum tracti, veluti est morbus regius autumnalis.
Bilis per
æstatem
quid faciat

Frigora enim ex caloribus, & calor ex frigore. Et si æstas bi-
 liosa fiat, & bilis aucta intus relinquatur, etiā aliquantū sple-
 nici fient. Quum igitur & Ver sic processerit, etiam vere fit
 morbus regius. Proximus est enim hic motus tempori, iuxta
 hanc speciem. Quum vero æstas fiat verisimilis, sudores in
 febribus, & febres faciles, & non peracutæ, neque linguis
 obaridæ fient. Si vero hybernium fiat ver, & postremū hyemis
 tempus, hyberni etiam morbi, & tusses, & peripneumonix,
 & anginæ. Et autumnus si non in tempore ac derepente hy-
 bernerit, non assidue, tales morbos facit, eo quod non in tem-
 pore incepit, sed inæqualiter fit. Quapropter etiam tempo-
 ra à iudicatione aliena ac inconstantia fiunt: quemadmo-
 dum etiam morbi, si præerumpant, aut præexcernantur, aut
 intus relinquuntur. Recidivas enim etiam tempora faciunt,
 quemadmodum & morbos ita inducunt. Itaque insuper con-
 siderandum est, quomodo habentia se corpora tempora sus-
 cipiant. Austri auditum grauant, caliginem inducunt cap-
 put grauant, torpidi sunt, dissoluunt. Quum hic præualue-
 rit, talia in morbis patiuntur, vlcera glabra, maxime os, pu-
 dendum, & alia partes. Si vero aquilo, tusses, faucium affe-
 ctiones, ventres duriores, vrinx difficultates, horrores, do-
Magnaue
torum cæ-
terarumq;
rerum ob-

lores laterum ac pectoris. Quum hic dominatur, tales mor-
 bos magis expectare oportet. Si magis redundauerit, ad squa-
 lores sequuntur febres itemque ad pluuias, ex quibus tan-
 dem redundantia transmutata fuerint, & quomodocunque
 habentia

- A** habentia se corpora ex alio tempore susceperint, & quocunque tandem humore in corpore dominante. Caterum siccitates & austrinæ sunt, & Aquilonares. Differunt enim & alia hoc modo. Magnū enim & hoc est. Nam alius in alio tempore ac regione magnus est. Veluti Aestas bilem parit, Ver sanguinem, reliqua prout singula. Mutationes maxime pariunt morbos, & præsertim maximæ: & in tēporibus magnæ mutationes, & in aliis. Quædam sensim fiēte progressu fiunt. Tempora huiusmodi sunt securissima, velut etiam diatæ, & frigus, & calor maxime sensim factio progressu. Et ætates sic transmutantur. Naturæ quantum ad tempora attingit, aliæ ad æstatem, aliæ ad hyemem, bene aut male dispositæ sunt. Quantum vero ad regiones, & ætates, & victus rationem, & alias morborum constitutiones, aliæ ad alias bene aut male se habent. Et ætates ad tempora, & regiones, & victus rationem, & morborum constitutiones. Et in temporibus, victus, & cibi, & potus, qualitatem suam requirunt, Nam hyems ab operibus ocium habet, & quæ in corpus ingeruntur matura ac simplicia postulat. Magnum enim & hoc est. Autumnus autem laboribus deditus. Sub insolationibus potus, frequentes sunt, cibi inconstantes, vina, arborum fructus. Quemadmodum autem ex temporibus morbos coniectare datur, ita quandoque etiam ex morbis aquas, & ventos, & siccitates prænosce licet, & aquilonares, & austrinas. Licet autem ei qui probe ac recte didicit, vnde sint hæc consideranda, velut & lepræ quædam, & circa articulos dolores. Aquæ ubi futuræ sunt, pruriginosi sunt, & alia huiusmodi. Et quæ pluuiæ alternis, aut singulis diebus, aut per alios circuitus, aut assidue fiēt. Et venti aliqui per multos dies flant, & contrario inter se modo flant, alij per pauciores. Et iidem per circuitum. Hæc habent cum temporum cōstitutionibus similitudines. Verū breuius talia. Si vero annus diutius talis fuerit, qualem constitutionem fecerit, tales etiam morbi diutius erunt. Et si magis fortes fuerint. inaximi quoq; morbi sic fiēt, & cōmunissimi, & ad plurimum tempus. Ex primis aquis, ubi post multam siccitatem, aqua futura est, de aqua inter cutem prædicere licet: & ubi talia parua signa apparuerint in ventorū quiete, in transmutatione. Colligenda igitur sunt, quæ in qualibet aquis aut vêtis morbi significāt, & audiendus est si quis


*seruatio**Bilis per æstatē sanguis per uer uiget. Tempore mutationes quantum possint.**Possit & ex morbis & ex anni tēporibus & tempore statib⁹ omnia præuideri.**Hydrops cōiectatio.**nonne,*

HIPPOCRATIS LIBER

nouit, quod tali hyeme prægressa, tale ver aut æstas erit. **D**

Colores non sunt similes in temporibus, neque in aëquilonariis, neque in austrinis, neque in ætatibus, neque in vnoquoque ad seipsum, neque in alio ad alium. Considerandum autem est ex his quæ præsentia ac quiescentia nouimus de coloribus, & quòd ætates temporibus similes sunt, & colore, & mutatione. Qui hæmorrhoidas habent neque pleuritide, neque peripneumonia, neque phagedæna, neque furunculis, neque tuberculis terebinthi figurâ habentibus corripuntur. Fortassis autem neque lepris, fortassis neque vitiliginibus. Multi tamen intempestiue curati, non tarde correpti sunt, & sic perniciosæ fuerunt. Et quicumque alij abscessus, velut fistulæ, aliorum medela sunt. Quæ ubi insuper comparant sedare solent, ea prius fientia impedimenta ab his liberant. Alterius loci morbos loca excipientia, aut dolore, aut grauitate, aut ob aliud quiddam liberant, aut quòd aliis sunt communicationes. Propter inclinationem non amplius sanguis prodit, sed iuxta humoris cognationem talia spūunt, cōuenit quibusdam sanguinem detrahete tempestiue in talibus, in aliis autem velut in his, non hoc conuenit. Impedimentum in spūentibus cruenta, tempus anni, pleuritis, bilis. Tubercula circa aurem quibus circa iudicationem exorta, non suppurata fuerint, his disparentibus recidiua fit, & pro ratione recidiuarum, recidiua fiente, rursus intumescūt, & permanent, quemadmodum febrium recidiuæ, in simili circuitu: in his spes est ad articulos abscedere. Vrina crassa, alba, **F** qualis Archigenis familiari erat, in lassitudinosis febribus quarta die aliquando prodit, & liberat ab abscessu. Si vero ultra hoc, etiam sanguis è naribus large eruperit etiam valde. Cui intestinum in dextra parte dolebat, & articulari morbo correptus est, quietior erat. Postquam autem hic curatus fuit, magis dolebat.

Vrinæ crassa alba quod faciat. Archigenes.



HIPPO-

A HIPPOCRATIS COI

LIBER DE MORBO SA=

cro, Iano Cornario medico

pbyfico interprete.

Non genuinum Hippocratis, sed memorabilis tamen utri, hunc librum Galenus esse dicit, tum quod ad dictionem, tum quod ad sententiam attinet. Hippocratis autem neque dicendi modum, neque sententiarum acumen in ipso esse.



E morbo sacro appellato sic se res habet. Nulla re videtur mihi aliis diuiniore esse morbis, neque sacratior. Verum naturam habet quam etiam reliqui morbi, unde fit. Homines vero naturā & causam eius diuinam esse putauerūt, prae inexperiētia & admiratione, propterea quod reliquis morbis nulla re similis est. & per inopiam quidē quod

Comitialis morbus.

Cur hoc malum nō magis diuinum quā alia putandum sit.

non cognoscunt, diuinitas ipsi conseruatur. Per abundantiam vero & parabilem modum sanationis medentur. Exoluuntur enim aut expiationibus aut incantamētis. Si vero propter admirationem diuinus censeretur, multi morbi sacri erunt, & non vnus: quemadmodum ego demonstrabo etiam alios nihil minus admirabiles, neq; minus monstrosos, quos nemo sacros esse censeret. Primum etenim fabres quotidianæ, & tertianæ, & quartanæ, nihil minus mihi sacri esse videntur, nec minus à deo fieri quā hic morbus, etiam si nihil admirabile habeant. Deinde video insanos homines & delirantes à nulla manifesta causā, & multā & simul importuna facere, vidique multos in somno plorare ac vociferari, alios vero suffocari, alios exilire & foras fugere, atq; ita delirare donec expergiscuntur. postea autē etiam sanos esse ac sapientes velut prius, effoq; ipsos pallidos ac debiles, atq; hæc non semel, sed sæpe, aliq; multi sunt ac omnigeni morbi, in quibus singulis recēsendis in longum sermo extenderetur. Cæterum qui primi

Quid cetera faciant.

f hunc

HIPPOCRATIS LIBER

Magi.

**Que ueta-
rent.**

**Libes cur
non sana-
rentur ab
hoc morbo.**

hunc morbum sacrum esse pronunciauerunt, tales homines mihi fuisse videntur, quales etiam nunc sunt magi & expiatores & circulatores, & quidam arrogantes, qui se vehementer pios esse simulant, & amplius quid scire. Hi itaque consilij ac mentis inopiae obuelantes ac prætexitēs diuinitatem, quum nihil haberent quod exhibitū prodesset, ut ne manifesta fieret ipsorum ignorantia, sacram hanc affectionē esse pronunciarunt. & rationibus idoneis collectis, curationem constituerunt sibiipsis securam, expiamenta offerentes & incantamenta, & à balneis abstinere iubentes, & à cibis multis ac ineptis ad hominum ægrotorū esum, velut ex marinis quidem à mullo, & melanuro, mugiliq; ac anguilla, hi enim pisces opportune haberi possunt. Ex carnibus vero à caprina, ceruina, suilla, ac canina. Hæ enim carnes maxime aluum turbant. Ex volucribus autem, à gallo & turture ac otide. insuperque ab his quæ robustissimæ esse censentur. Ex oleribus à mentha, allio, ac cepa. Nihil enim acre infirmo conducit. Pallium præterea nigrum habendū non esse præcepere. Niger enim color mortalis est. Neque in caprina pelle decumbendum esse, neq; eandem gestare oportere. neque pedem supra pedem habendum esse, neque manum supra manum. Hæc enim omnia curationis impedimenta esse, Omnia autē hæc diuinitatis gratia apponunt, velut amplius quid scientes, & alios prætextus proferentes, quo si sanus æger euadat, ipsis gloria & dexteritas adscribatur. sin moriatur, in tuto positæ sint ipsorum excusationes, habeantq; prætextū quod non ipsi sint in causa sed dei. Neque enim medicamentum aliquod edendum aut bibendum exhibuerunt, neque balineis incoxerūt, ut ipsi in causa esse videri possint. Mihi autē videtur nullum ex his qui mediterranea Africæ inhabitāt sanum esse posse, propterea quod caprinis pellibus ac carnibus vtuntur, quum neque stratum, neque pallium, neq; calceamentum habeant, quod non sit caprinum. Non enim alia vlla ipsis sunt pecora præter capras & boues. Si autem hæc admota & comesta morbum augent, & non comesta sanant, nō est sanē deus alicuius autor aut causa, neque profunt expiamenta, sed edulia sunt quæ & sanant & lædunt. Numinis vero vis dissipatur. Sic igitur mihi videntur hi qui hoc modo hos morbos curare aggrediuntur, neque sacros ipsos putare, neq; diuinos. Vbi enim præ talibus expiamenti

A mētis ac tali curatione tranſmutatur, quid vetat etiā præ aliis artibus ſimilibus illis, & diſcedere ab hominibus & accedere?

Quare nō deus autor eſt, ſed aliquid humanū. Quiſquis enim luſtrationibus & magicis incantamētis talem affectionē ab-

*Quare nō
diuinū ma-
lū hoc ſit.*

ducere potens eſt, is etiā aliis artibus abduxerit, & ex hac ratione diuinitatis opinio penitus peſſum it. Talia itaque di-
centes ac excogitantes, amplius quid ſe ſcire ſimulant, & ho-
mines decipiunt, proponētes his luſtrationes ac purificationes,
quum verba ipſorum magna ex parte ſe ad deum ac dæ-
monium extendant. Atqui mihi ſanè non de pietate verba fa-
cere videtur, velut ipſi putāt, ſed potius de impietate, & quòd
dei non ſunt, pietasq; ac diuinitas ipſorum impia eſt ac ſcele-
ſta, velut ego docebo. Si enim & lunam abolere, & ſolem ob-

*Quales ne
neſci.*

B ſcurare, tempeſtatemq; ac ſerenitatem facere, pluuias item
ac ſiccitates, & mare ſterile itemq; terram, & alia huiuſcemo-
di omnia, ſe ſcire proſitentur, ſiue ex ſacrorum myſteriis, ſiue
ex alia quadam profeſſione aut meditatione, hanc potētiam
iacent, qui talia ſtudio habent, impij ſanè mihi eſſe videtur,
& deos non eſſe putare, neq; ſi ſint, aliquid poſſe, neq; vllum
aliquod etiam extremum malum prohibere. Quod quum fa-
ciant, quomodo non ipſis infeſti ſint? Si enim homo incanta-
mentis ac ſacrificiis vtens, & lunam abolebit, & ſolem obſcu-
rabit, & tempeſtatem ac ſerenitatem faciet, non vtique ego
horum aliquid diuinum eſſe putauerim, ſed humanum, ſi ſa-
nè diuinitatis potentia ab humana voluntate ſuperatur, & in
ſeruitutem redaſta eſt: fortasſis autem hæc non hoc ſe modo

*Quare
hæc fingi-
tur.*

C habēt, ſed homines, victus indigi multa & omnigena moliun-
tur & euariant, tum in alia omnia, tum in hūc morbum, in ſin-
gulis affectionis ſpeciebus cauſſam deo adſcribentes. Non e-
nim ſemel, ſed ſæpius eorundem mentionem faciunt. Siqui-
dem enim capras imitentur, & ſi balatum edant, & frendant,
& ſi dextris partibus conuellantur, Matrem deorum cauſſam
eſſe aiunt. Si vero acutiorem & concitatiorem ſonum emit-
tant, equo aſſimilant, & Neptunum autorem eſſe dicunt. Si
vero etiam aliquid ſtercoris emittant, quod ſæpe quibuſdam
contingit præ morbo coactis, Hecates enodiæ appellatio ad-
ditur. Si autem tenuiorem & denſiorem vocem edant, velut
auiculæ, Apollo Nomius, id eſt paſtor, ſi vero ſpumam ex ore
remittant, ac pedibus calcitrent, Mars cauſſam habet. Qui-

*Quib' diis
hæc tri-
buant.
Apollo No-
mius.*

f ij cunque

HIPPOCRATIS LIBER

cunque porro pauores noctu ingruunt, timoresque ac deliria, D
& exaltationes è lecto, terroresque, ac fugæ foras, Hecates in-
sidias esse dicunt, & heroum insultus, expiamentisque vtun-
tur ac incantamentis, & scelestissimum ac impiissimū, meo sa-
nè iudicio, faciunt numen. Expiant enim morbo correptos
sanguine, itemque; aliis sceleribus inquinatos, aut iniustos, aut
ab hominibus intoxicatos, aut qui scelestum aliquod facinus
perpetrarunt, quos contraria his facere oportebat, sacrificare
nimirum ac precari, & ad templa progressos diis supplicare.
Nunc vero horum quidem nihil faciunt, verū expiant, & alia
expiamenta terra occultant, alia in mare proiciunt, alia ad
montes deferant, vbi nemo attingat, neque conculcet. Opor-
tebat autem ea ad templa deferre ac deo contribuere, si qui- E
dem deus est author, Non tamen ego puto hominis corpus à
deo inquinari, sordidissimū scilicet à purissimo. Verum etiā si
contingat ab alio inquinari, aut quid perpeti, cupierit utique
à deo purgari ac purificari magis quàm inquinari. Deus itaque;
est qui maxima ac sceleratissima peccata purgat ac purificat,
& liberatio nostra existit, ipsique; terminos templorum ac de-
lubrorum diis designamus, vt nullus qui nō purus sit eos tran-
scendat, & ingressi respergimur, non velut qui inquinemur,
sed si quod etiā prius scelus habemus purificemur. Et de ex-
piationibus quidem sic se res habere mihi videtur. Hic ve-
ro morbo nulla re diuinior reliquis mihi esse videtur. Sed na-
turam habet, quam etiam alij morbi, & causam vnde singuli

*Malū hoc
medicabi-
le.*

gignuntur. Naturam autem & causam, ab eodem deum fieri, F
à quo etiam alia omnia. Et sanabilis esse mihi videtur nihilo
minus quàm alij, nisi iam præ temporis lōgitudine inualue-
rit, vt fortior sit medicamentis quæ adhibentur. Incipit autē
velut etiam alij morbi secundum genus. Si enim ex pituitoso
pituitosus, ex bilioso biliosus gignitur, & ex tabido tabidus,
& ex splenico siue lienoso lienosus? quid prohibet vt cuius pa-
ter & mater hoc morbo correpti fuerint, etiam posterorū ac
nepotum aliquis eo corripiatur? Semen enim genitale ab om-
nibus corporis partibus procedit, à sanis sanum, à morbidis
morbosum. Aliud porro signum magnum est, quod nihilo di-
uinior reliquis sit morbis: pituitosis enim natura oboritur, bi-
liosus vero non accidit. Atqui si diuinior est reliquis, similiter
omnibus morbum hunc fieri oportebat, & non discrimen fa-

*Pituitosos
tantū comi-
tialis mor-
bus ueritat.*

ecce

A cere inter biliosos ac pituitosos. Sed enim ipsis cerebrum auctor est & causa huius affectionis, velut etiam aliorum maximorum morborum. Quo vero modo, & ex qua causa fiat, ego manifeste docebo. Cerebrum hominis duplex est, quemadmodum etiam aliis omnibus animalibus. Medium autem ipsius diuidit membrana tenuis. Quapropter non semper eandem capitis partem dolet, sed particulatim vtramuis, aliquando vero totum. Sed & venae in ipsum tendunt ex vniuerso corpore, multae & tenues, duae vero crassae, altera ab hepate, altera de liene. Et quae quidem ab hepate venit, hoc modo se habet.

*Cerebrum
hominis
duplex.*

*Venae
duae.*

B Altera quidem venae pars deorsum tendit, per partes ad dextram, iuxta ipsum renem ac lumbum, ad internam femoris partem, & descendit in pedem, & vocatur vena caua. Altera vero sursum tendit per venas dextras ac pulmonem. Finditur autem & in cor, & in brachium dextrum. Reliquum vero sursum fertur per clauiculam in dextram ceruicis partem, ad ipsam cutem, ut conspicua fiat. Iuxta aurem vero occultatur. Atque hic finditur, & crassissima quidem ac maxima & caussima ipsius pars, in cerebrum desinit. alia vero pars in aurem dextram, quae sane venula tenuis est, alia autem in oculum dextrum, alia in ipsum nasum. Atque sic quidem venae ab hepate habent. Tendit autem & a liene vena in sinistra sursum ac deorsum, velut ab hepate, verum tenuior & imbecillior. Caeterum in has venas etiam spiritus copiam inducimus. Hae enim corporis nostri respirationes sunt, aerem in se ipsas trahentes, & in reliquum corpus ac venulas deriuantes, refrigerantque ac rursus dimittunt. Non enim possibile est spiritum stare, sed procedit sursum ac deorsum. Si enim alicubi constiterit ac interceptus fuerit, impotens redditur illa pars ubi constiterit. Cuius rei signum hoc est. Quum enim desidenti aut decumbenti venulae compressae fuerint, ut spiritus a vena non discurrat, statim torpor occupat. Et de venis quidem reliquis sic habet. At vero morbus ipse fit in pituitosis, in biliosis vero non. Incipit autem fieri in foetu adhuc in utero existente. Purgatur enim & florescit cerebrum, velut etiam aliae partes prius quam gignantur. In hac autem purgatione, si quidem probe ac moderate purgatum fuerit, & neque plus neque minus quam oportet defluerit, hic foetus sanissimum caput habebit. Si autem amplior colliquatio a toto cerebro

*Vena ic-
coris.*

*Vena lie-
nis.*

*Cerebrum
in utero
purgatur.*

HIPPOCRATIS LIBER

Tinnit⁹ au facta fuerit, morbosum caput augescens foetus habebit, & so-
ritū unde. nitu plenum, & neque solem, neque frigus tolerabit. Si ve-
 ro ab vna aliqua parte colliquatio contigerit, aut ab oculo.
 aut ab aure, aut vena aliqua simul gracilis facta fuerit, ille sic
 afficitur qualiter sanè colliquatio contigerit. Si vero purga-
 tio non contingat, sed in cerebro spissetur ac cogatur, sic ne-
 cesse est foetus pituitosos esse. Et quibuscunque quidem
Vlcera & pueris existentibus erumpunt vlcera in caput, & in aures, ac
pustulae in reliquum corpus, & qui saliuosi fiunt ac mucosi, hi ipsi pro-
profut pue gressu ætatis facillime degunt: hic enim abit ac purgatur pi-
ris. tuita, quam in vtero purgari oportebat, & qui sic purgati
 fuerint, comitali siue sacro morbo ferè non apprehendun-
 tur. Qui vero mundi sunt, & neque vlcus vllum, neque
 mucus, neque saliuua vlla prodit, neque in vteris purgatio-
 nem fecerunt, talibus periculum imminet, vt ab hoc mor-
 bo corripiantur. Si porro ad cor progressum fecerit deflu-
 xus, tremor apprehendit & anhelationes, & pectora corrup-
 untur, aliqui vero etiam incurui fiunt. Quum enim descen-
 derit pituita frigida ad pulmonem aut ad cor, perfrigera-
 tur sanguis. Venæ autem violenter perfrigeratæ, ad pul-
 monem & cor affiliunt, & cor tremore concutitur, vt præ hac
 necessitate anhelationes incidant, & spiratio ceruice erecta.
 Non enim spiritum suscipere potest, donec id quod influxit
 à sanguine fuerit superatum, & calefactum in venas fuerit
 diffusum. Deinde & tremor & anhelatio sedatur, sedatur au-
 tem prout copia eius fuerit, Si enim amplius influxerit tar-
 dius: sin minus, citius. Et si quidem densiores ac crebriores
 fuerint defluxus, crebrius comitali morbo corripitur: sin
 minus, rarius. Hæc itaque perpetitur homo si ad pulmonem
 ac cor fluxus processerit. Si vero in ventrem, profluua alui
 apprehendunt. Si vero ab his viis exclusus fuerit, & in venas
 quas dixi defluxum fecerit, mutus fit & suffocatur, & spuma
 ex ore effluit, & dentes constringuntur, & manus conuel-
 luntur, & oculi distorquentur, & nihil sapiunt, aliquibus
 etiam sterqus inferne secedit. Atque hæc fiunt aliquando in
 sinistra, aliquando in dextra, aliquando vtrinque. Quomo-
 do vero singula hæc perpetiatur ego narrabo. Mutus qui-
 dem est, quum pituita derepente in venas delapsa, aerem ex-
 cluserit, & non admisit neque in cerebrū, neq; in venas ca-
 uas neque

*Tremuli
giberisq;
unde.*

*Diuerfi hu-
ius morbi
affectus.*

*Cur muti
fiant.*

A uas neque in ventriculos, sed occuparit respirationem. Quū enim accipit homo per os & nares spiritum, primum quidē ad cerebrum venit, deinde vero in ventriculum magna ex parte, pars etiam ad pulmonem, & pars ad venas. Ex his vero ad reliquas partes in venas dispergitur, & quantum quidem eius ad ventriculum venit, perfrigerat, & nihil aliud cōfert. Idem præstat & quod ad pulmonem venit. Qui vero ad venas peruenit aer, confert ad ventriculos ingressus & ad cerebrum. Atque sic sapientiam & motū membrīs exhibet. Quare vbi fuerit exclusus à venis aer præ pituita, eumque nō iussceperint, mutum ac desipientem hominem reddunt. At vero manus impotentes fiunt ac conuelluntur, sanguine quiescente & dum non diffunditur velut solebat. Oculi quoque distorquentur aere à venis excluso, & commouentur. Spuma vero ex ore prodit ex pulmone. Quum enim spiritus non ingrediatur in ipsum, spumescit & ebullit velut moriens.

*Cur oculi
distorquentur.*

Cur os spumescat.

*Cur olea
tēt.*

Cur præfocetur.

*Cur calcis
trent.*

Stercus vero subit dum violenter suffocatur. Suffocatur autem, hepate & ventre sursum ad septum transversum irruentibus, & stomacho ventris concluso. Irruunt autem, quū tantum spiritus in os non ingreditur quātum solebat. Calcitrat autem pedibus, quum aer in membrīs conclusus fuerit, & foras penetrare non poterit præ pituita, verū exiliens per sanguinem sursum ac deorsum, conuulsionem ac dolorem inducit, & propterea sanè calcitrat. Porro omnia hæc perpetitur, quum pituita frigida deflexerit in sanguinē calidū existentem. Perfrigerat enim & sistit sanguinem. Et si quidem fluxus multus fuerit ac crassus, statim occidit. Dominatur enim sanguini per frigus, ipsumque congelat. Si vero paucior fuerit, in præsens quidem dominatur obturans respirationē.

C Deinde temporis progressu quum dispersus fuerit per venas & ammixtus sanguini, multo existenti ac calido, si sic superatus fuerit, venæ aerem suscipiunt, atque ita ægri resipiscunt. Et quicumque quidem pueri parui hoc morbo corripuntur, vtp plurimū moriuntur, si multus fluxus contingat, isque humidus existat. Venæ enim tenues existentes pituitam præ crassitudine ac multitudine suscipere non possunt, sed perfrigeratur ac congelatur sanguis, & sic moriuntur. Si vero modica existens pituita in vtrasque venas defluxum fecerit, aut in alterius partis, superuiuiunt, nota ex morbo im-

*Cur infantes hic
morbus
necat.*

pressa reliqua. aut enim os conuellitur, aut oculus, aut ceruix, D
 aut manus, vbicunque sanè vena pituita repleta superata fue-
 rit & gracilis reddita. Hanc itaque venam necesse est debi-
 liorem esse, & hanc corporis partem lafam defectuosiore.
 Verum ad longius tempus plerumque prodest. Non enim
 amplius morbo apprehenditur, si semel notam impressam su-
 sceperit. Quapropter necessario etiam reliquæ venæ affligū-
 tur, ac partim simul gracilescent, vt aerem quidem suscipiāt,
 pituitæ autem defluxus non amplius similiter illabatur. De-
 biliora tamen similiter membra esse verisimile est venis af-
 flictis. Quibuscunque autem imperfectis & valde modica
 pituita defluerit, & ea in dexteras partes, hi citra notæ im-
 pressionem superuiuant, verum periculum est ne morbus E
 connutriatur ac simul augeat, si nō his quæ commoda sunt
 curentur. Pueris quidē igitur sic fit hic morbus, aut quā
 proxime huic modo. Seniores vero non occidit si accedat,
 neque distorquet. Nam & venæ sunt cauæ, & sanguine cali-
 do refertæ, quapropter neque superare potest pituita, neque
 perfrigerare sanguinem vt congelet ipsum, sed ipsa supera-
 tur, ac sanguini cito ammiscetur, atque sic venæ aerem susci-
 piunt, & sapientia contingit, signaque prædicta minus in-
 uadunt propter fortitudinem. At vero antiquissimis si hic
 morbus accedat, propterea ipsos occidit, aut leuiter sidera-
 tos facit, quia venæ ipsis sunt euacuatae, & sanguis modicus
 est ac tenuis & aquosus. Si igitur multum defluerit, & hye-
 mis tempus fuerit, occidit. Suffocat enim respirationes, & F
 sanguinem congelat, si in vtranque partem defluxus fiat. Si
 vero in alteram tantum, leuiter sideratum facit, Non enim
 potest sanguis pituitam superare, quum tenuis sit frigidus-
 que ac modicus, sed ipse superatus congelatur, vt impotentes
 fiant illæ partes iuxta quas sanguis fuerit corruptus. Ad dex-
 tras autem magis defluit quā ad sinistras, quia venæ sunt
 cauiiores & plures quā in sinistris. Ab hepate enim tendunt
 & liene. Defluit autem & eliquatur pueris maxime, qui-
 bus sanè caput fuerit percalefactum, siue à sole, siue ab igne,
 siue etiam derepente inhorruerit cerebrum, etiam tunc pi-
 tuita secernetur. Eliquatur etenim per calorem ac cerebri
 diffusionem, segregatur autem à frigore ac concretionem, &
 sic defluit. Et quibusdam quidem defluxionis causa hæc est.

Aliis

Cur adul-
 tos nō tol-
 lit.

Cur senes
 perimit
 uel sidea-
 rat.

Cur dex-
 trā partē
 potius ue-
 xet hic
 morbus.

A Aliis vero etiam ubi derepente post aquilonares ventos aufer flare cœperit, compactum ac debile cerebrum derepente soluit ac laxat, ut pituita redundet, & sic defluxum facit. Defluit insuper & ex ignoto timore, si quidem timuerint aut aliquo vociferante, aut inter plorandum spiritum cito reuocare non potuerint, id quod pueris frequenter contingere solet. Quicquid sanè horum ipsorum acciderit, statim horret corpus, & æger mutus factus spiritum non trahit, sed spiritus quiescit, & cerebrum compingitur, & sanguis consistit, & sic secernitur ac defluit pituita. Et pueris quidem hæ ipsæ causæ sunt, ut ab initio à sacro morbo corripiantur. At vero senibus hyems infestissima est. Quum enim ad mul-

B tum ignem senex caput & cerebrum percalsfecerit, deinde in frigore versatus fuerit ac inhorruerit, & ex frigore ad teporem accesserit, & ad ignem defecerit, idem hoc patitur, ac sic à morbo sacro apprehenditur iuxta prædictum modum. Periculum vero multum est ut & Vere patiantur idem

*Cur uer
periculosū
sit.*

hoc, si caput fuerit insolatum. Minime autem æstate, non enim fiunt repentinæ mutationes. Postquam vero viginti anni præterierint, non amplius hic morbus corripit, præterquam paucos aut nullum, nisi ex puero connutritus fuerit. Venæ enim plenæ sunt, & cerebrum compactum est, & acerbum ac rigidum, quare non defluit in venas: si vero defluerit, sanguinem non superat multum ac calidum existentem. In quo vero à puero augmentum cepit ac connutritus est, in eo per consuetudinem facit ut in mutationibus ventorum patiatur, & ut plurimum morbo sacro corripiatur, præcipue australi ac humida aeris cōstitutione. Et liberatio difficulter contingit. Cerebrum enim humidius quàm ex natura sit, & præ pituita inundat, ut defluxiones quidem frequentiores fiant, non autem amplius possibile sit pituitam excerni, neque cerebrum resiccare, sed perrigatur & humidū existit. Cognouerit autem hoc ipsum quis maxime ex ouibus hoc morbo correptis, & præsertim capris, Hæ enim frequentissime corripiuntur. Si enim caput ipsarum dissectueris, reperies cerebrum humidum esse, & sudore refertū, ac male olens. Et in hoc nimirum cognosces quòd non deus corpus affligit, sed morbus. Sic vero se res habet etiam in homine. Quum enim ætatem adeptus fuerit morbus, non amplius

*Oues &
capræ cor
ruptales.*

*Comitialis
pius*

HIPPOCRATIS LIBER

inueteratus non sanatur. plus curabilis est, cerebrum enim eroditur à pituita ac colliquatur. Id vero quod colliquatur, aqua fit, & foris cerebrum ambit ac circunalluit, & propterea frequentius ac facilius à morbo hoc corripuntur. Propterea vero diuturnus est morbus, quia id quod influit venis tenue est præ multitudinem, & statim superatur à sanguine ac calefcit. *Quid casuri agant.* Quicumque vero iam assueti sunt morbo, præcognoscunt se corripièdos, & ex hominum frequentia fugiunt, si domus ipsorum in propinquo fuerit, ad domum: sin minus, in locum desolatissimum, ubi quàm paucissimi ipsos lapsos sint visuri, statimque se obuelant, idque faciunt præ pudore affectionis, non præ timore, velut multi putant, dæmonij. At vero pueri primum quidem cadunt ubicunque tandem contigerit præ inassuetudine, *Quid uentorum mutationis possit.* Quum autem sæpius à morbo corripiantur, postquàm præsenferint confugiunt ad matres, aut ad alium maxime notum, præ timore ac formidine affectionis. verecundari enim pueri nondum sciunt. Cæterum in mutationibus ventorum propterea morbo sacro corripì censeo, maxime quidem austrinis, postea vero etiam aquilonaribus, deinde etiam reliquis ventis, hi autem sunt qui fortissimi ex ipsis existunt, & inter se tum statione, tum viribus contrariissimi. Etenim aquilo compingit aerem, & turbatum ac nubilosum excernit, & illi striorem ac pellucidum facit. Eodem modo etiam alij omnes venti ex mari ac aliis aquis proficiscèntes. Ex omnibus enim rebus, atque adeo ex ipsis hominibus humiditatem ac tenebrositatem excernunt. *Aquilo qualis & auster.* Quapropter saluberrimus omnium ventorum aquilo existit. Auster autem contraria huic operatur. primum enim incipit aerem compactum liquare ac diffundere, quapropter etiam non statim magnus spirat, sed primùm lentus ac lenis est, quoniam aerem statim superare non potest, qui prius densus est & compactus, sed temporis progressu ipsum dissoluit. Idem porro hoc etiam in terram operatur & in mare, fluuiosque ac fontes & puteos, & quæ ex terra nascuntur, & in quibus humor inest. Est autem in omni, in alio plus, in alio minus. Omnia autem hæc ventum hunc sentiunt, & ex splèdidis tenebrosa fiunt, & ex frigidis calida, & ex siccis humida. Et quæcunque in domibus vasa iuxta terram sunt cum vino aut alio quopiam liquore, ea omnia austrum sentiunt, & formam in aliam speciem transmutant. Solem vero & lunam ac syde-

A ac sydera multo hebetiora quàm ex natura sunt reddit.

*Mutatio
uentorum
quid possit.*

Quum igitur etiam his quæ adeo magna sunt ac fortia intantum dominetur, & corpus sentire faciat, ut ex horum ventorum alterationibus transmutetur, necesse est ab austris quidem solui ac humectari cerebrum, & venas laxiores reddi, ab aquilonis vero flatibus, quod sanissimum est in cerebro compingi, quod vero morbosissimum ac humidissimum est excerni, & forinsecus circunalluere, atque sic defluxus in horum ventorum mutationibus succedere. Hoc modo hic morbus fit & floret, tum ab accedentibus, tum à decedentibus, & nullatenus difficilior aut cognitu aut curatu est quàm alij, neque etiam diuinior aliis. Porro expedit homines nosse, quod ex

B nulla alia nobis parte voluptates contingunt, & læticiæ, & risus & lusus, quàm ex cerebro. Itemque mœrores & anxietates tristitiæque ac eiulatus & querelæ. Et hoc sapimus maxime ac intelligimus, & videmus & audimus, & cognoscimus

*Cerebrum
caussa omnium.*

turpia & honesta, mala & bona, iucunda & iniucunda, partim consuetudine discernentes, partim utilitate percipientes. Eodem voluptates & iniucunditates pro opportunitate dinoscimus, & non eadem nobis placent. Eodem & insanimus & deliramus, & terrores & timores nobis accedunt, partim noctu, partim interdiu, & insomnia, & errores intempestiui, & curæ inanes, & ut non noscamus adstantes, & defueto, & inexperientia. Atque hæc omnia perpetimur à cerebro, quum sanum non fuerit, sed aut calidius quàm

C ex natura fiat, aut frigidius, aut humidius, aut siccus, aut aliud quid perpetiatur præter naturam, & consuetudinem. Et insanimus quidem præ humiditate. Quum enim humidus fuerit quàm pro natura, necesse est moueri. ubi vero mouetur affectio, necesse est neque visum quiescere, neque auditum, sed alias aliud videre & audire, & linguam talia dicere qualia semper ac singulis vicibus viderit ac audierit. Quanto vero tempore cerebrum quieuerit, tanto etià homo sapit. Fit autem corruptio cerebri à pituita & bile. Vtriusque cognitio sic contingit. Qui enim à pituita insanunt, quieti sunt, & non vociferantur neque tumultuantur. Qui vero à bile, vociferatores sunt & malefici, & non quieti, semper aliquid intempestium faciētes. Si quidem igitur assidue insanunt, hæc ipsis sunt causæ. Si vero terrores ac timores accedant, à cerebri transmu-

*Cerebrum
quando furiat.*

*Pituitosi
biliosique
furores
quales.
Pavoris
caussa.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Oblivio
unde &
uocifera-
tio noctur-
na.*

*Spiritus aer-
is sapien-
tiae author*

*Cerebrum
Prudentiae
praebet
praecor-
dia non.*

transmutatione id contingit, transmutatur autem dum cale- D
scit, calefcit autem praebile, ubi ad cerebrum impetum fece-
rit ex corpore per venas haematitidas hoc est sanguinarias
appellatas. & timor adest donec rursus redierit in venas ac
corpus, deinde quiescit. Angitur autem homo & inquietu-
dine multa iactatur intempestiue, dum cerebrum perfrige-
ratur, & praeter consuetudinem compingitur. Hoc vero a pi-
tuita perpetitur, ab hac autem affectione etiam obliuiofus
euadit. Noctu vero clamat & vociferatur, quum derepente
cerebrum percalefiat. hoc autem perpetiuntur biliosi: pitui-
tosi enim non percalefiunt: quum sanguis multus ad cerebrum
peruenerit & efferbuerit, venit autem per venas praedictas:
Quum contigerit ut homo videat in somnium horrendum,]
& in timore fuerit, velut etiam si vigilet, tunc magis facies
ignescit, & oculi rubescunt, quum timuerit, & mens meditatur
aliquid mali operari, sic etiam in somno patitur. Vbi vero ex-
pergefactus fuerit, & resipuerit, atque sanguis rursus in ve-
nas praedictas dispersus fuerit, quiescit. Et propterea iudico
cerebrum vim plurimam in homine habere. Hoc enim est no-
bis eorum quae ab aere fiunt interpretes, si sanum fuerit. Sa-
pientiam autem ipsi exhibet aer. Oculi vero & aures & lin-
gua, & manus & pedes, qualia cerebrum statuit ac cognoscit,
talia subministrant. Sapientia enim toti corpori contingit,
prout aere participat. Ad intelligentiam vero internuncius
est cerebrum. Quum enim homo spiritum in seipsum attra-
xerit, primum quidem ad cerebrum peruenit, & sic ad reliquum]
corpus aer dispergitur, relinquens in cerebro suum ipsius vi-
gorem, & quicquid prudens ac sapientia praeditum fuerit. Si
enim in corpus primum perueniret, & posterius in cerebrum,
relicta in carnibus ac venis dinotione ac iudicio, ad cere-
brum calidus iam existens perueniret, & non sincerus ac pu-
rus, sed ammixto humore a carnibus & sanguine, ut non am-
plius exacte sincerus esset. Quapropter dico cerebrum intel-
ligentiae ac prudentiae internuncium ac interpretem esse.
Ceterum praecordia aliis fortuitum nomen apud Graecos
per consuetudinem habent, quum phrenes a sapientia dicta
videantur, reuera autem non, neque ex natura. Neque ego sa-
ne noui quam vim habeant praecordia, ut sapiant & intelli-
gant, praeterquam si homo ex improviso nimio gaudio per-
fundatur,

- A fundatur, aut tristitia afficiatur, tunc sanè exiliunt & anxietatem exhibent præ tenuitate & quòd distenta sunt maxime in corpore, & ventriculum non habent ad quem suscipiant aut bonum, aut malum allabens, sed ab utrisque his turbantur, propter naturæ debilitatem: Nam nullo sanè prius sentiunt ex his quæ in corpore insunt, sed frustra hoc nomen & causam habent, Quemadmodum quæ ad cor sitæ sunt aures appellantur, quum nihil conferant ad auditum. Porro dicunt quidam quòd corde sapiamus, & quòd hoc est quod angitur, & quod curam gerit, Verum hoc nò ita se habet, sed conuellitur quidè velut præcordia, & magis etià propter eadem causas. Ex omni enim corpore venæ ad ipsum tendunt, & còclusiones habet vt sentiat, si quis dolor, aut collectio homini contingat. Necesse est enim & dum angitur, inhorreere corpus ac distèdi, & si quis nimio gaudio perfundatur, idem pati. Quapropter cor quidem & præcordia maxime sentiunt, sapientia tamen minime participant, sed omnium horù cerebri causa est. quemadmodum igitur etiam prudentiam ac aerem omnium primum ex his quæ in corpore insunt percipit cerebrum, Sic etiam si qua mutatio fortior in aere contingat, præ temporibus anni, etiam ipsum à seipso diuersum redditur in aere. Etenim cerebrum propterea primum sentit, quia etiam morbi in ipsum irruunt acutissimi, & maximi, ac præcipue lethales, & qui difficilem iudicationem habent apud inexpertos. Hic vero morbus sacer appellatus, ex iisdem causis oritur, à quibus etiam reliqui, ab accedentibus nimirum ac decedentibus, velut frigore, sole, ventis, quæ & transmutantur, & nunquam quiescunt. Hæc autem sunt diuina. Quare nequaquam hunc morbum ab aliis discriminare oportet, neque reliquis morbis diuiniorè putare, sed omnes diuinos omnesq; humanos. Naturam autem vnusquisq; habet & vim in seipso, & nullus nec auxiliij nec remedij expertus est, & plerique his ipsis curantur, à quibus etiam nascuntur. Alterum enim alterius nutrimentum est, alterius vero perniciēs ac afflictio. Hoc itaque Medicum nosse oportet, & temporis occasionem in singulis pernoscere, quòd alterum quidem per alimētum absoluet & augebit, alterum vero detrahet & minuet. Oportet autem tum in hoc morbo, tum in reliquis omnibus, nò augere morbos, sed festinare vt ipsos exteramus;

*Cor cur nō
sedes sapi
entiæ.*

*Cordis
præcor-
diorumq;
proprie-
tas.*

*Morbus
sacer undè*

*Medicum
quæ scire
oporteat.*

HIPPOCRATIS LIBER

teramus, id quod aduersissimum est morbo exhibendo, non id quod amicum & familiare. A familiari enim & consueto floret ac augetur, ab aduerso vero & hostili perit & dissipatur. Quisquis autem talem mutationem in hominibus nouit, & humidum ac siccum facere potest hominem, calidum item ac frigidum per diætam, hic utique & hunc morbum sanauerit, si occasionem eorum quæ conferunt pernoſcet, citra expiamenta ac incantationes, citraque omnem aliam huiusmodi machinamentorum absurditatem.

HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS LIBER I.

Iano Cornario medico

physico interprete.

*Que me-
dicus præ-
ſtare de-
beat.*



Vi de ſanatione recte inquirere velit, percunctantique reſpondere, & contradicere recte, cum hæc animaduertere oportet. Primum quidem à quibus omnes morbi hominibus fiunt. Deinde vero qui morbi neceſſario ubi facti fuerint, aut longi ſunt aut breues, aut lethales aut non lethales, aut aliquam corporis partem mutilent, aut non mutilent, & qui poſtquam orti ſunt dubij ſint, an mala ab ipſis euentura ſunt, aut bona. Et à quibus morbis ad quales tranſitus fiat. Et quæ per fortuitum ſucceſſum medici ægrotos curantes faciunt. Et quæ bona aut mala ægrotantes in morbis perpetiuntur. Et quæ importune aut dicuntur, aut fiunt à medico ad ægrotum, aut ab ægrotato ad medicum. Et quæ exacte ſunt ac dicuntur in arte. Et quæ recta in ipſa, & quæ non recta. Et quod ipſius principium, aut ſinis, aut medium, aut aliud quid eiufcemodi demõſtratum, quod recte habet ut in ipſa ſit, aut non ſit. Et quæ parua & magna, & multa.

- A** & multa & pauca. Et quod omne in ipsa vnum est, & omnia quod vnum. Et quæ fieri possunt intelligereque ac dicere. & si opus sit, neque intelligere, neque dicere, neque facere. Et quod facilitas in ipsa sit, & quod difficultas, & quod oportunitas, & quod intempestiuitas, & quibus aliis artibus similis sit, & quibus nihil similis sit. Et de corpore, quod calidum sit aut frigidum, aut siccum aut humidum. Et quod forte aut debile, aut densum aut rarum. Et quæ multa, pauca sunt, aut in peius, aut in melius. Et quod honeste aut turpiter, aut tarde aut cito, aut recte aut non recte. Et quod malum supra malum fieri necesse est. Hæc animo versantem obseruare oportet in sermonibus, quantum quis ab his delinquat, aut in dicendo aut percunctando, aut respondendo. Et an quæ multa sunt, pauca dicat, & an quæ impossibilia sunt, possibilia esse asserat. Et quicquid sanè etiam aliud dixerit ac aberrarit, hac ratione obseruare oportet, & in contradictione aggredi & impetere. Morbi quidem igitur vniuersi sūt ex his quidem quæ in corpore insunt, tum à bile, tum à pituita. Ab externis vero, à laboribus & vulneribus. Sed & à calido & supercalefaciente, & à frigido ac superfrigefaciente, & sicco ac superresiccante, & ab humido ac superhumectate. Et bilis quidem ac pituita vnà cum nascentibus gignuntur, & sunt in corpore aut plus, aut minus. Morbos autem exhibent, partim à cibis & potibus, partim à calido supercalefaciente, & à frigido superfrigefaciente. Necessitatem autem talia habēt, vt fiant hæc quum ipsa fiunt, velut veibi causa. In vulneribus eos qui crassos neruos fauciatos habent, necesse est claudos fieri. Itemque si musculorum capita faucia sint, præsertim eorum qui sunt in femoribus. Moritur autem si quis cerebro fauciatu fuerit, aut spinali medulla, aut hepate, aut præcordiis siue septo transuerso, aut vesica, aut vena sanguiflua, aut corde. Non moritur autem vulneratus in his partibus, in quibus hæc membra non insunt, sed ab his longissime absunt. Ex morbis vero tales necessitatem habent, vt ab ipsis perimantur quum fiant, Tabes, Aqua inter cutem ac subter carnem nascens, & si mulierem fortum in vtero habentem peripneumonia, id est pulmonis inflammatio corripiat, aut febris ardens, aut pleuritis siue lateris inflammatio, aut phrenitis, id est membranarum cerebri inflammatio, aut Erysipelas

Omne vnum est.

Quæ morbos creēt.

Bilis & Pituita congenitæ.

Morbi qui mortiferi.

HIPPOCRATIS LIBER

*Que non
semper pe-
rimant.* pelas ignis sacer appellatus, in vtero fiat. Dubij autē mor- D
bi, vt & perdant, & non, tales sunt, peripneumonia, febris ar-
dens, phrenitis, pleuritis, angina, vua, hepatitis, splenitis, ne-
phritis, dysenteria, in muliere fluxus sanguinolentus. Tales
vero non lethales sunt, nisi quid ipsis accedat, affectiones
fluidæ circa articulos, atra bilis, podagra, coxæ dicum morb⁹,
tinefimus qui est voluntas egerendi inuitabilis, quartana, ter-
tiana, strangulatus vrinæ, lippitudo, lepra, impetigo, morbus
*Que mu-
tilent.* articularis. Multi autem frequenter ab his mutili fiunt, fide-
ranturque manibus ac pedibus, & linguæ impotentes red-
duntur. Et ab atra bile quidam leuiter fiderantur. Claudii ve-
ro à coxendicum morbo fiunt. Oculi autem & auditus mu-
*Lōgi mor-
bi.* tilantur à pituita obfirmata. Longos autem necesse est ef- E
fic, tabem, dysenteriam, podagram, affectiones fluidas circa
articulos, pituitam albam, coxendicum morbum, vrinæ stran-
gularum, in senioribus vero Nephritim. Mulieribus vero flu-
xum sanguinolentum, hæmorrhoidas ani, fistulas. At vero
febris ardens, phrenitis, peripneumonia, angina, vua, pleu-
ritis, cito decernunt. Transitus autem fit in his, ex pleuri-
tide in febrem ardentem, ex phrenitide in peripneumoniā.
*Qui cele-
riter de-
cernant.* Verum ex peripneumonia febris ardens non fit, ad dysente-
riam tinefimus accedit, & à dysenteria, lenteria siue leuitas
*Qui in a-
lia tran-
seant.* intestinorum, sequitur: ex lenteria in aquam inter cutem
transitus fit, & ex pituita alba in aquam inter cutem, & ex
peripneumonia ac pleuritide, in pectoris suppurationem.

*Que ne-
cessario
sequitur.* Mala porro supra mala fieri necesse est, velut si rigor cor- F
ripuerit, ardor igneus superuenit. Et si neruus dissectus fue-
rit, conuulsionem facit, & vt dissectus neque coalescat, & for-
titer inflammetur. Et si cerebrum concussum fuerit ac do-
luerit eius qui percussus sit, necesse est euestigio mutum fie-
ri, & neque videre, neque audire. Si vero sauciatum fuerit,
febrem necesse est superuenire, & bilis vomitum, & aliquam
corporis partem fideratam fieri ac perire. Si vero omentū
*Omentū
quādo pu-
trescit.* exciderit, necesse est putrefieri. Et si sanguis ex vulnere aut
vena effluerit, in supernum ventriculum, necesse est ipsum
*Tēpora,
occafio-
nēs.* in pus conuerti. Temporum autem occasiones, vt in sum-
ma dicam, multæ sunt & variæ in arte, quemadmodum etiam
morbi & affectiones, & horum curationes. Maxime vero re-
pentinæ sunt, in his quibus animo defectis opitulari oportet, &

- A** tet, & qui neque urinam neque sterqus egerere possunt, & qui suffocantur, & siulierem parietem aut sauciatam liberare oportet, & quęcunque eiusmodi. Et hæc quidem occasiones repentinę sunt, & paulo posterius non sufficiunt. Plerique enim paulo posterius pereunt. Occasio vero est, si horum aliquid perpetiatur homo, & quis antequam animam efflet opituletur, hoc totum ex occasione opitulatur. Est quidē igitur fermē hæc occasio etiam in omnibus aliis morbis. Semper enim in quocunque sanē quis opituletur tempore, ex occasione opitulatur. Quicūque vero morbi, aut vulnera nō ad mortem tendunt, sed temporarij sunt ac periculosi, doloresque in ipsis fiunt, verum possibile est ut cessent, si quis recte medeatur: His sanē non prosunt auxilia à medico adhibita, quum adhibeātur. Nam & non præsente medico utique cessassent. Alij vero morbi sunt, quibus occasio est ut curentur matutina diei hora, nihil autem refert an valde mane, aut paulo posterius. Alij morbi sunt quibus occasio est, ut semel in die curentur, nec refert quo tempore id fiat. Alij per tertium, aut quartum diem curantur, & alij semel per mensem, & alij per tertium mensem, nec refert an id ipsum tertij augmēto vel fine fiat. Tales itaque occasiones sunt, in quibus non aliam quā hanc certitudinem habent. Intempestiuitas autem hæc est, si quę mane curari oportebat in meridię curentur. Propterea vero intēpestiue curantur, quia inclinationem ad peius habent, propter curationem non in tempore factam. Quęcunque etiam citius siue in meridię, siue vesp̄i, siue noctu curentur, intempestiue curantur. & si vere curari oporteat, curentur autem hyeme, aut si hyeme oporteat, curentur autem æstate: aut si quod iam curari oportet, id ipsum differatur, aut quod differre oportet, id ipsum iam curetur. Talia omnia intempestiue curantur. Recte porrō & non recte in ipsa hæc fiunt. Non recte quidem fit, si morbum alium existentem, alium esse pronuncies: & magnum existentem, paruum dicas, & vicissim paruum, magnū. & si superuietūrum, non superuietūrum pronuncies, & peritūrum non peritūrum. Et si suppuratum existentem non cognoscas, nec morbum magnum in corpore nutriri cognoscas. & si medicamento aut potione quis opus habeat, quo ipsi opus sit non cognoscas. & si quę sanari possunt non sa-

*Curatio
opportuna*

*Que recte
fiunt.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Que non
rue.* nes, & quæ sanatu impossibilia sunt, te sanaturum recipias. Atque hæc quidem circa sententiam non recte fiunt. Circa chirurgiam vero hæc. Pus in ulcere aut tuberculo existens non cognoscere: & fracturas ac luxationes non cognoscere, & specillo admoto ad caput non cognoscere an os fractum sit: & fistulam in vesicam immisam demittere non posse, & lapidem in vesica existentem non cognoscere: & suppuratum existentem ex concussione non dinoscere, & secando aut v-
*Quid rite
fiat.* rendo, aut à profunditate, aut à longitudine aberrare, aut v-
*Perperâ
medican-
dâ nō est.* rere & secare quæ non oportet. Et hæc quidem non recte. Recte autē fiunt hæc. Morbos cognoscere qui sint, & à quibus, & qui ipsorum longi, & breues, & lethales & non lethales, & qui transmutantur, & qui aurescunt, & qui minuuntur, & qui magni, quique parui. & dum curas possibiles quidem curare, impossibiles vero scire cur curatu sunt impossibiles, & dum curas eos qui tales habent, per curationē quantum possibile est opitulari. Quæ vero offeruntur agrotis, ea sic obseruare oportet, recte ne an secus fiant, veluti si quis quæ siccare oportet, humectet, aut si crassescere oporteat, non exhibeat à quibus crassitudo inducitur. aut si quæ attenuare oportet, non attenuet, quæ frigefacere, non frigefaciat. quæ calfacere, non calfaciat. quæ putrefacere, non putrefaciat, & reliqua iuxta eandem rationem. Talia autem
*Que suo
tēpore u-
niunt bo-
na sunt.* sua sponte ac casu hominibus in morbis fiunt, tum bona, tum mala. Febrienti ac bilioso, in tempore foras dispersa bilis, bonum: diffusa vero ac dispersa sub cutem, toleratu leuior est habenti, & curatu faciliior sananti. diffusa autem ac dispersa & ad vnam aliquam corporis partem allapsa, malum.
Erysipelas Aluus turbata in pleuritico aut peripneumonico, aut suppurato, malum. Febrienti aut vulnerato aluus resiccata, malum. Subaquoso ac lienoso ab alba pituita detento, aluus fortiter turbata, bonum. Erysipelas si extra diffusum intro vertatur, malum. Si vero intra diffusum foras vertatur, bonum. A profluuiio alui forti correpto, vomitus superueniens, bonum. Mulieri sanguinem vomenti menses erumpere, bonum. A fluxione vero infestata, ad nares aut os fluxionem transire, bonum. Mulieri à conuulsione pressæ ex partu, febrem superuenire, bonum. Et tetano ac conuulsione occupante, igneum ardorem superuenire, bonum.

Talia

- A** Talia enim per nullam medicorum ignorantiam, aut scientiam, fiunt, & non fiunt, sed sua sponte ac fortuito casu fi-
entia, & profunt, & nocent, iuxta eandem rationem. Cæ- *Quæ bona
malæ
medicus
faciat.*
terum Medici talia per fortuitum successum bona, in cura-
tione faciunt. Nimirum si medicamento sursum purgâte da-
to, & sursum & deorsum probe purgât. Et si mulieri medica-
mento dato, quod bilem aut pituitam deorsum purgat, men-
ses aliâs non fluentes erumpant. Et si lienem suppuratum ha-
benti medicamentum dederint, quod bilem ac pituitam de-
orsum purget, & sic pus deorsum à liene expurgent, & à mor-
bo liberent. Et si medicamento exhibito calculoso, calculum
in vrinarium meatum præ pharmaci violentia protrudant,
vt per vrinam eiiciatur. Et si medicamentum dederint quod
B pituitam sursum purgat, ei qui pus in superiore ventriculo
in tuberculo habet, non scientes quòd habet, isque pus vo-
mat ac sanus fiat. Et si eum qui ex medicamento sursum
purgâte superpurgatur, sua sponte aluo subter erumpente, à vo-
mitu sanum faciant. At vero Malæ operantur Medici præ *Quæ non
bene me-
dico suc-
cedunt.*
infortunio hæc. Si pharmaco bilis aut pituitæ sursum ducti-
uo dato, venam in pectore præ vomitu rumpant, ei qui pri-
us nullum manifestum dolorem in pectore habuit, atque sic
fiat morbus. Et si mulieri in vtero habenti medicamentum
superne purgans exhibeant, aluus autem inferne erumpens
foetum expellat. Et qui suppuratum curat, si aluus proflua
fiat, ipsum perdit. & qui oculos curat ac sublinat, si dolores
incidant acutiores, & si ita contingat, rumpantur oculi & de-
C struantur, accusant medicum quòd oculos subleuit. Et si pu-
erperæ in ventris dolore medicum aliquid det, & male ha-
beat aut pereat, medicus in culpa est. Firmè autem quæcun-
que necessitatem habent vt fiant in morbis ac vulneribus *Quibus nõ
iure medi-
cus argua-
tur.*
mala supra mala, ea vbi fiunt, in medicum culpam reiciunt,
& necessitatem talia fieri cogentem non agnoscunt. Et si ad
febricitantem aut vulnus habentem ingressus, admotis quàm
primum remediis non opituletur, sed postera die æger peius
habeat, medicum accusant, Si vero opituletur, non æquali-
ter laudant. Oportere enim ipsum perperam putant, vlceraque
inflamari, & in morbis quibuscûq; dolores fieri oportere, neq;
tales esse vt ne fiant. Nervus præcisus ac dissectus non co- *Quæ non
coarctat præ-
cisa.*
lescit, neque vesica, neque aliquod ex tenuibus intestinis.

HIPPOCRATIS LIBER

*Principiū
artis cur
nullū est.*

neque vena sanguiflua, neque tenuis genæ pars, neque pu-
dendi pellicula. Porro principium sanationis demon-
stratum quidem non est, quod sanè recte principium sit vni-
uersæ artis, neque secundum aliquod, neque medium, neque
finis. Sed incipimus ab ea aliquando dicentes, aliquando o-
perantes, & definimus eodem modo. Et neque dicentes ex
iisdem sermonibus incipimus, neque si de iisdem dicamus,
neque in iisdem definimus & operantes iuxta eandem ra-
tionem, neque ex iisdem operibus incipimus, neque in iis-
dem definimus. At vero facilitas ac promptitudo in his
est. Quum quis secans aut vrens, neque nervum secet, neque
venam. Et si suppuratum vrat, pus consequatur. Et si secet,
eodem modo. Et fracturas recte componere. Et si qua pars
corporis ex natura excidat, vt ipsam recte ad naturam re-
trudat. Item apprehendere fortiter ea quæ oportet, & ap-
prehendendo premere. Et apprehendere leuiter ea quæ o-
portet, & apprehendendo non premere. Et in obligatio tor-
tuosa non facere ex rectis, neque premere quæ non oportet.
Et in contactu vbicunque tandem contigerit, dolorem ex
superfluo non exhibere. Hæc quidē igitur facilitatis ac pro-
ptitudinis existant. At vero digitis decenter attingere, aut
probe, aut non probe, aut longis, aut breuibus, aut probe de-
ligare omnes deligaturas, non ad artem pertinere iudicatur
de facilitate ac promptitudine, sed seorsim. Quicumque
suppurati fiunt pulmone, aut superiore vel inferiore ventre,
aut tubercula habent, siue in superiore ventre siue infe-
riore, aut in pulmone, aut vlcera intrinsecus, aut sanguinem
vomunt aut spuunt, aut dolorem aliquem habent, vel in pe-
ctore vel in dorso: Hæc omnia habent ex his quidem quæ
in corpore insunt, à bile & pituita: ab externis vero ab aere
infito calori ammixto. Sed & à laboribus ac vulneribus. Et
quicumque quidem pulmone suppurati fiunt, ab his fiunt. Si
peripneumonia correptus in iudicatoriis diebus non pur-
getur, sed relinquatur in pulmone sputum ac pituita, suppu-
ratus fit. Et si quidem statim curatus fuerit, vt plurimam effu-
git, si vero neglecta fuerint illa in pulmone, corrumpitur, il-
lis & inhærentibus & putrescentibus, vlceraturque pulmo &
suppuratus fit, & nō amplius intro ad seipsum nutrimentum
memorable trahit, neque quicquam depurgatur ab eo sur-
sum, sed.

Asum, sed suffocatur, & semper amplius difficulter spirat, & respirando itterit, & respirat illinc sursum ex pectore, tandem vero obturatur à sputo, & moritur. Fit autem & suppuratus, si pituita ex capite ad pulmonem destillet, & primum quidem ut plurimum latenter defluit, tussimque tenuem exhibet, & sputum paulo amarius solito, & aliquando tenuis adest calor. Temporis autem progressu, exasperatur pulmo, & intus exulceratur à pituita inhaerente ac putrescente: & gravitatem exhibet pectori, & dolorem acutum ante & retro, caloresque acutiores in corpus incidunt, & pulmo à calore trahit ad se pituitam ex toto corpore: & maxime ex capite. Caput vero calefactum ex corpore, & hanc putrescentem subcrassam spuit. Quanto vero magis tempus progreditur, tanto magis pus sincerum spuit, & febres acutiores fiunt, & tussis frequens ac fortis, & inedia vexat, & tandem aliud inferne turbatur. Turbatur autem à pituita, pituita vero de capite descendit. Hic quum ad hoc peruenerit, perit quemadmodum dictum est in superioribus, purulento ac putrido pulmone facto, aut ventre infra erumpente.

Fit praeterea & ab his pulmo suppuratus. Quum venula videlicet aliqua in ipso fuerit rupta, rumpitur autem à laboribus: & ubi rupta fuerit, sanguinem fundit, si quidem crassior fuerit, amplius, sin tenuior, minus, & sanguinem quidem ipsum partim confestim spuit, partim vero nisi vena adstringatur, in pulmonem funditur, & in ipso putrescit, & ubi putrefactus fuerit pus facit. progressu vero temporis aliquando pus sincerum, aliquando pus subcruentum, aliquando sanguinem, & si magis repleta fuerit vena, ipsam sanguinis copiam aceruatim à seipsa reuomit, spuiturque pus crassum ab accessoria & intus putrescente pituita. Hic si anticipetur incipiente morbo, priusquam vena sanguinem fundat ac fortiter laxetur, & priusquam attenuetur, & in lecto decumbat, & caput corrumpi incipiat, & reliquum corpus colliquari, superstes ab hoc morbo euadit. Si vero neglectus fuerit, & haec occuparint, ut ea perpetiatur aut omnia, aut plurius, perit. perit autem hic aut ex iisdem quae superius dixi, aut à vomitu, sanguine multo multoties per vomitum reiecto. Si vero vena omnino quidem rupta non fuerit, verum acutus tractus in ipsa fiat, fit autem maxime velut varix

*Vena fra
cta signa.*

*Varix in
terior.*

HIPPOCRATIS LIBER

qui etiam statim ubi factus fuerit, dolorem quēdam tenuem D
inducit, ac tussim aridam. Si vero diu durauerit & neglectus
fuerit, primum quidem sanguinem modicum ac subnigrum
dimittit ac reiecit, deinde vero adhuc copiosiores & sice-
rissimos, deinde pus, patiturque quęcunque in superioribus
dicta sunt. Conducit autem talibus, si ab initio curandos
suscipias, ut & venę de manibus sanguinem emittant, & dic-
ta à qua quā siccissimus & exanguissimus fiat. Eodem
porro modo etiam venę in latere afficiuntur, quę intus in
superficie sitę sunt. Quum igitur affectę fuerint, varico-
seque factę, & intus eleuata, & neglectę fuerint hęc perpe-
tiuntur. Erumpunt & spunt à se sanguinem, & aliquando et-
iam vomunt, & suppurati fiunt, & ut plurimum pereunt. Si E
vero curentur incipiente morbo, rursus in loco venę confi-
dunt ad latus, humilesque fiunt. Et pulmo ab his suppuratus
redditur, & ab ipso etiam talia perpetiuntur, & sic moriuntur.

Ceterum superiore ventre suppurati multipliciter fiunt.
Nam quum pituita de capite copiosa & aceruatim in supe-
riorem vētrem fluxerit, putrescit & in pus vertitur. Putrescit
autem maxime in diebus viginti vna. Hoc igitur pus cōcuti-
tur & intus fluctuat ad latera allabens. Hic si vratur aut sece-
tur priusquā diuturnū fiat pus, sanus plerumque euadit. Fiūt
autem & superiore ventre suppurati ex pleuritide, quum for-
tis fuerit, & in iudicatoriis diebus neque putruit, neque spūto
reiecta est, sed latus exulceratum fuerit à pituita affixa, & bi-
le, & quum vlus factum fuerit, reddit de se pus, & ex vi-
cinis locis prę caliditate in seipsum pituitam adducit, & hęc
ubi cōputruit, pus spuitur. Aliquādo vero etiam ex venis san-
guis se in vlus ingerit, & putrefactus pus fit. Hic si euestigio
assumatur, sanus plerumque fit, si vero negligatur, perit. Fiunt
pręterea suppurati etiam, si pituita de capite delapsa, ad la-
tus adglutinata fuerit & putruerit. Tunc enim latus ut pluri-
mum inflammatur, & patitur eadem quę ex pleuritide sup-
puratus. Fiunt & quum prę labore, aut exercitiis, aut alio
quopiam modo, vena ante aut retro fuerit rupta, & sic rupta
ut nō statim spuat sanguis, sed in carne acutus tractus siue
varix fiat: & caro tracta ac cōuulsa humiditatē modicā traxe-
rit, & subliuida facta fuerit: & statim quidē sic affectus non
pcipit prę robore ac bonā habitudine, aut si etiā sentit, nihil
molesti

Medela.

*Purulētus
unde.*

*Purulētus
uētriculus
superior
quot mo-
du fiat.*

F

A molesti esse putat. Hic ubi deprehenderit, quum iam præ febribus, aut potu, aut venere, aut aliqua alia re correptus, fuerit attenuat³, caro sauciata subresiccatur & subcalescit, & humiditatem in seipsam à vicinis tum venis, tum carnibus trahit. Vbi autem attraxerit, intumescit & inflammatur, & dolorem exhibet tenuem, & tussim raram & siccam primum. Deinde adhuc magis trahit in seipsam, & dolorem inducit vehementiorem, & tussim frequentiore. Et primum quidem subpurulentum sputum. Aliquando vero liuidum & subcruentum. Et quanto magis tempus progreditur, amplius in seipsam trahit ac putrefacit. & de ipsa carne quantum ab initio liuidum erat, hoc pus fit: & dolorem acutum exhibet, & febrem, & tussim multam ac frequentem, & per sputum sincerum pus expuit.

B Si vero pus in ventre morem traxerit, totum corpus ab ipso calefit. Maxime vero vicinissima partes. Calescente autem corpore, humiditas maxime eliquatur. Et quæ quidem à supernis partibus eliquatur, in supernum ventriculum maxime confluit, & pus fit, ad hoc quod iam in ipso est. Pars vero eius etiam in infernum ventriculum fluit: & quandoque alius ab ipsa turbatur, & hominem perimit. Nam cibi ingesti secedunt inconcocti, & alimentum ab ipsis corpori non accedit. Et sputi sursum purgatio non æqualis contingit, alio nimirum calefacta, & omnia deorsum trahente in seipsam. Et à sputo quidem suffocatur & stertit, dum non purgatur: à ventre vero fluente debilitatur, & plerumque perimitur. In huiusmodi autem morbis hunc fluxum maxime exhibet caput, utpote quod cauum est, & superne situm. Quum enim ab aluo fuerit calefactum, tenuissimam pituitam de corpore in seipsum trahit. Vbi vero hæc in ipso fuerit collecta, reddit rursus acervatam & crassam, velut dictum est: & pars quidem ipsius in supernum ventriculum defluit, pars vero in infernum.

Quum igitur caput fluere inceperit, & reliquum corpus colliquari, non amplius æqualiter, ne vsti quidem, superstites evadunt. Superant enim supra pus influentia mala, ea quæ defluunt: & carnes liquefcunt magis à malis, quam nutriuntur ab ingestis. Qui vero huiusmodi morbos habent, partim ab his brevi pereunt, partim diutius tempus extrahunt. Differt enim corpus à corpore, & ætas ab ætate, & affectio ab affectione, & tempus à tempore, in quo ægrotarint: & aliqui ma-

*Capitis
rheuma.*

HIPPOCRATIS LIBER

iorem tolerantiam in morbis habent, alij omnino ad tolerandum impotentes sunt. Proinde certitudo exacta temporis in quo pereunt non est, an longum, aut breue futurum sit. Neq; enim hoc tempus certum est quod quidam definiunt; & plerunque neque hoc ipsum suppurat. Differt enim & annus ab anno, & tempus à tempore. At si quis de ipsis recte cognoscere ac dicere velit, is cognoscet omni tempore, & perire, & superstites euadere, & pati quæcunque tandem patiantur.

*Qui uetris
culus inferi
rior puru-
lent⁹ fiat.*

Cæterum inferno ventriculo suppurati fiunt, maxime quidem quum pituita aut bilis acervata inter carnem & cutem collecta fuerit. Fiunt autem & à conuulsionibus, quum venula conuulsa rupta fuerit, sanguis effusus putrescit & suppuratur. Si vero caro conuulsa fuerit, aut contusa, sanguinem ex venis sibi ipsi propinquis trahit, atque hic putrescit ac suppuratur. His si quidem foras de se significationem præbuerit & eruperit pus, sani fiunt. Si vero sua sponte intro proruperint, pereunt. At vero diffusum pus in ventriculo inferno, veluti in superno dictum est, generari haud quaquam poterit, sed velut à me dictum est, in tunicis & in tuberculis innascitur. Et si quidem intro notas habuerit, cognitu difficile est. Neque enim ex concussione cognoscere licet. Cognoscitur autem maxime ex dolore ubi fuerit, & si terram figulinâ, aut aliud quid huiuscemodi imposueris, breui id resiccatur. Ery-

*Pulmonis
erysipe-
las.*

sipelas autem in pulmone fit, ubi pulmo fuerit nimium resiccatus, id quod cõtingit ab ardore, & à febribus, & à labore, ac intemperie. Et quum superresiccatus fuerit, plurimû sanguinis in seipsum trahit, maxime quidem & plurimû ex magnis venis. Hæ enim ipsi vicinissimæ sunt, ac ipsi incumbunt. Trahit etiam ex aliis vicinis. Et tenuissimû ac debilissimum trahit. Postquam autem traxit, febris ex ipso fit acuta, & tussis sicca, & repletio in pectoribus, & dolor acutus in anterioribus ac posterioribus partibus, maxime circa spinam, nimirum magnis venis percalefactis; Et vomunt aliquando subcruentum, aliquando liuidum. Vomunt item pituitam & bilem, & frequenter animo linquuntur, propter sanguinis transmutationem derepente contingentem; atque hoc maximum signum est Erysipelatis in pulmone generati, & si assidua febris inuasio contigerit. Huic si quidem duobus aut tribus aut quatuor ad summum diebus, id quod intus est diffusum fuerit ac transierit

- A** transferit foras, plerumque sanus euadit. Si vero non diffundatur ac foras transeat, intus putrescit, & suppuratus fit ac perit. Perit autem breui, utpote pulmone toto suppurato ac putrido. Si vero foras diffusum, intro vertatur & pulmonē corripit, huic nulla vitæ spes reliqua est. Quum enim antea resiccatus pulmo, traxerit in seipsum, non amplius dimittit, sed statim ab ardore, & siccitate, nihil amplius suscipit, neque quicquam sursum distribuit, sed corrumpit. Tuberculū in pulmone fit hoc modo, quum pituita aut bilis coacta putrescit. Et quandiu quidem adhuc crudius fuerit, dolorē exilem, ac tussim siccam inducit. Postquam autem maturum factum fuerit, dolor & ante & retro acutus fit, & calores corripiunt, ac tussis vehemens. Et si quidem quā celerissime maturuerit, & eruperit, & pus sursum vertatur, ac totum expuatur, & vētriculus in quo fuerat pus, contrahatur ac resiccet, penitus sanus euadet. Si vero ruptum quidem fuerit quā celerrime, & maturatum, ac repurgatum, verum penitus resiccare non poterit, sed ipsum tuberculum à seipso pus produxerit, & à capite sanè tunc, itemque reliquo corpore pituita ad tuberculum defluens putrescit, & pus fit, ac expuitur, per quod homo perimitur. Perimitur autem à ventre fluente, ab his quæ antea relata sunt, & loquente ipso ac intelligente omnes res, æque ut in priori tempore, resiccatur ac perfrigeratur, conuiuentque venæ in corpore omnes, utpote sanguine ex ipsis à febre exusto; quandoque vero etiam præ temporis longitudine ac morbi magnitudine, tum malorum iam præsentium, tum eorum quæ insuper accedunt. Quod si multo tempore rumpi non possit, neque sua sponte, neque à medicamentis, consumitur debilitatus à doloribus vehementibus, & inedia, & tussi, & febribus, & ut plurimum perimitur. Si vero iam attenuato, & in lectum reclinato, pus eruperit, neque sic valde reualescunt, sed tali modo perimuntur. At si eruperit quidem quā celerrime, & maturuerit, maturatum autem multa sui parte ad septum transversum effundatur, statim quidem melius habere sibi videtur. Verum progressu temporis si quidem totum per sputum reiecerit, & vētriculus in quo pus inerat, confidat ac resiccet, sanus euadit. Si vero & tempus longius protrahatur, & ipse debilior fiat, & per sputum reiicere nequeat, sed vstus fuerit aut fetus, &

*Pulmonis
uomica.*

*Pulmonis
uomica
quando
sanescat.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Costarum
uornica.*

Ruptioes.

ctus, & pus exeat, statim quidem & sic melius habere sibi videtur, verum tempore procedente perimitur ab iisdem quæ prius reſata ſunt. Porro in latere ſunt tubercula, & à piquita & bile eadem ratione qua in pulmone. Fiunt etiam à laboribus, quum vena aliqua tracta rupta fuerit, non tamen penitus rupta, ſed ita vt acutus tractus in ipſa factus ſit. Si quidem igitur rupta fuerit, ſtatim ſanguis è vena effuſus putreſcit & ſuppuratur. Si vero acutus tractus in vena fiat, principio quidem dolorem exhibet ac pulſat, progreſſu vero temporis diſtribuit vena ſanguinem in carnem, atque hic in carne putreſcens, pus ſit. Eodem modo & caro, ſi quidem magis doluerit, & ſanguinis plus in ſeipſam trahit ex viciniſſimis venis, & ſtatim ſuppuratur. Si vero minus doluerit, tardius & trahit, & ſuppuratur. Quibuſdam autem quum debiles facti fuerint tractus in carnibus, aut venis non ſuppuratur, ſed ſunt dolores diuturni, & vocantur Ruptiones. Et quæ quidem in carne ſunt, hoc modo ſunt. Quum caro afflicta fuerit, aut conuulſa, aut percuſſa, aut aliud quid perpeſſa, liuida velut antea dixi ſit, non ſincero ſanguine, ſed tenui & aquoſo, eoſque modico. Quum autem plus ſolito fuerit reſiccata, percaleſcit & dolorem exhibet, & à venis ac carnibus vicinis humiditatem in ſeipſam trahit: & vbi nimium fuerit humectata, atque ea ipſa humiditas vbi à carne fuerit ſupercalefacta, per totum corpus diſpergitur, qualis eſt attracta, magis tamen in venas diſpergitur quàm in carnes. Venæ enim magis trahunt quàm carnes. Trahunt tamen etiam carnes, Quando vero ad multam in corpore humiditatem, modica de carne attracta fuerit, obſcura iam ſit, & doloris exors, & pro morbida cum tempore ſana euadit. Si vero caro magis fuerit percalefacta, & ampliorem humiditatem traxerit, dolorem exhibet: & ad quamcunque corporis partem ab ipſa proceſſerit ac firmata fuerit, dolorem inducit acutum, & aliqui putant ipſis ruptionem tranſmutatam eſſe, verum hoc fieri non poteſt. Propinquiffima vero vlceri ſunt quæcunque talia & alia. At humiditas de carne exilit per venas, quum autem percalefacta, & craſſa, & copioſa facta fuerit, dolorẽ exhibet, donec ſimilis fiat reliquæ humiditati, in tenuitate ac frigidityte. Quæcunque vero in venis ſunt, ſic habent. Ipſa quidem vena inquantum tracta eſt, in loco manet.

Quum

- A** Quum autem tracta fuerit (trahitur autem ac connellitur à labore & violentia) fit veluti varix. Percalescit autem & trahit in seipsam, liquidam quandam humiditatem, quæ est à bile ac pituita. Et vbi mixta fuerint sanguis & humiditas de carne, crassescit sanguis, & multipliciter ipse seipso, ea parte qua vena conuulsa est, & morbosior fit, & amplius stabilior. Et quum copiosior factus fuerit, plenitudo ipsa transmigrat, quocunque tandem contigerit, & dolorem inducit acutum, vt aliquibus videatur ruptio locum permutasse. Et si contigerit vt ad humerum transferatur, & gravitatem in manu inducit, & torporem ac segniciem. Et si quidem ad venam proruperit, aut ad humerum & dorsum tendat, dolor plerumque statim quiescit. Fiunt porro conuulsiones & à laboribus, & lapsibus, & à plaga, & si quis onus maius leuet, & à cursibus & lucta, & eiusmodi omnibus. Quicunque vero à vulneribus suppurati fiunt, aut ex hasta, aut pugione, aut iaculo, intro sauciati fuerint, quandiu quidem habuesit vlcus respirationem foras, per antiquum vulnus, & hac parte frigidum in seipsum adducit, & calidum à seipso hac parte emit tit, & sanè facile tum pus, tum si quid est aliud expurgatur. Et si quidem & interna & externa pars simul fuerint sanata, sanus penitus homo euadit. Si vero externa quidem sanata fuerit, interna vero non, suppuratus fit. Et si etiam sanata simul sint interna ac externa pars, cicatrix autè intus debilis fiat, & aspera ac liuida, reulceratur quandoque, atque sic suppuratus fit. Rursus exulceratur etià si quid amplius laborarit, et si attenuatus fuerit, & si pituita aut bils ad cicatricem affixa fuerit, & si alio morbo correptus attenuatus fuerit. Vbi vero vlcus factum fuerit, siue hoc modo, siue vbi externa pars priusquam interna coaluit, dolorem acutum inducit, & tussim, & febrem: & frigiditatem ipsum sibiipsum vlcus inducit, eo quod amplius calidum existat: & ipsum à seipso caliditatem efflat, & pus expurgatur, & per longius tempus curatur, & tardius sanescit: quandoq; vero neque sanescit. Nam caro, & vlcus, ab ardore qui est in corpore coquitur, & nimium humectatur, vt nō possit neque sicari, neque carnem producere, neque sanari. Sed cum temporis progressu moritur, patiens talia quæ etiam prius dicta sunt.
- At si contingat vt crassarū venarū aliqua saucietur, & sanguis

Vena conuulsa.

πληρομα

Purificatus vulnere.

Cur quandoque vulnus non coalescat.

Purulentum alia de causa.

HIPPOCRATIS LIBER

quis intro fluat ac putrescat, suppuratus sit. Et si quidem hoc pus totum per sputum reiectum fuerit, & vena lauciata coaluerit, & vlcus intus ac foris sanatum fuerit, penitus sanus euadit. Si vero neque vlcus intus coalescere poterit, neque vena constringatur, sed alias atque alias sanguinem remittat. Et si statim vomatur & spuatur, aut etiam putrescat, & pus expuatur, plerumque perimitur, aut statim sanguine vomens, aut posteriori tempore, dum perit ab iisdem quæ antea dicta sunt. Sæpe vero hi quibus venarum aliqua intus lauciatur à vulneribus, aut quibusdam laboribus, aut exercitiis, aut alia quadam causa, quum coaluerit & sana esse videtur vena, alio tempore iterum rumpitur, idque ab iisdem contingit causis, à quibus etiam prius patiebatur. Vbi vero iterum rupta est, sanguinem fundit, & statim pereunt sanguinem multum ac sæpe vomentes (aut alias atque alias sanguinem recente vomunt) pus autem spuantes per omnem diem multum ac crassum, tali aut consimili modo pereunt, velut etiam in aliis morbis dictum est. At vero in his ac similibus morbis multum refert, quantum ad facilem ac difficilem curationem, vir sit an mulier qui morbum habet, iuuenis an senex, & mulier iuuenicula an anicula. Et præterea tempus à tempore differt in quo ægrotant. Interest item an ex alio morbo ægrotent, aut non ex alio. Differt etiam affectus ab affectu, maior à minore, & corpus à corpore, & curatio à curatione. His autem sic inter se differentibus, necesse est etiam tempus diuturnitatis differre: & aliis longius fieri, aliis breuius: & alios perire, alios non: & morbos aliis durabiles esse & maiores, aliis minores & brevis temporis: aliis permanere vsque ad senectutem & commori, alias perire ab ipsis breui. Et qui quidem iuniores patiuntur eas affectiones, quæ à laboribus fieri dictæ sunt, hi & ampliores & vehementiores ipsas patiuntur, & magis quam alij dolent, & statim in ipsis manifestæ fiunt, ut sanguinem aut spuant, aut vomant. Sed & quædam sententia fallunt ipsos, præ bona corporis habitudine. Seniores autem raro quidem patiuntur, & si patiantur, debiles ipsas perpetiuntur, utpote ipsi debiliores existentes, & remittunt magis ipsi, & affectionum maiorem curam gerunt. Fiunt igitur ab initio omnino minus seniori quam iuniori, & ubi factæ fuerint, seniori debiliores fiunt, iuniori vehementiores. Et iuniori quidem

*Diuerfitas
uaria.*

*Morborum
affectus
diuersi.
Seniorum
& iuniorum
affectus.*

Ari quidem, utpote qui habet corporis vigorem & ficitatem, & carnem densam ac robustam & ad ipsa ossa affidentem, cute circum ipsam circumtenta: quum aliquid amplius laborarit, solito magis & derepente, conuulsiones vehementes hunc, & ruptiones multæ ac omnigenæ venarum ac carniū. Et novum aliqua statim manifesta fiunt, aliqua posteriori tempore comparent. At senioribus vigor fortis non inest, & carnes circum ossa diffuunt, & cutis circum carnes: & ipsa caro rara est ac debilis, & neq; tale quid pati possit similiter senior veluti iunior. Et si quid patiat, leuiter patitur, & statim manifestum redditur. Atque intantum quidem in affectionum principio, iuniores senioribus difficiliter liberantur. *Quæ* vero morbus conspicuus factus fuerit, & aut pus, aut sanguinem, aut utrunque expuerint, qui quidem iuniores sunt, quæ corpus ipsorum sit robustum ac densum, non æqualiter depurari possunt ab ulceribus, quorum pus in superno ventriculo existit. Nam & pulmo non valde trahit ad arterias, ut qui densior sit: & arteriæ quum tenues & arctæ sint, pus non suscipiunt, nisi modicum & raro. Quare necesse est pus in thorace, & in viceribus coaceruari & crassum fieri. At seniori & pulmo rarior ac cavius est, & arteriæ ampliores, ut pus non diutius in ventriculo & ulceribus moretur, & quicquid eius insuper generatum fuerit, hoc totum necessario sursum attrahitur à pulmone ad arterias, & statim expuitur. In iunioribus igitur, utpote quum sint affectiones vehementiores, & purgatio pro ipso ratione non fiat, & febres acutiores & frequentiores fiunt, & dolores acuti incidunt, tum in ipso affectionis loco, tum in reliquo corpore: nimirum quum venæ sint robustæ ac sanguine plenæ. Vbi vero hæ percaleſcunt, dolores ab ipsis transiliunt alias ad aliam corporis partem. Ac hi quidem plerumque breui perimuntur. Senioribus vero quum affectiones sint debiliores, & sputum ab ipsis purgetur, & febres mitiores, ac paucae fiunt, & dolores adſunt quidem, verum exiles. Et ab huiusmodi affectionibus ne senes quidem penitus liberantur. sed longo tempore afflicti per-eunt. Et aliquando pus spuunt, quandoque sanguinem, quandoque neutrum, tandemque cum his moriuntur. Moriuntur autem hoc modo, quum ipsos morbus aliquis huic quem antea habent consimilis apprehendit, ita ut & hunc habeant, & is quem

*Pulmonis
uarietas.*

*Cur iuue-
nes magis
quàm se-
nes affi-
ciantur.*

HIPPOCRATIS LIBER

Morbi periculosi. is quem prius habent vehementior fiat, & vt plurimum per-
eunt. At vero morbi qui hos morbos efficiunt, maxime sunt
plenitudo & peripneumonia. Febris porro ab his fit. Quum
bilis aut pituita calefacta fuerit, totum reliquum corpus ab
his calefcit, & vocatur hoc febris. Calefcit autem bilis &
pituita, intrinsecus quidem à cibis & potibus, à quibus etiam
nutritur ac augetur. Extrinsecus autem à laboribus ac vulne-
ribus, & à calido nimium calefaciente, & à frigido nimium
frigefaciente. Calefcit item à visu & auditu, Verum mi-
nimum ab his. Rigor autem in morbis fit quidem & ab
Morborum frigus unde. externis, ventis, aqua, serenitate, & aliis huiusmodi. Fit
autem & ab ingestis cibis ac potibus. Maxime vero & ve-
hementior fit, quum bilis & pituita sanguini fuerint per-
mixta, aut altera ex his, aut vtraque. Magis tamen si pi-
tuita sola permixta fuerit. Est enim pituita frigidissima ex
Pituita frigida, calidior sanguis. natura. Calidissimus autem sanguis. Frigidior est etiam ali-
quanto bilis sanguine. Quum igitur hi humores ambo, aut
alter solum, permixti fuerint ad sanguinem, ipsum congelât,
non tamen omnino. Neque enim viuere posset homo, si san-
guis defior & frigidior seipso multis modis fieret. Frigescē-
te igitur sanguine, necesse est & reliquum totum corpus per-
frigerari, & vbi huiusmodi quid factum fuerit, rigor appella-
Rigor. tur. Et si quidem vehemens fiat rigor, vehementior est etiam
tremor. Nam dum contrahuntur venæ, sanguine & coactio &
congelato, corpus & contrahunt, & tremere faciunt. Si vero
minus aliquâto sanguinis coactio fiat, hoc rigor appellatur.
Horror. Horror autem dicitur debilissimus rigor. Quod autē post
rigorem necessario corripiat febris, aut maior, aut minor, sic
habet. Quum sanguis percaluerit, & vim depulerit, ac rursus
ad suam naturam redierit, concalefcit simul & pituita, & bi-
lis sanguini permixta. Et sanguis ipse seipso multipliciter ca-
lidior euadit. His igitur percalefactis, necesse est febrem suc-
Feruos. cedere post rigorem, præ sanguinis caliditate. Sudor vero
Sudor. fit hac de causa. Quicumque morbi in iudicatoriis diebus iu-
dicantur, & febrilis ignis dimittit, in his de pituita & bile
quod tenuissimum est eliquatur & secernitur, & secedit par-
tim extra corpus, partim intus & isthic in corpore relinqui-
tur partim præ caliditate attenuatur, & vapor fit, & cum spi-
ritu permixtū foras procedit. Atq; hæc quidem huiusmodi
sunt, &

- A** sunt, & ab his sudor generatur. Quare vero quandoque calidus, quandoq; frigidus est, ita contingit. Calidus quidem de percalefactio malo, & exusto, & attenuato, & debili, & non valde multo secernitur, & necesse est ipsum calidiorem ex corpore excerni. Frigidus autem de ampliore malo secernitur, & de eo quod reliquum est & adhuc validum, & nondum putrefactum, neque attenuatum, neque exustum, & frigidior ac crassior & graueolentior prodit. Manifestum autem hoc ex hac re fit. Qui frigidum sudorem exudant, è longis morbis plerumque agrotant, inualecente malo eo quod in corpore relinquitur. Qui vero calidum sudorem excludunt, citius à morbis liberantur. Pleuritis & Peripneumonia sūt hoc modo. Pleuritis quidem, quum potiones aceruatae & fortes valde corripunt. Percalefcit enim totum corpus ac humectatur à vino. Maxime autem & bilis & pituita percalefcit ac humectatur. Et sanè his commotis ac humectatis, contingeret ut rigor inuadat ebrium siue sobrium. Et quum latus natura carne nudum sit, præ omnibus corporis partibus: & non sit quicquam in ipso quod renitatur, præter ventriculi cauitatē: maxime rigorem percipit. Et quum riguerit ac perfrigeratū fuerit, tum caro quæ est in latere, tum venæ, contrahuntur ac conuelluntur. Et quantum in ipsa carne inest bilis ac pituitæ, aut in venis quæ in ipsa carne sunt, id magna ex parte, aut totum secernitur, introque compellitur ad caliditatem, carne extrinsecus condensata: atque id ad latus affigitur, & dolorē vehementem exhibet, & percalefcit: & per caliditatē trahit ad seipsum, à vicinis venis ac carnib⁹, pituitam ac bilem. Atque hoc sanè modo fit. Vbi vero ad latus affixa putruerint, & per sputum reiecta fuerint, sani fiunt. Si vero & antiquū multum affixum fuerit ad latus, & aliud insuper accesserit, statim pereunt, præ saluæ copia expuere nequeunt: aut suppurati fiunt, & partim pereunt, partim euadunt, Indicium autem hæc de se præbēt in septem diebus, aut nouem, aut vndecim, aut quatuordecim: dolorem quoque inducunt ad humerum, & ad clauiculam, & ad alas, hac de causa. Vena quæ splenitis appellatur, tendit à splene ad latus, à latere vero ad humerum & sinistram manum. Hepatitis autem ad dexteram partes eodem modo: & quum huius in latere pars à rigore contracta fuerit, & sanguis in ipsa horruerit, ad alas & clauiculā ac humerum

Calidus frigidusue cur.

Pleuritis, peripneumonia.

Vena splenitis.

HIPPOCRATIS LIBER

Peripneumonia qui fiat.

Splenitis hepatitis & uena.

merum concedit, & conuellit ac dolorem inducit. Eodē modo & loci circa dorsum, ab affixo ad latus humore pituita ac bilis percalefcunt: & quandoque dolorem locis infra latus exhibent. Sæpe vero si ad infernas partes conuertatur, dolorem per venas ad vesicam distribuit, multumque ac biliosum æger mingit. Arbitantur autē huius morbi causam ac principium rigorem esse. Peripneumonia fit quum commota ac calefacta pituita ac bile, pulmo præ caliditate traxerit in seipsum de vicinis locis, ad ea quæ iā sunt in ipso. Et percalefacit quidem totum corpus ac dolorem exhibet, maxime autem dorso, & costis, & humeris, ac spinæ: nimirum ab his in seipsum attrahens plurimam humiditatem, & superreficcantur hæ partes, & nimium calefcunt. Postquam autem attraxit in seipsum, & tum bilis, tum pituita, sedem in pulmone occupauit, putrescit ac suppuratur. Et si quidem in diebus iudicatoriis putrefacta per sputum reiecta fuerint, æger superstes euadit. Si vero & ea quæ ab initio aduenerunt susceperit, & alia insuper accesserint, & neque spuens, neque putrefaciens superarit, præ copia eorum quæ insuper accedunt, ut plurimum moriuntur. Si vero ad dies perueniant duos & viginti, & febris remittat, & in his per sputum purgati non fuerint, suppurati fiunt. Fiunt autem maxime ex his, quibus & pleuritis & peripneumonia vehementissima existit. Fit autem & peripneumonia & pleuritis sine sputo, ambe ex eadem causa, præ siccitate. Siccant autem & calida, ubi nimium calfaciunt: & frigida, ubi nimium frigefaciunt. Congelatur autem latus, & quæ sunt in ipso venæ, & conuellitur. & quantum in ipso inest pituitæ aut bilis, id à caliditate reficcatur, & dolorem inducit, & à dolore febrem. Huic venam secare cōducit in manu splenitidem appellatam, aut hepatidem, iuxta utram sanè fuerit morbus. Atque sic dolor mollior fit, & lateris, & aliarum partium. Nam vena & quantum in ipsa inest bilis ac pituitæ, & ipsius sanguinis ægrotantis vnā cum his magnam partem foras dimittit. Pars vero ex carne per medicamenta & potiones diffunditur, & à calefactoriis forinsecus adhibitis, ita ut morbus per totum corpus dispergatur. Vocatur autem hæc pleuritis sine sputo. Peripneumonia vero quum pulmo etiam ipse superreficcatus fuerit, & quantum in ipso inest bilis aut pituitæ, neque putrefacit æqualiter,

A equaliter, neque per sputum reddit: & quantum in ipso est humiditatis, aut à potu, aut à sorbitione, aut à vicinis locis, hoc totum exurit, præ nimia siccitate ac caliditate. Huic potiones bibere conducit, à quibus pulmo humectatur, ac sputum reiecit. Si enim sputum non reiecerit, & durior fit, & coarescit, & hominem perimit. Febris ardens corripit magis biliosos, corripit item pituitosos. Corripit autem hoc modo. Quum bilis commota fuerit per corpus, & contigerit ut venæ & sanguis attrahant bilē, eamq; plurimā ex carnibus ac ventriculo, ad eum qui prius inest, utpote quum etiam natura calidissimus sanguis in corpore existat. Quum itaque percaluerit ex carnibus & ventriculo, supra eum qui iam inest, adhuc magis à bile, percalfacit etiam reliquum corpus. Et quædam sanè partes præ multa humiditate, penitus resiccari non possunt. Si vero resiccata fuerint, homo moritur. Extremæ vero corporis partes, utpote natura siccæ, resiccantur, & plurima humiditas ex ipsis exurit: & si ipsas contingere velis, frigidas comperies ac siccas. Quapropter hi qui à febre ardente corripiuntur, internis quidem partibus à febre exuruntur, externis autem frigidi sunt. Et lingua ac fauces ab interno spiritu ac caliditate exasperantur & arescunt. Quæ autem in ventriculo & in vesica inest bilis, quod quidē in ventriculo est, aliquando deorsum exturbatur. plerunque vero in primis diebus vomitur, aut in quatuor aut quinque. Vomitur autem hac de causa. Quum supernus ventriculus supercalefactus fuerit, attrahit in seipsum, & fit vomitus. Et ob hoc ipsum etiam ex febre ardente, & ex pleuritide, ad peripneumoniam maxime morbi transmutantur. Vbi enim supernus ventriculus supercalefactus fuerit, trahit in seipsum, & suscipit pulmo, & fit peripneumonia: & plerunque pereūt, nimirum debiles iam existentes, & morbo alio nouo insuper generato, dies transigere nequeunt, donec sputum in pulmone concoquatur. Verum ut plurimum pereunt præ debilitate. Aliqui tamen euadunt. At quibus in vesicam confluit quid bilis, his crassa vrina mingitur, crassa autem à pituita. Biliosa vero alui egestio prodit, eo quod combusta sint ea quæ sunt in ventre. Phrenitis hoc modo se habet. Sanguis qui est in homine, maximam partem ad prudentiam confert. quidam dicunt totum. Quum igitur bilis commota ad

Καῦσος.

Causa vomitionis quæ.

Crassum lotiū cur. Phrenitis quæ fiat.

HIPPOCRATIS LIBER

venas & ad sanguinem ingressa fuerit, sanguinem ex consueta compage ac morione dimouet, & serosum facit, ac calefacit. Calefactus autem, etiam reliquum corpus totum percalefacit, & desipit homo, & non sibi constat, præ febris copia, & sanguinis ad serositatem transmutatione, & morione non solita contingente. Assimiles autem sunt maxime hi qui phrenitide tenentur, his qui ab atra bile delirant. Nam & hi ubi sanguis ex bile & pituita corruptus fuerit, morbum habent, & dementes fiunt. Aliqui vero etiam insaniunt. Et qui phrenitide correpti sunt eodem modo. Tanto autem minor insania ipsumque delirium fit, quanto paucior ac debilior est bilis quam pituita. Porro subcruentum & liuidum est sputum in pleuritide ac peripneumonia, idque ob hanc causam. Principio quidem plerunque neutrum spuunt, neque liuidum, neque subcruentum. vnde nosse conuenit morbum vehementem esse. Quum autem sputum subcrassum spueri cœperint, tunc maxime purgantur. Sputitur autem id à distentione venarum, in pleuritide quidem earum quæ sunt in latere: in peripneumonia vero earum quæ sunt in pulmones: & caliditate ad seipsam affectio trahit. Si vero ægro abscessus fuerit ruptus, ac purulētus fuerit, prima mox die sanguinem, & pus subcruentum ac liuidum cum salua spuit. Liuidum autem fit à sanguine, si modic⁹ ad multam saluam amixtus fuerit, & non statim spuatur, sed semiputrefactum & effœminatum in corpore manet. Moriuntur autem ex pleuritide, ubi & multum pituitæ ac bilis ab initio lateri fuerit affixum, & multum insuper ex reliquo corpore affluerit, & neque spuens, neque putrefaciens superarit, præ materiæ affluentis copia. Implentur autem arteriæ ab his quæ insunt, pituita ac pure. Deinde stertit, & frequenter, & illinc statim respirat, tandem vero omnia obturantur, & moritur. Eodem modo ex peripneumonia pereunt. Quicumque vero ex febre ardente moriuntur, omnes præ siccitate moriuntur. Et resiccantur primum quidem extremæ ipsorum partes, manus ac pedes. Deinde partes sicciore. Vbi autem humiditas ex corpore penitus fuerit exusta ac resiccata, sanguis quidē congelatur penitus ac perfrigeratur. Reliquum vero corpus exsiccatur, ac sic homo moritur. At ex phrenitide ita perit. Desipiunt in hoc morbo semper, nimirum sanguine corrupto, &

*Sputū sub-
cruentum
& liuidū
cur.*

*Liuidum
sputū san-
guis fit.
Peripneu-
monia quā
do necat.*

*Febris ar-
dens quā-
do peri-
mat.*

*Phreneti-
ci quomō-
do percuti-
unt.*

A rupto, & ex consueta motione emoto. & quum desipiant, nihil eorum quæ ipsis exhibentur accipiunt, quod saltem memoratu dignum sit. Quum vero progressum fuerit tempus, marcescant ac imminuti consumuntur, tum ex febre, tum quòd nihil alantur. Et primum quidem extremæ partes consumuntur ac perfrigerantur. Deinde ipsis proximæ. Sed & frigiditatis, & febris, & dolorum principium hoc habet. Quum sanguis qui est in venis perfrigeratus fuerit à pituita, transmutatur & conuellit acruatim alias alia parte, & tremit. Tandem vero omnia perfrigerantur, & moritur.

HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS, LIBER II.

Iano Cornario medico pby-
sico interprete.



Mltum vrinæ emittitur vbi caput nimium incaluerit. Liquefcit enim in ipso pituita. liquefcens autem secedit partim ad nares, partim ad os, partim per venas quæ ducit ad pudendum. Quum autem ad pudendum peruenerit, mingit homo & patitur quemadmodum ab vrinæ stillicidio. Cæcutiunt autem quum ad venas in oculis peruenerit pituita, Aquosior enim fit visus & turbulentior, & splendor in oculis non similiter splendidus est, neque in ipso cõparet si videre voluerit, similiter sicut ante quum splendidus & purus esset. Hic in quadraginta diebus maxime sanatur. Si vero longo tempore postea morbus reuertatur, cutis capitis crassescit, & reliquum corpus attollitur, & crassescit, ac bonum colorem habet. Hæc pituita ad carnes conuertitur, & ab hac crassus esse videtur. Nam carnes quum sint perrigatæ & eleuatæ ac rariores, sanguinem ex venis trahunt, & propterea bene colorati esse videntur. Alius morbus.

Cum quis multum micit.

Qui visu hebetetur.

v ij put vlce-

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Pustularū
capitis or
rigo.*

put vlceribus impletur, & corpus intumescit, & color morbi regij est, & alias alia corporis parte vlcera erumpunt : & febris alias atq; alias corripit, & ex dorso aqua fluit. Huic quū in capite pituita subbiliofa cōnutrita fuerit, vlcera fiunt vbi sinaput pituita & bile perrigatum fuerit, & vbi pituita rara & aceruata fuerit, itemque bilis. Hæc enim consistit, putrescit, & exulceratur. Attenuata vero pituita ad aures penetrat. At in reliquo corpore vlcera eadem ratione qua in capite fiunt, sanguine & bile putrefactis quacunque in parte fuerint collecta. Hac enim parte caro putrescit & exulceratur, & accedentem pituitam ac bilem insuper putrefacit, & fit pus. Alius morbus. Dolor circum circa caput vexat, & vomit bilem, & difficulter mingit, & desipit. Hic caput quidem dolet, præ nimia eius calefactione. Desipit autem quum sanguis in capite aut pituita fuerit calefactus, & plus solito commotus. Vomit autem bilem, vtpote commota ipsa in corpore. Et caput præ caliditate trahit in seipsum, & crassissimum quidem vomit, tenuissimum vero in seipsum trahit, Mingit autem & in hoc morbo ab iisdem, velut etiam in superiore dictum est. Alius morbus. Si circa cerebrum venulæ supereuomant, nomen quidem rectum morbo non est. Neque enim fieri potest vt aliqua vena, siue parua, siue magna supereuomat. Nominant tamen & dicunt supereuomitū.

*Caputcur
dolitet.*

*Malū ex
bono non
fit.*

Si vero etiam quàm maxime supereuomant morbum ab hoc ipso fieri non est verisimile. Nam à bono malum fieri non potest, neque à malo vtique bonum fiat. Neque rursus bonum plus iusto fieri potest. Verum supereuomere videntur, quum ad venas bilis aut pituita ingressa fuerit. Eleuantur enim venæ & pulsant, & dolor per totum caput dispergitur, & aures sonitum percipiunt ac nihil audiunt. Et sonitum quidē percipiunt, vtpote venis pulsantibus & palpitantibus. Tunc enim sonitus est in capite. Grauitur autem audiūt, partim præ interno strepitu ac sonitu, partim quum cerebrum & venæ circa ipsum eleuantur. Præ nimia enim caliditate, vacuum circa aurem partem cerebrum de seipso implet: & quum æqualis aeris copia non insit, velut priore tempore, neque æqualem sonum exhibeat, ea quæ dicuntur non æqualiter se imprimunt, atque ex hoc grauem auditum habent. Hic si quidem erumpat ipsi ad nares, aut ad os aqua & pituita, sanus fit.

*Tinnitus
auriū uni
de.*

A nus fit. Si vero nō erumpat, septima die maxime moritur. At si in capite venæ supereuomant, id quod ab iisdem fit quæ & prius relata sunt. Signum vero quod tali modo supereuomat hoc est. Quum quis aut manum, aut caput, aut aliam quandā corporis partem, hoc patientem incidat, sanguis niger profluit, & turbatus ac morbosus: quanquam neque sanguis nominari iuste mereatur, nisi tunc quum rubicundus ac sincerus fluit. Quum itaque supereuomant ab iisdem causis, dolor & vertigo, & grauitas caput occupant. Dolor quidē, præ nimia sanguinis caliditate. Vertigo vero, quum aceruatus ad faciem processerit sanguis. Grauitas autem, quod copiosior sanguis fit in capite, & turbulentior ac morbosior, quam intrinsecus.

Signū uenularū cerebri id efficiētū.

Vertigo, grauitas.

B Cerebri corruptio.

S l cerebrum corruptum fuerit, dolor ex capite spinam occupat, & ad cor animi deliquium procedit, & iudex adest, & somni expers est, & ex naribus sanguis fluit. Sæpe etiam sanguinem vomit. Corruptitur autē cerebrum tali modo, quum aut nimium calefactus aut perfrigeratus, biliosus aut pituitosus plus solito factus fuerit. Vbi vero horum aliquid perpeffus fuerit, etiam spinalem medullam supercalefacit. Et quum etiam hic percalescit, dolorem spinæ inducit. Animo vero linquitur homo, quum pituita aut bilis ad cor consistit. Consistere autem necesse est commotis ac humectatis. Sudor autem fit præ dolore. Sanguinem vero vomit, quum venæ quæ sunt in capite, à cerebro fuerint calefactæ: quæ vero circa spinam sunt, à spina. Spina autē à ipinali medulla. Medulla vero à cerebro, vnde sanè originē trahit. Quum igitur calefactæ fuerint venæ, & sanguis in ipsis efferbuerit, quæ quidem in capite sunt venæ, distribuunt ipsum ad nares, & ad os: quæ vero circa spinam sanguifluæ, in corp⁹. Hic tertia aut quinta die plerunq; perit. Alius morbus. Derepente dolor occupat caput, & statim vox intercipitur ac sui impotens fit. Hic in septem diebus moritur, si non febris inuaserit. Si enim hæc inuaserit, sanus euadit. Patitur autem hæc, quum atra bilis ipsi in capite commota fluxerit, maxime in partem in qua plurimæ sunt venæ, in collū inquā, ac pectus. Deinde postridie sideratus fit ac impotens, sanguine nimirum perfrigerato. Et si superior euaserit, ita ut sanguis calescat, siue ab his quæ exhibentur, siue à seipso, at-

Dolor capitis qui uocem intercipit.

HIPPOCRATIS LIBER II.

tollitur & diffunditur ac mouetur, & spirationem inducit, & **D**
 spumescit, & à bile separatur, & sanus euadit. Si vero superior
 non euaserit, adhuc magis perfrigeratur: & ubi penitus per-
 frigeratus fuerit, & calor ex ipso defecerit, congelatur, & mo-
 ueri non potest, sed moritur. At si ex ebrietatibus hæc patia-
 tur (nam & hoc contingit) itidem moritur.

*Temulen-
tia hoc &
ipsa facit.*

Caries ossis capitis.

Q Vum caries facta fuerit in osse, dolor ex osse cor-
 ripit. Temporis autem progressu cutis de capite
 alia atque alia parte discedit. Talia vero patitur
 is cui in secunda ossis lamina, pituita superueniens
 resiccata fuerit. Hac enim parte rarū fit,

& omnis humiditas ex ipso deficit, & quia aridū est, cutis ab **E**
 ipso discedit. Hic morbus lethalis non est. Alius morbus.

*Capitis stu-
por.*

Si sideratus fiat, anteriorem capitis partem dolet, & ocu-
 lis nō æqualiter videt, & soporatur, & venæ pulsant, & febris
 debilis tenet, & corporis impotentia. Hic patitur hæc, quū
 venæ in capite fuerint calefactę, & calefactę pituita in seipsas
 traxerint. Et principiū quidē morbi ex hoc fit. Anteriorē ve-
 ro capitis partem ideo dolet, quod venæ in hac sint crassissi-
 mæ, & cerebrum ad anteriorē capitis partem magis sitū est
 quàm ad posteriorem. Et oculis ideo non videt, procumben-
 te eo cerebro ac inflammato. Impotentia vero ideo corpus
 occupat. Postquam venæ pituitam in seipsas traxerint, neces-
 se est præ pituitæ frigiditate, sanguinem magis nunc sisti ac
 perfrigeratum esse quàm priori tēpore. dum autem sanguis **F**
 non mouetur, fieri non potest, ut non etiam corpus quiescat
 ac torpeat. Et si quidem sanguis ac reliquum corpus supera-
 rint, ita ut calefiant, homo euadit. Si vero pituita præualue-
 rit, sanguis magis perfrigeratur ac congelatur. Et si frigiditas
 ac congelatio augetur, penitus congelascit ac perfrigerat-
 ur homo, & moritur.

Angina.

A Ngina siue Cynanche fit, quum pituita in capite
 commota æruatim deorsum fluxerit, & in maxil-
 lis ac circa collum constiterit. Hic neq; saluam de-
 glutire potest, respirat autem violenter ac stertit, &
 aliquando etiā febris ipsum corripit. Et morbus sanè ex hac
 causa fit, & aliquando sub ipsam linguam, aliquando paulu-
 lum supra pectus,

Vua mor-

Vua morbus.

V Va fit quum pituita de capite ad gurgulionem descenderit, & gurgulio præceps dependet, ac fit rubicundus. Téporis autem progressu, nigrescit. Nigrescit autem hoc modo. Venosus est gurgulio ac crassus, & postquam inflâmatus est, calefcit: & præ caliditate sanguinem ex vena adtrahit, ac ab ipso nigrescit. Quapropter si non turgentem seces, statim inflâmantur. Nam vena calefacit, & præ caliditate partes circa gurgulionem sanguine replet, & breui suffocantur.

Tonfillæ ac vicinæ partes.

T Onfillæ, & partes sub lingua, & gingiuar, & lingua, & quæcunq; huiusmodi hoc loco cōsistunt: hæc omnes partes ex pituita ægrotant. Pituita auté de capite descēdit. Caput autem ex corpore trahit. Trahit autem vbi fuerit calefactū, percalefcit autem à cibis, & sole, & frigore, & laboribus ac febrili calore. Quum vero calefactum fuerit, tenuissimum ex corpore ad seipsum trahit, Vbi vero traxerit, rursus id ad corpus descendit.

Morbi à capite fientes.

Q Vum repletū fuerit caput, & ab aliquo ex relatis percalefactum, torpor caput tenet, & frequenter mingit, & alia patitur quæ ex vrinæ stillicidio cōtingere solent. Idem per nouem dies hæc patitur.

*Capitis
torpor nre
céue.*

C Et si quidē per nares aut aures, aqua & mu-
cus erumpat, à morbo liberatur, & vrinæ stillicidiū sedatur, mingitque citra dolorem, vrinam multā & albam, ad viginti dies. Et dolor capitis cessat, & intuenti splendor ex oculis subtrahitur, & dimidiatas rerum facies se videre putat. Hic quadragesima die penitus sanus euadit. Multis vero quandoque morbus redit, septimo aut decimoquarto anno. Et capitis cutis ipsi crassescit, & ad tactum cedit, & de paucis cibis tener ac bene coloratus apparet, & non acutum auditū habet. Quum ita habentem offenderis in principio morbi, priusquam erumpat aqua per nares & aures, & tenuerit ipsum dolor: derafo capite vtrem coriaceum circum frontem deligare oportet, aqua plenum calidissima, quantū iustinare potest, atque hinc ipsum caleferi permittere, & vbi perfrigeratus fuerit, aliū adhibere. Si vero hinc debilitetur, desistere:

*Strāguris**Medela
que.*

HIPPOCRATIS LIBER. II.

tempore interposito eadē repetere, donec remiserit dolor. **D**
 Et si aluus non egerat, infusum per clysterem immittere, &
 vrinam cientibus in potu datis, aquam mulsam aquosam in-
 super bibendam exhibere. & calore quā maxime foueatur.
 Sorbeat autē succum ptisanę tenuem. Si vero venter nō sub-
 eat, mercurialem in aqua coctam terito, ac succū excolato, &
 de ipso, ac de ptisanę succo, parem mensuram permisceto, &
 modicū mellis adiicito. Hūc succum ter in die sorbeat, & vi-
 num mellei coloris, aquosum, album modicum, à sorbitione
 insuper bibat. Postquam autem eruperint ipsi per nares mu-
 cosa, & vrinam crassam eiecerit, & à dolore capitis liberatus
 fuerit, vtre amplius ne vtatur, sed multa calida lotus, vrinam
 cientia, & aquam mulsam aquosam bibat. Et primis quidem **E**
 diebus milium delingat, & cucurbitam edat, aut betas per
 triduum. Deinde cibus vtatur mollissimis ac quā maxime
 per aluum subeuntibus, ita vt semper modicū ad cibos prio-
 res addat. At vbi quadraginta dies præterierint (sedatur en-
 nim morbus maxime in tanto tempore) capite ipsius purga-
 to, prius medicamento exhibito, ipsum deorsum purgato, si
 tempus anni hoc permittat. Deinde serum ad dies septem
 bibendum dato, aut pauciores, si debilis existat. Si vero mor-
 bus reuertatur, fomento per totum corpus adhibito, postri-
 die veratrum bibendum dato. Deinde quanto tempore ti-
 bi visum fuerit intermittito, & tunc capite purgato, medi-
 camento deorsum purgante exhibito, crustas octo capiti in-
 urito, duas circa aures, duas in occipitio. hinc atque hinc ad **F**
 cervicis neruum, duas in naso circa angulos oculorum. Ve-
 nę autem circa aures vrendę sunt, donec pulsare desinant.
 Ferramentis vero cuneoli forma paratis obliquas venas per-
 urito. Atque hæc vbi feceris, sanitas continget. Alius mor-
 bus. Vlceribus impletur caput, & crura intumescunt, ve-
 lut ab aquę potu, & in tibias tumor infarcitur, & si premas,
 color morbi regij apparet, & vlcera aliās alia corporis parte
 erumpunt, maxime tamen circa tibias, & malum aspectum
 præ se ferunt. Vbi vero inflammatione liberata sunt, cito
 sana fiunt. & febris aliās atque alās corripit. Caput autem
 semper calidum est, & ex auribus aqua fluit. Quum ita ha-
 bet, medicamentum ei dandum est, à quo pituita & bilis sur-
 sum purgatur, si quidem frigus fuerit, præfotō ac calida lo-
 to. Deinde

*Caput ul-
ceratur.*

*Medela
que.*

A to. Deinde tribus diebus interpositis caput purgato. Postea etiam deorsum purgans medicamentum bibendum dato. Si vero tempus anni ferat, etiam serum postea bibat. Sin minus, lac asininum. Post purgationes cibis quàm paucissimis, & quàm maxime per aluum subeuntibus vtatur, & non lact. Si vero caput exulceratur, fecem vini ad sinegma faciendum comburito, & glandis corticem tritum leuigatum ammisceto, & pari nitro ammixto, his defricus multa calida lauetur. Inungat autem caput baccis lauri tritis, & gallis, & myrrha, & thure, & argenti flore, adipeque suillo ac oleo laurino. His permixtis inungatur. Post hoc autem tempus vomitibus vtatur bis in mense, & exerceat se ac calida

B lauet. At si his adhibitis, ex reliquo quidem corpore morbus fuerit exclusus, verum in capite ipsi vlcera adhuc fiant, rursus capite purgato, medicamentum deorsum purgans postea bibendum dato. Deinde raso capite, fissuras raras incurito, & vbi sanguis effluerit confricato. Postea lanas succidas vino imbutas superligato, & postquam exolueris, sponsia detergito, & ne humectato. Deinde oleo subito cupressum inspergito. Laneis autem deligamentis donec sanus fiat vtatur. Alius morbus. Dolor caput corripit, & si paululum moueatur, bilem vomit. Quandoque etiam vrinam difficulter emittit, ac desipit, & septima die quandoque moritur: & nona quoque ac vndecima, septimam transgressus, si non eruperit per nares aut aures. Si vero eruperit,

*Si morbus
repullulet
quid agendum.*

C euadit. Fluit autem aqua subbiliosa. Deinde temporis progressu putrefacta pus fit. Quum igitur ita habuerit, quandiu quidem dolor tenuerit in principio, priusquam ex naribus ac auribus erumpat, spongas aqua calida imbutas cito capiti admoueto. Si vero his non laxetur, vtre vtaris eodem modo velut in superiore morbo. Bibat autem aquam mulsam aquosam. Sin minus, aquam de farina crassa in ipsa macerata. Sorbeat ptisanæ quoque succum, & vinum album aquosum insuper bibat. Postquam vero per aures eruperit, & febris ac dolor remiserit, cibis vtatur per aluum subeuntibus, à modicis initio facto, semper aliquid addendo. Et caput calida lauetur: & aures colluat aqua pura, & spongiam melle tinctam indat. Si vero neque sic resiccet, sed diuturna fluxio fiat, collutione facta, argenti florem, sandaracham, cerusam, sin-

Curatio.

HIPPOCRATIS LIBER II.

sam, singula æquis portionib⁹ trita leuigataq; in aurē indito, **D**
 eaq; expleto, & si quid præterlabatur, de medicamēto am-
 plius superaddito. Vbi vero resiccata fuerit auris, expurgata
 ac medicamentum eluito. Postea (obsurdescit enim primū re-
 siccata) lenibus fomentis aures foueto. Nam & sic vix ac lon-
 go tempore sedabitur. Moriūtur autem etiam, si dolor in au-
 re fuerit, & nihil in septem diebus eruperit. Hunc multa cali-
 da lauato, & spongiis aqua calida imbutas exprime, & tepi-
 das ad aurem appone. Si vero neque sic erumpat, auri fomēt-
 um adhibeto. Sorbitionibus autem ac potionibus iisdem
 vtatur quibus in superioribus. Alius morbus. Si aqua in
 cerebro fuerit, dolor acutus per finciput ac tēpora emergit,
 aliās alio loco: & rigor ac febris aliās atque aliās, & regiones
 oculorum dolet, & cæcutit, & pupilla finditur, & ex vno duo
 se videre putat, & si surrexerit, vertigo ipsum corripit, & vē-
 tum non sustinet, neque solem: & aures tinniunt, ac inter
 audiendum strepitu offenditur. & vomit saliuam ac pituitā,
 quandoque etiam cibos: & capitis cutis attenuatur, & con-
 tactu gaudet. Quum sic habuerit, primum dandū est ipsi me-
 dicamentum quod sursum pituitam educit, & postea caput
 purgato. Deinde interpersuro tempore medicamentum de-
 orsum purgans bibendum dato. Postea cibus quāmaxime
 aluum subeuntibus ipsum reficito, semper modica addendo.
 Postquam vero comederit iam cibos sufficientes, vomitibus
 ieunus vtatur, lenticulæ decocto mel & acetum miscens, &
 olera antea comedens: & in die illa qua vomuerit, primum
 cyceonem bibat tenuem, postea ad vesperam cibus modicis
 vtatur, & non lauet, & à cibus deambulet, itemque mane, vi-
 tans ventum ac solem, & ad ignem ne accedat. Et si quidē ta-
 lia faciens, sanus fiat, bene est. Sin minus, verevbi ipsum prius
 purgaris primum veratro, postea etiam in nares medicamē-
 tum infundito, & pauco tempore interposito deorsum pur-
 gato, Deinde cibus reficito. Postea inciso capite iuxta finci-
 put, ad cerebrum vsq; perforato, & veluti sectionem ac per-
 forationem curato. Alius morbus. Rigor, dolor, & fe-
 bris per caput, maxime ad aurem, & ad tempora, & ad finci-
 put, & oculorum regiones dolet, & supercilia ipsi incumbere
 videntur, & grauitas caput detinet, & si quis ipsum mouerit
 minget, & multum ac facile mingit. & dentes torpent, & stu-
 por ipsos

Cerebri
madentis
signa.

Medela
que.

Capitis a-
lius morb⁹

A por ipsos tenet, & venæ attolluntur ac pulsant in capite, & non potest quietus esse, sed anxius est ac desipit præ dolore. Huic si quidem per nares aut aures eruperit, aqua profuit subpulenta, & sanus euadit. Sin minus, plerumque in septē diebus moritur. Hic morbus maxime fit ex febre lipyria, quum liberatus à febre, nodum purgatus, aut cibus se impleuerit, aut inebriatus fuerit, aut in sole laborarit. Quum sic habuerit, *Medela* primum sanguinem de capite mittito, vnde cumque tibi visum fuerit. Et post sanguinis missionem, raso capite perfrigatoria ipsi adhibeto. Et si alius non subeat, infusum per clysterem immittito. In potu vero pitisanæ succum frigidum dato, & aquam insuper bibendam. Si vero ad perfrigatoria non remittat, transmutatione facta, vtre vitior ac calefacto, postquam autem quieuerit dolor, cibus vtatur aluum subeuntibus, & ne impleatur. Vbi vero vigesimum diem attigerit sedato dolore, fomento capiti ipsius adhibito, ad nares medicamentum apponito, & interposito triduo medicamentum deorsum purgans exhibeto. Alius morbus. Si venæ circa cerebrum sanguinem superuomuerint, ac cerebrum calefecerint, febris emergit fortis, & dolor ad tempora, & incipit, ac posteriorem capitis partem, & aures tinnunt ac flatu implentur, & nihil audit, & anxius est, & se ipsum præ dolore iactat. Hic quinta aut sexta die moritur. Quum sic habuerit, caput ipsius calefacito. Si enim per aures aut nares aqua eruperit, mortem effugit. Si vero sex dies euaserit, victum ipsi velut in superiore morbo constituito.

*Cerebri
morbus.*

Medela.

C Alius morbus. Si venæ superuomuerint in caput, dolor grauis totum caput tenet, & ad collum, & alias ad alias capitis partes transit. Et vbi surrexerit, vertigo ipsum corripit, febris autem non inuadit. Quum igitur sic habuerit, derafo capite si non calefactoriis cesserit, frontem ea parte qua capillus definit à capite findito: vbi vero secueris disparata ac diducta cute, quum sanguis defluerit, salem tenuissimum inspergito: & postquam effluerit sanguis fissuram componito, & duplici filo totā ipsam includito. Deinde spleniū cera ac pice illitū, vlceri imposito, & lana sordida superimposita deligato, & ad dies septē ne soluto, si non dolor vexet: si vero dolor adsit, exsoluto. Donec autem sanus fiat, aquā de macerata in ipsa crassa farina bibendam dato, & pitisanæ succum sorbendum, &

*Capitis
morbus.*

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER II.

- Cerebrum biliofum cum est.* dum, & aquam in super bibendā. Alius morbus. Si cerebrum bile infestatur, febris emergit debilis, & rigor, & dolor per totū caput, maxime ad tēpora, ad sinciput, & ad regiones oculorum: & supercilia ipsis impendere videntur, & ad aures dolor procedit, & quandoque per nares bilis defluit: & oculos hebetes habent, & plerisque dolor ad dimidiā capitis partem extenditur, quandoq; etiam per totum caput. Quum sic habuerit, perfrigatoria ad caput apponito, & postquam dolor ac fluor cessarit, apij succum in nares instillato, & ne lauet quādiu dolor obtinuerit. Et sorbeat milium tenue modico melle affuso, & bibat aquam. Si vero alius non subeat, brassicas edat & succum sorbeat. Sin minus, folia sambuci eodem modo. Et postquam tempestivum tibi esse visum fuerit, cibos quā maxime aluum subeuntes ipsi exhibeto. Et si depulso fluore ac dolore, grauitas ipsi supra supercilia incūbat, & in naso mucus crassus ac putridus fuerit, fomēto ex aceto, & aqua, ac origano ipsi adhibito, deinde calida aqua loto, florem æris & myrrham ad nares apponito, Atque his factis plerumque sanum efficies. Morbus autem non est lethalis.
- Cerebri corruptio.* Alius morbus. Si cerebrum corruptum fuerit, dolor ex ceruicis neruo ad spinam tendit, & ad cor frigus descendit, & derepente nouus sudor adest, & per nares sanguis fluit, Vomunt quoque multi. Hic triduo moritur. Si vero septem dies transgrediatur: plerique autem non transgrediuntur; & si sanguinem vomat, aut ē naribus fundat, neque calida ipsum lauato, neq; calefactoria adhibeto. Verum acetū album aquosum bibendum dato, & si debilis sit, prisanam sorbendam. Si vero plus iusto sanguinem vomere tibi videatur, aut ex naribus ipsi fluat, à vomitu quidem bibat farinam trimestris tritici in aquā inspersam. Si vero ex naribus fluat, venas & in brachiis, & in temporibus, spleniis suppositis deligato. At si neutrum horū ipsi affuerit, dolet autem ceruicis neruum, & collum, & spinam, & frigus ad cor processerit, cum eruo pectora, & dorsum, & ceruicis neruum, & collū calefacito. Nam his factis maximam vtilitatem capere poterit. Verum pauci huiusmodi morbum effugiunt. Alius morbus. Sanum derepente inuadit dolor circa caput, & statim vox intercipitur, & stertit, & os hiat, & si quis ipsum vocet aut moueat, solum suspirat, nihil autem intelligit, & multum mingit, & mingere se non
- Quæ uentres cient.*
- Medela.*
- Quo modo sanguis fistatur.*
- Capitis subitus dolor.*

- A** se non sentit. Hic si non febris ipsum corripiat, in septem diebus moritur. Si vero corripiat, plerumque sanus fit. Huiusmodi vero morbus senioribus maxime fit, & magis quam iunioribus. Hunc ubi sic habuerit, lauare oportet multa calida, & quàm maxime calefacere, & aquam multam tepidam in os instillare. At si resipiscat, & morbum effugiat, ubi ipsum cibus refeceris, ita ut viribus valere tibi visus fuerit, indito in nares ipsius medicamento, & paucis diebus interpositis, pharmacum deorsum purgans bibendum dato. Si enim ipsum non purgaueris, timor est ne rursus morbus reuertatur. Effugiunt autem non ita valde ex primo. Alius morbus. Si quis ex ebrietate voce priuetur, & statim sanè ipsum etià febris corripiat, *Senum morbus. Medela.*
- B** sanus fit. Si vero non corripuerit, die tertia moritur. Si itaque in ita affectum incideris, multa calida lauato, & spongas in aqua calida tinctas ad caput apponito, & cepas decorticatas in nares indito. Hic si quidem apertis oculis, & loquutus, ad se redierit, & non nugetur, hac die sopore pressus iacet, post tridie vero sanus fit. Si vero exurgens bilem vomuerit, insanit, & moritur maxime in quinque diebus, si non dormierit. Huic igitur hæc facere oportet. Multa calida lauato, donec ipse ad seipsum redeat. Deinde multo oleo illitum, ad stragula mollior reclinato, & vestimentis contegito: & neque lucernam apud ipsum ardere, neque loqui permittito. Vt plurimum enim ex balneo obdormit, & si dormierit, sanus euadit. Postquam vero ad se redierit, primis tribus aut quatuor diebus, milium *Temulentie morbus. Medela.*
- C** tenuè sorbeat, aut ptisanæ succum, & vinum mellis speciem referens bibat. Deinde cibus utatur mollissimis, ac paucis primùm.

Cerebri corruptio.

Si corruptio cerebrum inuaserit, dolor tenet maxime anteriorem capitis partem, & paulatim etiam intumescent, & liuida fit: & febris, & rigor apprehendit. Quum ita habuerit, secare oportet qua parte intumuit, & per purgato osse ipsum radere donec ad secundam laminam perueniat, deinde velut fracturam curare. *Curatio.*

Caries siue teredo.

Quam caries facta fuerit in osse, dolor ex hoc corripit ipsum os, & progressu temporis attenuatur ac inflatur, & fit in ipso fractura. Et si hanc refeceris, comperies ipsum os eleuatum, & asperum, ac fuluum. Quibusdam

HIPPOCRATIS LIBER II.

Curatio. Quibusdam vero etiam ad cerebrum vsque corrosus. Vbi in hoc modo affectum incideris, si quidem ultra corrosus fuerit, sinere optimū est, & vlcus quā celerrime curare. Si vero corrosus non fuerit, sed asperum, ad secundam vsque laminā rasum, velut præcedens curare. Alius morbus. Si sideratus quis fiat, & anteriorem capitis partem dolet, & oculis videre non potest, sed sopor ipsum tenet, & venæ in temporibus pulsant, & febris debilis tenet, & totius corporis impotētia, & emacescit. Quum sic habuerit, multa calida ipsum lauato, & calefactoria ad caput adhibeto. A fomētis vero myrrham & æris florem in nares infundito. Sorbeat autem ptisanæ succum, & aquam bibat. Et si quidem vbi hæc feceris melius habuerit, bene est. Sin min⁹, quæ vna spes reliqua est,incipit ipsius findito, & vbi sanguis defluerit, labiis compositis curato ac deligato. Si vero non secueris, decimo octauo aut vigesimo die plerunque moritur.

Angina.

Curatio. **F**ebbris corripit & rigor, & dolor capitis: & maxillæ intumescunt, & sputum difficulter deglutit. Expuit autē & saliuas duras ac paucas: & infra in faucibus stertit: & si apprehensa lingua inspexeris, gurgulio non magnus est, sed mollis, fauces autem intrinsecus saliuā viscosa plenæ sunt, & non potest exscreare, & decumbere non sustinet, verū si decumbat suffocatur. Hunc si ita affectum deprehenderis hæc facito. Primum quidem cucurbitas ad verticulū in collo primum affigito. Deinde in capite præraso, & iuxta aurem ab vtraque parte apponito. Et vbi cucurbitam affixeris, ad multum tempus adherere finito. Postea fomentum ipsi ex aceto, nitro, origano, & nasturtij semine adhibeto. Hæc terito, & cū aceto pari aqua permixta diluito, ac parū olei instillato. Deinde in ollulam infusus, operculo addito arundinem cauam immittito, & prunis imposita feruefacito: & vbi per arūdinis fistulam vapor ascenderit, hianti ore vaporem intro trahat, cauens ne fauces adurat. Forinsecus autem spongiæ aqua calida imbutas, ad genas ac maxillas apponat. Gargarismus porro ipsi parandus est, ex origano, satureia, apio, mentha, & modico nitro, cum aqua multa aquosiore, & modico aceto instillato. prædictarum herbarū folia trita, & nitrum, in aqua multa diluito, tepefacito, ac sic gargarifet. At si saliuā supprimatur, myrthi

- A** tur, myrthi ramulum complanatum sumito, & tenera ipsius summa parte incuruata, ac molli lana obuoluta, in fauces immissa, saliuam expurgato. Et si venter non egerat, glandē subdito, aut clysterem adhibeto. Sorbeat autem pitisanæ succum, & aquam bibat. Si vero tumor ipsi oboriatur, & ad pectus intumescat, ac rubicundus sit, & ardeat, amplior spes salutis est. Facienda vero hæc sunt, postquam inflammatio foras conuersa fuerit. Betas in frigidam aquam tinctas apponat. Tepidas collutiones ore gargariset, & ne lauet. Hæc faciens maxime euaserit. Est autem morbus lethalis, & paucissimi euadunt. Alia angina. Febris & dolor capitis corripit, & fauces inflammantur, itemque maxillæ, & saliuam deglutire non potest, spuit autem crassam ac multam, & difficulter loquitur.
- B** Quum ita habuerit, primum cucurbitam affigito, eodem modo veluti suprâ diximus. Deinde spongiam aqua calida imbutam, ad collum ac maxillas adhibeto. Aquam autem mulsam aquosam colluendam dato. Et succum pitisanæ sorbere cogito. Si vero ipsi talia facienti saliuam non exierit, eodem modo velut in priore fomentum adhibeto. At si ad pectus conuertatur inflammatio, aut ad collum, betas aut cucurbitas concisas, in frigidam aquâ tinctas superimponat, & frigidam aquâ bibat, quo saliuam facilius excreetur. Quum autem ad pectus extumuerit, plerique euadunt. Si vero faucibus ac tumoribus sedatis, morbus ad pulmonem conuersus fuerit, febris statim corripit, & lateris dolor, & vtpurimum moritur, vbi hoc factum fuerit. Si vero quinque dies effugerit, suppuratus sit, si nō ipsum statim tussis inuaserit. Si vero inuaserit, facta excreatione depurgatus, sanus sit. Huic quàm diu dolor latus tenuerit, latus calefaciendum est, & adhibenda quæ in peripneumonia adhiberi solēt. At si quinque dies effugerit, & febris remiserit, tussis autē remanserit, primis quidē diebus sorbitionibus vtatur. Postquā autē cibos sumere inceperit, q̄ pinguisimos ac maxime saltos edat. Quod si tussis non affuerit, nimirum suppuratū fieri scito, & vbi cōnauit quum dormire volet, alliuū edat crudum quàm plurimū. & vinum in super bibat vinosum meracius. Et si quidē ita pus eruperit, bene habet. Sin minus, postridie calida loço suffitū adhibeto, & si eruperit, velut suppuratum curato. Alia angina. Linguae posterior pars inflammatur, itemque locus sub tonsillis ad gut-

purgatio.

Secunda
angina.

Medela:

Tertia angina.

tur, &

HIPPOCRATIS LIBER II.

tur, & neque saliuam, neq; quicquam aliud deglutire potest. **Medela.** Si vero coactus fuerit, per nares ipsi effluit. Quum ita habuerit, mentam viridem tritam, apium, origanum, & nitrum, & rhoem rubrum melle diluito, & ad crassam formam redacta, intus linguæ qua parte tumet illinito. Postea ficus aqua coquito, & de rhoe parum tritum, hoc ficuum decocto diluito, ac gargarisandum dato si id potest, sin minus, colluendum. Bibendam vero aquam de farina crassa in ipsa macerata exhibeto. Foris autem ceruicem & maxillas, farina calida in vino & oleo cocta integito, & panes calidos apponito. Suppuratur enim plerumque in loco sub tonsillis, & si quidem sua sponte eruperit, sanus fit. Si vero non rumpatur, ubi digito contigeris an molle sit, ferramento acuto ad digitum alligato perforato. His adhibitis multi sani fiunt. Est autem hic morbus minime lethalis. E

Vua morbus.

Si vua morbus in faucibus fiat, summa gurgulionis pars aqua impletur, & rotunda fit ac pellucida, & spiratione intercipit. Et si maxillæ ab utraque parte inflammatae fuerint, suffocatur. Si vero ipse morbus per se consistat, maxillis non inflamatis, minus moritur. **Medela.** Quum sic habuerit, gurgulionem digito apprehensum sursum ad palatum apprimito, & summam ipsius partem præsecato. Postea foliorum hortensium condimentariorum decoctum gargarisandum dato, & farinam frigidam delingendam, aquamque insuper bibendam: & ne lauet. F

Tonsillæ, morbus.

Si tonsillæ fiant, intumescunt sub maxillis ab utraque parte, & ad contactum foris durum est tuberculum, & gurgulio totus inflammatus est. Quum sic habuerit, immisso digito tonsillas protrudito, ad gurgulionem autem florem æris siccum illinito: & foliorum condimentariorum hortensium decoctum, velut à sole calidum gargarisandum dato. Foris qua parte tumor est, ordeaceam farinam in vino & oleo coctam calidam pro cataplasmate apponito. Postquam vero tubercula mollia esse tibi visa fuerint intrinsecus ad contactum, scalpello ipsa pertundito. Quædam etiam sua sponte sedantur.

Tuberculum sub lingua.

Si tuber-

A **S**i tuberculum sub lingua, hypoglossis appellatum, fiat, lingua intumescit, & pars sub ipsa ac externa ad tactum dura est, & talium deglutire non potest. Quum sic habuerit, spongiam aqua calida imbutam apponito, & ordeaceam farinam vino ac oleo coctâ, foris ubi tumor est imposito. Gargariset ficuum decoctum, & ne lauet. postquam autem purulentum factum fuerit, secato. Aliquando vero sua sponte erumpit, & sedatur non sectum. Si vero foras suppurauerit, perurito.

Hypoglossis.

Inflammatiō consistens ad palatum.

B **S**i inflammatiō confiterit ad palatum, intumescit & suppuratur. Quum sic habuerit, tuberculum inurito. Vbi vero exierit pus, reliquum eluito, primum nitro & aqua calida. deinde vino. Postquam autem elueris, uinâ passam albam exemptis vinaceis tritam, in vstura locum indito, & ubi exciderit, vino meraco tepido colluat, & ubi edere quid aut sorbere valet, spongiam indat, atque hæc faciat donec sanus fiat.

Polypus.

C **S**i polypus fiat in naso, ex medio cartilaginum dependet, veluti gurgulio. & ubi expirationē facit, progreditur foras, & est mollis, ubi vero inspirationem facit, retrocedit: & loquitur obscure, & quum dormit stertit. Quum sic habuerit, spongiam in rotundum concisam, & velut spirā factam, lino Aegyptio obuoluito, ac duram efficito. Sit autem eius magnitudinis, ut ad nasum quadret. Spongiam vero quadruplici lineo filo deligato, ita ut vtrumquodq; longitudinē habeat cubitalem. Deinde facto vno ipsorum principio, virgā stannēā tenuem sumito, quæ ad alteram sui partem foramen habeat, & transmissio per foramen filorum principio, virgam in acutam in os trāsmittito, & attrahito donec filorum principium apprehendas. Postea specillo instar vngulæ bifurcato sub gurgulionem subposito, renitens trahito, donec polypum extraxeris. Postquam vero ipsum extraxeris, & sanguis fluere desierit, siccum linamentum specillo obuolutum indito, & de cætero æris flore in melle cocto, linamentum illine, atque sic in nasum inde. Et ubi iam vlcus curatum fuerit, plumbum efformatum ita ut ad vlcus perueniat, melle illine, & donec sanus fiat appone. Alius polypus. Impletur nasus carnibus, & ad contactum caro dura apparet, & per nasum

Medela.

x spirare

HIPPOCRATIS LIBER

- Medela.** spirare non potest. Quum sic habuerit, fistula immissa, fer-
 mentis tribus aut quatuor vrito, & post vñionem veratrum
 nigrum tritum iniucito, & postquã computruerit ac exciderit
 caro, linamenta melle illita cum æris flore indito. & vbi cura-
 tum fuerit vlcus, plumbeas massas siue fistulas melle illitas im-
 mittito, donec sanus fiat. Alius polypus. Intrinsecus ex
 cartilagine caro rotunda prominet, quæ ad contactum mol-
 lis est. **Medela.** Quum ita habuerit, chordam nerueam accipito, &
 facta in ipsa parua ansula, eam tenui filo obligato. deinde al-
 terum principium per ansulam transmittito, alia maiore an-
 sa facta. Postea principium illud per virgam stanneam trans-
 mittito. Deinde ansam illam maiorem in nasum indito, &
 specillo infecto ipsam circum polypum obducito ac adapta-
 to, & vbi circumscita fuerit, virgam in os transmittito, & ar-
 reptam ipsam trahito, eodem modo specillo instar vngulæ
 bifurcata supposito sub gurgulionem ac renitente. Post-
 quam autem extraxeris, curato velut superiorem. Alius po-
 lypus. Intrinsecus circa cartilaginem alicunde durum quid
 nascitur, & videtur quidem caro esse, si vero ipsum attigeris,
 strepitum edit velut lapis. **Medela.** Quum sic habuerit, fisco per
 scalpellum naso expurgato, deinde inurito. Atque hoc facto
 nasum rursus consuuto, & vlcus curato, linamentum melle il-
 litum indens, & vbi computruerit, æris florem cum melle
 illinito. Fiat autem curatio plumbeis massis itidem immis-
 sis. Alius polypus. Nascuntur ex obliquo cartilaginis in-
 summo, velut cancelli. Omnes autem hos vrere oportet, &
 post vñionem veratrum inspergere. Postquam autem com-
 putruerint, æris flore cum melle expurgare. Curatio autem
 etiam plumbo immisso fiat.

Morbus regius niger.

- C**olor fit niger circa faciem, & maxime circa partes ve-
 lut in vmbra occultatas: & oculi cum virore pallidi,
 itemque lingua inferne, & venæ sub lingua crassæ ac nigræ:
 & est homo sine febre, ac mingit vrinam crassam, biliosam.
Medela. Quum ita habuerit, primum venas sub lingua secato, de-
 inde calida multa loto, asphodeli radices bibendas ieiuno da-
 to, ita vt æquales quinque radices depurgatas in vino co-
 quas, & apij foliorum quantum manus plena capit addas. Af-
 fundito autem vini dulcis tres heminas dimidiatas Aegino-
 ses, vt à

Ates, vt à coctura semihemina supersit. Hoc permixtum bibendum dato. Postquam autem minxerit, cibis aluum subeuntibus vtatur, & à cibo cicer album edat, & vinum album, multum, aquosum bibat: & apium ac porrum in cibo edat. faciat autem hæc per dies septem, & si quidem in his color probe depurgatus esse tibi visus fuerit, bene est. Sin minus, etiam alios tres hæc faciat. Postea interposita vna atque altera die, medicamentum ad nares apponito. Deinde pharmacum deorsum purgans bibendū dato, à quo bilis purgatur. Et si splenicus fuerit, asininum lac aut serum postea exhibeto. Hæc faciens, sanum efficies. Alius morbus regius. Febris corripit debilis, & grauitas caput tenet, & quibusdam sanè febres cessant. Ipse vero fit cum virore pallidus, & maxime oculi, & debilis est, & corporis impotentia adest, & vrinam crassam cum virore pallidam emittit. Hunc calida lauato, & vrinam cientia bibenda dato. Postquam autem purior esse tibi visus fuerit, & color melior apparuerit, medicamentum ad nares appone, & postea deorsum purgans bibendum præbe. Cibis autem vtatur quàm mollissimis. Vinum bibat albū, dulce, aquosum. Hæc faciens sanus euadet.

Medela

Febres à bile.

Si bile infestatur homo, febris ipsum corripit quotidie, ac dimittit. Detinet autem in meridie. & os amarum est, & quum sine cibo manet, offendit hoc ipsum. Vbi vero ederit, strangulatur, & à modicis quibusdam cibis impletur, & abominatur, & vomitiones ipsum inuadunt, & ad lumbos ac crura grauitas incumbit, & multum dormit. Hic si post febrem exudarit frigidum ac multum sudorem, & febre non liberetur, morbum diuturnum sentiet. Si vero non sudarit, citius iudicatur. Quum sic habuerit, & ad nonum diem deuenierit, pharmacum dato. Nam si statim à febris initio deditis postquam purgatus est febris repetit, & rursus medicamentum opus habet. At si os non afficiatur, verum ad inum ventrem tormen irruat, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, & postea lac asininum, aut serum, aut aliquem succum. Si vero debilis fuerit, per clysterem subtus eluito.

Medela

Ante medicamenti vero potionē, si quis febrat, danda est ipsi aqua mulsa aquosa. Altera autem die qua febris detinet: aquam frigidam quantum bibere volet dabis. Vbi vero re-

x ij miserit

HIPPOCRATIS LIBER II.

Continua febris. miserit febris, ptisanæ succum, aut milium tenue sorbeat, & vinum album, odoratum, aquosum insuper bibat. Si vero febris neque noctu, neque interdiu remittat, & ad contactum supernas partes habeat calidas, venter autem & pedes frigidum sunt, & lingua aspera: huic medicamentum ne dederis, sed molli infuso per clysterem subluo, & ptisanæ succum bis in die frigidum sorbendum dato, & vinum aquosum insuper bibendum. Reliquo vero tempore aquam frigidissimā bibat. Hic si quidem septima die exudarit, & febris ipsum dimiserit, bene est. Sin minus, decimaquarta die plerunque moritur. Alia febris. Foris ad contactum febris debilis est, intrinsecus autem ardet, & lingua ipsius aspera est, & per nares & per os spirat calidum. Quinta die præcordia dura sunt, & dolor inest, & calor qualis in morbo regio apparet, & crassam ac biliosam vrinam eiicit. Hunc si septima die rigor & febris vehemens apprehenderit, & exudarit, bene est. Sin minus, moritur septima aut nona. Corripit autem maxime hic morbus, si non annus squalidus fuerit. Quum sic habuerit, quotidie calida lauato, aquamque mulsam aquosam multam bibendam dato, & ptisanæ succum frigidum bis in die sorbendum. A sorbitione vero vinum bibat aquosum, album, modicum. Si vero alius non egerat, clysterem adhibeto, aut glandulam subdito. Cibum autem ne exhibeas, donec febris remittat. Vbi vero sedata fuerit, pharmacum deorsum purgans bibat. Reuertitur enim quandoque morbus, si impurgatus permanferit. Et amplius morbus hic rursus corripit, si sanguis nimium biliosus factus fuerit. Alia febris. Si tertiana febris tenuerit, si quidem non omiffis tribus inuasionibus, quarta corripiat, pharmacum deorsum purgans bibendum dato. Si vero pharmaco non opus habere tibi videatur, radicum quinquefolij tritarum acetabuli mensuram, ex aqua bibendam dato. Si vero neque sic cesset, multa calida loto, trifolium, & filphij succum, in vino pari aqua ammixta, bibenda præbeto, & reclinato vestimenta multa integito, donec exsudet. Postquam vero exsudarit, si sitiat, polentam cum aqua bibat. Vesperis autem milium coctum tenue sorbeat, & vinum insuper bibat, donec febris cesset: & cibus quàm mollissimis vtatur.

Febris quartana.

Quum

- A** **Q**uam febris quartana ex alio morbo non purgatum apprehenderit, pharmacum deorsum purgans bibendum dato. Deinde caput purgato. Postea rursus infra purgato. Si vero his factis non cesset, interpositis duab⁹ inuasionibus post purgationem infernam, multa calida ipsum lauato, & feminis hyoscyami milij magnitudinē, & mandragoræ tantūdem, & succi silphij trium fabarum magnitudinem, & trifolij tantūdem, in vino meraco bibat. At si firmus & sanum se esse putans, ex lassitudine, aut profectione febre correptus, ad quartanam deueniat; fomētis ipsi adhibitis allium dato, in melle tinctum. Deinde lenticulæ decoctum bibat, melle & aceto ammixtis. Postquam autem repletus fuerit, vomat. Postea calida lotus, vbi frigidus factus fuerit, cyceonem ex aqua bibat. Vesperis cibis mollioribus & non multis vtatur. Altera vero exacerbatione, vbi multa calida laueris, & stragula ipsi intexeris, donec exudet, statim veratri albi radices trium digitorum longitudine, & trifolij drachmam, & succi silphij duarum fabarum magnitudinem, in vino meraco bibat. Et si vomitiones ipsum vrserint, vomat. Sin minus, post caput purgatum. Cibis autem vtatur quā mollissimis & acerrimis. Quam vero exacerbatio ipsum inuaserit, ieiunus medicamentum ne bibat.

Pleuritis.

- P**leuritis vbi corripuerit, & febris & rigor tenet, & dolor per spinam ad pectus, & erectæ ceruicis spiratio, & tussis, & salua alba ac subbiliosa, & non facile per tussim reicit, & per inguina dolor est, & cruentā vrinam mingit. Quam ita habuerit, si quidem febris septima die remiserit, sanus euadit. Si vero non remittat, deuenit morbus ad vndecimum aut decimum quartum diem. Et sanè multis in his diebus moriuntur. At si decimum quartum transgrediatur, euadit. Quam ita habuerit dolor, calefactoria adhibeto. Bibat autem mel, æquali aceto affuso coctum, ita vt quanta fuerit mensura cocti mellis & aceti, vnde uigessimam partē aquæ affundas. Hoc paulatim & frequenter bibendum dato; & postea quoque aquam modico aceto affuso ammisceto. Sorbeat & milij succum, melle modico adstillato frigidum, quartæ heminx partis mensura, quoties vtrūque cibum sumit, & bibat vinum album vinosum, aquosum modicum. Sit autem vinum quā mollissimum, odorem non habens. Vbi vero febris dimiserit,

x iij per biduum

HIPPOCRATIS LIBER II.

per biduum milium bis in die sorbeat, & betas iucundissime paratas edat. Deinde catulum aut auiculam coquat, & ius sorbeat, & de carnibus parum edat. Reliquo vero tempore, maxime quandiu à morbo tenetur, in prandio milium sumat, ve speris cibis paucissimis ac mollissimis vtatur. Alia pleuritis.

Medela. Febris tenet, & tussis, ac rigor, & dolor ad latus, & quandoq; ad clauiculam, & saliuam sput subbiliosam ac subcruentam. Quod si ægro abscessus ruptus fuerit, qua parte dolor maxime vrget, calefactoria adhibeto, & calida lauato, si non magna febris ipsum teneat. Sin minus, non. Bibendum autem dato fauum in aqua maceratum, ita vt aquam iam subdulcem facias, & postea quoq; aqua ammiscens. Sorbeat ptisanæ succum bis in die, & vinu inde bibat album, aquosum. Et si quatuordecim dies effugerit, sanus euadit. Alia pleuritis. Febris detinet, & dentium stridor, & tussis sicca, & cum virore pallida reicit, quandoq; etiam liuida: & dolor latus cornipit, & dorsum subrubidum fit. Caput & pectus calescunt, aliquando etiam venter, & pedes, & crura. Et quum erectus sedet, magis tussit: & aluus turbatur, & alui egestio cum virore valde pallida est, ac graueolens. Hic in viginti diebus moritur. Si vero has effugerit, sanus fit. Huic donec quatuordecim dies præterierint, aquam de farina crassa in ipsa macerata bibenda dato, & vinum album vinosum, aquosum postea bibendum. Sorbeat succum ptisanæ frigidu, bis in die. Verum præ melle mali punici succum, ad ptisanæ succu admisceto, postquam iam hic ptisanæ succus coctus fuerit, & lauet non multa. Vbi vero quatuordecim dies præterierint, in prædio miliu sumat. Ad vespeream carnibus auicularum, cum iusculo, & paucis cibis vtatur. At talem morbum pauci effugiunt. Peripneumonia.

Febris detinet dies quatuordecim vt minimum, ad summum duas de viginti, & per hos dies fortiter tussit, & primum quidem exscreat saliuam crassam ac puram, septima & octaua die. Si vero febris corripuerit, nona ac decima, subdulcem & purulentam, donec quatuordecim dies præterierint. Et si quidem decimaquinta die pulmo resiccatus fuerit, & tussiendo reiecerit, sanus fit. Sin minus, duas de viginti obseruato, & si quidem in his diebus tussis sedata fuerit euadit. Si non sedata, interrogato ipsum, an saliu ipsi dulcior appareat, & si hoc confessus fuerit, morbus annum durabit. Nam pulmo suppuratus fit.

A puratus sit. Huic primis diebus vinum dare conuenit dulce, *Medela.* album, aquosum, paulatim frequenter bibendum. Sorbeat etiam ptisanę succū melle ammixto bis in die, donec dies decem & octo præterierint, & febris defuerit. Periclitatur autem maxime in septem, aut quatuordecim. Postquam autem decē & octo dies transgressus fuerit, nō amplius moritur, sed pus spuit, & pectus dolet, & tussit. Quum sic habuerit, ieiun⁹ cum saluia vini illam potionem bibat, & leguminis fressi decoctum sorbeat, adipe multo ammixto, si non calor fuerit. Si vero fuerit, ne sorbeat, sed cibis vtatur salis ac pinguibus, & marinis potius quā carnibus. Et si pro ratione purgari tibi visus fuerit, in os infundito, ac fomenta adhibeto: si quidē crassum fuerit pus, fomenta adhibeto: si vero tenue, infundito. & ex cibis hæreat quā maxime, & ab acribus abstineat, & a carnibus bubulis, ouillis, ac porcinis.

Suppuratus ex peripneumonia.

Quam ex peripneumonia suppuratus factus fuerit, febris detinet, & tussis sicca, & difficultas spirandi, & pedes intumescunt, & manuum ac pedum vngues contrahuntur. Hunc ita affectum ad decimam diē a sup- *Medela.* purationis initio progressum, multa calida lauato, & ari radicem tali magnitudine tritā, & salis granum, & modicū mel-
lis, & aquam, & olei parum, extracta lingua tepida infundito, & postea humerum cōcutito. Et si quidem ab his pus erumpat, bene habet. Sin minus, aliud facito. Cibos acres & cyclaminum exsuccato, sitque succi vtrorūque acetabulum paruum, deinde silphij succum fabæ magnitudine terito ac diluito, & lactis caprini aut asinini acetabulum ammisceto. Hoc tepidum infundito. Quod si ab hoc non erumpat, raphani corticem, & æris florem, trium fabarum magnitudine terito: Sit autem raphani duplum: & oleo diluito quarta hemina parte. Hoc tepidum infundito. Et si eruperit pus, cibis quā salissimis ac pinguis-
Csimis vtatur. At si non prodierit pus, paulatim fomentum adhibeto in os, ex sij succo, vino Tornio, lacte bubulo, aut caprino, singulis pari mensura permixtis, ita vt sint hemina tres, in quos postea furni testas igni candefactas iniicito, atque inde vaporem per fistulam trahat, cauendo vt ne aduratur. Postquam autem purius iam spūm prodierit, viticæ semen,
x iiij thus,

HIPPOCRATIS LIBER II.

thus, organum, in vino albo, melleque ac oleo modico, ipsi D
 infundito, idque per tertium diem. postea vero butyrum, re-
 finam in melle eliquatam. Et cibus non amplius vtatur salis,
 neque pinguibus. At diebus interpositis, infusionum oris vsu
 cessante, saluiâ, rutam, satureiam, organum, pari portione ie-
 iunus ex vino bibat acetabuli mentura, omnibus illis insper-
 sis. Quod si ab infusionibus his oris non eruperit, nihil miri
 est. Sæpe enim prorumpit ad aluum, & statim melius habere
 sibi videtur, vbi ex angusto ad ampliorem regionem deue-
 nerit. Alius morbus. Quî tempus longius protrahitur, &
 febris vehemens ac tussis corripit, & latus dolet, & ad sanam
 partem decumbere non potest, sed ad dolentem, & pedes, &
 oculorum cavitates intumescunt. Hunc vbi decimus quintus E
 ab eruptione dies adest, multa calida lotum in sella firma col-
 locato, & alius quidem manus ipsius teneat, tu vero humerû
 concutito, vt audias in vtrum latus affectio strepitum edat:
 optandum autem esset in sinistrum. Hûc ipsum igitur locum
 secus, minus enim lethalis est. Si vero præ crassitudine ac co-
 pia strepitum non edat, quo ipsum cognoscere possis, (nam
 hoc aliquândo contingit) vtrum latus tumuerit ac magis do-
 luerit, hoc infime secato retro tumorê magis quàm ante ip-
 sum, quo parvis exitus facilem fluxionê habeat. Secato autem
 inter costas per nouaculam primum cutem, deinde scalpello
 acuto, quod pâniculo sit obligatum, ita vt summa ipsius pars,
 ad vnguis magni digiti mensuram expedita restet, quam in-
 tromittas. Postea emisso pure quantum visum fuerit, vulnus F
 linamento ex lino crudo, alligato foras propendente filo,
 concludito: & quotidie semel pus educito. postquam autem
 decimus affuerit dies, omni pure emisso linamentum ex lin-
 teo indito. Deinde vinû & oleum tepesacta per fistulam in-
 fundito, ne pulmo à pure humectari solitus derepente resic-
 cetur. Emitterendum autem est id quod mane infusum est, ad
 vesperâ: quod vespera, mane. Vbi vero pus tenue velut aqua
 fuerit, & ad digiti contactum viscosum ac modicum, peni-
 cillum stanneum caviû indito. Postquam autê omnino ven-
 ter resiccatus fuerit, paulatim linamentum præfectum minui-
 to, donec vlcus coalescat, & ipsum penitus eximas. Signum
 autem an euasurus sit habes, si pus album ac purum fuerit, &
 fibræ sanguinis insint, plerunque sanus fit. Si vero prima die
 profuat

*Vomica i-
 terior quî
 signatur.
 Curatio
 que.*

*Pus de uoi-
 mica quî
 educatur.*

- A** profluat lutei oui speciem habens, aut secunda die defluat crassum, cum virore subpallidum, foetens, moriuntur ubi pus effluxit. Alius morbus. Quum quis ex pulmonis affectu *Tabes.* tabescit, is salivam crassam, cum v. rore subpallidam, dulcem, tussiendo reiecit, & stridor ac dolor ad pectus & ad dorsum fit, & in faucibus tenuis sibilus auditur, & fauces siccae sunt, & oculorum cavitates rubicundae, & vox grauis, & pedes inflammescunt, & ungues contrahuntur, & supernae partes attenuantur ac imminuuntur, & salivam abominatur ubi excreaturus ipsam in ore habet, & tussit mane maxime & circa mediam noctem, immo etiam aliis temporibus. Et corripit magis hic morbus mulierculam iuenculam quam vetulam.
- B** Huic si iam pili de capite defluant, & nudum fit caput, velut ex morbo: & si prunis inspueti saliva graueolens fit, intra breue tempus ipsum moriturum esse pronuncia, id vero quod occiderit, alui profluuium fore. Vbi enim iam pus circa cor putruerit, nidorosum odorem prunis iniectum de se praeber: & cerebrum coalescens sanguinosum humorem effundit, qui aluum mouet. Huius autem signum est, quod capilli ex capite defluunt, Hunc ubi ita habuerit ne curato. Si vero a principio morbus obtigerit, lenticulae decoctum bibendum dato. Deinde interposita vna die, veratrum dato temperatum, vt ne aluum infernam moueat. Et quum noctu ad os sanguinosus humor ipsi influit, medicamenta ipsi frequentiora ad nares appone. Si vero non fluit, appone quidem, sed rarius, *Signa mor-
tis.*
- C** & mense semel, ita vt insuper veratrum bibendum des, quantum duobus digitis comprehendi potest, in vino dulci temperato. Statim vero lenticulae decoctum inde bibendum dato. At medicamenta quam paucissima bibat, si non febres acutiores ipsum corripiant. Radicem dracontij albam, & veratri delingat, sed non ex melle. Sic enim minime aluum mouebit. Si vero tormen in aluo inferna oboriatur, primum per clysterem illud infusum immittito, in quod coccus cni- *Coccus
cni-
dius.* dius ammiscetur. Quod si neque sic sedetur, lacte asinino cocto purgato, pharmacum autem nullum deorsum purgans dato. Si vero ante medicamentum, praepotato veratro bilem vomat, ab ipso lenticulae decoctio accepto vomat. Cibis autem vtatur, si febres acutae tenuerint, carnibus ouillis coctis, & volucrum, & cucurbita, & beta. Iusculum autem ne *Cibus
qualis.* forbeat,

HIPPOCRATIS LIBER II.

forbeat, neque ad intinctus vtatur. Piscibus vtatur scorpiis, & D
 cartilaginei generis coctis. Calidum vero nihil edat, neque
 lauet, si febris multa teneat. Neque oleribus acribus vtatur,
 præterquam satireia, aut origano. Vinum bibat album. Si ve-
 ro sine febre sit, calores autem aliàs atque aliàs corripiant,
 pisces edat optimos ac pinguisimos. & pingua, & dulcia, &
 quàm maxime salia. Et deambulationibus vtatur, neq; in ven-
 to, neq; in sole. Et à cibis vomat, vbi tempestiuum visum fue-
 rit. Et calida lauet, capite excepto. Ex cibis frumentaceis præ-
 stat panis, his qui non mazam edere soliti sunt, Mazam vero
 edere solitis, vtraque dato.

Alius morbus appellatus Tabes.

E
T Vsis vexat, & sputum multum ac liquidum, & quando-
 que facile tussiendo reiicitur etiam pus, veluti gran-
 do. quod dum digitis conteritur, durum & male olens est. At
 vox pura est & doloris exors, & febres nō corripunt, verum
 calor quandoque aliàs atque aliàs, atque hic debilis. huic ve-
 ratrum bibendum est, & lenticulæ decoctum, & large cibus su-
 medus, ita vt abstineat ab acribus, & carnibus bubulis ac por-
 cinis & ouillis. Exerceatur modice & deambulet, & à cibis vo-
 mitu vtatur. A Venere abstineat. hic morbus per annos se-
 ptem aut nouem durat. quod si ab initio æger curatus fue-
 rit, sanus euadit. Alius morbus. Si ex feruido vlce-

Medela

*Pulmonis
fistula affe-
cta quid fa-
ciat.*

re, aphtha appellato, pulmonis fistula laborarit, febris debi-
 lis tenet, & dolor medium pectus, pruritus corporis adest, &
 vox raucosa, & saliuam liquidam ac tenuem spuit: quando-
 que etiam crassam, velut ptisanæ succum. Et in ore odor ob-
 oritur ipsi grauis, velut à piscibus crudis, & aliàs atque aliàs
 in saliuâ apparent dura, velut fungus ab vlcere. & supernæ
 partes attenuantur, atque adeò homo totus: & circuli faciei
 rubescunt, & progressu temporis vngues contrahuntur, & a-
 ridi ac cum virore pallidi fiunt. Moritur autem statim, si non
 curatus fuerit, sanguinem ac pus spuens. postea etiam febres
 vehementes accedentes ipsum perimunt. Si vero curetur,
 effugit ex hac tabe. Curare porro oportet, vt lenticulæ deco-

F

*Medela
mali huius*

cto potu vomat. Quod si tempestiuum esse visum fuerit ve-
 ratrum bibat, siquidem potes fuerit homo, per se. Sin minus,
 dimidium potionis ad lenticulæ decoctum ammisceto, ita vt
 in quinta aut sexta potione desinat. At ventrem infernū me-
 dicamentis

- A** dicamēto ne moueas, si nō febres fortes corripuerint. Si nō autē corripuerint, lacte asinino subtus purgato. Quod si debilis sit, vt bibere nō possit, per clysterē infundito. Min⁹ aut caput moueas, & si quidē salua ad os prodierit multa ac salugino-
sa, ad nāres apponito quid, quod bilē nō ducat. Si vero fluxio ad os nō fiat, nihil capiti adhibeto. vbi autē salua graueolēs fuerit, interpositis inter lenticulā decocti vsum diebus, medi-
camētū in pulmonē infundito, & interposita vna die suffito. Cibus vtatur carnibus ouillis & volucriū, & piscib⁹ cartilagi-
nei generis, & scorpiis coctis. Quarto vero quoque die falsa-
mētum edat optimum ac pinguiissimū, & in pradio mazā su-
mat, in coena vero etiam panem ad hanc addat, & nihil for-
B beat, neque cyceonem bibat, si edere poterit. Porro obsonia condiat ac edat sesamo pro tritico, & coriandro ac anetho. Silphio autem ne vtatur, neque alio quopiam olere acri, pre-
terquā origano, aut thymo, aut ruta. Deambulationibus autē vtatur ante & post cibum, vitās ventum & solē. Ab ebrie-
tatibus & re venerea abstineat. Lauet tepida, excepto capite, quod quām rarissime lauari debet.

Tabes dorsalis.

- D**orsalis tabes à medulla fit. Corripit autem maxime recentes sponso, & veneri deditos. Sunt autem sine febre, & bene cibum capiunt, ac consumuntur. Et si interroges ita affectum, dicet cibi superne de capite in spinam velut for-
C micas descendere videri, & vbi mingit, aut ventrem exonerat, prodit ipsi genitale semen multum ac liquidum, & geni-
tura in vtero non manet, & in somnis semen profundit, siue dormiat cum vxore siue non, Et quum iter fecerit aut cu-
currerit, tum alias, tum ad accliuem locum, anhelatio ac debilitas ipsum corripit, & capitis grauitas, & aures sonant. Hunc temporis progressu vbi febres fortes ipsum corripue-
rint, perdunt febres lipyriæ. Quum ita habuerit, si ab initio curandum susceperis, fomento per totum corpus adhi-
bito, medicamentum sursum purgans bibendum ipsi dato, & postea caput purgato. Deinde deorsum purgans exhibeto. Optandum autem fuerit vt vere hāc curationem aggredia-
mur. Postea vero serum aut lac asininū bibendum dato. Cæ-
terum bubulum lac per quadraginta dies bibendum præ-
beto. Ad

Seminis clandestini fluxio.

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER II.

beto . Ad vesperam vero quàm diu lac potat , alicam sor- **D**
bendam dato . A cibis aurem abstineat . Postquam vero lac bi-
bere cessarit , cibis mollibus ipsum reficito , ex modico initiũ
sumens , & quàm maxime crassum ac pinguem facere stude-
to . Per annum ab ebrietatibus , & venere , & laboribus absti-
neat , exceptis deambulationibus , in quibus vitet frigus & so-
lem . Tepida autem lauet .

Pulmonis morbus.

Medela. **S** Aliua crassa ac fuliginosa tussi reiciit , & color niger , ac
subturgidus est , & dolores tenues sub pectus & sub scapu-
las fiunt : & vlcera ipsis ægre sanescunt . Minus tamẽ periculo-
sus est hic morbus superiore , & plures euadunt . Hunc vera-
trum bibere oportet , & per se , & lenticulæ decocto ammix- **E**
tum . Infundere etiam in pulmonem oportet ac suffitum fa-
cere . Cibis quoque large vtatur , abstinendo à carnibus bu-
bulis , ouillis , & porcinis , & ab acribus oleribus , præterquam
origano , aut satureia Vtatur deambulationibus . Mane vero
ieiunus ad accliuem locum iter faciat . Deinde folia condi-
mentaria hortensia bibat in vinum temperatum inspersa .
Deinde vero cibis relatis vtatur .

Arteria vulnerata.

Medela. **S** I vulnerata fuerit arteria , tussis habet , & sanguinem tuf-
siendo reicit , & fauces sanguine latenter implentur , &
grumos eiicit , & dolor fit acutus ex pectore ad dorsum , & sa-
liua viscosa ac multa , & fauces sicæ , & febris ac rigor corri- **F**
pit , & strident fauces velut à pinguedine , atque hæc ad quin-
detim dies patitur . Postea vero pus sputat , & velut vlceris ri-
cinos , bronchia in pulmone cartilaginosa , & rursus tussit , &
sanè sanguis erumpit , & postea pus crassius sputat , & febris for-
tior fit , & in pulmonem definit , & vocatur ruptio pulmonis .
At si post primum sanguinem pus non sputat , à laboribus ac
exercitiis quiescere oportet , & vehiculum inscendere , absti-
nereque à cibis salis , ac pinguibus , & ab oleribus acribus , &
postquam ipse seipsum optime corpore affectum esse putat ,
pectus ac dorsum inurito , ex parte vtrunque , & postquã vlce-
ra sana fuerint , per annum abstineat ab ebrietate , & ne ni-
mium impleatur , neque manibus laboret , neque vehiculum
inscendat , sed studeat vt corpus quàm maxime crassum ef-
ficiat .

Articuli pulmonis conuulsi.

- A** **Q**uam articuli pulmonis fuerint conuulsi, sputum spuit album, quandoque vero cruenta, & desipit, & febris tenet, & dolor pectus, dorsum, ac latus: & si se vertat, tussit & sternutat. Huic qua parte dolor fuerit calefactoria apponito, & centaurium, & daucum, & saluæ folia trita, melle & aceto affuso, præforbenda dato. & aquam insuper sorbendam. Et ptisanæ succum præforbeat, & vinum aquosum insuper bibat. Postquam vero dolor sedatus fuerit, saluiam tusam ac cribratam, & hypericum, & irionem trita, & potentiam, singula paribus portionibus, in vinum temperatum coniecta, ieiuno bibenda præbeto. At si ieiunus non sit, le-
B guminis fressi decoctum sine sale sorbendum dato. Si vero calor fuerit, cibus vtatur mollissimis, non salis, & minime nidorosis, vbi iam probe se habuerit corpus, & in pectore, & in dorso. At si ambo conuulsa fuerint, tussis emergit, & salua crassa ac alba apparet, & dolor acutus adest ad pectus, & sub scapulas, ac latus: & ardor detinet, & rubicundis in tibiis circulis impletur, & pruritus habet, & non sustinet neque sedere, neq; iacere, neq; stare, sed ægre afficitur, ac viribus deficit. Hic quarta die maxime moritur. Si vero hanc effugerit, spes neque sic multa superest, Verum periclitatur & in septima. Quod si & hæc effugiat, sanus euadit. Hunc vbi sic habuerit, multa calida bis in die lauato. Et quum dolor habuerit, calefactoria adhibeto, & mel, & acetum bibendum dato,
C & ptisanæ succum sorbendum, & vinum album vinosum insuper bibendum. Si vero ad balneum & calefactoria affligatur, ipsa que non sustineat, crassi lintei panniculos ipsi adhibeto, quos aqua tinctos in pectus ac dorsum imponas. Et fauum mellis aqua frigidissima macerato, aquamque bibendam dato. & frigidum ptisanæ succum, & aquam insuper bibat, & ad frigus decumbat. Hæc facienda sunt. Verum morbus lethalis est.

Erypelas in pulmone.

Si erypelas in pulmone fiat, tussis habet, & saluiam expuit multam ac liquidam, velut de gutture, non est autem cruenta: & dolor tenet dorsum, & vacuas partes ventris, ac laterum mollitudinem. & viscera sugunt, & vomit pituitam ac velut acetum, & dentes stupefcunt, & febris, ac rigor, & sitis corripit,

HIPPOCRATIS LIBER II.

Medela.

corripit, & ubi quid ederit, in visceribus fugit, & acidum eruat, & venter stridet, & corpus torpescit, & ubi vomuerit, melius se habere putat. Quum autem non vomuerit, digressa die tormen & dolor in ventre oboritur, & excrementum alui liquidum procedit. hic morbus maxime fit ex ebrietatibus, & carniū esu, & ex aquæ mutatione. Sed & ex aliis causis emergit. Huic pharmacum deorsum purgans bibendū dato, & iac asininum insuper bibendum, si non natura fuerit splenicus. Si vero splenicus fuerit, ne purges, neque succis, neque lacte, neque sero, sed eo quod modicum ingestum multum educet. Per clysteres quoque infusio in aluum fiat, & glandulæ subdantur in omnibus morbis, si aluus non egerat. Adhibendum est & frigida lauacrum in hoc morbo, & exercitium, ubi febres remiserint, & corpus leuiter se habere visum fuerit. Et vere & autūno vomitus inducatur. At vero alij capita, & origani pugillum, quātum tribus digitis apprehendi potest, duabus heminis vini dulcis affusis, & aceti acerrimi hemina vna, & mellis quarta hemina parte, coquito donec tertia pars reliqua fiat. Deinde ubi hominem exerceueris, & aqua tepida laueris, calidum hoc bibendum præbeto, Dato etiam lenticulæ decoctum, melle & aceto ammixtis, donec impleatur. Deinde vomat, & ea die pota polenta & aqua, ita ieiunus permaneat. Ad vesp̄eram vero betam edat, & parum de maza, & vinum aquosum bibat. Reliquo vero tempore, à lenticulæ decocto, & à cibis vomat. Et si discesserit dolor sub scapulas, cucurbitam affigito, & venas in manibus pertrūdito. Cibis porrò vtatur non salis, neque pinguius. Acr̄ia autem & acida edat, & frigida omnia. Vtatur & deambulationibus. Hæc si fecerit, optima victus ratione vsus fuerit, & per plurimum tempus morbus prorogari poterit. Est autem non lethalis, sed consenescentes relinquit. Si vero iuniorem aliquem citius à morbo liberare voles, ubi ipsum purgaris, pectus & dorsum inurito.

Morbus dorsalis.

Rigor & febris, & tussis, & spirandi difficultas corripit, & saluam sputum cum virore pallidam, quādoque etiam subcruentam: & dolet maxime dorsum & inguina: & tertia aut quarta die cruentam vrinam mingit, & moritur septima die. Si vero quatuordecim dies effugerit, sanus euadit: effugit autem

Agit autem non ita valde. Huic aquam mulsam bibendam dato, in olla noua feruefactam ac perfrigeratam, & apij aut feniculi radice cortice in ipsa macerato. Dato & pitisanæ succum bis in die, & vinum album aquosum insuper bibendum. Qua vero parte dolor constiterit, calefactoria adhibeto, & calida lauato, si non febris multa vexet. Postquam autē quatuordecim dies præterierint, in prandio quidem sumat milium, ad vesp̄eram vero carnes catulinas, aut volucrium, coctas edat: & de iusculo sorbeat. Cibis autem quā paucissimis primis diebus vtatur.

Medela.

Tuberculum in pulmone.

Quum tuberculum in pulmone natum fuerit, tussis tenet, & erectæ ceruicis spiratio, & dolor ad pectus acutus, & ad latera, & vsque ad quatuordecim dies ita afficitur. Nam plerisque per tot dies tuberculi affectio inflammantur. Sed & caput dolet & palpebras, & videre nō potest: & corpus subfuluum fit, ac venis impletur, Hunc multa calida lauato, & aquam mulsam aquosam bibendam dato, & pitisanæ succum sorbendum, & vinum aquosum insuper bibendum. Si vero dolor vrgeat, calefactoria adhibeto. Vbi autem sedatus fuerit, cibis mollissimis vtatur. Quod si liberatum à morbo, spirandi difficultas corripiat, dum ad accliuem locū rectā pergit, aut aliās festinat, pharmacum dato, à quo inferna aliud non moueatur. Et si vnā cum vomitu pus sequatur, si quidem pus fuerit album, & fibræ in ipso subcructæ fuerint, effugit. Si vero liuidum, & cum virore pallidum, ac graueolens, moritur. Purgantur autem in quadraginta diebus ab ea qua erupit. Multis etiam annuus fit morbus. Hunc velut suppuratum curare oportet. Quod si non erumpat (multis enim progressu temporis abscedit ad latus, & extumescit) hunc si hoc fiat secato aut vrito.

Medela.

Pulmo repletus.

Si pulmo repletus fuerit, tussis tenet, & erectæ ceruicis spiratio ac anhelatio, & linguam exerit, rubicundis circulis in tibiis repletur, & pruritus vexat, & dolor acutus emergit ad pectus & scapulas, & non potest sedere, neque iacere, neque stare, sed agris viribus est. Hic quarta die maxime moritur. Si vero hanc euaserit, spes plerunque est, periclitatur tamen etiam in septima. Si vero hanc effugerit, sanus euadit.

*Curatio.**hunc*

HIPPOCRATIS LIBER II.

hunc vbi ita habuerit, multa calida bis in die lauato, & vbi D
dolor habuerit, calefactoria adhibeto. Et mel & acetum co-
cta bibenda dato, & pitæ succum sorbendum, ac vinum
insuper bibendum. Si vero ad balneum & calefactoria affli-
gatur, & ipsa non sustineat, perfrigeratorium ipsi adhibeto:
& fauum mellis aqua frigidissima macerato, aquamque bi-
bendam dato. Et decumbat ad frigus. Hæc faciat. Morbus au-
tem grauis est & lethalis.

Pulmo ad latus prolapsus.

Si pulmo ad latus prolapsus fuerit, tussis tenet, & erectæ
ceruicis spiratio, & saluam tussiendo reicit albâ & do-
lor ad pectus & dorsum emergit, & incumbens pulmo impel-
lit, & graue quiddam in pectore incumbere videtur, & do-
lores acuti pungunt, & sanguis stridet velut pellis, & spiratio-
nem cohibet, & ad affectum quidem latus decubitum susti-
net, non autem ad sanum: verum veluti graue quiddam ipsi
de latere pendere videtur, & per pectus transpirare se putat.
Medela. Hunc calida multa bis in die lauato, & aquam mulsam ipsi
bibendam dato. Post balneum, vinum album, cum modico
melle misceto, & dauci ac centaurij semina trita his diluito,
& tepida hæc sorbenda præbeto. Et infusam aquam calidam
in vtriculum, aut vesicam bubulam, ad latus apponito, & fas-
cia pectori alligato. Decumbat in latus sanum. Pitæ suc-
cum tepidum præbeto, & vinum aquosum insuper bibendū.
At si ex vulnere hoc fiat, aut suppurato secto (fieri enim in
his solet) huic vesicam ad fistulam alligatam flatu impleto, ac
intro mittito, & penicillum solidum stanneum indito, ac vl-
terius propellito. Sic curationem instituens, maxime pro-
feceris.

Lateris tuberculum.

Quoniam in latere tuberculum sit, tussis emergit dura, &
dolor, & febris, & grauitas in latere incumbit, & dolor
acutus in eodem semper loco vrget, & sitis vehe-
mens, & calidum potum auersatur, & in dolens latus decum-
bere non potest, sed in sanum. At vbi decumbit, velut lapis
impendere ipsi videtur, & intumescit, & rubescit, & pedes in-
tumescunt: hunc secato aut vrito. Postea pus emittito, vsque
Curatio. ad decimum diem, linamento ex lino crudo indito. Decima
autem die pure omni emisso, vinum & oleum tepidâ immit-
tito, vt ne derepente resiccet, & linamento, ex linteolo vti-
tor, vbi i

A tor, vbi vero id quod infusum est emiseric, aliud infundito. atque hæc per dies quinque facito. postquam autem pus tenuis effluerit, velut prisanæ succus ac modicum, ad manus contactum, stanneum penicillum indito, & vbi penitus reficatum fuerit, linamento semper modice præfecto, vlcus ad linamentum coalescere finito.

Hydrops pulmonis.

Si hydrops in pulmone fiat, febris & tussis tenet, & acuatim respirat, & pedes tument, & vngues contrahuntur omnes, & patitur talia, qualia is qui suppuratus sit, sed debilius ac diuturnius. Et si quid infundas, aut fomentum aut suffitum adhibeas, pus non sequitur, atque ex hoc sanè cognoueris, non pus, sed aquam intus esse. Et si multo tempore aure ad latera adhibita audire tentaueris, ebullit intrinsecus velut acetum: & hæc quidem aliquandiu patitur, postea erumpit ad aluum, & statim quidem sanus esse sibi videtur, ac à morbo liberatus. Verum progressu temporis aluus incenditur, eademque illa patitur, & adhuc amplius. Aliqui etiam intumescunt ventre, scroto, ac facie. Et quidam ab inferna aluo id esse putant, quum videant ventrem magnum, & pedes tumentes. Intumescunt enim hæc, si sectionis tempus transgrediaris. Hunc si quidem extra inrumuerit, inter costas sectum curare oportet. Si vero non intumuerit, multa calida lotum velut suppuratos collocato, & qua parte strepitum perceperis, ea secato, quàm potes infimo loco, quo effluxio facilis contingat. Postquam secueris, linamentum ex lino crudo indito, ita vt crassum & acutum linamentum facias, & sanguinem paucissimum parce emittas. Et si quidem in linamento pus adhæserit quinta die, plerunque euadit. Sin minus, vbi aquam exhauseris, sitis corripit & tussis, & moritur.

*Curatio
quæ.*

Pectus aut dorsum ruptum.

Si pectus aut dorsum fuerit ruptum, dolores tenent pectus ac dorsum perpetuo, & calor aliàs atque aliàs corripit, & saliuam subcruentam tussiendo reiecit, & velut pilus cruentus per saliuam transcurrit. Atque hæc maxime patitur, si manibus quid laborarit, aut in currum aut equum inscenderit. Huc ante & retro vrito ex partibus utroque loco, & sic sanus euadit. Cæterum per annum à labore se cõtineat, & ab vltura

Curatio.

y pinguefa-

HIPPOCRATIS LIBER II.

pinguefaciendo corpori studeat.

Febris ardens.

*Peripneu-
monicus.*

Medela

Febris tenet, & sitis vehemens, & lingua aspera, & nigra, & cum virore pallida, & sicca, & vehementer rubicunda: & oculi cum virore pallidi sunt, & excrementum egerit rubicundum & cum virore pallidum, talem quoque urinam mingit, & multum sputat. Sæpe etiam transmutatur velut ad peripneumoniā, & delirat. Ex qua re cognoueris quod peripneumonia sit. Hic si quidem peripneumonicus fiat, & quatuordecim dies transgrediatur, sanus fit. Si vero in decem & octo diebus peripneumonicus fiat, si non impurgatus permanens suppuratus fiat, aquam de crassa farina in ipsa macerata bibat, & acetum album quam odoratissimum postea bibat, & prisanæ succum sorbeat bis in die, si vero debilis fuerit, ter. & vinum vinosum, album, aquosum insuper bibat, & quam minimum lauet. At si suppuratus fiat, velut suppuratum curato.

Febris singultiens.

*Ptisana
integra.*

Potio que

Febris detinet vehemens, & rigor, & tussis, & singultus, & una cum salua grumos sanguinis tussiendo reiecit, & septima die moritur. Si vero decem dies effugerit, melius habet. Verum vigesima suppuratur, & primis diebus pus modicum tussiendo reiecit, deinde amplius, Purgatur autem in quadraginta diebus. Huic primis diebus acetum & mel cocta bibenda dato, & postea acetum & aquam ammisceto, quo aquosior potio fiat. Et prisanæ succum modico melle ammixto sorbeat, & vinum album vinosum insuper bibat. Postquam autem decem dies præterierint, si febris sedetur, & sputum purum sit, ptisanam integram sorbeat, aut milium. At si vigesima die pus sputat, saluam, & rutam, & satureiam, & origanum, ac hypericum, singula æquis portionibus contrita ac cribrata permisceat, ita ut omnium cyathi parui siue conchæ marinæ, sit mensura, & polentæ tantundem. Hæc ieiunus in vino dulci temperato bibat. Et si hyems sit, aut autumnus, aut ver, forbitionibus utatur. Si vero æstas, minime. Verum amygdalas, & cucumeris semen torrefactum, & sesamum, singula æquis partibus, ut in totum sit conchæ marinæ mensura terat, & aquæ heminam Aeginæam affundat, & farinam ac fauum inspergat. Hæc post potum sorbeat. Cibis utatur pinguibus & salis, & marinis magis quam carnibus.

Calida

A Calida lauet, minime vero caput. Hæc faciens à morbo liberatur.

Morbus lethargus dictus.

T Vllis oboritur, & saliuam spuit multam ac liquidam, & nugas garrit, & vbi nugari desierit, dormit: & recrementum male olens egerit: huic aquam de macerata in ipsa farina crassa bibendam dato, & vinum album vinosum postea bibendum, & prisanæ succum sorbendum. Verum huic mali punici succum ammisceto: & vinum vinosum album insuper bibat, & ne lauet. Hic in septem diebus moritur, Si vero has effugerit, sanus euadit.

Curatio.

Morbus siccatorius appellatur.

B N Equè sine cibo esse, neque cibum acceptum tolerare potest. Verum vbi quidem sine cibo manet, viscera fugit, & os ventriculi dolet, & aliàs alia vomit, & bilem, & saliuam, & pituitam, & acria: & postquam vomuit, aliquantisper melius habere sibi videtur. At vbi cibum accepit, ructus adsunt, & cum rubore exardescit, & semper multum se cacaturum esse putat. Vbi vero ea gratia defederit, status prodit: dolor caput habet, & totum corpus velut aciculis pungi videtur, aliàs alia parte. & crura grauiora sunt ac debilia, & consumuntur, ac debilis fit. Huic medicamentum bibendum dato, primum deorsum purgans, postea superne: & caput purgato, & à cibis abstineat dulcibus, & oleosis ac pinguibus, & ab ebrietatibus. Vomat autem à succis, & à cibis, & pro anni tempore, lac aut serum asininum bibendum præbens, pharmacum insuper bibendum dato, vtro tandem magis opus esse tibi visum fuerit. Aestate & vere frigida lauet. Autumno autem & hyeme vnguento vtatur, & deambulet, & modice se exerceat. Si vero debiliior sit quàm vt exerceri possit iter faciat. Et cibis frigidis ac aluum subeuntibus vtatur. Et si venter non egerat, molle infusum per clysterem iniicito. Morbus hic diuturnus est, & consenescentes, si ita futurum est, relinquunt. Sin minus, commoritur.

Medicla.

Febris interficiens appellata.

F Ebris tenet, & rigor, & supercilia impendere videntur, & caput dolet, & vomit saliuam calidam, & bilem multam. quandoque etiam infra egerit, & loci oculos non capiunt, & dolor ad ceruicem & ad inguina emergit, & affectis viribus est.

y ij bus est,

Medela

bus est, & nugas garrit. Hic septima die aut etiam prius moritur. Si vero hanc effugerit, plerumque sanus fit. Morbus est lethalis. Huic perfrigeratoria adhibere oportet ad viscera, & ad caput. & ordeum torrefactum vnâ cum paleis fractum aqua macerare, & de excolata aqua, mulsam facere, atq; hanc aquosam bibendam dare. Cibum autem non offerre, neque sorbitionem, vsque ad septimum diem, si non debilis esse visus fuerit. Si vero sit, pristinæ succum frigidum ac tenuem modicum, bis in die exhibere, & aquam insuper bibendam. Postquam vero septem dies præterierint, & febris dimiserit, milium lingat, Ad vesperam cucurbitam, aut betas paucas sumat, & vinum album aquosum inde bibat, donec ad nonum perueniat diem. Postea cibo quàm paucissimo vtatur, miliū in prandio sumens. Balneo donec dolor & febris affuerint, ne vtatur. Vbi vero cessauerint, multa lauet. Quòd si venter non egerat, molle infusum per clysterem immittito, aut glândulas subdito. Quum vero validus factus fuerit, molli pharmacum ad nares appposito, aluum infra purgato. postea lac asinum bibendum dato.

Morbus liuidus.

Medela

Febri detinet sicca, & horror aliàs atq; aliàs, & caput dolet, & dolor viscera tenet, & bilem vomit, & quum dolor tenet, suspicere non potest, sed grauat, & venter durus fit, & color liuidus, & labia, ac albæ oculorum partes liuescunt, & aspectum præ se fert velut qui strangulatur. Quandoq; etiam colorem transmutat, & ex liuido, cum virore subpallidus fit. Huic medicamentum & deorsum, & sursum purgans bibendum dato, & clysterem adhibeto, & à capite purgato. Et calida quàm minime lauet, sed & vbi lauerit, ad solem apricetur. Serum etiam & lac asinum pro anni tempore bibat, & cibis quàm mollissimis vtatur & frigidis, abstinens ab acris & falsis: verum dulcioribus ac pinguioribus vtatur. Cæterum hic morbus vt plurimum cum ægro commoritur.

Morbus ructuosus.

Dolor corripit acutus, & dolitat vehementer, & ipse se ipsum iactat, & vociferatur, & frequenter eructat, & vbi eructauit, melius habere sibi videtur. Sæpe etiam bilem reuomit modicam, poculi parui mensura: & dolor corripit à visceribus ad imum ventrem, & laterum mollitudinem, & vbi hoc

A vbi hoc factum fuerit, melius habere sibi videtur: & venter inflatur, ac durus fit, & strepit, & flatus non egreditur, neque stercus. Hunc si dolor habuerit, multa calida lauato, & ca- *Medela*
 lefactoria ipsi adhibeto. Vbi vero in ventre dolor ac flatus fuerit, clysterem adhibeto: & mercurialis coctæ succum, ad pitisanæ succum ammisceto, ac sorbendum dato, & vinum dulce, aquosum, insuper sorbendum. Cibum autem ne exhibeas, donec dolor remiserit, & vuarum expressarum retrimenta dulcia, per noctem in aqua maceret, & hanc aquam per sex dies bibat. Si vero vuarum expressarum retrimenta non habeat, mel & acetum cocta bibat. Postquam autem dolorem enouerit, medicamento deorsum aluum purgato. Cibus vtatur inde mollibus & aluum subeuntibus, & marinis magis
B quàm carnibus, carnibus autem volucrum & ouillis coctis: edat etià betas & cucurbitam: ab aliis vero abstineat. Morbus hic si iuuenem corripit, tempore decedit: si senio- rem, commoritur.

Morbus pituitosus.

C Corripit quidem morbus pituitosus etiam virum, sed magis mulierem, & est hæc quidem crassa & bene colorata, verum iter faciens debilitatur, & maxime si ad accliuem locum iter faciat. Corripit ipsam etiam febris tenuis, quandoq; etiam suffocatio: & euomit vbi ieiuna est, bilem & saliuas multas, sæpe etiam vbi cibum accepit, de cibo tamen nihil: & quum laborarit, dolet pectus & dorsum, aliàs alia parte, & rubicundis cutis eminentiis impletur, velut ab vrtica inustis. Huic medicamentum bibendum dato, & serum *Medela*
 ac lac asininum bibat. Si vero serum poterit, medicamentum deorsum purgans ad plurimos dies præbibendum dato. Et si serum bibere desierit, lac asininum postea bibat, & dum hoc poterit, à cibus quidem abstineat, vinum vero quàm iucundissimum bibat, donec purgari desinat. At vbi à portione cessauerit, milium in prandio sumat. Vesperis cibo molli-ssimo vtatur ac paucissimo. Abstineat à pinguibus & dulcibus ac oleosis. Et aliàs atque aliàs, maxime tamen hyeme, à lenticulæ decocto vomat, oleribus præsumptis. Et calida quàm minimum lauet, sed & ad solem apricetur. Morbus autem commoritur.

HIPPOCRATIS LIBER II.

Pituuta alba.

D

Cursatio.

INtumesceat totum corpus albo tumore, & venter ad contactum crassus est, & pedes ac femora tument, Tibiæ item ac scrotum, & acervatim respirant, & facies rubicunda est, & os siccum, & sitis tenet, & ubi cibum accepit, spiritus frequens incumbit. Hic eadem die quandoque melius habet, quandoque peius. Huic si quidem venter sua sponte turbatus fuerit in principio morbi, proximus sanitati est. Si vero non turbetur, medicamentum deorsum purgans dato, à quo aqua purgetur. Et calida non lauet, & sub dio exponatur, & scrotum ubi impletum fuerit secato. Cibis utatur pane puro frigido, & beta, & piscibus scorpiis coctis, iusculo autem quam paucissimo. Et frigida omnia edat, & non dulcia, neque pingua: sed trita & acida, & acria, excepto allio, cepa, & porro. Origanum vero & satureiam multam edat, & vinum inde vinosum bibat, & ante cibum iter faciat. At si à medicamento tumeat, clysterem adhibeto, & cibo, deambulationibus, & illuie premito. Medicamenta vero quam paucissima exhibeto. Verum sursum purgans non prius dederis, quam tumores ad infernas partes descenderint. Quod si extenuato iam ipso suffocatio in pectore oboriatur, veratrum bibendum dato, & caput purgato, & postea deorsum purgans bibat. Morbus hic maxime à nullo discedit.

Cura morbus difficilis.

Medela.

IN visceribus veluti spina esse videtur, & pun gere, & anxietas ipsum corripit, & lucem ac homines fugit, & tenebras amat, & timor inuadit, & septum transuersum foris tumet, & ad contactum dolet, & expauescit, & terculamenta ac somnia horrenda videt, & quandoque etiam mortuos. Et morbus hic fere plurimos vere corripit. Huic veratrum bibendum dato, & caput purgato, & post capitis purgationem pharmacum deorsum purgans bibat, postea vero lac asinum bibat. Cibis utatur quam paucissimis, si non debilis fuerit, & frigidis, & aluum subeuntibus, & non acris, neque salis, neque pinguibus, neque dulcibus. Et calida non lauet, neque vinum bibat, sed aquam maxime, aut saltem vinum aquosum. Neque exercitiis utatur, neque deambulet. Hæc si fecerit, à morbo liberabitur temporis progressu. Si vero neglexerit, commoriatur.

Morbus niger.

Nigrum

A Nigrum vomit veluti fecem, quandoque cruentum, quandoque velut vinum secundarium, quandoque velut polypti atramentum, quandoque acre velut acetum, quandoque salivam & pituitam, quandoque bilem cum virore pallidam. Et vbi quidem nigrum cruentum vomuerit, cadaueris fetorem refert; & fauces & os à vomitu aduruntur, & dentes stupescunt, & id quod vomitu reiectum est terrâ eleuat. Et postquam vomuit, paululum melius se habere putat. Et neque sine cibo esse, neq; ampliozem cibum ferre potest. Verum vbi sine cibo manet, viscera sugunt, & salivæ acidæ sunt. Quam vero cibū accepit, grauitas in visceribus est, & pectus ac dorsum velut stilis pungi videntur, & dolor tenet latera, & febris debilis est, & caput dolet, & oculis non videt, & crura grauantur, & color niger est, & consumitur. Huic pharmacum bibendum dato frequenter, & pro anni tempore & serum, & lac. Et à cibis abstineat dulcibus, & oleosis ac pinguibus, & frigidissimis ac maxime per aluum subeuntibus vtatur. Et caput purgato, & post medicamentorum potiones sursum purgantes, de manibus sanguinem detrahito, si non fuerit debilis. At si alius non egerat, molle infusum per clysterem immittito. Et abstineat ab ebrietatibus & venere. Si vero coierit, ieiunus fomentis vtatur. Et à sole abstineat, neque multum se exerceat, neque deambulet, neque calida lauet, neque acria edat, neq; falsa. Hæc faciēda sunt. Et vñā cum ætate aufugit etiam morbus, & cū corpore senescit. Si vero denigratus, fuerit cōmoritur. Alius morbus niger. Subfulvus & gracilis, & oculis cum virore pallidis fit, & tenuem cutem habet, ac debilis est. Quanto autem tempus amplius progreditur, tanto morbus amplius affligit. Et vomit omni tempore velut stillamentum modicum, ad duorum poculorum paruorum mensuram, & frequenter etiam cibum, ac vñā cum cibo bilem & pituitam; & post vomitum dolet totum corpus, aliquando etiam antea quā vomat. Et horrores tenues ac febris tenet. & ad dulcia ac oleosa maxime vomit. Hunc medicamentis sursum ac deorsum purgare oportet, & lac asinum postea bibendum præbere. Cibis autem vtatur mollissimis ac frigidis, piscibus littoralibus, & cartilaginei generis, & betis, & cucurbitis, & carnibus tritis. Vinum bibat album, vinosum, aquosius. Labore & deambulationibus vtatur, & calida ne la-

*Medela.**Medela.*

HIPPOCRATIS LIBER III.

uet, & à sole abſtineat. Atque hæc ſanè facienda ſunt. Verum **D** morbus lethalis quidem eſt, non autem conſeſcit.

Morbus corruptorius.

Alia quidem omnia eodem modo patitur. Verum gra-
mos bilis concretos vomit, & deorſum ſimiliter egerit,
poſtquam cibos excreuit. Cæterū eadem facere oportet, quæ
in priore morbo relata ſunt, & clyſterem adhibere.

HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS LIBER III.

*Iano Cornario medico phy-
ſico interprete.*



DE febribus vniuerſis à me dictum
eſt, de reliquis iam dicam.

Cerebri tumor,

QUum cerebrum ab inflāma-
tione tumuerit, dolor totum
caput occupat, maxime
qua parte cōſtiterit inflāmmatio:
Conſiſtit autem in temporibus: &
aures ſonitu implentur, & auditus
hebeſcit, & venæ extenſæ ſunt, ac

pulſant. & febris ac rigor aliquando corripunt, & dolor nun-
quam deficit, ſed quandoque remittit, quandoque magis pre-
mit, & vociferatur ac exilit præ dolore. Et vbi ſurrexit, rur-
ſus ad lectum decumbere feſtinat, & iactat ſeipſum. Hic le-
thaliter quidem affectus eſt, in quot vero diebus morietur,
non habet iudicationem. Nam alij aliter pereunt. Plerunque
tamen in ſeptem diebus moriuntur. Si vero vigefimumpri-
mum effugerint, ſani ſiunt. Quum itaq; dolor vexarit, frige-
facere caput oportet maxime quidem per raſuram, aut frige-
factorio aliquo, velut eſt ſolani ſuccus, & terra figularis, in ve-
ſicam aut folliculum immiſſo, ita vt viciffim modo appo-
nas, modo auferas, priuſquam tepescant. Sed & ſanguinem
detrahere

Modela.

A detrahere oportet, & caput purgare, ad apij succos odoratis ammixtis. A vino autem in totum abstinere. Ptisanæ succum sorbere, & infernam aluum soluere.

Cerebri repletio dolorosa.

QUum doluerit caput præ cerebri repletionem, vitiosorum humorum purgationem non factam esse significat, & dolores totum caput tenent, & delirat, & moritur septima die, & euadere non poterit, si non eruperit humor septima die per aures. Sic enim & dolor sedatur, & resipiscit. effluit autem multus & inodorus. Huius aures priusquam pus erupisse videris, potius ne curato. Si vero supernam ac infernam aluum purgare voles, seorsum utrâque soluito. Postea **B** capiti maxime quidem vniuerso, sed & per aures, & per nares, fomentum adhibeto. Sorbeat autem ptisanæ succum, & a vino abstineat in totum. Postquam vero eruperit pus, contineto te donec multa fluxio sedetur, postea aures colluito vino dulci, aut lacte muliebri, aut oleo veteri, atque hæc tepida infunduntur. Caput vero frequenter mollibus ac odoratis fomentis foueto, quo citius cerebrum purgetur. hic primum quidem non audit, progressu vero temporis & fluxio minor fit, & auditus vnâ cum fluxione penitus quiescente contingit, & maxime sibi ipsi similis reddit. Cauere autem oportet solem, ventos, ignem fumum, acrium odores, & alia huiusmodi: & quiescere, ac molli victus ratione vti. Sit autem aluus inferna præ vasorum vacuatione solutu facilis.

Syderati.

QUæ iacti ac syderati esse dicuntur, quum cerebrum multa immundicia vitiosorum humorum repletum fuerit, anterior capitis pars primum dolorem ipsis exhibet & suspicere non possunt, aliqui ambobus oculis, aliqui altero, & sopor ipsos tenet, & desipiunt, & tempora saliant, & febris tenuis habet, & corporis impotentia. Hic tertia aut quinta die moritur, & ad septem non deuenit. Si vero deuenierit, à morbo liber euadit. Hunc si curare voles, capiti fomenta adhibeto, & sectione facta transpirationem effcito. Si vero dolor tenuerit, etiam sternutationes inducere oportet, & caput purgare leuibus ac odoratis, infernam item aluum purgare. A vino autem penitus abstineat, & ptisanæ succo vtatur.

Cerebri corruptio.

Si cerebrum

HIPPOCRATIS LIBER III.

SI cerebrum corruptū fuerit, dolor caput tenet, & per col-
lum procedit ad spinam, & æger non audit, & frigus ad
caput deuenit, & totus intumescit, & derepente priuatur vo-
ce, & ex naribus sanguis fluit, & liuidus fit. Quod si morbus
Medela. leuiter corripiat, vbi sanguis discessit, melius habet. Si vero
vehementer correptus fuerit, cito perit. Huic sternutationes
per odorata inducit, & aluum vtrunque, aut alteram saltem
purgato. & odorata quæ leues odores habent, naribus ad-
moueto. & sorbitionem tenuem ac tepidam exhibeto. Absti-
neat autem penitus à vino. Lethargus.

MOrbi lethargi appellati status idē est, qui & peripneu-
monia, Verum difficilior, & non omnino liber ac re-
motus est ab humida peripneumonia. Sed multo tardior est
morbus. Patitur autem æger hæc. Tussis & sopor ipsum ten-
net, & saluam liquidam ac multam educit, & vehementer im-
Medela. potens est: & quum moriturus est, multum atque id liquidum
infra egerit. Huic valde exigua vitæ spes est. Attamen hoc cu-
rādum est vt plurimum sputat, & calefiat, & à vino abstineat. Si
vero effugerit, suppuratus fit.

Morbus siue febris ardens.

IN morbo febris ardente appellato, sitis tenet multa, & lin-
gua horret. At color eius primo quidem tempore est velu-
ti solet, verum sicca est. Progressu vero temporis induratur,
exasperatur, crassescit ac nigrescit. Si vero in principio hæc
patiantur, citiores iudicationes fiunt, Si posterius, tardiores.
Cæterum remissionis eadem omnia signa lingua exhibet,
quæ in peripneumonia: & vrinæ biliosæ aut cruentæ, dolo-
rem ampliolem: flauæ vero, minorem significant. & sputum
præ caliditate ac siccitate, combustum ac crassum est. Sæpe
vero etiam in peripneumoniâ transit, quod si contigerit, bre-
Medela. ui moritur. Hunc autem hoc modo curare oportet, calida bis
aut ter singulis diebus lauato, capite excepto. At in iudica-
tionibus lauare non oportet. Et primis quidem diebus deor-
sum purgato, & aquam bibendam dato. Nam plerunque vo-
mitum aqua ciere solet. Posterioribus verò post purgationem
humectato, & sorbitionibus vtatur, ac vinis dulcibus. Quod
si non ab initio ægrum curandum susceperis, sed signis iam
in lingua existētibus, sinere oportet donec iudicationes præ-
terierint, & linguæ signa mitiora facta fuerint: & neque me-
dicamentum

- A dicamentum dederis, neque ad purgationem faciendam clysterem adhibueris priusquam iudicationes prætereant.

Pulmo tumens præ calore.

- Q Vum pulmo tumuerit præ nimio calore repletus, tussis tenet fortis & dura, & erectæ cervicis spiratio, & acuatim respirat, & frequenter anhelat, & intumescit, & nares expandit, velut equus ex cursu, & linguam frequenter exerit, & pectus ipsi canere videtur, & gravitas in ipso inesse. Quapropter hanc capere pectus non potest, sed dirumpitur & impotens fit, & dolor acutus emergit, & dorsum, & pectus, & latera velut acubus punguntur: & ardent hæ partes velut eius qui sedeat ad ignem & rubores exoriuntur ad pectus & dorsum, velut à flama, & morsus fortis incidit, & angustia, ut neque stare, neque sedere, neque decumbere possit. Verum ita velut desperatis rebus anxius iactat seipsum, & iam mori videtur. Moritur autem maxime quarta aut septima die, quas si effugerit, non valde perit. Hunc si cures, infernâ aluum quàm citissime clysteri adhibito, probe purgare oportet, & de cubitis, & naso, & lingua, ac de omni corporis parte sanguinem mittere. Potiones item frigefaciētes exhibere, & sorbitiones idem præstātes. Danda sunt & urinam cientia sapere, sed quæ non calefaciant. Et ad ipsos quidem dolores quū irruunt, calefactoria levia ac humida adhibēdo, locum calefacere ac humectare oportet, ubicunq; dolor fuerit: ad reliquas vero partes, frigefactoria adhibere, vicissim ea apponēdo ac tollēdo, & ubicunq; arserit frigus facere. A vino autem penitus abstinere.
- C

Capitis dolor.

- Q Vum à capite initio sumpto, dolor acutus statim vocē interceperit, tum aliās, tum si ex ebrietate hoc contingat, ita affectus septima die moritur. Minus tamen moriuntur qui ex ebrietate tale quid perpeffi sunt, & voce privati permanserunt. Nam si eadem die, aut postera, aut tertia vocem edant, sani euadūt, faciunt autem hoc aliqui ex ebrietate, & neutri moriuntur. Hi sternutationes fortes inducere oportet, & infusum per clysterem iniicere, quod bilem vehementer ducat. Quod si sensum æger receperit, Thapsiæ succum in multa calida aqua dato, quo quàm citissime reuomat. Postea attenuato, & à vino prohibeto per septē dies. Detrahendus est & à lingua sanguis, si venā cōprehendere possis.

Phreni-

Medela.

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER III.

Phrenitides.

D

Medela.

Phrenitides sunt etiam ex aliis morbis. Patiuntur autem ægri hæc. septum transversum dolent, ut ne contingere quidem permittant. & febris accedit, & mente mouentur, & intentis oculis vident, & alia similia faciunt his qui peripneumonia affecti sunt, ubi sanè in peripneumonia mente mouetur. Hoc modo affectum calefacere oportet calefactoriis humidis & potionibus, excepto vino. Et si quidem fieri poterit, sursum purgare, & per tussim ac spuitionem educere oportet, quemadmodum in peripneumonia. Sin minus, inferna alius præparanda est, ut egerat. Humeato autem potionibus, hoc enim conducit. Morbus autem lethalis est. Moritur enim tertia, aut quinta, aut septima die. Si vero leniter corripiat, iudicat velut peripneumonia.

Angina.

AB Angina appella suffocatur homo, & in faucibus magis ipsi inhærere videtur, & neque saluam, neque quicquam aliud detrahit, & oculi affecti sunt ac prominent, velut strangulatis, & intente per ipsos videt, & ipsos conuvertere non potest, & anxius est, & exilit frequenter, & facies & fauces ardent, immo etiam collum. At videntibus nihil mali habere videtur, & videt ac audit obtusius, & præ suffocatione non intelligit, neque quid dicat, neque quid audiat, aut faciat. Verum hians decumbit saluam fundens, ac talia facies. Hic quinta, aut septima, aut nona die moritur.

Leuis angina paracynanche appellata.

F

Medela.

AT ubi horum signorum quid abfuerit, laxiorem morbum significat, quem paracynanchen vocant. Huic venâ secare oportet, maxime sub mamma. Concomitatur enim hac parte ex pulmone spiritus calidus. Oportet quoque deorsum purgare medicamento, aut per clysterem. Fistulas item detrudere cōuenit in fauces iuxta maxillas, quo spiritus ad pulmonem trahatur. Et faciendum uti quàm citissime spuat, & pulmo gracilis fiat. Et suffitus fiat per hyssopum Cilicium, sulphur, & bitumen: & attrahat & per fistulas, & per nares, ut exeat pituita. Fauces & lingua confricentur his quæ pituitam ducunt. Et venæ sub lingua secantur. Sed & à cubitis sanguis dimittatur, si vires validæ fuerint. A vino abstineat, & prisanæ succum tenuē sorbeat. Postquā vero remiserit morbus, &

A bus, & iam cibos gustarit, elaterio recenti purgato, vt ne in aliud malum incidat.

Morbus regius.

Morbus regius huiusmodi acutus est, & cito occidit. Color totus mali corium valde refert, & cum virore pallidus est, quales sunt lacerti cum virore pallicantes. Cōsimile est etiam corpus: & in vrina subsidet velut eruum fuluum, & febris ac horror debilis habet. Quandoque etiā vestimenta ferre non potest, sed mordetur ac raditur. Et mane quum cibum non accepit, viscera plerunque lancinantur. Et quum quis ipsum excitat, aut alloquitur, non patitur. Hic plerunque in quatuordecim diebus moritur. Has si effugerit, sanus euadit. Oportet autem ipsum calida lauare, & aquā mul-
Medicla.
sam bibendam dare, ita vt de nucibus Thafius decorticatis, & absinthij coma, æquis portionibus acceptis, & de aniso cribrato dimidia parte ammixta, obolos tres ieiunus ex illa bibat, & rursus dum cubitum it hanc aquam mulsam sumat. Bibat etiam vinum vetus tenue, & sorbitionibus vtatur. Nec à cibis abstineat.

Tetanus.

Quam distentiones Tetani appellati, corripuerint, maxilla rigent velut ligna, & os aperire nō possunt, & oculi lachrymantur ac distorquentur, & dorsum riget, & crura contrahere nō possunt, similiter neque manus, & facies rubicunda est, & valde dolet, & vbi moriturus est, & potum, & sorbitionem, & pituitam per nares reuomit. Hic
Medicla.
tertia die, aut quinta, aut septima, aut decimaquarta perit. Vbi vero has effugerit, sanus euadit. Huic catapotia ex pipere & veratro nigro deuoranda dato: & iusculum volucrum pingue calidum. Inducendæ sunt etiam fortes ac multæ sternutationes, & fomenta adhibenda. Quum autem fomentis non vtitur, calefactoria humida ac pinguis vndeque in vesicis ac vtriculis apponantur, maxime tamen ad partes dolentes, & calido oleo multo ac sæpe illinatur.

Opisthotonos.

Quam autem distentio in posteriores partes, opisthotonos appellata tenuerit, reliqua quidem plerunque eadem sunt. Verum in posteriores partes conuellitur, & vociferatur aliquando, & dolores emergunt vehemē-
tes, &

HIPPOCRATIS LIBER III.

tes, & crura interdum contrahere non permittit, neque manus extendere. Sunt enim cubiti incuruati, & digiti in pugnum contracti, & pollicem plerunque aliis digitis cōtinet, & clamat, & nugas garrit quandoque, & non potest seipsum continere, sed aliquando exilit, ubi dolor premit, quum vero dolor remittit, quietem habet. Aliquando etiam vox interceptitur simul ut morbo corripiuntur, aut infani & atra bile perciti fiunt. Hi tertia die moriuntur voce soluta, & reuomunt per nares. Si vero effugerint decimumquartum diem, sani fiunt. Curandus hic est velut superior. Quod si voles, etiam sic facies. Aquam frigidam plurimam superfundito, & postea vestimenta tenuia, pura, ac calida superintegito. Ignē autem tunc non adhibeto. Hoc auxilium & ad tetanos, & ad opisthotonos adhibere oportet.

Medela.

Voluuli.

Voluuli fiunt quum supernus vētriculus calefcit, infernus vero frigescit. Resiccatur enim simul intestinum, & prae inflammationis caliditate obturatur, ut neque flatus, neque cibi pertranseant, sed venter durus sit, & quandoque vomat, primum pituitosa, deinde biliosa, postremum stercus. Et æger situm habet ac dolorem, maxime circa præcordia. Verum & totum ventrem dolet, & inflatus est, & anxius est, & febres corripiunt, & fiunt maxime septima die. Hos sic curare oportet. Supernum ventriculum quàm citissime purgato, & sanguinem de capite ac cubitis detrahito, ut superna alius calefcere desinat, & partes supra septum transversum frigefacito, excepto corde. Infernas autem calefacito, homine in folio aquæ calidæ collocato, ac semper oleo illito. Calefactoria quoque humida apponito. Et glandulam de melle solum decem digitorum longitudinis facito, & ex summa anteriori parte fel taurinum oblinito, atque sic bis ac ter subdito, quo omnia combusta stercora circa rectum ac princeps intestinum contenta educas. Et si quidem sic obediērit, postea clysterem adhibeto. Sin minus, follem fabrilē indito, & in ventrem flatum immittito, à quo & ventrem, & intestini cōtractionem distendas. Deinde extracto folle, clysterem adhibeto. Sit autem infusum per clysterem iniiciendum paratum non ex valde calefactoriis, sed ex his quæ stercora dissoluunt ac colliquant. Postea obturata per spongiam sede, in aqua

Medela.

In aqua calida desideat continens clysteris infusum. Et si hoc infusum susceperit, & rursus dimiserit, sanus euadit. Cæ-
 terum priore tempore mel optimum delingat, & vinum splē-
 didum vernaculum bibat. Quod si voluulo amoto, febris ip-
 sum corripiat, desperatus est. Fortassis enim & inferna aluus
 soluta ipsum occiderit.

*Desperat
tio huius
morbis quā
do.*

Peripneumonia.

Peripneumonia talia facit. Febris acuta tenet, & spiritum
 frequentem ac calidum respirat, & anxietas adest, & im-
 potentia, & iactatio, & dolor sub scapulas, & ad claviculam,
 & ad mammam, & grauitas in pectore, quādoque etiam de-
 lyrium. Quidam dolorem non sentiunt, donec tussire ince-
 perint, Verum hic morbus diuturnior ac difficilior illo est.
B Saluam tenuem, ac spumofam primum sputum. Lingua flaua
 est. Verum progressu temporis nigrescit. Si igitur in princi-
 pio nigrescat, citius morbus finitur. Sin posterius, tardius.
 Tandem vero etiam rumpitur lingua, & si digitum apponas,
 inharet. At liberationem à morbo significat lingua, similiter
 velut in pleuritide. Hæc autem patitur homo, minimum die-
 bus quatuordecim, ad summum vna & viginti, & per hoc tē-
 pus tussit vehementer, & vnā cum tussi purgatur, primum sa-
 liua multa & spumosa. Septima vero & octaua die vbi febris
 in vigore fuerit, si humida sit peripneumonia, crassior pro-
 dierit: sin minus, non. Nona vero & decima, cum virore pal-
 lida ac subcruenta. Duodecima autem vsque decimam quar-
 tam, multa & purulenta. Atque hoc in his contingit, quorum
C naturæ & corporis affectiones humidae sunt, & morbus for-
 tis est. Quorum vero & natura, & morbi constitutio sieca est,
 in his minus. Si quidem igitur decima quarta die resiccatus
 fuerit, & non amplius purulentum tussiendo reiecerit, sanus
 est. Sin minus, ad duodeuigesimam, & vigesimam primam
 animum aduerte, & si quidem tunc sputum illud quieuerit,
 euadit. Sin minus, interroga ipsum, an dulcior sit salua, & si
 affirmauerit hoc, scito pulmonem ipsi suppuratum esse, &
 morbus annum durabit, si non in quadraginta diebus pus e-
 duxerit. Si vero insuaem saluam esse dixerit, status morbi
 lethalis est. Verum in primis dieb⁹ hi maxime manifesti sūt.
 Si enim putrefactum ac purulentū expuerit in diebus duo-
 bus ac viginti, & non exulceratus fuerit, euadit. Sin minus,
 non. Hæc

*Purulenti
pulmonis
signa.*

HIPPOCRATIS LIBER III.

non. Hæc peripneumonia nihil abest ab affectionibus quæ D
in pulmone sunt. Si igitur aliquid harum affectionum abfue-
rit, cognoscere oportet & quæ ægrotus mala habeat, & quæ
medicus aggredi debeat. Si vero pauca horum signorum ha-
buerit, ne decipiatur. Nam perniciofa non est peripneumo-
nia, sed mollis. Cæterum peripneumoniam hoc modo cu-
rare oportet. Non tamen peccabit, si quis etiam pleuritidem
& phrenitidem ita curare aggrediatur. Primum caput le-
uius facere incipe, quo nihil influat ad pectus. Primis autem
diebus sorbitiones sint dulciores. Sic enim id quod cõfedit
ac compactum est, potissimum elueris ac commoueris. Quar-
ta die & quinta ac sexta, non amplius dulces, sed pingues. Nã
ad sputum sursum exscreandum conducunt. Si vero pro ra-
tione spueri non possit, ex pharmacis sursum educetibus da-
to. Aluum autem in primis quatuor aut quinque diebus sub-
ducere oportet, & hoc paulo amplius, quo & febres obtusio-
res sint, & dolores leuiore. Quum autem euacuatus fuerit, &
corpore debilis, infernam aluum tertio quoque die deorsum
commoueto, quo & corpus potes sit, & supernæ regiones hu-
moris exortes. Nam si multus humor infra secedat, à quinta
die, mortem inducit. Infra enim humore secedente, supernæ
partes reficcantur, & sputi purgatio sursum non prodit. O-
portet igitur & infernam aluum, neque valde suppressam esse,
ut ne febres sint acutæ: neque valde egerere, quo salua sur-
sum educi possit, & æger viribus valeat. At medicamenta sur-
sum educentia, sexta & septima ac nona die, & morbo adhuc
vltcrius progresso, magis exhibeto. Sit autem medicamentũ,
veratrum album, thapsia, elaterium recens, singula æquis por-
tionibus. Quod si salua non probe purgetur, & spiritus fue-
rit frequens, & purgatio non præualeat, prædicendũ est nul-
lam spem vitæ reliquam esse, si purgatione nihil efficere pos-
sit. Sed & alia facienda sunt quæ in peripneumonia fieri so-
lent, si inferna aluus ministerium suum probe obierit. Quin
& aliter facere curatiouẽ oportet. A prima die initio sum-
pto, ari magni conchulam maiorem dato, dauci & vrticæ v-
triusque itidem vnã, sinapis & rutæ quantum tribus digitis
comprehendere potes, & succum silphij magnitudine fabæ.
Hæc in aceto dulci & aqua permixta & diluta ac excolata,
ieiuno tepida bibenda dato. Postquam vero purum exspuere
cœperit,

Curatio.

*Venter ni-
mis solutus
quinto die
necat.*

*Curatio al-
tera.*

A cceperit, ari conchulam maiorem, & scsamum, & amygdalas purgatas, in aceto dulci aqua diluto bibenda prabeto. Si vero magis ducere voles, radices Capparis corticem his ammisceto.

Pleuritis.

Quam pleuritis apprehenderit; hec patitur. Dolor latus, & febris & horror tenet, & frequentem spiritum habet, & erectæ cervicis spiratio vrget, & tussiendo reicit subbiliosa, velut à mali punici corio, si non ruptiones habuerit. Si vero habuerit, etiam sanguinem à ruptionibus. Est autem & sanguinea pleuritis, in qua subcruenta reicit, Et est quidem biliosa, mitior, si non ruptiones ager habeat: sin minus, dolorosior quidem est, sed non lethalior. At sanguinea fortis, & dolorosa, & lethalis est. Quum igitur affuerit simul singultus, simulque cum saliva sanguinis grumos nigros tussiendo reiecerit, septima die moritur. Si vero dies decē transgressus fuerit, à pleuritide quidem sanus fit, verum vigesima suppuratur, & pus tussiendo reicit, demum vero renomit, & non adeo facilis curatu est.

Pleuritides sicca.

Sunt & sicca pleuritides sine sputo, Verum hæc difficiles sunt. Iudicationes autem similes aliis sunt, sed ampliore in potu humectatione opus habent quàm alia. Biliosa vero & sanguinea, nona & undecima die iudicant, atque hi magis sani fiunt. At si à principio quidem molles quidam tenuerint dolores, à quinta vero ac sexta die acuti, hi vsque ad duodecimum perueniunt, & nō valde effugiunt, Periculum autem maxime est, vsque ad septimum. Immo etiam vsque ad duodecimum. Post has vero sanantur. Quæ vero ab initio molles sunt, à septima autem & octaua acutæ, ad decimumquartum iudicant, & sani fiunt.

Pleuritis ex dorso.

Pleuritis ad dorsum intantum ab aliis differt, dorsum dolet velut ex plaga, & suspirat, & acervatim respirat. statim autem sput pauca, & corpus delassatur. Tertia aut quarta die saniem mingit subcruentam. Moritur autem maxime quinta die: sin min⁹, septima. Has si effugerit, vixerit, Et morbus lenis est ac minus lethalis. Custodire tamen oportet vsq; ad decimumquartum. Postea vero sanus euadit. Cæterum

HIPPOCRATIS LIBER III

quibusdam pleuriticis salua quidem pura est, mixtio autem **D**
 cruenta, velut ferosa à carnibus assatis sanies. dolores vero ac-
 cuti per spinam ad pectus, & ad inguen tendunt. Hic si septi-
 mum diem effugerit, sanus fit. At si alicui in his pleuritidibus
 contingat dorsum rubescere, & humeros calefcere, & inter
 desidendum grauari, & venter exturbetur egestione cum vi-
 rore pallida, ac valde graecolenti, hic propter ventris ege-
 stionem, vigesima prima die moritur. Has si effugerit, sanus
 fit. Quibus autem statim sputa varia sunt, & dolores valde
 acuti, hi tertia die moriuntur. Hanc autem transgressi, sane-
 scunt. Qui vero sanus non fit septima, aut nona, aut decima,
 hic suppurari incipit. Melius est autem suppuratum fieri, et-
 iam si dolorosum sit. Minus enim lethale est. Porro supra om- **E**
 nia relata signa, in vnaquaque pleuritide considerare opor-
 tet linguam. Si enim bulla subliuida fiat in lingua, velut ferro
 in oleum tincto, si quidem in principio fiat aspera, difficilior
 est morbi emotio, & necesse est sanguinem tussiendo reice-
 re, in diebus quibus id fieri oportet. Si vero factò morbi pro-
 gressu fiat, iudicationes quidem contingent ad decimum,
 quartum diem, Verum necesse est sanguinem spueri. Habet
 autem se res de liberatione ab hoc morbo, hoc modo. Si qui-
 dem tertia die inceperit maturari ac expui, citius liberabi-
 tur. Si vero posterius maturescat, posterius iudicationes fiunt,
 quemadmodum in capitis signis. Dolores porro in omni
 pleuritide, plerunque magis interdium quam noctu leuiiores
 sunt. Curare vero pleuritidas hoc modo oportet, ut plurimū **F**
 velut phrenitidem & peripneumoniam, præterquam quod
 hic balneis calidis & vino dulci vtendum est. Si igitur prima
 aut secunda die postquam inuasit, agrum accesseris, si ster-
 cus prædiit purum, aut leuiter biliosum & modicū, infusum
 ex Thapsia per clysterem iniicito. Si vero alius commota, no-
 ctu quidem egerat, postridie vero dolor & tormen vexet,
 rursus clysterem adhibeto. At si æger biliosus sit natura, &
 non purgatus correptus fuerit à morbo, priusquam saluam
 biliosam expuat, etiam medicamento bilem probe purgato.
 Si vero iam expuat biliosa, medicamentum ne dederis. Si e-
 nim dederis, sputum sursum prodire non poterit, sed septima
 aut nona die suffocabitur, maxime si præcordia doleant,
 Quod si ad dolores in lateribus etiam præcordia doleant,
 clysterem

Medela

A clysterem adhibere oportet. & in potu ieiuno bibendam dare, Aristolochiam, hyssopum, cuminum, silphium, peplum, mecona appellatum album, florem æris, mel, acetum, & aquam. Et per medicamenta quidem ita primas curationes facere oportet. Reliqua vero sic se habent. Multa calida pro viribus ægri lauato, capite excepto. & quum iudicationes sunt, dolentes locos humidis fomentis tepefacito, & oleo illinito. Quum vero impetu fertur morbus, & ægrum & medicum à curationibus quiescere conuenit, ne quid mali inducatur. Dandus autem est ptisanæ succus coctus, aliquanto crassior spissitudine mellis. Post balnea etiam vinum dulce & aquosum bibendum est, non frigidum, modicum, ex angusti oris pocillo, & ubi tusses inuaserint, amplius bibendum & quam maxime excrescendum, & potu humectandū, quo pulmo humidior factus, facilius ac citius sputum reddat, & tussis minus affligat. Sed & mali punici dulcis vinosi succum, lacte caprino modico, & melle ammixto, paulatim sæpe dato, & noctu & interdiu, & somnum quam maxime prohibeto, quo purgatio & citius & copiosior fiat. At vero sanguineam pleuritidem sic curare oportet. Post iudicationes cibis leuibus reficito, & quietem agat, & nimium caueat solem, ventos, repletiones, acida, salsa, pingua, fumum, flatum in aluo, laborem, venerem. Si enim morbus recidiuarit, mors sequetur. In expuitionibus autem si dolor habeat, & expuere non possit, ieiuno æris florem dato, magnitudine oliuæ, & succi silphij dimidium eius, & trifolij seminis modicum, Hæc ex melle delingat. Aut piperis grana quinque, & succi silphij magnitudinem fabæ, mel, acetum, & aquam, ieiuno tepida bibenda præbeto. Hoc etiam dolores sedat. Quod si pro ratione spueri non possit, sed moretur sputum hærens in ipso, & stertat in pectore, ari magni radices conchulam maiorem, & oleum ac acetum mixta dato, & acetum aqua dilutum insuper bibat. Aliud forte. Florem æris magnitudine fabæ, & nitrum assatum dupla portione, & hyssopi quantum tribus digitis comprehendi potest, melli misceto, & aquam ac oleum modicum adstillato, & tepefacta in conchula maiore infundito, ut ne suffocetur. Hoc etiam in peripneumonia facere oportet, si non purgetur. Si vero neque stertat, neque velut oportet spuat, rapparidis fructus quantum tribus digitis

Pleuritis hæmatorides.

z ij compre-

HIPPOCRATIS LIBER III.

comprehendi potest, & piper, & nitrum modicum, & mel, **D**
 & acetum, & aquam misceto, atque hæc tepida sorbenda
 præbeto. Altera die eadem in aceto, melle, & aqua feruefa-
 cta sorbeat. Hoc etiam stertentibus dato, & his qui purgari
 non possunt. At si fortius facere voles, hyssopi & sinapis, &
 nasturtij concham maiorem, melle & aqua terito, & ferue-
 facta ac excolata, tepida sorbenda dato. Atque hoc modo
 hi morbi curati sanantur, si non quid sputi in pulmone reli-
 ctum pus fiat, à quo arida tussis sequitur, & febris ac horror
 emergunt, & erecta ceruice spiratio tenet, & frequentem &
 acervatam respirationem æger habet, & vox paulo grauior
 fit, & color cum calore faciem occupat. Progressu vero tem-
 poris, morbus magis manifestus redditur. Hunc si intra de- **E**
 cem dies susceperis, ubi victu & balneo calido calefeceris.
 medicamentum quod pus ducat in pulmonem infundito, a-
 liisque pus ducentibus vtitor, atque sic velut suppurato vi-
 ctus rationem præscribas. Caput quoq; resiccato, vt ne quid
 influat. Si vero ex eo quod in pulmonem infusum est; pus
 nõ educatur, rumpitur hoc ipsum ex pulmone in thoracem,
 & post ruptionem sanus esse videtur, quoniam ex angustia
 ad amplam capacitatem pus peruenit, & spiritus quem respi-
 rando attrahimus in pulmone locum ac sedem habet. Verum
 progrediente tempore pectus pure impletur, & tusses, & fe-
 bres, & alij dolores omnes magis ipsum premunt, & morbus
 inclarescit. Hunc post eruptionem per quindecim dies sine-
 re oportet, quo pus rursus maturescat, Nam ex eo quod pus **F**
 ad ampliorem locum deuenit, perfrigeratum est, & id quod
 in thorace humidi erat ad seipsum attraxit, ita vt ipsum sit
 semiputrefactum. Si quidem igitur sua sponte expui inci-
 piat in hoc tempore, bene est. Sin minus, medicamentis aut
 potionibus opem ferre oportet, in vltimis ex quindecim il-
 lis diebus, festinando ad corporis excitationem antea quàm
 magis affligatur, ita vt caput purum custodias, influxionum
 gratia. Si vero non spuatur, sed sui significationem ad latera
 præbeat, secato aut vrito. At si neque spuatur, neque ad late-
 ra de se significationem præbeat, ubi multa calida ieiunum
 lauasti, & neque potu vsum in firma sella locasti, alter ex hu-
 meris ipsum apprehendat, tu vero concute ipsum, aure ad la-
 tera admoda, quo percipias ex vtra parte significationem sui
 præbeat.

A praebeat. Optandum autem esset ex sinistra. Nam dexteras vrere aut secare lethalius est. Quanto enim robustiores sunt dextrae partes, tanto etiam fortiores morbi in ipsis fiunt. Quod si praecrassitudine, humor non fluctuet, neque strepitus sit in pectore, verum spiritum frequentem trahat, & pedes intumescant, & tussicula aliqua adsit, ne te decipiant, haec, sed thoracem pure plenum esse probe noris. Proinde in terra eretriade liquida, & valde trita ac tepida, linteum tenue tingito, eoque thoracem circumcirca integito, & qua parte primum resiccatum fuerit, ea secato aut vrito, quam proxime ad septum transversum, cauendo tamen ne hoc ipsum laedas. Si vero voles, ipsam terram eretriadem illinito, & similiter velut in linteo considerato. Multi simul illinunt, ne quae primum illinuntur resiccentur. Post sectionem aetionem, linamento ex lino crudo vrere, & paulatim pus emitte. Ceterum ubi secare vel vrere voles, corpori in eadem figura, in qua inter secandum aut vrendum futurum est, notam imprimito, ut ne cutis te decipiat, si in figurae transmutatione sursum aut deorsum magis cedat. Sed & tusses vitare oportet ex victu, ut ne rursus pus reuellant ad pulmonem. Malum enim hoc est: quare permittendum est ut ad sectionem quam citissime resiccetur. Postquam vero duodecima affuerit dies, reliquum pus totum emittito, & ex linteo linamentum indito, & bis in die pus emittito, & ventrem supernum ex victu quam maxime resiccato. Atque hoc modo oportet etiam suppurationes ex vulneribus, & ex peripneumonia: & ex magnis destillationibus, & pulmone ad lateres prolapsio, considerare ac curare.

Frigefactoriae potiones in febre ardenti.

Frigefactorias potiones in febribus ardentibus quando voles bibendas dato. Sunt autem multarum operationum. aliae enim mictionem inducunt, aliae alui egestionem, aliae utrumque praestant, aliae neutrum, aliae solum frigefaciunt, velut si quis in vas aquae feruentis frigidam aquam infundat, aut ipsum vas ad frigidum ventum exponat. Dabit itaque alias aliis. Neque enim dulces omnibus conducunt, neque acerbae, neque eadem omnes bibere possunt. 1. Fauorum siccorum heminarum duarum mensuram aqua macerato, & conterens gustato donec subdulcis aqua fiat, deinde exco-

z iij lato, &

HIPPOCRATIS LIBER III.

lato, & iniectis apiis bibendam dato. 11. Seminis lini acetabulum, aquæ heminis decem affusis, in noua olla prunis imposita coquito ac feruere finito vt transpirent, donec succus ad tactum pinguis fiat. 111. Aquam mulsam aquosam ad dimidias coquito, deinde apio iniecto frigidam paulatim exhibeto. 1111. Ordeum Achilleum magnum æ plenum heminæ mensura siccato, & acutis spicis ablatis, vbi probe laueris, aquæ congio affuso coquito ad dimidias, frigefacito ac bibendum dato. v. Cumini Aethiopici heminæ decimæ parti, tres aquæ semicongios affunde, & olla luto piloso oblita, donec tertia pars restet feruere sine, & frigidam hanc ad omnem ardentem aliamque febrem exhibe.

v1. Aquam cœlestem ipsam per seipsam præbe.

v11. Prisanæ heminæ congio aquæ affuso, ad dimidias coquito, deinde excolato, & apiis iniectis frigidam dato.

v111. Prosūt & vina alba aquosa ex uuis passis. 1x. Prosunt & uuarum passerarum expressarum retrimenta aquosa.

x. Uuarum passerarum albarum exēptis vinaceis heminam, radicum quinquefolij manipulum, tundito, & affusis aquæ heminis viginti, ad dimidias coquito, & frigidam hanc paulatim bibendā dato. x1. Ad farinæ ordeï pleni crassæ chœnicem dimidiam, aquæ congium affundas, & quum iam intumescunt crassæ farinæ partes, manibus teras, donec aqua alba fiat, & adianti pugillo iniecto, sub dio per noctem exposito, ac exhibeto. x11. Quorum trium aut quatuor candidum, in aquæ congio concussum bibat. Hoc valde frigefacit, & ægrum ad aluum exonerandam conturbat.

x111. Ordeï torrefacti probe loti chœnicē dimidiā, in aquæ cōgio bis aut ter feruere finito, & frigidā hanc exhibeto.

x1111. Prisanæ succum coctum tenuem, & vinum dulce dato. Hoc vrinā ducit. xv. Cucumeris peponis corio nudi dati pollinem ex aqua præbeto. Hæc potio vrinam ciēt, frigefacit, & sitim sedat. xv1. Eruum in aqua præcoquito, deinde ollam nouam, in maiore ollam aqua plenāposito, & alia aqua eruo affusa, ad modicū tempus coquito. postea vbi coctū fuerit eruum, tertiā aquæ partem reliquam excolatam bibendam dato, ita vt ad singulos cyathos, & cucumeris, & erui pollinem inspergas. Hoc constanter sitim sedat.

xv11. Vinū Thasiū vet^o parte vna, cū viginti quinque aquæ partibus

A partibus dato. **xviii.** Trifolium, cucumeris pollinem, & crassam ordei farinam in aqua macerato, & hanc bibendam dato. **xi.** Apij manipulos tres, pulegij pugillos duos, in aceti heminis decem ad tertias coquito. Hoc melle & aqua dilutū, aquosum bibat, adianti pugillo iniecto. Hoc vrinā ducit, & aluum soluit. **xx.** Mala odorata dulcia cōtundito, & aqua macerato, & aquā bibendā dato. **xxi.** Mala cydonea eodem modo, si alius soluta fuerit in febre ardente. **xxii.** Quod si morbus regius insuper corripiat, vñ passæ albæ exemptis vinaceis, & cicerum alborum, vtrorumque dimidiam heminam, & ordei Achillei magni ac pleni tantundem, & cnici tantundē, aquæ heminas decem, & apium, & mētā, & coriandrum, de singulis parum, terito donec placide aqua dulcescat, & adiati pugillo postea iniecto, vbi sub dio per noctem exposuisti exhibeto. Potes etiam alia his similia imitari. Omnia vero per noctem sub dio exposita dabis febrienti, exceptis his quibus alui plus quā cōuenit fluunt. **xxiii.** Pulegij pugillos tres, apij duplum, in vino diluto coquito ac exhibeto: hoc vrinam ciet, & bilem per aluum trahit.

HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS LIBER IIII.

Iano Cornario medico
physico interprete.



Ad hominis generationem de omnibus & viri & mulieris partibus semen progressum, & in vterum muliebrem illapsū condensatur, temporeque veniente natura hominis formā referens ex ipso producit. Habet autem & mulier, & vir, quatuor species humoris in corpore, à quibus morbi fiunt, qui non à violentia aliqua sunt. Sunt
z iij autē

*Membra
cū gene-
rationi cō-
ferunt.*

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

*Pituita,
sanguis,
bilis.*

autem species hæc, Pituita, Sanguis, Bilis, & Hydrops siue aqua: & de his non minima, neque debilissima, in semen procedit portio. Et quia animal secundum parentes nascitur, tot humorum species, & sanorum & morbosorum in seipso habet. Ostendam autem quæ in vnaquaque harum specierum & plura & pauciora in corpore fiunt, & à quo ægrotant. Et quod morbi in imparibus diebus indicantur. Et quæ sint morborum principia. Et qualia singula ex ipsis in corpore efficiant, ut morbum inducant. & à quo rigor febrilis fiat, & cur post ipsum febris irruit. Primum autem demonstrare volo, quomodo bilis, & sanguis, & hydrops, & pituita, copiosiora & pauciora fiant à cibis & potibus, hoc modo. Venter dum plenus est, omnium horum corpori fons est. Verum ubi vacuus est, corpore fruitur colliquefcente. Sunt autem & alij fontes quatuor, à quibus unusquisque horum humorum in corpus procedit, postquam sanè ipsi à ventriculo acceperunt: & hi quoque fontes ubi euacuantur, de corpore fruuntur. Sed & ipsum corpus attrahit, ubi ventriculus

*Quatuor
corporis
fontes.*

*Cor sanguinis fons,
caput pituitæ, lien
aque, fel
bilis.*

in seipso quid habuerit. Et sanè sanguinis fons est cor, pituitæ caput, Aquæ splen, Bili locus folliculi in hepate. hi sunt quatuor humoribus hi fontes, ventriculo excepto. Ex his autem maxime caui sunt, Caput & Splen, Nam in hoc ipso maxima amplitudo est. Verum de hoc paulo postea clarius dicam. Quin & hæc sic se habent. In omnibus cibis ac potibus & biliosi quid est, & aquosi, & sanguinei, & pituitosi: in alio plus, in alio minus. Quapropter & quæ eduntur ac bibuntur, alia aliis præstant ad sanitatem. Atque hæc mihi de

*Quo pacto
hæc corp⁹
hauriat.*

Terræ uires.

hoc dicta sunt. Postquam vero comedit aut bibit homo, corpus in seipsum humorem relatum ex ventriculo, & fontes trahunt per venas de ventriculo, similis humor similem, & corpori distribuunt. Quemadmodum etiam in plantis similis humor similem trahit de terra. Habet enim eodè modo terra omnigenas in seipsa ac innumeras facultates. Quæcunque enim in ipsa nascuntur, his omnibus exhibet humorem similem unicuique, qualem & hoc ipsum quod nascitur sibi similem, iuxta cognationem habet. & trahit unumquodque de terra alimentum, quale etiam ipsum existit. Nam & rosa de terra trahit talem humorem, qualis ipsa in potentia est: & allium de terra humorem eiusmodi trahit, quale ipsum in potentia est.

*καρὰ δὲ ἡ
γῆ ἀπὸ τοῦ
σαύρου καὶ τοῦ
καυλοῦ.*

A tia est. Et alia omnia terræ nascentia, ex terra trahunt, singula iuxta seipsa. Si enim hæc res non ita se haberet, non nascerentur plantæ similes feminibus. Cui porro plantæ in terra cognatus humor multo vberior est quàm conuenit, ea planta ægrotat. Cui vero paucior quàm opportunum est, ea resiccatur. At si ab initio non insit terræ humor, quæ planta iuxta cognationem trahat, ne germinare quidem poterit. Intelligentiam autem huius rei, quod si non habeat planta humorem secundum naturam, ne ab initio quidem germinet, inde nobis suppeditatur. Ionia enim regio & Peloponesus pro temporibus anni à sole non minime calet ac illustratur, vt sol nascentibus è terra sufficere possit, attamen fieri nõ po-

B test, multis frustra iam id tentantibus, vt in Ionia aut Peloponeso Silphium nascatur. At in Libya sua sponte nascitur. *Silphium.* Non enim est neque in Ionia, neque in Peloponeso, eiusmodi humor qui ipsum alere possit. Quum autem sint & aliæ multæ medicinz, quas sole sufficiente, regiones alere nõ possunt, aliæ vero sua sponte producant, hoc ipsum eius quod nunc dicturus sum considerandi occasionem exhibet, quantum videlicet locus alteri loco etiam valde vicinus præstet ad iucundi vini productionem, sole æqualiter sufficiente. Hic etenim in terra humor est, qui vinum suauiter exhibere potest, illic non est. Sunt etiam syluestria non pauca in loco nascentia, quæ ad orgyæ seu cubitorum quatuor spatium translata: nasci minime comperias. Non enim habet terra

C talem humorem translato, qualem illa syluestribus plantis exhibebat. Sunt enim ex ipsis quædam venenosiores, aliæ *Diuersiter* humidiores, aliæ dulciores, aliæ sicciores, aliæ asperiores, & *re humores.* innumeræ aliæ aliter se habent. Innumeræ enim sunt in ipsa terra facultates. Et propter hæc genera primum nihil alteri simile ex terra productum est, quod non esset cognatum. Et mihi sanè videntur hæc omnes plantæ syluestres fuisse, Verum homines ipsas masculerunt, fructum ferre efficientes vnâquaque iuxta suum semen. Trahit enim similis humor similem ex terra, & ex hoc augetur ac nutritur. & nullum ex terræ nascentibus alteri simile est, quod nõ æqualem, neque similem humorem ex terra trahat. Et omnia quæ nascuntur in cibi ac potus vsum venientia, multas facultates de terra ad se trahunt, & in omnibus est aliquid pituitosi

Prius syluestica oia fuerunt.

Cibus potusque quid feci habet.

ac

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

ac sanguinei. Et ex hoc adeo ad hanc demonstrationis necessitatem deueni, quod à cibis ac potibus in ventriculum procedentibus trahit corpus, secundum fontes quos nominavi, similis humor similem per venas. Referam quoque aliud argumentum, quod singula prout relatum est trahant, & simul dicam, unde pituita in corpore gignatur. Vbi quis caseum comedit, aut aliquid acre, aut aliud quid edit aut bibit, quod pituitosum est, statim ipsi ad os ac nares accurrat; atque hoc ita fieri partim omnes videmus, partim ita esse credere oportet, ex his quæ ego referam. Affero itaque, quod quantum in cibo aut potu pituitæ inest, illud ubi ad ventriculum peruenit, partim corpus ad seipsum trahit, partim caput, ut quod cauum sit, & velut cucurbita corpori incumbat, ad se trahit, utpote viscosa existente pituita, ita ut hanc alia per aliam sequatur ad caput: & quæ quidem recens ex cibo generatur pituita, in capite manet. Vetus autem, prout copiosior est recens, ab ipsa violente extruditur. Quapropter ubi quis edit aut bibit aliquid pituitosi, excreat pituitam, Habet autem & hæc res se hoc modo. Si ubi edit aut bibit quid pituitosi homo, non rursus exeat quod redundat, neque per os, neque per nares, necesse est ipsum manere in capite, aut ad corpus descendere de capite, & ad ventriculum peruenire. Ac optimum quidem fuerit, si ad ventriculum perueniat. Exire enim poterit una cum stercore, & si quidem multum fuerit ac humidum, sterqus humectare poterit. Si vero modicum, non hoc effecerit. At si in capite maneat, multum dolorem capiti exhibuerit, quum in venis est. Si vero modicum, non hoc fecerit. Significationem autem de se præbet copiosum ne sit an modicum. Quod si ad corpus deueniat, atque illic alio humori ammixtum fuerit, si quidem multa fuerit pituita, statim corpus læserit: si vero pauca, non adeo lædere poterit, quum magnum sit corpus, si non & aliud quoddam principium ipsi reliquum sit. Verum temporis progressu, si alia pituita superaccedat, lædi utiq; possit. At si corpus vesicæ ac ventriculo deleger, atque hæc foras perferant, nihil mali ex ipsa habuerit. In hoc igitur sermone demonstratum est, quomodo caput pituita ex ventriculo trahit, & simile ad simile perueniat, & simul à me dictum est, quomodo & quare copiosior pituita homini à cibis ac potibus fiat. Nunc vero dicam de bile,

Caput cucurbitulæ
instat.

Pituita qd
agat.

E

F

A bile, quomodo & cur copiosior in corpore fiat, & quomodo *Bilis.*
 locus folliculi in hepate ipsam trahat. Habet se res hoc modo. Postquam comedit & bibit homo aliquid amari, quodq; aliàs biliosum ac leue est, copiosior etiam bilis fit in hepate, & statim dolet hepar, quod pueri cor vocant, atque hoc ita fieri videmus, & clarum nobis est quòd à cibo aut potu factum est. Trahit etenim corpus in seipsum de cibis omnem prædictum humorem. Trahit etiam folliculus in hepate, quicquid isthic biliosum inest. Et si derepente multa bilis fiat, homo hepar dolet, & de ventre copiosior fit. Hoc enim contingente, procedit de veteri bile propter multitudinem ad ventriculū, & ex hoc tormen ventriculo oboritur, & pars ipsius per vesicam, pars per aluum egreditur, atq; sic minima pars in homine manet, & dolores cessant. Si vero neutrum horum contingat, procedit primum de veteri bile ad corpus, distribuitur enim ad ipsū: & si multa fuerit, statim significationē sui præbet alij humori ammixta. Si vero modica, non adeò læserit, quum magnum sit corpus, si nō & aliud quoddam principium suboritur, Verum temporis progressu, si alia bilis superaccedat copiosior, hominem utiq; læserit. Si vero non superaccedat, excolare illam poterit corpus, ut & bilis, & quæcunq; biliosa sunt prodeant. Nam quæ in cibo ac potu sumuntur, alia aliorum medicamenta sunt. Sic sanè etiam alia quæcunq; lædentia sunt medicamenta, ubi aliud ab alio in ventriculum incidit, sua ipsius potestate causam habens, id quod superatum est expellit, ac ipsum lædit. At si superaccedat alia bilis in corpore, ab his quæ in ventriculum incidunt, morbus huic oboritur. Atque in hoc sermone iam ego declaravi, quomodo bilis, & cur copiosior fiat in corpore, à cibis & potibus: & quòd trahit in seipsum folliculus in hepar, iuxta similitudinem id quod biliosum est à cibis ac potibus.

Nunc vero dicam de aqua, quomodo, & cur copiosior fiat *De aqua*
 in corpore, & quomodo splen trahat in seipsum. Affero autem *hydropis*
 rem ubi homo bibit amplius, & corpus, & splenem, aquam in *us.*
 seipsa trahere ex ventriculo. Et si plus traxerint quàm oportet, statim hominem affligi, atque hoc ita fieri intelligunt quicunque homines splenici existunt. Postquam autem traxit splen, optimum est, si vetus aqua quæ in splene inerat, ad vesicam aut vetriculum excoletur, & per hæc expellatur.

Nam

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

Nam per supernas regiones non purgatur aqua de splene, nisi quantum eius in vasis inest, quæ de liene procedunt, verum ad ventriculum & vesicam depurgatio fieri potest. Si vero hæc ad fluxionem apta non fuerint, neque aqua per ea foras excoletur, de splene ad infernas partes aqua procedit, atque isthic alij humori miscetur. Et si quidem pauca fuerint, non sanè læserit, sed de corpore ad vesicam, & ad ventriculum, per venas exolari poterit. Sunt enim multæ ex hoc tendentes deorsum, quæ ex infernis partibus à seipsas trahunt, ubi ficiiores fuerint quàm prius erant. At si alia aqua generetur, & ventriculus ac vesica foras non expellant, splen eleuatur, & inferna corporis partes dolore afficiuntur. Atque hæc à me dicta sunt, quomodo & cur aqua copiosior generetur in corpore à potu: & quomodo splen trahit. Nunc autem de sanguine dicam, quomodo & cur amplior in corpore generetur. Postquam bibit aut comedit homo aliquid quod sanguineum est, trahit quidem & totum corpus in seipsum, trahit autè & cor sanguineum ad seipsum. Et ubi plus attraxit, non oboritur cordi dolor. Est enim cor res solida ac densa, & propterea dolore non affligitur. Et ex ipso procedunt venæ crassæ iugulares appellatæ, ad quas statim si copiosius accedat, sanguineum illud distribuitur, & illæ impletæ breui ad caput & corpus delegant. Et quum ederet aut biberit homo quid sanguinei, statim venæ iugulares attolluntur, & facies rubet. Accedente vero ad cor & corpus sanguine quàm satis est vberiore, à cibis ac potibus, & ad alium humorem ammixto, si non ab ipso egressus fuerit, per aluū aut vesicā, reliquo humori ammixtus, dolorem corpori inducit. Si vero modicus accedat, non sanè læserit corpus. Verum temporis progressu distribuitur ab ipso ad ventriculum, aut ad nares, quæ ipsum foras excolant, & nulla læsio contingit. Si vero paulatim copiosior fiat, morbosus efficitur. Atque ita quomodo copiosior sanguis generetur, à me declaratum est. Quum autem sint quatuor, Sanguis, Bilis, Pituita, & Aqua, omnia hæc à me demonstrata sunt, & quomodo, & cur copiosiora fiant, à cibis ac potibus. Quod autem ex his fiant ac generentur, hoc argumento constat. Si homo parum edit, & parum bibit, nullum morbum hoc ipsi inducit. Et hæc quidem de hoc mihi dicta sunt. Attigi etiā obiter ostendere intelligenti, quomodo hæc pauciora fiant. Verum de

*Splen tursus
gens quid
agat.*

*Cor cur non
laboret.
Venæ iugulares.*

E

E

- A**rum de hoc paulo post melius tractabo. Cæterum fontes hi quatuor quos nominaui, quum pleni fuerint, semper corpori distribuunt: quum vero vacui, vice versa trahunt ab ipso. Sic etiã ventriculus facit. Et habet se res hoc modo, veluti si quis tria aut plura ænea vasa in planissimo loco componat, & coaptata quàm optime disponat, fistulis ad foramina insertis, atque ita placide in vnum vas aquam infundat, donec omnia ab aqua fuerint expleta. Ab vno enim diffluet in reliqua vasa, donec etiam alia fuerint expleta. Postquam autè plena facta fuerint vasa, si quis de vno aquam effundat, retribuet se retro fluens aqua ad vnum vas, & vacua fient reliqua vasa rursus, quemadmodum etiam susceperunt. Sic sanè & in corpore res se habet. Postquam enim cibi ac potus in ventriculū inciderint, fruitur corpus de ventre, & vnà cum fontibus impletur. Vbi vero alius vacuatur, rursus retro humor ab ipso redditur, quemadmodum susceperat, veluti ex aliis ad vnum vasculum. Venæ enim sunt per totum corpus tendentes, aliæ tenuiores, aliæ crassiores, multæ ac frequentes. Hæ autem donec viuit homo apertæ sunt, & suscipiunt & dimittūt nouum humorem. Vbi vero mortuus fuerit, clauduntur & extenuantur. Quandiu igitur viuit homo, fruitur corpus de vetriculo, vbi quid in seipso habuerit: fruuntur etiam fontes, & impleti corpori distribuunt. Si enim corpus non traheret de ventriculi humore, sed soli fontes, & hi ad corpus distribuere, nō sanè haberet corpus sufficiens alimentum, sed paucius. Non enim amplius haberent alimentum fontes, quod corpori subministrarent. At vero si fontes isti non essent, dum edimus ac bibimus, verè nō cognosceremus, neque quid iucundum, neque quid iniucundum esset, propter hanc quam referam necessitatem. Hi loci quum minores sint, & intra reliquum corpus, semper etiam antea quàm attrahat vnusquisq; iuxta suā facultatem, reliquo corpori denūciat de cibis ac potibus, qui biliosus sit, & qui pituitosus, & qui sanguineus, & qui aquosus. Quicquid enim horum humorum plus quàm opportunū est, in cibis ac potibus nobis obuenerit, neque cibos illos iucundos facit. Quæ vero maxime appetimus, pro eorum ratione etiã illi iucundi sunt. Si vero cibis ac potibus opus habuerit fons quidam, pro hac ratione etiam corpus trahet ab ipsi fontibus, donec humor paucior quàm oportet fiat, & tunc sanè appetit;

Fontes corpori subministrant, non soli.

Quo pacto sua quisque trahat.

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

nè appetit homo aut edere, aut bibere tale quid, quod portionem illam expleat, ac reliquis adæquet. Et propterea ubi **D**
Cur cum multū sum psumus pl^o appetim^o. multum cibi sumpimus aut bibimus, quandoq; adhuc cibum aut potum appetimus, & nihil aliud libenter edimus, quàm quod appetimus. Postquam autem comedimus, & adæquatus fuerit humor, his perfectis & in fontibus, & in corpore, tunc cessat appetentia. Atque hæc de hoc à me dicta sunt. Quin & hoc se ita habet, quòd ad folliculum in hepate, sola bilis à cibis ac potibus secernitur. Venulæ enim quum debiles & tenues sunt, alium humorem trahere non possunt, qui grauior & crassior existit: & simul nō est ea loci capacitas, vt alius humor in hoc folliculo consistat: & est hic locus maxime familiaris bili secundum naturam, & ob id in ipso nullus alius fit morbus, quàm is quem homines Cardiogmū, hoc est cordis morsum vocant. At Caput, & Cor, & Splen, de omnibus humoribus participant. Vnumquodque tamen si non ægrotet, plurimum de relatis participat, iuxta suam ipsius naturam, ca
Caput pituitæ loc^o, cor sanguinis lien aque. put pituita, cor sanguine, splen aqua. Trahunt autem & de alio humore venæ in seipsas, amplæ & crassæ, & instar pampini retortæ existentes, ita vt vbi trahant, alius humor alium sequatur. Et cordi quidem propinquant venæ iugulares crassæ, ad quas cito distribuitur, vbi illi amplior quàm cōmodus est humor accedat. Hæ vero ad reliquum corpus delegant: & simul ipsum cor solidū est ac densum, vt ab humore non ægrotet, & propterea nullus morbus in corde oboritur. Caput autem & splen maxime sunt morbis obnoxia. Aegrotant enim **F**
Venæ iugulares. & ab his quæ à natura insunt, quum plura q̃ opportunum est acceperint, Aegrotāt item ab aliis humoribus. Venæ enim in ipsis crassæ ac multæ sunt, & ipsa quoque venosa sunt ac caua, vt & aliis humorib^o recipiēdis capacitas in ipsis sit, paulatim nimirum accedentibus, & ad eum humorem qui à natura inest, se ammiscentibus. Quemadmodū in vase magno amplior capacitas est quàm in paruo. Sic sanè & in capite, aut in splene, res se habet. Magna enim capacitas maxime in ipsis est. Si vero repletæ fuerint isthic humore venæ, ab ipso sanè in illis morbus oboritur. Atque hæc mihi de hoc nunc dicta sunt.
Quo pacto humores in corpore minuuntur. Volo autem melius declarare, quomodo vnusquisque horum humorum in corpore paucior fiat. Quatuor equidem humores esse demonstraui hominē ludentes. Quatuor item ipsorū fontes.

fontes. Quatuor quoque esse dico locos, per quos homo de singulis his expurgatur. Sunt autem hi, os, nares, podex, vrinae meatus. Et ubi humor aliquis affligens copiosior factus fuerit, si his locis homo depurgetur, nullas ipsum morbus ab illo premit. Et si ventriculus plenus fuerit, liquefcete corpore ab humore, defluit ad ipsam, & extra prodit per aliquem horum locorum, & propterea humor paucior fit in corpore. Corpus enim velut & antea dixi, ventriculo retribuit, ubi vacuus fuerit: & fruitur de ipso, ubi plenus existit. Atque hæc à me dicta sunt, quomodo & cur pauciores fiant humores hominem affligentes. Quomodo vero & cur homo sanus degat, referami.

Postquam comedit ac bibit, & humor ad corpus peruenit, eo quo dictum est modo, ammixtus alij, tum ei qui in corpore, tum ei qui in fonte est, ea quidē die qua accesserit, in corpore manet. postridie vero alius humor ad ipsum accedit. Atq; hi quidem duo sunt dies, duo vero in corpore humores. Et alteri quidem humori duo dies sunt, alteri vnus. Et qui quidē postridie accessit, manet in corpore, vt qui sit crassus. Alter autē coctus à caliditate diffunditur, & tenuis fiens, postera die ad ventriculum accedit, & per omne tempus à recti expellitur. Vbi vero ad ventriculum peruenit, cibos in hoc loco coquit, & de se sanguinem in corpore facit. Si vero permanferit, tempore graueolens fit. Tertia vero die vnā cum stercore, & vrina exit, copia ipse sibi ipsi æqualis, & consimilis, & æquilibris; etiam si sui ipsius pars quædam sit, quo humor maneat in corpore iuxta relatum rationem. Influit autem & tertia die humor de corpore ad vētriculum amplior & graueolentior, qui videlicet reliquus fuit à secundo, & defert cibos concoctos, & quicquid est in corpore morbosum, & rursus simul exit. Indicium est autem vrina quæ sanguinosa est, quod cibi defuerunt de corpore etiam id quod morbosum est. Et cibi quidē semper postridie per aluum secedunt, humor autem ad tertiam diem. Hoc modo sanitas contingere solet. Atq; hæc dicta sunt, quomodo, & cur homines sani degunt. At vero humor hic si particulatim foras prodiret postridie, cibi nō similiter ex ventriculo graueolentes facti foras prodirent, sed veluti cocti: & vrina potui similis, & corp⁹ semper euacuaretur, & per omne tempus homo, ubi ventrem exonerasset ac minxisset, opus haberet statim potu ac cibo, pro egestionis factæ copia,

Quatuor locis corp⁹ purgatur.

Sanitas qui continet.

Tertio quoque die quæ sumuntur producantur.

Quid esset si statim os letaretur.

HIPPOCRATIS LIBER IIIII.

copia, si modo validus esse deberet, quum humor sufficiens **D**
 in corpore non relinquatur, sed vnà cum stercore foras pro-
 deat postridie, aut eadem die. Et si quidem comedisset, be-
 ne esset. Sin minus, & euacuatus debilis esset, neque humor
 crassus fieri posset, vt postridie foras prodiret. Non enim suf-
 ficiens in corpore, relinquitur. Nunc vero aluum exoneran-
 tes probe valemus, & si per biduum nihil cibi acceperimus, &
Duos dies sine cibo quis daret viuere, & facere quid possumus, & non penitus debilitamur
 ex euacuatione in hoc tempore. Humor enim in corpore ma-
 nens, robur exhibet. Atque hæc à me dicta sunt, quomodo &
 cur fieri non possit, vt humor qui corpori accessit, foras egre-
 diatur eadem die, immo neque postridie. Id porro assero, si
Triduo excant cibaria oportet. humor pluribus quàm tribus diebus in corpore permaneat, **E**
 aut alius multus implens accedat, venis calescentibus ac stan-
 tibus, maius malum, aut minus, homini significationem de se
 præbere: hyeme quidem minus, & posterus: æstate vero ma-
 ius, ac prius. Atque hæc à me dicta sunt, de eo quod fieri so-
 let, si humor in corpore maneat. At vero si corpus cibos ea-
Si cibaria statim exirent quid eveniret. dem die egereret, non sufficienter humore vti posset, sed es-
 sent homines tenues ac debiles. Nunc vero quum maneant
 cibi ac potus, quamdiu permanent, corpus fruitur sensim de
 ventriculo trahens, & impletur. Hæc dixi & quomodo, & cur
*Quid cibaria retenta diutius fa-
ciant.* cibi non possint eadē die exire. Si vero cibi maneant in ven-
 triculo, ampliore tempore quàm opportunum est, & alij ad ip-
 sos incidant, corpus utique repleatur: & dum premuntur à
 plenitudine venæ, calor ac dolor corpori accesserint, æstate
 quidē citius, hyeme vero posterius. Aestate enim calidus est **F**
 aer ambiens, & calidiorem corpus in seipsum trahit. Et si ca-
 lido adhuc existente ventriculo, calidior quàm opportunus
 est spiritus homini accedat, nihil miri est hominem ex tali fe-
 brile. hyeme vero quum frigidū spiritum trahat in seipsum.
 multo magis poterit corpus repletionem ferre, homine mo-
 dice ventrem exoneratē. Et hæc à me dicta sunt de eo quod
 fieri solet, si cibi ampliore tempore in ventriculo maneāt. Et
 attigi quoque obiter vt declararim omnem humoris ac cibi.
 & longioris & brevioris temporis differentiam, cur homines
 ægrotent. Verum de hoc melius tractabo temporis progres-
 su. Reuertor rursus retro de sanitate dicturus, quod sanē cor-
 pus hominis humore de cibis ac potibus fruitur, & prodeunt
 foras

- A foras in sano, tum cibi, tum humor, iuxta relatam rationem. Et si quidē foras prodeat plus humoris, quā de cibis ac potibus accessit, homo attenuatur. Prodit autē foris plus quā accessit ob hanc causam. Si in quiete degat homo, & non laboret, mali aliquid ipsi in corpore inest. Verum prae alia sanitate quae multa est, non laedit valde. Malum vero illud huiusmodi est. Postquam aliquid ex his quatuor corpori accedentibus, aduenerit copiosius, non ita multo, corpus calefcit sensim, vt non valde laetatur: & liquefcit in ventriculo, & cibum homini iniucundum facit. Si vero humor alius alio copiosior fuerit, febris ex hoc homini oboritur. Verum de hoc exactius paulo post tradam. Quandoq; etiam vbi cibus iucundus est, homo attenuatur. Causa vero eadem est. His autē sentibus, plus humoris extra prodit, quā succēturatur. Et propterea in quiete degenti contingit vt attenuetur. At vero laborantibus hominibus itidem corpus coalescit. Et hoc à labore calefcēte, tum humor in ipso diffunditur, tum attenuationis morbus oboritur. Quum autem inutilis fiat humor, & ad ventriculum, & ad vesicam defluit, haec autem foras expellunt. Pars vero ipsius extra exhalat, per internam corporis raritatem. Pars autem quae adhuc intus manet, sudor fit, & per corpus foras procedit. Eodem modo & exercitationes iuuenum idem efficiunt quod labor. Si vero etiam non paucior fuerit humor eo qui prius exiuit, accedatque insuper alius à cibis ac potibus, attenuatur propterea homo. Paucior autem C accedit, si non aliud quid edere poterit, & si neq; laboret pro prioris laboris aut exercitationis ratione, alij aliis pauciores fiunt. Ceterum bonus corporis habitus accedit ex esu, hac de causa. Postquam reficcatus est tempore humor, & in prior labore prius egressus est alius alio copiosior, & vnus alius alios valde superauit, homo repletus fit. Et si quidem à multis valde superetur, febris ex hoc modo oboritur. Si vero à paucis, parum superatur. Sed & corpus hoc modo sufferre ac renalefcere potest, humiditate enim vberiore in ipso existente, calorem exoluat. Calefcit enim corpus à febre, & si quidē modicum fuerit id quod affligit, tertia die eodem modo dimittit, per duas autē continue tenet. Si vero copiosius, quinta die: per quatuor vero tenet pro ratione. Atque hoc modo Morborū decreta. morbi per dies iudicatur. At si dimiserit febris in imparibus diebus,

*Macies
unde.*

*Quid exer
citatio pos
sit.*

*Morbosū
decreta.*

HIPPOCRATIS LIBER III.

*Cur dieb⁹
nō parib⁹
hæc fiant.*

diebus, & sanus homo fit, & moritur. Qua de causa, paulo post dicam. Nunc autem referam cur febris dimittat. Sic autē sentio, Quæcumque febris de corpore hominem corripuerit, necesse est tertia die humorem affligentem exire de corpore, aut in alio copiam impari die, iuxta rationem antea relata. Non enim exit prius quàm alius bonus de ventriculo ipsi accedat. Nam intermedia & postera die corpus trahit de ventriculo, quicquid ipsi in seipso dimiserit priore die, nisi ventriculus id expulerit, & alium humorem habuerit, quod sanè malum homini esset. Si vero dimiserit febris tertia die, eodem modo dimittit quo etiam eadē die, velut dictum est. Atque ita quidem contingit, ut febris de corpore fiens, tertia die remittat. Dico autem, etiam si quinta die, aut septima, aut nona dimittat, eodem modo dimittere, quemadmodum & tertia exiit. Etenim alimentum febri contingit, secundum locos quos paulo antea dixi. Vbi enim humor copiosior prævaluerit, homo liberatur à febre. Dimittit autē febris in diebus imparibus ea de causa. Quod videlicet in paribus diebus trahit corpus de ventriculo: in imparibus vero dimittit, Ventriculus autem extra propellit in homine sano, iuxta huiusmodi necessitatem morbi in imparibus diebus iudicatur. Atque hac quidem ratione homo febricitans sanus euadit. Assero autem & quod doleant maxime homines ægroti in imparibus diebus, propter hoc & secundum rationem fieri. Conturbatur equidem homo quum febricitat. Cuius rei signum est, quod horror aliàs atque aliàs per corpus transcurrit, Hoc vero non sanè ita cōtingeret, si non cōturbaretur humor, & de ipso aut plus, aut minus secerneretur, & alius alium superaret. Conturbatur autem maxime in imparibus diebus quum ægrotat. Sed & horror maxime tunc fit. Habet enim se res hoc modo. De humore affligente expellitur aliquid ex corpore, à recentissimo humore superatum, & procedit ad alium infernam, & alius ipsa vna cum affligente calefcit, suscipiens in seipsam magis quàm priore tempore. Hoc autem maxime fit in morbi iudicatione. Et si paulatim corpus ad alium dimiserit, & non multum fuerit id quod hominem affligit, & alius, & corpus, calorem sufferre in iudicatione potest, & homo sanus euadit, ubi humor affligens egressus fuerit, & is qui febri alimentum præbuit consumptus, & sanus prævaluerit.

*Salutis
mortisq;
caussa.*

A luerit. Atque hac ratione propter relatas à me causas, homo ægrotus sanus euasit. Nunc vero referam cur moriantur homines in imparibus diebus. Sic autem sentio. Si multum fuerit id quod affligit in corpore, magis quàm opportunum est, & acruatim robustum, turbatur ad ventriculū, & quum non possit calorem sufferre corpus, eo fruitur, & graueolentiam circa spiritum fieri necesse est, & quum nequeat corpus præ debilitate, nimirum omni humore morbofo existente, spiritū trahere, quo ea quæ in ventriculo sunt refrigerentur, quicquid est humoris vitalis id foras exhalat, atque ita homo moritur. Nō enim superat alius humor, sed totus à morbofo qui multus est eleuatus, ac consumptus à febre exhalauit ac perspirauit. Atque hoc modo in imparibus diebus maxime dolor affligit. Neque est quisquam cui hoc non sit notum. At vero quòd humor turberetur in iisdē diebus, hoc signū est. Qui-

B cunque iam à febre continua correpti, pharmaco vñ sunt in diebus paribus, hi nimium purgati nunquam sunt. Qui vero in diebus imparibus medicamento forti vñ sunt, nimium purgati sunt. Multi vero etiam perierunt nimium purgati. Proinde priores Medici in hoc maxime peccarunt. Medicamenta enim exhibuerunt in diebus imparibus, & homines peremerunt, non scientes quòd hæc res se ita habet. Humor enim in corpore ægroti magis turbatur in imparibus diebus, nimirum corpore humorem ad ventriculum transmittente. Et si quis iam turbatum, adhuc magis perturbet medicamento immisso, nihil miri est ex talibus hominē perire. Quin & vlcera

C si curentur, maxime in his diebus inflammantur. Venit enim humor ad omnes venas quum turbatur, easque replet. Et vbi ad vlcus peruenit, si quidem non curetur, & pus exitum habeat, expellitur ab humore qui in turbatiōe accessit, & vlcus foras expurgatur. Si vero curetur, pus exitum non habens, & isthic vnā cum eo qui accessit permanens, dolorem inducit, & carnem circa vlcus attollit: & ex illo si quidem in cruribus habuerit vlcus, attolluntur venæ quæ in iuncturis crurū existunt. Si vero in manibus, quæ in manuum iuncturi sunt, & ex hoc glandularum tumores sunt. Quibuscunque vero hominibus febris incidit, si nihil aliud male habeat homo, à pinguiore quàm oportet existente humore incidit. & venæ impleta: dolorem ac calorem vlceri inducunt. Hoc autem cale-

*Disparib⁹
diebus om
nia lāguē
tiū disce
runtur.*

*Cur febris
nulla de
causa fiat.*

A ij factum,

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

factum, etiam reliquum corpus calefacit. Atque hoc modo caliditas ad ulcera peruenit. Calefit enim corpus, & ulcera, ab humoris commotione. Et labor talia efficit. Liberantur autem ulcera ab inflammatione quinta die, & iuxta horum dierum rationem, prout etiam ulcera fuerint magna, & tertia, & quinta, & septima, & nona, & undecima. Deinde absoluto primo circuitu, rursus secundi principium tertia sequens hinc est, quæ à prima, decimaquarta est. Maxima vero ulcera decimaquarta die ab inflammatione liberantur. Atque hæc ratio docet morbos in imparibus diebus iudicari, & humorem in sano homine tertia die exire, stercus autem secunda. Et hæc tertia die contingentia mutuū inter se testimonium præbet, quod res se ita habeat. Atque ita mihi hic sermo vniuersus ad summum perductus est. Nunc vero exactius referre volo, cur homines ægrotent, simulque cum hoc sermone dicā quæ sint principia morborum, & qualia vnumquodque ipsorum efficiat. Sic autem assero. Si cibi plures quam opportunū est, qui iam concocti sunt, intus maneant, & homo non purgetur, & alij cibi superingerantur, corpus ab humore priore ac recenti repletum calefit, & febris ex hoc homini oboritur. Verum febris hoc modo fiens, non periculosa, neque fortis est, in qua humor æqualis est, copia paululū vberiore nos affligens. Si enim hoc ita se habuerit, & quis admodum validus sit, & quæ commoda sunt adhibuerit, sanus euadit. Vnus autem morbus solus est ex omni humore, & septem signa habet. Nam & tussis ipsum habet, quæ & debilis, & sicca est: & venter durus fit, utpote & stercore intus contento: caput grauatur: & vomit: & febris: & vrina non probe prodit. Hæc septem signa huius morbi sunt ex omni humore fiensis. Si vero alui egestionem non prodeunte, vnus ex aliis humoribus superet, melius deget homo. Et si quis febre fiense ab omni humore, non adhibeat idonea, inualescet morbus quantum ipse humores superauerit, hoc modo. Calefcente sanguine exhalat maxime per hunc humor aquosus, qui febri est infestissimus. Relinquitur autem pinguis ac leuis, qui est biliosus, & febri maxime nutrimentum est. Exhalat autem hoc modo, Velut si quis aquam & oleum in vas æneum infundat, & ligna multa subiecta ad multum tempus exurat. Aqua enim multo paucior erit, ex vase enim exhalabit: oleum autem paululum immi-

nuctur.

Labor qd faciat.

Diffaria omnia de-erectoria.

Morborū causse.

Signa septem mali-utius.

Si nile.

A auetur. Nam aqua præ raritate ab igne attenuari potest, & levis reddita exhalare. Oleum vero utpote quod est coniunctum ac densum, attenuari non potest, neque similiter ut aqua exhalare. Sic sanè & in homine se res habet. Aqua enim calefacte corpore foras exhalat: Biliosus autem humor, ut qui coniunctus est ac densus, non similiter attenuatus exhalare potest. Verum attenuatus hic biliosus humor, corpus magis calere facit. Copiosius enim & melius alimentum febri bilis suppeditat, & prorumpens aut firmata in corpore, morbum supra priora corroborat. Atque hæc quidem dicta sunt de eo quod afficitur homo, si non purgetur & curetur. Si vero non ipsa copia prævaluerit, siue semel multa fiens, siue paulatim colligatur, reliquum corpus dum hoc fit, præ robore sufferre potest, donec principium aliquod superaccedat. Atque hoc sanè modo morbus fit, si homo à copiosiore fiente humore non expurgetur. Principia ex quibus fiunt morbi tria sunt. Et unum quidem iam à me relatū est, qualia & quod afficiat in corpore. demonstraui enim quomodo & cur ægrotet homo, si non purgetur. Alterum est, si contingat ut ea quæ ex cælo obueniunt, inepta & præter victus rationem sint. Tertium est, si violentum quid accidat, Violentum autem esse dico, & casum, & vulnus, & plagam, & laborem, & si quid aliud est huiusmodi. Horum vero principiorum maximum est Violentia si magna fuerit: si vero parua, non ita maximum. Secundum est, si non purgetur homo. Tertium, si quæ ex cælo obueniunt inepta fuerint ad sanitatem. Proinde diligenter ab his se custodire oportet. Singula vero talia in corpore faciunt, qualia ego dicturus sum. Equidem si vulnus fiat, manifestum est quod caro dissecta est, & vlcus factum est, hoc autem morbum esse dico. Si vero contusio fiat, homine percusso, aut lapso, aut aliud quid tale perpeffo, & tumor oboriatur, sanguis statim præ violentia calefactus, & venis hiatis illapsus, non habet exitum præ copia, quod abire possit, conglobatur: & propterea tumor fit, & tamdiu adest, donec depurgatus fuerit, eo modo quo de locis depurgari dictum est, aut etiam per ipsum tumorem, & siue per chirurgiam, siue sine ea, sanguini transitus fiat, aut per tempus suppurato, aut non. Sed & labor tale quid efficit. Quia enim homines laborarint, quibus sanè maxime sanguinis afflicto contigerit, illic firmatur ac calefcit, & ex hoc dolor

Tria morborū principia.

Tumoris causa.

Labor quæ faciat

A iij oboritur.

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

*Cælestis
uis quid fa-
ciat.*

*Scytharū
butyrum.*

Hippocr.

*Qui humo-
res febrē
creant.*

oboritur. Si vero hæc quidem superarit homo, verum multa copia labor accedat, & alius ac vesica non breui copiam expulerint, febris sanè ex hoc irruerit. Et si quidem prior humor æqualis fuerit, nequaquam. Si vero in labore ipsorum plurimus in corpore permaneat, superat ille. Atque hæc à me dicta sunt de violentia, qualia in corpore efficit. Et hæc quidem duo sunt principia, Violentia, & plenitudo, quæ si non purgètur homines, corpora calefaciunt. At vero quod ex cælo obuenit principium, si ineptum fiat in homine, superat aliquid humoris, & velut ad morbum calefacit & frigefacit prius, si fieri contingat. Dicam autem prius de eo, quod calefacit. Sic igitur sentio. Si in eodem homine fuerit aliquid morboſi, quale in priori dixi, & ea quæ ex cælo obueniunt incommoda fuerint, & caleſcat homo, turbatur humor omnis in corpore caleſcens. Hoc autem violentia facit. Et si quidem depurgetur homo, humore illo turbato, ſecernitur quantum eius plus quàm commodum eſt redundarit. Et habet hæc res ſimilitudinem ad id quod Scytharū faciunt ex equino lacte. Lac enim in caua vaſa lignea inſuſum concutiunt. Illud autem dum turbatur, ſpumefcit ac ſecernitur, & pingue quidem, quod Butyrum vocant, quum leue ſit, in ſuperficie conſiſtit: graue vero & craſſum, deorſum ſidit, quod etiam ſecretum ſiccant. Vbi vero concretum ac ſiccatum fuerit, Hippacem ipſum vocant. At ſerum lactis medium locum tenet. Sic etiam in homine, dum turbatur humor, quicquid eius eſt in corpore, à principiis quæ dixi diſparatur. Et in ſuperficie quidem bilis conſiſtit. Leuiſſima enim exiſtit. Secundo loco ſanguis. Tercio pituita. Grauiſſimus autem horum humorum eſt aqua. His vero ita ſe habentibus, quiſquis ex his in morbo plurimus fuerit, in principio ſiente turbatione, deuenit ad locum, ubi plurimus eſſe poſſit. Verum in turbatione, ſpacioſa capacitate ſiente, ſecretus diſtrahitur, & calefacit corpus. Aut aliqua corporis parte firmatus, vnà cum alio humore, cum quo eſt in alio loco, dolorem ac calorem exhibet. Qui vero calefactus eſt locus, inſuper etiam reliquum corpus concalefacit, & ex hoc febris oboritur. Et oboritur magis à bile, & pituita, & ſanguine, calidiſſimi enim hi humores exiſtunt. Et ſi quiſ horum in

- A**rum in aliqua corporis parte firmatus fuerit, ut plurimum morbus illinc nominatur, & cognomen habet. Ceterum ab aqua non valde fortis febris oboritur, neque diuturna. Nam igni non bonum alimentum aqua præbet. Atque hæc quidem de hoc dicta sunt. At vero ante turbationem, non habet multus humor quo procedat, sed sursum ac deorsum voluitur & distrahitur alij humori permixtus. Omnia enim plena existunt. In turbatione vero euacuatur. Verum aliud alio magis euacuatur. Et multus humor suum locum occupat, & alienus alij non ammiscetur, si firmatus fuerit priusquam ille viribus adæquetur. Potest autem ipsi adæquare is qui ab ipso postea ad morbum superaccescit, donec purgatus fuerit locus qualicunque purgatione. Si vero multus fuerit affligens humor, fruitor: & consumitur ad morbum etiam alius qui prius salubris erat. Et tali modo homo moritur, fruitor autem, si morbus non amplius sufficiens alimentum habuerit, & consumitur ab humore qui in loco dolente existit. primum enim propinquum assumit, deinde longius depascitur, donec consumptum fuerit, & non amplius inest in corpore alimentum. Alimentum autem est homini humor levis. Quemadmodum igitur ut certum est, putrefactio primum paulatim fit, si maxime calefiat: Postea ubi isthic alimentum putrefactioni non amplius sufficit, depascitur de sano, initio sumpto à proximo, ad totum corpus, donec totum quicquid carnosum est putrefecerit, postquam vero in totum depasta est, alimentum putredini consumitur. Sic sanè etiam in morbo. Sumpto enim à loco illo initio, ubi isthic alimentum sufficiens non amplius inest, depascitur ulterius, à proximo initio facto. Postquam enim per totum grassatus fuerit, alimentum morbo consumitur, & alius salubris humor non superat. Et si hoc fiat, homo moritur. Quin & in turbatione, ubi hic salubris humor ampliore locum occupavit, & non firmatus fuerit, sed voluatur ac distrahatur, non amplius alij miscetur, sed ad morbum consumitur, si non depurgetur. Deinde venæ superimplentur. Valde autem impletæ, nihil ex seipsis remittunt, priusquam spaciofa capacitas ipsis cõtingat. Quemadmodum ubi quis vehementer percussus est, sanguis sub plagam subtercurrit, nimirum venis à plaga euacuatis. Postquam autem carnes veluti spongia fuerint repletæ, non amplius remittunt,

*Hydrops
febrē leuē
& non longam facit.*

*Qui æquetur
superuenientia.*

*Mortis
caussa.*

Simile.

HIPPOCRATIS IBER III.

sed continent in seipsis, donec in loco aliquid ab ipsis eua-
 cuatum fuerit. Quum enim collectus fuerit sanguis, præ co-
 pia viam intercipit. Quemadmodum si quis vas olearium co-
 riaceum angusti oris oleo impletum, in osculum vertat è di-
 recto, & si hoc fecerit, oleum ex ipso prodire non poterit.
 viam enim ipsum oleum intercipit, utpote multum & aceri-
 natum incumbens. Si vero quis ipsum vas inclinet, libera e-
 rit via osculi intercepta, qua effluet oleum ex ipso. Idem fe-
 cerit etiam aqua in mensa. Ita sanè etiam ubi multus humor
 in corpore, præ turbatione locum occupavit, & venas imple-
 uerit, non amplius ab ipsis discedit, priusquam ubi locus va-
 cuus est, alimento à morbo consumpto. Atque hæc à me di-
 cta sunt de hoc, si in corpore quid fuerit unde morbi gignā-
 tur, redundantibus etiam aliis: & quemodo principia effi-
 ciant colorem & turbationem humorum deducētia ad mor-
 bum. Nunc vero dicam quæ efficiant ea quæ ex cælo no-
 bis obueniunt, si ad ea quæ in corpore generata sunt inepta
 fiant, & quum humorem in corpore superarint. Affero au-
 tem partem humoris in homine, ubi liquatus fuerit, conglu-
 bari ac spissari, donec morbum pepererit: partem vero di-
 latari, ac secerni. Habet autem & hæc affectio similitudinē
 ad lac. Si quis enim succum in lac immittat, frigiditas in ip-
 so oborta, lac inspissat & conglobat. At circum inspissatum,
 serum est. Sic etiam in homine humor, frigiditate in morbo
 oborta, cōglobatur & inspissatur. Circum ipsum vero aquo-
 sum humorem, adhuc etiam alius humor, quanto copiosior
 fuerit in alio corpore, ammixtus est. At si quidem ad aluum
 deuenerit, sterco conturbat, & tormen in aluo inducit, &
 foras pertransit, nullo magno damno illato. Si vero non ad
 aluum deuenerit, firmabit se aliqua corporis parte, ubi ipsi
 plurima capacitas erit. Volutatur itaque exquirens sibi ipsi
 loci capacitatem. Et quod quidem aquosi humoris de con-
 globatione secretum est, utpote frigidissimum ac grauissimū
 in corpore existens, ad infernas partes descendit, & circum
 ossa ac nervos volutatum, adhuc magis corpus ad inflamma-
 tionem perducit, & clarum est quòd circa nervos, & præser-
 tim circa ossa, aquosus humor, qui humorem facit, existit.
 Circa osseas enim corporis partes, homo maxime tiget, &
 capilli erecti stant, contorta cuticula, ac sicciorē fiente quàm
 priori

Hydrops.

*Horroris
caussa.*

A priori tempore : Nimirum aquoso humore isthic deficiente, & circa essa obuoluto . Atque hinc sanè solus ille locus vbi primo tempore erat, humorem facere non potest , vnde etiã rigor oboritur. At vero reliqu' humor qui æqualissime crassus est, partim quidem in toto corpore est , partim vero quantum abundauerit, si quidem aluus plena non fuerit , & quod affligit modicum sit: quandoque ad aluum deuenit , & nulum magnum damnum inducit . & aliquando quidem febrè non inducit, aliquando vero debilem & innoxiam . & quod affligit vna cum stercore exit . Si vero aluus plena multum quod affligit habeat, periculum est ex ipso morbum aliquem fieri, si alicubi se firmet id quod affligit , aut ad latus , aut ad

*Veter ple
nus uel ua
cuus quid
faciat.*

B viscus, aut alicubi aliam partem concalefaciat , quo primum illum humorem simul turbet . Qui vero non valde ex calore ab aquoso humore victi sunt, utpote qui circa ossa , & prope medullam consistit: hos progressu temporis magis lædet, primum quidem in illum ipsum locum , deinde ipsi propinquum, & semper ulterius depascitur, & aluus ipsum assumit , ut quæ calida sit, & postea tum aluus, tum lædens humor, adhuc magis calefacit . At humor crassius calescens primum diffunditur, is qui propinquus affligenti existit. diffusus autem aquoso humori affligenti miscetur deinde in concussione corporis inanior redditur . & tam diu rigor tenet , quandiu aquosus humor alij humori ammixtus est. Quin & febris hoc modo generata oboritur. Affligentia ad locum firmata, cale-

C scens corpus febrem in se suscipere cogunt: & ab affligente, & ab aluo calefactum, reliquum aquosum humorem superat. Atque sic febris fit post frigus , si qua corporis parte copiosior humor formatus fuerit. Si vero voluatur ac distrahatur, tali modo febris oboritur. Post frigus febris volutatur, maxime affligens circa aluum & supernam, & infernam. Isthic enim plurima loci capacitas existit . Dum autem volutatur, primum propinqua calescunt, & viscera, & quæ in aluo sunt. Postea etiam alius humor diffusus calore fruitur , & aquoso humori miscetur. Atque febris post rigorem hic fit, vbi affligens volutatur , imò etiam vbi firmatum fuerit reliqua corporis parte. Et hæc à me dicta sunt, quomodo, & quando, rigor morbosus fiat, & quomodo, & ex quali necessitate febris post ipsum irruat . Et quæ sint principia morborum , & qualem

*Qui post
frigus fe
bris fiat.*

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

lem vnumquodque ipsorum morbum in corpore inducat. D
& quomodo & cur in diebus imparibus morbi iudicantur.
Et vnde homines sani sint, & vnde ægrotent, & quomodo bi
lis, & pituita, copiosior & paucior fiat. Itemq; alia multa quæ
in ipsa natura humana sunt demonstraui, quæ sanè hic ser
mo exigebat. Atque hæc ita relata finem habent. Nunc
*Lumbrici qui creen
tur.* autem de lumbricis latis dicam. Affero enim ipsos in puero
dum adhuc in utero est nasci. Postquam enim semel ex ute
ro egressus est, non tanto tempore sterco in aluo manet, vt
ex eius diuturnitate ac putrefactione, tantæ magnitudinis
animal generari possit. Excernit enim semper hesternum
sterco per omnes dies, si sanus homo esse debet. Tale ve
ro animal nasci non possit, etiamsi multis diebus homo ster
cus non egeret. Multa enim nascuntur dum puer in ute
ro est hoc modo, Vbi ex lacte & sanguine computrescente
ac redundante, vtpote quod dulce est, pus factum fuerit fer
uidum, animal isthic generatur. Nascuntur autem & rotū
di lumbrici isthic eodem modo. Signum vero quod hæc res
ita se habet, hoc est. Postquam in lucem editi sunt pueri,
mulieres ipsis in cibo offerunt medicamenta, quo sterco ex
intestino exeat, & non comburatur, & simul vt intestinum
dilatetur. Vbi vero cibum obtulerunt, multi sanè pueri &
rotundos & latos lumbricos vnâ cum primo stercore excer
nunt. Si vero non excreuerint, sunt etiam insuperque na
scuntur in ventribus. Et rotundi quidem pariunt, lati ve
ro non amplius, etiamsi quidam ipsos parere dicant. Nam
*Lumbrici nō
gignunt.* homo qui latum lumbricum habet, velut cucumeris semen
excernit alias atque alias, vnâ cum stercore ipso, & sunt ho
mines qui hoc lumbrici partus esse dicunt. Mihi vero non
recte dicere videntur qui talia dicunt. Neque enim ab vno
animali tot pulli generari possunt: neque ea est loci in in
testino capacitas, vt partus educare queant. Augescit
autem puero, augetur etiam lumbricus in intestino, ab his
quæ in ventriculum ingesta sunt, & æqualis fit intestino, qui
busdam in pubertate, quibusdam posterius, quibusdam paulo
prius. Et postquam intestino adæquat⁹ est, similiter augetur,
& quanto maior factus fuerit, vnâ cum stercore excernitur
de intestino recto, & excidit velut cucumeris semen, sepe
vero etiam maior. Quibusdam vero iter facientibus, aut la
borantibus,

- A** borantibus, & ventriculo calefcente, deorsum descendit, ipsisque prominet ex podice inflatus, hocque facit, & de podice refecatur, aut retrocedit. Signa vero quod non pariat, sed ita habeat velut ego dico, hæc sunt. Si quis curet hominem latum lumbricum habentem, & medicamentum dederit aut potionem, siquidem fuerit homo bene præparatus, totus rotundus factus ad pilæ figuram exir, & homo sanus euadit. Si vero ad medicinam hæreat, recta pars de lumbrico abruptipitur, longitudine duorum aut trium cubitorum, aut etiam longe amplior, & ubi abruptus fuerit per multum tempus signa cum stercore non prodeunt. Postea vero auferunt. Atque hæc argumenta sunt, quod lumbricus latus non parit, sed abruptipitur. Est autem species ipsius, qualis alba intestini rasura. Signa habet hæc. Cacat alias atque alias velut cucumeris semen, & ubi ieiunus est homo, exilit ad hepar alias atque alias, & dolorem inducit; & quandoque sputa ori influunt ubi ad hepar affilit, quandoque non. Quibusdam etiam vocem intercipit, si fortiter ad hepar irruat, & valde multa sputa ex ore fluunt, paulo autem post sedantur, & tormentum multum in ventriculo alias atque alias oboritur. Quandoque etiam ad dorsum dolor incidit. Nam & hic aliquando firmatus innititur. Hæc lumbrici lati signa sunt. Contingit & hoc. Qui hoc animalculum habet, in toto quidem tempore valde debilis fieri non poterit. Ubi vero debilis factus fuerit, vix reualefcit. Latus enim lumbricus partis alicuius participes fit, ex his quæ in ventriculum ingesta sunt. Si quidem igitur curatus fuerit iusto modo, sanus fieri poterit. Si vero non curetur, sua sponte non exit. Mortem tamen non inducit, sed cõsenescit. Atque hæc à me dicta sunt de lumbrico lato, unde nascitur, & quæ morbi ipsius signa sunt. Ceterum calculi morbo principium oboritur à lacte, ubi puer lac impurum fugit. Lac autem in nutrice impurum fit, si pituitosis cibis ac potibus, & alimentis impuris nutritur vtatur. Conferunt enim omnia in ventriculum illabentia in ipsa ad lac. Habet autem & hæc res se hoc modo. Si nutritrix non sana fuerit, sed biliosa, aut aquosa, aut sanguinea, aut pituitosa: Lac etiam malum puero generatur. Consentiant enim corpus & ventriculus. Plurimum vero ipsi ad lac cedit, de eo quod ipsa plurimum in seipsa habuerit. Et puer si de nutritrice lac non

Lõgus lumbicus.

Lumbrici signa.

Calculus puerorum unde fiat.

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

lac non purum suxerit, sed biliosum velut dixi, morbosus fit ac debilis: & in præsens maxime affligitur, quandiu lac prae-
 ym ac morbosum suxerit. At vbi suxerit lac non purum, sed
 terreum & pituitosum, & habuerit puer venas de ventriculo
 ad vesicam tendentes amplas ac attrahentes: procedit autē
 & quod bibit nutrix, & lac in ventriculum pueri, tale quale
 trahit à ventriculo de lacte, in totum similiter prout venę ad
 ventriculum detrudere possunt: si quid sanè in lacte non pu-
 rum fuerit, id quo vesica fruitur lapis fit tali modo, velut in
 aqua non pura, in calice aut vase æneo turbata, & rursus se-
 data, fex acervata fit in medio. Sic sanè & in vesica de vrina
 non pura existente. Et non per urinam eiicitur, vt quę in ca-
 uo sit loco, & maxime acervata fiens, prę dolore per mictio-
 nem non pertransit, & à pituita cruda concrescit, Glutinum
 enim fit pituita ad fecem ammixta. Et primum parua lanugo
 superstat, deinde quod accedit arenosum fit, glutino fiente
 pituita, quę est in vesica de lacte, & augetur, & quicquid hu-
 moris in glutinatiōe accesserit, emingitur. Rursus autem fex
 solida fit, & lapidis speciem accipit. Quemadmodum ferrum
 ex lapidibus ac terra dum comburuntur fit. Et in prima qui-
 dem in ignem immisione, cōglutinati sunt lapides cū terra
 ad ferri recremētum. At vbi iterū atq; iterū in ignē immissa
 fuerint, recremētum quidē foras decedit liquefcens ex ferro,
 id quod ita fieri oculis videmus. Ferrum autem in igne
 relinquitur, & recremento decedente subfidet, fitque solidū
 ac densum. Sic profecto etiam fex in vesica, dum pituita glu-
 tinum fit, emingitur id quod ab vrina liquefcit. Fex autem
 subfidet, & densatur, ac solida fit velut ferrum. Vbi vero sub-
 sed it ac solida facta est, sursum ac deorsum in vesica voluta-
 tur, & feriens vesicam dolorem inducit, & si vehementer fe-
 riat ac vlceret, aliquid de ipsa aufert. Verum id quod in super
 affertur, adhuc magis quā id quod arenosum decessit, con-
 cretionem efficit. Atque tali modo fit lapis de lacte in vesica:
 & si pueri anxietas aliqua ab hoc oboriatur, aliās atque
 aliās, vbi meiere vult, vrinx meatum apprehendit. At si pue-
 ro iam adulto lapis gignatur ex terrę eū, dolor nō adest ipsi
 prius quā ipse sibi ipsi cibum deligat. Et hæc à me de hoc
 relata sunt. Cæterum morbus signa quinque habet. Nam
 vbi meiere vult, dolore affligitur, & vrina paulatim fluit ve-
 lut in

*Lapis in
vesica qui
fit.*

*Similiter
ex ferrum
fit.*

*Calculi di-
uersa caus-
sa*

*Quinq; cal-
culi signa.*

A lut in vrinæ stillicidio, & est subcructa, nimirum vesica à lapide exulcerata, & vesica inflammata est. Verum hoc signum inconspicuum est, indicat tamen summa pars præputij. Quandoque mingit arenosa, verum à talibus, qualia ego dicam. Eicit autem aliquando lapides duos, aut etiam plures paruos, generatos eodem modo, velut de vno dixi. Fiunt etiam tali modo. Quum lapis fuerit concretus, & profunde subsecderit in vesicam in arena separata, ita vt ipsam aduenientem lapis non assumat in seipsum, sed grauior ac copiosior fiat, vt tamen ipsa ad seipsam non concreascit, etiam sic duo lapides fiunt. Fiunt etiam plures eodem modo. Sed & collisis inter se in agitatione aliquid disparatur, & arenosum per vrinam

*Qui duo
vel plures
calculi fiunt*

B eiicitur. Quod etiam aliquando contingit, vbi arena ad vesicam descendit, & non eoaluit. Quidam dicunt quod potus in pulmonem deuenit, ex hoc vero in reliquum corpus. Hi autem qui hæc dicunt, redarguuntur ex hoc quod dicturus sum, quod videlicet pulmo cauus est, & in ipso fistula est. Quod si pulmo cauus non esset, & fistula non ipsi adhæreret, animalia vocem non ederent. Vocem enim edimus de pulmone, quia cauus est, & fistula ipsi adest. Vocem autem articulant labia & lingua, Verum de hoc exactius in peripneumonix tractatione egi. Caterum hominibus quibus potus in pulmonem ferri videtur, aduersabor, habetque res se hoc modo. Proccedit potus in ventrem, à ventre autem in reliquum corpus expenditur. Oportet autem his quæ dicturus sum

*Potus pul-
monem non
petit.*

C mentem adhibere. Sermonis argumenta, quod potus non procedit in pulmonem, sed in ventrem, hæc sunt. Si enim potus procederet in pulmonem, quum pulmo expletus esset, homo non facile respiraret, neque loqui posset. Non enim esset, pulmone pleno existente, quod resonaret. Et hoc quidem vnum argumentum est. Deinde si potus in pulmonem procederet, cibi in nobis sicci existentes non similiter concoquerentur. Atque hæc duo argumenta existunt. Sed & medicamenta aluum subducentia, si in potu sumantur, extra ventrem procederent. Habet autem hæc res hoc modo. Quæcunque medicamenta purgatoria sunt aut superne, aut inferne, aut etiam vtrunque præstant, ea hæc faciunt. Omnia valde vrunt, & fortia quidem ex ipsis, si partem aliquam teneram corporis contigerint, eam exulcerant. Mitiora vero turbu-

*Medica-
menta quid
agant.*

lentum

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

lentum corporis motum faciant, quancunque tandem partē occuparint. Si vero aliquod ex his medicamentis in pulmonem perueiret, videtur mihi magnum aliquod malum inducurum esse, Pituita enim de capite descendens, cum in valde breui tēpore exulcerat. Tenera enim & rara res est pulmo, & si exulceratus fuerit, nō bene habebit homo ille, ob multas sanē causas. At vero venter à medicamento non exulceratur. Nam res est vailda ac robusta, nimirum velut pelis & corium. Et plerique sanē ex Libyæ incolis pecorum pellibus pro vestibus vtuntur, ventribus autem pro vtricialis. Robusta enim res venter existit. Deinde vbi à vino nigro homines repleti fuerint, nigra recrementa excernunt. Atq; hæc omnia argumenta existunt. Et vbi alia comederimus, aut aliud quoddam edulium olidum, vrinam reddimus comesta odore referentem. Et hæc quidem omnia argumenta sunt. Sed & hoc considerandum venit quod dicturus sum. Si quis cyceonem biberit, aut farinā coctam sorbuerit, aut aliud quid eiusmodi, & hoc ipsum in pulmonem peruenerit, certē arbitramur ipsum ne minimum quidem tempus viuere posse. Vbi enim modicum quiddā pituitæ in pulmonem peruenit, aut in fistulam ipsius, multa ac fortis tussis oboritur, ac conuulsio. Si vero vtiq; & vixerit homo qui cyceonum biberit, aut farinam coctam sorbuerit, vbi sanē concocta fuerit forbitio, videtur mihi multa & fortis caliditas corpori oboritura esse, multusque dolor, vt omnino moriatur homo hoc modo, si illa in pulmonē perueniant. Atq; hæc iam argumenta septem sunt. Præterea quomodo lac infantes pueros nutrire posset, si ad pulmonem descenderet? Atque hoc mihi aliud adhuc argumentum est. Et hæc ne produxissē quidem ad sermonis mei confirmationem, nisi multi adeo homines essent, quibus potus in pulmonem procedere videtur, & necesse est ad opiniones fortiter inhaerentes multa argumenta adducere, si quis velit auditorem à priore sententia abducere ac conuertere vt suis verbis fidem habeat. Et propter hoc etiam potus in pulmonem non procedit, sed in ventrē: quia contigua & annexa est ipsi gula hominis semper hians, & in hanc procedit. Et simul pulmonis fistulæ velut hederae foliū incumbit, quare neq; descendere permetteret in transglutiedo, si in ipsum procederet. Atq; hæc mihi de hoc relata sunt.

Procedit.

*Libum ac
stutus.*

*Cur lotiū
oleat escu
lenta.*

*Lactis etiā
exemplo
hos resolu
lit.*

*Quid pul
monis fi
stulam te
gat cū qd
edimus.*

- A** Procedit nanque potus in ventriculum, & vbi expletus est, splen de ipso suscipit, & distribuit ad venas, & ad omentum, & in decliue deorsum, & in scrotum, & ad crura, & ad pedes. Et postquam morbus ex aqua multa obortus fuerit, procedit de ventriculo, & semper ad splenem venit de potu, vbi biberit homo. Contingit autem in hoc morbo, vt neq; febricitet aliàs ex ventre, quàm vbi homo sitiat, vesica autem & ventriculus non iusto modo excolent, neq; conueniente diætâ homo vtatur. At splen subagrotans à ventre de potu trahit. Morbus autem oboritur, & scrotum pellucidum fit, & clauicula, & collum, & pectora attenuantur. Colliquâtur enim ab hoc morbo, & humor ad ventriculum defluit, & inferne partes aqua plenæ sunt, & venter cibum auersatur, & quâdoque valde adstringitur, quandoque defluit. Nec vesica iusto modo excolat, & plerunque horror aliàs atque aliàs per corpus discurrit, & quandoque febris corripit. Et quibusdam facies tumida fit, quibusdam non. Aliquibus etiam tibiæ rumpuntur, vbi morbus diurnus factus fuerit, & aqua illinc effluit. Incidunt & vigilie & impotentia corporis, ac maxime lumborum. Et postquâ edit aut bibit, etiam paulo amplius splen affligitur, & spiritum frequentem semper emitit. Atque hæc signa hydropis sunt. Est autem & circa ventriculum solum, siue febris corripuerit, siue non. Et venter magnus fit, & crura implentur aqua. Verum supernæ corporis partes attenuantur his qui ita affecti putantur. At signa omnia debiliora sunt, & simul in cruribus aqua non discedit, & dolor râtio minor existit. Cæterum circa ventriculum solum hydrops & aqua hac de causa fit. Etenim vbi aceruatim aqua accessit, & via in principiis non pateat ad infernas partes, sed aceruatim in venis concludatur, nimirum vt quæ respirationem non habeat, neque sursum neque deorsum inmitti potest, haud aliter quàm si quis magnum vas angustî osculî occludat, ac subito inuertat, deinde sensim operculû de osculo detrahat. Et si enî hoc fecerit, aqua non effluet foras, neque enim respiratione habet, sed à spiritu qui intus est, conclusa est. Nam spiritus qui intus est replet vas, & externo spiritui renititur, & excursus aquæ nõ datur præ spû vas implente, & simul aere incumbente. Si vero quis sensum vas inclinaret, aut fundum perforaret, spiritus de vase exibat. Egresso autem spiritu, procedit

*que gra-
uilescant
tabescent
in hoc mor-
bo.*

*Subtercu-
tanei mor-
bi signa.*

*Cursus
ueter tui
gest.*

Simile:

HIPPOCRATIS LIBER

cedit etiam aqua foras. Sic sanè in hydrope, si quidem perspi-
ratio sursum aut deorsum cōtingat, in principio morbi, tran-
sit ad crura hydrops, & ad pedes. Sin minus, isthic solum vo-
lutarur circa ventriculum, Atq; ita quidem de his à me di-
Mulieres ctum est. Fit autem & mulieribus hydrops in vtero ipso,
etiam hoc & signa sanè in ventriculo, & in cruribus, & reliqua signa ea-
patiantur. dem habet. Et de hoc ipso à me dictum est in morbis mulie-
bribus. Atque hæ tres sunt species morborū ab hydrope.
Fiunt autem hi morbi omnes cito difficiles, & omnes cito
augentur. Adhuc autem difficiliores fiunt, si ex alio mor-
bo corpus liquefactum, ad hunc deuenerit. Si quidem igitur
subito occupauerit morbus hominem, moritur, nempe alio
morbo diutissime iam affligente. At vbi etiam alius valde
fluida fuerit, citissime moritur, & sentiens, & loquens. Atque
hæc à me relata sunt de hydrope, & vnde oriatur, & quod
hæc sint ipsius signa.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE AFFECTIONIBUS,

Iano Cornario

medico pbyfico

interprete.

Hunc Galenus Polybi esse dicit.



Irurum prudentem ratione apud se
inita, quod maximi pretij res est
hominibus sanitas. nosse conuenit
quomodo ex sua ipsius intelligen-
tia, in morbis vtilitatē capiat. Nos-
se autem conuenit ea quæ à medi-
cis & dicuntur, & adhibentur cor-
pori suo, eaque diiudicare posse.
Atque hæc singula hætenus nos-
se satis est, quatenus idiotæ cōtin-
gere possit.

- A** gere potest. Hæc vero nouerit quis maxime, si harum rerum cognitione ac studio teneatur. Morbi omnes hominibus à bile ac pituita fiunt. Bilis autem & pituita morbos exhibent, quum in corpore nimium aut resiccantur, aut humectantur, aut incalescunt, aut frigesunt. patiuntur autem hæc pituita & bilis, & à cibis, & à potibus, & à laboribus, & à vulneribus, & olfactu, & auditu, & visu, & coitu, & à calido, & à frigido. patiuntur autem quum singula ex relatis, aut nō in debito tempore corpori exhibentur, aut non consueta, aut plura & fortiora, aut pauciora & debiliora. Vniuersi igitur morbi hominibus ex his fiunt. Oportet autem ad hæc idiotam nosse, quæ par est nosse idiotam. Quæ vero artifices
- B** nosse par est, ea etiam adhibere ac tractare. De his autem quæ dicuntur & fiunt, fieri potest vt idiota ex intelligentia quadam coniecturam faciat. Iam vero vnde singula hæc nosse oportet, ego referam. Si in caput dolores inciderint, huius caput calefacere conducit: ita vt multa calida lauemus, & sternutatione facta pituitam ac mucos subducamus. Et si quidem ex his à dolore liberetur, sufficiunt hæc. Si vero non liberetur, purgandum est caput à pituita. Victus autem sit forbitio, & potus aqua. Vinum autē non exhibeatur, donec dolor sedetur. Quum enim calidum existens caput, vinum attraxerit, dolor fortior euadit. Dolores incidunt à pituita, quum in capite mora cumulata fuerit. Si vero aliās atque aliās dolor & vertigo in caput inciderit, profunt quidem & hæc adhibita, prodest autem etiam, si sanguis à naribus fuerit detractus, aut à vena in fronte. Si vero diuturnus & fortis in capite fiat morbus, & purgato capite non decedat, huius caput aut scarificare oportet, aut venas in circuitu inungere. Ex his enim solum sanum fore spes est. Agrotos considerare oportet statim in constitutionis morborum principio, qua re opus habeant: & quales sint vt pharmaco purgentur, aut vt aliud quid, quodcunque tandem volueris, exhibeas. Si vero omisso principio, ad finem iam vergente morbo exhibueris, in desperato iam corpore, forte quiddā præbere veritus, periculum est ne magis delinquas, quàm successum consequaris. Si in aures inciderit dolor, conducit multa calida lauare, & auribus fomentum adhibere. Et si quidē ad hæc cesserit pituita de capite attenuata, & dolor cessauerit,

*Morbos
origo.*

*Capitis
dolor.*

*Aurium
dolor.*

B rit,

HIPPOCRATIS LIBER

rit, sufficiunt hæc. Sin minus, optimum omnium pharmacum **D**
 fuerit, quod in potu exhibitum, sursum pituitam purgat. Aut
 purgandum est caput medicamento, quo capitis pituita pur-
 gatur. Fit autem & hic dolor, quum intrinsecus ad aures pi-
 tuita ex capite allapsa fuerit. Si vero fauces inflammatae fue-
 rint, gargarismis vti oportet. Fit autem & hoc à pituita. Si
 vero gingivæ, aut aliquid sub lingua inflammatum fuerit, his
 quæ commandantur vtendum est. A pituita autem & hæc fi-
 unt. Si vero vna dependerit & suffocarit (Quidam hoc
 gurgulionem vocant) statim gargarismis vtendum est, præ-
 paratis velut scriptum est in medicamentis. Si vero ex his
 gracilis non fiat, retro raso capiti cucurbitæ duæ adhibean-
 tur, & sanguinis plurimum detrahatur, & pituitæ fluxus re- **E**
 tro reuellatur. Si vero neque ex his detumescat, scalpello in-
 cidito, & aquam educito. Sectio autem facienda est, vbi sum-
 mum subrubicundum factum fuerit, Nam si tale factum se-
 ctum non fuerit, inflammatur, & aliquando derepente stran-
 gulat. Fit autem & hoc à pituita, vbi ex calefacto capite a-
 ceruatim defluerit. Cæterum quod ad dentium dolores
 attinet, si corrosus fuerit dens, & mouetur, eximatur. Si ve-
 ro non corrosus est, neque mouetur, dolorem autem exhi-
 bet, per vitionem resiccatur. Profunt etiam quæ commandu-
 cantur. Dolores autem fiunt, quum pituita sub radices den-
 tium subierit. Exeduntur autem & corroduntur, partim à pi-
 tuita, partim à cibis, si natura debiles fuerint, & cauitatem ha-
 buerint, & male in gingiuis fixi fuerint. Si in nare Poly- **F**
 pus nascatur: quæ res ex naso in obliquum per respiratio-
 nem diffatur, ac intumescit: eximitur laqueo ex' naso ad os
 distractus. Aliqui etiam pharmacis erodunt. Nascitur autem
 à pituita. Atque hi quidem sunt morbi qui à capite oriuntur,
 exceptis oculorum morbis, de quibus priuatim agemus. At
 vero de morbis circa ventrem, hæc considerare oportet.

Pleuritis. Pleuritis, peripneumonia, febris ardens, phrenitis, hi
Peripneu- morbi acuti vocantur, & fiunt maxime quidem ac fortissimi
monia. hyeme. fiunt etiam æstate, verum minus, & molliores. Quod
καύρος. si forte in tales incideris, hæc sanè faciens ac consulens, ma-
Phrenitis. xime successum fenseris. Pleuritis. In pleuritide febris
 detinet, & lateris dolor, & erecta ceruice spiratio, & tussis, &
 sputum ab initio quidem subbiliosum sput. Postquam autem

quinta

- A** quinta aut sexta dies aduenerit, etiam subpurulentum. Huic ad lateris quidem dolorem dandum est, quod pituitam & bilem à latere deducat. Sic enī dolor lenissimus fuerit. Alius autem curanda est per clysterem subducentem ac frigefaciētem. Hoc enim vniuerso morbo cōmodissimum erit. Exhibēdus est etiam potus, & sorbitio. Et potiones dandæ sunt acidiores, quo sputum de latere repurgetur. Quum autem pus purgari inceperit, latus calefacere conducit, & forinsecus maturare ea quæ circa latus sunt. prius autem hoc facere nō expedit. Resiccatur enim. Fit autem hic morbus maxime ex potu, quū quis humecto corpore, aut ebrius, aut sobrius, friguerit. Fit etiā aliter. Iudicatur autem morb⁹ breuissimus septima die, longissimus decimaquarta. Et siquidem in hac, per sputum reiectū ac purgatū fuerit pus à latere, sanus fit. Si vero per sputum nō fuerit pus reiectum, pectore suppuratus efficitur, & morb⁹ lōgus erit. Porro iudicari in morbis est, quū morbi augeſcunt, aut marcescunt, aut in alium morbū tranſeunt, aut desinunt. Peripneumonia. In peripneumonia febris detinet, & tussis, & excreat primum quidem pituitam crassam ac puram, Sexta vero & septima, subbiliosam & subliuidam. Octaua autem & nona suppurulentam. Huic si quidem dolor adest, aut dorsi, aut laterū, dandū est medicamentum, quod in pleuritide ad lateris dolorem, in medicamētario libro scriptum est. Per potus autem, & sorbitiones, & vētris subductionem ac frigefactionem, eadem curatio adhibeatur quæ in pleuritide. Quo vero sputū & pus ex pulmone repurgetur, danda sunt pharmaca in potu, quibus pulmo humectatur, & pus sursum purgatur. Fit autē hic morbus, quum pituita acervatim ex capite ad pulmonem fluxerit. Aliquando etiam ex pleuritide in peripneumoniam & febrem ardētem transitus fit. Iudicatur autem breuissimus quidē in diebus quatuordecim, longissimus vero in duobus de viginti. Pauci vero hunc morbū effugiunt. Fiunt etiā pectore suppurati ex hoc morbo, si non in iudicatoriis diebus pulmo fuerit purgatus. Phrenitis vbi apprehenderit, febris primum dibilis detinet, & dolor circa præcordia, magis autem dextera, ad hepar. Quum autem quarta aut quinta aduenerit, & febris fortior fit, & dolores augeſcunt, & color subbiliosus efficitur, & mens percellitur. Huic ad dolorem quidem dan-

Morbiliterum curatio.

Causse morbi huius.

Morbore decretorium quid. Peripneumonia.

Medela.

Morbushic unde fiat.

Phrenitis.

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER

da sunt quæ in pleuritide, & tepor faciendus ubi dolor hæret. **D**
 Sed & alius curanda, ac reliqua similiter facienda sunt, excepto potu. Potu vero utendum est quocunque alio volueris, præter vinum. Aut acetum & mel ac aquam dato. Vinum autem non conuenit mente motis, neque in hoc morbo, neque in quibusuis aliis. Conducit autem in hoc morbo etiam caput multa calida lauare. Mollito enim corpore, sudor quoque magis sequitur, & alius & vrina secedit. Et æger ipse seipso temperatior euadit. Fit hic morbus à bile, quum mota visceribus ac septo transuerso infederit. Iudicatur autem morbus, breuissimus septima die: longissimus vndecima. Effugiunt & hunc pauci, transiitque etiam ipse in peripneumoniam, & si transierit, pauci effugiunt. Febris ardens siue causos, quum habuerit, febris detinet, & sitis fortis, & lingua aspera ac nigra fit, à spiritus sanæ caliditate. Et color subbiliosus fit, & sputa biliosa. Et æger extrinsecus quidem frigidus fit, intrinsecus vero valde calidus. Huic conducit frigefaciëntia adhibere, & ad aluum, & forinsecus ad corpus, cauendo ne inhorrescat. potiones quoque ac sorbitiones dandæ sunt frequentes, & paulatim quàm frigidissimæ. Venter autem curetur, & si quidem non subeant quæ insunt, infusa frigidissima per clysterem immittantur, aut quotidie, aut alternis. Hic autem morbus fit à bile, quum mota intra corpus firmata fuerit. Solet etiam in peripneumoniam transire. Iudicatur autem breuissimus quidem nona aut decima die. Longissimus autem decimaquarta. Et si quidem transierit in peripneumoniam, pauci effugiunt. Si vero non transierit, multi effugiunt. Atque hi quidem morbi acuti vocantur, & oportet hos sic curare. Quæcunque vero alie febres hyeme fiunt, siue ex vino, siue ex lassitudine, siue ex aliqua alia re, eas obseruare oportet. Transeunt enim aliquando in morbos acutos. Transitiō vero ipsarum talis est. Quum commotis duobus humoribus, pituita & bile, non conducentia corpori exhibentur, ipsi inter seipso coacti, pituita videlicet ac bilis, corpori ubicunque tandem contigerit allabuntur. Et fit pleuritis, aut phrenitis, aut peripneumonia. Obseruare igitur ac vitare oportet febres in hyeme. Sit autem obseruatio, & tutela ab ipsis, quies, & gracilitas, & ventris euacuatio. In sorbitionibus autem & potionibus degendum est, donec febris imminuta fuerit.

Ex morbis

Causos.

Medela.

Hybernae febres cur obseruandæ.

Quæ obseruatio.

- A** Ex morbis feruē maxime acuti & occidunt, & laboriosissimi sunt, & opus est ad ipsos plurima tutela, & exactissima curatione. Et à curante nullum malum accedere oportet, sufficiunt enim quæ ab ipsis morbis adsunt. Verum ut boni quid præstet, pro viribus conetur. Et si quidem recte curante medico, à magnitudine morbi superetur æger, non hæc culpa medici est. Si vero non recte curante, neque cognoscen-
te, à morbo superetur, medici culpa est. Aestate porro hæc sunt, febris detinet fortis, & fitis. & vomunt aliqui bilem, aliquibus vero etiam inferne secedit. His in potu dandum est, & ad sorbendum, quodcumque tandem tibi idoneum esse visum fuerit. Si vero bilis aut pituita ad cor confederit, aqua frigida, aut aqua mulsa pota, vomant. Si vero venter non secesserit, clysteri vtendum est, aut subdititia glande. Morbus autem fit à bile. Liberantur autem maxime septima die, aut nona. Si vero febre detinente non purgentur, neque deorsum, neque sursum, dolor autem affuerit per totum corpus, tertia aut quarta die, pharmaco leui aut potione, deorsum purgato, facito autem sorbitionem ex milio, aut farina: & iisdem potionibus curato. Patiuntur autem & hæc à bile. Si vero externæ partes non valde feruidæ fuerint, verum internæ, & lingua aspera ac nigra fit, huic pharmacum ne dederis, curato autem frigescentia adhibendo, & ad aluum, & ad reliquum corpus. Vocatur autem hæc febris æstuosa. Iudicatur maxime vndecima die, & decima quarta. Si vero febrilis calor apprehenderit ac dimiserit, grauitas autem corporis ipsum detinuerit: hunc donec quidem calor tenuerit, sorbitionibus ac potionibus curato. Quum autem non tenuerit, etiam cibos dato, purgato autem quam celerrime pharmaco, siue sursum siue deorsum opus habere tibi visum fuerit. Si vero febris quidem nō tenuerit, os vero amarum habuerit, & corpus grauetur, & cibum auerfetur, pharmacum dandum est. Patitur autem hæc à bile, quū in venas ac articulos incubuerit & firmata fuerit. Quicunque vero alij dolores in aestate circa ventrem fiunt, si quidem ad præcordia & cor tēderint, aquam mulsam aquosam facito, & aceti tribus heminis affusis, tepidam bibendam dato & vbi modico tempore ipsam retinuerit, & igne ac vestibus concalesfactus fuerit, vomat. Si vero à vomitu rursus ac-
- B** iij cesserint
- Morbore acutorum natura.*
- Per aestate quæ uocant.*
- Medela.*
- Feruor interiorum.*
- Causæ febres.*
- Curatio.*
- Dolores æstatis.*
- Medela.*

HIPPOCRATIS LIBER

cesserint ac suffocauerint, rursus vomitum faciat. Aut ipsum **D**
 multa calida lotum, per clysterem subluere, & tepefactoria ad-
 hibe, si affuerit dolor. Patiuntur autem hæc maxime à pituita,
 quum commota ad cor allapsa fuerit. Danda sunt etiã his qui
 talibus doloribus vexantur, pharmaca quæ descripta sunt ad
 eiusmodi morbum, in medicamentario libro. Si vero transie-
 rit dolor aliàs ad alium ventris locum, & febre caruerit, mul-
 ta calida lauatur, & doloris gratia bibenda dentur, quæ in
 pleuritide sunt descripta, aut alia prout tibi visum fuerit. Si
 vero à dolore non liberetur, per pharmacum deorsum sub-
 purgetur. A cibis autem abstineat, quousque dolor affuerit.
 Tales autem dolores, qui sic errant, à bile sunt. Quicumque
 vero dolores infra umbilicum fiunt, in his molli infuso per **E**
 clysterem immisso subluo. Si vero non sedentur, pharmacum
 deorsum purgans dato. Quicumque vero dolores derepente
 in corpore fiunt citra febrem, in his lauare multa calida con-
 ducit, & tepefacere. Nam pituita & bilis compacta quidem, for-
 tia sunt, & prævalent in quacunq; corporis parte constituerint,
 & laborem ac dolorẽ fortem exhibent. Diffusa vero debi-
 liora sunt, quacumque corporis parte manifesta fuerint. At
 vero morbi qui in æstate fiunt, sic fieri solent. Quum corpus
 à sole fuerit calefactum, humectatur. humectatum autem ægro-
 tat, aut totum, aut ea parte in quam pituita & bilis incubue-
 rint. Si quidem igitur quis ipsos incipientes curet, neq; lon-
 gi fiunt, neque periculosi. Si vero non curet, aut male curet,
 & longiores fiunt, & sæpe quoq; occidunt. Sed & tertianæ & **F**
 quartanæ febres, ex talibus fieri solent. Hæc morborum con-
 stitutio maxime quidem æstate fit, aliquibus vero etiam hye-
 me. Tertianæ febris quum apprehenderit, si quidem vide-
 bitur tibi non purgatus esse, quarta die pharmacum dato. Si
 vero pharmaco non videbitur opus habere, medicamenta
 in potu exhibeto, quibus febris aut transmutetur, aut defi-
 ciat. Exhibeto autem velut scriptum est in medicamentis.
 Et in apprehensione quidem, sorbitione & potu nutritio.
 Interposito vero tempore, cibis per aluum secedentibus.
 Apprehendit autem plerumque non ita sæpe. Si vero non
 curetur, in quartanam transire solet, & diuturna fieri. Si
 vero quartana apprehenderit, si quidem impurgatus fuerit,
 primum caput purgato, & interpositis tribus aut quatuor
 diebus,

*Causa ho-
rum ma-
lorum æstis.*

Tertianæ.

Quartanæ.

A diebus, pharmacum sursum versus purgās dato in ipsa apprehensione. Et interpositis diebus rursum aliud deorsum purgās dato in ipsa apprehensione. Si vero ex his non sedetur, rursum interpositis diebus, multa calida lauato, & pharmaca quæ scripta sunt dato. potib⁹ autē & sorbitionibus, & reliqua dicta vtendum est velut in tertiana. Apprehendit autem hæc febris plurimos multo tempore, alios vero pauco. Et fit tum tertiana, tum quartana, à bile & pituita. Cur autem tertiana & quartana, alibi à me scriptum est. Vim porro habent medicamenta in his febribus, vt potis his corpus in loco sit, in consueta caliditate ac frigiditate. & neq; præter naturā calefiat neq; frigefiat. Danda sunt autē velut scriptū est in medicamentario libro. Pituita alba quum tenuerit, corpus totū intumescit albo tumore. & in eadem die alia parte melius sibi videtur habere, alia deterius. Et tumor aliās in alia corporis parte maior & minor fit. Huic pharmaca dāda sunt deorsum purgantia, à quibus aqua, aut pituita purgatur. Viētus autem ratio constituenda est, in cibis & potibus, ac laboribus, à quibus siccissimus ac gracilimus euadat. Morbus autem hic fit à pituita, quum quis ex febribus diuturnis pituitosus existens, impurgatus manserit, & pituita ad carnes ipsius conuersa fuerit. Et nihil quidem albidior est hæc pituita quàm alia. Verū corporis color albidior apparet. Sanguis enim à pituitæ copia aquosior fit, & non inest similiter in ipso bonus color. Quapropter albidiores apparent. & vocatur hic morbus pituita alba. Si quidem igitur curatus fuerit incoante morbo, sanus fiet. Sin minus, in hydropem transit morbus, & hominem corrumpit. Quicumque splenem habent magnum, qui quidem fuerint biliosi, hi mali coloris fiunt, & malis vlceribus scatent, & ex ore graue olent, & tenuēs euadunt. Et splen durus est, & semper consimili magnitudine. & cibi non secedunt. Qui vero pituitosi sunt, hæc & minus patiuntur, & splen aliās maior, aliās minor efficitur. His conducit si quidem impurgati fuerint, & caput & reliquum corpus purgare. Si vero purgatione non egeant, viētus ratio constituenda est, ita vt pituitosis corpus resiccemus ac attenuemus, cibis & potibus, & vomitibus, & exercitiis plurimis, & deambulationibus. Et in vere sursum per veratrum purgentur. Biliosis autem conducit, vt per viētum humectantem, aluum & vesicam subduca-

*Pituita
alba.*

*Medela
que.*

*Morbi huius
caussa.*

*φλέγμης
λευκῆς.
Lienosi
quales sint*

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER

mus, & vt de vena splenitide frequenter sanguinem mittant; & medicamentis urinā cientibus vtantur, quæ splenem molli-
 lire scripta sunt, & vt pro anni tempore bilem purgent. Qui-
 dam vero splenici à pharmacorum potu nihil vtilitatis sen-
 tiunt, neque à reliqua curatione, quicquam gracilior splen ip-
 forum euadit, sed quæ adhibentur à magnitudine morbi su-
 peratur. progressu vero temporis, aliquibus in hydropē mor-
 bus degenerat, & corrumpuntur. Aliquibus autem splen suppu-
 ratur, & vsti sani fiunt. Cum quibusdam vero consenescit du-
 rus & magnus existens. Morbus autem fit, quum ex feбри-
 bus & mala curatione, bilis aut pituita, aut ambo in splenem
 incubuerint. Et diuturna quidem est affectio, non autem le-
 thalis. Ex pharmacis quæ splenis gratia exhibentur, alia per
 vesicam purgant, & ipsum molliorem faciunt. Alia vero pur-
 gant quidem, verum neque per vesicam quicquam, quod ma-
 nifestius fiat, neque vsquam alia parte. Splenem tamen mol-
 liunt. Voluulus quum apprehendit, venter durus fit,
 & nihil scernit, & dolor inferne omnem aluum tenet, & fe-
 bris, & sitis. Aliquando vero præ dolore æger etiam bilem vo-
 mit. Hunc humectare oportet, & intrinsecus, & extrinsecus.
 Et multa calida lauare. Et bibenda dare quæ aluum mouent,
 & urinam subducunt. Et clysterē adhibere, si admittat. Si ve-
 ro nō admiserit clysterem, fistulam ad vtriculi extremitatem
 alligato, & insufflando multum flatum immittito. Et vbi in-
 testinum & venter eleuata fuerint à flatu, exempta fistula, sta-
 tim infusum per clysterē immittito. Et si susceperit, secessum
 emitter, & sanus euadet. Si vero non sic susceperit infusum,
 moritur maxime septima die. Talis autem morbus fit, quū
 stercore aceruatim combusto in intestino, pituita circa hoc
 colligitur. Et intestinū intumescit, vtpote his aceruatim in-
 duratis. & neque pharmaca quæ superne bibūtur suscipit, sed
 reuomit. Neque infusa inferne adhibita admittit. Est autem
 morbus acutus & periculosus. Aqua inter cutem fit plerun-
 que quum quis ex longo morbo, impurgatus multo tempore
 manet. Corruptuntur enim carnes, & liquantur, & fit aqua.
 Fit etiam hydrops à splene, quum ægrotauerit: & ab hepate,
 & à pituita alba, & à dysenteria ac lienteria. Et si quidem ex
 purgatione non facta fiat hydrops, venter aqua impletur. pe-
 ctus autē & suræ attolluntur. humeri vero & clauiculæ, & pe-
 ctora &

A ſtota & femora liqueſcunt. Hunc ſi à principio acceperis, priuſ *Medela.*
quam aqua ſuper excreſcat, pharmaca bibenda dato à quibus
aqua aut pituita purgatur. Bilem vero ne moueto. Cibos au-
tem & potus & labores ac deambulationes conſtituito, à qui-
bus gracilis ac ſiccus euadat, & carnes quæ robuſtiſſimæ fiant.

Morbus autem eſt lethalis, cum aliàs, tum ſi venter aqua re-
pletus fuerit. Quum vero à ſplene, aut hepate, aut pituita
alba, aut dysenteria in hydropem tranſitus fit, conducit qui-
dem per eadem curare, effugiunt autem non valde. Nam in
morbis quum alter alteri ſuccedit, plerumque occidit. Quum
enim corpori à præſenti morbo debilitato, alius morbus accet-
ſerit, præ imbecillitate perit, priuſquàm alter morbus qui poſte-
rior acceſſit, deſinat. Aqua porro ſic fit. Quum carnes à pituita,

B & tẽpore, & morbo, & nõ purgata immundicia, & mala cura- *Morb⁹ qui
fit.*
tione, ac febribus corruptæ fuerint, liqueſcunt & fiunt aqua.

Et venter quidem non diſtribuit aquam in ſeipſum, verum in
circuitu circa ipſum conſiſtit. Siquidem igitur à pharmacis, & *Medela
anteceps.*
alia victus ratione, æger vtilitatem percipiat, & venter ipſius
euacuatur, bene eſt: Sin minus, ſectiõe facta, aquam emitto.

Secatur autem vel iuxta vmbilicum, vel retro iuxta lumbos.
Effugiunt autem & hinc pauci. Dysenteria quum habuerit, *Dysente-
ria.*
dolor adeſt per totum ventrem, & tormen, & egerit bilem ac
pituitam, & ſanguinem combuſtum. Huius vbi purgaueris ca *Medela.*
put, pharmaco in potu exhibito, quod ſuſum pituitam pur-
gar, & aluum lacte cocto elueris, reliquum corpus curato, &

C ſi quidẽ febre caruerit, pinguibus & dulcibus ac liquidis ſem-
per quæ inſunt, ex aluo ſubducito. Et multa calida partes ſub
vmbilico lauato, ſi dolor affuerit. Potus autem & ſorbtiones
ac cibos exhibeto, velut ſcriptum eſt in medicamentario li-
bro. Morbus hic fit, vbi bilis & pituita in venas ac aliu in- *Morb⁹ hic
unde.*
cubuerint, ægrotat quidẽ ſanguis, & corruptus ſecedit: ægro-
tat autem & inteſtinum, & raditur ac exulceratur. Fit autem
hic morbus, & longus, & laborioſus ac lethalis. Et ſi quidem
robuſto adhuc corpore curetur, ſpes eſt fuge. Si vero colliqua-
to iam, & ventre omnino exulcerato, nulla vitæ ſpes ſuper eſt.

Lienteria. In lienteria, hoc eſt inteſtinorũ leuitate, cibi *Lienteria.*
ſecedunt non putrefacti, liquidi, dolor autẽ non adeſt, & cor-
pus attenuatur. Hunc per eadẽ curato, velut à dysenteria de-
tentos. Morbus autem fit, quum ex capite & ſuperiore vêtre,
pituita

HIPPOCRATIS LIBER

pituitæ defluxus fit in vêtrem inferioré. Quod vbi cōtingit, D
cibi ab ipso frigescunt ac humectâtur. Et secessus ipsorum nō
putrefactorū velox contingit. Et corpus liquefcit, dum simul
cibi per multū tempus in ventre non concoquuntur, & simul
à ventre calido, præter naturam calescit. Profluuium ven-
tris longum quum detinuerit, secedunt primū quidem liqui-
da, quæ sunt ingesta: postea pituita. Et probe quidem edit, ve-
rum à multo secessu debilis ac tenuis fit. Hunc sursum versus
resiccato, veratro in potu dato, & capite à pituita purgato.
Ventre quoque lacte cocto eluito. Deinde reliqua cibis ac
potibus curato, à quibus venter & totum corpus resicceretur.

*Profluuiū
ventris.*

Morbus autem ab iisdem fit, à quibus etiam intestinorum
leuitas. Hi morbi, dysenteria in quā, & lienteria, ac diarrhœa
siue profluuium ventris, consimiles sunt. Et oportet ipsos sic
sanare, ita vt defluxū à capite & superiore vêtre intercipias,
aut auerras. Morbi enim natura hinc est. Et nemo sententiam
tuam reprehendet. Fermè autem & reliquos morbos sic con-

*Malorum
observatio
Tenesmos.*

fiderare oportet, vnde vnicuique natura sit. Et si sic conside-
raueris ac deprehenderis principiū morborum, minime ab-
erraueris. Tenesmos vbi apprehenderit, secedit sanguis ac
mucus, & dolor fit in ventre inferiore, maxime vbi ad seces-
sum deuenerit. Huic conducit ventrem humectare, & pin-
guetfacere, ac tepefacere. Et quæ insunt subducere, & calida
lauare, excepto capite. Solet autē hic morbus plures cibos
expetere, Tormina enim euacuato ventre à sanguine ac mu-
co pertransēitibus, & ad intestinum allabentibus, fiunt. Quū
autem insunt cibi minorem mordacitatē intestino inferunt.

Cholera.

Et fit quidem ex iisdem à quibus & dysenteria, verum debi-
lior, & breuis, & non lethalis. Quum ex vino aut à cōiuiuo
bilis superne ac inferne flux³, aut diarrhœa corripuerit, diar-
rhœa quidem conducit ieiunare. Et si sitim habeat, vinū dul-
ce dare, aut vuarū passarum dulcium retrimenta. Ad vespē-
ram vero danda sunt, quæ etiam his qui à pharmaco purgati
sunt dātur. Si vero nō cesseret, velis autē sedare, vomitū à cibo,
aut lenticulæ decocto facito, & cōfestim sursum reuellitur in-
fernus secessus. & si succo lentium aut cicerum infuso elue-
ris, etiam sic sanè sedabitur. At vero bilis fluxui conducit,

Medicla.

si dolor adfit, dare quæ in pharmacis scripta sunt sedātia do-
lorem. Venter autem curetur, tum superior, tum inferior, per
potiones

A poriones humectantes, & per balnea calida corpus mollientia, capite excepto. & sic tum vomitus procliuor fit: & si liquor aliquis ingressus fuerit, ea quæ aduersantur sursum reuomuntur: tum infernus secessus magis prodit. Si vero euacuaueris, violenter vomuntur, & violentius secedunt. Ad vesperam vero dato & huic ea quæ dari solent ei qui pharmacum bibit. fiunt autem & hi dolores qui ex potationibus aut ex conuiuio oriuntur, quum cibi & potus plus solito in ventrem ingressi fuerint, & quæ extrinsecus corpus supercalefacere solent, bilem ac pituitam mouerint. Vrinæ stillicidij modi quidem multi & omnigeni sunt. Conducit autem forinsecus quidem corpus balneis calidis mollire. Intrinsecus vero humectare aluum quidem per cibos, à quibus fluida fiat, Vesicam vero per potus, à quibus vrina quàm plurimum diffunditur. Danda sunt & vnam scientia medicamenta, quæ scripta sunt in medicamentario libro sedantia dolorem.

*Dolores
crapulæ.*

Medela.

B Morbus autem fit à pituita. Et quum quidem vesica siccata fuerit, aut perfrigerata, aut euacuata, dolorem exhibet. Quum vero humida est, & plena, aut etiam diffusa, minus. fit autem senioribus diuturnior hic morbus. Iunioribus autem breuior. Neutris vero lethalis. Coxendicum morbus quum fit, dolor corripit coxæ iuncturam, & summas nates, ac coxendicem. Tandem vero etiam per totum crus dolor vagatur. Huic confert quum dolor tenuerit, mollire in quacunq; tandem cruris parte dolor hæserit, per balnea, & tepesfactoria ac fomenta. Et aluū subducere. Vbi vero quiuerit dolor, pharmacum dandum est infra purgans. Et postea bibat lac aspinum coctum. Doloris autem gratia dentur quæ scripta sunt in medicamentis. Morbus hic fit, quum bilis & pituita in sanguisuiam venam incubuerint. aut ex alio morbo, aut aliter quantumcunque sanguinis à pituita & bile compactum ægrotarit. Hic enim per crus vagatur per sanguisuiam venam: & ubicunque constiterit, ibi etiam dolor manifestus fit maxime, molestus quidem, sed non lethalis. Si vero in vnum aliquem locum incubuerit dolor, & constiterit, & medicamentis non fuerit exactus, vrito quocunq; loco fuerit dolor. Vrito autem lino crudo. Articularis morbus quum tenuerit, corripit calor & dolor corporis articulos. Corripit autem acutus, & in aliū atq; alium articulū dolores incumbunt,

Ischias.

Curatio.

*Morb⁹ hic
unde.*

Articularis morbus

tum acu-

HIPPOCRATIS LIBER

Medela. tum acutiores, tum molliores. Huic conducit adhibere quæ parte dolor hæret, frigefactoria. Et quæ insunt ex aluo subducere, per clysteres, aut glandem subditam. Ad sorbendum vero & bibendum dato quodcunque tibi conducibile visum fuerit. Quum vero dolor intus fuerit, pharmacum infra purgans bibendum dato, & post hoc serum coctum, & asinum lac. Hic morbus à bile fit & pituita, quum commota in articulos incubuerint. Et brevis quidem fit & acutus, non autem lethalis. Solet autem iunioribus magis quam senioribus

Podagra contingere. Podagra violentior est omnibus eiusmodi circa articulos morbis, & diuturnissimus ac ægre cedens morbus. Et est quidem hic morbus sanguinis in venulis à bile ac pituita corrupti. Quanto autem in tenuioribus fuerit venulis, & in plurima corporis necessitate constitutis, & in nervis, & ossibus multis ac densis; tanto sane durabilior est morbus, & qui ægerrime depelli possit. Conducunt autem & huic eadem quæ morbo articulari. Et longus quidē est & hic morbus ac molestus, sed non lethalis. Si vero in digitis dolor relinquatur, venas paululum supra articuli in digito nodū inurito. Vrito autem cum lino crudo. Morbum autem regium

Regius Morbus. sic curare oportet. Extrinsecus quidem corpus molliendum est balneis calidis. Aluus vero & vesica humectanda, & urinā cientia danda, quæ sunt præscripta. Si vero fortis fuerit, purgato capite, pharmacum quoddam potandum dato quod bilem deorsum purgat. Postea vero urinam cientibus utendum est. Morbus autem fit, quum bilis commota sub cutem vertitur. Quod si hæc nouerit vir idiota, non similiter in incurabiles morbos inciderit. Solēt enim morbi ex paruis occasionibus magni ac diuturni fieri. Et quicunque cibi, aut potus, aut sorbitiones congrue ac consequenter se habent, & quæcunque pharmaca doloris gratia, ea omnia sine periculo semper exhibentur; si iuxta præscriptum exhibueris. Quæcunque vero pharmaca purgant bilem aut pituitam, in his pericula fiunt, & culpæ medentibus imputantur. Quam maxime igitur ea vitare oportet. Atque hi quidē sunt morbi qui circa ventrem fiūt. Exceptis pectore suppuratis, & tabidibus, & muliebribus morbis. Hi enim seorsim describentur.

*Quæ medicamenta
cautius danda.*

Tubercula.

Tubercula quæ enascuntur omnia, à pituita aut sanguine nascuntur, quum sanè à vulnere, aut casu fuerint collecta. Conducit

- A** ducit autē horum aliqua cataplasmatīs integere, & per phar-
maca in potu data diffundere. Aliqua vero impositis cata-
plasmatis maturare, & diffundunt quidem cataplasinata, quæ
quum calida sint humectant, & non in seipsa trahunt. Matu-
rant autem, quæ calefacientia contrahunt. Quum vero ali-
quod sectum fuerit, aut sua sponte ruptum, pharmaco hu-
morem repurgare conuenit, vbi autem pus effluere desue-
rit, velut vlcus sanare. Lepra, & pruritus, & scabies, &
impetigines, & vitiligo, & alopecix, à pituita fiunt. Sunt
autem talia turpitudine magis quam morbi. Fauus, & stru-
ma, & pani, & furunculi, & carbunculus, à pituita fiunt.
Quo vero hæc depurges, pharmacis sic vtendum est. Quicū-
B que biliosi sunt, his dato ea à quibus bilis purgatur. Pituito-
sis vero, ea à quibus pituita. Atrabiliariis autem, ea à quibus
atra bilis. Hydropicis ea per quæ aqua. Quæcunq; vero phar-
maca in potu dantur, & non purgant neque bilem, neque pi-
tuitam, ea quum in corpus ingressa fuerint, vim exhibere o-
portet, aut frigefacientia, aut calefacientia, aut siccantia, aut
humectantia, aut contrahentia, aut diffundentia. Quæ vero
somnum faciunt, ea quietē sanguini exhibere oportet. Quū
ad ægrotum deuenieris, interrogare oportet quæ patitur, &
ex qua causa, & quot iam diebus: & an vter secedat, & quo
victu vititur, Et primum considerare, an morbus à bile aut pi-
tuita factus sit, aut vtrisque. Et hoc probe nosse conuenit, &
neceffe est, vt ab altero horum, aut vtrisque fiat. Deinde vtrū
C siccitate aut humiditate opus habeat. Aut aliquæ quidē par-
tes corporis siccitate, aliquæ vero humiditate. Postea an mor-
bum sursum purgare oportet, aut deorsum, siue per vesicam.
Et an augefcit morbus aut marcescit, & an soluitur, aut in al-
uum transit. Vulneratos fame affligito, & ex aluo quæ in-
sunt subducito, aut per clysterem, aut pharmaco infra pur-
gante exhibito, & in potu dato aquam, aut acetum. Aut sor-
bitiones præbeto. Inflammata cataplasmatīs frigefacito.
Talia vero cataplasmata sint, aut betæ coctæ in aqua, aut a-
pium, aut oleæ folia, aut fici folia, aut rubi, aut quercus, aut
mali punicæ. Atque his coctis vtendum est. Crudis vero rhā-
ni foliis, aut viticis, aut saluæ, aut Tithymali. Aut pulegium
viride, aut porrum, aut apium, aut coriandrum, aut isatidis fo-
lia impone. Si vero nihil horum habueris, neque vllum aliud
cataplasma

Lepra, pruritus, scabies, impetigo, vitiligo, alopecie.

Fauus, struma, pani, furunculi, carbunculus.

Sauiora curatio.

Quæ vultus refrigerent.

HIPPOCRATIS LIBER

cataplasma, polentam aqua aut vino subactam imponito. Tā-
 to autem tempore hæc cataplasmata prosunt, quanto frigi-
 diora fuerint quam vlcus. Quum vero fuerint calidiora, aut
 similiter calida, nocent. Pinguia ad inflammata non con-
 ducunt, neque ad ea quæ non sunt purgata, neque ad putre-
 scentia. Sed ad inflammata conferunt frigida. Et ad impur-
 gata ac putrescentia, acria faciunt, & quæ mordacitatem ali-
 quam inducentia purgant. Vbi vero carnem producere vo-
 les, pinguiæ & calida magis conducunt. Ab his enim caro pu-
 lulat. Quibuscumque cibis aut potibus homines sani in vi-
 ctu vtuntur, ex his oportet præsentibus vti ad ægrotos, ita vt
 præpares calidos & frigidos, & humidos, & siccos. Ex frigi-
 dis quidem calidos, & calidos ex non calidis, & siccos ex nõ
 siccis, & reliquos iuxta eundem modum. Neque vero de præ-
 sentibus desperare oportet, tanquam nihil possint, & absen-
 tes querere, qui nullam vtilitatem ægro afferant. Comperies
 autem, si recte consideraueris, extra hos, paucos quibus ad
 ægrum vtaris. Sorbitiones autem in morbis omnibus dato,
 aut ptisanam, aut milium, aut farinam, aut alicam. Et que-
 cunque ex his dederis ad secessum, tenuia dato, & magis per-
 cocta, & dulciora potius quam falsiora aut calidiora. Quæ ve-
 ro ad robur aut refocillationem, crassiora, pinguiora, & mo-
 derate cocta. Potibus autem vtendum est, si quidem aluum
 & vesicam subducere velis, vino dulci aut aqua mulsæ. Si ve-
 ro adstringere, austero, albo, tenui. Si corroborare, austero, ni-
 gro. Qui vinum bibunt citra affectionem erga ipsum, his dan-
 di sunt potus qui præparantur, & in medicamentario libro
 scripti habentur. His qui medicamentum biberunt, post pur-
 gationem detur, febrientibus quidem, aut lenticula, aut mi-
 lium tenue, aut ptisanæ succus. Danda est autem ptisana &
 milium, velut quæ leuia sint. Alica vero velut omnium robu-
 stissima. Et farina velut his robustior. Lenticula autem o-
 dorata præparetur, & modica secundo loco detur, vt quæ le-
 uis sit sorbitio, & stomacho grata fursum versus. Ammiscea-
 tur autem aut sal, aut mel, & cuminum, & oleum. Ad lenticu-
 lam vero ammisceatur pulegij herba, & parum aceti. Non fe-
 brientibus autem, panis puri medullam in iusculum interi-
 to, aut mazam & frustum piscis dato, aut ouiculæ tenerimæ
 carnem, aut volucris aut catuli coctam. Febrientibus autem
 etiam

*Quæ uil-
neri com-
plendo
profint.
Tēpera-
mentum
omnium.*

*Quæ for-
beantur.*

*Quæ uen-
trem uris
namque
ciunt.*

*Quæ strin-
gunt.
Post pur-
gationem
quæ dan-
tur.*

A etiam betam dato, aut cucurbitam, aut blitum. Et post cibum bibant vinum vinosum, vetus, album quàm aquosissimum.

Quibus lauari non conducit, vngantur vino & oleo calido, & alternis extergeantur. Quum alium debilis, à cibis humectare volueris, mazam dato & obsonia. Et marinorum quidem piscium frustra cocta cum intrito. carnes autem ouiculae tenerimae, aut hœdi, aut catuli, aut volueris coctas. Et betam aut blitum, aut rumicem, aut cucurbitam, si tempus tulerit. Ex oleribus vero apium, & anethum ac ocimum, & vinum mellei coloris, vetus, album item ac aquosum.

*Quæ sic
cent.*

B Quum vero ficcare volueris corpus, panem dato, & obsonia assa, & sicca, & hæc omnia calidiora. & carniū partes carnosas: pisces, petrosos: olera, rutam, aut thymum, aut origanum. Vinū vero nigrum austerum. Præparentur autem obsonia cum sale & cumino. Aliis vero condimentis parcissime utendum est.

Quum autem ex morbo refocillare volueris, alia quidem eadem dato, quæ exhibes quum ventrem humectas, Verum pro lactentibus carnes fortiores, & pro catulinis, volucrum ac leporinas. & ex his aliquas assatas, tum de carnibus, tum de piscibus, & quàm optime præparatas. Quibuscūq; morbis siccitas conducit, his semel in die cibum exhibere expedit,

*κρυοστ-
τῖα.*

& cibos ac potus pauciores dare, quàm ut repleantur, & hos laboribus ac deambulatione perficere, & quàm minimū dormire. Quibuscunque vero humiditas conducit, his expedit in ediam non ferre, & cibi ac potus non indigos esse,

C neque laborare, & dormire quantum voluerint. Quoscūq; cibos, aut obsonia, aut potus ægroti concupiscunt, exhibeto, si non corpori damnum inde accessurum est. Quum aut ei bus aut pot^{us} augere inceperis aut detrachere, paulatim & additiones, & detractiones facere oportet. Quicunque cibos sufficientes perficere possint, his sorbitiones ne dederis. Excludunt enim cibum. Qui vero non possunt, his dato.

*Quidquid
languens
petierit
dato.*

Si vero quid dare volueris refectionis gratia, alicam dato, & prisanam triticeam. Hæ enim sorbitiones sunt fortiores. Dantur autem post cœnam. Pharmaca quæ potantur, & quæ ad vulnera adhibentur, discere oportet: omnibus enim hoc expositum ac procliuè est. Non enim ex intelligentia homines hæc reperiunt, sed potius ex fortuna. Neque artifices magis quàm idiotæ. Quæcunque vero in arte medica, intelligentia

*Sorbitiones
usulas
dæ.*

*Medica
mētis casu
reperita.*

discunt.

HIPPOCRATIS LIBER

discuntur & reperiuntur, aut de cibis aut de medicamentis: ea ab his qui dinoscere possunt quæ in arte sunt, discere oportet, si quid discere velis. Post sorbitiones cibum debilibus dato, & vinum vinosum insuper bibendum. Ante cibos vero & potus aut sorbitiones, & postea, & cibum & potum quicumque tandem tibi videbitur debilibus exhibeto, ita ut & corpus & animam inspicias. Sic enim maxime profueris.

*Qui vis co-
rum quæ
porrigun-
tur cogno-
scitur.* Quam facultatem singuli cibi habeant, coniectare oportet, ex his qui vim manifestam faciunt. Quicumque flatum, aut morsum, aut repletionem, aut ructum faciunt, aut tormē, aut secedunt, aut non secedunt: hi manifesti sunt quod hæc operantur. & ex his etiam alios considerare oportet. Habēt enim singula edulia, & quo profunt, & quo ledunt. Verum alia manifestissime operantur quæ operantur, alia vero obscurius. Cibi & obsonia præparentur ac exhibeantur debilibus, à quibus neque flatu fit, neque ructus acidus, neque tormen. & quæ neque valde per aluum secedūt, neque valde resiccantur. Hæc autem sic fiunt. Quæcunque quidem venter superat, & corpus ipsa suscipit, ea neque flatum exhibent, neque tormen. Si vero venter non superarit, ab his & flatu, & tormen, & alia huiusmodi fiunt. Leuissima sunt cibaria, & potus ac obsonia, quæ moderata in corp^o ingesta, aut paulo amplius supra modum, neque repletionem exhibent, neque tormen, neque flatum, neque aliud quiddam eiusmodi, & celerime concoquuntur, & concocta secedunt, & per omnem diē in ventrem ingesta, minime molesta sunt, etiam si diu antea fuerint ingesta. Grauiora autem sunt, quæ moderata exhibita, aut infra modum, repletionem & dolorem exhibent. & quæ neque dari, neque edi, neque bibi possunt, ut non dolorem exhibeant. Et si quis ipsa per tempus rursus bibat aut edat, etiam sic dolorem exhibent, & non pro ratione secedunt.

*Leuia
que.*

Grauiora.

*Sanitati
cōducētia.
Robur fa-
cientes.*

Ad sanitatem optima sunt, quæ modice ingesta, sufficiunt, ut & famis & sitis sint medela. Et plurimo tempore corpus ipsa suscipit, & pro ratione secedunt. Ad robur autem optima sunt, quæ carnem plurimam ac densissimam producant, & sanguinem crassifaciant, & pro ingestorum ratione secedunt. & corpus plurimo tempore ipsa suscipit. Pinguia, & caseosa, & mellita, & ex sesamo parata, ructum acidum maxime faciunt, & bilis fluxum superne ac inferne, & flatum,

A flatum, & repletionem. Hoc ipsum etiam contingit, quū quis plura ederit aut biberit, quā venter concoquere potest.

Debilibus si quidem pro morbi ac corporis ratione dederis, quæcunque tandem dederis, consumit hæc corpus, & neque indigum est, neque repletum. Si vero aberraris à temporis occasione, detrimentum in vtraque sequitur. Quæcunque cibaria aut potus, aut obsonia corpus suscipit, ab his maxime neque tormen fit, neque flatus, neque ructus acidus.

*Cibaria,
poculaque
cōserētia,
& contrā.*

Quum enim in ventrem ingesta fuerint, corpus ab ipsis trahit quod ipsi commodum est. Et necesse est iam quod restat debilius esse, quā vt tormen, aut flatum, aut aliud quid huiusmodi in ventre faciat. Vina dulcia, & austera, & mellei

Vina.

B coloris vetusta, ventrem subducunt, maximeque vrinam ciēt ac nutriunt, & neque flatum exhibent, neque tormen, neque repletiouem. Carnes percoctæ & exassatæ, vtræq; debiles sunt ad robur augendum. Ad secessum vero percoctæ cōmodæ sunt, Assatæ vero magis sistunt. Quæ vero moderatam habent & cocturam & assaturam, hæ & ad robur, & ad secessum moderate se habent. At vero crudiores ad robur quidē cōmodæ sunt, sed non ad secessum. Ex cibis ac potibus qui cōmodissimi sunt corpori ac maxime sufficientes, & ad alimentum, & ad sanitatem, ex his ipsis etiam, vbi quis ipsis nō in tempore vtatur, aut pluribus quā tempestiuū est, & morbi, & ex morbis mortes fiunt. Reliqui vero cibi ac potus, qui talem vim non habent, parum vtilitatis afferunt, etiam si

Carnes.

C quis semper ipsis in tempore vtatur, parum autem etiam lædunt. In vtranque enim partem debiles sunt, vt & boni aliquid faciant, & mali. Sunt autem cibi & potus qui hanc vim habent hi, panis, maza, carnes, pisces, vinum, & ex his alij magis, alij minus. Quicunque ex sicco vi&u viuunt, his nō cum cibo potus detur, sed post cibum, multo tēpore interposito. Et sic quidem siccus humor à siccis cibis ortus, corpus siccatur. Si vero quis simul cum cibo bibat, cib⁹ humidior factus, corpus humidius facit. Panis calidus, & carnes calidæ, ipse per se comestæ, siccant. Si vero cum liquore dederis, aut statim à cibo potum prebueris, non siccant. Panis purus ex farinis, ad robur ac refectionem commodior est, quā qui non est ex tenuibus farinis paratus, & recens vtilior est quā vetus, & ex farinis recentibus melior quā veteribus. Polenta ex

*Siccus mu-
tricus.*

*Panis dis-
ferentia,*

Polenta.

C ordeo

HIPPOCRATIS LIBER

*Vinū quī
acbiliter
tur.*

*Caro quæ
leuissima.
Grauis.*

Pisces.

Balneum.

*Molera.
Allia.
Cepæ.*

ordeo non madefacto, sed circuncirca consperso ac decorticato, fortior est quàm ex madefacto: & recens quàm vetusta. Et maza prius subacta fortior est, quàm non subacta. Vinū diffusum, ac perfrigeratū, & excolatum, tenuius fit ac debilius. Carnes coctæ, si quidem percoctas feceris, debiliores sunt ac leuiore. Assatæ vero si exassatæ fuerint, & inueteratæ ex aceto aut sale, debiliores sunt & leuiore recentibus. Debiles ac leues cibi, ventrem quidem nō lædunt, neq; corpus, eo quod calefacti non intumescunt, neq; replent, sed cito mollescent, & concocti secedunt. Humiditas autē ab ipsis debilis corpori accedit, & neq; augment, neq; robur memorabile exhibent. At fortes cibi, & intumescunt vbi in ventrem ingesti fuerint, & replent, & difficilius quidē ac tardius concoquuntur, & non secedunt. Verū humor ab ipsis fortior ac incorruptus accedens, multum robur ac augmentum corpori addit. Ex carnibus leuissimæ sunt in corpus, caninæ, & volucrum, & leporinæ coctæ. Graues autem sunt bubulæ. Et porcina moderatior, flatum autem faciunt, & coctæ & assatæ. Et sanis autē & debilibus conueniunt ouillæ. Suillæ vero his qui laborant & exercitantur, & ad bonum habitum, & ad robur comoda sunt. Debilibus autem & priuatam vitam degētibus fortiores. Sed & ferinæ māsuētis leuiore sunt, eo quod fructum non similem edunt. Differunt autem & pecorum carnes, & eorum quæ fructum edunt, & quæ non edunt. Et fructus non idem in omnibus facit, sed partim densam ac fortem victimæ carnem efficit, partim rarā & humidam, ac debilem. Vt in summa dicam, pisces leue sunt edulium, & cocti, & assati, & ipsi per se, & cum aliis cibis. Ipsi vero inter se ipsos sic differunt. Stagnorū pisces, & pingues, & fluuiatiles, grauiore sunt. Littorales autem marini, leuiore. Et percocti assati sunt leuiore. Ex his itaq; fortes dato, vbi reficere aliquem voles. Leues vero, vbi gracilem & tenuem facere oportuerit. Balneum calidum moderatum quidem, mollit & auget corpus. Quod vero opportunum modū excedit, siccās quidē corporis partes humectat, humidās vero resiccāt. Et siccæ quidem humectatē debilitatem & animi deliquium exhibent. Humidæ vero siccāt, siccitatē ac sitim. Ex oleribus allia, & coctā & assatā, urinā cient, & per aluum secedunt, & ad menses muliebres conducunt. Cepe
ad urinas

A ad vrinæ commodæ sunt. Succus enim acrimoniam quandā exhibet, vt secedat. Atque his quidem sic vtendum est, sed debilibus non exhibenda. Apium & coctum & crudū vrinam ciet, & palustre magis q̄ satiuū, quod etiam maiore vim habet. Coriadrū stomacho gratum est, & per aluum secedit, tum coctum, tum crudum. Ocimum & humidum est & frigidum, ac stomacho gratum. Porrum coctum quidē vrinam ciet, & secedit. Crudum vero æstuosum est & pituitosum. Malum punicum reficit & pituitosum est, & cū nucleo quidem, aluum sistit. Citra nucleum vero, secedit. Calidi cibi, sicci quidem sistunt, humorem enim in ventre resiccant. Si vero humidi sunt, humectantes per caliditatem, aluū subducunt. Acerba ficcant, & contrahunt corpus. Habent & vim sistendi. Acida attenuant, morsum inducētia. Sal sa secedunt, & vrinam cient. Pingua & dulcia, humiditatem & pituitam exhibent. Reficiunt cucurbita, & beta, & blitum, & rumex, & per humiditatem secedunt. Brassica vero acrimoniam quandam habet ad secessum, & simul boni succi est. Caseus, & sesamum, & vicia passā, reficiūt & pituitosa sunt. Vinum dulce, & mellis speciem referens, ambo & reficiunt, & vrinam cient, & pituitosa sunt. Austera vero, ad robur & siccitatem commodæ sunt. Vrinā autem cient etiam austera vetusta, quæ alba & tenuia existunt. Oleum & quæcunq; oleosa, reficiunt & pituitosa sunt. Ex olerib⁹ coctis secedunt, quæ ex natura humidissima aut acerrima sunt, aut caliditatem habent. Danda autem sunt hæc tepidiora ac flaccidiora. Sic enim ad secessum comodant. Cucumis pepo, & vrinam cit, & aluo secedit, ac levis est. Alter autē pepo, frigiditatem quandam exhibet, & sitim sedat. Alimentū vero, à neutro horū contingit, nisi tenue quoddam. Sed neque malū, neq; memorabile. Mel cū aliis quidē comestū, & nutrit, & bonū colorem exhibet. Ipsum autem per seipsum attenuat magis q̄ reficit. Nā & per vrinam, & per secessum plus iusto expurgatur. Vrinā cientia in ventre & cito calefiūt, & calefacta marcescūt ac liquefcūt, & ob id citū secessum faciūt. Stabiles autem ac aluū sistentes cibi, & calefcūt, & calefacti cito resiccantur ac compingūt, & propter ea obduri facti, non secedunt. Quæ per aluū secedūt, succosa sunt, & natura calida. Quæ vero vrinam cient, sicca & frigida.

Apium.

Coriadrū.

Ocimum.

Porrum.

Malū pu-

nicum.

Cibaria.

Brassica.

Vinum.

Oleum.

Mel.

Cibariorū
uarietas.

HIPPOCRATIS LIBER

Frumentū uinum. Frumentum & uinū, differunt quidem & ipsa inter seipsa ex natura, tum robore & debilitate, tum leuitate ac grauitate. Differt etiam locus à loco, ex quo illa fuerint. Est enim aliud aquosus, aliud aquarum inops, & apricus, & umbrosus, & bonus, & malus. Quare omnia hæc ad hoc conferunt, ut singuli cibi aut fortiores sint, aut debiliores. Quicumque sanè panem comedere soliti fuerunt, his dandus est & in morbis.

Quæ plus iusto comedatur quid agendum. Quum quis cibos aut potus plures solito acceperit, si non solito more perfecerit, optimum est ut statim reuomat. Pomæ & fructus arborei, tum mollis, tum duri corticis, propter ea post cibum molestiora sunt, & sano, & debili, quia corpus eius qui cibum sumpsit, solum ab ipsis humores trahit. Si uero ieiunus quis edat, plures. Quicumque cibi aut flatum, aut æstum, aut morsum, aut repletionem, aut tormen faciūt, à talibus liberat uinum meracum insuper potatum. Corpus enim à uino calefactum, per calorem amouet ea quæ insunt à

Cibaria cum uexat, quid agas. cibis & potibus ac similibus. Venter aliquando perturbatur, aliquando sistitur, aliquando etiam pro ratione secedit. Cur autem hæc sic se habent? primum quidem venter quum humidior fuerit, & quum siccior, susceptum cibum corrumpit. Deinde quum mutatio facta fuerit, siue ex frigore ad caliditatem, siue ex caliditate ad frigiditatem, itidem corrumpit. Quare necesse est ventrem, ab iisdem cibis ac potibus propter hæc ipsa, & molliorem fieri, & durior. Cibaria & potus & obsonia, excepto pane, & maza, & carnibus, & piscibus, & uino, & aqua, reliqua omnia tenues ac debiles utilitates exhibent, ad augmentum, & ad robur, & ad sanitatem. Tenuia

Ventris diuersitas. item ac debilia mala ab ipsis fiunt. Quosunque ægrotos: febres non continenter detinent, sed intermittentes corripiunt, his cibi dandi sunt post apprehensionem, ita ut coniecturam facias, ne febris à recens accepto cibo irruat, sed cibis iam concoctis. Vinum & mel optima iudicata sunt in hominibus, si iuxta naturam & sanis, & debilibus cum temporis opportunitate ac mediocritate exhibeantur. Et bona quidem sunt ipsa per seipsa, Bona uero etiam permixta, & tum alia, tum quæcunque memorabilem utilitatem habent. Quicumque sanis commoda sunt, ea etiam ægrotis exhibita fortiora sunt. Et oportet detracto ipsorum vigore ea dare, alioqui non feret ipsa corpus, sed magis lædunt, quam profunt.

Linguentia nutritio.

Hippo-

A HIPPOCRATIS COI

LIBER DE INTERNIS

*affectionibus, Iano Cor-**nario medico physi-**co interprete.*

I pulmonis arteria fuerit exulce- *Pulmonis*
rata, aut aliqua tenuis venula ex *arteria*
his quæ in pulmonem dependent, *sauciata*
rupta fuerit, aut aliqua fistula ex *utæue*
his quæ per pulmonem distentæ *fractæ.*
sunt: & alia in aliam distracta fue-
rit, & sanguine fuerint impletæ:
distrahuntur sanè ac rumpuntur ob
has maxime causas, propter labo-
rè, propter cursum, ob casus, ob pla-

gas, ob vomitus violenter fientes, ob febres. Hæc igitur pati-
tur. Primū quidē tussis sicca obtinet. Deinde paulo post ex-
puit salivam subcruentā, aliquādo autem puram. Et si quidē
hic breuē à morbo liberetur, satis est: Si vero nō, tēporis pro-
gressu sanguis amplior prodit, aliquando purus, & aliquando
etiā subputridus. Sæpe vero etiā fauces non animaduertēti-
bus sanguine implētur. Postea sanguinis grumos paulatim &
frequenter emergentes reiiciunt. Aliquādo vero etiā graueo
lentia ab ipsis contingit. & fauces aliquando spuma quadā
replentur. Et rigor ac febris apprehendit, circa initia quidem
morbi, vehemēter. In progressu autē debilius. & alias atq; a-
lias corripit. & dolor quandoq; in pectoribus insitus est, & in
dorso, & in lateribus. Et ubi sanguinem spueri desierit, salivā
multam liquidā expuit, quandoq; vero etiā viscosā. Atque
hæc quidē sic patitur donec quatuordecim dies præterierit.
Post hos vero si nō desuerit morbus, squamas ab arteria tuf-
siendo auellit, quales à pustulis decedunt. & dolor incidit in
pectus, & in dorsum, & in latus. & præcordia cōtingens velut
vltus dolet. Huic conducit vt q̄ maxime quietē intus habeat,
si morbus sic se habuerit. Si enim quid laborarit, & dolor a-

Curatio.

C iij cutior, &

HIPPOCRATIS LIBER

cutior, & tussis magis q̄ prius premit, & rigor ac febris magis occupat. Et si sternutauerit, dolor acutus irruit. Dolet aut̄ & in lecto, quū se circūuertit. Huic cibos quidē eosdem, quos & pectore suppurato exhibere oportet, verum hos non multos. Ex obsoniis autē his vtatur. De piscibus quidē, squatina, aut pagro, aut galæo magno albo, aut aliis similibus, omnibus cū rhoe & origano cōditis. Carnem autem edat galli assatā, sine sale, aut capræ coctā. & vino austero vetustissimo ac iucūdis-
simo nigro vtatur. Deambulationib. autē moderatis. Veruntamen hæc fiant febre non tenente. Si vero febris tenuerit, serbitione farinæ aut milij vtatur. Si vero cibos assumat, paucos assumat, & obsonia per aluū secedentia. Et si pharmaco tibi vtendū esse videbitur, cnidio cocco, aut tithymalide ipsū subpurgato. Et post purgationē, farinæ coctæ pinguis hemina absorbendā dato. Deinde q̄ maxime reficito, vt q̄ minimū tenuis sit. Ad huiusmodi enim morbū non conducit tenuem esse. Deambulationes etiā primum paucas faciat, vt ne lassitudo succedat. Fomentū vero alias atq; alias adhibeatur. Et qua die fomentū adhibetur, sine cibo sit excepta farina coctā, cuius hemina absorbeat. Aquam autē bibat. Postera die minus q̄ solitus fuit edat, & bibat vinū nigrum, iucundū, austerū modicū. De cætero vero bis aut ter in die cibi dentur. Sic aut huic paulatim dato, donec ventrē confirmaueris. Nā ex febris & inedia, si os quidē appetiuerit, venter autē suscipere noluerit, vbi acuatim suscepit, inflammatur. Quare paulatim dare oportet. Si vero acuatim dederis, & parū laborarit, deambulationib. venter nō perfrigeratur, nimirū cibis quiete cōpactis. Quare etiā febris succedere solet, & hyeme quidē minus, æstate vero periculū est ne delinquat. Hung q̄ maxime reficere oportet, quo q̄ crassissimus fiat. & deambulationib. moderatis vtatur, & min⁹ solito luctetur, & parū labore primū, deinde amplius, nunquā autē multū. hæc si fecerit, celerrime sanus erit. Si vero tenuis fiat propter laborē, remittat ac quietē agat. Hic vbi sanus fuerit, neq; ad vētū celeriter currat, neq; equū, neq; currū cōscēdat. Vitet etiā vociferationē, & iracundiā. Periculū est enī ne morbus reuertat. Quare hæc oīa vitare oportet. Si vero cibū auerfetur, eruum torreto, & corticē depurgato, deinde per triduū in aqua macerato, singulis aut diebus aquā diffundito, & aliā affundito.

Postea

*Medela
que.*

*Que ca-
uenda.*

A Postea quarta die excolato ac reficcato, deinde tenuissime molitum cribrato. Et lini semen tostum tundito ac terito. Et sesamum tostum tundito ac terito. Et polentam non salfam, puram, tenuem accipito. Et erui quidem ac polentæ, amborū æqualis sit mensura, sesami vero tertia pars, lini vero dimidia vnus partis. Hæc in lacte caprino cocta quàm liquidissime absorbeat. Postea vero in prandium ipsi dentur cibi puri, & obsonia fortiora. Vinum autem idem bibat. Dato autem ipsi & centaureæ radices, ad has rupturas facientes, in vinū ipsas derauens. dato item dracontij radices in vinum derafas. Sed & tussis gratia, dracontium derafum in melle delingendum dato: Et si decoctum in lacte asseuerarit se sorbere non posse, lac bubulum quàm plurimum bibat, tertia parte aque mul-
 B sæ ammixa. Atque sic celerrime sanus erit. Morbus autē curatione multa opus habet. Est enim difficilis. Si enim curatus & sanus factus nō seipsum custodierit, plerisque reuertens morbus interitus causa fit. hic si quidem ab hac curatiōe sanatus fuerit, satis est: Sin minus, ipsum lacte crassificato, &
 C in pectore, & in dorso vrito. Si enim successerit vstio, fugæ morbi spes est. Si vero arteria conuulsa fuerit, aut aliqua vena ex his quæ ad pulmonem tendunt, hæc patitur. Ab initio quidem morbi, tussis acuta obtinet, & rigor, & febris. & saliuam expuit multam, atq; & spumofam, aliquando vero sub cruentā. & dolor caput ac collū detinet. hic morbus fortior est priore. & vsque ad decem primos dies talia patitur. Postea plerique vndecima die pus crassum violenter expuunt. Decimaquarta vero die puriora expuit, si euasurus est, & dolore minus vexatur, & breui sanus fit. Si vero morbus diuturnus futurus est, tunc & pus multo amplius expuit, & reliquus dolor multo amplior in corpore inest. Calores autem debiliores habet quàm prius. Hunc si à principio acceperis, infra
 subpurgato scammonia succo, si non febricitarit. Post purgationem autem accipiat ea quæ prius, & alia eadem assumat, quieto quàm maxime corpore, & molliter cubet. & hæc quidem ab initio faciat vsque ad decem dies. Si vero pectore suppuratus fiat, eadem quæ etiam prius faciat. Si vero sanus fiat, ab his cibis ac potibus abstinere oportet, ab acidis, & acris, & salis, & pinguib*. Alabore item ac iisdem à quibus prior, abstineat. Hæc si fecerit, celerrime à morbo liberabitur.

*Sorbitio
que.*

Curatio.

*Arterie
lancinatio*

Medela.

C iij Si vero

HIPPOCRATIS LIBER

*Pulmonis
morbus un
de fiat.*

Medela.

*Pus seca-
tiōe usio-
nēue edu-
citur.*

Si vero quid horum non fecerit, rursus reuerso morbo peri-
clitabitur, & morbus peior erit. Nam multi rupto pulmone
vitam degunt, donec moriantur. Hunc si non statim quis cu-
ret, recidiuāte morbo postea non habueris quo prodesse pos-
sis, nisi hæc feceris. Lacte bubulo crassefactum, in pectore &
dorso vrito. Si enim vstio successerit, pderis. Morbus autem
hic ex iisdem delictis fit, ex quibus etiam prior. Pneumo-
nis siue pulmonia, ab his maxime fit. Quum pulmo sanguine
in seipsum traxerit, aut pituitam falsam, & non rursus dimi-
serit, sed in ipso coacta ac compacta fuerint: ab his tubercula
fieri solent in pulmone & suppurari. Hic autem hæc pa-
titur. Ab initio & per totum morbum tussis acuta sicca ob-
tinet. Et rigor, & febris, & dolor in pectoribus & in dorso
incumbit. Aliquando etiam in latere. & erecta ceruice spi-
ratio vehemens incidit. hic vsque ad quatuordecim dies ta-
lia patitur. Sæpe vero etiam plures. Deinde erumpit pus, &
multum expuit. Sæpe vero etiam velut araneorū tunicas ex-
puit. Sæpe etiam subcruentum. Et si quidem depurgatus fue-
rit & breui gracilis factus pulmo, interitum effugit. Si vero
non adhæret, & per annum morbus tenet, & transmutatur,
vt aliās alia æger patiatur, huic in principio antequam pus
erumpat, hæc adhibere oportet. Quum febris remiserit, mul-
ta calida lauetur, & sorbitionibus multis vtatur. Ptisanæ suc-
cum coctum, melle ad coctum affuso, sorbeat. Et vinum bi-
bat dulce album, aut aquam mulsam coctam. Quum vero pus
expuere inceperit, eadem bibat, quæ prior suppuratus, & ci-
bis ac potibus, & obsoniis iisdem vtatur, abstinens ab acidis,
& acribus, & falsis, ac pinguib. Et à venere ac ebrietatib⁹, nisi
morbo comodum fuerit. Ex coloris autem inspectione æsti-
mandum est, qualibus opus habere videatur. Reliqua vero
eadem faciat. Bibat etiam lac bubulum, ac caprinum pro tē-
pore. prius autem subpurgetur lacte asinino cocto. Bibat etiā
equinum lac excolatum quotidie mane, poculi tres heminas
continentis mensura, si facere poterit. Si quidem igitur sic cu-
ratus melius habebit, satis est. & si non eruperit pus in pect⁹,
ipse seipsum curet, quietem quam maxime corpori exhibens,
& quæ comoda sunt sibi ipsi exhibens. Si vero erumpat pus in
pectus, qua parte tibi significationem de se præbere videbi-
tur, illic maxime sectione aut vstione facta, pus emittit mo-
di cum

A dicum primum. Reliqua vero eadem facito, quæ & in priore suppurato factò descripta sunt. Si in pulmone varix fiat, tussis sicca corripit, & rigor, & febris in principio quidè morbi valde vehementer, habet etià erecta ceruice spiratio. & dolor in capite còsistit. Et supercilia impendere vidètur. & tumor in faciem descendit, & in pectus, & in pedes. Sæpe vero etià in capite innititur. & præ dolore vbi is vexat, respicere non potest. & corpus subpallidum est, & venæ per ipsum tendunt flammeæ, aut nigræ. Huic quum sic habuerit, & dolor maxime premit, primum sanguis detrahatur. Deinde multa calida lauato. Et vbi sitis habuerit, Cyceonem in vino nigro austero quàm iucundissimo, æquali mensura aquæ mixtū, bibendum dato. Frigidum autem maxime bibere oportet. Sorbitionibus autem vtatur ptisanæ succo còcto, melle bono affuso. Hæc exhibere oportet in primis quatuordecim diebus.

Si vero diutius morbus teneat, & dolor amplior fuerit in corpore, & impotentia aderit, huic sic habenti eadem exhibeto, quæ ei qui pulmonem suppuratum habet, vbi quatuordecim dies præterierint. Hic morbus fit à labore, & atra bile. Quum venæ cauæ per pulmonem tendentes, sanguine aut atra bile impletæ fuerint, venulæ aliæ in alias rumpuntur, vt quæ in angustis sunt conclusæ, & exitum non habeant: & dolorem exhibent ac flatum in pulmone. Hic morbus difficilis est, & multa curatione opus habet, Alioqui ægrum non relinquit, & plerunque in multis simul commoritur. Si

*Morbi
caussa.*

C inflammatio in pulmone fiat, fit autem maxime à vinolentia, & gulositate, piscium capitonum, & anguillarum. Hi enim pinguedinem habent naturæ hominis infestissimam, Iam vero etiam factus est morbus à pituita, vbi sanguini mixta in pulmone influxerit. Accidit etiam ex carnis esu, & ex aque mutatione. Hæc igitur æger patitur. Tussit fortiter, & saliuâ expuit liquidam ac multam. Sæpe etiam crassam & albam, velut à raucedine, Et dolor premit acutus in pectora, & dorsum, & laterum mollitudinem ac latera. Et acidum eructat. Et ex pectoribus ac pulmonibus, velut venter murmurat. Et vomit pituitam acidam. & si id quod vomuit in terram effundas, radit terram velut aceto inaso. & dentes stupefcunt. & rigor ac febris, & sitis fortis detinet, & si quid pingue voluerit edere, exugitur ad viscera, & vomitum inducit. Et

*Pulmonis
inflammatio*

HIPPOCRATIS LIBER

cit. Et totum corpus torpor occupat. Quum vero reuomue-
rit, paulo leuior sibi esse videtur, postea vbi vespera diei ac-
cessit, venter sonitum edit, & tormine versatur, ac murmu-
Medela. rat. Huic quum sic habuerit, & tempestiuum esse visum fue-
rit, curationem sic adhibeto. Mel & lac, & acetum, & a-
quam, mixta in ollam infusa tepescacito, & origani capi-
tati ramulis agitato, vbi vero tepida facta fuerint, bibenda
dato, aut apprehensa lingua, sensim per fistulam infundito.
Deinde conuolutum quietem habere iubeto. Postea si vom-
itus succedat, prompte vomat. Si vero non succedat, irritatio-
ne per pennam facta vomat. & si quid pituita vomuerit, per
dies quinque idem faciat. hinc enim leuior euadet. Bibat au-
tem hæc exercitatus, si fieri poterit, & multa calida lotus. Sin-
minus, saltem lotus. postquam vero quinque dies præterie-
rint, mane ieiunus bibat in aqua mulla, aut vino mulso. fil-
phij succum, erui magnitudine: & allium comedat ac rapha-
nidas ieiunus: & meracum vinum insuper absorbeat nigrū,
aut album austerum. Bibat etiam inter cibum, & post cibum.
Cibis vero siccis, & carnibus caninis vtatur coctis, si rigor &
febris non apprehenderit. hic si à tali infusione per fistulam
in os, purgetur, satis est. Sin minus, sursum per veratrum ip-
sum purgato. Post purgationem vero farinae coctæ duas he-
minas absorbendas dato, melle affuso. Vinum vero idem bi-
bat aquosum. At si non in principio affueris morbo, lacte
ipsum crassefactum in pectore ac dorso vrito, ita enim ma-
vsio. xime à morbo liberari poterit. Si vero non fuerit vsus per-
manet, & non valde deficit, sed ad senectam vsque adhæret. F
Sæpe etiam commoritur, si non in primis quadraginta die-
bus mortuus fuerit. Quare multa quam maxime opus est cu-
ra. Et serum ac lac pro tempore bibat, bubulum & capri-
num, & asininum ac equinum. Sic enim facillime deget. Est
autem morbus difficilis. Si pulmo ab erysipelate intu-
pulmonis
erysipelas muerit, Hic autem tumor maxime à sanguine fit, quum
pulmo in seipsum sanguinem attraxerit, & susceptum te-
nuerit. Morbus autem hic æstatis tempore maxime fit: Hæc
igitur ab ipso æger patitur. Tussis incidit sicca, & rigor, &
febris, & erecta ceruice spiratio, & dolor fortis in pectori-
bus. & nares aperit, velut equus à cursu. Et linguam exe-
rit, velut canis æstate ab ardoris statu vsus. Et tumor de-
tinet

A tinet pectora . & parum loquitur . & rubor est in facie . & pruritus fert in corpore . & præ dolore decumbere non potest . Sed ipse seipsum anxius iactat . Hic in septem diebus moritur , Veruntamen in principio quum sic habuerit , per hæc curetur . Corpus quidem perfrigeretur , betis in aqua frigida tinctis , ac corpori impositis , in recenti maxime dolore . Aut lintea frigida aqua tincta ac expressa apponito . Et si quidem sic melius habuerit , satis est : Sin minus , terram figularem frigidam pro cataplasmate imposito . & sub dio decumbat . Sic enim tractatus sæpe septem dies effugerit . Quum autem septem dies præterierint , & dolor adhæserit , dolentem partem intus , cum oleo illinito , & tepesfactoria eadē quæ in pleuritide adhibeto : & potionem ad subpurgationem ipsi dato , ex peplio , & meconide , siue peplo , & grano cnidio . Et post purgationem , lenticulæ heminam absorbendam dato . Bibat autem aquam . Postera die multa calida aqua ipsum lauato , capite excepto . Postea origanum in aqua multa macerato , & bibendam dato . Potibusque quàm calidissimis utatur . Cibus autem accipiat eosdē quos & qui à pleuritide correptus est , si non febris adhæserit . Hic morbus grauis est , & pauci effugiunt . Si pectus & dorsum dirupta fuerint : Dirumpuntur autem maxime à labore , æger hæc patitur . Tussis obtinet acuta , & saliuam expuit aliquando subcruentam , & rigor & febris plerunque corripit . & in pectore , & in dorso , dolor inest acutus . & in latere velut lapis incumbere videtur , & à dolore perpetuo pungi , velut si quis acu stimulet . Huic quum sic habuerit , statim lacte in potu dato , pectus & dorsum inpurito . Et sic celerrime sanus erit . De cætero vero quietam maxime corpori vitam degat . Si quid enim laborarit , & aut currum , aut equum ascenderit , aut humeros oneri subdiderit , periclitabitur ne rursus morbus recidiuam faciat . Et si hoc contingat , periculum est ut corrumpatur . Morbus enim reuersus magis premit quàm ab initio . Si vero non fuerit vltus , iisdem ipsum curato quibus & suppuratum , sorbitionibus , & potibus , & cibis . In summa vero , quietem agat , & commodis cibis alatur , Si enim sic tractatus fuerit , celerrime sanus erit . Morbus autem grauis est . Si in latere tuberculum nascatur , & suppuratus fiat , hæc patitur . Rigor tenet & febris , & tussis sicca per multos dies . Et dolet latus . & ad mam-

*Medela.**Curatio.**Pectoris
scapularis
ut scissura**Tuberculi
lateris.*

HIPPOCRATIS LIBER

Curatio. ad mammam, & ad claviculam, & ad scapulas, dolor impetum D
facit. Hic quum sic habuerit, in primis decem diebus sorbiti-
onibus vtatur, ptisanæ succo cocto melle affuso, quum sorbi-
tio cocta fuerit. Vino autem vtatur albo, dulci, aut austero, &
aquofo. Et vt vinum saepe sorbeat, ac expuat iubeto. Et à som-
no impedito, donec vndecim dies præterierint. Post hos dies
cibis paucissimis vtatur, carnibus catulinis aut galli calidis.
Oportet autem ipsas probe cum iusculo præparare, & iusculum
absorbeat. Et sorbitionibus prius quàm cibo vtatur. & ne fi-
tiat, donec latus suppuratum fiat. Suppuratur autem maxime
in quadraginta diebus, aut paulo prius. Hoc autè cognosces.

*Puris emis-
sio.* vbi suppuratum fiat latus. Pus enim non expuit, neque reuo-
mit. Hunc quum sic habuerit, vbicunque tumor significatio-
nem de se præbuerit, secato aut vrito. Et postea pus paulatim
emittito. Et postquam exhauseris, linamentum crudi lini im-
mittito & hoc postridie rursus exempto, paulatim pus exhau-
rito. Deinde rursus linamentum indito, & rursus tertia die, &
aliis deinceps, bis per diem exhaurito, donec resiccatum fue-
rit. Dato autem & cibos & obsonia, si admiserit. Et bibat mo-
dicum non multum, siue vinum, siue aquam. Edat etiam ori-
ganum tenellam plurimam melle tinctam. Si vero tenellam
non habeat, siccam tritam & melli ammixtam plurimam ex-
hibeto. Et neq; frigeat, & balneis lauet, & molliter cubet. Et
sic hunc morbum curans, celerrime sanum feceris. Quum au-
tem sanus euaserit, vitet frigus, calorem, solem. Et deambula-
tionibus modicis vtatur post cibum, vt ne lassitudo corpus
corripiat. Hæc faciens sanus erit. Ex his morbis quos-
cunque vsseris, statim post vssionem, porrum multum tritum
super vsturas imponito, & per diem vnā finito. Tres sunt

*Tabis tres
species.* tabis species. Prima quidè fit à pituita. Quum enim caput pi-
tuita impletum ægrotarit, & calor accesserit, pituita in capite
computrescit, vt quæ moueri non potest vt decedat. Postea
quum crassæ factæ fuerint & putrefactæ ac superexpletæ ven-
ulæ, fluxio in pulmonem fit. Et pulmo vbi suscepit, statim
ægrotat, vt qui à pituita mordetur quæ falsa est ac putrida.

Hæc igitur æger patitur. febris debilis inuadere incipit, &
rigor, & dolet pectora ac dorsum. Aliquândo etiam tussis pre-
mit acuta, & expuit salinam, multam & liquidam ac salinam. Et
hæc quidem in principio morbi patitur. In progressu vero
corpus

A corpus attenuatur, cruribus exceptis, hæc enim intumescunt. & pedes & ungues contrahuntur. ex humeris autem tenuis & debilis est, & fauces velut lanugine implentur, & velut per arundinem sibilat: & fortiter sinit per totum morbum: & multa impotentia corpus habet. Hic quum sic habuerit, in anno corruptus male perit. Verum studium quàm maxime adhibere oportet, ac reficere. Et primū quidem veratrum bibendum dare, infra autem subpurgare epithymo, aut peplio, aut grano cnidio, aut tithimalide. Hæc quater in anno dare oportet, sursum bis, deorsum bis. Dandum est & lac asinum coctum ad subpurgationem, aut bubulum, aut caprinum. Bibat etiam crudum lac bubulum, tertia aquæ mulsæ parte ammixta, per

*Medela
que.*

B quinque & quadraginta dies, ammixto etiam origano: Caput autem ipsius prius purgetur, pharmaco ad nares appposito. Ci baria autem & obsonia dentur, neque pingua, neque nidorosa, neque valde acrida. Hæc autem morbum obseruando facere oportet, & deambulationibus ad cibos uti, obseruando ne frigeat. Hyeme vero iuxta ignem habitationem faciat. Vinum autem bibat austerum, nigrum, quàm vetustissimū ac iucundissimū, verum modicū. Et si tibi visum fuerit, ante pharmacum fomentum adhibeto, & sic pharmacum dato. Si vero dare nolueris, facto fomento, vomitum ex cibis facere cogito, velut prius scriptum est. Huic si commodæ fuerint, deambulationibus vtatur. Si vero non conducant, corpore quàm maxime quiescat. Hic hoc modo tractatus, facillime in morbo deget. Est autem morbus lethalis, & pauci hunc effugiunt. Secunda tabes fit à labore. Eadem autem æger patitur quæ & prior. Morbus autem hic magis priore quiescit, &

*Tabes se-
cunda.*

æstate remittit; Saluam vero exspuit crassiorē priore, & tussis premit maxime senes, & dolor fortior est in pectoribus, & velut lapis incumbere ipsis videtur. Dolet etiam dorsum. Et color ipsius limpidus existit. & si quid laborarit, flatus & anhelatio oboritur. Hic ex hoc morbo in tribus annis maximo moritur. Curare autem oportet iisdem, quibus etiam priore.

Hic morbus multis adhæret vsque ad tres annos, sed moriuntur. Estque morbus grauis. Tertia tabes. Ab hac hæc patitur. Medulla ipsius spinalis sanguine plena fit. Tabescit autē similiter & à cauis venis. Hæc vero pituita hydropiformi, & bile replentur. Patitur autem eadem, ab vtris tandem tabescat.

*Tabes ter-
tia.*

Et homo

HIPPOCRATIS LIBER

Et homo statim niger fit ac subrumidus. Et partes sub oculis pallidæ sunt. Et venæ in corpore pallidæ distēte sunt, quædā vero valdæ rubicundæ. Maxime autē manifestæ sunt, quæ sunt sub alis. Et spuit pallida, quæ vbi ipsum inuaserint, suffocāt: & tussire volens aliquādo non potest. Quandoque autē præ suffocatione & tussendi cupiditate, bilem aceruatim vomit, ali quando vero pituitam. Sæpe vero etiam cibos quum comederit. Et vbi reuomuit, leuior sibi esse videtur. Deinde modico tempore interposito, in iisdem doloribus iacet. Hic etiā acutius loquitur quàm quū sanus esset. Et rigor ac febris interquiescens, rursus sudorosa corripit. Hunc vbi sic habuerit, cibis & sorbitionibus, & potibus ac pharmacis, & reliquis omnibus curato, velut priores. Morbus autem, durat maxime annos nouem. Postea durat dum corrumpitur. pauci vero ex ipso effugiunt. Grauis enim est morbus. Si vero voles, sic ipsum curato. Primum fomentum adhibeto, & vbi fomentum adhibueris, postridie aquæ mulsæ dimidium congiū ipsi bibendum dato modico aceto affuso. & hæc citra respirationem bibere iubeto. Deinde stragulis ipsum ad multum ac quàm longissimum tempus contegito. Si vero non sustineat, & euomere velit, vomat. Si vero vomitus non sequatur, tempore iam aliquo interposito, aquæ tepidæ poculo magno superingesto vomat, irritatione per pennam facta. Quum vero euomuerit, vt bene habeat, quietē agat per hunc diem. Vbi autem cœnæ tempus fuerit, cœnet mazam modicam, & obsonium habeat, salsamentum & porrum. Hæc autem quàm plurima edat. Vinum vero bibat dulce. Reliquo tempore per totam diem, exordio mane facto, multa calida lauetur. & post balneum cauere oportet, vt ne frigescat, sed decumbens plurimo tempore dormiat. Quum autem à somno surrexerit, viginti stadia minimum circumeat illa die. In aliis autem diebus alia quinque stadia prioribus addens vadat, singulis diebus additione facta, donec ad centū stadia perueniat. Ventrē vero quotidie subpurgare oportet, succis betæ, & à brassica, ita vt vtræque seorsim coquas, & de vtraque congiū excoles. Deinde adipis à rhenibus detracti minæ quadrantē ammisceas ac simul coquas, in vtrisque succis diuisim facta coctura. Quum autem bibere voluerit, ad brassicæ quidem succū, salem adiicito. Ad betæ vero succū, mel affundito. Licet autem seorsim vtranq;

Curatio.

- A** vtranz; bibere : Aut melle in alterum poculum affuso bibat, in alterum vero immisso sale . Ebibere autem oportet totum succum, & hæc facere per triginta dies. Secundo vero mense *Secundus mensis curatio.* edat panem, & carnes pingues suillas coctas, aliud vero nihil. Vinum autem bibat album, austerum, & iter faciat, non minus stadiorum triginta ante cœnam. Post cœnam vero decet. & ne frigeat, sed contegatur. Hæc si fecerit, leuius morbum feret. Tertio autem mense cyceonem floridum bibat, apij radices, & anethum, & rutam, & mentam, & coriandrum, & papauer tenerum, & ocimum, & lentē, & mali punici dulcis & vinosi succum. Oportet autem dulcis duplam mēsuram esse, ita ut vtriusque succi simul sit hemina dimidiū, & vini nigri iucundi austeri hemina dimidium, & aquæ hemine dimidium. *Tertius.*
- B** Postea flores triti in hoc diluantur permixto, & in poculum infundantur. Et postea farina erui acetabulum adiciatur, & polentæ tantundem, & casei veteris caprii rasi tantundem, & hæc permixta ebibat. Deinde modico tempore interposito prandeat panem, & obsonium habeat, frustum torpedinis, aut squatinæ, aut galei, aut raie. Et carnes suillas edat coctas & crasse faciat serpsum, quietem quam maxime agens. Et decimo quoque die fomentum sibi ipsi leuiter adhibeat. Quarto autem mense, quinto quoque die leuiter fomento utatur. *Quartus.* Et edat obsonium plerimum. Sint autem obsonia, caseus, & carnes ouillæ coctæ paucæ. Et iter faciat per stadia, velut antea dictum est. Et prima quarti mensis die, initio à decem stadiis factio eat, & quotidie addat, donec octuaginta stadia fiant. Et deambulet in die stadia octuaginta. Ante cœnā, triginta. Post cœnā, viginti. Mane, triginta. Reliquo vero tempore victu utatur, mazā & panē vtranz; edens. Et obsoniū habeat, chartilaginea. Sed & carnes oēs edat, exceptis bubulis ac porcinis. A piscibus autem his abstineat, à mugile, anguilla, & melanuro. Edat autē torpedinē, squatinā, raia, galeū, pastinacā, & ranas: Ex aliis nihil. Si vero videatur innoxius esse, etiā cyceonē bibat. Postquā autem dormire voluerit, bibat de vino nigro iucundo, veteri, poenulū duarū heminarū. Et per diē eodē vino utatur inter cibū. Et in die iter faciat per stadia centū quinquaginta: Ante cœnā, nonaginta. Post cœnā, viginti. Mane, quodraginta. Hic hoc mō curatus, in anno sanus euadit. Resiccat *Medulla sine curtes fuerint arefcet.*

HIPPOCRATIS LIBER

tes fuerint obturata, itemq; ex cerebro accessus. Propter cor-
 poris autem afflictionem hæc patitur, & ægrotat. Resiccatur
 etiam à venere. Hæc igitur patitur. Dolor acutus incidit ipsi
 in caput, & in collum, & in lumbos, & in lumborum musculos,
 & in articulos crurum, vt aliquando flectere non possit. Et
 sterco non secedit, sed sistitur. Et vrinæ difficultate vexatur.
 Hic in principio quidem morbi quietius degit. Quanto autē
 magis tempus morbo prolōgatur, tanto magis omnia dolet.
 Et crura velut ab aqua inter cutem tumēt. Et vlcera à lumbis
 emergunt, & alia quidem sanescunt, alia vero nascuntur. Huic
 quum sic habuerit, caput purgato, hippophais succo, aut cni-
 dio grano, corpore prius valde bene foto. Vespero vero post
 purgationem, ptisanæ duas heminas sorbeat, melle affuso. Vi-
 num autem bibat album molle. Postera die asinini lactis co-
 cti, melle affuso, octo heminas ebibēdas ipsi dato. Si vero as-
 ninum non habeas, bubuli aut caprini cocti tres semicōgios,
 melle affuso. Et dum temporis opportunitas adest, lac bibat,
 sero & lacte vtens, per quinque ac quadraginta dies. Cibis au-
 tem & obsoniis vtatur quāmm axime per aluū secedentibus.
 Vinum bibat album, molle, Mendesium. Quum autem cras-
 sissimus fuerit, in lumbos ipsius ab vtraque verticulum parte
 crustas quatuor inurito, & in dorsum vtrinque quindecim.
 & in ceruicem duas, inter tendines. Si enim vstio successerit,
 sanum facies. Est autem morbus hic grauis. Quatuor morbi à
 rhenibus fiunt, A primo hæc patitur. Dolor acutus incidit in
 rhenem, & in lumbos, & in testem secundum rhenem situm.
 Et frequenter mingit, & adstringit paulatim ac supprimitur
 vrina, & cum vrina procedit arena. Et vbi per vrinæ meatum
 exit arena, dolorem fortem in meatu exhibet. Quum autem
 ipsam per vrinam eiecerit, dolor remittit. Postea vero rursus
 in iisdem doloribus iacet. Quum autem mingit, etiam colem
 præ dolore fricat. Vulgus autem medicorum quod non intel-
 ligit morbum, vbi videt arenam, putat vesiccam è calculo la-
 borare. At non vesica, sed rhen lapide laborat. Hic morbus fit
 à pituita, quum rhen susceptam in seipsum pituitam, non rur-
 sus dimiserit, sed in ipso in tosum concalluerit, & fiunt ex ea
 tenues lapilli, velut arena. Huic quum sic habuerit; cum sca-
 moniæ succo aut ipsa radice, fomento prius adhibito, totum
 corpus purgato, postera vero die duob' congiis succi ciceris
 albi

Medela.

Vstio quæ

*Rhenum
 morbi qua-
 tuor.*

*Medicorū
 error.*

*Calculi
 causa.*

Medela.

A albi subpurgato, quem sale iniecto bibendum dabis. Post hæc potibus, & cibis, & balneis curato, & eadem quæ in vrinæ stillicidio exhibentur pharmaca dato. Quum autem dolor presenserit, multa calida lauato, & tepefactoria qua parte maxime dolet adhibeto. Quum autē intumuerit & eleuatus fuerit, sub id tempus iuxta rhenem secato, & extracto pure, arenam per vrinam cientia sanato. Si enim sectus fuerit, fugæ spes est. Sin minus, morbus homini cōmoritur. Secundus rhenum morbus. Dolores fortiter premunt, velut in priore. fit autē morbus à labore, quum ruptæ fuerint venulæ ad rhenem tendentes, & postea rhen sanguine repletus fuerit. Hic vbi hæc patitur, cum vrina sanguinem mingit in principio morbi, deinde progressu temporis pus, hic si quietem corpore habuerit, celerissime sanus erit. Si enim quid laborarit dolores, multo magis obtinebunt. Quum itaq; suppuratus fuerit rhen, circa spinam intumescit. Hunc vbi sic habuerit, circa tumentem partem secato, profunda maxime sectione iuxta rhenē. Et si quidem successerit sectio, euestigio sanum facies. Si vero aberraueris, periculum est ne vlcus linamentis curandum fiat. Si autem cōcreuerit vlcus, venter intrinsecus à rhene suppuratur. & si quidem pus intus rumpatur, & ad intestinū rectum procedat, fugæ spes est. Si vero contigerit alterum rhenem, periculum est ne pereat. Curetur autem pharmacis, & iisdem omnibus, quibus & prior, & dietam eandem habeat. Hic morbus grauis est, & multi ex ipso ad tabem rhenalem deuenerunt.

*Secundus
rhenum
morbus.*

*Morb' hie
qualis.*

Curatio.

C Tertius rhenum morbus. Vrina prodit, velut à carnibus bubulis affatis succus. fit autem morbus ab atra bile, quum bilis in venas confluxerit quæ ad rhenem tendunt, & quum cōstiterit, exulcerat venulas & rhenē. Ab vlceratione igitur tale quiddam cum vrina procedit, Dolores autē hærent in lumbis, & in vesica, & inter anum ac pudendum, & in ipso rhene, ad modicum tempus. Deinde remittit dolor, & rursus acutus breui corripit. & in tenuem ventris partem aliquando dolor incidit. Huic quum sic habuerit, ventrem subpurgato, epithymo, aut scammonia radice. Bibenda vero eadem dato, quæ & ex vrinæ stillicidio laboranti. & quum dolor habuerit, multa calida lauato. & tepefactoria ad dolentem maxime locum adhibeto. & sorbitione vtatur farina cocta, melle affuso. & reliquo victu vtatur quàm maxime per aluum secedente. & vinū

Terti' rhenum morbus.

Medela.

D bibat

HIPPOCRATIS LIBER

*Quartus
rhenum
morbus.*

Curatio.

*Obsonium
obseruato.*

bibat album Mendaui mellei coloris. Aut aliud album iucundissimum probe temperatum. Hic morbus non valde deficit. & pro temporis opportunitate serum & lac bibat. Serum quidem ad purgationem. Lactis autem potum faciat in tempore per quinque ac quadraginta dies. Hæc si ita feceris, morbum in melius disposes. Quartus rhenum morbus. Morbus hic fit à bile & pituita, maxime tempore æstatis. fit etiam à venere morbus. Hic æger hæc patitur. Dolores premunt ipsum in lateris mollitudinem, & in lumbos, & in lumborum musculos: & patitur qualia solet mulier ex partu laborans. & non sustinet in sanam partem decumbere, sed valde dolet. & ex lateris mollitudine quedam pendere videntur, velut abrupta. Si vero pronus decumbat, non dolet. pedes & tibiæ ipsius semper frigent. Urina vero vix prodit, præ pituitositate & crassitudine sua. & si fueris ipsam ad modicum tempus depositam donec defederit, videbis subsidentiam crassam, velut farinam. & siquidem bilis præualuerit, subfuluam ipsam videbis. Si vero à pituita fuerit morbus, alba & crassa erit. & primum quidem in annum, aut paulo amplius aut breuius tempus, æger talia patiens perseuerat. Si vero prolongetur morbus, & magis dolet, & suppuratur. & quum suppuratus factus intumuerit, quæ maxime parte intumuerit, in rhenem secato, & pus emittito, & si quidem successerit sectio, statim sanum facies. Hunc quum sic habuerit, iisdem omnibus curato, quibus etiam priores. Et à principio morbi oportet & purgare, & ante subpurgatione fomentum adhibere, & balneis frequenter lauare. Vngatur item & magis calefiat, neque frigeat, & à sole abstineat. & neque venere vtatur. Hæc si fecerit, & non celerrime sanus euaserit, nihil noui est. Morbus enim est grauissimus. Si vero citra pharmaca curari velit, crassum ex diæta facere oportet, siue ex hoc morbo ægrotet, siue ex aliquo de prioribus, diuisis cibis quos edere solet in decem portiones, ita vt vna parte detracta, reliquas comedat. Obsonium autem habeat, carnem suis tritam. & ea die decem stadia deambulet. postera vero die & tertia vsque ad decem dies, portionem minus edat, & deambulet decem stadia aut plura singulis diebus addens. Quum autem ad vltimam cibi portionem deuenierit, etiam ad centum stadia iter faciat. & edat quidem vnam tantum portionem, & ea die centum stadia deambulet. Post cœnam autem viginti,

A viginti, mane vero quadraginta. Vinum autē bibat Mendegum album, austerum, atque hæc per tres menses faciat. postea reliquo tempore deambulationes imminuat, & cibos plures comedat, eodem modo additione facta velut detrahebat. Deambulationem vero detrahat vsque ad decimū diem. & postea quā maxime quietem habeat. & cibus puris alatur, & obsonia quā pinguiſſima habeat, & dulcia omnia ipsi commoda sunt. Ab oleribus autē, & acidis omnibus abſtineat, itemq; ab acris, & quæ flatum faciunt, Multa etiam calida lauet, & ne frigeat. Hæc si fecerit, celerrime sanus erit. A rhenū morbo corripit morbus magnus venarum cauarum, quæ à capite iuxta iugulum per spinam tēdunt, ad malleolum pedis externum, & ad intermedium magni digiti locum. Morbus hic fit à pituita & bile, quū in venas cōfluxerint. Venæ autē hæ sanguine plenæ sunt. Si igitur quid alieni in ipsis præter lapsum fuerit, ægrotant. Si dextram partem morbus corripiat, dolorē ex coxæ acetabulo in principio exhibere incipit. Quanto autem amplius tempus progressum & prolongatum fuerit, tanto acutior dolor infra descendit, & quum ad malleolum pedis externum, & ad magni digiti inter medium locum deuenit, rursus ad caput venire incipit, & vbi in ipſo vlcus cōstitit, fortiter premit, & homo caput sibi diffringi putat. & oculi pituita replentur, itemque totum corpus. huic quum sic habuerit, elaterium bibendum dato, aut thapsiæ radicem, aut veratri, aut succum scammoniæ. post purgationem vero eadē exhibeto quæ superioribus. Si vero ab hac curatione non desinat, lacte ipsum crassificato, & in scapulam dextrā quatuor crustas inurito. & in acetabulum coxæ dextræ, tres. & sub nates, duas: & in medio femore, duas: & supra genu, vnam: & supra malleolum, vnam. Hic vbi sic vltus fuerit, neq; sursum neque deorsum morbū procedere permittit. Si vero alicubi dolor ruptus visus fuerit, si quidem in crus incubuerit priusquā vratur, claudus erit. Si vero in caput, surdus aut cecus. Si vero in vesicam, prodit simul cum vrina sanguis maxime, per quadraginta dies. Verum si in vesicam eruperit, eadem pharmaca quæ & in vrinæ stillicidio dato. & si alicubi dolor congregatus fuerit, vrato. Vrare autem oportet carnosa quidem, ferro: ossa vero & neruosa, fungis. Cæterum ante hæc si in principio morbi accesseris, ista facere oportet. In potu exhibendū

Quam magnus morbus hinc fiat.

Medela. anceps.

Curatio.

D ij est vinum

HIPPOCRATIS LIBER

est vinum album Mendæum, aquosius, plurimum per diem, & inebrietur donec sanguis à naribus erumpat. Quam autè fluere inceperit, minimum tres & decem dies fluit. Vbi vero hi dies præterierint, non amplius inebrietur, neque vbi semel fluere inceperit. Bibat tamè paulo amplius vinum inter cibū, quo sanguis fluere possit. Iam vero quibusdam sedato sanguine, erupit in vesica, & prodiit sanguis ac pus. Si igitur eruperit, eadem pharmaca quæ & ex vrinæ stillicidio laboranti dato. Et de eodem vino plus bibendum exhibeto. Hic si ita cureretur, & cibos per aluum secedentes assumat, & obsonia eiusdem facultatis, citissime sanus erit. Morbus autem grauis est.

- Vena sinistra læsa.** Alius morbus à sinistra vena. Hic æger alta quidem eadem patitur, quæ etiam prior. Verum in splenem dolor acutus incumbit statim, & in principio morbi. Et si non intellexerit priusquam incubuerit, proflit in pulmonē. Huic per fungos crustas octo inurito, capita lienis quæ celerrime intercipiēs. Et ubicunq; alius dolor incubuerit vrito. Sic enim statim sanus erit. Si vero non fuerit vltus, sanus autem sponte fiat, plerisque post duodecim annos, morbus rursus reuertitur, & si splenem occuparit, multis aquam inter cutem inducit. Verum oportet statim curare velut priorē, & si visum fuerit vrere velut priorem, si dolor in iisdem articulis constiterit. Si vero non sic curatus fuerit, de cætero colliquescens moritur. Morbus enim
- Pituita.** grauis est. De pituita easdē sententias habeo, quas & de bile. & species ipsius multas esse puto. & alia quidem popularis est, quæ sanè recentissima est. Cuius etiā curatio facilima est.
- Curatio.** Vomitus enim post cibum facere oportet per duos aut tres dies, ita vt & prandeat insuper ac quiescat, si prioribus diebus semel in die cibum capere, & laborare solitus fuit. Sin minus, huiusmodi diætā vtatur. Primum multa calida lauetur, quum vomitum facere voluerit. & edat mazam oleo & melle subactam, & panem exassatum veterem. Hæc enim magis pituitā trahunt. Obsoniis autè vtatur & oleribus acribus. Sed & pingua, & dulcia, & acida omnia idonea sunt, vt permixta assumantur. Et oleribus omnibus viridibus vtatur. Et bibat inter cibum frequenter modicum vinum dulce, & in fine placentā insuper edat, & mel, & ficus. Et quū cœnabit, pocula large exhauriat. & vbi iam repletus fuerit, parū dormiat. Deinde expectectus vomat, magno vini poculo epoto, cum tepida aqua temperato.
- Vomitus qui.**

A temperato. Trahit enim magis pituitam & humorem ex car-
nibus, & corpus magis reficcat. Euomat autē donec ficus euo-
muerit. Hæ enim postremū euomuntur. Atq; hæc quidē hac
die faciat. postera vero contineat seipsum vsq; ad cœnam, &
in cœna sumat panem, cui nihil fursurum decessit. Obsonium
autem sit ex fortioribus. Vinum vero bibat nigrum, austerū.
Atque hæc quidem popularis pituitæ medela est. Si vero ede-
re & bibere potest, & cibus delectatur, deinde vero crura gra-
uentur, & color immutatus fuerit, huic ostendendum est, pi-
tuitam molestantem in ventre esse. Verum oportet quum sic
habuerit, mel & vinum dulce, & oleum, & nitrū tali ouilli ma-
gnitudine, permixta per clysterem infundere. hæc enim rei-
tissima sunt in clysterem ad hominis naturam. Mensuram au-
B tem singulorum esse oportet, vini quidem heminam, olei ve-
ro heminæ dimidium, & mellis rātundem. Si vero clysterem
non voluerit, humectū hominem facere oportet, fometo hu-
mido admoto. Fortassis enim etiā sic sterus subeuacuari po-
terit. Nam à ciborum nimia reficcatione hæc patitur. Siqui-
dem igitur quis edat cibos valde succosos, fortassis hæc non
ita vehementer patiatur. Si vero etiā aliquando patiatur, mo-
dica curatione opus habuerit. Hunc ita curans, celerrime sa-
num feceris. At si antiquior fuerit pituita, appellatur autē
hæc pituita alba, hæc patitur. Grauat hominem magis, & spe-
ciem à populari alienam habere videtur pallidiorem & totū
corpus laxo tumore intumescit, & facies rubet, & os ficcū est,
C & sitis tenet; & quum comederit, spiritus densus ipsi incidit.
Hic eadem die aliquando melius habet, aliquando derepen-
te dolet, & sibi mori videtur. Huic si quidem venter sua spon-
te turbatus fuerit, sanitati proximus erit. Si vero nō sua spon-
te venter turbetur, purgare oportet cneoro dato, aut hippo-
phæ, aut cnidio grano, aut lapide Magnesie. Et post purga-
tionē, lenticulæ hemina vna aut duæ dentur ad absorbendū.
Coquatur autem allium in lenticula. Detur etiā betæ pinguis
hemina non conditæ, polenta circuminspersa. Bibat vinum
nigrum, austerū, & forte. Postera vero die mane stadia vigin-
ti deambulet. A qua deambulatione reuersus, panē edat parū
exassatum, & obsonium habeat allium coctum. & de eodē vi-
no paulo meracius bibat. deinde stadia vadat triginta. & vbi
tempus aderit cœnet, quantum etiam prandere cōsuevit: ob-

*Quæ facile
subiungant.*

*Quæ ven-
trem mo-
ueant.*

HIPPOCRATIS LIBER

Que caro piscisue dandi. sonium autem habeat, maxime quidem pedes, & capita suilla. Sin minus, galli carnibus & suis tritis vtatur. Ex piscibus autem scorpio, aut dracone, aut cuculo, aut callionymo, aut gobio, aut aliis piscibus qui æqualem facultatem habent. Ex oleis autē solo allio, & nullo alio vtatur. Hoc vero quā plurimum edat, & crudum, & assatum, & coctum, semper plus singulis diebus. & laboret ex modico amplius, respectu ad cibos facto. hic morbus maxime fit tempore æstatis ex aquæ potu. Insuper & à somno multo. Iudicatur autem in triginta diebus an lethalis sit, aut non. Atque hæc quidem faciat vbi triginta dies præterierint. In primis autem diebus, sorbitionibus vtatur, lenticula cocta acidiorē ab aceto, & pitifana acida. Bibat aquam mulsam tepidam, polēta modica inspersa, quo corpus preparatū sit ad pharmacorum potum. Et his diebus sub diodormiat. & si tibi visum fuerit sanguinē à lumbis detrahete, cucurbitam affigito, & venas in scroto crassissimas secato. hic ita curatus citissime sanus fiet. A pituita maxime in aquam inter cutem trāsitus fit, hoc modo, pinguedo colliquefcit, & à calore qui in pituita est fit aqua. Cognosces autē hoc an quis sanari possit, aut non. Donec enim quis in pectine pinguedinem habet, fieri non potest vt ipsum sanes. Cognosces autem ex his maxime, an pinguedo insit in pectine, aut non. Si quidem febres succedant, & nō potest exurgere, & vmbilicus inflatus extra prominet, indicium est non amplius inesse pinguedinem, & sanabilem esse. Huic conducit ventrem siccare, & panem dare cui nihil furfurum decessit, antiquum calidū. Obsonium autem carnem leporinam, & canis perfecti, & ouiculæ, & suis assatam, & galli assatam ac calidā, & polypos edat coctos in vino nigro austero. Vinum autem bibat nigrum, austerum quā crassissimū ac acerbissimum. Piscibus autem vtatur, gobio, dracone, callionymo, cuculo, scorpio, & aliis huiusmodi, omnibus coctis, non recentibus, & frigidis. hi enim siccissimi sunt, & in iusculū ne intingat, & insulsi sint pisces. ex oleribus autē vtatur raphanis, & apio. Torreat autē lenticulā ab aceto acidiorē, & edat. Et deābulet quotidie, & post cœnā, & mane. & serotino tēpore dormiat, & mane exurgat. Et si quidē ab his restituitur, satis est. Sin minus, cneorū, aut hippo-phais succū, aut granum cnidiū, bibēdum dato. Et post purgationem, lenticulæ heminas duas sorbeat, & panē paruū come-dat. Vinum

Aqua inter cutem de pituita quā fiat.

Vitæ.

- A** dat. Vinum vero bibat nigrum, acerbum modicum. Bibat autem pharmacum bis in die, donec vacuus fiat. Si vero tumor confiterit in scroto, & femoribus ac tibiis, acuto scalpello multa & frequentia vulnuscula incutito. Et si hæc feceris, cito sanum efficies. *Aqua inter cutem ex his fit. Quum æstatis tempore siti vexatus aquam multam biberis: nam ex hoc maxime fieri solet: & pulmo expletus fuerit, rursus ad pectora dimittit. Et quum in pectoribus fuerit, calorem vehementem exhibet, ut pinguedo quæ in arteriis inest colliquescat. & si semel liquari pinguedo inceperit, multo amplius in breui tempore aquam inter cutem facit. Fit etiam si tubercula in pulmone fuerint enata, & aqua repleta, & in pectora rupta. Quod autem fiat etiam à tuberculis aqua inter cutem, testimoniū habeo, & in boue, & in cane, & in sue. In his enim quadrupedibus maxime sunt tubercula in pulmone, quæ aquam habet. Si enim dissecueris, citissime cognoueris. Fluet enim aqua. Videntur autem talia multo magis in homine fieri, quàm in pecoribus, quanto etiam morbosiore diætâ utimur. Facti sunt autem & multi pectore suppurati tuberculis obortis. Hæc igitur in principio ad morbum consequuntur. Tussis sicca, & fauces exasperari videntur. & rigor ac febris succedit, & erecta ceruice spiratio. & corpus intumescit, & pedes tument, & ungues contrahuntur. & donec quidem in superno ventre fuerit aqua intercus, adest dolor acutus. postquam autem ad infernum ventrem venerit, melius habere sibi videtur. Postea progressu temporis patitur qualia prius impleto ventre. Quandoque etiam ad latus intumescit, & indicat ubi secare oportet. Si vero non indicat, multa calida lauato, & humeris apprehensum concutito, & deinde in vitro latere magis fluctuet audito. Quo intellecto costam tertiam ab ultima usque ad os secato. Deinde cum terebra caua ultra perforato. Et ubi perforata fuerit, aquæ parū emittito, & ubi emiseris, linamentum ex crudo lino indito, & spongiam mollem superimponito. Deinde ut ne excidat linamentum deligato. Emittere autem per duodecim dies aquam oportet, semel in die. Post duodecimum autem diem sequenti decima tertia totam aquam emittere, & reliquo tempore si subnascatur aqua emittere, & ventrem cibus reficcare. Post sectionem autem hæc exhibere oportet. Succus silphij drachmæ pondus iij. dus pa-*

Aqua inter cutem unde.

Tubercula pulmonis.

Exemplo probat.

Purulentia etiam hinc sunt.

Curatio.

HIPPOCRATIS LIBER

dus parato, & aristolochiâ tali ceruini magnitudine deradi-
 to, & lentium ac erui torrefactorum polentam, dimidiâ choe-
 nicis mensura vtrunque purgato, atque hac melle & aceto
 subigito. Deinde pastillos sexaginta efformato, & quotidie
 vnum tritum in vini nigri austeri ac iucundissimi hemina di-
 midia diluito, & mane in potu dato. Reliquum vero victum
 ac laborem eundem, velut priori tempore, habere iubeto. Et
 si intumuerint pudenda ac femora, confidenter vulnusculis
 impactis pertundito. Hunc si ita curaueris, celerrime sanum
 facies. Ab hepate fit aqua intercus, quum in hepar pituita
 accesserit, & hepar ipsam susceperit, & humectû fuerit. Sta-
 tim igitur calorem huic exhibet, & flatum inducit. Deinde
 temporis progressu aqua impletur. Postea morsus in corpus
 incidit. Et tumor in tibiis ac pedibus inest, & hepar durû est
 ac intumescit, & clauiculæ attenuantur. Huic quum sic ha-
 buerit, in principio si hepar doluerit, organum tritum, & sil-
 phij succum erui magnitudine, in vini albi dimidia hemina
 diluta, bibenda dato. & lactis caprini poculum quatuor he-
 minarum, tertia aquæ mulæ parte ammixa. A cibis autem
 per primos decem dies abstineat. Hi enim iudicât morbum,
 an lethalis sit, aut non. Sorbeat autem ptisanâ succum coctû,
 melle affuso. Vinum autem bibat album Mendeum, aut aliud
 iucundissimum aquosum. Quum autem decem dies præter-
 ierint, cibos accipiat puros, & obsonium habeat, galli carnem
 assatam calidam. Habeat & catulinam coctam. Pisce vero vta-
 tur galeo, & torpedine assatis. Vinum vero idem bibat, & si
 quidem ab his quiescat, satis est: Sin minus, postquam sanè
 crassissimus factus fuerit, & hepar maximum, fungis vrito,
 Sic enim celerrime sanum feceris. Inurere autè oportet cru-
 stas octo. Si vero aqua intercus innascatur, & rumpatur in
 ventrem, isdem medicamentis & potibus, & cibis, ac labori-
 bus, quibus priores curato. Vinum vero bibat austerum ni-
 grum. Si vero tibi videatur discessisse ab hepate, per ferrum
 vbicunque apparuerit vrito, & aquam paulatim emmittito, &
 velut reliquos priores curato. Si vero ab his non sanus fiat,
 temporis progressu corrumpitur ac moritur. Morbus enim
 est grauis, & pauci hunc effugiunt. Aqua vero intercus à
 splene, hoc modo fit, & ab huiusmodi maxime causa, quum
 quis ficum viridium, & malorum fructus multos ederit. Mul-
 ti vero

*Aqua in-
tercus ab
h-pate.*

Curatio.

*Aqua in-
tercus a-
lia.*

*Alia à lie-
ne.*

- A** ti vero iam etiam à cibo botrorum multorum, & à multo multo, morbum inciderunt. Si quidem igitur in morbum collaberetur, statim in doloribus est. Dolores enim acuti in splene consistunt, trāseunt autem & in humerum, & in claviculam, & in mammam, & ad lumbos, & febres fortes tenent. Et si parum quid ederit, venter impletur, & splen attollitur, & dolorem exhibet. Hic morbus si durauerit, reliquo quidem tēpore minus dolet. Quum vero fructuum malorum tempus fuerit, & hos ederit, magis quàm prius dolet. Hūc vbi sic habuerit, à principio curato, & sursum quidem veratrum exhibit. *Medela.*
- B** so. & si quidem ab his restituitur, satis est: Sin minus, quū maximus fuerit lien, & maxime intumuerit, fungis vrito, capita eius intercipiens: aut ferramentis, cum multa cautione ac obseruatione ne vltra peruras. hāc à morbi principio facito, & hac diarta nutriatur. Si quidem febris non affuerit, pane vtatur triticeo assato, aut ex duro tritico bis cocto: obsoniū autem habeat salsamentum Gaditanum, aut saperdam. Et carnem ouillam tritam. Et acida ac salsa omnia edat. Et bibat vinum austerū Coum quàm nigerrimū, A dulcibus abstineat. Quum autem exsurgit, & potens est, luctetur summis humeris, & laboret per circuitus multos in die, & comedat ea quę dicta sunt. Si vero aqua intercus fiat, iisdem curato quibus & priores. *Alia aqua*
- C** faciens per viam lōgam, in aquam pluuialem ac stabilem inciderit, & biberit de ipsa multū assatim. Si igitur carnes absorbuerint & continuerint in seipsis aquam, secessus autem nusquam fiat, hāc patitur. Si quidem fuerit in carne, calorem facit & in ventre, & in corpore, vt pinguedo ventrem ambiēs colliqueſcat. hic quandiu quidem iter facit, nihil mali habere videtur. Postquam autem iter facere cessarit, & sol occiderit, statim dolorem multum habet. progressu vero morbi valde attenuatur. Si vero etiam cibi fastidium accedat, multo plus attenuatur. Si vero cibos edere poterit, & ad laborē impotens fuerit, etiam amplius læditur, & plerisque horum tumor in totum corpus deducitur. Et tenui quidem color corporis liuidus fit, & venter magnus, & fitis fortis tenet, & viscera ipsius à calore resiccantur. progrediēte vero tempore, *intercus.*
ad eden-

HIPPOCRATIS LIBER

ad edendum quidem promptus fit, & edit quodcumque quis **D**
 dederit, & bibit, & dolet nihil. Si vero tumor obtinuerit, co-
 lor huic fit pallidus. Et venæ nigræ frequentes per corpus di-
 stenduntur. Indignatur autem & tristatur ex quavis re, etiā-
 si nihil noui accadat. Venter vero aqua perhumescit, & ma-
 gnus fit, & laternæ speciem præ se fert. Et temporis progres-
 su cibos non admittit, sed videntur ipsi cucumeris syluestris
 odorē habere, præ abominatione. huic ubi sic habuerit, cneo- **E**
 ri aut hippophais succum dato, aut cnidium granum. hæc ve-
 ro pharmaca ita dare oportet. Cneorum quidem per sextam
 diem, Hippophais autem succum per octauam. Cnidium ve-
 ro granum per decimam. & dare ipsa oportet donec expur-
 getur, & vacu⁹ fiat. Interpositis autem diebus alatur ex iisdē
 quibus & prior. Maxime autem de eadem aqua bibendum da- **E**
 to, ex qua morbus corripuit, plurimum, quo ventrem ipsius
 turbet, & valde secessum faciat. Sic enim potissimum sanum
 facies. Si vero tibi videbitur, etiā frequenter clysterem ad-
 hibeto, ex cneori triti dimidia hemina, mellis tertia hemina
 parte ammixta, his cum quatuor succi betæ heminis dilutis,
 atque sic infusus. postera die etiam asinini lactis cocti octo he-
 minæ dentur affuso melle, aut adiecto sale potandæ. Et post
 purgationem, iisdem vtatur quibus prior. & interiectis die-
 bus, cibis ac potibus iisdem vtatur, & deambulationibus si-
 militer, & sic curatus breui à morbo liberabitur tertio men-
 se, aut sexto. Si vero negligentia aliqua contigerit, & nō sta-
 tim curatus fuerit, breui moritur. Sed & in attenuato iisdem **F**
 vtendum est ad sanationem. Præhumeſtare vero antea cor-
 pus ipsius oportet per fomenta, quo magis pharmacis obe-
 diat. At vero statim curam adhibere oportet: Sin minus, cum
 multis consenescit morbus. Sed & vter tandem morbus fit,
 clysterem ex his adhibere conuenit. Vini albi heminas duas
 accipito, & mellis heminam dimidiam, & olei heminam di-
 midiam, nitri Aegyptij rubri torrefacti quadrantem, fo-
 liorum cucumeris syluestris tusorum ac expressorum succi
 heminam. hæc omnia mixta & in ollulam infusa seſuefaci-
 to, & per clysterem infundito. Morbus hepaticus. Fit ab
 atra bile, quum influxerit ad hepar. Accidit autem maxi-
 me in autumnno, in mutationibus anni. Hæc igitur æger
 patitur. Dolor acutus ipsi in hepar incidit, & sub vltimas
 costas,

Curatio.

*Morbus
hepaticus.*

A costas, & in humerum, & in claviculam, & sub mammam. Et suffocatio fortis tenet. Et aliquando liuidam bilem reuomit. & rigor, & febris primis diebus debilior habet. & dum attingitur, hepar dolet, & color ipsius subliuidus est, & cibi quos prius comedebat, suffocant ipsum, & ingesti vrunt ac torquent ventrem. Atque hæc quidem in principio patitur. Morbo vero progrediente, & febres remittunt, & à paucis cibis repletur. In solo autem hepate dolor restat, & ipse aliquando fortis, aliquando quietus. Quandoque vero acutus corripit, & sæpe derepente ager animam efflauit. Huic cōducunt vbi dolor habuerit, tum alia, tum tepefactoria eadē apposita, quæ etiam pleuritidi. *Medela.*

B multa calida ipsum lauato. & aquam mulsam bibendam dato, & vinum album dulce, aut austerum, vtrum tandem profuerit. Et sorbitiones easdem quas etiam à pleuritide correpto. Cæterum ad dolorem hæc bibenda dato. Qui galinacei cocti liquorem terito, & succi solani dimidiam heminam affundito, & aquæ mulsæ dimidiam semiheminæ partem ammisceto, diluito, ac bibenda dato, & sedabunt dolorem, dato autem quotidie donec dolor quiescat. Bibat etiam silphij succum erui magnitudine, & cum eo origanum tritum in vino albo diluat, & sic ieiunus bibat. Bibat insuper & pharmaca quæ in pleuritide dantur doloris gratia. Bibat & caprinum lac, tertia parte mellis ammixta. Sint autem lactis heminæ quatuor. Hoc mane bibat, quum alia non biberit. *Suffocatio-
tionis me-
dela.*

C A cibis autem abstineat, donec iudicetur morbus. Iudicatur autem maxime in septem diebus, in his enim manifestum sit, an lethalis sit, an non. Si vero etiam suffocatio accesserit, hæc dare oportet quo vomat. Mel, aquam, acetum, salelem, permixta in ollam nouam infundito. Deinde tepefactoria, & origani capitati ramulis vnâ cum semine agitato. Vbi vero tepefacta fuerint, tepida ebibenda dato. Deinde stragulis iniectis contextum finito, donec quæ maxime exudarit. Et vbi vomitus ipsum apprehenderit, prompte vomat irritatione per pennam facta. Si vero vomere non possit, aquæ mulsæ tepidæ poculum duarum heminarum insuper bibat, & sic vomat. Et si quid pituitæ aut bilis euomuerit, rursus idem facere oportet ad horas quatuor. proderit enim. Post morbi vero iudicationem curato modicis cibis, iisque puris datis. & si quidem

E HIPPOCRATIS LIBER

quidem panem edere cupiuerit, panem calidum maxime pu-
rum edat. Si vero mazam, eam quæ vino dulci subacta non
est edat, vbi tamen prius aqua subegit. Obsonium autem ha-
beat carnes catuli coctas, aut columbæ, aut pulli gallinacei
carnibus, omnibus coctis vtatur. Ex piscibus autem galeo,
torpedine, pastinaca, & rais paruis, omnibus coctis. Lauetur
autem quotidie, & frigus vitet & parum deambulet antea in
securitate. Hæc si seruauerit non est timor vt morbus reuer-
tatur. Nā huiusmodi morbus grauis est ac diuturnus. Alius
hepaticus morbus. Dolores quidem eodem modo premunt
in hepar, & color differt à priore. Malicorij enim formam ha-
bet. In tempore vero ætatis maxime incidit. Fit autem à bu-
bulæ carnis esu, & vini potu nimio. Hæc enī omnia isto anni
tempore hepatis sunt infestissima, & bilem maxime ad hepar
adducunt. hæc igitur æger patitur. Dolores acuti incidunt,
& non deficiunt vlla hora, sed semper magis premunt. Ali-
quando etiam vomit bilem pallidam. & vbi vomuit, paulo
melius sibi habere videtur. Si vero non vomuerit, bilis ad o-
culos peruenit, & sunt valde pallidi. Et pedes intumescunt,
Atque hæc patitur quandoque valde, quandoque minus.
Quam autem dies præterierint in quibus morbus iudicatur,
dolor minus vrget, si nihil deliquerit, & eiusmodi dietam
huic constituere oportet, qualem & priori. Si enim inebria-
tus fuerit intempestiue, aut venere vltus fuerit, aut aliud quid
fecerit quod commodum non est, hepar statim ipsi durum
fit, & intumescit ac à dolore pulsat. Et si quid facere festina-
rit, derepente hepar & totum corpus dolet. huic vbi sic ha-
buerit, & primi dies præterierint, fomentum adhibeto. de-
inde scammonio subpurgato. Si vero venter combustus fue-
rit, clysterem ex iisdem quibus in prioribus vsus es adhibe-
to, quæ probe ducant. & post clysterem, lacte asinino cocto
subpurgato, octo heminis eius, melle affuso, in potu datis.
Dato etiam caprinum lac mane poculi quatuor heminas cō-
plectentis mensura, tertia parte aquæ mulsæ ammixta. Dato
item cocti lactis caprini heminas duas, tertia aquæ mulsæ
parte ammixta, aut ipso solo melle affuso. dandum est etiam
equinum lac, eodem modo velut asininū, & si quidem ab his
morbis curatus cedat, satis est: Sin minus, dextri cubiti in-
ternam venam secato, & sanguinem detrahito. Si vero non
visus

*Alius he-
paticus
morbus.*

Medela.

DE INTERNIS AFFECTIOIBVS. 215

- A** visus fuerit tibi per asininum lac subpurgandus esse, bubuli lactis crudi duas heminas dato, tertia aquæ multæ parte ammixta, quotidie ad dies decem. Deinde ad alios duodecim dies, sexta parte aquæ multæ affusâ, ad bibendum dato. De cætero vero ipsum lac duarum heminarum mensura, donec pinguescat exhibeto. Si vero neque sic desinat, vrere oportet, quum maximum hepar factum fuerit, & maxime eminuerit. Vrito autem per buxeos fusos, in oleum feruens tinctos. Apponito autem donec tibi bene habere, & vñtionem factâ esse visum fuerit. Aut per fungos octo crustas inurito. Si enim vñtio successerit, sanum facies, & reliquo tempore melius deget. Si vero non successerit, de cætero ab aliis sanus nõ tiens,
- B** corrumpitur ac moritur. Alius morbus hepaticus. Reliqua quidem eadem patitur hic æger velut priores. Color autem niger est. At hepatis fel, pituita & sanguine repletum, velut ratiocinamur, dirumpitur. & vbi diruptum fuerit, celerrime insanit, & indignatur, & loquitur stulta, & latrat velut canis. Et vngues punicei sunt, & oculis videre non potest, & pili in capite erecti stant, & febris acuta corripit. Huic eadem adhibere oportet quæ etiam prioribus. Plerique vero moriuntur. in vñdecim diebus, paucique effugiunt. Splenis morbus primus. Fit huiusmodi morbus, propter caliditatem solis bile commota, quum in seipsum bilem traxerit. Hæc igitur æger patitur. febris acuta in principio accedit. progrediente vero morbo remittit, excepto ipso splene, in quo semper calor hæret, & dolor aliàs atque aliàs incidit acutus, & in lateris mollitudinem, & in ventrem. Et cibos in principio quidem admittit, non autem valde secedunt. progressu autem temporis, & color pallidus fit, & dolor fortis irruit. & clauiculæ attenuantur. & cibos non similiter admittit, velut in principio, & à modico impletur. Lien vero alius magnus fit eadem die, & aliàs minor. huic quum sic habuerit veratrû purgans deorsum, bibendum dato, & cnidio cocco subpurgato. Ad vespærum autem post purgationem, lenticulæ acidioris heminam sorbendam dato: & betarum pinguium heminam polenta inspersâ. postera vero & tertia die panis paruum dato, pro obsonio autem lenticula vtatur, & carne suilla in lenticula cocta trita. Vinum bibat austerum. nigrum, paulo meracius. Et quietem his diebus habeat, nisi quod intus in

*Hepatis
tertius
morbus.*

Splenitis.

Medicis.

tus in

HIPPOCRATIS LIBER

tus in ymbra paululum deambulet. Reliquo vero tempore hæc exhibenda sunt. Cibus sit panis cui nihil furfurum decessit. Obsonium habeat carnem canis maioris, vel capræ, vel ouiculæ tritam. & salsamentum Gaditanum, aut saperdam. & acida ac salsa omnia assumat, & acerba. Bibat vinum Coum subastringens quam nigerrimum. à dulcibus autem & pinguibus ac nidorosis abstineat. & silphium non accipiat, neque allium, neque carnem porcinam. Neque mugilem, nec recetem, nec salsum, neque anguillam. Neque olas vllum coctum sine aceto. Ex troximis autem, hoc est his quæ cruda eduntur, raphanide vtatur & apio, in aceto tinctis. & polentam vino subactam edat. & vinum meracum sorbeat. Si vero velit, etiam panem in vinum interat, ac calidum edat. Dentur etiam pisces, scorpius, draco, cuculus, gobio, callionymus. Hos coctos & frigidos dato. Dato etiam quæ splenem attenuare possunt singulis diebus, asphodeli semen, aut visci folia, aut scenum Græcum, aut viticis semen, aut rutam, aut mentæ radicem. ex his quodcunque volueris tritum in vino austero dato ieiunio. Si vero adeò validus fuerit, per triginta dies ad ligna secanda cogito. & summis humeris luætur. & interdiu deambulet. & vespere dormiat. Mane vero surgat, & quæ relata sunt edat. Si vero ab his non melius habeat, splenem fungis vrito, decem magnis crustis inustis, quum maximus fuerit splen, & maxime eleuatus. Si enim successerit vstio facta velut oportet, sanum facies, verum non breui. Opus enim habet morbus curatione. Grauis est enim & diuturnus, si non fuerit statim curatus. Alius splenis morbus fit quidem ab iisdem à quibus & prior. patitur igitur æger ab hoc morbo hæc. Venter inflatur. postea vero etiam splen intumescit, & durus est, & dolores acuti in splenem incidunt. Color autem mutatur, & conspicitur niger, pallidus, malicorij speciem referens, & ex aure male olet, & gingivæ male olent, & à dentibus discedunt. & ex tibiis vlcera erumpunt, velut pustulæ nocturnæ. Membra vero attenuantur, & stercus non secedit. Hunc quum sic habuerit, iisdem pharmacis & eduliis, & potibus, & laboribus, atque aliis omnibus curato. & vbi stercus secedere noluerit, clysterem adhibeto, ex mellis hemina dimidia, & nitri Aegyptij magnitudine tali ouilli. Hæc trita in quatuor hominis aquæ de betis coctis diluito, & per clysterem

- A**sterem infundito. Si vero morbus ab his non sedetur, splenem ipsiusvrito velut prioris, & si vñtio successerit, sanum efficies. Alius splenis morbus fit, in anno, veris maxime tempore, verum à sanguine. Quum enim repletus fuerit splen sanguine, erumpit in ventrem, & dolores acuti in splenem incidunt, & in mammam, & in claviculam, & in humerum, & sub scapulam. Color autem corporis est plumbiformis. & parua vlcuscula velut lancinata in tibiis exurgunt, ex quibus vlcera magna fiunt, & quæ primum infraecedunt, sanguinolenta sunt & æruginosa. & venter durus subit, & splen velut lapis est, hic morbus magis lethalis est quàm priores, & ex ipso pauci effugiant. hunc quum sic habuerit, iisdem purgato quibus & priorem, veruntamen pharmacum sursum purgans ne dederis. Deorsum vero granum cnidium exhibeto. Et postera die etiam lactis equini cocti octo heminas dato, melle affuso. Si vero hoc non adfit, bubuli aut caprini eocti duos cõgios præbeto, ita vt alternatim mel in poculum ammiscetur, & vicissim bibantur. Ad vesperam autem post purgationem, eadem quæ priori dato. Et si visum fuerit, ab interna cubiti sinistri vena sanguinem detrahito. Reliquis autem diebus quotidie ieiuno lactis bubuli quatuor heminas dato, terriæ muricæ parte ammixta. Cibis vero & potibus & aliis omnib⁹ iisdem curato, quibus & priorem. Abstineat autem à venere, & ebrietate, hic velut prior. Et si videatur etiam vrito, quum crassissimus & maximus splen factus fuerit. & si opportune visseris ac successerit, sanum facies, Si vero ab hac curatione sanus non fiat, tempore corruptus moritur. Est enim morbus valde grauis. Alius splenis morbus. Accidit & hic morbus vere maxime, quum splen pituitam assumpserit in seipsum, & statim magnus factus fuerit ac durus, & deinde rursus sedatur. Et quum quidem eleuatus fuerit, dolores incidunt acuti. Quum vero mollis fuerit, doloris exors est. Et vbi diuturnus factus fuerit morbus, obscurior esse videtur. & insurgit, & cito sedatur. Hic quum sic habuerit, in principio morbi cibos admittere non potest, & cito attenuatur: & corpus impotentiam multam habet. Morbus autem si non statim curatus fuerit, aut sua spõte quieuerit, interpositis quinque aut sex mensibus, rursus insurgit. Intermittit autem maxime per hyemem, huc si in principio acceperis, decem cras

*Lienis tertius morbus**Medela**Lienis quartus morbus*

HIPPOCRATIS LIBER

*Lienis
quintus
morbus.*

Medela.

*Regius
morbus
primus.*

Medela.

stas in splenem vrito, & statim sanum facies. Si vero non vferis, iisdem pharmacis curato, quibus & priores. Et alius item iisdem, & potibus, ac laboribus, Sic enim celerrime sanum feceris, huius autem color fit exalbidus, subpallidus, & squalidus. Alius splenis morbus. Fit autumnō maxime ab atra bile. Fit autem ab olerum multorum quæ cruda eduntur esu, & ab aquæ potu. Patitur itaque æger hæc. Quū morbus corripuerit, splenem vehementer dolet, & rigor & febris apprehendit, & inedia ipsum habet, ac cibos auersatur, & corpus cito concidit. Splen autem, magnus quidem non valde fit, verum durus, & ad viscera allabitur, & adhærens fugit. Hunc quum sic habuerit, iisdem pharmacis & eduliis ac laboribus quibus priores curato. Et si se tibi exhibuerit, vrito ipsum eo modo quo etiam alios. Hic morbus in plerisque si statim curatus fuerit, breui decedit. Quatuor morbi regij. primus quidem æstate maxime corripit, bile commota. Consistit igitur bilis sub cute, & in capite, quare statim corpus in alium colorem mutat, & fit pallidum, velut malicorium. Et oculi pallidi fiunt, & in capite sub pilis velut cortex subest, & rigor ac febris corripit, & pallidum vrinam mingit, & crassum subpallidum in ipsa subsidet, & mane quā diu ieiunus fuerit, ad cor & viscera exugitur, & si quis ipsum alloquatur aut interroget, ægre fert, & anxius fit, & non sustinet audire. Stercus autem excretum cum pallore albicat, & male olet. Hic quum ita habuerit, maxime moritur in quatuordecim diebus. Si vero has effugiat, sanatur. Curare autem oportet ipsum sic. Quum febris remiserit, multa calida lauato, & aquam mulsam bibendam dato. Et sorbitionibus vtatur, ptisanæ succo, melle affuso. Mel autem non simul coquito, donec præterierint quatuordecim dies. Hi enim iudicant an lethalis sit morbus, aut non. postea vero bis in die lauato, & nutrito primum modicis quæcunque maxime admiserit. postea tamen plura dato. Vinum bibat album plurimum per diē. & si progressu temporis videatur tibi pallidus esse & debilis, vomitum a cibis facere iubeto, velut in superioribus morbis habetur. Et si quidem ab his morbis quiescat, satis est: Sin minus, veratrum bibendum dato. Post talem autem purgationem, ad vesperam edat mazam mollem, aut panis medullam. Obsonium vero edat, pullum gallinaceum percoctum, probe

A probe cōditum cum cepa, coriandro, casco, sale, sesamo, & vna passa alba. Vinum autem bibat album, austerum, vetustissimum. Aluum vero infra subpurgato, postera die succo cicerum alborum, melle affuso, vtatur, & duas heminas eiusmodi succi ebibat. Tertia vero die initio facto, singulis diebus hanc aquam bibat, ex his rebus coctam fœniculi radices tenues ea copia quanta tribus digitis comprehendi potest, in duos aquæ congios mittito, ac coquito vsque ad dimidias. Et cicerum alborum chœnicen, in duobus aquæ congiis ad dimidias item coquito, & quod superest excolatum sub dio per integram noctem exponito, & ambo hæc decocta miscero. Cum hac aqua & vinum temperatum bibat, & ipsam aquam
 B solam si velit, quàm plurimam bibat: & aliam aquam non bibat. Si vero hanc potionem non admiserit, aliam sic præparatam dato. Caricarum albarum chœnicen in duobus aquæ congiis coquito, excolato, & sub dio per integram noctem exponito. postea hanc aquam bibat, siue nudam ipsam voluerit, siue cum vino mixtam. Bibat autem non acervatim multam, sed pro vna vice dimidiam heminam, vt ne alui profluuium ipsi succedat. & modico tempore interposito rursus bibat. Commoda autem sunt & hæc in potu data ieiuno singulis diebus, trita & in vini veteris albi hemina diluta, apij semē, cucumeris semen, fœniculi semen, cuminum Aethiopicum, adiantum, coriandrum herba, vna passæ albæ. His & illis in potu acceptis vtilitatem percipiet, & celerrime sanus fiet.

C Alius morbus regius siue arcuatus. Hic corripit tempore hyemis, & ex ebrietate & rigore. Incipit autem primum rigor inuadere, postea etiam febris detinet. Et humor qui est in corpore, congelatur in cute. Quod autem sic habeat, ex his ostenditur. Liuidum est ipsius corpus & subdum. Et venæ per corpus distentæ sunt pallidæ. maiores autem & crassiores sunt quàm prius. Et aliæ venæ subnigriores distentæ sunt. Et si quis aliquā ipsarum secet, sanguis effluet pallidus, si pallidæ sunt venæ. Si vero nigræ fuerint, niger sanguis effluet. Et vestē interiorem corpori adiacentē, præ pruritu nō sustinet. Hic promptus est ad iter faciendum & ambulandū, sed præ debilitate crura labascunt, ac ipsum non sufferunt, & sitit vehementer. Hic morbus non minus priore lethalis est. Procedit autem ad amplius tempus, si non in primis diebus
 E sanus

Secūdus.

Quales in hoc morbo venæ.

HIPPOCRATIS LIBER

Medela-
que. fanus fiat . Si vero morbus prolongetur , & ad octauum aut
 nonum diem duret, in morbum incidit , & morbus , & dolor
 magis premit , & exurgere non potest . Et plerique in hoc
 tempore statim pereunt . Huic ubi sic habuerit , si quidē prin-
 cipio morbi accefferis , quum iam septem dies præterierint ,
 veratrum bibendum dato . Ventrem vero infra subpurgato
 per succum, velut priori . Et alia eadem pharmaca dato . Ex-
 hibeto & cantharidas, sine alis, & capite, quatuor tritas , & in
 vini albi hemina dimidia dilutas , modico etiam melle affu-
 so . Atque has bis aut ter in die bibat . Progrediente vero mor-
 bo, balneis & fomentis curato . Edat autem quæcunque ad-
 mittit . Vinum bibat album, austerum , & alia eadem assu-
 mat quæ prior . Hic morbus diuturnus est & gravis, si non ab
 initio probe fuerit curatus . Alius morbus regius . Popu-
 laris appellatur hic, eo quod omni tempore corripit . Fit au-
 tem à repletionem maxime ac ebrietate . & postquam rigue-
 rit, statim sanè corpus immutatur , & pallidum fit , & oculi
 pallidi valde sunt . Et sub pilos ac sub ungues morbus proce-
 dit . Et rigor ac febris debilis tenet . Et debile est corpus , &
 in capite dolor adest . Et pallidū ac crassum mingit, hic mor-
 bus minus lethalis est prioribus . & curatus breui sanatur .
 Huic quum sic habuerit, cubiti venam secato , & sanguinem
 detrahit . Deinde fomento adhibito , elaterium bibendum
 dato . Tertia vero die rursus infra subpurgato , cum lacte asi-
 nino . Reliquas vero sorbitiones , & potus , ac edulia, eadem
 dato quæ priori . Et caput ipsius frequenter purgato . & de
 succo bibendum dato . Et multa calida ipsum lauato , ac car-
 nem defricato , & defricatas sordes in vino albo bibendas
 dato . & ad alia omnia iisdem vtatur . & breui sanus euadet .
Curatio.
Quartus. Alius morbus regius, fit quidem à pituita , hyeme autem
 maxime corripit . & color ipsius ægri est albus , & pectora
 ipsius pituita plena fiunt . & spuit saluam . & quum excreat,
 singultus ipsi oboritur . Et album lotium ac crassum mingit,
 & in vrina subsidet, velut farina . Hic morbus non est lethali-
 sis, & breui sanatur . Huic quum sic habuerit , cnidium gra-
 num bibendum dato . Et post purgationem , succi ptisanæ
 quatuor heminas, melle affuso, exorbendas dato . Superio-
 rem vero ventrem vomitu inducto , velut in prioribus pur-
 gato . Sic enim facillime pituitam à pulmone & arteriis ab-
 duxeris .

- A** duxeris. Sed & gargarismum ipsi frequenter preparato. Hic aliquando etiam febricit debili febre, & horror tenuis succedit. De cætero vero iisdem quibus priores curato, & pharmacis, & fomentis, & balneis, & eduliis, & potibus, & sorbitionibus. Sic enim maxime sanum facies. Morbus Typhos vocatus. Typhos quidem appellatur hic morbus, hoc est stupor attonitus, corripit autem tempore æstatis, quum canis sydus oritur, bile per corpus commota. Statim igitur ipsum febres fortes tenent, & calor acutus, & à gravitate debilitas, & crurum ac manuum impotentia: maxime enim inutilia ipsi fiunt hæc membra, & venter turbatur, & quæ secedunt graue olent. Et tormen forte succedit. Sed & hæc patitur, si quis ipsum erigere velit, erigi non potest. neque oculis videre potest præ calore. Et si quis ipsum interrogat, præ dolore respondere non potest. Quum autem moriturus est, acutius videt, & loquitur confidenter. & bibere ac edere cupit, & si quis det quod edat, breui etiam animam emittit, si non euomuerit. Huic morbus hic iudicatur in septem, aut quatuordecim diebus. Multi vero perueniunt etiam ad viginti quatuor. Si igitur hos transferit, sanus erit. Nam in his diebus iudicatur, an lethalis sit morbus, aut non. Hunc quum ita habuerit, sic curato. In primis quidem diebus à balneo abstineat. Ungatur autem vino & oleo tepido, in lecto, & à cibis abstineat. Sorbitiones autem tenues frigidæ dato. Vinum autem bibat nigrum, austerum, si ipsi conducat: Siminus, album, aquosum, austerum. Si vero sitis fortis premat propter calorem, potu aceruatim dato, euomere iubeto, bis aut ter hoc repetito. Et quum calor habuerit, lintea aqua frigida tincta apponito, qua parte se maxime ardere dixerit. Si vero horrorem habuerit corpus, frigefactoria remittito. Hic quum doluerit, ab huiusmodi maxime dolore periclitatur, ne repente animam relinquat. Verum exhibere oportet ipsi doloris causa festinanter, eadem pharmaca quæ ei qui à pleuritide tenetur. Quum autem exsurrexerit, cibo & potu, & balneis quàm celerrime refocillato. Morbus enim est difficilis, & pauci effugiunt. Alius typhos. Corripit quidem hic morbus omni tempore. fit autem propter corporis humiditatem, quum cibos humidos, & potum multum, carnes combibunt, & fluidæ fiunt, ab his maxime fit morbus.

Typhos.

Medela.

Quæ æstus leniatur.

Typhos alter.

HIPPOCRATIS LIBER

Incipit igitur febris, tertiana aut quartana, in principio fiēs. Et dolor fortis in capite consistit, Aliquando etiam in corpore intermittens. Et vomit saliuam, & frequenter eructat, & oculorum regiones doler, & facies albescit, & tumor in pedes descēdit. Quandoq; vero etiā totum corpus intumescit. Et ad pectora, & ad dorsum aliquando dolor currit. & venter turbatus est. & oculis fortiter tuetur, & saliuam multam & spumofam expuit, & in faucibus detineri videtur. & exasperat ipsas. Sæpe vero etiam inflammantur fauces. Hic ubi sic habuerit, & dolor ita presserit, & erectæ cervicis spiratio fortis inciderit, quandoque de repente præ dolore animam emitrit, in septem diebus, aut quatuordecim. Multi vero vique ad viginti quatuor dies durant. Sæpe vero etiam derепente morbus remittit, & æger sanus esse sibi videtur. Verum obseruare oportet donec quatuor & viginti dies præterierint. Si enim has effugerit, non ita valde moritur. Huic quum ita habuerit, in primis diebus sorbitiones dare oportet, farinam coctam, tenui melle affuso. Vinum vero dandum est nigrum, paulatim, prout voluerit temperatum. Cibi autem ne exhibeantur priusquam hi dies præterierint. Polypi vero in vino cocti edendi dentur, & iusculum sorbendum. Et raphanidas multas edat, & nasturtij semen torrefactum, molitum ac cribratū, vino nigro acerbato affuso bibat. Et polēta tenuis modica mane bibenda detur. A balneo autem abstineat, donec hi dies præterierint. Vino vero & oleo tepesfactis in lecto illinatur, & extergatur. Et fructus pæoniæ grana decem in vino nigro cocta bibenda dato. & rapi probe percocti succum sorbeat, caseo insulso conditum, & papauere, & tale, & oleo, & filphio, & aceto. Si vero etiam pharmacum bibendum dare volueris, cnidium granum dato. Et post purgationem, farinæ coctæ & pinguis duas heminas exsorbendas dato. Vinum autem bibat idem. Et ex pharmacis & sorbitionibus ac potib⁹ quicquid dederis profuerit, siue singulatim, siue plura simul exhibueris. Atque sic celerrime sanum feceris. Morb⁹ autē est grauis, & pauci effugiunt. Alius typhos, hic quidem propter hoc fit. Quum bilis putrefacta ammixta fuerit sanguini, per venas & articulos, quum sanguis steterit, consistit quidem maxime in articulis. Incumbit autem quādoque etiā in reliquū totum corpus, &

Medela.

Potio quæ

*Typhos
tertian.*

A pus & dolores acutos exhibet. & multi ex huiusmodi morbo claudi fiunt, quum bilis in articulis conclusa in tofum callescit. Dolor autem intermittens, corripit per tres & quatuor dies. Hunc ubi sic habuerit, hoc modo curato. Dolo-
Medela. re in corpore praevalente, tepefactoria facere & adhibere oportet, oleo prius illito. Quum autem remiserit, veratrum ipsi dato, toti corpori antea fomento adhibito. Postera die serum caprinum coctum bibendū dato, duorum congi-
Potio quae orum mensura, ita ut in alterum congi-
 um mel affundas, & in alterum sal adicias, deinde poculis vicissim permutatis bibat, donec totū ebiberit. Ad vesperam vero post purgationem, lenticulae heminam sorbeat. & betarum pinguium heminam, polenta in-
 spersa ebeat. Et pulli gallinacei carnem, aut columbe, aut turtur, aut ouiculae, aut suis pinguem edat. Veratrum autem per sextum diem dato. & si alicubi in articulis tumor fiat, & discessus fieri nolit, cucurbita affixa sanguinem detrahit, punctura per acum triangularem facta in genua, si in genibus tumor fuerit. Verum nullum ex aliis articulis perpunxeris. Interpositis autem diebus cibum accipiat, panem maxime assatum. Mazam vero maxime oleo & melle subactam. Obsonia vero habeat, maxime quidem assatas carnes volucrum, non falsas: Sin minus, etiam coctas, conditas, verum sine caseo, & sesamo, & sale. Piscibus autem utatur carnosissimis, assatis eodem modo velut carnes; & coctis origano co-
 spersis, ac oleo ipsis affuso. Vinum autem bibat album, si con-
 C ducat: aut si hoc non commodet, nigrum. & in deambulationibus se exerceat per diem, & post coenam, & mane. Serū autem & lac pro tempore semper bibat. Si vero tibi visum fuerit, etiam asinum lac decoctum dato. Et si sanus fiat, in custodiā ipsum esse oportet, ut ne à frigore & aestu laedatur. & cibis non valde expleatur. Periculum est enim ne morbus reuertatur. hic itaque morbus si sic curetur, in sex mensibus sanatur. In tot enim mensium spatio iudicatur an mortalis sit, aut non, etiam si statim curetur. Nam morbus est gravis, & plerisque commoritur. Alius typhos. Fit quidem hic morbus in tempore pomorum, quum quis se fructibus molli corticis, & foris non lignosis, omnis generis repleuerit. Plerisque vero etiam ab his factus est talis morbus, ubi videlicet placentarum, & liborum sesaminorum, & aliorum dulciorum ex

*Typhos
quartus.*

*Morbi huius
causae.*

HIPPOCRATIS LIBER

Mel del.

*Typhos
quintus.*

melle paratorum, esu se insatiabiliter expleuerunt. Mel enim D
coctum estuosum est, & ventri adhæret: postea quū concoctū
fuerit in vētre, effluat: & venter derepente attollitur, &
ardet ac dirumpi videtur. Deinde repente ventris profluuiū
succedit. & quum semel secedere inceperit, per multos dies
purgatur. & multi post hanc purgationem sani fiunt. Quum
igitur sua sponte purgari cessauerit, lentium succi tres semi-
congijs ipsum ebibere cogito, sale adiecto. post purgationē
vero succi, ad vesperam, lenticulæ frigida non falsa hemina
sorbeat: Multum autem silphij in ipsam deradat: & betæ pin-
guis non conditæ heminam, polenta inpersa. Vinum autem
bibat nigrum, austerum, paulatim. Reliquo vero tempore ead-
em faciat. Et cibos accipiat panem exassatum, & Mazam
oleo & melle quā maxime subactam. Primis autem diebus
farinam edat coctam frigefactam, melle affuso. Vinum autē
bibat nigrum, acerbum, & donec quieuerit morbus hæc as-
sumat. At qui ex fructibus morbo arreptus est, flatum sentit,
& tormen, & dolorem: & cibi secedere non volunt, & venter
ipsius magn⁹ ac durus est, & rigor ac febris habet. huic si qui-
dem sponte turbatus fuerit venter, in viginti diebus vt mini-
mum purgatur. Et quum purgari cessauerit, sanus statim erit.
Si vero non fuerit purgatus, purgato ipsum hippophais suc-
co, aut cnidio grano. Ad vesperam autem eadem exhibeto,
quæ ei qui sponte purgatur. Postera die si febris habuerit,
quietem habeat. Et de eodem vino in aqua frigidissima ipsi
bibendum dato. Si vero febris non habuerit, victu vtatur nō
humido, sed fortiore. Et deambulet coniectura iuxta cibos
facta. Ab hoc morbo multis iam aqua intercus facta est. Et si
tibi clysterem adhibere visum fuerit, eadem quæ etiam hy-
dropico per clysterem infundito. Si vero volueris, hæc infun-
dere potes: In aquæ mulæ hemina, herbā thapsiæ coquito, &
sic infundito. hic hoc modo curat⁹ celerrime san⁹ erit. Alius
typhos. Fit hic morbus quū humor qui est in corpore, pu-
trefactus fuerit, & magis quā opportunum est reliccat⁹.
Fit igitur æger hoc morbo correptus, specie limpidus ac hu-
meatus, subpallidus, pellucidus, & vesicæ vrinae similis, verum
non intumescit, sed tenuis & aridus est, ac debilis. Attenu-
antur autem in corpore maxime clauiculæ, & facie fortiter
gracilescit, & oculi valde sunt excauati. & hæc quidem
a morbo

A à morbo patitur. Color autem corporis niger est, causa vero hæc est. Quum bilis atra in venas, & ad cutē subierit, & postea calor successerit, necesse est à calore venas comburi ac resiccari. Quare sanguis è venis excedit. hæc igitur patitur. Hic tenuis fit, & fortiter gracilis, & oculis raro nictat, & muscæ à stragulis venatur. Et grauitas ciborum maior est quàm quum sanus esset. & lucernæ extinctæ odore delectatur. & frequenter semen per somnum effundit. Sæpe vero etiam inter eundem genitura ipsi exit. huic quum sic habuerit, ventrem nigro veratro purgato, supernum videlicet: infernū vero scammonia succo. Post purgationem vero eadem quæ & aliis dato. & serum ac lac bubulum, aut caprinum pro tempore exhibeto. dato & lac asininum decoctum, ad purgationem. Hic

B ita curatus in duobus maxime annis sanus fit. Cibus autē quos vult assumat, & quàm maxime nutriatur, & deambulet coniectura ad cibos facta. hic morbus corripit maiorem viginti annis. Vbi vero corripuit, si non à principio morbi quis curatus fuerit, non desinit, nisi viginti anni præterierint, sed adhæret. postea ab aliquibus dum curantur decedit. Morbus autē grauis est. Voluuli porro vocantur hi morbi. fiunt autem maxime ab his. Si hyemis tempore quis calido & humido victu vititur, & non deambulationibus se exerceat, respectu ad cibos factu. Verum repletus semper dormit. & deinde locum iter perficere cogatur, frigore sæuiente. Deinde riguerit sub ossa. hæc igitur patitur. Flatus in toto corpore oboritur. & color ipsius fit plumbiformis. & riget semper, vt etiā calida ipsi affusa, calida esse non videatur. Corpus autem ipsius dum lauatur, à calida desquamatur, maxime scrotum. & si digito corpus cōpresseris, impressionem facies, & notæ tibi apparebunt, velut in farina aqua subacta. Maxime autem in potibus impressionem perfert. Crura vero ipsius graui sunt. & si obambulet, tremit. & si ad accliuem locum iter faciat, vehementer anhelat. & vlnę dependere videntur, & sitis vrget noctu, cibi vero crudi secedunt quoscunq; ingessit. Huic quum sic habuerit, fomento prius adhibito, cneorum bibendum dato, aut hippophaiss succum, aut cnidiū granum. post purgationem vero, eadem dato quæ prioribus. Postera die lactis asinini cocti congiū dato bis ebibendum, sale adiecto. Ad vespērā cœnet panem. Obsonium autē habeat, ouiculæ carnes coctas, & poly-

Medic. a

Voluuli.

Curatio.

HIPPOCRATIS LIBER

pos coctos in vino nigro, & iusculum sorbeat. & lenticulā habeat sic preparatam; heminā lentis coctam probe terito, deinde farinā ammisceto, & silphium derafum addito, & salem adiiçito, & acetum affundito, & allium ad hæc simul coquito, & affusa aqua bis aut ter feruefacito, & cū rudicula vndique expassa brachia habēte, simul ipsa agitato: deinde ablata frigefacito. Sit autem non valde crassa, & odoris gratia etiam pulegiū vt simul coquatur, adiiçiat. Intermediis vero diebus vomitus faciat per sextum diem. Verum aliās atque aliās ante vomitum, & pharmaci potum, fomentū adhibere oportet. Et per tertiam diem lauetur, si conducat: Sin minus, vngatur. Et deambulet si ita potens fuerit, coniectura ad cibos facta, & sambuci, ac conyzæ semper teneræ, folia cocta edenda dato. Sic enim curatus, facillime deget, & morbus annum desinet. Multis vero iam sanis factis, post duos annos morbus reuersus est. Sed si hoc contingat, eodem modo curetur. Si vero tertium reuertatur, tumor quidem non succedit. Tenuis aut fit & gracilis, incipitq; à facie attenuari, & colore exalbescit magis q̃ prius. huic quandoq; aqua intercus fit in vētre. Si igitur facta fuerit, secare ipsum non oportet, moritur enim, sed in eodem curare quibus eum qui à splene aqua inter cutem laborat. hunc maxime in principio curare velis, & sic cito sanū facies, Opus autem habet morbo multa curatione. Est enim grauis. Alius voluulus arcuatus. Hic maxime æstatis tempore in palustribus regionibus corripit. Magis autem ab aquæ potu. Multi vero iam à tali morbo correpti sunt, ex volutatione ad solem capitis dolore affecti. Verum similia prioribus patiuntur, excepto colore. Nam pallidus fit æger, velut malicorium. Et oculi aliquādo morbo arcuato implentur. hunc vbi sic habuerit, iisdem curare oportet quibus priorem. Danda etiā in potu aqua à cicere albo cocta. & cum vino eadem permixta danda est. Et caput eius tetragono medicamento purgetur. hic minus q̃ prior lethalis est, & vocatur voluulus arcuatus.

Voluulus hæmatites. Reliqua quidē eadem patitur cum prioribus. Incipit autem morbus autumnō fieri. Hæc vero in morbo accedunt. Ex ore male olet à dentibus, & gingiuarū discidunt, & à naribus sanguis fluit. Aliquando etiam ex cruribus vlcera pullulant, & alia sanescunt, alia emergunt. Et color niger fit, & cutis tenuis. Est autem ad deambulandum ac laborandum

- A**randum promptus. Hunc ubi sic habuerit, iisdē curato quib⁹ *Medela.*
 priores, & hac per clysterem infundito. Cucumeris syluestris
 folia quinq; terito, & mellis dimidium hemina ammisceto,
 itemq; olei hemina dimidiam, & salis quantum vna manu cō
 prehēdere potes, & succi betarum heminas quatuor. Ad sub-
 purgationem vero lactis asinini cocti heminas octo exhibe-
 to, melle affuso. Bibat etiam bubulū lac pro tempore, per qua
 draginta dies. Bibat itē mane bubuli lactis duas heminas, ter-
 tia aque mulę parte ammixa, per intermedios dies. His mor-
 bus multa medela opus habet: Sin minus, nō exit, sed cum ho-
 mine moritur. Vocatur aut voluulus hæmatites. Morbi cras-
 si appellati. Ex crassis appellatis morbis, hi maxime sūt. Quū *Morbi*
Bpituita & bilis mixta fuerint in corpore, fluunt in vētrem. & *crassi.*
 quum congregata fuerint in ventre, attolluntur, & sursum ac
 deorsum discurrunt, velut vnda. Et rigor ac febris corripit. Et
 dolor in capite consistit, & quum dolor circa viscera cōstite-
 rit, suffocationem inducit. Aliquando vero vomit pituitā aci-
 dam, quādoq; etiam salsam & postq̃ euomuit, os amarum ipsi
 esse videtur. In lateribus autem rubores detinētur. Nam quū
 pituita in ventre sit, sanguis à caliditate congregatus in late-
 ra allapsus est, & rubores in laterib⁹ excitat. Et calor maxime
 latera occupat, ac costas. Et dorsum ipsius incuruū fit. Et quū
 maxime doleat, corporis contactum non sustinet. Nam velut
 ex ulcere dolet. Et carnes præ dolore vibrantur, & testes con-
 trahuntur. & in sedem, & in vesicam, calor quidā ac dolor ir-
Cruit. Et mingit crassum velut in aqua inter cutem. Et ex capi-
 te defluunt capilli, & pedes semper frigidi sunt. & dolor pre-
 mit maxime latera, & dorsum, & collum. & ad cutem aliquid
 ipsi proserpere videtur. Morbus vero quandoq; vrget, quan-
 doq; remittit. In progressu autem magis assidue premit, & cu-
 tis capitis crassa ac rubicunda est. Hic vsq; ad sex annos talia
 pati perseuerat. postea & sudor multus diffunditur, & male
 olet. Sæpe vero etiam per somnum semen effundit. Quod ve-
 ro per coitum emittit, subcruetum ac subliuidum prodit. Hic
 morbus fit propter calorem solis, & aque potū. proinde hunc *Medela*
 quum sic habuerit, cneoro aut hippophae, aut enidio grano-
 dato, subpurgato. dato etiā lactis asinini cocti heminas octo
 bibendas, melle affuso. postera die post purgationem, eadem
 quę aliis exhibeto. Primis autem diebus ex iisdem nutriatur,
 ex quibus

HIPPOCRATIS LIBER

*Morbus
crassus
scandus.*

Medela.

ex quibus etiam is qui ab aqua inter cutem correptus est . & deambulationibus se exerceat, si ita potes fuerit. Si vero præ febris impotens fuerit, & cibos edere non poterit, lenticulæ forbitione utatur . potu vero vino nigro quæ maxime austerum. Hic morbus maxime corripit autumno, & tempore fructuum pomorum. hic si quidem curatus fuerit in sex annis, satis est: Sin minus, adheret usque; ad decem annos. Cum multis vero si mul moritur, si non statim curatus fuerit. Alius crassus morbus. Tales crassi morbi à bile fiunt, quum bilis in hepar influxerit, & in capite constiterit. hæc igitur æger patitur. hepar intumescit, & præ tumore ad septum transversum expanditur. & dolor statim in caput irruit, maxime vero in tempora. & auribus non acute audit. Sæpe vero etiam oculis non videt. & horror ac febris corripit. Atque hæc quidem in principio morbi ipsi fiunt, intermittentia quandoque; valde, quandoque; minus. Quanto autem magis morbus progressus fuerit, tanto amplior dolor in corpore existit. & pupillæ oculorum dispersuntur ac hebetantur. & si digitum oculis admoventis, non sentit, eo quod non videt. Quod autem non videt ex hoc cognoveris, quod admovento digito non nictat. & floccos de stragulis tollit, si quos viderit, pediculos ipsos esse putans: & quum hepar magis ad septum transversum expansum fuerit, delirat. & ob oculos ipsi obversari videtur reptilia, & omnis generis peregrine fere, & milites armati pugnantes. & ipse sibi inter ipsos pugnare videtur. & talia loquitur velut qui videat pugnas & bella geri, & inuadit, & minatur, si quis ipsum exire vetet. & si surrexerit, crura eleuare non potest, sed cecidit. & pedes ipsius frigidi sunt. Et quum dormit, exilit à somno, & timet quum insomnia viderit horrenda. Cognoscimus autem hoc, quod ab insomniis exilit ac timet, postquam respiscit. Nam insomnia denarrat, & ea quæ corpore fecit, & quæ lingua loquutus est. Atque hæc quidem sic patitur. Quandoque; vero etiam per totam diem ac noctem voce priuatus iacet. respirans spiritum multum acervatum. Quum autem delirare cessauit, statim euestigio respiscit, & si quis ipsum interroget, recte respondet. & cognoscit ac intelligit omnia quæ dicuntur. deinde rursus post modicum tempus, in iisdem afflictionibus iacet. hic morbus accidit maxime in peregrinatione. Et si quis alicubi per desertam viam iter faciat, & timor ipsum ex spectro corripiat. Fit etiam aliter. huic quum sic habuerit, vera-

- A** rit, veratri nigri obolorum quinq; pōdus, in vino dulci bibendum dato. Aut hæc per clysterē infundito. Nitri Aegyptij magnitudinem tali ouilli terito, & mellis optimi cocti dimidiā heminam, & olei dimidiā heminam, in mortario ammisceto, & aque à betis coctis heminas quatuor per noctē sub dio expositas addito: aut si volueris, pro beta lac asininū coctū ammisceto. & hæc mixta per clysterem immittito, siue febris habeat, siue non. Sorbitionibus aut vtatur, pituitana cocta, melle affuso. Bibat etiā mel & aquā & acetū, simul permixta, donec iudicatus fuerit morbus. Iudicatur autem in quatuordecim diebus ad summū, siue lethalis est, siue nō. Multis autē iam huiusmodi morbus sedatus, rursus rediit. Si igitur redierit, periculum est ne ager pereat. Iudicatur autem morbus in septem diebus, an lethalis sit, aut non. Si vero has effugerit, nō valde moritur, sed morbus in plerisq; curatus decedit. Quum autē defuerit morbus, dicta bona vtatur, quiete ingerens quæ venter suscipiat, & non coburantur, neq; ventris profluuiū succedat. Ambo enim hæc periculosa esse videntur. Lauetur autem quotidie, & deambulet post cibos modice. Veste vero induatur leui ac molli. & pro tempore anni lac & serum bibat, per quinq; ac quadraginta dies. Hæc si fecerit, celerrime sanus erit. Morbus autē grauis est, & multa cura opus habet. Alius morbus crassus. Fit à pituita putrefacta. Quod aut putrida est vnde fit, ex hoc manifestū est. Eructat ab hac quod odorē habet, velut si quis raphanides edisset. Incipit autē fieri talis morbus unde.
- B** morbus à cruribus, deinde ab his ascendit ad ventrē. Et quū in ventre consliterit, rursus decurrit ad viscera. Et quū in his constiterit, fugit & vomitū facit, pituitam acidā subputridam educens, & vbi euomit, non habet seipsum neq; sibi constat æger. Deinde angustia fit circa viscera. Quandoq; etiā in caput derepente dolor incūbit acutus. Et auribus acute audire nō potest, neq; oculis videre, præ grauitate. & sudor multis diffundit male olēs, & maxime quū dolor habuerit, & morbū leuat. Color autē ipsius arcuatus apparet. hic morbus priore paulo minus lethalis est. Huic quū ita habuerit, ventrē purgato, deorsum quidem, per hippophaes. sursum autē, per veratrū. & caput tetragono purgato. & quum à veratro purgatus fuerit, postera die lacte asinino cocto subpurgato. Tertia deinde caprino cocto. & similiter quarta ac quinta. Reliquis vero viginti
- Tertius crassus morbus unde.*
- Medela.*

HIPPOCRATIS LIBER

viginti diebus, lac bubulum crudum, aut etiam caprinum da-
 to, tertia aquæ mulæ parte amixta. Bibat autem lactis con-
 gium. Post purgationem vero deorsum versus, eadem phar-
 maca exhibeantur, quæ hydropicis. Reliquo tempore quum
 lac bibit, cœnet panem exassatum. Obsonium autem habeat,
 ex piscibus scorpium, aut callionymum, aut cuculū, aut squa-
 rinæ frustum cum condimentis coctum. ex carnibus, ouillas,
 aut gallinacei pulli coctas. Vinum bibat album, si conducatur:
 Sin minus, nigrum austerum. deinde post cibum deambulet,
 vt ne frigeat. Si quidem igitur cōducant, cibos huic dato qui
 dicti sunt. Si vero non conducunt, sorbitiones dato prisanæ
 aut milij. In hoc morbo si æger triginta dies transgressus fue-
 rit, sanus fit, hi enim iudicant an lethalis sit, aut non. Est autē
 morbus grauis. Alius morbus crassus. Fit hic morbus à
 pituita alba. Cōgregatur autem in ventre, quum febres diu-
 turnæ corpus occuparint. Initium hic morbus à facie sumit,
 & intumescit facies. deinde descendit in ventrem, & vbi in
 ipso constitit, ventrem magnum attollit, & corpus velut à
 labore lassatur, & in ventre grauitas inest, & dolor fortis, &
 pedes tument, & si pluuia in terram effundatur, pulueris odo-
 rem non sustinet. Si vero in pluuia steterit, & terram odoret,
 derepente cadit. Hic morbus interquiescens, longiore tem-
 pore quàm prior occupat, & tardius decedit. Curare vero ip-
 sum oportet iisdem quibus hydropicum, fomentis videlicet
 & pharmacis, & eduliis ac laboribus. Hic morbus per sex an-
 nos maxime obtinet. Deinde decedit temporis progressu, si
 probe curetur, etiam si non in principio fuerit curatus. Est au-
 tem morbus difficilis, & multa cura opus habet. Coxendi-
 cum morbus ex his maxime causis fit plerisque. Si quis diu-
 tius in sole versetur, & coxendices fuerint calefacti, & hu-
 mor qui est in articulis, à calore fuerit resiccatus. Quod autē
 id quod resiccatur, condensatur, ac constringitur, hoc mihi
 signum est. Aeger enim articulos vertere aut mouere non po-
 test, præ dolore qui est in ipsis, & eo quòd verticula sunt cō-
 pacta. Dolet autem maxime lumbos, & verticula ex obliquo
 iuxta coxendices, & genua. consistit autem dolor multo tem-
 pore in inguinibus simulque coxendicibus, acutus & astuo-
 sus, & si quis ipsum erigat, aut transmoueatur, præ dolore ei-
 lat quàm maxime potest. Aliquando etiam conuulsio succe-
 dit, &

*Quintus
 crassus
 morbus
 unde.*

*Curatio
 quæ.*

*Coxendi-
 cis dolor.*

- A** dit, & rigor ac febris. fit autem & à bile, & pituita, fit item à sanguine, dolor confimilis velut ab omnibus morbis. & rigor ac febris aliquando corripit debilis. Caterum eum qui à sole hoc morbo correptus est, sic curare oportet. Corpus ipsius fomento humectetur. & cibi ac potus, & alia quæ exhibentur, tepida ac humida præbeantur. Atque hæc omnia cocta, cibo vtatur maza molli, vino dulci nō subacta. Vinum bibat albū, aquosum, & corpore quietem habeat, & quamuis impotens fuerit vt exsurgat, tamen modice singulis diebus deambulet. & ne frigeat, & non multa aqua lauetur. & quum tibi bene habere visus fuerit, & corpore humidus esse, leni fomento vehementer foueto. Magis enim remittit, & cōdensatione ex articulis humectat ac relaxat. Deinde postera die cnidium granum bibendum dato. Si vero nō profuerit, hæc per clysterem infundito. cumini heminam dimidiā terito, & colocynthidem integram paruam ac rotūdā in mortario tūdito ac cribrato, & nitri rubri Aegyptij minæ quadrantem torreto, ac terito. Atque hæc in ollam conicito, & olei heminam, mellis heminam dimidiam, vini albi heminam, & fucci betæ quātum videbitur affundito, & donec bonam crassitudinem habere visa fuerint coquito. Deinde per linteum excolato, & si mel non simul coquere velis, mellis Attici heminam ipsis ammisceto. Si vero Atticum non habeas, optimū alias cocti heminam in mortario ammisceto. Si vero crassius fuerit hoc infusum, de eodem vino affundito, iustæ crassitudinis respectu habito, & per clysterem infundito. deinde usque ad dies tres purgari sinere oportet. Si vero pluribus diebus purgetur, bubuli aut caprini lactis heminas tres ebibendas dato. deinde betas pingues non salsas, condimentis conspersas, edendas exhibeto. Ex hoc morbo multi claudi facti sunt. Si vero à bile morbus fiat, veratrum deorsum purgans ipsi bibendum dato, aut scammoniae succum. post huiusmodi vero purgationem, succi ptisanæ melle affuso, heminas duas exsorbendas dato. postera vero aut tertia die adhibito fomento, lacte asinino cocto subpurgato. Ad vesperam autem pinguis betæ heminas duas edat, polenta inpersa. Vinum bibat album, aquosum, dulce, & nunc, & post pharmaci purgationem. Si vero à pituita ægrotet, cnidium granum, aut hippophaes, adhibito prius fomento, bibendum ipsi dato. post purgationem

*Medela:**Biliosus
morbus.**Pituitosus.*

HIPPOCRATIS LIBER

gationem vero, easdem sorbitiones ac potus exhibeto. Itemque lactis potionem. Intermediis autem diebus, diæta quàm leuissima vtatur. Et si quidem ab his vtilitatem sentit, bene est. Sin min⁹, ipsum vrito multis ac profundis crustis inustis, in ossibus quidem partibus, per fungos. In carnosis autem, per ferra-
Sanguine. menta. Si vero à sanguine ægrotarit, fomentum adhibeto, & cucurbitam affigito, & venas in poplitibus secato. Si autem tibi visum fuerit, etiam cnidium granum ipsi bibendum dato. Diæta vero quàm siccissima vtatur. Vinum autem ne bibat. Si vero bibere velit, quàm minimum & aquosissimum dato, & modice deambulare iubeto, aut si potens fuerit, plurimum. Conducit autem & à pituita ægrotanti talia facere. Si vero stare non possit, in lecto ipsum quàm frequentissime circumferre oportet, à quacunque causa ægrotarit, per omnia similiter, vt ne intus chartilago concreseat. Si vero concreuerit, & articuli conglutinati fuerint, omnino necesse est hominem claudum fieri. Et si clysterem adhibere volueris ei qui à sanguine ægrotat, quo sanguinem ac pituitam à coxendicibus abducas, hæc infundere oportet. Salis pugillo trito, olei heminam, & de ordeï decoctio duas heminas ammisceto, atque sic infundito. Si enim sic curationem feceris, celerius sanum facies. Morbus autem grauis valde est ac diuturnus. *Tetani tres.* Si ob vulnus tetanus siue dissentio fiat, æger hæc patitur. Maxillæ conglutinantur, & rigent, & os aperire non potest. & oculi lachrymantur ac detrahuntur, & dorsum conglutinatum riget, & crura flectere nequit, neque manus, neque spinam. Quum autem lethalis fuerit, potum & cibos quos prius accepit, aliquando per nares reddit. Hunc quum sic habuerit, fouere oportet, & pinguiter vnctum, ad ignem non ita prope calefacere, & tepesfactoria illito corpori adhibere. Et absinthium, aut lauri folia, aut hyoscyami semen, & thus terito, deinde vino albo diluta in ollam nouam infundito, & oleum pari cum vino mensura affundito, & cum his calefactis large calidis corpus ac caput illinito. Postea super pelliceum indumentum reclinatum, ita vt pars ad quam fuit animalis caro sursum vergat, mollibus ac puris stragulis ac vestimentis contegito, quo vehementer exsudare possit. Aquam vero mulsam tepidam, si quidem hanc bibere poterit, per os exhibeto. Si vero non poterit, per nares infundito. Vinum
autem

autem album quàm iucundissimum ac plurimum bibendum dato. Hoc quotidie facere oportet, donec sanus fiat. Est autè morbus grauis, & statim curatione op⁹ habet. *Opisthotonos.* In distentione retrorsum fiene (*opisthotonum* vocant) alia quidem eadem æger patitur. Fit autem, quum tendines qui sunt retro in ceruice ægrotarit. Aegrotat autè, aut ab angina, aut ab vna, aut locis circa tonsillas suppuratis. Aliquando etiam à capite febribus succedentibus, cōuulsio succedit. Iam vero etiam à vulneribus. Hic trahitur in posteriorem partè, & præ dolore circa dorsum ac pectora, eiulat. Hic conuellitur vehementer, vt vix detinere possint ipsum præfentes, ne è lecto excidat. Hic sæpe in die dolore affligitur, sæpe etiam leuius degit. Huic sic habenti eadem exhibere oportet, quæ priori. Morbus autem adhæret ad summum diebus quadraginta. Si vero hos euaserit, sanus fit. Alius tetanus. Hic tetanus minus lethalis est quàm priores. Fit autè ab iisdem. Multi vero etiam ex casu in partes posteriores, à morbo correpti sunt. patitur igitur æger hæc. Totum corpus conuellitur. Aliquando vero quacunq; corporis parte id cōtigerit conuellitur. & primum quidem obambulat. Postea temporis progressu in lectum cadit. & rursus remittit & dolor, & conuulsio. & si surrexerit, & fortassis ad paucos dies obambularit, postea rursus in iisdem afflictionibus iacet. Atq; hæc patitur ac trāsmutat, per multum tempus. & si quid comedit, non secedit infra, nisi difficulter, atque hoc combustum. At in pectoribus hæret cibus, & suffocationem inducit. Hunc si iisdem curaueris quibus priores, celerrime sanum facies. Clysterem vero ex præsana cocta tenui, ac melle adhibeto. *Curatio.* *Tetanus tertius.* *Medela.*

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE VIRGINVM

*morbis, Iano Cornario me-**dico physico inter-*
prete.

Principium



Rincipium fit mihi cōpositionis
eorum quæ perpetua sunt in arte
medica : Non enim possibile est
morborum naturam cognoscere
(si quidem artis est inuenire) nisi
quis nouerit naturam in indiuisi-
bili, ex qua in principio discreti
sunt: primum de morbo sacro ap-
pellato, & de attonitis siue syde-
ratis, & de timoribus. ex quibus

adeo fortiter pauēt homines, vt delyrent, & dæmones quos-
dam videre se putent, ipsis infestos, quandoque nocte, quan-
doque interdiu, aliquando vero vtroque tempore. Postea ab
huiusmodi spectris multi iam se strangulauerunt, plures au-
tē mulieres, quàm viri. Est enim muliebris natura animi ma-
gis deiecti ac imminuti. Cæterum virgines nobiles & matura
viro, hoc magis patiuntur, vnā cum mēsum descensu, an-
tea non valde hinc afflicta. Postea enim sanguis in vteros
confluit, velut effluxurus. Quum igitur osculum exitus non
fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit, propter ci-
bos & corporis augmentum, tunc sanguis non habens efflu-
xum, præ multitudinem resilit ad cor, & ad septum transuer-
sum. Quum igitur hæc repleta fuerint, cor fatuum fit, deinde
ex fatuitate torpedio, postea ex torpedine delyrium apprehendit.
Quemadmodum quum aliquo longo tempore desidente, sanguis ex
coxis ac femoribus depressus, in tibias ac pedes torporem inducit.
A torpore autem, pedes ad iter faciendum impotentes sunt, donec
sanguis ad seipsum reuertatur. Reuertitur autem celerrime, quum
steterit in aqua frigida, quæ vltra malleolos madefaciat. Atque hic
quidem torpor facile cedit. Cito enim propter venarum rectitudinem
refluit. Et locus corporis non est periculosus. At ex corde &
septo transuerso tarde refluit. Venæ enim obliquæ sunt, & locus
periculosus, & ad delyrium ac insaniam paratus. Quum enim hæc
partes repletae fuerint, & horror cum febre ingruit, erroneas febres
appellant. his autem sic habentibus, præ acuta quidem inflammatione,
insanit: præ putredine vero, clamat: præ caliginositate autem, timet
ac formidat: præ compressione vero circa cor, strangulationes parat:
præ sanguinis autem

*Virgines
quæ percel-
lantur.*

*Quid pe-
dū torpor-
em discus-
siat.*

*Causa fur-
oris.
Planetes
febres.*

Anis autem malicia, animus mœrens ac anxius malum attrahit. Sed & alium horribiliter compellat, & in puteos profligare ac incidere iubet, & strangulari, tanquam meliora sint hæc, & omnem vitæ utilitatem excedentia. Aliquando vero sine spectris ac phantasmatis, voluptas quædam adest, ex qua mortem, velut bonum aliquod, amat. postquam autem respicit homo, mulieres tum alia multa, tum pretiosissimas muliebres vestes Dianæ consecrant, à vatibus id iubentibus deceptæ. Cæterum curatio ut hinc liberentur, est sanguinis detractio, si nihil fuerit quod impediatur. Ego vero iubeo virgines quum huiusmodi patiuntur, quàm citissime viris cohabitare. Si enim conceperint, sanæ sunt. Si vero huiusmodi non affuerint ipsis, simul cum pubertate, aut paulo post corripientur, si non viro nupserint. At vero ex mulieribus viro iunctis, steriles magis hæc patiuntur.

*Que Diana
ne daret.
Furoris
medela.*

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE NATURA MULIEBRI, Iano Cornario medico

physico interprete.

DE muliebri natura ac morbis hæc **Deus** pater dico. Maxime quidem numen in **tissimus** hominibus causam esse. postea **author &** vero naturas mulierum, & colores. Nam quæ superalbidae sunt, humidiores sunt & fluidiores. Nigrae vero duriores acerbioresque ac adstrictiores. Quæ vero vini colorem referunt, medium quid inter utrasque habent. Sic autem

& in ætatibus contingit. Iuuentulæ enim humidiores sunt, & multo sanguine plerunque refertæ. Aniculæ vero sicciores, & modicum sanguinem habentes. Mediæ autem, medium quiddam inter utrasque habent. Oportet autem eam qui hæc recte tractare velit, primum quidem ex diis ordiri. Deinde mulierum naturas discernere, itemque ætates, & tempora,

**Medici
munus.**

F pora, &

HIPPOCRATIS LIBER

Humoris pora, & locos, in quibuscunque degunt. Frigidi enim loci, **D**
aquatici fluidi sunt. Calidi vero, sicci & stabiles. Initium autem facia
cognitio ab humido secundum naturam. Si aqua intercus in vteris
& mede- oboriatur, menses pauciores ac deteriores fiunt. Deinde re-
la. pente deficiunt. & venter intumescit, & mammae siccae fiunt,
Primus lo- & reliqua male habet. Et in ventre sibi habere videtur. & ex
cellorum his cognosces, quod aqua inter cutem laborat. Sed & in ore
morbus. vterorum significationem de se præbet. Tangentibus enim
 gracile apparet. & calor & aqua ipsam corripit. Quum autem
 tempus amplius processerit, dolor in venterem, & lumbos,
 ac laterum mollitudinem occupat. Hic morbus maxime fit
 ex abortu. Accidit item ex aliis. Quum sic habuerit, calida la-
 uare oportet, & tepesfactoria adhibere, donec dolor sedetur. **E**
 pharmacum autem deorsum purgans bibendum dare opor-
 tet. post pharmacum vero, vteros bubuli stercoreis fomento
Stercus bu- fouere. & postea medicamentum cum cantharide præpara-
bulum. tum apponere. Et interpositis tribus diebus, id quod cum fel-
 le paratur. Vna vero die interposita, per triduum aceto infu-
 so colluatur. & si quidem venter mollis & vacuus fiat, & fe-
 bres sedatae fuerint, & menses prodeant, viro condormiat.
 Sin minus, rursus eadem facito, donec menses procedant. &
 aliquibus subdititiis vtatur. Intermediis autem diebus cre-
 thmi corticem bibat, & prœonia grana nigra, & sambuci fru-
 ctum, ieiuna in vino. & Mercurialem quæ plurimam edat, & al-
 lium coctum ac crudum. & cibis mollibus, & polypis, ac aliis
Cum uteri mollibus vtatur. Si vero pepererit, sana erit. Si vteri ad hepar
hepar per- accesserint, muta de repente fit, & dentes conserit, & color ni-
tunt. ger sit. patitur autem hæc derepente dum sana est. Est autem
 huiusmodi affectio virginibus maxime antiquis, & viduis,
 quæ iuuentulae sunt & pepererunt, ac viduae manent. Quum
 sic habuerit, depulsione per manum infra facta, sub hepate aut
 sub præcordiis, fascia deligato, & aperto ore vinum odoratif-
 simum infundito. Et graueolentia naribus adhibeto ac suffi-
 to. Sub vtero vero bene olentia. Postquam autem resipuerit,
 pharmacum infra purgans bibendum dato. & lac asininum po-
 stea bibendum exhibeto. Deinde vteros odoratis foueto, &
 medicamenta cum buprestis præparata apponito. Postridie ve-
 ro Netopon vnguentum. Intermissis autem duobus diebus,
 vteros cum odoratis colluito. Et postridie pulegiū apponi-
 to. die

A to die vero una interposita, aromata suffito. Atque hæc quidem viduæ facito. Virginem autem ut viro cohabitaret persuadeto. ad uteros vero nihil adhibeto, neque pharmacum bibendum dato, verum conyzam & castoreum in vino ieiunæ exhibeto. & caput odoratis ne vngat, neque odorata olfaciat.

Si uteri prociderint, & foras egressi fuerint, calor habet maxime pudenda, & sedem. Et vrina paulatim destillat, ac mordet. hæc patitur si ex partu progressa viro cōdormierit. *Cum uterq; prociderint.* Quum autem sic habuerit, myrti baccas & loti ramenta, in aqua coquito, & aquam per noctem sub dio exponito, & pudenda cum eo decocto quam frigidissimo perfundito. & eadē trita pro cataplasmate adhibeto. postea bibens aquam lentium, & mel,

B & acetum, donec uteri fuerint eleuati, vomat. Et lectum a pedibus altiore facito, & graueolentia sub pudenda suffito, odorata vero sub nares. Cibis vero utatur mollissimis ac frigidis. Et vinum aquosum album bibat, Ne lauetur autē, neque cum viro dormiat. Si vero penitus ex pudendis exciderint, dependent velut scrotum. Et dolor corripit anum ventrem, & lumbos, & quum tempus processerit, ad locum redire non volūt. Morbus autem corripit, quum ex partu progressa uteros doluerit, aut cum viro in puerperij purgatione cōcubuerit. *Cum exciderint.* Quum vero sic habuerit, frigesfactoria ad pudenda apponere oportet, & quod foris est depurgatum, & cum vino nigro, in quo malum punicum coctum est, ablutum, intro deducere. Deinde mel & resinam mixta infundere. Decubat

C autem supina pedes sursum extentos habens. postea spōgias imponito, & ex lumbis deligato. Quum autem sic habuerit, a cibis quidem abstineat, potu vero, quam paucissimo utatur, donec septem dies præterierint. & si quidem sic ingredi voluerint, bene habet: Sin minus, summas uteri oras deradito, calefacito, abluito, ac cerato picato illinito, & alligata ad scalam muliere, scalam iuxta caput pulsato, & uteros cum manu intrudito. postea crura ipsius alternatim colligato, & sic per diem ac noctem finito. & modicum ptisanæ succum frigidum dato, aliud vero nihil. Postera die decumbenti cucurbitam quæ maximam ad coxendicem affigito, & multo tempore trahere finito. postquam vero detraxeris, ne scarificato, sed reclinatam finito, & nihil aliud quam succum exhibeto, donec septem dies præterierint. Si vero sitiāt, aquam dato frigidam

HIPPOCRATIS LIBER

quàm paucissimam. Vbi vero septem dies præterierint; cibis D
mollissimis ac paucissimis vtatur. Si vero ventrem exonera-
re velit, decumbens exoneret, donec quadraginta dies præ-
tereant, postea surgat, & parcissime obambulet, & ne laue-
tur, sed intra pudendum graueolentium suffitum admittat,
Cū locelli & modica edat. Si vteri adglutinati fuerint, incumbunt.
hæserint. & si contigeris, videbis locum durum sub lateris mollicie, &
dolor corripit imum ventrem, & laterum mollitudinem, &
lumbos, & in crura dolor irruit, eaque extendere non potest.
Sape vero etiam suppurantur, & linamentis inditis curatę ac
Medeis. fluentes moriuntur, si non vsseris, aut secueris. Quum autem
sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet,
& multa calida lauare ac fouere, & quum recens lota aut
fota fuerit, iubere vt admota manu, cum digito os vterorum
abstrahat, & myrrham caloniam suffiat, rosaceo affuso. Bi-
bat autem pæonię grana nigra quinque, castorio ammixto,
in vino odorato. & in coxam sanam decumbat, & apponat
Baccarim vnguentum, aut oleum album ad coxam sanam. &
edat allium plurimum, & crudum, & coctum, & succum for-
beat, & cibis mollibus vtatur. postquam autem dolor quie-
uerit, abduces euntem super sanam coxam, postea vero fo-
mentum ex vrina adhibeto, lauro inspersa, & à fomento cy-
claminum apponito. postera die lotę suffit⁹ ex aromatis ad-
hibeatur. Caterum ex hoc morbo maxime steriles fiunt.
Si complicatum fuerit os vterorum, menses non prodeunt.
Si os ute- Si vero prodeant, pauci ac prauis sunt. Et vbi cum viro coit, F
rorum cō- dolet. & dolor imum ventrem tenet ac lumbos. Et si contin-
plicatum gat digitis & os requirat, non est manifestum. Quum sic ha-
fuerit. buerit, vrina humana foueatur, & post fomentum lenticulę
Curatio. decocto lauetur, & postquam lota fuerit, vteri vnguento Aeg-
yptio foueantur. Et si odor ad nares ascenderit, spes est ip-
sam sanam fore. Et quum dormire voluerit, Aegyptium oleū
in lana subdat. Postera vero die consideret an magis corre-
cti sint vteri, postea odoratis foueto. & purgatoria quę non
mordeant subdito, & post subdititia medicamenta, pari men-
sura aceti ad aquam ammixta eluito. Quum autem menses
prodierint, ieiuna & illota, & suffita, cum viro coeat. Maxime
vero ex hoc morbo steriles fiunt. Si vteri ad coxam decur-
Cum uteri rerint, & menses non procedunt, & dolor ad imum ventrem
coxendicę accedit,
petunt.

A accedit, & ad lateris molliciem. & si digito cōtigeris, deprehendes os in coxa. Quum ita habuerit, calida lauato, & allia plurima edenda dato. Et lac ouillum purum bibat. & postquā lac purum exhaust, fomēto adhibito, postea pharmacum infra purgans exhibeto. Quum autem purgata fuerit, rursus vteros foueto, ex fœniculo & absinthio permixtis. Vbi vero recens fota fuerit, os cum digito abstrahito, & scillam apponito, & interposita die postea id quod præparatur cum narcissino adhibeto. Si vero tibi purgata esse visā fuerit, Netropon apponito. Et postridie rosaceum vnguentum. Cæterum prima mensium decurrentium die ab apponēdo cessato. postera vero incipito vbi defecerint. At in mēsis si quidem sanguis eruperit, satis est: Sin minus, cantharides quatuor bibat, pedibus & alis ac capite reiectis, & præoniæ grana nigra quinque, & sepiæ oua. & apij semen, cum vino. Et si dolor habuerit, & vrinæ stillicidium vexarit, in aqua calida desideat. & aquam mulsam bibat aquosam. Si vero à primo non fuerit purgata, rursus bibat donec fiat. postquam autem purgatio decurrit, ieiuna cum viro coeat. In purgatione vero mercurialem edat, & polypos coctos. & cibus mollibus vtatur. Liberabitur autem à morbo, si in vêtre habuerit. Si ex

Curatio.

Cū puerpera non purgatur.

Curatio.

Cum uteri pituita operentur, quid accidat. Curatio.

B dem sanguis eruperit, satis est: Sin minus, cantharides quatuor bibat, pedibus & alis ac capite reiectis, & præoniæ grana nigra quinque, & sepiæ oua. & apij semen, cum vino. Et si dolor habuerit, & vrinæ stillicidium vexarit, in aqua calida desideat. & aquam mulsam bibat aquosam. Si vero à primo non fuerit purgata, rursus bibat donec fiat. postquam autem purgatio decurrit, ieiuna cum viro coeat. In purgatione vero mercurialem edat, & polypos coctos. & cibus mollibus vtatur. Liberabitur autem à morbo, si in vêtre habuerit. Si ex partu non fuerit purgata, tumet venter & crura. & rigor ac dolor inum ventrem, ac lumbos tenet. Quādoque etiam ad viscera ascendit, & animo linquitur. Atque hæc patitur incipiente morbo. progressu vero temporis, caux faciei partes rubescunt. Quum igitur sic habuerit, fomento vteris adhibito, cyclaminum apponito. Bibat autem medicamentum cum tæda præparatum, donec fluxus fuerit commotus. Ad os vero vterorum, adipem anserinum illinito, & myrrham, & resinam tepidam. & quàm maxime deambulet. & ante cibum Mercurialem coctam edat, & allium ac porrum. & brassicæ succum sorbeat. & cibus mollibus vtatur, & magis marinis. & calida lauatur. A pinguibus autem & dulcibus abstineat, donec sana fiat. Si vteri pituita impleti fuerint, flatus oboritur, & menses albi pituitosi superueniunt. Aliquando etiam sanguis tenuis pelliculis plenus. & præ humiditate cū viro coire non vult. & pallida ac tenuis fit. Interrogare igitur ipsum oportet, an quod fuit mordeat & exulceret. & si non mordeat, pronunciarè à cerebro fluxum esse. Si ve-

HIPPOCRATIS LIBER

ro mordeat, à ventre. Si quidem igitur à ventre fuerit, à
 lenticulæ decocto vomat. Deinde veratro purgato. postea
 idem in nares immittito. Postquam autem superior venter
 tibi purgatus esse videbitur, pharmacum infra purgans bi-
 bendum dato. A cibis autem pinguibus ac dulcibus absti-
 neat. Acres autem exhibeantur, velut commodi, nisi pu-
 denda fuerint exulcerata, præstant autem frigidi. Et mo-
 dice lauetur, non tamen calida, neque caput. Ieiuna vero
 bibat hypericum, semen apij, saluiam, in vino aquoso.
 Quum autem cessauerit fluxus, cum succo grossorum elui-
 to, & postea acerbis colluito, Est autem morbus grauis. Si
 vteri inflammati fuerint menses omnino non prodeunt, aut
 prauī & pauci. Et quum ieiuna est, vomitus ipsam corripit. E
 Vbi vero quid ederit, vomit cibos. & dolor inum ventrem
 ac lumbos habet. & animi deliquium inuadit. Venter autem
 aliquando durus, aliquando mollis est, & inflatur ac magnus
 fit. & putat se in ventre habere. Si vero contigerit, plenitudo
 illa vacua fit. Huic vsque ad decimum mensem tumor paula-
 tim augetur, velut in ventre habenti. Vbi vero decem men-
 ses præterierint, venter aqua impletur, & vmbilicus eminet.
 Et si digitum admoueris, os vteri gracile & collapsum com-
 peries. Et vbi menses apparuerint, pauci sunt & prauī. Et cla-
 uiculæ ac collum attenuantur. Et pedes intumescunt. Quum
 igitur sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum da-
 to. & ad vteros quæ purgant & non mordent apponito. Et
 post appositionem vteros eluito, pari mensura aceti acerrimi
 ad aquam ammixta. & Mercurialem edat, & succum eius
 farina inspersa, vbi cocta fuerit absorbeat. Morbus autem est
 periculosus. Si ignis facer erysipelas dictus in vteris obo-
 riat, tumor fit à pedibus exorsus, & ad crura & ad lumbos
 procedens. Quum autem tempus amplius processerit, intum-
 escit etiam venter, & rigor ac febris corripit, itemque de-
 bilitas. Præ dolore vero, quiescere nō potest, sed iactat seip-
 sam. Dolor autem ex imo ventre ascendit ad lumbos. postea
 sursum vergit ad præcordia, & pectora, & caput. Et mori sibi
 videtur. Quū autē remiserit, torpor occupat manus. Aliquā-
 do etiam inguina & crura, & poplites. & liuida fit, & modico
 quandoq; tēpore sibi melius habere videtur. Deinde rursus
 eadē patitur. & corp⁹ pustulis implet. & facies rubescit, & si-
 tis fortis

*Cum uteri
 penitus
 inflammā-
 tur, quid
 agendum.*

*Vteri ery-
 sipelas.*

A tis fortis tenet, & fauces siccae sunt. Hic morbus si prægnanti fiat, moritur. Sin minus, curata sanatur. Quum igitur sic habuerit, adhibere oportet, si dolor habeat, frigefactoria, & ventrem turbare. Et si quidem in ventre habeat, cibis ac potibus utatur, à quibus fœtus non corrumpitur. Si vero non fecedant, clysterem adhibeto. Si autem in ventre non habuerit, pharmacum bibendum dato. & cibis paucissimis utatur molliissimis ac frigidis. & Mercurialem edat, & sambucum. & neque salsa, neque pingua, neque acria, velut est origanum, aut thymus, aut ruta. Postquam autem calor & strangulatio remiserit, & tumor non fuerit sedatus, medicamentum fortius infra purgans postea bibendum dato. Morbum autem hunc pauca effugiunt.

Curatio.

B Si uteri præter naturam hiant, & menses plus quam oportet prodeunt, viscosioresq; ac frequentiores. & genitura non manet intus. Et si digito contingeris, os hians comperies. & febris ac rigor & dolor, imum ventrem & lumbos corripit. Hic morbus à fluxu sanguinolento corripit. fit autem quum menses suppressi derepente eruperint. Huic quum dolor maxime habuerit, tepesfactoria apponito. Et cum remiserit, vteros foueto. & pharmacum infra purgans bibendum dato. Et quæ non mordent subdito. & post subdititia medicamenta, cum acerbis colluito. & quam minimum lauato. Cibis autem siccissimis utatur. Si vero his factis sana non fiat, pharmacum bibendum dato, à quo sursum ac deorsum purgetur. Et quum menses moti fuerint, & quum quieuerint, eiusdem modi victum exhibeto. Morbus autem lethalis est.

Cū uteri præter naturam hiant.

Curatio.

C Si uteri ad medium lumborum processerint, dolor imum ventrem habet, & crura contrahuntur. & quum aluum exonerat, dolores acutiores fiunt, & stercus cum vi prodit, & vrina destillat, & animo linquitur. Quum sic habuerit, fistula ad vesicam alligata vteros sufflato, & fomentum adhibeto. Aut multo calido lauato, & male olentia sub pudenda sufflato. Sub naves autem odorata. Quum autem dolor cessarit, lenticulæ decocto præpotato, pharmacum sursum purgans bibendum dato, à quo venter moueatur. postquam autem uteri ad locum suum redierint, medicamentum infra purgans bibendum exhibeto. & postea lac bibendum dato. Postea fomento ad vteros adhibito ex vino, medicamenta cum lauro præparata immittito, & apponito quæ non mordent, ammix-

Cum uteri lumbos percutunt, Medela.

HIPPOCRATIS LIBER

**Profluuiū
album.**
 to aceto. Postea aromata suffito. Cæterum steriles & claudæ **D**
 fiunt ex hoc morbo. Quum fluxus albus obortus fuerit, ve
 lut vrina asinina apparet. Et dolor imum ventrem habet, &
 lumbos, & lateris mollitudinem. & tumores sunt crurum ac
 manuum. & caua eleuantur. & oculi humidi sunt, & co-
 lor arcuatus ac albus fit. Et quum iter facit, anhelat. Morbus
 autem fit, si vbi natura pituitosa est, febricitarit, & bilis com-
 mota purgata non fuerit. Si quidem igitur venter acuerit,
 ventris profluuia fiunt. Si vero ad vteros vertatur, fluxus fit.

Medela.
 Postquam igitur ventris profluuium habuerit, papaueris al-
 bi ac rubri corticem pari pondere, & spinæ fructum in vino
 diluto terito, & polenta recenti inspersa bibat. Si vero velis,
 malicorium calido cinere torrefactum ac tritum ex vino bi- **E**
 bat, pari polenta ac farina inspersa. Minimum vero lauetur.
 Cibis autem vtatur quàm siccissimis ac frigidis. Vbi vero flu-
 xus quieuerit, pharmacum bibendum dato, à quo superna
 purgentur, & lac asininum bibat. Postquam autem infra pur-
 gata fuerit, bubulum lac bibat, ad dies quadraginta, si poterit
 meracum, sub dio per noctem expositum, quarta aquæ par-
 te ammixta. Vesperi vero vbi ebibit, alicam forbeat. Quum
 autem decem dies fuerint transacti, lactis & aquæ decimam
 partem detrahito. Quantum autem detraxeris, tantam te-
 pidi recens multæ portionem additam bibat. postridie ve-
 ro duas portiones, vt in decem portionibus pro modico di-
 luto sit meracum, & ad quatuor dies bibat. Dum autem de-
 cimum partem detrahit, etiam de sorbitione amplius addat. **F**
 Postquam autem quatuordecim dies transegerit decimam
 lactis partem bibēs, postea tertiam aquæ partem affundens,
 ad dies decem bibat. & cibis vtatur. & sic fiant omnes dies
 quadraginta. Quum conceperit & vterum ac partus ge-
 starit, ea quæ natura sterilis est, primum quidem menses de-
 ficiunt, & pauciores fiunt, & tempus in quo prius fiebant,
 transmittunt. Postea derepente multi fiunt, & puri ac fortes.
 & si quidem semel facti fuerint, de cætero secundum ratio-
 nem in vêtre habet. Sin minus, & primum fiunt & iterū atq;
 iterum in mense, postea ex seipso desinet fluxus, pallidaq; ac
 tenuis fit. Pharmacum igitur & sursum & deorsum purgans
 bibendum dare oportet. Et lac asininū postea bibendum aut
 serum. Postea adhibito fomento, vteros medicamento quod
non

**Profluuiū
aliud.**

Medela.

- A** non mordeat purgato. Deinde cum aceto colluito. Postea aromata suffito. Hęc autem facito ut prima mensium die facta sint. Et ne sit illota & impasta, cyceonem insulsum crassum bibens, & aromatis suffiatur, netopo affuso & unguento rosaceo. Postea cum viro coeat. Si acetabula pituita plena fuerint, menses quidem bene succedunt, & in ventre habet. Corrumpit autem fortum ubi fortior factus fuerit. Non enim retinere potest, sed abrumpitur. Cognoueris autem hoc modo. Humida sit, & mucosum ac viscosum defluit, & non mordet, & in mensibus ubi à fluxu purgari cessauerit, per duos ac tres dies mucī ab utero prodeunt. Hanc grossorum succo eluito, & collutione per acerba postea bis aut ter facta. de cetero apponito id à quo pituita purgatur, & mollia fomenta adhibeto. Et post subdititia apposita, pari mensura aceti ad aquam ammixta eluito, & in mensibus aromata suffito. postea impasta & illota cum viro dormiat. Quū menses occultati fuerint, dolor inum ventrem tenet, & onus incumbere ipsi videtur, & lumbos dolet, ac laterum mollitudinem. Quū vero ad præcordia uteri allapsi fuerint, suffocant, & ubi frequenter acida euomit, ad modicum tempus melius habet. Dolor autem & ad caput & ad collum procedit. Postquam igitur allapsum parat, aut allapsi sunt, tepefactoria adhibeto, & graueolentia suffito, infra autem odorata. & castorium bibendum dato, & conyzam. Vbi vero deorsum prociderint, infra graueolentia suffito. sub nares autem odorata. Sedatis autē doloribus, pharmacum bibendum dato. Et lac asininum postea bibendum. Deinde succum à quo vomat dato, & ad nares apponito. Postquam autem purgaueris, fomento uteris adhibito ex his quæ cum lauro præparantur, id quod ex narcisso præparatur apponito. Et tribus interpositis diebus, fomento adhibito, id quod ex cantharide præparatur apponito, & postera die adipem anserinum. postea intermissis tribus diebus, collutione cum aceto parata eluito. In purgationibus autem, mercurialem ante cibos edat, & cibis molliissimis utatur, & acria edat. Et bis in die calida lauetur. Si vero menses non fiant, ubi hæc opportuno tempore feceris, cantharides bibendas dato, & postquam prodierint, ieiuna & illota, ac suffita, cum viro dormiat. Quum in ventre habens, fortum menstruum aut bimestrem corruerit, & ad perfectionem gestare non

Cum acetabula pituita impleantur.

Medela.

Menses cum non decurrant.

Medela.

Cum prægnas partum menstruum perdit.

HIPPOCRATIS LIBER

Medela. re non poterit, & tenuis præter naturam fiat. Huius vteros D
 purgare oportet ac corpus pinguefacere. Non enim prius fœ-
 tum perferre poterit, quàm vteri ipsius crassi fiant, & robu-
 sti euadant. Si vero crassifac̃ta fuerit mulier præter naturam,
Crassæ cur non concipiant. non concipit in ventre. Nam omentum multum ac crassum
 incumbens vteros deprimit, & genituram non suscipit. Hanc
 attenuare oportet, & pharmacum infra purgans bibendum
 dare. & ad vteros apponere quod purget ipsos, & flatus indu-
Cū os uul- uæ duru- scit. cat. Si vero os vterorum durum fiat, aut ceruix, digito in-
 tromisso id cognosces. Itemque si ad coxam fuerint auersi.
Medela. Quum sic habuerint, nihil acre adhibeto. Si enim os exulce-
 raueris, vbi inflāmatum fuerit, periculum est ne penitus ste-
 rilis fiat. Verum apponito quæ non mordent, à quibus pur-
 getur. Si mulierem parere non potentem purgare velis,
 & fuerit biliosa aut pituitosa. Cognosces autem vtrum ho-
 rum sit, si arena substrata quum menses fiunt, in sole sangui-
 nem superfundas, ac ficcari sinas. Si enim biliosa fuerit, su-
 pra arenam sanguis pallidus erit. Si vero pituitosa, velut mu-
 cus erit. Et sanè vtrum horum fuerit, infra purgato, & ad v-
 teros subdititia apponito. Si menses omnino non fiant, si
Cū menses nō decur- runt. quidem præ dolore id contingat, primū ventrem infra purga-
 to, deinde medicamentum à quo sanguis ex vteris purgatur
 apponito. postea intermissa die vna aut altera, rursus id à quo
 sanguis purgatur apponito. Reliquo vero tempore corticem
 crethmi in vino tritum bibat. Si humidius fuerit os vte-
 rorum quàm oportet, acria apponito, quo morsū perreptet,
Cū humi- dius fuerit os uulue. & inflāmatū valde durum fiat. Si vero induratum fuerit, a-
 cria adhibeto. Mordentia enim saniem diffundunt. Deinde
 mollia apponito. Sed & ad alios morbos non minus apponi-
 to. Si puerpera vteri in coxam incubuerint, aut ad lateris
 mollitudinem, ad sanam coxam oleum Aegyptium album,
 aut baccarim vnguētum apponere oportet. & in sanā coxam
 decūbat. & pæoniæ grana nigra quinq; bibat, & fructus sam-
 buci conchæ testam maiorem, & castorij magnitudinem fa-
 bæ in vino. postea lota suffiatur. & potibus ac cibis mollibus
 vtatur, & mercuriali. & acribus omnibus, excepto raphano
Stragula- tio uulue. ac cepis. Quum suffocarint vteri, graueolentia omnia suf-
 fire oportet, bitumen videlicet, sulphur, cornu, lucernarium
 funiculum, phosæ adipem, castorium. O odorata vero subter
 pudenda,

- A** pudenda. Si vero puerperæ inflammati fuerint vteri, ar- *Cū uteri*
det, & suffocatio habet. Quum autem sic habuerit, muscum *inflāmatur.*
marinum tenuem tritum super linteolo extentum pro cara- *Medela.*
plasmate adhibeto. postea crudam ordeaceam farinam, &
cinerem sarmentitium, ac lini semen, oleo & aceto affuso
coquito, donec velut farinæ subactæ massa fiat. Deinde
quàm calidissima ferre potest imo ventri imposito. Si ve- *Cum uteri*
ro fixi fuerint vteri, lentem & mentam multam in aceto co- *compassi*
quito, vt vaporem inde in os trahat, & nares adhibeat. & gra- *fuerint.*
ueolentia suffito. & mercurialem edat, & in succo eius fari-
nam coctam sorbeat. Quam celerrime autem & priusquàm do-
lor occupet, exhibere oportet pharmaca, quæ vteros à dolo-
B re leuant. & cibos per aluum secedentes assumat. Si vero vē-
ter calefiat, clysterem adhibeto. Si ex partu inflāmati fue- *Apartuini*
rint vteri, solani succum in pudenda infundito. & vbi hic ca- *flāmatio.*
lidus factus est, alium infundito, Si vero hic non fuerit, len- *uulue.*
tisci aut rhamni, aut betæ, aut cucurbitæ succum expressum
infunde. & quod in medio huius est tenerimum, deraſum
longa forma inde. postea cerusam aqua tritam & lana exce-
ptam appone. Si vero horruerit, tolle. Si mulier ab vtero *Debilitas*
debilis sit, & bilis ipsam suffocet, & opus sit ipsam leuiter pur- *à partu.*
gare, & dolorem sedare, peucedani succum trium cyathorū
mensura bibendum dato. Si in lumbis aut lateris mollitu-
dine fuerint vteri, & transmouere velis, sulphur & bitumen *Cū lumbi*
terito, & melle cocto affuso, glandulam crassam facito, & in *et ilia ue-*
xantur.
C sedem indito, & vteri si sicci fiant, hæc quàm celerrime ap-
ponito. Mulieri si vteri sicci fiant, & ad pudenda promi-
neant, & inguina dura fiant, & calor in pudendis insit, can-
cerari incipit. Quum sic habuerit, cucumeris syluestris inter-
nam partem aridam terere oportet, & aquæ hemina affusa,
in sedē immittere, & purgari sinere donec purgetur. Quū
autem mulieri pharmacum dederis, ammisce ad pharmacum
ea quæ vteros purgant, & quæ expellunt.

Potiones, & subdititia medicamenta, quæ
secundas educere, & menses
detrahare possunt.

C Antharides quinque auulsis alis & pedibus ac capite,
deinde tribolos ad mare nascētes vnā cū radice mēsurā,
quāta est conchæ testa terito. & anthemii pallidā siue luteam
internam

HIPPOCRATIS LIBER

internam partem siccam tritam, conchæ testam addito, & se- D
 minis apij tantundem, & sepix oua quindecim & in vino dul-
 ci diluto bibenda dato. & quum dolor habuerit, in aqua cali-
 da desideat, & aquam mukam aquosam bibat. Aliud. Ra-
 nunculi foliorum & floris triti Aeginei stateris pōdus, in vi-
 no dolci bibat. Quum autem dolor habuerit, cicer album
 & vuas passas in aqua coquito, & perfrigeratam bibēdam da-
 to. & vbi vrinæ stillicidium vexarit, in aqua tepida desideat.
 Aliud. Adianti staterē Aeginæum, in vino albo pari aqua
 ammixta, bibēdum dato. Aliud. Violæ albæ semen quan-
 tum tribus digitis apprehendi potest, in vino albo eodē mo-
 do temperato, bibendum dato. Aliud. Leucorij nigri ra-
 dicem, in vino eodem modo sumat. Aliud. Crinanthemū E
 quod in domibus nascitur, eodem modo misceto ac bibendū
 dato. Aliud. Anchusæ foliorum pugillos duos, in vino al-
 bo æquali aqua ammixta, bibēdos dato. Aliud. Chamæ-
 leonis radicem, velut veratri potionē, derasam in vino albo,
 aqua pari mensura ammixta, bibendā dato. Aliud. Bras-
 sicæ & porri succum, ad vtrunq; succi silphij obolis tribus am-
 mixtis, & vino albo cum pari aqua bibendum dato. Aliud,

Oliuas albas priusquam oleum insit compunctas siccato,
 postea tufas & cribratas ac in vinum iniectas bibendas dato.
 Hoc & menses detrahit, & secundam expellit. Aliud. Di-
 ctamni Cretici obolū in aqua bibēdum dato. Et si hoc in po-
 tu dato, secundam eiicere non potes, sambuci succo cocto im-
 misso foueto, & cātharidem apponito. Hoc etiam fœtum ex- F
 pellit. Quum autem morsum intulerit, auferat, & rosaceo vn-
 guento tinctum apponat donec elapsa fuerit. Aliud. Po-
 puli nigræ creticæ grana nouem trita, in vino bibenda dato.
 Cum hoc etiam abluatur, si difficulter pariat. Aliud. Go-
 nyzæ testam conchæ maiore cum porri succo diluto, & ne-
 topi testam conchæ maiorem ammisceto. & hæc in vino bi-
 benda dato. Aliud quod menses detrahit. Peucedanum
 & panaces, & pæoniæ radicē, in vino bibenda dato. Aliud,
 quod fœtum mortuum & secundas eiicit. Violæ & portu-
 lacæ semen contundito ac misceto, & in vino albo veteri ex-
 hibeto. Aliud quod menses detrahit. Seminis violæ albæ
 quantum tribus digitis apprehendi potest, & stercoris capri-
 ni pillulas quinque aut sex, in vino odoratissimo permisceto,
 & bibenda

- A** & bibenda dato, ubi prius fomentum ex aqua & oleo immiseris. Adhibeto aut fomentum in sella. & ubi hæc bibit, quàm celerrime lotam reclinato. Brassicam vero edendam exhibeto, & succum eius sorbendum. Aliud. Seminis violæ albae quantum tribus digitis apprehendi potest, in vino bibendum dato. & in aqua calida desideat. Si vero id non habeat, fœniculi radices contusas, in aqua multa tepida macerato, & exhibeto. Aliud. Fraxini grana decem, in vino bibenda dato. Hoc in omni uterorum morbo commodum est, & valde ciet vrinam. Aliud. Succum silphij magnitudine erui, & nasturtij semen terito ac ammisceto, & in vino aut lacte canino bibenda exhibeto. Hoc etiam fœtum expellit. Aliud.
- B** fœtum eiiciens. Ranunculum herbam, & parum elaterij, in aceto temperato mixta bibenda dato. Aliud ad idem.

Brassicæ caulem tenerum, extremitate ex netopo illita, affricato. Aliud si menses non fiant. Terebinthi fructum tritum, in vino & aqua dilutum ac excolatum, ieiunæ bibendum dato. & calida lauetur. Aliud menses ciens. Rubra præoniæ grana, in vino ieiunæ bibenda dato. Aliud ad puerperij purganda. Fœniculi semen, & crethmi corticem, & thus, in vino bibenda dato. Aliud. Tædam quàm pinguiissimam in vino coquito, & præoniæ grana quinque in vino terito, & heminæ quadrantem bibendum dato.

- Aliud. Mercurialis semen & folia, in vino bibenda præbeto. Aliud. Præoniæ grana nigra quinque, & sapiæ ova
- C** in vino bibenda dato. Ad omnem puerperam. Ad irionē & polentam, oleum affunde, & coctum sorbeat. & cibis quàm molliissimis vtatur. Aliud. Scammoniam in lacte muliebri tritam, lana exceptam appone. Aliud. Mercurialis folia trita in linteo subde. Aliud. Herbam artemisiā tritam, & vnguento rosaceo imbutā appone. Aliud. Albam radicem tritā ac rosaceo vnguento subactā appone. Aliud.

Præoniæ radicē melle, vnguento rosaceo & Aegypto subactam, in lana subde. Aliud. Farinam non lotam eodem appone. Aliud. Lolij & tritici farinam, simul melle subactas, in lana subde. Aliud quod menses & puerperij purgamenta purgat & aquā ducit. Radicis struthij tusti tritum tribus digitis apprehendi potest, melle subactum appone. Nascitur autem in Andro in littoribus. Aliud ad uteros depurgandos.

HIPPOCRATIS LIBER

depurgandos. Mercurialis contusa, & cucumeris syluestris modiciū, in vino tere, & melle subacta appone. Aliud. Pilos leporis cōbustos, ac tritos in vino, & melle cocto & aqua subactos, bibēdos dato, & aqua calida lauetur. Aliud partus purgatoriū. Polentā crassius fresam dimidij hemichœnicis mēsurā, in aquā heminis quatuor coquito, & vbi efferbuerit, bis aut ter sorbendā dato. Aliud purgās puerperij purgamētā. Sābuci folia coquito, & oleo affuso bibēda dato. Edat & brasīcas coctas, & porrū. Aliud purgās vteros. Rhois folia & irionē terito, & in vino, polētā inspersā, bibēda dato. Aliud. Misyos obolos duos tritos & vino subactos apponito. Aliud.

Lini semen tritū, vino subactū apponito. Aliud. Trifolij semē in vino bibendū dato. Si vero ad lūbos vteri incubuerint, polypos coctos edat, itemq; assatos. & vinū bibat nigrū, odoratum, meracū q̄ plurimū. Aliā potiones, medicamēta subdititia ac purgatoria. Rhoē rubrū, & vinacea, in aqua coquito, & farina tritici recētis in aquā inspersā, bibendā dato.

Aliud. Farinā in aquā iniectā bibēdā dato. Aliud. Mora rubi siccato ac terito, & polenta recēti ammixta, amborū acetabuli mensuram, in vino odorato & aquoso, bibat. Aliud. Terrā nigrā samiam in aqua tritā, tali magnitudine bibendā prębeto. Aliud. Hypocistidē in vino bibendā dato. Aliud. Mala punica vinosā exsuccato, & polentā cum succo, subactā siccato. Postea tritā in vino bibendam dato. Aliud. Baccas myrti nigras tritas in aqua diluito, & polenta inspersā, bibendas exhibeto. Aliud. Mali punici dulcis assati drachmā, in vino tritā bibendā dato. Aliud. Triticū & ordeū torrefacta, trita, & ad farinam redacta, in vino nigro bibenda dato.

Aliud. Mali punici dulcis internā partē, pari aqua ammixta bibendā dato. Aliud. Cicutæ quantū tribus digitis apprehendi potest, cum aqua bibendū dato. Aliud. Farinę tritici recētis, & gypsī, æquales partes mixtas in aqua bibēdas dato.

Aliud. Mali punici dulcis corticē ac coriū, in vino bibendū dato. Aliud, si sanguis ex vteris fluat. Vitis folia in vino nigro bibenda dato. Aliud, ad fluxū ac dolorē. Rosmarini radicē in vino bibendā dato. Alias item potiones ad vteros habes. Cedri fruct⁹, seseli, cuminū Aethiopicū, casīæ fructū, iuniperi baccas, miliū, lentisci fructū, nigellā, dauci radicē ac semē. Aromata vero, thymū, thymbrā, ericen, hypericū, papauer album,

A uer album, crethmi radices ac semen, malux radices, mercurialis semen, & folia, vrticæ semē, saluiam, populum nigrā, dictamnū, pseudodictamnū, amomum, cardamomū, heleniū, aristolochiam, castorium, adiantum, dracontium, percedanū, rutæ folia ac semen, apij semē, fœniculi semē, hipposelini semen & radices, hippomarathri semen & radices, struthij semen & radices, hyssopum cilicium, irionem, pæoniam, panaces. Quodcunque horum volueris, & cum altero permixtū, & per se in vino aut aqua prout volueris coctū, exhibeto bibendum. Commoda sunt & purgatoria, & quæ dolores sedant.

Malux radicem in aqua dato. Aliud. Pæoniæ semen modico cedrino oleo ammixto, in vino bibendū dato. Et uterorum dolores sedabis. Aliud, quum uteri suffocarint. Castorium & conyzam in vino albo bibenda dato. Si vero ad nares accefferint, cnidij internā partem albam, melle ammixto, naribus illinito. Aliud sedans dolores. Malux radicem, & fœniculi ac crethmi corticem, ex aqua bibenda dato.

Aliud. Stellas marinas nigras, & brassicam misceto, & in vino odorato bibenda præbeto. Aliud. Myrrhæ obolos tres, coriandri parum, resinam, pæoniæ radicem cuminiū Aethiopicum, hæc trita in vino albo diluta, leuiter tepesacta bibenda dato. Aliud, quod secundas expellit. Rucini radicem bibendam dato. Aliud, si ad cor allapsū uteri strangularint. Viticis & pæoniæ semen, in vino bibendum dato.

C Apposititia acris sanguinem ducentia. Cantharidas quinque thuri ac myrrhæ ammisceto, & glandulam longam magnitudine gallæ formato, & lana obuolutā linteo albo circumdato, & vnguento Aegyptio albo aut rosaceo madesactā apponito. Aliud. Buprestim si parua fuerit, totā, si magna, dimidiā, ad prædicta ammisceto, & eodē modo apponito. Si vero mollioribus uti veliat, buprestidas in vinum mitte, & cuminiū Aethiopicū, & fœseli, ac anisum addito ac feruefacito. ad decē vero buprestidas, acetabulū olei ammisceto, reliquis omnibus æquali portione acceptis. Ammisceto etiā myrrhæ ac thuris parū. Ex hoc pugillū accipito, & velut priorē glandulā subdito. Aliud. Nigellā terito cū melle, & vino subactā in glandulā redigito, ac utere velut superiōre. Aliud. Philistiū eodē modo preparatū apponito. Aliud. Telephiū eodē modo preparatū subdito. Aliud. Anemonæ folia trita linteo excipito,

HIPPOCRATIS LIBER

excipito, & myrrha parum ammisceto, & eodē modo vtor. D

Aliud, quod sanguinem ducit. Glandem Aegyptiam terito, & sulinum vnguentum quod est in terra Aegyptia addito, & aqua diluta, ac lana inuoluta apponito. Aliud bilē purgans. Cucumeris sylvestris medullam tritam, ac melle subactam, & ad glandis formam redactā apponito. Aliud. Colocynthidis sylvestris internam partem terito, & melle subactam eodē modo subdito. Aliud. Elaterij potiones quatuor, adipe anserino & caprino, & misy ammixto, in glandulam formato, & in linteo apponito. Aliud. Thlaspi tritū, & melle imbutum apponito. Aliud. Foliorum fici saniē deradito, & elaterij potiones duas ammisceto, & nitri tātundem, melleque subacta apponito. Aliud, si vteri inflammationi fuerint. Nitrum rubrum, ficus pinguedinem internam, vtriusque pares portiones tritas, & ad gallę magnitudinē efformatas subdito. Aliud. Cumini folia cum vino trita, in linteo subdito. Aliud. Radicē albā terito, & melle affuso seruefacito, & glādulā inde factā subdito. Aliud. Succū filiphij, & ficū, mixta in glandē formata apponito. Aliud. Cucumeris sylvestris semen tritū eodē modo. Aliud. Fel tauri, nitrū rubrum, netopon, cyclaminū terito, & de singulis gallę magnitudinem, de cyclamino vero plurimū, melli ammisceto & apponito. Aliud. Cyclamini caput purgatum, in aqua tritum ac linteo illigatum apponito. Aliud. Myrrham, salem, cuminum, fel tauri, hæc melle subacta ac linteo excepta subdito. Aliud. Grana cnidia triginta deligito, & tria Indici pharmaci oculorum, quod piper vocatur, & alia tria de rotundis. Hæc tria in vino veteri trita, & oleo dulci diluta ac subacta, lanaq; excepta subdat, & vrina eluatur. Aliud.

Tithymali succum melle subactum, ac linteo exceptum apponito. Aliud. Scillę radicem longitudine digitorum sex sumito, & duobus digitis lana obuolutis subdito. Alia mollientia, à quibus aqua purgatur, & sanguis ac menses ducuntur, si non diuturni fuerint, & os vteri mollietur. Narcissinum, cuminum, Aethiopicum, thus, absinthium, cyperum: aliorum quidem singulorum æquales portiones sumito, narcissini vero partes quatuor. Hæc trita & in glandulam efformata, linteoque crudi lini excepta apponito. Aliud. Cyclaminum magnitudine tali, & florem æris magnitudine fabæ terito,

A terito, melle subigito, & efformatam hinc gládulam subdito. Aliud. Pulegium, myrrham, thus, fel suillum, melle subigito, & in glandulâ efformata subdito. Alia acerba. Rhoem vino nigro subactum apponito. Aliud. Cnicum eodem modo præparatum subdito. Aliud. Lori ramenta eodem modo apponito. Aliud. Rhoem melle ammixto subdito. Alia mollientia. Sulphur, adipem, vitellum oui, farinâ, melle subige, & tepesacta in lana subde. Aliud. Pinguedinem anseris, adipem ouillum, ceram albam, resinam vnguentum rosaceum, tenui linteo excepta appone. Aliud.

Medullam cerui & adipē liquefacito, & in lana apponito.

Aliud. Adipem ouillum aut caprinum, & oui candidum, rosaceo vnguento subactum, ac lana exceptum apponito.

B Quæ ad eluendos veteros infunduntur. Grossos hybernos in aquam missos ad lentum ignem coquito, & oleo ad decoctum affuso eluito. Deinde vero malicorium, & gallam, & lori ramenta, in vino acerbo coquito, & hoc excolatum infundito. Aliud. Fecem vini combustam in aquam mitte, & postea cum aqua collue. deinde malicorio, myrti baccis, foliis rhois in vino coctis, vinum excolatū infunde. Aliud. Lentisci, saluæ, hyperici folia, in vino nigro coquito, ac infundito. Aliud. Si quid in vteris fuerit exulceratum. Butyrū, thus, myrrham, resinę parum, infunde. Aliud. Porrum in aqua coquito, & excolatam aquam ad vinum ammixtam infundito. Aliud. Sambuci fructum, anisum, thus, myrrhâ,

C vinum, sumito & horum succum infundito. Aliud. Brassicam in aqua coquito, & in brassicę succo, mercurialē coquito, modico lini semine adiecto, & postea excolatum infundito. Aliud. Myrrhæ acetabulum, thus, seseli, anisum, semen lini, netopum, resinâ, mel, pinguedinem anseris, acetum albū Aegyptium, horum singulorum æquales portiones terito, & in vini albi heminis duabus diluito, & postea tepida infundito. Aliud. Mercurialem in aqua coquito ac excolato, & myrrhę acetabulum, thuris, netopi, singulorum equas portiones ammisceto, ac tepida infundito. Aliud. Saluiam & hypericum in aqua coquito, ac infundito. Aliud. Sambuci fructū, & lauri baccas, æquis portionibus in vino coquito, deinde vinum infundito. Aliud. Pulegium in aqua coquito, & oleo ad aquam affuso immittito. Aliud. Pingue-

HIPPOCRATIS LIBER

dinem anseris, & refinam, colliquefacta infundito. Aliud. D

Butyrum, oleum cedrinum modicum, cum melle liquefacto, & tepida infundito. Aliud. Cyperum, iuncum rotundum odoratum, calamum aromaticum, pari portione myrrham misceto, & cum his Sisymbrium in vino coquito, ac infundito.

Aliud. Semen apij, anisi, fœelis, nigellam, in vino coquito ac infundito. Aliud. Cedrum creticum in vino coctam infunde.

Aliud. Bryoniam albam & myrrham, in aqua diluta infunde. Aliud.

Argenti florem cum vino & aqua infunde. Aliud. Elaterij portiones duas aqua dilutas infunde. Aliud. Cucurbitas siue colocynthidas sylvestres duas, in vini aut lactis co-

cti heminis quatuor madefacito, excolato, ac infundito.

Aliud. Cucumeris sylvestris medullam palmi parui magnitudine, in aqua heminis quatuor coquito, & melle ac oleo affuso infundito. Aliud. Radicis thapsiae duas portiones, & mel ac oleum, in duabus aqua heminis diluito ac infundito. E

Aliud. Veratri duas portiones in duabus aqua heminis tepida infundito. Aliud. Thlaspios acetabulum melle admixto, in duabus aqua heminis diluito, ac tepide infundito.

Aliud. Cucumeris sylvestris magnitudinem palmi parui, in aqua heminis quinque coquito, & melle affuso infundito. Aliud. Grana cnidia sexaginta, oleo & melle diluta infundito. Aliud. Si natura pituitosa fuerit. Cneori

portionem tritam, in aqua mulsa hemina Aeginæa diluito, ac infundito. Aliud. Si biliosa fuerit. Daphnes portionem

odoratae illius drachma pondus, scammoniae portionem, terito & in aqua mulsa, aut aqua vuae passa hemina Attica diluito. Aliud. Daphnoidis portionem eodem modo. & si biliosa fuerit, hæc infunde: Si vero pituitosa, grana cnidia electa, & succi tithymali portionem infundito. Similiter etiam cneoro, & peplo, utrisque his uti oportet. Immittito autem cum infuso non ampliore quam duarum heminarum. Suffitus porro sunt hæc contusa. Gallam suffito. Aliud. Ramenta loti ad oleæ folia sicca contusa misceto, & oleo subacta suffito. Aliud. Prunas subiicito, & ordeï paleis humidis inspersis suffitum facito. Aliud. Super amphoræ oleariae operculo stœben incendito. Aliud. Cupressi ramenta suffito. Aliud. Scammoniam, myrrham, thus, vnguento affuso suffito. Aliud. Bitumen, & ordeï paleas misceto, F

A misceto, ac addita pinguedine phocæ suffito. Aliud Fraxinum, cupressi ramenta, cyperi radicem, vnguento rosaceo subacta suffito. Aliud. Calamum, cyperum, bryoniam, muscum, arboreum, apij semen, anisum, simul mixta & vnguento rosaceo subacta suffito. Aliud. Resinam siccam cineri feruido inspersam suffito. Aliud. Cinamomum, myrrham, casia, paribus singula portionibus suffito. Aliud.

Crocum ammixta myrrha, & musco, æquali cum croco portione suffito. Aliud Calamum, cneorum, crocum, folia rosarum rubra suaue olentia trita & siccata ad crocum ammisceto, & styracem dimidia croci portione addito. Hæc trita mixta & siccata, melle cocto modico subigito. Horum vero omnium suffitus sit oboli Attici pondus. Suffiantur autem super stercore bubulo. Formetur autem stercus velut acetabulum olearium, habeatque fundum tenue, & sit siccum. Ignis autem sit sarmentitius, in quo stercus iaceat, & ex illo mulier insidens contacta suffiatur. Aliud. Galbanum, resinam, mannam, vnguento rosaceo subacta suffito.

B Aliud, Panacis & cupressi ramenta, vnguento Aegyptio albo subacta suffito. Aliud. Cinamomum, nardum & myrrham vnguento rosaceo imbuta suffito. Aliud. Violæ albæ semen, cedri ramenta, & galbanum, melle subacta suffito. Aliud. Stercoris caprini pilulas, & leporis pilos, pinguedine phocæ subacta suffito. Aliud. Coaguli phocæ pelliculam contusam ac tritam, & spongiam, & muscum arboreum, trita simul mixta, atque phocæ pinguedine excepta suffito. Aliud. Stercus caprinum, & pulmonem phocæ, ac cedri ramenta suffito. Aliud. Stercus bubulum, cedri ramenta, & bitumen suffito. Aliud. Spinæ Aegyptiæ fructum, & cedri ramenta, & myrti siccæ folia. Hæc trita & vnguento molli subacta suffito. Multa vero aromata in vnguentū inticito. Aliud. Vinacea tusa trita, & cedri baccas, & resinam pinus, simul mixta & passo cocto subacta suffito. Fomenta. Stercus bubulum contusum ac cribratum, acetæ dimidia mensura, & de cocti erui dimidia adiecta, leniter pro fomento adhibeto. Postquam autem fomentum adhibueris, lenticulæ decoctum bibendum dato ac reuoluentum. Et farinam sorbendam, ac vinum insuper bibendum. Postridie vero granum cnidium deuorandum exhibeto. Se-

HIPPOCRATIS LIBER

quenti die quod vrinam ciet, hoc scilicet . Ciceris albi partes D
 duas tritas, vñ passę tertiam partem, affusa aqua ad dimidias
 coquito, deinde excolatam aquam per noctem sub dio expo-
 nito, & postridie bibendam dato. Et de cetero saluam ac li-
 ni semen, polenta ad ambo hæc ammixta, bis per diem in vi-
 ni diluti heminis quatuor dato. Aliud. Olei heminas di-
 midias tres, foliorum sambuci manus plenę mensuram . Hæc
 cocta in craterem calidum fundito, & per testas calidas im-
 missas fomentum facito, muliere in sella collocata, ac vesti-
 mentis cooperta. Aliud. Foliorum sambuci manus ple-
 nę mensuram, & myrti tantundem in aquam missa coquito,
 & ad excolatā aquam, ordeï paleas iniicito, coquito, & lin-
 teo excipito, ac cum hoc fomentum facito, prout maxime ca- E
 lorem ferre poterit. Aliud. Acetum, oleum, aquam, mel,
 hæc mixta valde feruefacito. deinde accepta vesica capiente
 congiū, aut vtriculo ex tenui corio factō, infundito, & pan-
 niculo laneo obuoluto, foueto. Quum autem tepidus factus
 fuerit panniculus, alium obuoluto. Aliud. Pini corti-
 cem, & rhois folia in aquam coniecta fortiter coquito : & in
 excolata aqua ordeï paleas coquito, oleo affuso. vbi vero si-
 mul coxeris linteo excipito, ac foueto. Aliud. Loti ra-
 menta & cupressi, aqua & oleo affuso coquito. Deinde simul
 cocta linteo excipito, ac foueto. Aliud. Aromata in aquę
 chœnicem coniecta coquito. & in excolata aqua fursures tri-
 ticeos coquito, & foueto. Aliud. Eodem modo gallam
 contusam, & rhamni corticem in aqua coquito. & cum aqua F
 fursures triticeos subigito, ac oleū ammisceto. Postea semiaf-
 satum panem duos chœnices habentem facito, linteoque ex-
 cipito, ac foueto. Aliud. Brassicam & porrum decoqui-
 quit, & cum succo eodem modo fomentum facito. Aliud.
 Ordeï paleas coquito, oleo affuso, & linteo excipito, ac fo-
 ueto. Aliud. Solanum & oleę folia coquito, & eodem mo-
 do fomentum facito. Atque hæc sanè, si quidem humidis
 vti volueris, pro fomento velut scripta sunt adhibe . Si vero
 siccis, panes parato & exassatos, & semiaffatos, & cum his fo-
 ueto . Sed & testis calidis linteo inuolutis foueto, itemque
 cum ipsis linteis calefactis . & cum lenticulis vasis testaceis,
 feruente aqua infusa, Apponito autem ad pedes. Aliud.
 Iridis radicem tundito ac coquito, & eodem modo foue-
 to. Si aqua

A 10. Si aqua in vteris gignatur, menses pauciores sunt, & *Menses*
deteriores, & per longius tempus, & prægnans est semper per *quando*
duos menses, aut paulo amplius. Quum autem hoc tempus *pauciores.*
aduenerit, & corrumpit, & aqua multa in ipsa gignitur. huic *Medela.*
autem lac bibendum dare oportet, & peplum, mecona dictum,
donec foetus moueri inceperit. Plerumque vero ante hoc cor-
rumpitur, & per abortum extruditur, & vteri sanguine man-
nant. Hæc autem patitur nihilo magis ex labore, quam ali-
ter. Hoc autem cognoscere poteris quod hydrops inest, ex
digiti contactu. Comperies enim osculum ipsorum gracile, &
obscuratum ac plenum humiditate. Si vero non circa initia,
sed dum iam mouetur, foetus ipsi corrumpatur ac suffocetur,
B tunc & venter imus intumescit, & ad contactum dolet, velut
ulcere præsentem. & febris ipsam ac dentium fremitus corri-
pit. Et dolorem habet acutum & vehementem, circa puden-
dam, imam ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem ac co-
xendices. Quum sic habuerit, calida ipsam lauare oportet. Et
qua parte dolor hæserit tepesfactoria adhibere, experimento
facto de eo quod maxime admittat. & pharmacum deorsum
purgans bibendum dato, Interposito vero tempore quantum
tibi sufficiens esse videbitur, & collutione facta, & fomento ad-
hibito, cyclaminum apponito, ita ut melle subactam, & lin-
teo exceptam deliges, & ad os vterorum apponas. Cupressi
etiam ramenta in aqua madefacta, eodem modo apponito.
C Verum hæc breuiore tempore, & per longius temporis in-
teruallum, quanto magis mordent & exulcerant. Et specil-
lum stanneum paratum immittito, & digitum eodem mo-
do. Portiones quoque bibendas dato, experimentum faciens
quas libenter admittat. & cum viro dormiat, maxime opportu-
no tempore præsentem. Si enim genituram conceperit, & præ-
gnans facta fuerit, ac pepererit, subexpurgantur & quæ prius
in ipsa fuerant, cum ipso puerperij purgamento. Atque sic ma-
xime sana fieri poterit. Si indurati fuerint vteri, & os ip-
sorū asperum sit, & menses occultantur. Quum vero ap-
paruerint, velut arena sunt. & genitura hoc tempore non
fit. Si vero etiam digito contigeris, asperum comperies os
vterorum. Quum sic habuerit, cyclaminum terere oportet, *Vteri du-*
& salem ac ficum crudam ammiscere, & cum melle efforma-
ta apponere. & fomento adhibito, purgatoria infundere. *rities.*
Curatio.

HIPPOCRATIS LIBER

Edat autem mercurialem, & brassicas coctas, & succum sor- D
 beat, & calida lauetur. Si indurati fuerint vteri, & menses
 occultantur, & os ipsorum conniuet, & nō concipit. Quum sic
 habuerit, si digito contigeris, comperies os asperum, & digi-
 tum non intromittit, & febris ipsam corripit, ac dentium fre-
 mitus. Et dolor habet imum ventrem, & laterum mollitudi-
 nem, & lumbos. Paritur autem hæc, si fœtus in ipsa corru-
 ptus fuerit putrefactus. Quibusdam vero etiam ex partu con-
 tingit. Sæpe etiam aliter. Quum sic habuerit, multa calida ip-
 sam lauare oportet, & fomentum adhibere. Quum autem re-
 cens lota aut fota fuerit, immisso specillo os aperito ac dila-
 tato, & per digitum eodem modo, & velut in priore scriptum
 est apponito. Et potiones similiter bibendas dato. & eodem E
 modo curato velut priorem. Si vteri ad latus allapsi fue-
 rint, tussis detinet, & dolor sublatus, & vterus durus velut pi-
 la insidet, & ad contactum dolet velut ab vlcere. Et contabe-
 scit, & videtur peripneumonia esse, & conuellitur, & gibbo-
 sa fit. Et menses omnino non apparent. Quibusdā vero prius
 conspecti, euanescent. Tunc autem sientes, debiles sunt ac
 pauci, aut deteriores quàm antea, & genitura nō fit hoc tem-
 pore. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bi-
 bendum dato, & eo epoto, multa calida ipsum lauato. & ex
 tepefactoriis quod maxime admittit adhibeto. & à quibus
 sanguis purgatur ea apponito. & lini semen tostum, tufum
 ac cribratum, & peplum album, & saluiam cum polenta te-
 nuī, & caseum caprinum, sordibus & salis muria derafis: hæc F
 misceto, vt casei sint partes duæ, reliquorum vero vna: po-
 lenta autem sit antiqua non falsa, & ieiunæ in vino bibenda
 dato. Vespero vero cyceonem crassum melle affuso exhibe-
 to, & ex potibus quemcunque libenter admiserit bibendum
 dato. Et frequenter fomentum adhibeto. Calidam vero as-
 pergito, & per ceratum leniter mollito, ac à latere detrudi-
 to, & latus fascia lata deligato. & lac bubulum quàm plurimū
 ad dies quadraginta bibendum præbeto. Cibis autem vtatur
 quàm mollissimis. Morbus hic vehemens est & lethalis. &
 pauca etiam si curentur ipsam effugiunt. Si os vterorum
 concludatur, forte fit velut grossus ficus. Et si digito conti-
 geris, comperies durum ac contractum. & digitum non in-
 tromittit, & menses occultantur, & geniturā non suscipit hoc
 tempore.

*Vteri ad
lat^o allapsi*

Medela

*Cū os ute-
rorum con-
cluditur.*

- A** tempore. & dolor habet imum ventrem, & lumbos, & laterū mollitudinem. Quandoque etiam sursum procedit, & suffocat. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum præbeto. & multa calida lauato. & quæ os molliunt apponito. & specillum immittito ac aperito. & digitum similiter. & calidam aspergito. Quum autem molle factum fuerit, ea quæ sanguinem purgant apponito. & ex potionibus dato, experimento facto quam libenter admittat. & brassicam edat, & succum eius sorbeat. Si vteri obliqui fiant, etiam os ipsorum obliquum fit, & menses ipsi nunc occultantur, nunc prius apparentes euanescent. & non similes fiunt, sed deteriores & pauciores quàm antea. & genitura non fit hoc tempore. & dolor habet imum ventrem, & lumbos, & coxam, & attrahit ipsam. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet. & calida lauare. ac fouere. Vbi vero recens fota aut lota fuerit, digito immisso os vterorum corrigat ac dirigat. & odoratorum suffitum admittat. & ex potionibus dato, iuxta experimentum quam libenter suscipit. Cibus autem vtatur mollibus. & allia edat cocta ac cruda. & cum viro dormiat. & in sanam coxâ decumbat. Alteri vero fomentum adhibeat. Morbus autē difficulter cedit. Si inflati fuerint vteri, & vter attollitur ac inflatur, & pedes intumescunt, & caux faciei partes. Color vero iniunctus fit. & menses non fiunt. & genitura hoc tempore non fit, & anhelat. & anxia moeret. & quum surrexerit, aut progressa fuerit, erectæ ceruicis spiratio ipsam tenet. & quicquid ederet aut biberit, ipsam molestat. & gemit, & magis agre tristatur quàm priusquam ederet. Sæpe vero etiam suffocatur. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum dato. & calida lauato, ac fomentum adhibeto. Interposito vero tempore quodam, apponito ea à quibus purgetur, ac non mordeatur. Frequentissime vero totum corpus foueto. Tunc autem & sub pudenda odorata suffiantur. Sub nares autem graueolentia. & potionibus dato quæ vteros purgant, & ad locum compellunt. Et Mercurialem edat. & lac bibat, velut de latere dictum est. Morbus autem non est diuturnus. Si sanguinis grumi in vtero coierint, os ipsorum velut eruo plenum fit. & si attigeris, ita habere deprehendes. & menses non fiunt. Neque genitura retinetur, quàm diu sic habuerit. Quum

*Medela.**Vterorum obliquitas.**Medela.**Vterorum inflatio.**Medela.**Grumi sanguinis in utero.*

HIPPOCRATIS LIBER

Medela. igitur ita habuerit, cyclamini corticem detrahito, & allium, D
& salem, & ficum, & mellis parum terito ac permisceto, &
glāndulam hinc formatam ad vterorum os apponito. & alia
vteris conuenientia medicamenta subdito, quæ videlicet a-
cria sunt ac corrodunt, & à quibus sanguis purgatur, & de po-
tionibus dato eas quæ vteros purgant, & omnia circumradi-
to. & vesicæ pellicula siue cuticula digitis obuoluta, os vte-
rorum deradito. Si obtorti fuerint vteri, & menses non
Vteri ob- fiunt, & genitura non manet intus, & dolor habet imum vē-
torti. trem, & lumbos, & laterum mollitudines, & si digito conti-
geris, os vterorum attingere non poteris, nam fortiter seces-
sit. Quum sic habuerit, pharmacum bibendum dare oportet,
Curatio. à quo sursum ac deorsum purgetur, magis tamen deorsum. E
& os ipsum ac vteros quàm maxime fouere, ac calida lauare
bis in die. & de potionibus dato quam libèter susceperit pro
experimento. & viro condormiat frequentissime, & brassi-
cam edat. Si vteri commoti in loco non manserint, quo
prolapsi fuerint dolores exhibent, & inconspicui fiunt. Quā-
doque vero eminent, velut sedes prolapsa. Et quum quidem
Cum uteri supina decubuerit, in loco manent. Quum autem surrexerit,
non confu-
sunt. aut se inclinauerit, aut alias se commouerit, exeunt. Sepe ve-
Medela. ro etiam quietem habent. Hanc quàm maxime quiescere o-
portet, & non moueri. & lectum ad pedes altiore statui. &
iisdem vti, velut in superioribus. & cum acerbis infusis con-
spergere. & graueolentia suffire. Sub nares autem odorata.
& malum punicum in medio per vmbilicum perforato, & in F
ipso picem quæ maxime congruat cum vino tepesacito, &
non valde premens quàm penitissime apponito. Quum au-
tem quid apposueris, lata fascia exceptum ex lumbis deliga-
to, vt ne dilabatur, sed maneat & faciat quod expetitur. &
peplum cum casco, & polenta, bibendum dato, velut in alla-
psu ad latus dictum est. & ex potionibus quam maxime ad-
miserit bibendam præbero. Cibis autem mollissimis vtatur.
& cum viro quàm maxime dormiat. Si hiauerit os vtero-
Cum uteri rum magis quàm solet, menses plures fiunt, & deteriores, &
hiant. humidiores, & per longius tempus. & genitura ipsam non
contingit, neque intus manet, sed rursus foras effunditur. &
si digito contigeris, os vterorum hians comperies. & impo-
tentia ipsam corripit præ mensibus, & febris ac rigor. & do-
lor tenet

Alor tenet imum ventrem, & lumbos, ac lateris mollitudinem. patitur autē hęc maxime, si quid in ipsa fūsum fuerit, & corruptum cōputruerit, patiuntur etiam ex partu, & aliā aliter. Quum sic habuerit, pharmacū bibendum dare oportet, à quo sursum purgatur. & quum dolor habuerit, tepefactoria apponere, & calida lauare, & interposito tempore, per infusā colluere, velut scriptum est in priore. & de potionibus dare quā libentissime susceperit. & suffire quæ siccant. Edat autem polypōs & mercurialem. Si leuigati fuerint vteri, & menses plures fiunt, & deteriores, & humidiores, ac frequentiores. & genitura intus non manet, sed rursus exit. & si digito contigeris, comperies os leue. Et impotentia ipsam corrūpit prae-

Medela.

Cum uteri
leuigati
fuerint.

B mensibus, & febris ac rigor. & dolor imum ventrem, & lumbos, ac lateris mollitudinem, maxime si quid in ipsa corruptū computruerit, & ex partu, & alias. Quum sic habuerit, curare oportet vbi dolor habuerit, velut scriptum est in priore. Si vteri ad ventrem nutauerint, dolor acutus & vehemens coxendices, & lumbos, ac laterum mollitudinem habet. Et crus claudicat. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet, postmodum vero suffire hoc modo. Ordei chœnices duas, & oleę folia probe contusa, & gallam cōtusam ac cribratam, & hyoscyami tertiam chœnicis partem. Hęc mixta, & olei hemina dimidia affusa, efformata, in olla per dies quatuor, ter in die suffito. Noctū vero lac bubulum, & mel, & aquam bibat. & calida lauatur. Si ad caput con-

Medela.
Cum uteri
in uentre
uagentur.
Medela.

Cuersi fuerint vteri, signum hoc est. Venas in naso & sub oculis dolere videtur. Hanc calida multa lauare oportet, etiam in capite, lauro & myrto in aqua incoctis. & caput vnguento rosaceo illinatur. & odorata subter suffiantur. & brassicam edat, & succum absorbeat. Si ad crura & pedes conuersi fuerint, ex hoc cognoscēs. Magnis pedum digitis cōuellitur sub vngues. Et dolor crura ac femora tenet. Quum sic habuerit, multa calida ipsam lauare oportet. & fomentum adhibere quod maxime libenter admiserit. & subter suffire graueolētia. Et vnguento rosaceo vngere. Si mulier vterum auersans vteros doleat, & febris ipsam ac rigor corripiat, pepli albi quintam dimidię chœnicis partem, & seminis vrticę tantundem, & casei caprini rasi dimidiam chœnicem, simul cum vino vetere molliō, deinde cocta sorbenda dato. Si ex partu

Cum uteri
caput uer-
xant.
Medela.Cum uteri
crura &
pedes non
lesiant.Cū cibis fa-
stidium ob-
uulsa dor-
lorem ob-
repiit.

HIPPOCRATIS LIBER

Cum fluor partu fluxus corripiat, & cibi in ventre non maneat, uiam **D**
post partū passam nigram, & mali punici dulcis grana trita, & coagu-
uexat. lum hœdi, vino nigro diluito ac utitor, ita ut caseum capri-
Medela. num derasum, & polentam tritici torrefactam adicias, & be-
Sanguinis ne temperata bibenda præbeas. Si ex partu sanguinem vo-
uomit. mat, hepatis fistula sauciata est. & dolor ad viscera procedit,
Medela. & cor conuellitur. Hanc multa calida lauare oportet, &
 tepefactoria quæ maxime admiserit adhibere, & asininū lac
 bibendum ad dies quinque dare. Postea vero vaccæ nigræ
 lac bibendum præbere, ita ut sine cibo degat, ad dies quadra-
 ginta. Ad vesperam vero sesamum tritum bibat. Morbus hic
 est periculosus. Si mulier diu non concepit, mensibus ap-
Cum diu parentibus tertia aut quarta die, alumen tritum inungento
turno tem dilutum, lana exceptum appono. & per tres dies appositum
pore non habeat. Tertia vero die fel bouis radito, & ramentum oleo
concipiat. dilutum ac subactum, linteum exceptum apponito. Et tres di-
Morbos es appositum habeat. Sequenti vero cum viro coeat. Ad v-
uterorum terorum morbum sedandum, lini scissi vna cum stipula pu-
remediū. gillum tenuiter tussum, in vino albo quàm iucundissimo per
 noctem madefacito, deinde excolatum in ollula tepefacito,
 & in eo lanam mollissimam tinctam apponito, & vicissim
Purgamē priore detracta aliam subdito. Si vteros purgare voles, pri-
ta utero- mum quidem ordeum oleo imbutum in prunis suffire oport-
rum. tet. Postridie vero carnem ouillam coquere, cum ordeum deco-
 ctum sub dio per noctem exposito. Sit autem decoctum ordeum
 congiij mensura, & valde ipsas coquito. Vbi vero coctæ fue-
 rint, leuiter tepidas edat, & iusculum sorbeat. Postridie autē
 thus & pulegium tritum, melle subactum & lana exceptum
 ad triduum subdito. Si vteri ad sedem conuersi fuerint, &
Cum uteri secessus secedere prohibuerint, dolores habent & lumbos, &
sedem pe- imum ventrem, & ilia. Quum sic habuerit, calida ipsam laua-
tunt. re oportet, & lumbos fouere, & graueolentia suffire. & ap-
 ponere quæ purgant & impellunt ipsos vteros. & bibenda
 dare ea quæ maxime admittit. Si vlceratum fuerit os vte-
Cū os ute- rorum aut inflammatum, myrrham & adipem anserinum, &
rorum ul- ceratur. ceram albam, & thus, in leporis pilis qui sub ventre sunt mi-
Cū secūda sceto ac terito, & in lana mollissima apponito. Si secundæ
decedere decedere non possint, statim quidem a cibo abstinere oport-
nō possūt. tet, Viricis autem folia trita in vino & melle, oleo affuso te-
 pefacito,

- Apefacito, & heminae mensuram bibendam dato. Si inflammati fuerint uteri, sambuci folia tenerrima in tritici recens crassiore farina coquito, & leuiter tepida sorbenda dato. Si uteri transmoti fuerint, hederam siccissimam tritam, & linteolo tenui illigatam subdito. & pingue aliud nihil adhibeto. Bibendum vero dato triticum recens, & pepulum tostum, & saluiam, & cyperum, & anisum. Hæc trita viro diluta cum furfuribus ordeï bis in die dato, pro vice dimidian heminam. Si menses constituto tempore non fiant, brassicæ folia & rutam terito, postea paleas ordeï chœnicis mensura madefacito donec flaccescant, & per noctem sub dio exponito. Mane vero in hemina inde excolata brassicam ac rutam diluito, & affuso oleo conquassato, & bibenda dato. postea polypum vino albo suffocatum edendum dato, & vinum ebibendum. Si vero volueris, pisces odoratissimos coctos edendos dato, & iusculum sorbendum.
- Si ex feruido & superficiario ulcere pudenda fuerint exulcerata, myrti baccis in vino coctis pudenda colluat. Et postea mali punici dulcis putamina in vino coquito, & myrrham ac resinam simul mixta vino diluito, & intinctum in his linteum subdito. Si vrinae stillicidium corripit, cucumeris siue cucurbitæ os & fundum rescato, & subiecta pruna cucumim circumponito, & inspersa in ignem myrrha, mulierem super cucumim locato, ita vt summam cucumeris partem quàm penitissime in pudendum indat, quo vapor plurimus in pudenda transmittatur. Et ex potionibus vrinam cientibus ieiunæ aliquas exhibeto. Si ad cor progressi uteri suffocent, & non decedant, porri semen tritum, & pulegium, in aquæ cyathis tribus, & aceti albi cyatho vno, & mellis tertia cyathi parte diluito, tepefacito, & ieiunæ sorbenda dato. Si ex partu, aut abortu, rigor corripuit, iuniperi fructum & saluiam simul trita, in aceti albi cyatho diluito, & vini albi diluti poculum affundito, versato ac stare finito. Mane vero excolato, & tepefactum bibendum dato. Si uteri inflati fuerint, & si ventus in vtero fiat & dolor, saluiam & cyperum tusa madefacito per noctem, & mane excolato, & puri cremorē in ollam fundito, tritici farina crassiore adiecta, & aceti albi cyatho affuso, & succi sulphij magnitudine fabæ addita, & cocta crudius sorbenda dato.
- Si in pu-

*Cum uteri
flamme
sunt.*

*Cum uteri
mouentur.*

*Cum men
ses stato te
pore non
fiunt.*

*Pudenda
ulcerata.*

*Strangu
ria.*

*Cum uteri
cor petit.*

*Rigor à
partu.*

*Vterorū
inflatio.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Graueolē-
tia in pa-
dendis.
vlcera in
pudendis.* Si in pudendis graueolentia fuerit, & columella nascatur, D
& dolor habeat, dolorem quidem sedabit apij semen ieiunæ
in vino datum. Graueolentiam vero, anisum eodem modo
datum. Columellam vero refecare oportet. Si vlcera fiant
in pudendis, & pruritus corripiat, oleæ & hederæ & rubi &
mali punicæ dulcis folia trita in vino veteri dilue, & postea
carnem recentem foliis intege & appone. Et habeat subdi-
tam per noctem. Mane vero eximat, & myrtum in vino deco-
quat, & cum vino pudenda colluat. Si genituræ non sus-
cipiat, mēsisbus secundum naturam sientibus, membrana ante
vteri os excreuit. Contingit etiam ex aliis causis. Cogno-
sces autem hoc, si digitum admoueris, membrana prætextum
continges. Ad hæc medicamentum subdititium facere oportet. Resinam itaque & æris florem melle diluito, & linteum E
ex his tinctum penitissime indito, filo ad extremam partem
dependente illigato. Quum itaque hoc exiluerit, myrtum in
vino coquito, & cum vino tepido eluatur. Si anhelationes
corripuerint mulierem, sulphuris magnitudinem fabæ, & nā-
sturtij tantundem, & rutam, & cuminum Aethiopicum, hæc
trita & vino diluta, ieiunæ bibenda præbeto. Oportet autem
& à cibis abstinere, & non frequenter edere. Si pariens in-
flata fuerit, hepar ouillum aut caprinum calido cinere obru-
tum, edendum dato meracius ad dies quatuor. & vinum bi-
bat vetus. Si lumbos doleat, anisum & cuminum Aethio-
picum bibat, & calida lauetur, & subcalidam bibat. Si mē-
ses non fiant, testam crassam exurito ac terito, & origanum F
in pinguedine anseris coctam terito, & ad testam in linteum
ammisceto, ac tepida apponito. Si vteri conclusi fuerint,
& mēses non apparuerint, colocynthidem syluestrem, & sil-
phij semen, cuminum Aethiopicum, nitrum, salem thebaicū,
adipem rhenalem, farinam, myrrham & resinam, Omnia hæc
feruefacito, simulque mixta ac trita in glandulam efforma-
to, & apponito. Si vteri ad viscera conuersi strangularint,
vinum cedrinum, & cuminum Aethiopicum bibat. & calida
lauetur, & subcalidam bibat. Si mēses non fiant, adipem
anseris, & netopum, & resinam, mulier lana excepta subdat.
Si vero magis quam conuenit prodeant fusinum, & raiæ
linguam, in lana apponat. Si transmoti vteri aliquo allapsi
moti fuerint, ordeum decorticatum tritum vnā cum paleis sume,
& cum

A & cum cornu ceruino vino subige, & hinc vteros suffito.

Si secundæ decedere non possint, fœniculum vino & oleo ac melle feruefactum bibendum dato. Si menses non appareant, & velis ipsos detrahere, crassiores tritici farinam & ordeum coquito, & oleo affuso edenda dato. Si inflammati fuerint vteri, cotyledonis folia, & porrum, in crassiore tritici farina coquito, & affuso oleo edenda dato. Si moti vteri aliquo allapsi fuerint, & dolorem exhibuerint, oleæ scabiam, & lauri ac cupressi ramenta, in aqua coquito, & linteis excepta apponito. Si vterus doleat, & ad vesicam fuerit dolor, porri semen in aqua tritum ieiunæ bibendum præbe. & tepefactoria adhibe. Si vteri prominuerint, lotos ipsos

Cū secundæ nō decedunt.
Vteri inflāmati.
Vteri moti.

B cum aqua tepida, & vino ac oleo illitos, rursus intrudito, & ex lumbis deligato, & graucolētia suffito. & si vrinam emitte non poterit, calida lauato ac foueto, & cupressi ramenta suffito. Et potiones vrinam cientes bibendas dato. Si fluxus fiat, acerba suffito, & stercus asini derafum, lanæ illigatum subdito. Sit autem stercus siccum. Si in pudendis vl-

Vterus dolitans.
Vteri prominentes.

Fluxus.

cera fiant, adipem bubulum illinito, & apponito. & cum vino in quo myrtus cocta est colluito. Si ex parte os vterorum fuerit exulceratum, florem rosarum tritum & vino imbutum in pilis leporinis apponito. & acerbis colluito. Si vteros, doleat, alij caput integrum, & nitrum testum, & cuminum terito, & melle subacta subdito. & calida lauerur. & subcalidam bibat. Si ex feruido ac superficiali vlcere pudenda

Pudenda ulcerosa.
Os vteri ulceratus.
Vteri dolor.

C fuerint ulcerata, adipem bubulum, & butyrum, & anteris adipem, ac susinum vnguentum misceto, & ex his pudenda illinito, & aqua tepida colluito. Si vteri ascendentes suffocant, funiculum lucernarium accensum extinguito, & narius admoueto, quo fumum attrahat. postea myrrham vnguento dilutam, & lana exceptam apponito. Et resinam oleo dilutam bibendam dato. Si secunda non secedat, conyzam tritam lana exceptam apponito. & ignem in vino tritam bibendam dato. Si caput doleat, & inum ventrem, & lumbos, bilis in vteris est. Huic itaque pharmacum dare oportet, quod sursum ac deorsum purgare potest. & calida lauare. & apponere quæ bilem purgant. Et anisum ac nigellam vino diluito, & bibenda dato. Si fluxus oboriatur, caneros fluuiales in vino suffocato, & vinum bibendum dato. & quæ siccant

Vteri ascendentes.

Secunda nō secedens.
Capitis dolor.

Medicamenta aduersus fluxus.

suffito, xxi.

HIPPOCRATIS LIBER

suffito, & apponito. Si fluxus oboriatur, porri pugillum in **D**
 vino tritum bibendum dato. & siccis & acerbis vtatur. Si
 fluxus oboriatur, muli sterlus combustum, tusumque ac cri-
 bratum, vino dilutum bibat. Reliquis autem eodem modo
 vtatur. Si fluxus oboriatur, & iam diuturnus fuerit, spon-
 giam combustam ac tritam, vino odorato dilutam, bibendam
 dato. & per suffitus resicca. & quæ restringunt appone. Si
 vteros purgare velis, nitrum, cuminum, allium, & ficus terito,
 & melle subacta apponito. & calida lauetur. & subcalidam bi-
 bat. Si vteros doleat, cyclamini radicem in vino ieiunæ bi-
 bendam dato. & calida lauetur. & subcalidam bibat. Si lac
 extinctum fuerit, reliqua quidem eodem modo curato, sceni-
 culi vero semen bibendum dato. & radices sceniculi decorti-
 catas, ac butyrum simul coquito. Quum autem cocta fuerint,
 frigesacito ac bibenda dato. Commodum est etiam hippo-
 marathrum & hipposelinum simul coctum. Si lac extinctum
 fuerit, porrum tritum aqua dilutum bibendum præbe. & ca-
 lida lauetur. & porrum ac brassicam edat, simul coctis Cytisi
 foliis, & succum sorbeat. Si lac extinctum fuerit, saluam,
 cedri aut iuniperi baccis adiectis coquat, & ad diffusum, vi-
 num affundat, ac bibat. & ad cætera farina inspersa addito-
 que bulbo, & modico oleo affuso, edat. Et acria, & acida, &
 salsa, ac cruda olera omnia vitet. Nasturtium vero in vino po-
 tum comodum est. Nam lac purgat. & calida lauetur. & sub-
 calidam bibat. Si velis mulierem prægnantem fieri, ipsam
 & vteros purgato. postea farinam ieiunæ edendam dato. &
 vinum meracum insuper bibendum. & nitrum rubrum, cumi-
 nū, ac resinā, melle subacta in linteo subdito. & vbi aqua de-
 fluxerit, nigros pessos mollitorios apponat. & cum viro dor-
 miat. Si prægnantem facere voles mulierem, ipsam & vte-
 ros purgato. Deinde linteum tenuissimum resiccatum, ac
 melle imbutum in glandes efformato, & in fici succo tin-
 ctos apponito, donec fuerint aperti. Postea vero magis
 intrudito. Vbi autem defluerit aqua, vino & oleo colluta
 cum viro dormiat. Bibat autem & pulegium in vino cedri-
 no, quum viro condormire volet. Medicamentum foetum
 ex vteris pellens. Cucumeris sylvestris succum potionis
 mensura, in mazam conspersum apponito, vbi ad duos dies
 antea ieiunauit. Aliud. Staphidis sylvestris pugilos
 duos

*Vteri pur-
gatio.*

*Vteri do-
lor.*

*Lactis ex-
tincti re-
media.*

*Vt mulier
prægnās
fiat.*

*Vt foetus
ex utero
expellat-
ur.*

A duos, in aqua mulsa dilutos, bibendos dato. Experimentum fecunditatis. Caput allij integrum deraſum vteris apponito. Poſtridie vero digitum immittat, ac contingens conſideret. & ſiquidem olnerit inde os, bene habet: Sin minus, rurfum apponat. Aliud experimentum: Netopum modicum in lana inuolutū apponat, & conſideret an per os oleat.

Alia ſubdititia medicamenta. Scorpij marini fel, in lana inuolutum, & in vmbra ſiccatur apponito. Puſegium ſiccum tritum, melle imbutum in lana apponito. Cucumeris ſylueſtris ſemen, & teſtam combuſtam, vino ſubaſtam, cum pilis leporinis, in lana ſubdito: Alumen Aegyptium, lana inuolutum apponito. Cantharidas vino ſubaſtas, in lana ſubdito. **B** Herbam artemiſiam vino ſubaſtam apponito. Nigellam in vino tritam, in lana ſubdito. Aliud ad recens c-nixam. Vnguentum roſaceum & cēram, in lana apponito.

Bulbion ex tritico, tritum & vino ſubaſtum in lana ſubdito. Vini albi veteris fecem combuſtam, & vino albo extinſtam ac tritam, in lana apponito. Galbanum, netopum, & miſy, cum vnguēto roſaceo, in linteo apponito. Elaterij portiones duas, & fauum cum vino, in linteo apponito. Butyrum & alumen melle ſubaſtum, in linteo ſubdito. Scammoniae ſuccum, & adipem, cum maza miſceto, & vino imbuta, in linteo apponito. Si concipere nolit, miſyos fabae magnitudinem aqua dilutam bibendam dato, & per annum non concipiet. Si periculum facere velis in muliere, an prægna-

C ſit aut non, rubro lapide ſive terra erythrea oculos ſublinito. Et ſi quidem ingrediatur pharmacum, prægnaſt eſt, ſin minus, non. Si prægnaſti pudēda feruido & ſuperficiario vlcerare fuerint exulcerata, amygdala trita, & medullam buſlam in aqua coquito, & modica farina adieſta, pudenda illinito. & baccarum myrti decocto colluito. Si virgo ex lapide laborarit, ſemen radicis Aethiopicae, in vino veteri ad dies decē dato. Deinde in aqua ad dies viginti. & bis in die multa calida lauato. Cataplaſmata. Allium, portulacam, apium, loti & cedri ramenta, trita ſimul mixta aqua mulſa diluito, & cataplaſma hinc factū imponito. Rubi folia, myrti folia, ſimul trita aqua mulſa diluito, & polēta ammixta ſubaſta imponito. Sambuci folia, myrti folia, terebinthi folia, tenerrima, eodē modo apponito. Loti ramenta, mori folia,

Ne concipiat mulier.

An cōceperit experimentum.

Pudēda ſi ulcerofa ſint.

ſimul

HIPPOCRATIS LIBER

simul trita mixta, aqua diluta cum vva passa imposito. **Suf-**
fitus. Ouiculæ aut capræ cornu tostum, & ordeum tostum
 ac frefum, oleo subigito ac suffito. Cerui cornu, & oliuas
 nondum habentes oleum, simul trita mixta suffito. Rhoem
 rubrum, & polentam tostam, oleo subigito ac suffito. Po-
 lentam, & stercus bubulum, & paleas, oleo subigito ac suffi-
 to. Loti ramenta, & rhois folia, & cupressi siccæ ramenta,
 vino nigro austero subacta suffito. Galbanum, mannam, &
 refinam, vnguento subacta suffito. Capræ cornu, & gallæ,
 & adipem suillum, ac cedriam suffito. Terram ex asinorū
 pedibus deradito, & stercus asininum, cum vino nigro sub-
 igito ac suffito. Collutiones. Folia myrti, & lauri, ac he-
 deræ in aqua coquito, & cum hac tepida colluito. **Rhois,**
 & mali punicæ, ac rubi folia, in aqua mulsa coquito, & cum
 ea excolata colluito. Sambuci & lentisci folia in aqua co-
 quito, & excolatam leuiter tepidam infundito. **Forniculi &**
 brassicæ radices tulas in aqua coquito, oleo affuso, & postea
 cum excolata colluito. Oenanthen, & cyperum, & **ruas**
 passas, in aqua mulsa coquito, ac colluito. **Malagmata.**

Maluam & fœnogræcum in aqua feruefacito, & cum ex-
 colata aqua leuiter tepida colluito. Cupressi ramenta &
 amaracū, in passo aqua temperato coquito, ac colluito. Ser-
 pillum & violæ albæ radicem, in aqua mulsa coquito, ac col-
 luito. Hypericum, & lentiscum, & baccas cedri in aqua co-
 quito, & cum leuiter tepida colluito. Fauum, & butyrū, &
 refinam, & adipem anserinum, in aqua coquito, & colluito.

Fomenta. Lolium tostum ac molitum, in posca meracio-
 re coquito. Postquam autem coxeris, linteo illigato, & foue-
 to. Lentem tostam, decorticatam, & in farinam crassio-
 rem alicæ similem redactam, in aqua coquito, & linteo illigato,
 ac foueto. Eruum eodem modo parato, ac foueto. Com-
 moda est & saluia eodem modo parata. Saluiam & hyperi-
 cum in aqua coquito, & ordeï paleis in decocto coctis, & lin-
 teo exceptis foueto. Loti & cupressi ramenta in vva pas-
 sæ cremore coquito, linteoq; ipsa illigato ac foueto. Oleū,
 & myrti, & hederæ, ac lauri folia, in aqua coquito, & in deco-
 cto, ordeï paleas coquito. deinde linteo illigato, ac foueto.

Cupressi ramenta & cedri, & ordeï furfures, simul misce-
 to, & in vva passæ cremore subigito, ac panem formato, &
 cum hoc

A cum hoc affato, calido in linteum illigato, foueto. Viola alba semen, aut radices, in aqua coquito, & cum aqua furfures tritici subigito, ac panē formato, cum quo calido in linteum inuoluto, foueto. Serpillam in aqua coquito, & furfure triticeo in aquā coniecto, eodē modo foueto. Spongas calefacito & adhibeto. & cū mollibus lanis, & panniculis laneis, & vasis testaceis aqua infusa, & vtriculis eodē modo, & decoctionibus in vtres infusis foueto. Purgatoriū.

Si mulierem parere non potentem, facere velis vt pregnas fiat, considerare oportet in mensibus, an biliosa aut pituitosa sit. Cognosces autem hoc, arena tenui sicca ad solem conspersa, & quum menses prodierint, sanguine super arenam in sole effuso, ita vt ipsum siccari sinas. Si enim biliosa fuerit, sanguis super arenam siccatus, pallidus fit. Si vero pituitosa, velut mucus existit. horum igitur vtrum tandem fuerit, ventrem purgato, siue sursum siue deorsum purgatione opus habere visa tibi fuerit, postea paucis diebus interpositis, vteros purgato.

Vterorum fomenta. Si duri fuerint vteri, & nō concipiat, Vinum quā inuicundissimū cum pari aqua temperatum, trium semicongiarū Atticorum mensura, & foeniculi radices, & seminis foeniculi quartam partem, & vnguenti rosacei semiheminā. Hæc in vas nouū fundito, & vinū affundito. Vasis autem operculū perforato, & imposita arundine foueto. Arundinē vero cum operculo tollito. Si enī sine operculo abstuleris, exuretur. Postquā autem fota fuerit, scillam apponito, velut infra scriptum est. Apponito autem donec dixerit molle & amplum esse vterorum osculum. & siquidem exulcerata fuerit, & pustulæ in purgatione fuerint, si summa labia vlcerata fuerint, anisum, & adipem anserinum, in rosaceo oleo terito, & in lana inuoluto & accepta carne bubula, magno pedis digito crassiore, sex digitorum longitudine, ipsam pharmaco illinito, & lana exceptam inuoluto, & ad extremam carnis partem quæ foras spectat filum alligato, & reliquam in vteros indito, vbi est vlcus. Mensium purgatoria. Si non procedat menstrua purgatio, cucumeris syluestris internam partem pondere trium obolorum, & artemisiæ herbam, & thuris obolum, terito & ammixto melle in lana inuoluto, & ad os vteri apponito, quinquies in die hoc faciens. Aliud. Vitem viridem terito, & melle am-

*Vteri cū
duri fuerint.*

H mixto

HIPPOCRATIS LIBER

mixto lana excipito, & eodem modo apponito. Aliud. D

Cupressi fructum, & cucumeris sylvestris internam partem, & thus, terito & melle ammixto lana excipito, & eodem modo subdito. Aliud. Cupressi fructum & thus terito, & melle ammixto lana excipito, ac subdito. Aliud. Abrotani obolos tres, cum melle lana excipe ac subde. Aliud.

*Cū mulier
nō cōcipit.* Elaterij obolum, & myrrhæ obolum terito, & cum melle lanæ inuoluito, ac subdito. Purgatorium si mulier non concipiat. Tauri vrinam collige trium heminarum mensura. Deinde artemisiam herbam, aut parthenium, aut adiantum, & laurum viridem, & cedri ramenta simul contunde. Deinde in effossa scrobe carbones accende, & imposita olla vrinæ tauri infunde, & confusa in mortario adice. postea sellam circumpone, & artemisiam herbam, aut hyssopum, aut origanū impone, & muliere super hæc collocata, donec sudet foue. E
Vbi vero sudarit, laua cum calida, & in lauacrum artemisiam & laurum immitte. Deinde subdititium medicamentum adhibe. Aut artemisiam, aut bulbium in vino albo tritum lanæ inuolutum subdat. Hæc ad tres dies faciat, & deinde cum viro dormiat. Subdititium pharmacum ad conceptum facies. Ex nitro & thure, cum melle glandem formato, & apponito. Aliud purgatorium molliens. Caricam coquito donec granula abiiciat, & hanc expressam leuissime tritam in lana cum rosaceo vnguento apponat. Aliud acrius. Brasicæ, rutæ, pares portiões tere ac vttere eodē modo. Aliud molle & purgatorium. Medullā anseris, aut bouis, aut cerui, magnitudine fabæ, affuso vnguento rosaceo & lacte muliebri terito, velut molle pharmacum teri solet. Deinde ex hoc os vtteri illinito. Aliud tepidum purgatorium. Anseris medullam magnitudine nucis, resinæ lentissimæ aut terebinthinæ magnitudine nucis. Hæc in vnguento rosaceo ad lentum ignem liquefacito, & velut cæratum facito. & deinde ex hoc tepido os vtteri illinito, & pectinem madefacito.
Aliud detrahens purgationem & sistens. Pæoniæ grana nigra aut rubra, tria aut quatuor in vino trita bibenda dato. Si vero magis detrahere voles, grana nigra eodem modo trita bibenda præbeto. Aliud purgans ac detrahens.

Lauri baccas ad summum viginti, & felis dimidium acetabulum, cum vino trita bibat. Aliud. Tauri fel trium dimidiarū

A dimidiorum obolorum Atticorum pondere, in vino ieiunæ bibendum dato. Et efformata quoque ex ipso catapotia deuoranda dato. Aliud. Farinam recentem, myrrhæ obolos tres, croci tantundem, castorij obolum, Hæc cum vnguento rosaceo trita apponat. Aliud purgatorium. Semen vriticæ, & malux succum, cum adipe anserino tritum subdat.

Aliud. Si non purgata fuerit ex partu, floris farinæ quantum tribus digitis comprehendi potest coquito, & melle affuso, ventri velut cataplasma imposito, & bibendum dato.

Aliud quod vteros aperit & purgat. Cantharidas quinque aceto albo affuso terito, & non valde liquidum pharmacum facito, sed vt digitis effingi possit, & de sicu alba pingui, sine granulis & pelle, duplam catharidum partem ammisceto, & efformatam glandulam tenui lana inuolutam subdito. Aliud. Si ex partu non fuerit purgata, trifolium in vino albo bibendum dato. hoc etiam menses educit, & foetus expellit. Aliud purgans vteros. Quum puero immortuo sanguis intus manserit, colocynthidem syluestrem in melle tritam delingat, aut subdat. Aliud sanguinem purgans.

Sanguinem ex vteris expelles, si violæ albæ semen tritum, vino dilutum bibendum dederis. Aliud quod similiter sanguinem ex vteris expellit. Rhois seminis quum rubrum fuerit, grana virida triginta terito, & rosas caninas rubras, rubicundo ex ipsis delecto, in vino bibenda dato, quum sanguis eruperit. Aliud purgatorium. Si menses non apparuerint, styracem & origanum terito. commisceto, & adipe anserino affuso apponito. Aliud quod subditum vteros purgat ac euacuat. Absinthij radicem tritam cum melle, cum oleo apponito. Subdititia vteros purgâtia, aperiëntia, & aquam ducentia. Scillæ frustum longitudine sex digitorum, & digiti parui crassitudine accipito, & de hoc duos digitos circunderadito ac leuigato, & reliquum lana sordida inuoluito, eam vero partem quæ circumrâsa est ad os vterorum subditam, per diem ac noctem appositâ finito. Postquam autem lauit & abstulit, aqua odorata colluatur. Aliud purgatorium molle, quod aquâ & pituitam ducit, & pallidos ac subcruentos menses detrahit, si non diuturni fuerint, & os emollit. Vnguentum narcissinum, cuninum quod edimus, myrrham, thus, absinthium, cupressum, salem, rosaceum oleû

*Postremæ
horū medi
camentū.*

H ij sumito.

HIPPOCRATIS LIBER I.

sumito. Et de aliis quidem singulis congiū accipito, narcis- **D**
fini vero partem quartam, & omnia in glandem efformata,
ac crudi lini linteo excepta subito. Aut linteum tenue pennę
circundato ac deligato, & in oleo albo Aegyptio tinctum ap-
ponito, & tota die appositum finito. Deinde ubi lauit & ab-
stulit, aqua odorata colluatur.

HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS MULIEBRIBVS

liber I. Iano Cornario

medico physico in-

terprete.

*Cur mulie-
res crebri⁹
laborent.*

*Quę pu-
erperia sa-
cile decur-
rant.*

*Cur steri-
les magis
afficiantur.*



DE muliebribus morbis sic sentio. Mulierem quę non peperit graui-
us & citius ē mensibus ægrotare,
quām eam quę peperit. Quum e-
nim peperit venę fluidiores
sunt ad menses. Fluidas autem ip-
sas facit purgatio illa quę fit à par-
tu. Et ubi hæc erumpit, vicinę ma-
xime ventri ac mammis corporis **F**
partes discinduntur. Discinditur
item reliquum corpus. à quo vero hoc fiat, dictum est à me in
natura pueri in partu. Discisso autem corpore necesse est ve-
nas magis aperiri, & ampliores ac fluidiores ad menses fieri:
itemque vteros magis aperiri, nimirū puero per ipsos egres-
so, qui & vim & dolorem induxit. & quum hæc sic se habeāt,
mulier purgationem à partu experta, minus laboriose men-
sibus decurrentibus purgatur. Si vero etiam affectio aliqua
mulieri quę iam peperit accidat, vt menses venientes probe
purgari non possint, facilius dolorem feret, quām si non pe-
perisset. A sueti enim sunt vteri, & corpus idoneū vt implea-
tur, vtpote in ventre habenti, & simul multa amplitudo in
corpore est. Maior autem fit etiā amplitudo ubi peperit, ni-
mirum

A mirum corpore disscisso. & corpus in amplitudine existens, minus dolore affligitur, si non venæ superimpleantur, & nimium doleant. At vero ei quæ non peperit, quum corpus nõ affuetũ sit, si impleta fuerit, & fortius ac solidius & ætius sit, si purgationem à partu experiatur; & quum vteri ægrius aperiantur, menses laboriose prodeunt, & affectiones plures accidunt: vt propterea menses obturentur, si prius nõ peperit. Habet autem res se hoc modo, velut etiam prius à me dictũ est. Dico mulierem rariore carne præditam & teneriorem esse quàm virum, & hæc res sic se habet. à vtre trahit humiditatem, & citius, & magis, corpus mulieris quàm viri. Etenim si quis super aqua, & per regionem aquosam, duobus diebus ac duobus noctibus, molles lanas ponat, & vestem puram & cõtextam æquali ad lanas pondere, sublatis vtrisque apponderatione facta, multo grãuiores lanas comperiet quàm vestem. Fit autem hoc ex eo quod semper ab aqua sursum decedit in vasa ampliora oscula habentia, & lanæ quidem tanquam raræ & molles, ex decedente amplius suscipiunt. Vestis autem vt quæ plena est & ex cõtextu obturata, explebitur, non multum ex decedente aqua suscipiens. Sic sanè etiam mulier, velut quæ rarior est, ampliorem à ventre humiditatem corpori attrahit, & citius quàm vir. & tanquam teneriori carne præditæ mulieri, vbi corpus sanguine repletum fuerit, si non ab ipso secesserit, carnib⁹ impletis ac calefactis, dolor oboritur. Habet enim mulier sanguinem calidiorem, & propterea

C calidior est quàm vir. Si vero amplior accedens sanguis secesserit, dolor non fit à sanguine, neque calor. Vir autem vt qui solidiore carne præditus est quàm mulier, neque in superna ventris parte adeò sanguine superimpletur, vt nisi aliquid sanguinis singulis mensibus secedat, dolorem fieri necesse fit: & sanguinis quantum satis est ad nutrimentum trahit: & quum corpus ipsi non sit tenerum, non dolore affligitur, neque superincalescit à plenitudine, velut mulieri. Multum autem confert ad hoc viro, quod magis laborat quàm mulier. Nam labor aliquid humoris abducit. Postquam igitur mulieri quæ non peperit, occultati fuerint menses, & viam foras reperire non poterint, morbus fit. Hoc autè contingit, si vterorum os cõclusum fuerit, aut distortum, aut aliqua pudendi pars cõtracta. Si enim horũ quid fuerit, menses exitũ inueniunt.

*Exemplo
cõprobat.*

Cur mulier

calidior

est quàm

uir.

Quid for-

minas af-

ficiat.

Vteri in-

uersio.

HIPPOCRATIS LIBER I.

nire non poterint, priusquam vteri ad sanam naturam redierint. Fit autem hic morbus his maxime, quæ angustos vteros habent, aut ceruicē vltra pudendum sitam. Si enim horū alterum fuerit, & mulier viro non misceatur, & venter magis quàm oportet euacuetur, ab hac affectione vteri obtorquetur, Neq; enim humidi in seipsis sunt, vtpote muliere nō coeūte: & amplitudo ipsis spatiosa est, vtpote quū venter magis vacuus existat. Quare obtorquetur, dum siccior & leuior est venter quàm cōuenit. & aliquādo dum ipsi obtorquentur, etiam os ipsorum distorqueri cōtingit, nimirum ceruice vltra pudendum sita. Si enim humidi fuerint vteri à coitu, & venter nō euacuetur, non facile distorquentur. Hæc igitur causa est vt ipsi sint cōclusi, nimirū à venere abstinente muliere. In

*Mēses diu
tius remo-
rati quid
agant.*

tertiis porro mēsisbus optime afficietur, si quæ prius insunt progressa fuerint educta. Sin minus, mulier hæc patietur. Suffocatio aliàs atq; aliàs in ipsā irruet, & febris aliàs atq; aliàs corripiet, ac horror, & lumborum dolor. hæc patietur in tertiis mensibus, si ipsi nō prodierint. In quartis vero si nō egres si prioribus exitum fecerint, etiam tunc tertij mensis afflictionibus oībus magis affligetur, & maxime tēpore mensiū. Deinde minus. Sæpe vero etiā à dolore libera sibi esse videbitur. Erunt autem in quartis etiam hæc signa. Vrinā multam ac crassā eiiciet, aliàs atque aliàs. Et venter ipsius durus erit, & maior quàm prius, & dentibus fremet, & cibum auersabitur, & vigilabit. Hæc patietur in quartis mensibus. Si vero curetur, etiam in his sana euadit. Et in quintis si non multi

*Mēses sex
mensibus
retenti nō
habēt me-
dolan.*

menes descenderint, dolor adhuc fortior accidit. In sextis vero iam incurabilis est. & iuxta priora quidem signa magis dolebit. Deinde ad ea etiam hæc aderunt. Anxia erit, & aliàs atque aliàs seipsam iactabit, & animo deficiet, & piruitā vomet, & sitis fortis animo corripiet. Nimirum dum exurit venter ab vteris sanguine plenis. & ad contactum dolebit, maxime pectinem. Et aliàs atque aliàs acute febriet. & vteri aliàs atque aliàs murmurabunt, dum videlicet sanguis in ipsis cōmouetur ac discurret. & venter consueto modo nō secedet. Neq; vesica urinam excolabit, maxime quum vteri ad stomachum qui neruosus est, mulieri allapsi fuerint, & ad vētrem irruerint, dolet spinam, & totum dorsum. & lingua ipsius refrenatur. & hanc non claram habet. &

animi

A animi deliquium adest. Aliquibus etiam vocis priuatio. & stomachus mordetur. & flaua bilis exit. & spiritus offendens. & anxia est, & iactat seipsam, & ardet. Postquam autem transmutati fuerint, & vesica tenuem sanguinem ab uteris traher, tunc vrina mingitur rubra, Et dolet quidem reliquum corpus, maxime vero collum, & spinam, & lumbos, ac inguina. Et ipsi ad hoc progressæ, & venter attollitur, & crura supra modum intumescunt, & tibiæ ac pedes. & mors succedit. Et circa hanc quidem sic finiunt menstruæ purgationes ad sex menses occultatæ. fiunt item hæc.

B Quibusdam mulieribus menses bimestres in uteris existentes multi ad pulmonem procedunt. & ubi recepti fuerint, omnia patiuntur quæ in tabe dicta sunt. & non est possibile ipsam superesse. fiunt & hæc.

*Mensura
utrius af-
fectus.*

Quibusdam suppurati fiunt menses, ubi per duos aut tres menses moram traxerint. Hoc autem maxime fit, si à febre fuerint cõbusti. Signa vero sunt si suppurati fuerint. dolores enim incidunt in pectinem. & pulsationes fortes, & contactum non sustinet. & si melius habitura est, menses ipsi erumpuntur in pudendum, & procedit pus ac sanguis, & procedit graueolens, ad septem, aut octo, aut nouem dies. In priore vero tempore dolet velut dictum est antea. Postquam autem depurgata fuerit, optimum quidem est si non fiant vlcera. Si vero reliquantur vlcera, ampliore curatione opus habebit, quo vlcera non putrescant, & graueolentia fiant. Sterilis autem euadet, etiam si melius habebit, ubi magna vlcera fuerint quæ in uteris facta sunt.

C Si vero non continget, ut menses ipsi in pudendum procedant suppurati facti, ad partes supra inguen, iuxta lateris mollitudinem erumpent, citra tuberculum, utpote pure rupto, & illa parte purulenta graueolentia procedent. & si hoc fiat, mulier non superstes manet. Si vero etiam superstes maneat, semper sterilis erit. Hac enim parte de cætero via fit mensibus ut foras prodeant. Nam os uterorum ad hunc locum allapsum est. fit & hoc. Quibusdam ubi bimestres aut trimestres aut diuturniores fuerint menses, & ad lateris mollitudinem allapsi fuerint, quum non suppurati sint menses, velut tuberculum fit supra inguen, sine capite, magnum, rubrum. & vulgus medicorum ignarum quid hoc esset, iam sæpe secuerunt, & sic in periculum induxerunt. Cæterum id quod velut tu-

*Menses cū
non in pu-
dendū pro-
cedunt.*

*Cū uenter
exuberet*

HIPPOCRATIS LIBER I.

berculum fit, tali modo fit. Fruitur sanguine caro ipsa, utpote osculo uterorum lateris mollitudini, adiacente. & impletur caro ab ipso, & insurgit ac eminet, velut sanguine repleta. Et aliquando si transmutum fuerit os uterorum, & ad pudendum conuersum, & menses processerint per pudendum, id quod circa lateris mollitudinem eminuit sedatur. In uteros enim distribuitur, hi vero foras laxantur. Si vero non conuersum fuerit os uterorum ad pudendum, circa lateris mollitudinem suppuratur, & hac parte transitus fit mensibus. & eadem pericula sunt, quæ prius sunt relata. Sed & ad vomitum conuertitur, & quibusdam in sedem, velut in virginum morbis à me dictum est, & signa & dolores eosdem ostendit, quos isthic retulimus. Ad hanc viam minus faciunt menses mulieribus quàm virginibus. Quum menses fuerint occultati,

*Signa menses
fieri non
defluentium*

Medela.

dolor habebit imum ventrem, & onus quoddam incumbere videtur, & lumbos & laterum mollitudinem mirum in modum dolet. Si vero omnino non procedunt, præ morbo aut crassi & viscosi, aut glutinosi fiunt. Primum igitur ventrem purgare oportet sursum ac deorsum. Deinde uteros subditio medicamento, à quo sanguis purgatur. Atque ita quiescere, & potandum dare pharmacum, à quo sanguis prodeat. Bibat etiam Crethmon in vino tædaceo. Si vero fluxus ipsi non fiat, continget ut prægnas esse videatur, & dum cum viro coit doleat, ut putet quid incubere. & grauitas fit in ventre. & venter prominet, & desiderii similibus afficitur, velut in ventre habeat. & stomachi dolore afficitur, maxime ubi quinquaginta dies præterierint, Et dolor aliàs atque aliàs habet ventrem, & partem circa umbilicum, & collum, & inguina, & lumbos, Et postquam menses duo aut tres præterierint, quandoque menses acruatim ipsi in pudendum erumpunt, & quæ prodeunt velut carnem esse putat, quemadmodum ex foetus corruptione & nigra. Quibusdam etiam vlcera fiunt in uteris, & opus habent diligenti animaduersione. Multis vero contingit ut putent se sex mensibus in utero habere, aut etiam paulo breuiore tempore. & venter prominet, & alia sibi fieri putat, velut in ventre habenti. Postea sunt & quibus suppurati eruperunt supra inguen, simul cum quinto aut sexto mense, & viam ea parte patefecerunt. Quibusdam autem vlcera fiunt in uteris etiam infra sub inguine. & periclitatur

*Vterorum
ulcera.
Vterorum
varii morbi.*

Atatur mulier de vita. Si vero etiam superstes maneat, sterilis erit. Quibusdam etiam in pudendum erumpunt, & prodeunt ipsi putrefacti ac purulenti. Et ab his vlcera fiunt in vteris, & periclitatur. Et oportet vt ne antiqua fiant vlcera, cum attentione mederi. Sterilis autem & hæc fit, etiam si fuerit curata. Si vero non eruperint menses sex mensibus intus conclusi, omnia patietur velut ea quæ non peperit, in qua menses viam inuenire non possunt. Et si quidem curata fuerit, sana erit. Sin minus, etiam ad octo menses durans moritur. Multis vero cōtingit, vt menses pituitosi ad multum tempus prodeuntes, etiam pauciores sanis sint, sana autem talis fit, si conuenienti cura fuerit sanata. Si vero mēses mulieri prodeat

B quidem, verum pauciores quàm conuenit, vtpote osculo vterorum paululum à pudendo emoto, aut nuper concluso ad hoc, vt prodeant quidem, verum obturentur ab ipsis etiam transitus, per quos penetrant vbi ad vteros descendunt: moderati sanè paulatim prodeunt, sanguine semper perfecte osculo incumbente. Et postquam dies præterierint quibus purgari solet, & conclusus fuerit sanguis in vteris relictus, & alij menses subdescendentes non expulerint conclusum sanguinem, sed semper paulatim grauunt, & primis mensibus duobus aut tribus non valde prodeunt. Postquam autem plures menses præterierint, adhuc magis dolebit. & non habet in ventre, quàm diu sanè sic habuerit. & febris corripiet ipsam debilis, maxime in diebus quibus purgari solet. Verisimile

C est autem & in intermedio tempore ipsam febrile, & horre-re, & stomachi dolore vexari, & ad multitudinem addere singulis diebus. Et dolet aliàs atque aliàs corpus, & maxime lumbos, & spinam, & inguina, & articulos manuum ac pedum. Verum his locis non simul dolet, sed aliàs atque aliàs, qua parte sanguis discretus, & in vteris esse non potens imperu suo grauatur. & qua sanè corporis parte incubuerit, tumor est, fitque etiam cōuulsio fortis articularum corporis. Et aliàs aliud ex relatis antea signis ipsi apparet. Hæc si quidem iuxta debitum modum curata fuerit, sana euadet. Sin minus, morbus septimestris aut diuturnior factus, lethalis fuerit, aut claudam faciet, aut artes aliquas impotentes efficiet, si præ rigore & cibi fastidio, sanguis circa neruos compactus fuerit, quæcunque tandem locū occupauerit. Hic autem morbus magis

*Cur s-n-
guis circa
neruos cō-
pingatur.*

fit his

HIPPOCRATIS LIBER I.

fit his quæ virum non habent. Si vero hi morbi iam relati, **D**
aut quicunque postea referentur, incidunt in eam quæ par-
tum non sit experta diuturniores erunt, & minus dolorosi.
Verum signa eadem, & iidem fines, tum ei quæ non peperit,
tum ei quæ puerperia experta est, contingunt, si non curen-
tur, Oportet autem statim curationem facere. Sin minus sta-
tim comparent morbi. Si vero menses plures quàm opor-
teat prodeant, & crassiores; Nimirum corpore natura fluida
existente, & osculo vterorum prope pudendum sito, & ad hæc
multo cum viro coitu vtatur, & conuiuetur, semel aliquan-
do multi descendentes, & cumulate prodeuntes, os vtero-
rum impetu suo magis dilatant. & si ad hæc non incidat va-
porum euacuatio, sed rursus multus accefferit calor, & os am-
plum faciunt, & corpus: vt pote dum conuiuante & volu-
ptatem ac consuetudinem viri consectante muliere, facili fluxu
ad vteros etiam calor deferitur. & decolor erit quàm diu
sic habuerit. & si postea morbus aliquis aut affectio incide-
rit, vt corpus affligatur, & vteri similiter iuxta solitum mo-
rem ampli sunt, & corpus facili fluxu in ipsos præditum est,
Et post hæc febris habet, & cibum auersatur, & anxia est,
& tenuis ac debilis. & lumbos ex mensibus dolebit, & pro-
gressu temporis si non curata fuerit, omnia ipsam magis af-
fligent in intermedio tempore, & periculum ipsi imminet,
ne sterilis fiat, aut à tempore & morbo vexata, si alius mor-
bus coincidar, ex hoc moriatur. prodeunt autem menses
crassiores & plurimi, in intermediis diebus. Incipientes au-
tem & desinentes, pauciores & tenuiores. Moderati vero
sunt menses prodeuntes in omni muliere si sana sit, vt dua-
rum heminarum Atticarum mensura secedant, aut paulo plu-
res, vel pauciores. atque hoc ad duos aut tres dies. Longius
autem tempus aut breuius, morbosum & sterile est, Conie-
ctare porro oportet mulieris corpus inspiciendo, & interro-
gare collatione ad priora facta, an semper morbosa viuât, aut
non. Si enim pauciores aut plures dies quàm solent prodeât,
aut ipsi pauciores aut plures fuerint, morbosum sunt: Nisi na-
tura ipsa morbosa & sterilis fuerit. Si vero hoc fuerit, & ad sa-
lubriorem statum transmutatur, melius est. procedit autem
sanguis velut à victima, & cito congelatur si sana fuerit mu-
lier. Quibus vero in natura est, vt plures quàm quatuor dies
purgentur,

*Cum multe
purgatio-
nes men-
strue &
crassæ de-
fluant.*

*Mensium
modus &
qualitas.*

A purgentur, & menses valde multi prodeunt, hæc tenues fiunt, & foetus ipsarum tenues, & emarcescunt. Quibus autem purgatio infra tres dies fit, aut pauci menses secedunt, hæc crassæ sunt, & bene coloratæ, virilesque ac partus immemores. & neque concipiunt. Si suffocatio derepente accesserit: fit autem maxime his quæ cum viris non coeunt, & senioribus magis quàm iunioribus. Leuiiores enim vteri ipsarum sunt: fit autem potissimum tunc, vbi mulieri vasa euacuata fuerint, aut plus solito laborarit: resiccata à labore vteri conuertuntur, ut qui vacui sint ac leues. Est enim ipsis locus spaciosus ut conuertantur, vitpote vacuo existente. Dum autem conuertuntur, impetunt hepar, & iuxta consistunt, & ad præcordia irruunt. Currunt enim & progrediuntur sursum ad humiditatem, tãquam à labore magis quàm opportunum est resiccata. Hepar autem humidum est. Postquàm autem impetiuerint hepar, suffocationem faciunt, derrepente perspirationem circa ventrem intercipientes. & aliquando simul incipiunt hepar impetere, & à capite pituita defluit ad præcordia, velut ab eo quod suffocatur. & aliquando simul cum pituita defluxu, descendunt ab hepate ad locum suum, & cessat suffocatio. Descendunt autem detrahentes humiditatem, & grauati. Stridor autem ab ipsis fit, dum ad suam ipsorum sedem procedunt, postquam autem eo deuenierint, aliquando venter post illa humidior fit quàm superiori tempore. Laxat enim iam caput pituitam in ventrem. Vbi vero apud hepar & præcordia fuerint vteri, & strangularint, mulier albas oculorum partes subuertit, & frigida fit. Sunt autem & quæ liuidæ fiunt. Quædam etiam dentibus frendunt. & saliuæ ad os fluunt. & similes sunt his qui ab Herculeo morbo detinentur. Si vero diutius moram traxerint vteri apud hepar & præcordia, mulier strangulatur. Quandoque vero vbi mulier vasa euacuata habuerit, & insuper laborarit, vteri conuersi ad vesicæ stomachum allabuntur, & urinæ stillicidium inducunt. Aliud autem nihil mali habet, & curata cito sanescit, quãdoque etiã spõte. Quibusdã vero ex labore aut inedia, ad lumbos aut ad coxas allapsi, dolores exhibent. Si mulier corpore male habuerit, & menses biliosi prodierint, ex hoc pbe cognosci possunt. Nigri sunt valde, quandoque vero nigri aut splèdidi. & paucissimi pdeunt, & citissime cõgelant. & semè amborum, & maris & foemine euanesceat, & nõ habet

Suffocatio
vis uulue
caussa que

Menses bi
liosi.

HIPPOCRATIS LIBER I.

*Febres er-
raticæ.*
 habet in ventre. & incipiente quidem morbo, purgatur die- D
 bus quibus solita fuit, non pluribus. progredientibus autem
 mensibus, pluribus diebus purgatur, & menses pauciores sin-
 gulis diebus apparent. Et febres succedunt erroneæ acutæ,
 cum horrore & cibi fastidio alias atque alias, & stomachi do-
 lor. & dolebit maxime vbi menses ipsi appropinquarent. Post-
 quam autem purgata fuerit, & ad modicum temp^o, superio-
 rum respectu melius habuerit, postea rursus ad idem perue-
 niet. Dum autem curatur, cito sana fit. Si vero non curetur,
 & tempus procedat, omnia prius relata valde ipsum affliget.
 & dolor corripiet, nunc ventris partem infra umbilicum, nunc
 inguina, nunc lumbos & coxendicum ad sedem iuncturam,
 nunc collum, aliquando vero strangulatio fortis accidet. & E
 caligo ante oculos obuersabitur, & vertigo, utpote purgatio-
 ne sursum vergente ac ascendente. Si enim corpus male ha-
 buerit mulieri menses pauciores fiunt. & quibus corpus ple-
 num fuerit, his menses plures prodeunt. At vero biliosæ si
 menses prodeant, pusillanimitas incidit, & cibi fastidium a-
 lias atque alias, & anxietas, ac vigilia, & eructat frequenter,
 & non vult deambulare, & tristis est, & non videre sibi vide-
 tur, & timet. Et si curetur, ex his sana erit. Si vero tempus pro-
 cesserit, adhuc magis dolebit. Optime autem cum hac aga-
 tur, si vomitus biliosus succedat, aut venter turbetur, non for-
 titer, & subeant biliosa. & si fluxus succedat ipsi non fortis.
 Si enim quid ex his forte inciderit in corpus afflictum, pe-
 riclitabitur. Si vero leniter depurgetur aliquid biliosi aut to- F
 tū id quod molestū est, sana fiet. Si vero neq; curetur, neque
 quicq; horū fiat, moritur mulier. plerūq; tamē cōtingit ut fluxus
 incidat biliosus ex hoc morbo. & si fluxus fiat, primū qui-
 dē pauca sunt quæ cōparent. per oēs autē dies omnino plura
 cōtingūt. Tēporis autē progressu plerunq; etiā morbus acutus
 fit. & vteri à purgatione biliosa prodeunte mordetur, ac exul-
 cerantur. Sed & in hoc adhuc sana fit, si curetur, & fluxus cō-
 pescatur. Si vero vteri ab vlcerib⁹ fuerint inflammati, adhuc

*Profluuiot
rū consue-
tudo.*
 acutior morbus erit, & multa graueolentia ac purulenta pro-
 dibunt, ab ipsis vteris iam egressa, & semper velut aqua de car-
 nibus. & prius relata omnia ipsam magis affligent. & vlcerā
 adhuc magis efferatiora erunt, donec ipsam vincant. Si ve-
 ro etiam sanata fuerit, sterilis erit à cicatricibus. Si mulier
 corpore

A corpore male habuerit, & pituitosi menses prodierint. cognosci autem possunt si pituitosi prodeant. Pelliculosi enim apparent, & velut araneorum casses distenduntur, & subalbidi sunt. Hoc autem contingit, si corpus & caput ipsi pituita repleta fuerint, & hæc non subpurgetur, neque per nares, neque per sedem, neque per urinæ meatum. Sed in mensibus, & in turbatione sanguinis, vna cū purgatione foras exit. Et si hæc sic habuerint, ad duos quidem aut tres menses nihil agrotat. postquam autem amplius tempus progressum fuerit, & non curetur, magis dolebit. & febris erronea corripiet. & cibum alias atque alias fastidiet, & stomachum dolebit, & maxime dolebit vbi menses appropinquarent. Quū vero purgata fuerit, ad modicum tempus, superiorum respectu melius habebit. postea ad idem relabitur. & si non curetur, sed tempus procedat, sient ipsi omnia quæ ei cui biliosi menses prodibant, donec fluxus sistatur. Consequitur etiam vt hæc fluxum pituitosum habeat, aut alia quæ ego dicam paulo postea. Et si quidē fluxus succedat, semper procedūt per omnes dies, nūc acruata, nunc pauca. & quandoque velut à carnibus aqua prodit, quandoque velut sanies. & in hoc ipso multi sanguinis grumi insunt. & radit terram velut acetum, & mordet vbiq̃ue mulierem contigerit, & vteros exulcerat. Et vbi ad hoc peruenit, reliqua quidem similiter patitur, velut prior. Minus vero quàm illa caput dolebit. & vlcerata neque deformia, neque magna, neque purulenta, neque graucolentia, similiter velut illi sunt, sed minus huic. Si vero curetur, sana euadit, etiam vbi morbus progressum fecit, & non valde moritur. Verū prægnaſſe esse non potest quæ sic habet. Quæcunque viro cohabitantes in ventre habere non possunt, interrogandæ sunt, an ipsi menses prodeant, aut non: & an purulenti sint, aut frigidi. Si quidem igitur responderit, interrogetur an statim exeat genitura, an postera die, aut tertia, aut sexta, aut septima. Si igitur dixerit statim exire vbi coiuit, vteri osculum rectum non est, sed distortum, & genituram non capit. Si vero dixerit, postera die, aut tertia, vter perhumectus est, & semen eluitur. Si vero sexta aut septima, semen putrefcit. putrefactum vero exit. Si igitur ab initio non suscipiat semen, os vteri primum curandum est, vt rectum sit. Si vero eluatur postera, aut tertia die, vterus & caput. Si

*Pituitosi
menses.*

*Qualis ue-
ratio i his.*

*Fluxus pi-
tuitosus.*

*Quid i his
agendum,
quæ non
cōcipiunt.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

*Mensium
cognitio.*

Medela.

Medelas.

put. Si vero computrescat & exeat, & uterus, & totum corpus D
curetur. Atque hæc singula sic cognoscere oportet. Quali ve
ro purgatione opus habeat, hoc modo cognoscit. Quum
mensēs prodeunt, linteum complicatum palmi magnitudi-
ne super tenuem cinerem expandito, deinde ut quæ exeunt
super hoc defluant curato. Præstat autem duo esse lintea, v-
trunque seorsim, alterum diurnum, alterum nocturnum. &
diurnum quidem, postera die lauare oportet. Nocturnū ve-
ro, ubi per diem ac noctem super cinere situm fuit. In lo-
tura vero considerare oportet, qualiānam fiant lintea lota,
ubi in sole fuerint siccata. Optimum tamen est in tenebri-
coso loco ea resiccare. Si quidē igitur pituita fuerit quæ cō-
ceptionem impedit, mucosa lintea erunt. Si vero propter sal
suginem & bilē impeditur, fulua & subliuida. His igitur cō-
sideratis, & diligenti animaduersione expensis, totum etiam
corpus inspicito, an multa purgatione opus habeat, aut sec⁹,
ita ut & ad colorem, & ætatem, & robur, & anni tempus, &
qua dixta vtantur respicias. Curatio vero & totius corporis
est, & uteros ac osculum ipsorum sanare. & si hoc conclusum
fuerit, aperire. Si vero illi distorti fuerint, dirigere oportet.
Si autem humidi fuerint, resiccare. & alia quoque facere cō-
traria. Ferriñe autem omnibus multa curatio eadem est, ex-
cepta mēsum detractione. Nam quibus nihil prodit, his de-
trahere oportet. Immo quicquid in mensibus mali inest, hæc
auferre oportet: quum videlicet pituitosi sunt, & pelliculosi,
& saniosi, & tenues, aut albi, & grumosi: & quum nigri sunt,
& carbunculosi, aut caliginosi, aut acres, salsi, turbati, purulē-
ti. Hæc omnes causæ tollendæ. Prohibent enim in ventre cō-
ceptum. Quibuscunque igitur menses pituitosi ac pelliculosi
sunt, hæc carnosæ sunt, & his os humectum est, & saliuā multa
ac viscosa. Et si acidum aut acre quid gustarint, sputum in o-
re liquidius erit, & insulsum. & ad omnia quæ ederint aut bi-
berint, turbatio sequitur. & supprimitur ipsis ac attollitur vé-
ter, & nausea adest, & anxietas ac iactatio multa. Et à capite
fluxus defluit, & omnia obducit, & multam humiditatem in-
ducit. & partes sub oculis liuidæ sunt ac inflatæ. Has totas
fouere oportet & frequenter vomere, & à cibis, & ieiunas.
Infernaum autem ventrē mollire, sed pharmacis omnino le-
uibus, quæ minime bilem ducunt, & semel in die cibum ca-
pere.

A pere, & frequenter exerceri. Et cibo siccissimo uti, & potu paucissimo meraciore. Melius autem est ut venter facile solubilis conseruetur. Verum uteros si ad hanc dietam non paruerint, pharmacis subdititiis non mordacibus purgare oportet. Fomentum tamen semper purgationibus præmittendum est, prius id quod ex fœniculo paratur. Deinde quod ex suffimentis. Fomenta vero & subditiōes medicamentorum facito, coniectura facta ut omnia fiant, & pro ratione adhibeantur, quo tempore menses prodeunt. Si quidem igitur puri & sinceri ac cruenti fiant, ita ad virum accedat incipientibus mensibus. Optimum autem, desinentibus, & adhuc euntibus, magis quàm ubi disparuerunt. Quum autem ad virum itura est, suffimentum quoddam ex adstringentibus suffiat, atque hoc per canistrum, & arundinem, pharmaco calido cineri insperſio. Quum vero insperſeris, & canistrum, siue operculum circumponito, & per arundinem insidenti fomentum adhibeto. Vbi vero opus fuerit ipsam suffiri, plumbea fistula utere, ut aperto osculo suffiatur. Deinde quum surrexit, rursus in lecto plumbeam fistulam apponat, Deinde ea subtraçia cū viro coeat. Et si ea quæ à viro prodeunt, non fuerint ei manifesta, extentis & alternatim positis cruribus quiescat. Ieiunium autem vtile est in hac die, præterquam si cyceonem velit non falsum in aqua. Hūc autem tunc bibat quum vult suffiri. Si vero ubi cum viro coiuit, postridie detineat genituram, & neq; altera die exeat: à cibis quidem & balneis prohibeatur. Bibat autem polentam in aqua non falsam, bis ac ter in die. Atque hæc dieta sit per sex dies, aut quod melius est, septem, si non exierint ea quæ à viro suscepit dum eū ipso coiuit. Illota vero maneat per omnē tempus, & det operā ut motus vitet. Si vero deambulare velit, deambulet in loco plano & leui, nequaquam accliuī, neq; decliuī. Desideat etiā super mollia, si conceperit. Reliquam vero dietam eandē faciat vsque ad dies triginta. Illota autem sit, aut si lauari opus habeat, pauca & non valde calida lauetur. Caput vero ne mædefaciat. Cibus autem utatur & panibus, & maza si velit. Ex carnibus autē, palumbe, & similibus. ex marinis, his quæ aluū sistunt. prohibeatur ab olerib⁹ acris. Vino vero nigro utatur. Carnibus autem assatis potius quàm coctis, tum mansuetis, tum ferinis. Et hæc quidem si conceperit, hoc modo facere oportet.

*Vterorum
purgatio.*

*Post viri
cōgressum
quid agat.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

Quæ semē non continet quid agat. cere oportet. Si vero non conceperit, sed secunda aut tertia die exeunt ea quæ à viro immissa sunt, fluentia cum multa humiditate: manifestum est quòd vteri sunt humidiores. Curare itaque oportet iuxta relatum modum, donec sicci fiant. Quum autem sicci esse videbuntur, sic curato. Optimum est pharmacum mollitorium, & retro, & anteriori parte ipsi adhibendum, donec vteri ad naturam suam redeant. & rursus ad virum accedat, quum menses non amplius multi, sed pauci & bene colorati fuerint, & ad libidinem concitatur. Sed & in aliis diebus cum viro consuetudinem habere oportet, si optime habuerint vteri. Quum autem in relatis diebus consuetudinem habuerit cum viro, si probe parati fuerint vteri, & si geniturâ ad decem aut duodecim dies detinuerit, ne adeat virum. Si vero non concipiat, vteri autem sani sint: contingit enim & hoc plerisque, quum debiles existentes vteri, ab affectione macilenti fiunt: aut præ medicamentis & fomēto multo, genituram ferre non possunt, priusquam assueti fiant & conualescant. Hoc autem sic cognosci potest. Quum ab ipsa exierint, secunda aut tertia die exeunt, aut adhuc prius, crassa & compacta velut mucus: nisi mali quid sit, & propter alium vterorum morbum genitura discedat. Quum igitur talia apparuerint, curatione quidem vterorum non est opus, verum reliqui corporis curâ habenda est, quo huiusmodi bonus habitus sit ipsi, ut contractum simul sit corpus, & iusta mole præditum, ex paucorum balneorum, plurium vero & leuius laborum usu. Ab acribus autem & salis prohibeatur. Vomitus utatur ante dies quibus menses fieri solent. & rursus fame maceretur, & alia perficiat quæ dicta sunt. Atque hæc quidem harum curatio est. Quibus autē statim ubi coierint diffluunt ea quæ à viro sunt immissa, his os vterorum causa est. Curare vero sic oportet. Si quidem valde conclusum fuerit, tædis & plumbeis fistulis immixtis aperito. & molli fomēto ex fœniculo foueto. & subdititiis, quæ vteros attenuant, & in directum redigunt, purgato. Post purgationes autem & fomenta, ea infundito quæ causæ sunt contraria. Quibus vero os distortum est, & ad coxam allapsum: sunt enim etiâ talia prohibentia ne vterus semen suscipiat: Quum igitur tale quid acciderit, odoratis fomentis fouere oportet. post fomentum autem, per digitum anulum à coxa detrahitur. Quum autem

Autem discesserit, tædis & plumbeis fistulis immisfis iuxta priorem rationem in rectitudinem dirigit. vbi vero rectificati ac aperti fuerint vteri, medicamentis subdititiis purgato, & alia facito iuxta relata rationem. Quum autem ma-

*Cum uteri
nimis biat.*

gis quàm oportet aperti fuerint vteri, purgatione opus habent. post purgationes autem, collutionibus & suffimentis. Si vero propiores sint quàm oportet, vomitibus vteri opus habent, & fomento fœtido, donec ad suum locum redeant. Dieta vero vtendum est relata. Si vero os pingue fuerit & crassum, & propterea non concipiat, sinapi coctum ieiuna

*Cū os mul-
ue crassū
est.*

edat, & meracum insuper bibat. Apponat autem nitrum rubrum, & cuminum, ac resinam. Optimum autem fuerit nitrum vino ammiscere & resinæ, vnà cum cumino & vnguento albo. Aut cornu cerui vrito, & duplum crudæ ordeacæ farinæ cum vino ammisceto. Si vero non melius habeat, porrum coquito, & ipsam insidere facito. Aut phagum id est glâdem tritam apponat. Et allio recenti vescatur, & aqua multa insuper pota vomat. Quibus porro intus manet viri semen & computrescit, & turbationem facit, his atriplicis semen aut succum, cum melle aut cum cumino delingendum dato. Quum autem à viro immissa graueolentia fuerint, non concipit. Portulacam igitur & adipem anserinum misceto & apponito. Quibus vero sexta aut septima die, à viro immissa prodeunt putrefacta, his verisimile est ab vtrisque fieri, & bilis, & saluginis influxu. Curare autem sic oportet, per

*Cum semē
intus pue-
trescit.*

Cveratrum, aut scammoniam, aut peplium. Hæc enim sursum ac deorsum pituitam & bilem purgât, & flatus educunt. Antè purgationes autem fomentis vtendum est ex suffimentis. Vbi vero fomentum adhibueris, per subdititia purgato, eodem modo velut in prioribus. Et post subdititorum ac purgationum vsu, mollitoriis vtete, & subdititia medicamento ex mercuriali & artemissa herba, & anemona, & veratro albo aut nigro. Atque hæc quidem medicationes hoc modo his conducunt. Dietam vero respectu ad totum hominis corpus factò constituere oportet, siue siccior, siue carnosior mulier esse videatur. Et si quidem siccior fuerit, balneis pluribus, & obsoniis omnibus coctis, tum marinis, tum carnibus vtatur. Vino vero aquoso, & oleribus coctis, & pinguius omnibus ac dulcibus. Hæc enim plerunque faciunt vt humi-

Curatio.

*Vterorum
humescens
tium cura-
tio.*

I ditas sit,

HIPPOCRATIS. LIBER .

ditas sit, tum in reliquo corpore, tum in vteris. Si vero hu- D
midior fuerit, tales vteri nullo ex his opus habent, sed vice
versa neque contrectare, neque lauare recenti motu facto
oportet, neque suffire. Nam ad periculum hæc procedere
solent. Et si magis quàm pro natura fuerint humectæ, sicca-
re sanè ac suffire oportet. Si vero biliosa in ipsos confluant,
medicamentum dare quod bilem purgat. Si vero salugino-
sa, lac asininum, & vinum, & alia auxiliaria. Morborum porro
vires considerare oportet, & causas ex quibus morbi fiunt
exquirere, atque sic ad alia procedere, & morbos circa locos
curare. & quæ quidem ob causam osculorum hiantium pro-
hibentur, vt ne detineant in ventre, horum oscula præpara-
re, vt probe diducta sint. Quum vero humiditas prohibue- E
rit, hanc inspicere vt ne impediatur, totis mulierum negotiis
expensis, siue ex toto corpore quid moueri videatur, siue ex
ipsis vteris, siue ex vtrisque. Vteros autem sic curare opor-
tet, vt neque humidi sint, neque valde sicci. Imo sicciore
quidem, tanto magis bono succo, quanto sunt sicciore, eius-
modi humiditate vt pingues magis fiant quàm graciles. Hu-
mectos vero & madidos siccare, ita vt relinquantur quo humidi
sint, & non valde resiccetur. Excessus enim in his valde sunt
vitandi. Concipit autem in ventre, neque ea quæ humidita-
tem habet, neque quæ resiccata est, nisi quid horum in vte-
ri natura fuerit. Cæterum virum adire ipsam oportet, post
adhibitam curationem, desinentibus aut inchoantibus mē- F
sibus. Optimum est etiā vbi quiescent. Maxime vero in his
diebus experiendū est, an prægnans fieri possit. hi enim sunt
opportunitissimi. Si vero nō statim concipiat, & reliqua bene
habeāt, nihil prohibet etiam aliis diebus cum viro coire. Nā
hæc exercitatio alacritatem ipsi inducit, & venulæ hinc la-
xantur. & si ea quæ à viro prodeunt concurrerint secundum
rectitudinem cum eo quod à muliere, citius concipiet. Hæc
enim causa est his, quibus siue statim, siue posteriore tempe-
re exeunt. Atque hæc quidem de his dicta sunt. Si vero hu-
midius fuerit os vterorum, genituram attrahere nō possunt.
Vtendum autem est medicamentis subdititiis acribus. Com-
morsus enī & inflammatus stomachus, solidus ac firmus quā-
doque fit, & aliquo modo accommodatur. Sed & si in callum
indurari fuerint, præstat acria apponere quæ mordeāt. Quæ
enim

*Tēpus cō-
cubitus.*

*Que durū
etiā vulua-
rē tollant.*

A enim tenuia & feruida sunt, calli duriciam diffundunt. Si vero mollitus fuerit callus, mollibus curato, & his quę non mor-
dent. Quod si diu non concipiat, mensibus non apparenti-
bus, quum tertia aut quarta dies aderit, alumen tritū, vnguē-
to dilutum, & lana exceptū apponito, & habeat per triduum.

*Medela
non concipientis.*

Quarta vero die fel bubulum siccum in oleo feruefacito, &
lanam teneram eo imbutam subdito, & habeat per triduum.

Postridie autem eximat, & cum viro coeat. Si genituram
non suscipiat mulier, mensibus secundum naturam prodeū-
tibus, membrana pręposita est. fit etiam ex aliis causis. co-
gnosces autem vbi digito obicem contigeris. facito autē me-
dicamentum subdititium, resinam & æris florem cum melle

subacta in linteo apponito quā penitissime, filo ad extre-
mitatem alligato. vbi vero hoc extraxerit, myrtum in vino
coquat, & vino tepido perluatur. pręstat autem membranam
auferre. Sunt autem mulieres quę facile quidem in ventre

*Partus re-
tinendi cu-
ratio.*

conciunt, gestare vero non possunt, sed fœtus ipsis corrū-
puntur, aut tertio, aut quarto mense, nulla causa accedente,
neque cibo incommodo ingesto. & hæc est causa quę relata
est, & maxime quum vteri augmentum fœtus dimiserint, aut
venter ipsis turbetur. Debilitas autem, & febris vehemens, &
cibi fastidium incidit eo tempore quo fœtus corrūpunt. Est

autem & hæc causa, si vteri fuerint leues, aut natura, aut vl-
ceribus in ipsis innatis. Si enim leues fuerint, quādoque cō-
tinentes ipsum pelliculæ, minus quā oportet coherent: vt-
pote quum vteri ipsi pleni existant. cognouerit autem quis

*Leuitas ut-
terorū ut
dignoscā.*

hæc singula, si de his exacte interroget. De leuitate vero co-
gnouerit, si alia mulier contigerit, dum vteri vacui sunt. Non
enim hoc tempore manifestum fit. Si vero menses prodeū-
runt his acervatim prodeūt. Quibusdam tamen ipsarum cō-
tingit vt fœtus edāt. Et si qua curetur, spes partus adest. & de
his quidem sic habet. Si mulierem puerperam facere velis,
alias concipere nequeuntem, menses considerare oportet, an
pituitosi sunt aut biliosi. Cognosces autem sic. Arenā tenuē
ac siccā subiicito, & quum menses prodeūt, in sole sangui-
nem superfundito, ac siccari finito. Et si quidem biliosa fue-
rit, sanguis in arena siccatus pallidus erit. Si vero pituitosa
fuerit, velut mucus. Vtrum igitur horum fuerit, ventrem pur-
gato, siue supra opus habuerit, siue infra. postea vteros pur-

HIPPOCRATIS LIBER I.

*Que fœ-
cunditatē
parent.* gato. Si vero concipere voles, hederæ grana septem, aut fo- D
lia, singulis mensibus in vino veteri, cessantibus mensibus bi-
benda dato. Et malicorium in vino odorato meraco coqui-
to, & glandem ex hoc factam in meridie subdito. Aut alumē
Aegyptium tritum lanæ illigatum apponito. Quum autem
sol occiderit, eo detracto, vino odorato perluatur. Hęc autem
cessantibus mensibus facere oportet. Sed & hoc sic habet.

*Conceptus
tempus.* Quum purgatæ fuerint mulieres, maxime in ventre con-
cipiunt cum viro consuetudinem habentes. & genitura ipsi
corroboratur, si quando oportet coiuerint. Et semen viri fa-
cile ammiscetur, & si præuauerit, illi accommodatur ac ap-
propriatur. Tunc enim maxime os vterorum hiat, & disten-
tum est post purgationes. Et venæ genituram attrahunt. At E
in priore tempore, & os vterorum conclusum est, & venæ ma-
gis sanguine plenæ existentes, nō similiter genituram attra-
hunt.

*Quādo nō
concepit.* Si vero genitura iugi cursu defluat, mulier viro mi-
sceri non cupit, & si misceatur, non concipit: & lumbi ac co-
xendices doloribus vexantur, & febris debilis corripit, & im-
potentia ac animi deliquium succedit. & aliquando vteri in
suo loco non sunt. Si quidem igitur præ plenitudine defluat,
finere ipsam optimum est. Si vero vterus laxus fiat, diæta sit
alica, caro suilla, aut palumbis, & vinum nigrum. potiones ve-
ro, quæ ad fluxum describentur. Nūc porro dicā de mor-
bis earum quæ in ventre habent. Pronūcio autem de mulie-
re in ventre habente duos aut tres menses & ultra, si menses
statim prodeant singulis mensibus, necesse est tenuem ipsam F
fieri ac debilem. Quandoque etiam febris ipsam corripit his
diebus, quā diu menses prodierint. Et dum prodeunt, &
postquam prodierint, pallida fit. Sed & pauci prodeunt. His
vteri magis quā opportunum est hiant, & augmentum fœ-
tus dimittunt. Descendit enim quum mulier in vētre habet,
sanguis paulatim in vteros à toto corpore. & in orbem circa
id quod in vteris est circumstans, illud auget. Si vero hiarint
vteri magis quā oportet, sanguinem singulis mensibus, ve-
lut procedere solet, dimittunt. Et quod in vteris est, tenue ac
debile fit. Si vero curetur mulier, melior & fœtus, & mulier
enadit. Si vero non curetur, fœtus corrūpitur. Sed & ipsa pe-
richitatur, ne diuturnum habeat morbum, si purgatio plus
quā oportet prodeat. Quia & post corruptionem pericu-
lum im-

Alum imminebit, nimirum vteris magis apertis. Si vero mulieri in vtero habenti caput pituitosum fuerit, & pituita acris in ventrem descenderit, & à capite ventrem percurrat, & febris debilis ipsam corripit, & palpitaciones quibusdam debiles subexolutæ, augescētes acutæ. Si vero etiam cibi fastidium, & impotentia corripiat, periculum est ne breui fœtus corrumpatur. Sed & ipsa in periculum adducetur, si non curetur. vbi vero effugerit, utpote ventre fluído existente, statim concludere ac constringere oportet. Multa vero etiam alia sunt pericula, in quibus fœtus corrumpuntur. Nam si mulier in ventre habens ægrotarit, aut debilis fuerit, aut onus leuarit, aut percussa fuerit, aut saltarit, aut cibum fastidierit, aut animi deliquio correpta fuerit, aut amplius aut minus nutrimentum accipiat, aut timeat, & consernetur, aut vociferetur, aut intemperanter viuat fœtum corrumperet. Nam & cibus corruptionis causa est, & potus multus. Sed & ipsi vteri naturas habent, quibus abortum faciunt, quum sunt statuoſi, denſi, magni, parui, & alia his similia. Si mulier in vtero habens, ventrem aut lumbos doleat, formidare oportet ne fœtum per abortum edat, pelliculis qui ipsum continent ruptis. Sunt etiam quæ fœtus corrumpunt, si acre quid, aut amarum ederint, aut biberint præter consuetudinem, dum adhuc parvus intus est puerulus. Si enim puero quid accidat præter consuetudinem, & si paruulus adhuc fuerit, moritur. Et si eiusmodi edat aut bibat, velut diximus, ut necesse sit ipsi turbare ventrem, dum adhuc paruus est puer. Percipiunt enim & concitantur ipsi vteri, fluxione ex ventre secedente. Et si laborarit mulier plus quàm oportet, & venter ipsius concludatur, aut magnus fiat, etiam sic puer corrumpitur, velut à labore calefactus, & à ventre pressus. Plerumque enim dum parui sunt, debiles sunt. Quidam vero etiam magni corrumpuntur. Quare mirari non oportet mulieres, quod inuitæ corrumpunt. Nam custodia & scientia multa opus est, ut in vteris gestent puerum & enutrient, & ut euadant ab ipſo in partu. Si vero mulier in ventre habens, corpore male habeat, & fuerit biliosa & doloribus vexata, & alias atque alias febricitet, & os examareſcat, & lingua cum virore pallida fiat, oculi velut morbo regio affecti, vngues bi-

Causæ uarie abortus.

Quam facile abortus fiat.

Pregnantium uarii affectus.

HIPPOCRATIS LIBER I.

liofi, vrina acris; hæc tum alias, tum fi febricitet, alias at-
que alias ipfi accident; poftquam vero etiam purgationem
contigerit biliofa effe, planè timendum eft etiam pueros
debiles fore; hæc fi biliofa per feceffum egerat (id quod val-
de contingit) melius deget. Et fi biliofa aut valde nigra
funt partus purgamenta, etiam vt plurimum pinguedo fuc-
cedit, & prodeunt paulatim, & non cito congelantur. &
primo quidem tempore leuius fert, pofttea vero grauius, &
minus purgatur quàm oportet. Si enim corpus male habue-
rit, etiam partus purgamenta pauciora ac deteriora ipfi pro-
cedent. Patietur autem & hæc omnia, etiam fi menses pro-
deant biliofi. Verum breuiori tempore ægrotabit. Et mor-
bus ad eadem pericula, & figna, & tranfmutationes deue-
niet. Aut enim ipfis vomitus biliofus, aut purgatio per ven-
trem, in hoc morbo fit, & vteri exulcerantur. Multa vero cu-
ftodia mulier opus habet. Quum igitur tale quid factum fue-
rit, vt ne moriatur, ftertilis erit. Si vero nihil horum fiat, &
non curetur, fed partus purgamenta fuerint ipfi occultata, in
triginta & vna diebus vt plurimum moritur. Huic pharma-
cum in potu exhibendum eft quod bilem ducat. Prodeft &
anifum, & quæ ad vrinam ciendam dantur. Vomat autem,
& fudores eliciantur, & alius fucco prifanæ, & melle, & onis,
& malux aqua infufa eluatur. Quibus in ventre habenti-
bus circa feptimum aut octauum mensem, derepente mam-
marum & ventris plenitudo collabitur, & vbera gracilefcunt,
& lac non apparet, his dicendum eft, puerum aut mortuum
effe, aut viuere & debilem effe. Si enim in ventre habuerint,
& apparuerint menses; aut abortus fiunt, fi plures fuerint &
male olentes, aut fœtus morbofi fiunt. Si mulier in ventre
habens pituitofa fuerit, & caput dolet, & alias atque alias fe-
brit. & in capite obuoluitur pituita. Et grauitatem exhibet
ac frigus. & in corpus procedit, & in venas, quum caput fue-
rit repletum. Fit etiam colore plumbo fimilis, & vomit pitui-
tam, lingua alba eft, & vrina communiter exalbefcit, frigida
eft, turbatio adef, & æger motus. Vbi vero pepererit, proce-
det ipfi purgatio pituitofa, & apparebit pelliculofa, & velut
araneorū caffes in hac diftenti erunt. & patietur quidē eadē
omnia etiā ea cui menses pituitofi prodeunt. verum breui-
re tēpore ægrotabit, & eadē pericula, & figna, & tranfmuta-
tiones

Medela.

*Quid fi
gnificet
partum
periffe.*

Actiones morbo habebit, Cōtinget enim ipsi vomitum pituitosum fieri, & affectiōes similes velut illi accident. Dependēt enim eodē modo partus purgamenta, & menses pituitosi, verum purgamenta partus breuiore tempore quā menses. & nisi eruperit ipsa purgatio quæ diu moram traxit, moritur in quinq; & quadraginta diebus, etiāsi pituitosum partus purgamentum ipsi prodierit. Curata autem mulier, sana fiet. & inflabitur ab initio si sanata fuerit, Grauis enim erit hic morbus. Huic dare oportet pharmacum quod pituitam ducit, & lac caprinum coctum cum melle miscere. Si vero sepe non obediāt, nasturtium, aut enicum, aut cneorū, aut polypodiū, aut serum, aut medicamentum ex sale compositum exhibeto, & quæcunque pituitam laxant, ac educunt. Si vero mulier in vtero habens, lienosa sit à relatis affectiōibus, in hoc morbo menses hydropi similes & pituitosos demittit. & partus purgamenta procedent hydropi similia, & prodibunt modo multa, modo pauca, & fiunt quemadmodum aqua à carnibus, velut si quis carnes cruentas abluat. Aliquando vero paulo crassiora, & non congelantur. Et patietur eadem omnia etiam ea cui menses aquosi procedunt, & pericula eadem ac transmutationes morbus habebit. Continget enim ipsi fluxum aquosum fieri, aut purgationem occultari, & ad vētrem conuerti, & ad crurā, aut ad pectus, aut aliquam harum partium. & pericula erunt eadē quæ prius sunt relata. Si prægnans intumescat, vtricæ semen plurimum, & mel, & vinum dilutum odoratum potandum dato, bis in die. Si prægnantem bilis vexet, ptisanæ succum dato, rhoe rubro insperso, aut eo qui ex moris paratur. Sorbeat autem frigidam, & sistetur. Si suffocatio derepente accadat prægnanti. Fit autem hoc maxime vbi mulier laborarit, & cibum fastidierit, vteris à labore calefactis, & pauciore humore foetui accedente. Et quum vterus ac venter inanior sit quā oportet, procedit foetus ad hepar & præcordia, vt quæ sunt humecta, & suffocationem fortem derepente inducit. Intercepit enim perspirationem circa ventrem, & mulier voce priuatur, & albas oculorum partes subuertit, & reliqua patitur omnia quæ relata sunt, si mulier non prægnans ab vtero suffocetur. Quia & suffocatio fieri incipit mulieri in ventre habenti, quum à capite defluit pituita ad præcordia,

*Periculū
mortis in
prægnate*

Medela

*Prægnās
lienosa qd
patiatur.*

*Suffocatio
vulue cur*

HIPPOCRATIS LIBER I

utpote corpore respirationem trahere non potente. Et si quidem vnâ cum pituitâ descensu, foetus redierit ad suum locum, velut qui humorem attraxit, & à pituita delatus sit, mulier sana fit. Stridor autem fit foetu locum suum occupante. Et venter mulieris ut plurimum humidus fit. Si vero non breui redeat foetus in suum locum, duo iam fiunt quæ foetum affligunt, pituita quæ à capite descendit, grauat enim & insistens frigefacit: & loci alienitas, & periclitabitur. Et si non breui quis commodiorem dietam adhibuerit, mulier suffocabitur. Et de his quidem sic habet. Si vero mulieri in ventre habenti, tempus partus iam affuerit, & dolor partus tenuerit, & ad multum tempus mulier puerum edere non poterit, omnino obliquus aut in pedes procedit. Vtile est autem in caput procedere. Et si obliquus procedat, difficilis fit affectio. Sicut enim si quis in vas olearium angustioris nucleum immittat, non procliuè est extrahere ipsum obliquatum. Sic sanè etiam mulieri grauis affectio est, vbi foetus fuerit obliquatus. Difficile est enim ipsum exire. Graue autem est etiam si in pedes processerit, & sæpe aut matres pereunt, aut pueri, aut ambo. Est autem & hæc magna causa ut non facile exeat, si mortuus, aut syderatus, aut duplicatus fuerit. Quum mulier in ventre habuerit, tota fit cum virore pallida, quoniam purus ipsius sanguis semper quotidie ex corpore destillat, & in foetum descendit, & augmentum ipsi accedit. Et quum paucior sanguis sit in corpore, necesse est ipsam esse pallidam, & semper alienos cibos appetere, & sanguinea in ventrem intrare. Et debiliior fit, quoniam sanguis minuitur. Affero porò mulierem vbi pariet, frequentem spiritum emittere. Et si purgatio inceperit, venter plenus est, & calore pressus. Maxime vero frequenter respirat, vbi partus appropinquat. Et tunc maxime lumbos dolet. Nam & lumbi à foetu colliduntur. Dolet autem stomachum siue ventriculi osculum in intermedio tempore aliàs atque aliàs, utpote dum venter, maxime vero vterus, circum foetum obuoluitur. Et si puerperæ vterus infletur, ouiculæ aut capræ hepar cinere obruito, deinde coquito, & hoc edat, ac vinum meracius verus, si nihil prohibuerit, bibat ad dies quatuor, si longius aberit à partu. Si vero lumbos doleat, anisum & cuminum Aethiopicum bibat. Et calida lauetur. Si vero anhe-

Partus difficilis.

Cur grauidæ pallidæ sciat.

Parturitionis signa.

- A**ro anhelatio corripiat, sulphuris magnitudinem fabæ, & cardamomi tantundem, & rutæ ac cumini Aethiopici tantundem. Hæc terito, & vino diluta ieiunæ bibenda præbeto. Et à cibis frequenter abstineat. Si in partu purgatio multa prodierit, vterus contrahitur, & vesica, & intestinum, & neque sterco continent, sed & urinam emittunt. Oua igitur sorbenda dato, & panem cinericium edendum. & reliqua quæ scripta sunt. Si vero ea quæ in partu est, sicca fuerit, & difficulter humectetur, oleum bibar, & locos oleo calido cum malux aqua irriget. & cerato liquido illinat, & anserinum adipem cum oleo infundat. Si vero parere non poterit, resinam, aut cuminum, aut pinus corticem suffito, *Partus difficultasque tollatur.*
- B** Quicunque vero tumores vteri in partu, aut ex partu fiunt, eos adstringere non oportet, velut medici faciunt: verum pharmaca optima exhibeto. Cuminum Aethiopicum quantum tribus digitis capi potest, & anisi, & seselis grana quinque aut sex, præoniæ radicis aut etiam seminis testam conchæ maioris dimidiam. Hæc in vino albo odorato maxime, ieiunæ exhibeto. Aut dauci Aethiopici radicem, seseli, præoniæ radicem, eodem modo. Aut hipposelini, aut dauci Aethiopici semen, eodem modo. Aut crethmi radicem. Aut cuminum Aethiopicum quatuor obolorum Atticorum pondere. Aut piper, anisum, daucum, præoniæ Atticæ radicem, hæc in vino terito, & bibenda dato. Aut myrtidani ramulos duos aut tres, & cuminum Aethiopicum, & præoniæ radicem.
- C** Aut etiam lini semen similiter, quo etiam pueros ruffientes nutriunt, cū omi affati vitello, & cum sesamo tosto. Si prægnanti pudenda superficiatio ac feruido vlcere affecta sint, amygdalas tritas, & medullam bubulam in aqua coquito, & modica farina adiecta, pudenda illinito. & aqua à coctis myrti baccis perluito. Nunc vero dicam de puerperij purgamentis, & his quæ post partum exeunt. *Puerperarum purgatio.* Quin mulieri aut partus purgamenta non fuerint purgata, aut menses non prodierint, aut etiam vterus durus fuerit: dolor habet lumbos, & lateris mollitudinem, & inguina, & femora, & pedes amare dolet. & venter attollitur. & horrores per corpus discurrunt. Ex talibus autem febres fiunt acutæ. Hanc ita habentem, si quidem sine febre fuerit, balneis curato. Caput autem oleo anthino inungito. Maluam autem

HIPPOCRATIS LIBER I.

rem coquito, & oleo cyprino in aquam eius infuso, mitigandi gratia insidere iubeto. In omnibus autem morbis in quibus fomentum auxiliatur, melius est postea oleo vngi. Si vero febris habeat, à balneis abstinere. fomentis autem & tepidioribus inum ventrem & lumbos curare. In potu autem exhibere pharmaca vterina, aut sepiæ ovis, aut castorio amixtis. post hoc vero farinam cum ruta coctam, aut ptisanæ succum sorbendum dare. Si vero mulieri cum puero in partu non prodierit humor velut oportet, sed siquidem in capite habuerit humorem à calore attractum, in partu & ante, caput dolebit. Si vero in ventrem aceruatim descenderit, vbi concitatus fuerit, ipsum turbabit. Et non oportet longe progredi sinere, sed auxilium ferre, vt ne ex partu ventris profluuium succedens, corpore male habente, ipsam dolore affligat. Si vero à capite delatus fluxus, ad puerperij purgationem vertatur, & multum concitetur, melius habebit. Si vero plus moderato, curam adhibeto. Si vero in ventrem, facilius utique exitus puero contigerit. Si vero purgatio modica mulieri prodierit, dolor fortis corripit lumbos, & omnem circa pudenda locum, & intumescit, & femora ardent.

Et ex ore ac naribus pituita fluit fortiter aquosa. & dolet caput, & febris habet, & horror, & tumet. & dentes stridunt. & venter, & vesica constringetur. & oculos subuertit. & caliginosum visum habet. Quum mulieri puerperæ purgatio non facile procedit, velut vteris inflammatis, & osculo ipsorum concluso. Obtorquetur enim stomachus vteri post pueri egressum. Si enim quid horum fuerit, purgatio non procedet. Si vero non processerit purgatio, continget ipsam febrile, & horrorem habere, & ventrem magnum esse. & si ipsam attigeris, totum corpus dolere, maxime si quis ventrem attingat, & aliàs atque aliàs stomachi dolore vexatur, & lumbos dolet. & cibi fastidium, & vigiliæ, & punctura adest. postea quinto aut septimo die quandoque venter turbatur, & secedunt nigra, & valde graueolentia aliàs atque aliàs, & vrina velut asinina. Et si secesserint, videtur sibi melius habere, & curata, breui sana fit: sin minus, periclitabitur profluuium ventris forti ipsi illapso. Et puerperij purgamenta ipsi occultabuntur. Si vero venter ipsi non turbetur, neque purgatio prodeat sua sponte, neque ea quæ comoda sunt breui exhi-

Quid si non
curentur
eueniat.

Aui exhibeantur, tempus autem progrediatur, multo magis ex prædictis affligetur. Et insuper periclitabitur, ne liuida fiat velut plumbum, & aquam intercutem incidat. & vmbilicus extabit ipsi, ab vteris eleuatus. Et circumcirca nigrior erit. & vbi hæc facta fuerint, fieri non potest vt mulier superstes maneat. Pereunt autem aliæ alio tempore, pro corporis & affectionis ratione. Verū vnam & vicesimam diem nō excedunt, id quod plerunq; sic cōtingit. Si vero purgatio ipsi eruperit, siue à pharmacis, siue sua sponte: fit enim & hoc si vteri os laxariat, à sanguine aceruatim derepente delato coacti: & si eruperit, graueolentia purulenta depurgantur, Quandoque etiā nigra. & melius habebit, & curata sanescit. Fiunt autē &

B vlcera in vteris, vtpote puerperij purgamentis putrefactis. *Signa ulcerum in uuluis.* Si vero fiant, maiore cura opus erit, vt ne ipsi vlcera magna & putredinosa fiant: periculum est autem ne aut moriatur, aut sterilis fiat. Signa vero hæc fiunt, si vlcera intus fuerint.

Quum purgatio ipsi prodierit, velut spina per vteros transire videtur. & calor ipsam corripit, ac maxime ventrem inuadit. Et si attingatur, partem infra vmbilicum dolet, velut si purum neruosum vlcus contingat. Post dolores fortes aliās atque aliās in vteros incidunt. Et febris aliquando ad contactum manus debilis & aliās atque aliās puerperij purgamenta procedunt, maligna, purulenta, graueolentia. Hæc sunt signa, si vlcera in vteris fuerint, & multa cura opus habent. Atque huius quidem morbi tot fines existunt. Si vero purgatio

C puerperij primis tribus aut quatuor diebus processerit, verū postea derepente euanescit: easdem affectiones consimiles priori patitur, sed minus. & si transmutetur morbus, in idem transmutabitur. Diuturnus autem & debilior priore erit. Si vero curetur mulier, superstes erit, si cito curetur. & de hoc morbo sic habet.

Si vero ex partu non fuerit purgata, venter intumescit, & splen, & crura. Et febris habet, & rigor corripit, & dolores profiliunt ad lumbos. Aliquando etiam ad viscera. Et perfrigeratur, & febris habet. pulsus debiles sunt, & aliquando acuti, & aliās attolluntur, aliās deficiunt. Hæc patitur incipiente morbo, & sic habet. Temporis autem progressu, cauæ faciei partes rubescunt. Quum sic habuerit, leues cibos exhibeto. Et si turget, pharmacū infra purgans bibendum dato, si biliosa fuerit, quod bilem purgat: Si pituitosa, quod

Cū puerperæ purgatio subsistit.

Cum post partū non purgatur.

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER I.

quod pituitam. Postea vero vteros odoratis foueto, & molli- D
 torium in die apponito. Si vero osculum solidum fuerit, tota
 die foueto, & mollitoria apponito. Deinde calida aqua laua-
 to, & plumbeas fistulas indito. postea salis grana, & myrrham
 in linteum illigato, & picem coctam ammixtis aromatis lana
 excipito, & singulorum pares portiones ad gallæ parue figu-
 ram efformato, & per diem ac noctem apponito. Deinde ve-
 ro intermissis tribus diebus, iisdem foueto. Et grana cnidia
 decorticata duarum portionum mensura, & piperis grana tri-
 ta, oleo Aegyptio albo, & melle optimo ammixto, in lanâ in-
 fascito, & pênæ obuoluta, tota die ac nocte apponito. Et si ti-
 bi purgata esse videatur, melius est sinere. Si vero purgatio-
 ne opus habere videatur, duobus diebus interpositis, rursus E
 id quod ex cucumere syluestri paratur, per diem ac noctem
 subdito. Deinde Netopon, & oleû rosaceum odoratissimum,
 & adipem cerui liquefacito, & die vna in lana subdito. & mul-
 ta calida, quantum eius fieri potest, leniter lauato. Statim au-
 tem vbi purgatorijs, & calida, fuerint purgata loca affecta,
 adipe anserino, & myrrha, & resina tepida os vterorum illi-
 nat, & foueat. vteros vero postridie vino & oleo narcissino
 eluat, Aut si narcissinum non sit, vino solo. Atque hæc die v-
 no ante menses faciat. Postquam autem menses prodierint,
 primis diebus atramentum, hoc est spodium cyprum terat,
 & salis granum addat, & hæc lana excepta paululum in cor-
 pore habeat. Et ieiuna vinum meracû odoratum absorbeat.
 Vbi vero quieuerint menses, per diem id quod ex pulegio pa F
 ratum apponat, & virum accedat. Et si in ventre conceperit, sa-
 na euadit. Cibus autem in purgatione vtatur. Ad hæc côm-
 dat, mercurialem coquere, & porrû, allium, brassicam, & gra-
 na mali punici ammiscere, & succum forbere. Aliis autem ob-
 sonijs marinis potius quàm carnibus vtatur. A dulcibus vero
 & oleosis prohibeatur. Bibat autê semper ieiuna id quod ex
 tæda paratur, donec purgetur. Et mensibus prodeuntibus idê
 valde bibat. Si vero paulo pauciora quàm oportet prodie-
 rint mulieri puerperij purgamenta, velut vteris angusto ore
 præditis ac distortis, Aut aliqua pudendi pars valde fuerit cû
 clusa ab inflammatione: Mulier acutè febrit, & stomachi do-
 lore vexatur, & dolet totum corpus, & moleste fert. & ad ar-
 ticulos manuum ac crurum & lumborum dolor procedit. &
 locum

*Puerperæ
 mala pur-
 gatio quid
 apportet.*

- A locum circa collum, & spinam & inguina dolebit. & quædam corporis partes impotentes fient. Postea calor quietus erit, & horror valde manifestus. Vomunt autem & pituitosa, amara, acria. & de hac sic habet, & continget vt si curetur, sana fiat. Sin minus, clauda & quarundam corporis partium impotens erit. Non autem valde sterilis est hic morbus. Si quidem vlcerati fuerint vteri, & puerperij purgamenta nõ prodierint, *Vterorũ ulcera.* velut oportet, omnia dolebit. & si non magna fuerint vlcera, curata breui sanescit. Oportet autem curationem vlcerum in vteris exacte facere, vt quæ in tenera & subtili sensu prædita sint parte, & in nervosa cavitate. Multæ autem sunt partes cum quibus societatem habet, scilicet, stomachus. Mens percellitur, & improba fit, & non facile intelligit. Si vero vteri angustia oris ipsi fuerint, & puerperij purgationem non emisierint, *Cum uterorũ os angustia fuerit.* inflammantur: & si non curetur breui, omnia magis ipsam affligent. Et odor malus erit, & exitus intumescit. Et si non inflammari fuerint vteri, sua sponte exit malum graue olens, & liuidum, aut nigrum grumosum. & mulieri puerperij purgamenta purgantur. Quandoq; vero non exit, sed mulieri mortem portendit, nisi quis breui venam fecet, aut ventrem emolliat. præstat autem etiam clysterem adhibere. Si vero ad vomitum facilis fuerit, etiam vomitum inducere. Melius autem est lotium ciere & exudare. Verum in his occasio optima est, quum opus his fuerit. Si vero ex partu purgata mulier fuerit, paulo plura quam oportet. Cõtingit enim hoc, si vteri amplioris osculi fuerint, & venæ quædam ruptæ sint, quæ sub vteros tendunt. præ violentia egressus ipsius fœtus: febris & rigor habebit ipsam tenuis, & calor per totum corpus. Aliquando etiam horror, & cibi fastidium, & omnino abominabitur. & tenuis erit ac debilis, & pallida, & tumida, & cibum auersatur. Si vero quid edat aut bibat, non concoquitur. Quibusdam vero etiã aluus & vesica erumpit. & horror magis obtinet. Et de hac sic habet. Si vero puerperæ aliqua pudendi pars obturata fuerit: Iam enim etiam hoc cognoui: si vlceratum fuerit os pudendi, vbi sanè vlceratum fuerit, in partu à pueri exitu violatũ, simile quid sit vlceri superficiali ac feruenti, & valde inflammatur. Et labia præ inflammatione inter se coincidunt, & se mutuo contingunt, utpote quæ sunt exulcerata. Sed & frigus fit, & ambo labia clausa sunt, cõstrin-
gentia

HIPPOCRATIS LIBER I.

gentia purgatione relicta. Si vero prodiret purgatio, vlcera non conclusa essent. Nunc autem influit, & aliena carne crassescunt. Proinde ea sanare oportet, velut in reliquo corpore, & ad cicatrices perducere. Locus autem levis & concolor reddatur. Mulier quædam patiebatur eadem quæ patiuntur vteri dum à puerperij purgamentis non purgantur, & ad hæc dolebat pudendum. Et ex contactu cognouit, quod obrurata esset, & narrauit, & curata depurgata est, & sana euasit ac fecunda. Si vero curata non fuisset, neque purgatio ipsi sponte erupisset, vlcus maius fecisset, & malo non remittente, periclitata fuisset ne vlcera cancerosa fierent.

Cum purgatio caput petit.

Si vero processerit mulieri puerperij purgatio ad caput, thoracemque ac pulmonem: fit enim & hoc: moriuntur sæpe statim, si detineatur ac firmetur. Si vero probe exeat per os aut nares, sana euadit. Si vero morbus paulo diuturnior fiat, patietur sanè mulier ea quæ dicta sunt de virgine, cui menses primum comparentes sursum impetum fecerunt. Verum mulier longiore tempore superstes erit quàm virgo, & affectiones debiliores erunt, donec pulmo purulentus fiat. Si vero puerperij purgatio non exeat per os, sed sursum tamen impetum fecerit, occultabitur, & non procedet iusto modo. Et tussis corripiet, & anhelationes. Et impleto pulmone à sanguine, valde dolebit latus & dorsum. Et quum tussiet, sicce tussiet. Aliquando vero spumum expuet. Temporis autem progressu sputum apparet subnigrum & turbatum. Et calor pectora tenet, magis quàm reliquum corpus, nimirum sanguine ipsa calefaciente. Et febricit mulier. & venter ipsi coarctatur. & cibum fastidit, & vigilabit,

Cum purgatio faciem petit.

& abominabitur. & non superstes manet, sed moritur plerumque vicesima prima die. Si vero purgatio sursum progressa, per os non exeat, neque in pulmonem vertatur: conuertetur ipsi ad faciem, & erit hæc valde rubicunda, & caput graue, quod neque mouere potest absque doloribus. & oculi valde rubicundi erunt, & ex ipsis sanguis tenuis fluet. Et quibusdam ex naribus sanguis manat. Et si hic exierit, diuturnior morbus fit. Et aures non acute audiunt in hoc morbo. & stomachi dolore vexatur, & eructat, & mente alienatur, & deliria sunt furiosa. Quibusdam autem adest oculorum distortorum ferocitas. Et reliqua omnia perpetietur, velut si purgatio ad pulmonem vertatur. Verum non tussiet, neque expuet eiusmodi, neque dorsum.

- A** dorsum similiter dolebit. Curata vero sana fit. Non multa vero spes est de vita ipsius. Et si etiam superficies maneat, surcitas aut caritas omnino ipsi accedet. Atque hic est huius morbi finis. Si ex partu fluxus corripiat, & cibi in ventre non maneat, uiam passam nigram, & mali punici dulcis grana terito, & vino nigro dilutis utitor, ita ut caseum caprinum derafum, & polentam tritici torrefactam inspergas, & bene temperata bibenda præbeas. Si ex partu sanguinem vomat, hepatis fistula sauciata est. & dolor ad viscera procedit, & cor conuellitur. Hæc multa calida lauare oportet. & tepescfactoria quæ maxime admiserit adhibere. & lac asinum ad dies septem vel quinque bibendum dare. postea vero vaccæ nigræ lac bibendum præbere, ita ut sine cibo degat, si fieri poterit, ad dies quadraginta. *Profluuit post partum.*
- B** Ad vespæram vero sesamum tritum bibat. Morbus hic est periculosus. Quomodo autem lac fiat, dictum à me est in pueri in partu natiuitate, & alia similiter. Si lac fuerit extinctum, porrum tritum & aqua dilutum bibendum dato. *Quæ lac reparent.* Et calida lauatur, & in cibo porrum ac brassicam edat. Sed & cytisi folia simul coquat, & succum sorbeat. Bibat etiam scœniculi succum, & de radicibus scœniculi. Et ordeum molitum ac butyrum simul coquito, frigesacito, ac bibenda præbeto. Bonum est & hippomarathrû, & hipposelinum, & cytissus. Hæc omnia simul multum lac faciunt & augment. Capræ item Scyriæ, casei autem maxime commodi sunt. Sed & saluiâ coquat. Aut à iuniperi baccis, aut cedri fructu, succum diffundat, & vino affuso bibat. & reliqua oleo affuso edat. & ab acerbis, & salis, & acidis, & crudis oleribus omnibus prohibeatur. Nasturtium vero in vino potum commodum est. Nam lac purgat. & calida lauatur, & subcalidam bibat. Vitæis item fructus in vino bibendum dato. & betæ succus potatus multum lac facit. Sesamum quoque recens, & ordeum trimestre, in mortarium cōiecta terito, & succum per linteum exprimito, & mel aut amamelidas ammisceto. deinde in vino nigro bibenda dato. *Quæ post partum eueniunt.*
- C** Quum mulier peperit, & à secunda non fuerit liberata, præstat dare ea à quibus maxime purgantur puerperij purgamenta: allia cocta aut affata in vino & oleo cum polypis ac scopolis super prunis tostis, quicquid tandem ex his voluerit. Castorium vero aut nardum bibat. Bibat etiam rutam in vino nigro dulci ieiuna, aut sine vino. Si vero vinum non fuerit dulce, melius

HIPPOCRATIS LIBER I.

ce, melius est mel ammiscere. Edat etiam brassicam coctam cum ruta & mercuriali. & semen aliquod utero commodum bibat. Si vero puerperij purgamenta in grumos fuerint coacta, & dolor in imo ventre fiat, porrum coctum, & quaecunque sylvestria ac hortensia olera dato, verum omnia pingua facito: & per tertium quenque diem sub clementi cœlo lauetur. Frigus enim his inimicum est. Et post balneum inungere melius est, & non multa calida uti. Quum secunda non statim exierit post partum, uni ventris dolores fiunt, in laterum molitudine, & rigores ac febres. Et si discesserit secunda, sanatur etiam mulier. Sæpe vero putrescit, & discedit sexta aut septima die, aut etiam prius. Huic autem dare oportet pharmaca quæ ego describam, & spiritum continere iubere. Omnium vero optimum noui artemisiam herbam, & dictamnū, & violæ albæ florē. Et silphij succus optimus est fabæ græcæ magnitudine in aqua potus. Et si secundas excludere non poterit, à cibo abstineat. Et postea viticis folia trita in vino & melle, oleo affuso tepefacito, & hemina mensuram bibendam dato,

Cur secunda remanet.

& exhibunt. Si mulieri secunda in utero relicta fuerit, hoc sic contingit. Si per vim ruptus fuerit umbilicus, aut ab obstricta umbilico seca per imperitiā resectus, quæ videlicet umbilicum pueri prius incidit, antequam secunda ex utero exisset, & uteri sursum retrahunt secundam, utpote lubricam & diffusam, & in seipsis detinet. Nam secunda ex umbilico pueri hæret. & umbilicus postremus ex utero exit. Si enim prior exiret, non accederet per ipsum puero nutrimentū, quoniam

Cum partus minor non exit.

ex ipso dependet. Quum in ventre habens fœtum corruptum mēstruum, aut bimestrem, & secundæ exire non poterint, fuerit autem tenuis: huius corpus tunc purgare oportet ac pinguefacere. Non enim prius exeunt fœtus putrefacti, nisi

Cum secunda non exit

si fortes fuerint uteri, & probe compacti. Si mulieri secunda relicta fuerit, si non ampli fuerint uteri, purgatio ipsa minus quàm oportet procedit, & venter durus fit ac magnus. Et frigus detinet, & febris acuta. & dolor per totum corpus, & ventris maxime partem eam quæ est infra umbilicum. & grauitas fit in utero, & tormen, velut fœtus insit. Et curata secundam breui eiicit putrefactam, & sana euadit. Si ex partu

Cum post partum uterius ulcera

uterus ulceratus fuerit, rosarum floribus curato. Sed & acerbis infusus colluatur. Si vero os eius ulceratū fuerit ac inflammatum,

- A** matum, myrrham, & adipem anserinum, & ceram albam, & thus, pilis leporinis sub vêtre enatis misceto, & simul trita in lana apponito. Si ex partu vteri fuerint inflammati, febris debilis corpus tenet, & caligo adest. Ex ventre vero nūquam deficit calor, & sitit, & coxas dolet, & véter imus fortiter intumescit, & aluus turbatur. Seccessus autē est malus & olidus. & calor vehemēs corripit, & cibum auersatur, & dolor iuxta finciput est, & ventris stomachus non potest trahere cibos ac potus, & concoquere nequit. & nisi curentur statim, plurimæ moriūtur. Venter autem est in causa. Sambuci igitur folia tenerrima, in crassiore tritici recentis farina cocta, leuiter tepida sorbeat. Dato & aquam mulsam, & vinum aquosum. Et perstinem cataplasmatibus frigefactoriis integito. Cibum autem quā minimum edat, & véter sistatur, & caput curetur. præcordiis vero & vterorū loco, cataplasmata adhibeto. *Quum Cum sedes post partū doluerit, ac bibendum dato. Si ex partu doleat, resnam terebinthinam, & mel, & vinum tepidum, sorbenda dato. Et si inflammati fuerint vteri, inde sedantur. Si vero nō doleat vterorum locum, amygdalas amaras tritas, & olea folia tenera, & anisum, & irionem, & origanum, & nitrum. Hec misceto, terito & vterorum collyria efformato. Si vero inflammati fuerint, & dolor habuerit, rosarum folia, cinamomum, & cassiam, simul terito, & netopo affuso, placētulas ac pastillos drachmales formato, easq; in ollam nouam fictilem igne candentem mittito, circumlocataque muliere ac vestibis contenta, in vteros suffito. Hoc dolores sedat. Si vero ex partu vteri doluerint, calor debilis habet. verum venter imus intus igne ardet, & ad coxendicem aliquando intumescit, & dolor habet imum ventrem, & laterum mollitudinem. Et seccessus biliosi sunt & graueolentes, & si non sistatur venter, derepen te moritur. Quum igitur sic habuerint, ventrem frigefacere oportet, cauendo ne horrescat. Bibat autem si non sistatur, aquam de crassiore tritici farina in ipsa macerata, & panis farinam edat. Sorbeat autem mali punici vinosi succum aqua dilutum, farina lentium inspersa. Et hoc coquito, misce lentē, & cuminum, & saleem, & oleum, & acetum, atque hanc sorbitionem frigidam exhibeto. Lenticulam item acidam dato, & vinum vinosum pramnium in super sorbendum. Ab aliis autē*
- B**
- C**
- K** **cibis**

HIPPOCRATIS LIBER I.

cibus abstinere oportet donec febris solvatur. Si vero visum fuerit, etiam lauetur. Si vero debilis fuerit, polentam bibendam dato. Et si imbecillior sit, ex aqua frigida. Cibum autem exhibeto leuem, qui non euacuet, ubi calor remiserit. Morbus hic acutus est & lethalis. Si inflammati fuerint puerperæ vteri, venter ardet, & magnus fit. & ad præcordia suffocatio habet. Quum sic habuerit, muscum marinum quem super pisces iniiciunt, pro cataplasinate adhibeto. Verum in mortario misceto ac tundito, crudam ordeaceam farinam, & cinerem sarmentitium, & lini semen tostum, & hæc oleo & aceto subigito, & velut cyceoné crassum facito, deinde coquito donec velut farinæ subactæ massa fiat, atque ita quàm calidissima imponito. & si opus fuerit, etiâ insidere facito. Si puerperæ inflammati fuerint vteri intumescunt. & ubi puerperij purgamenta intus manserint, occulte distenduntur. distenduntur autem ubi cōdensati fuerint à frigore. His si quidem perfrigerentur, calefacere conducit. Si vero inflammati fuerint, & frigus discesserit, medicamentum subdititium facere, quod inflammationi aduersatur. & simul lauare, ac fouere, & pharmaca adhibere, quæ ego describam, & vaporem in os ac nares attrahere. Si vero suffocet, lentes in aceto, & sale, & origano multo coquere, & attractionem facere. Et mercurialem edat, & in succo eius tenuem farinam sorbeat. & quàm celerime ac prius quàm dolor corripiat, pharmaca dato quæ vterorum dolores sedant. & cibos per aluum secedentes assumat. & si venter sit inflammatus, clystere adhibito quàm citissime subluatur. Si vteri pituita fuerint impleti, flatu in vteris fiant, & menses procedunt pauciores, albi, pituitosi. Quandoque etiam sanguis tenuis sincerus, pelliculis plenus. Quibusdam etiam conturbatur, & ter in mense comparet. & præ humiditate cum viro cōmisceri non vult, neque libidine ad hoc faciendum concitatur. & tenuis fit. Dolet autem imum ventrem, & lumbos & inguina. & si mordeat id quod effluit, & exulceret osculi vteri circumferentiam summam, fluxionem diuturnam fore pronunciat. Et si non multa fuerit fluxio, lenticulæ decoctum cum veratro exhibeto ad vomendum. Deinde in nares infundito. & pharmacum deorsum purgans bibendum dato. A cibis autem acribus prohibeatur. Si vero grauetur, & frigeat, & torpido habeat, lac præbeto, & vinum odoratum.

*Cum inflā
mantur.*

Medela.

*Cū puer-
peria le-
choeū in-
flāmantur
Medela.*

*Quī stran-
guinatio tol-
latur.*

*Cum uteri
pituita im-
plentur.*

*Profluvii
lōgi signa*

*Medela
ulcerū ut
rerum.*

A odoratum. Bibat autem ieiuna hypericum, apij semen, saluā, in vino odorato aquoso. & vteros medicamento ex vini fece colluat. & si vlcerati fuerint, interpositis diebus duobus aut tribus, pharmaco ex grano cnidio eluat, & postea cum acerbis lauet, myrti ac lauri decocto, & medicamento ex flore argenti illinat. Morbus autem est grauis & paucae effugiunt.

Si vero acetabula pituita plena fuerint, menses fiunt pauciores. & si in ventre habuerit, corrumpit vbi foetus fortior factus fuerit, Non enim corroboratur, sed defluit. Cognoueris autem hinc. Humida fit, & quod defluit mucosum & viscosum velut à ventre defertur, & non mordet, & in mensibus postquam sanguine purgari desierit, per duos aut tres

*Cum acetabula vlu-
uæ pituita
plena sunt*

B dies, muci ex vteris prodeunt. & horror tener, & calor non acutus, verum non deficit. Hanc succo grossorum colluito, à quibus omnis aqua purgatur, & hoc iterum atq; iterum. Postquam autem purgata fuerit, de cætero acerbis vtatur. Apponat autem mollia, à quibus pituita purgatur. & foueat vteros medicamento ex lauro, & colluat pharmaco ex aceto. & aromatis suffitum faciat, postquam menses cessarint. postea vero à cibis & balneis abstinere oportet, Coeat autem cum viro, & cibos ac vinum parce sumat, & calide degat, & tegumenta cruribus circūdet, & oleo illinat. Si aqua intercus in vteris nascatur, menses pauciores & prauī fiunt, & ante tempus deficiunt. & imus venter intumescit. & mammae solidæ, molles fiunt, & lac malum. Et putat se in ventre habere. &

Medela.

C ex his cognosces quod aqua intercus est. Sed & in vterorum osculo significationem de se præbet. Ad tactum enim gracile & humidum apparet. & rigor ac febris corripit. Quanto vero magis tempus processerit, tanto magis dolor habet imum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem, ac inguina. Hic morbus ex abortu fit. Sed & ex aliis causis, & quum menses fuerint occultati. Hanc multa calida lauare oportet, & tepefactoria adhibere si dolor habuerit. Postquam autem sedatus fuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet, & vteros medicamento ex bubulo stercore fouere. Deinde id quod ex cantharide paratur apponere, & biduum aut triduum intermittere. Et si robur affuerit, ne-
topo colluere. & si venter mollis fiat, & febres cessent, & menses secundum rationem prodeant cum viro dormiat, &

*Aqua in-
terc' uteri*

*Medela
huius quæ*

HIPPOCRATIS LIBER I.

in medicamentis subdititiis perseueret. & interposita die D
crethmi corticem bibat, & pæoniæ grana nigra quinque, &
sambuci fructum in vino ieiuna. Et mercurialem quàm plu-
rimam edat, & allium crudum ac coctum. & mollibus ad som-
num vtatur, & multa potione, & aliis mollibus. & obsoniis
marinis potius quàm carnibus. & si pepererit, sana euadit.

*Hydrops
uulue.*

Si hydrops in vteris fiat, menses pauciores fiunt ac dete-
riores, & per longius tempus, & pauciores quàm oportet,
aut paulo plures. & venter intumescit, & locus supra pecti-
nem, & tibiæ, & lumbi. Vbi vero multum temporis proces-
serit, & in ventre habuerit, corrumpit ac eiicit. & aqua cum
ipso fœtu effunditur. & mulier plerunque moritur. Sanguis

Medela.

autem corrumpitur, & aquosus redditur. Huic lac bibendum E
dato, & peplum album potandum, donec fœtus moueri po-
terit. Quin & ante hoc vtplurimum fœtus corrumpitur, &
per abortum eiicitur. & vteri sanguine & aqua manant. Hæc
autem patitur nihilo magis ex labore, quàm aliter. Cogno-
scere vero poteris quod hydrops est, ex digiti contactu. De-
prehendes enim osculum ipsorum gracile & plenum humi-
ditate. Si vero fœtus in ipsa non circa initia, sed iam bime-
stris corrumpitur ac suffocatur, tunc & venter imus intume-
scit, & ad contactum dolet, velut vlcere præsentem. & febris
magnâ ipsam ac dentium fremitus corripit, & dolor acutus
& vehemens pudenda, & inum ventrem, & lumbos, & la-
terum mollitudinem, & coxas. Quum sic habuerit, calida
ipsam lauato. & si dolor habuerit, tepefactoria adhibeto, ex F
perimento facto de eo quod maxime admittat. & pharma-
cum deorsum purgans bibendum dato. Intermissione vero
facta per tempus quantum tibi satis esse videbitur, & collui-
to, & foueto, & cyclaminum melle subactum, ac linteo ex-
ceptum, ad os vterorum apponito. Et cupressi ramenta in a-
qua madefacta, eodem modo apponito. Verum hæc breuiore
tempore, & per longius temporis intervallum, quanto ma-
gis mordent & lancinant. Et specillum stanneum paratum
immittito, & digitum eodem modo. Potiones quoque biben-
das dato, quasunque maxime libenter admiserit. & cum viro
dormiat, maxime opportuno tempore præsentem. Si enim ge-
niturâ conceperit, & prægnans facta fuerit, ac pepererit, sub-
purgantur, & ea quæ prius in ipsa fuerunt, vnâ cū ipsis puer-
perij purga-

- A** perij purgamentis subeuntia. Atque sic maxime sana fieri poterit. Si mulier aqua intercute laborarit, splene ipsius magno & aquoso existente. Fit autem splen aquosus ab hac affectione, quum febris habuerit, & nō dimiserit hominem, & sitis ipsum corripuerit fortis, & biberit, ac non reuomuerit. Nā quod in vesicam penetrat, per urinam euicitur. Reliquum vero splen caput, abstrahens à ventre ad seipsum, ut qui rarus est & spongiformis, & secundum ventrem situs. Et si his sic habentibus non exudarit, neque aliud laxetur, ab hoc splen attollitur, & hoc magis si aqua fuerit potus. & si quis ipsum contingat, mollis est velut mollissima pluma siue lana: quandoque vero etiam renititur. Eleuatus autem & impletus, distribuit per venas corpori, & maxime in omentum, & locos circa ventrem, & crura. Altera enim pars ad alteram delegat in corpore, ubi singulis plus quam oportet effuerit, & continere non poterint. Succedit autem ex hoc semper hydrops, ubi splen ad seipsum trahere consueuerit, quum natura rarus sit ac mollis. Quibusdam vero hoc morbi principium fit sine febre, si calor quidē in ventre constiterit, velut pituita in ipsum collapsa. & si homo sitim non continuerit, neque vesica, neque venter, urinam & stercus iusto modo excolarint: neque commoda diata homo utatur. Si vero hydropica fuerit, prodeunt menses multi derepente, quandoque vero pauci. Et sunt aliquando velut aqua à carnibus, sicut si quis cruentas carnes abluisset: aliquando vero paulo spissiores, & non cōgelantur. & anhelatio ipsam corripit priusquam menses prodeunt. & dolor in splene, & magis si quid dulce ederit. & venter attollitur ac magnus fit. Et ubi plura quam solita est ederit, dolet ventrem, & lumbos aliās atque aliās dolor vexat. & febris ipsam paulatim corripit. postquam autem depurgata fuerit, melius sibi habere videtur superiorum respectu. postea ad idem relabitur. & si curetur velut cōuenit, sana euadet. Sin minus, & fluxus comparet, & per omne tempus semper fluat paulatim velut serosa sanies, & ampliore curatione opus habet. Si vero fluxus non succedat, sed vteri à prioribus menses nō laxarint: tunc & venter ipsi magnus erit, & grauitas intus erit, velut in ventre habenti. & velut puer in ventre ipsius moueri videbitur, nimirum dum vteri aqua pleni sunt, & aqua mouetur. Aliās enim atque aliās fluctuat in ipsis aqua, velut in vtre. & pars

Causa hydropis in femina.

Lienis natura.

Hydropides mulier que patitur.

Signa huius mali.

HIPPOCRATIS LIBER I.

infra umbilicum ad contactum dolet. & clauiculæ, & thorax, D
 & facies, & oculi attenuantur. & mammæ attolluntur. Quibusdam vero & venter, & crura aqua implentur. Quibusdam autem alterum horum. & si quidā ambo impleta fuerint, nulla spes est de hominis vita. Si vero etiam alterum horum, modica spes est si curetur, & non valde fuerit attenuata. Diuturnus est autem hic morbus. Et fiunt omnia magis his quæ non pepererunt, fiunt autem sæpe etiam his qui pepererunt. Periculosa vero sunt velut dictum est, & plerumq; acuta & magna, & intellectu difficilia, eo quod mulieres participant morbis, & aliquando neque ipsæ sciunt quod ægrotant, priusquam morbos experiatur à mensibus, & seniores factæ fuerint. Tunc autem & necessitas, & tempus, ipsas morborum causam docet. E
 & quandoque non cognoscentibus ex quo morbo ægrotent, morbi incurabiles fiunt, antequam doceatur recte medicus ab ægrotante ex quo morbo ægrotet. Verentur enim narrare, etiam si sciant: & præ imperitia ac ignorantia, turpe sibi id esse putant. Sed & medici simul peccant non exacte causam morbi percunctantes, sed velut viriles morbos sanantes. & multas noui iam ab huiusmodi affectionibus corruptas. Quare statim causam exacte interrogare oportet. Multum enim differt muliebrium morborum ac virilium curatio. Si vteri fuerint ulcerati, sanguis & pus purgatur, & fœtor grauis oboritur: & dolor acutus corripit lumbos, & inguina, & in inum ventrem. & dolor sursum procedit ad laterum mollitudinem, & ad costas, & ad scapulas. Aliquando etiam ad clauiculas peruenit. & mordetur, & caput vehementer dolet, & delirat. Progressu vero temporis tota intumescit. & debilitas ipsam corripit, & animi deliquium, & febris tenuis, & perfrigeratio. Intumescunt autem maxime crura. Morbus autem corripit ex abortu, si qua corrupto ac putrefacto intus puero, non fuerit expurgata. & calor totum corpus tenet, Corripit etiam ex fluxibus, & si in ipsis acria fuerint, & biliosa mordeant. Si in hoc modo habentem incideris, vbi quidem dolores habuerint, multa calida lauato. & tepefactoria adhibito qua parte fuerit dolor. & si quidem superne fuerint dolores, & mulier fortis est, totam fomentato. & pharmacum deorsum purgans bibendum dato. & vbi tempus anni fuerit, serum coctum insuper bibendum

Languentis & medicis error.

Vterorū ulceratorū signa.

Morbi causæ.

Medela.

A bibendum præbeto, per dies quinque, si id facere poterit. Si vero non fuerit serum, lac asinum coquito, & per dies tres aut quatuor bibendum dato. Post lactis autem potum, cum aquis ipsam reficito, & cum cibis commodis, carnibus ouillis teneris recentibus, & volucrum: & beta, & cucurbita. Abstineat autem à falsis & acribus, & marinis omnibus. Et à carnibus porcinis, & bubulis, ac caprinis. Edat autem panes. Si vero animi deliquia teneant, & non valida sit, & perfrigeretur, forbitionem accipiat. Sunt autem quidam qui his caput dolentibus lac bibendum præbent, quia caput dolent. Alij aquam, quia animo linquantur. Ego vero vice versa, si caput dolent, & mente percellantur, aquam commodam puto. Quam autem mordentur, & acria sunt quæ pungunt, lac his lenitatem inducit. Vbi vero tibi valida esse videbitur, vteros colluito. primum medicamento ex vini fece. postea interpositis diebus tribus aut quatuor, eo quod cum brassicæ decocto tepido paratur. Et rursus intermissis diebus tribus eo quod cum butyro paratur eluito. Et si vbi hæc feceris sanescant vteri, eo quod cum malicorio paratur colluito. Super vlcera vero argenti florem, & gallam, & myrrham, & thus, & spinæ Aegyptiæ fructum, & cenanthen syluestrem, & chrysocollam, & squamam aris, & loti ramenta, & crocum, & alumen Aegyptium combustum illinito. Horum singulorum vna æqualis sit portio. Alumen vero & gallam, & crocum, vna omnium portione sumito. Hæc omnia trita ac permixta in vino albo dulci diluito, deinde coquito donec mellis crassitudo fiat, & dato vt cum hoc pharmaco bis in die vlcera inungat, vbi aqua tepida prius lauit. Coquantur autem in aqua, & hedera, & salvia. Et vbi tibi hæc facienti melius habere visa fuerit, lac caprinum coctum præbibendum vna die dato. Postea vero lac bubulum præbeto eodē modo velut in prioribus. post lactis autem potum, per cibos quam maxime crassefacito, & vt in ventre habeat facito. Sana enim fiet. Plerunque vero ex hoc morbo euadunt, & steriles fiunt. Senioribus autem non valde quid horum accidit. postea vero bibenda sunt pharmaca, lini semen torrefactum, & sesamum, & vrticæ semen, & pæoniæ radix amara, hæc in vino nigro odorato trita bibat. Si vteri ulcerati fuerint, & sanguis, & pus, & serosa faecies fluit: putrescentibus enim vteris, morbus ab ipsis fit, &

*Quæ res-
ciant.*

*Quid ca-
pitis dolo-
rem sedet.*

*Signa u-
terorū ul-
ceratorū.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

*Morbi
caussa.
Medela.*

venter imus eleuatur, & attenuatur, & ad contactum dolet, D
 velut vlcere presente, Et febris ac fremitus ipsam occupat.
 & dolor acutus ac vehemens inuadit pudenda, & pubem, &
 imum ventrem, & lateris mollitudinem, & lumbos. Mor-
 bus autem maxime corripit ex partu, si quid in ipsis diuul-
 sum computruerit. Itemque ex abortu, & alias sua sponte. In
 has si incideris, aqua multa calida lauato. & qua parte dolor
 habuerit, tepefactoria adhibeto & spongiam ex aqua calida
 expressam. & colluito acribus & acerbis vitatis, mollioribus
 vero ammixtis, prout tibi tempestiuum esse videbitur. & lini
 semen ac sambuci fructum tundito, & ammixto melle phar-
 macum facito, atque hoc vtitor. calida vero aqua lauato. Et
 acceptam spongiam, aut mollem lanam, in aqua calida tingi-
 to, & pudenda ac vlcera expurgato. Deinde in vino meraco, E
 rursus spongiam aut lanam tingens, eodem modo vttere. Et
 postea pharmaco hoc inunge, quoties tibi tempestiuum esse
 visum fuerit. Postea resina & adipe suillo mixtis simul illini-
 to sepe interdium ac noctu. postea vero lini semen torreto,
 tundito, ac cribrato: & peplum album in polenta tundito ac
 cribrato: & caseum caprinum assato, & sordes ac salu-
 ginem deradito, & pinguitudinem eius, & polentæ polli-
 nem ammisceto. Sit autem vna pharmaci mensura, & ca-
 sei, & polentæ. Hæc bibenda dato mane ieiunæ, in vino
 austero diluto. Ad vespæram autem misceto, & crassum cy-
 ceonem præbeto, & quicquid muliercula maxime libenter
 admiserit, bibendum dato. Et donec quidem sanguis multus F
 fluxerit, & dolores acuti habuerint, & modico tempore in-
 termiserint, hæc facito. Postquam autem vlcus minus fue-
 rit, & dolores debiles apprehenderint, & per longius tem-
 pus, pharmaca bibenda dato à quibus purgetur deorsum ma-
 gis quam sursum. & intermisso tempore quantum opportu-
 num esse visum fuerit, lenibus fomentis foueto, muliere in
 alto collocata, prout tempestiuum esse videbitur. Hæc si fe-
 cerit, sana euadet. Morbus autem est lenior & lethalis. & pau-
 cæ ipsum effugiunt. Si vero vehementer exulcerati fue-
 rint, sanguis & pus purgatur, & odor fit grauis. Et quum do-
 lor apprehenderit, velut à partus dolore fiunt ea quæ circa flu-
 xum contingere solent. Et quum tempus affuerit, crura & pe-
 des intumescunt. Et curant medici hunc morbum velut hy-
 dropem,

*Cum valde
ulcerati
fuerint
autem.*

- A** dropem, verum hic talis non est. Hanc si curandam acceperis, primum calida lauato, & calefacito. Et acribus ac molli-
bus & acerbis, & aqua & vino colluito. Et polycarpon, & poly-
cynemon, ac mel simul coquito, deinde lanam in his tingi-
to, & pudenda illinito. Et resinam, ac mel, & pinguedinem
suillam illinito. Et bibendum dato semen lini ac sesamum tor-
refactum, & butyrum, & caseum caprinum, & polentam in o-
mnibus. Bibat autem in vino ieiuna. Ad vesperam vero plu-
rimum mellis affundito. Et donec quidem sanguis purgetur,
& dolores acuti habuerint, & modico tempore intermiserint,
hoc facito. Quum autem ipsi minus prodierit, & dolores de-
biliores per longius tempus tenuerint, pharmacum deorsum
*Medicina post dolor-
res.*
- B** purgans bibendum dato, ac finito. Hæc si fecerit, sana eua-
det. Sobolis autem spes non adest. Quæcunque vlceratio-
nes in vteris fiunt, ex abortu, aut alia quadam causa, eas om-
nes respectu ad totum corpus factò curare oportet, quacun-
que curatione op^a habere visæ fuerint, siue ex vniuerso cor-
pore hominem curandam esse putaueris, siue ex ipsis vteris.
*Causa ul-
cerum.*
- Cognosces autem an ab ipsis vteris sint, hoc modo. Quæ e-
nim vlcerationes ab ipsis vteris sunt, purgationem exhibent
purulentam & compactam; quæ vero non ab ipsis, tenuem &
saniosam. Quum igitur tenues sunt fluxiones, cum pharma-
co eas curare oportet, & dare quod & sursum, & deorsum pur-
get. Primum autem sursum. Et si quidem post pharmaci po-
tionem, fluxiones pauciores fiunt ac faciliores, intermissio-
Cognitio.
- C** ne facta rursus eodem modo medicari oportet. Post pharma-
ci vero potionem, talem victum præscribito, ex quo homo ip-
sa quam siccissima fiat. Id autem continget, si toti ipsius cor-
pori, per tertiam aut quartam diem, fomentum adhibueris,
& à fomentis statim vomitus feceris. post vomitus autem &
fomenta, dietam constituito ex illuue, & aquæ potu, & pa-
nis cibo, nullo vero obsonio, quam vino nigro meraco. Nul-
lo item olere. Quum vero vomitum præparas, multis & a-
cribus oleribus opus habes, quibus ipsam impleas, multis et-
iam cibus, & obsonio quodcunque voluerit. Et vt impleas ip-
sam multo vino aquoso, & vt à fomentis ipsam laues multa
calida. Atque hæc quidem curatio est huiusmodi fluxionū.
*Nutricatio post potio-
nes.*
- Melius tamen est vt vtræque pharmacis cures, & vomitum
procures, & sursum trahas. Dieta vero siccatoria melior est,
*Qui vomitio prouo-
cetur.*
- & illu-

& illuuiēs. Cæterum vteros hoc modo curare oportet. pri-
Smegma. mum quidem fouere sambuci foliis in aqua coctis. Deinde
 post fomētum, smegmate ex vini fece colluere. Et si quidem
 putredo in vlceribus fuerit, & quæ exeunt graueolentia,
 smegmate meraciore. Si vero nihil tale, aquosiore. post fe-
 cem autem, cum aqua in qua cocta est myrtus & saluia. Po-
 stea vero cum vino colluere, meraco, albo, tepido. Quum au-
 tem mordetur iam à collutionibus, tunc iam pura sunt vlce-
 ra. colluere igitur oportet fece aquosiore, & vino nigro. post
 vinum vero, adipem suillum recentem liquato, & pingue-
 dinem anseris si affuerit, sin minus, aliam, maxime gallinace-
 am, aut ex volucrum gente. Si vero neque hæc adfit, oleum
 vetus ex oliuis ammisceto, atque hoc tepido colluito post vi-
 num, per alium clysterem in os vteri infuso. Et si fuerit vlce-
 ratum, linamēta ex mollitoriis facta apponito. Et si hæc sub-
 dita ardorem induxerint, his ademptis mulierem aqua tepi-
 da lauari iubeto, tali quali colluebatur. Si vero ad hanc diæ-
 tam fluxiones non discedant, pauciores tamen fiant, & ve-
 hementer mordeant, & ea quæ effluunt bilis fuerint ac salu-
Medela. go: & non solum internas partes, sed etiam externas exulce-
 rent, diætā transmutare oportet, & totam humectare, quo
 fluxiones quā aquosissimæ fiant, & minime mordaces, bal-
 neis multis calidis, maza, oleribus coctis omnibus pingui-
Cibus. bus piscibus earthilagineis, cum cepis & coriandro, in muria
 dulci coctis: coquantur autem pingui modo: carnibus coctis
 omnib⁹, excepta bubula & caprina: His enim percoctis cum
 anetho & fœniculo: vino mellei coloris, fuluo, aquoso, vbe-
 riore lactis potu cum vino dulci. Reliqua vero de collutio-
 nibus iuxta relatum modum facito. Atque hæc quidem est e-
 iusmodi fluxionum curatio. Quum vero purulenta & com-
 pacta exierint, harum quidem totum corpus non mouere o-
 portet. Verum colluere, & per collutiones totam curationem
 facere. Colluere autem oportet cum iisdem infusis, quæ pri-
 dicta sunt eodem modo. Conscribentur tamen etiam aliæ
 collutiones. Vlcera curatio. Ceruinum adipem recē-
 tem ac viridem subdito. Omnia vero statim vino sirao siue
 sapa colluere oportet. Optimum autem est cerussa, si vlcera
 fuerint, & oleo narcissino. Cibus autem mollissimis vtatur, &
 non acribus. Si vero sordida fuerint, & proserpant, ac proxi-
 mum lo-

A mum locum mordeant, purgato, & nouam carnem produci-
to, & carnem ad cicatricem perducito. facile enim resoluun-
tur, & maligna fiunt. & frequenter lauato. Si vero mulier
ex abortu vulnus accipiat, aut ex medicamentis subditiis
vteros exulceretur: Qualia multa semper mulieres faciunt
ac medicando excitant, & foetus corruptus fuerit, & mulier
non purgetur, sed vteri inflammati fuerint vehementer ac
conclusi, & purgationem emittere non poterint, nisi primū
emittant sanguinem qui est in foetu. hæc si quidem curetur,
breui sana euadet, verū sterilis. Si vero puerperij purgamen-
ta ipsi sua sponte eruperint, & vlcera sanata fuerint, etiam sic
sterilis erit. Si vero purgatio quidem ipsi fiat, vlcera autem
B nō purgentur, periculum est ea putredinosa esse. Si vero pur-
gatio prodierit ipsi iā afflictae ac extenuatae, moritur. *Quin*
& si in partu vteri valde fuerint exulcerati, foetu non secun-
dum naturam exeunte, eadem patientur quæ patitur ea quæ
ex corruptione foetus vteros vlceratos habet. Et transmuta-
tiones ac fines eosdē morbus habet, siue ex foetus corruptio-
ne, siue ex partu vteri fuerint vlcerati. & si puerperij pur-
gamenta omnia prodierint, minus dolebit, nisi magna vlce-
ra fuerint. Et si curetur breui sanescit. Oportet autem curam
cito adhibere, si vlcera in vtero fuerint. Nam vt quæ in tene-
ro loco sunt, cito augefcunt, & breui putrescunt. Curare vero
oportet vlcera, velut etiam ea quæ in reliquo corpore sunt,
Nimirum vt inflammationem arceas, & repurges, & repleas,
C & ad cicatricem perducas. Danda est autem aqua in potum,
vinum minime. cibos item paucos, ac minime multos exhi-
beto. Quicunque abortus facti discedere non possunt, dū
aut toti, aut partes foetuum sunt maiores, aut minores & ob-
liqui ac impotentes, tales siquidem secundum naturā siti fue-
rint, pharmaco aliquo dato ex his quæ ego referam expelli-
to, vbi multa calida prælaueris. Et si prodire volentes, non fa-
cile exeant, quum siti sint secundum naturam, talibus ster-
nutatoriū admoueto. Apprehendito autē nasum, & os cōpri-
mito, ac sic sternutet, quo sternutatio q̄ maxime efficax sit.
Utatur itē cōcussionibus. Sic autem cōcussionem facito. Le-
ctum altum robustum ac instratū sumito, & mulierem supinā
reclinato. pectus vero & axillas ac man⁹, fascia aut molli lato
igro ad lectū alligato ac cingito, & crura incuruato, & mal-
leolis

*Cum uteri
partu uel
abortu ul-
cerantur.*

Curatio.

HIPPOCRATIS LIBER I.

leolis apprehensam detineto. Quū autem sic disposueris, far-
 mentorū molliū fascem, aut aliquid huic simile parato, tantū
 quātus sufficit, vt lectū nō negligat excipiendo ipsum, dum
 in terrā proiicitur, quo nō pedibus iuxta caput, terrā contin-
 gat. Postea vero ipsam manib⁹ lectū apprehendere iubeto, &
 lectū ad caput sublimem habere, vt decliuis sit in pedes, ani-
 maduersione habita ne p̄nua sit homo ipsa. vbi vero hęc fa-
 cta fuerint, & lectus sublimis fuerit, retro farmēta supponito,
 maxime autē dirigito, quo pedes terrā non cōtingant dum
 lectus proiicitur, & vt sint intra farmenta. Eleuent autē duo
 viri ex vtroq; pede hinc atq; illinc, quo in directū lectus ca-
 dat, planē ac æqualiter, & cōuulsio ne fiat. Cōcutiendum est
 autē maxime vnā cū partus dolore. Et si quidē discedant, sta-
 tim quiescendū. Sin minus, interstitio facto rursus cōcutito,
 & in lecto gestatam attollito, ac agitato. Atq; hęc quidem sic
 facienda sunt, vbi recte & secundū naturā discedant. Opor-
 tet autem cerato liquido præillinare, quod in omnibus hu-
 iusmodi circa vterū affectionibus optimū est: & malux aquā
 affundere, & fœnigræci, aut potius ptisanæ triticeæ succum.
 Oportet autem vsq; ad inguina, sedem & pudendū fouere,
 & insidere, vbi partus dolores maxime infestant, & nihil ali-
 ud mēte versare. eā vero quę medicatur, oscula mollibus a-
 perire oportet, & leniter hoc facere. Umbilicū vero vnā cum
 fœtu attrahere. Quicumq; vero duplicati cōplicatur, & in
 osculo vterorū incumbunt, eos siue viui fuerint, siue mortui,
 rursus retro p̄trusos vertere oportet, quo secundū naturā in
 caput exeant. Quū autem retrudere voles aut vertere, supine
 ipsi reclinatæ molle quiddā sub coxas substernere oportet, &
 sub lecti pedes, quo altiores sint hi à pedib⁹, semper aliquid
 supponere. Sed & coxæ altiores capite sint, & vt nullū cerui-
 cal sub capite sit, p̄uideto. Quū vero retrusus fuerit fœtus,
 & hinc atq; illinc obuoluitur, vt secundū naturā constitua-
 tur, & quicquid sub lecti pedes supposuisti ac lapides, & quic-
 quid sub coxas subdidisti, subtrahito. Capiti vero puluinar
 subiicito. Atque talia hoc modo curato. Quicumque vero
 fœtus viui, manū aut crus foras præmittunt, aut etiā ambo:
 eas oportet q̄ celerrime vbi exitū significarint, prædicto mo-
 do intro retrudere: & in caput vertere, & ad viā reducere. Et
 quicumq; fœtus cōplicatur, ad lateris mollitudinē, aut coxā
 in partu

*Quū par-
 tus nō rite
 prodeunt,
 quid agē-
 dum.*

*Cū partus
 cuius ma-
 nū uel cr⁹
 emittit, &
 cū mortu⁹.
 qd agat.*

- A** in partu collapsi, eos dirigere ac vertere oportet, & in aquā calidā desidere facere, donec mulier refocilletur. Quicūq; vero fœtus mortui, aut crus, aut manū, foras p̄tendunt, eos optimū quidē fuerit, si id fieri posset, intro retrudere, & ambas has partes in caput vertere. Si vero hoc fieri nō poterit, verū intumescit, secare hoc modo. Dissectum per scalpellum caput, cum cōtusorio instrumento, vt ne in ramenta findatur cōtundito, & ossa per ossium volsellā, aut tractoriū instrumentum, iuxta caluiculā immissū, prout habuerint extrahito, non multis simul, sed paulatim exēptis, ac rursus ablatiis. Quū vero hęc foras extraxeris, & in ipsiis humeris fueris, ambas manus in articulis cum ipsiis humeris secato. Et vbi hęc extraxeris, si
- B** quidē fieri poterit vt exeant, etiā reliqua facile extrahito. Si vero nō obediunt, totū pectus vsq; ad iugulum findito, Verū caueto ne in ventrem seces, & aliquid de intestino denudes. Exit enī venter, & intestina, & sterces. Si vero horum quid excidat, maioris negotij iam res sit. Cōtūdito autē costas, & scapulas cōtrahito. Et facile postea reliquū fœtus p̄cedet, nisi iam ventrē tumidum habuerit. Si enim tale quid fuerit, melius est ventrē fœtus leniter perforare. Flatus enī solū à vêtre exit, & sic facile p̄dibit. Si vero exciderit man⁹, aut crus, immortui fœtus, si quidē fieri poterit, ambas partes retrudito. & fœtū rite dirigit. Hoc enī optimū fuerit. Si vero fieri nō poterit vt hoc facias, quicquid sanē foris fuerit quantum potes penitissime resecat. & reliquū p̄funditate intus explorata
- C** protrudito, & fœtum in caput vertito. Quū autem vertere ac secare puerū voles, vngues de manibus tuis resecat. Scalpellum vero quo dissecas, incuruū potius sit q̄ rectum, & hui⁹ caput occultato per indicē digitum, eodēq; interna explorato ac deducito, ita vt caueas ne vterū cōtingas. Cæterū molē cōceptus hęc caussa est. Quū multi mēses, modicū & morbosum semen cōceperint, neq; cōceptus rectus sit, & vêtre plenus est velut pregnātis. Nihil autē in vêtre mouetur, neq; lac in mammis generatur. Māme autem turgidæ sunt. Hęc igitur ad duos annos, sepe etiā tres, sic habet. & si quidem vna caro fiat, mulier perit. Neq; enim fieri potest vt superstes maneat. Si vero plures, erūpit ipsi per pudendū sanguis carnosus plurimus. & si hoc moderate fiat, seruetur. Sin min⁹, à fluxu correpta perit. & morbus quidē talis est. Iudicare vero oportet
ex pleni-

HIPPOCRATIS LIBER I.

**Partus quo-
tus in utero
re moueat** ex plenitudinis mole, & q̄ in ventre nō mouetur. Nā mas tri
mestris, fœmina quadrimestris motum habet. Postquā igitur
tēpore hoc prætergresso nō mouetur, nimirum hic morbus est.
est autē hoc magnū signum, q̄ lac in māmīs nō generat. Hāc
igitur maxime quidē ne curato. Aut certe cum prædictione.
**Curatio.
mole.** Et primum quidē totum corpus foueto. Deinde per sedē cly
sterem adhibeto, quo sanguis multus erūpat. Fortassis enim
quod cōpactum est commoueris, id quod fœtus esse putatur,
muliere à pharmaco concalefacta. Sed & vteros colluito, quo
sanguinem educas. Sin minus, subdititiis vtatur fortissimis ē
buprestis. Et dictamnū creticū in vino bibat, sin minus, ca-
storis testem. Et retrō cucurbitam ipsi ad laterum mollitudi-
nem affigito, & plurimū sanguinē detrahitō. Atq; hoc maxi-
me rerū ac viriū ipsarū cōiectura facta facito. Et hætenus
quidē dictū est de morbis à puerperij purgamentis fiētibus.
Sunt autē pericula in ipsis nō parua, Acuti enim sunt, & cito
trāsmutātur. & magis affliguntur primiparæ, q̄ quę sunt par-
tuum expertę. Prodeunt autē puerperij purgamenta sanæ mu-
lieri sufficiēter, primū sesquiheminæ mēsurā, aut paulo plura.
**Puerpe-
rie purga-
tiōis men-
sura, &
color.** postea adhuc pauciora iuxta hāc rationē, donec cessent. Pro-
deunt autē velut sanguis à victima, si sana velut dixi, mulier
fuerit, & sana futura est, & cito cōgelant ac purgātur. & post
partū plerunq; sanæ mulieri cōtingit vt post puellæ partum,
in quadraginta duobus diebus diuturnissima purgatio fiat.
extra periculū autem est etiā si viginti quinq; diebus purget.
post masculi vero partum, purgatio diuturnior fit in triginta
diebus. extra periculū est etiā quę in viginti diebus cōtingit.
& in his quę fœtus corruerunt secundū horum dierū ratio-
nem purgatio cōtingit. & in iunioribus quę corruerunt pau-
cioribus diebus. In senioribus autē, pluribus. Eadē vero sunt
affectiones ex puerperij purgamentis, & ei quę corripit fœ-
tum, & ei quę peperit, si mēstruū corruerit fœtū. & quę cor-
ruperunt magis piclitātur. Corruptiones enī grauiores sunt
q̄ partus, Nō enim fieri potest vt citra violentiā fœtus corrū-
patur, aut pharmaco, aut potu, aut cibo, aut subdititiis medi-
camentis, aut aliqua alia re. Violentiā vero malū est. In huius-
modi enim periculū est ne vteri exulcerentur, aut inflāmen-
tur. Hoc autē est periculosum. At vero lac quō fiat, dictū est
**Lactis pro
creatio.** à me in natura pueri in partu. Postq̄ autem prægnans fuerit
mulier,

- A** mulier, menses nõ valde p̄deunt, præterq̄ quibũdã pauci. Dulcissimus enim humor ex cibis ac potib⁹ ad m̄mas vertitur ac exsugitur. Et necesse est etiã reliquũ corpus magis euacuari, *Cur quædã lac nõ habeãt aut ab eo deserantur.* & minus sanguine plenum fieri. Atq; hoc ita contingit. Sunt autem quę natura sine lacte sunt, & quib⁹ lac deficit ante tēpus. Hæc vero natura solidæ sunt, & densæ carnis. & p̄pterea sufficiens humor nõ penetrat à ventre in m̄mas, quũ via sit densa. Ad menses detrahendos. Elaterij potiões duas sumito, & adipem ouillũ de rhenib⁹, parĩ elaterij portione ammisceto, & nõ conterito, verũ duas glãdulas subdititias facito. Aut melãthium ex tritico terito, & aqua subigito, & duas glãdulas formato, atq; has ante dies quib⁹ affuturi sunt apponito. Si enim nõ prodeunt, rigores ac febres inducunt. *Mensium prouocatio.*
- B** litoria, à quibus aqua & arena purgatur, ducunt etiã m̄ses, si nõ fuerint diuturni, & osculũ emolliunt. Narcissum, myrrham, cuminũ, thus, absinthium, cyperũ, singula æqualib⁹ portionibus sumito, narcissi vero solũ quatuor portiones: & puluillum stupe dum pectinatur crudũ linum ammisceto, & hæc cum aqua origani cocti terito, ac glandẽ formato & subdito. *Diversa de hæc re medicamēta.*
- Aut cyclaminũ magnitudine tali, & aris florem magnitudine fabę terito, & cum melle glãdem formato, ac apponito. Aut pulegium, myrrham, thus, fel suis ac bouis, cũ melle subigito, & glãdem efformato. Si menses nõ prodeant, adipem anseris, & netopũ, ac resinã permixta ac lana excepta apponito. Medicamentũ subdititium, purgatoriũ, mollitorium,
- C** Caricã percoctam ac expressam leuissime terito, & in lana subdito cũ rosaceo vnguento. Aut acris brassicæ & rutæ, vtriუსq; dimidiũ terito, ac vtitor eodẽ modo. Purgatoriũ. Medullam anseris aut cerui magnitudine fabæ affuso vnguento rosaceo & lacte muliebri terito, velut pharmacũ teri solet, & cum hoc os vteri illinito. Aliud subdititiũ molle. Medullam anseris magnitudine nucis, cerã magnitudine fabæ, resinã lentiscinẽ aut terebinthinẽ magnitudinẽ fabæ. Hæc cum rosaceo vnguento ad lentũ ignem liquefacito, & velut ceratum efficito. deinde ex hoc tepido os vteri illinito, & pectinem irrigato. Aliud purgatoriũ. Farinã recentẽ, myrrhæ obol. iij. croci tantundem, castorij obolum, hæc trita cum vnguento irino apponat. Aut vrticæ semen, & malux succum, ac anseris adipem simul permixta subdat. Aliud subdititiũ purgatoriũ

HIPPOCRATIS LIBER I.

purgatorium, si menses non cōpareant. Styracem & origanū D
terito, & pmixtis adipem anserinum affundito ac apponito.

Aliud quod vteros expurgat, ac sanguinē euacuat. Absin-
thij radicem tritā, melle ac adipe anserino amixtis apponi-
to. Aliud purgatoriu. De buprestis caput & pedes & alas
tollito, & reliquū ipsi⁹ terito, ac ficus internā partē ammisce-
to. Sit autē pinguitudinis ficus portio dupla. Hoc vteros in-
flat. Hoc etiā desperatis optimū est. Aut mercurialis folia tri-
ta subdito. Hoc tenuē biliosā purgationē ducit. Sed & artemi-
sia facit velut mercurialis, & melius purgat. Veratrum
quoq; nigrū cum aqua tritū, velut aquā à carnib⁹ ducit. Sed
& alumen ac resinā idē facit cyperū, absinthiū, aristolochiā,
cuminū, salem, mel. Hec oīa simul terito ac apponito. Et ve- E
ratrum cū vino dulci, & farina lolij ac tritici, melle subacta in
lana subdatur. Subdititia si catapotia nō purgarint. Mer-
curialem, myrrhā, violam albam, cepam acerrimam, & melā-
thium ac mentā, si sufferat, permixta apponito. Subdititia
acria sanguinē ducentia. Cātharidas quinq; demptis pedi-
bus ac capitib. & myrrhā ac thus simul misceto, & mel addi-
to. Deinde in oleū rosaceum aut Aegyptium tinctū per diē
subdat, & vbi mordet, tollat. & rursum in lac muliebri ac vn-
guentū Aegyptium tingat, & hoc per noctē apponat. & aqua
odorata perluat, & adipē subdat. Cōduxerit & buprestis, si
quidem parua fuerit, sine alis & pedib. ac capite. Si vero ma-
gna fuerit, non cōmisceto eadē quē cantharidibus, sed solā su-
mito ac similiter apponito. Si vero molliore opus habuerit, F
ad buprestim vinum & cuminū Aethiopicum ammisceto, v-
uam itē passam & pollinē fefelis ac anisi. & vinū feruefacito,
eoq; affuso reliqua terito, & pastillos drachmales efformato,
eosq; apponito myrrha ac thure ammixtis. facito autem eo-
dem modo velut cū cantharidib⁹. Aut melanthium ex tri-
tico, tritum ac melle subactū apponito. Aut hoc ipsum melā-
thium cum melle tritū velut glādem efficito, circum pennā
autem obducito. Subdititiū efficax. Succum mādragoræ
& cucurbitę sylvestris, cū lacte muliebri apponito. Aut fecē
siccā ex vinoveteri albo vrito, & vino extinguito ac subdito.

Cucurbitā item sylvestrē, mercurialem, nitrum & irionem.

Citius detrahit & mādragoræ radix, cātharis, serpyllū, lau-
ri fructus, vnguentum irinum, laurinum. Tithymali succum
permisceto

- A** permisceto ac agitato, & detracto visco, erui magnitudine exhibeto. Optimū est & glādē subdititiā ex eo facere. Si vero amplius p̄dierit, vino proluatur. Aut æs vstū dissoluito, & tepidum lana excipito ac apponito. Medicamētum ad cōceptū. Cedrix acetabulū, adipis bubuli drach. iij. simul terito, & talorū figuras efformato, quas ieiuna apponat, & dum appositas habet per diem ieiunet. Apponat autē bis, mane & vesp̄ri, post mēses post cōnā vero lauet, & cū viro dormiat. Aut melāthiū cōtūdito, & in linteū illigato, & adipe anserino addito, subdendū dato. Aliud ad cōceptū. Quo cures mulierem vt in ventre cōcipiat, vrinā sumito veterem, & ferri recremētum tātum, vt in fragmenta resoluerē possis. postea mulierē in sella collocato, & corpore & capite velato, peluīq; ad pedes supposita, ignita recrementi ferri fragmenta tria pro vna vice iniicito. Sit autē vetus hęc vrina cōgij mensura. & cum his triginta fomētis ipsam foueto. Dum autē fomentū adhibes, caput lauato, ita vt donec fota fuerit rursus lapides illos recremēti ferri in vrina extinguas, & fomentum rursus calefacias. Postea vero caput lauato plurimū, polio & viticis foliis q̄ plurimis in aqua coctis. Hęc autem facito ad dies septē. Ter vero per singula hęc fomenta suffito, antequā laues. A balneo vero oleo laurino inungatur. post cōnā autem, vbi cepas melle tinctas comedit, & aquā mulsam tepidā quatuor heminarū mensura bibit, & paululum cōtinuit, vomat. & supina reclinata, rutā habeat auribus & narib⁹ inditā.
- C** Et panem fermentatū sexta chœnicis parte, in iusculum volucris cōfringat, habeat autem hoc iusculum apij chemam, & sic assumat. & rursus tantūdem in cōnā dato. Et hoc per dies septem facito. postea vero ventri per dies septem clysterem adhibeto, Sit autem infusum clysteris, resinæ drachmæ quatuor, mellis acetabulū, olei platænsium tātundem, fursurum recentium succus, spuma nitri, oua tenuia. Sit autē infusum hemina octo, & ex his tres succi ptisanæ. Obliquæ vero clysterem adhibeto, & parū lauato. Apponat etiā glādes septem indie, & detineat donec fuerint liquefactę. Sint autē ex thure, nitro, galbano, melle cocto. Cibo vero eodem vtatur. Suffito autem asini albi pilos, & lupi sterus. De his plurimū prunis iniice, ipsamq; circumlocatā ac contactā suffito, cauendo ne cōburas. Si vero mulier parere nequeat quę prius peperit,

HIPPOCRATIS LIBER I.

rit, nitrum & resinā, & myrrhā, & cuminum Aethiopicum, & D
vnguentū simul terat, & apponat. Aut pulegium siccū in lin-
teo subdat. Bibat autē pulegium vbi dormire volet. Aliud
ad cōceptum. Viſtus rationem mulieri cōſtituere oportet,
Quī cōce-
ptus pare-
tur.
quæ pręgnans fieri cupit, & ad edendum ac bibendum exhi-
bere ipſi, quæ libenter admittit. Viro autem mulieris reliqua
dato, præter allium, & cepā, & legumina freſa cocta, & ſilphij
ſuccum, & quę inflant. Ab his fanè abſtineat. Medicamen-
tum quod ſimiliter infunditur ſi nō concipiat. Lac mulieris
maſculū alentis, grana mali punici recentis terito ac ſuccum
exprimito, & teſtudinis marinæ partē inter anum & puden-
dum cōburito ac terito. & hæc in pudēdum muliebri infun-
dito. Aliud quod ſimiliter infunditur nō cōcipienti. Lac & E
resinam, & mali punici dulcis ſuccum, Hęc omnia melle am-
mixto infundito. Aliud ad cōceptum. Bulbi albi ſemen,
aut ſorem, cum melle terito, & lanæ inuolutū per triduū ad
vterum apponat. Quarta vero die, maluā ſylueſtrem lotifoliā
terat, lacte muliebri ammixto, & lanæ inuolutā apponat. de-
inde cum viro dormiat. præforbeat autē pulegium in farina
coctum, & bibat pulegium tenue in vino. Si vero huic nō o-
bediat, conyzā odoratā cōtundat, & expreſſum ſuccum vino
mixtum ieiuna bibat. Aliud. Aſparagi ſemen ſimiliter in
vino bibat. Aliud. Secundā mulieris, & vermium carniū
capita, & alumen Aegyptium, cum adipe anſerino diluito, &
in lana ad os vteri apponat. Aliud. Aeruginē, ſorem æris,
vtrunq; oboli dimidij pondere, thuris maſculi, aluminis ſciſſi,
F
fructus vitis ſylueſtris, gallæ, myrrhæ, malicorij, resinæ, po-
lij, ſingulorum obolum in melle tritum, per triduū bis in die
apponat. Si vero fortaffis acrius fuerit, anſeris adipem ac ni-
trum toſtum ammiſceto. Vinum autē exhibeto, fortitudinem
in ipſo vitans. Aliud ad cōceptum. Vermem carniū qui
caudā habet accipito, & de ipſo tres aut quatuor partes ſu-
mito. & organum tenuem ſimul cum roſaceo vnguento te-
rito. & hoc ad vteri os apponat. Aliud. Portulacā cum a-
dipe anſerino, & myrrhæ, & porri ſemine, & felle bubulo te-
rito, & lanæ inuoluta ad os vteri apponito. Si menſes qui-
dem ſiant multi, nō concipit autem, ſoris æris obolos duos,
& aluminis ſciſſi tātundem, cum melle terito, & lana excipi-
to. Illiget aut mulier lanā in linteum cum filo, & ſibi ipſi ſub-
dat, ita

Cōceptus
reparatio

A dat, ita vt filum extra promineat. Deinde quum probe purgata fuerit extrahat, & vino odorato myrti folijs iniectis uerfacto proluat, & virum accedat. Subdititium ad cōceptū.

Mel, myrrhā, myricæ fructum, resinam liquidā, adipem anserinum, omnia simul trita lanæ inuoluta apponat. Aliud, quod vterum valde aperire potest, quum cōclusus est, & cōcipere nō potest, & ad aquam expurgandam. Accipe anchusam paruum, & lentiscum, & cuminum, & cyperum, & cucurbitam syluestrem, & nitrum rubrum, & sal Aegyptium, & anchusam magnam. Hęc omnia trita per lintheum rarum excernito, & acceptū mel ad lentum ignē coquito. Postq̃ vero effert buit, ceram ac resinam ammisceto. Deinde etiam aliis omni-

B bus ammixtis oleum affundito, ac ab igne tollito. & tepida lanæ cōuoluta inuoluta vtero apponito, donec purgata fuerit. Aliud. Si mulierem cōcipere velis, ad purgatoria quibus vititur, etiā virū accedere oportet. Et baccas lauri nigras decem, thuris pugillos tres, & cumini modicum, cum melle trita in sanam succidam inuoluat, & semel in die subdat, & semel auferat, ad quatuor dies, & iisdem diebus à cibo abstineat. Cōceptum impediens. Si vero cōcipere non oporteat, misyos magnitudinē fabæ aqua diluito, ac bibēdam dato, & per annum vt ita dicam, nō concipiet. Partum accelerans ægre parienti. Lauri radicē deraſam, aut lauri baccas dimidij acetabuli mensura in aqua calefacta bibēdas dato. Aliud partum accelerans. Diſtamni obolos duos tritos

*Cōceptum
impediens
tia.
Partū ac-
celerātia.*

C in aqua calida bibat. Aut abrotoni drachmam, & lauri baccas, & anisum, in vini dulcis veteris cyatho terito, & aquæ cyatho affuso bibendum dato. Hoc bonum est si ante partus dolores fuerit datum. Aut diſtamni obolum, myrrhæ obolū, anisi obolos duos, nitri obolum. Hęc cum vini dulcis cyatho vno terito, & aquæ calidæ cyathis duob⁹ affusis bibenda dato. Deinde calida lauato. Aliud partum accelerans. Resinam terebinthinam, mel, oleum duplum horum, vinum odoratum q̃ suauissimum. Hęc mixta tepefacta sape ebibēda dato. Oportet aut, & vteros sedare, si fuerint inflāmati. Aliud.

Cucumeris syluestris quicumq; albus fuerit semē ceræ infarcito, deinde lanæ rubræ inuolutum lumbis alligato. Si vero pręgnans multo tēpore cohibeatur, & parere nō possit, sed diebus pluribus ex partus doloribus laboret: Sit autem

HIPPOCRATIS LIBER I.

Que puerperia purgent.

iuuenis, in vigore, & multo sanguine referta, secare oportet **D** venas in malleolis, & sanguinē detrahēre, virium respectu habito. & postea calida lauri corticib⁹ incoctis lauato. Viticis autē semen, & distamnū creticam, vtrunq; pari portione, in vino albo aut aqua bibendū dato. Subdititium autem medicamētum facito, galbano, & baecis lauri, & oleo rosaceo, in lana inuolutis ac subdatis. Aliud. Filicis quercinæ radicē tritam in vino bibendā dato. & adiantum tritum in oleo dilutum illinendū, & in vino meraco bibendū dato. Aliud, quod puerperæ puerperij purgamenta melius purgat. Testudinis marinæ hepar viride adhuc viuentis, in lacte muliebri terito, & cū vnguēto irinō ac vino subigito, & apponito. Aut mercurialem tritam in lana apponito. Aut artemisiā tritam similiter in lana subdito. Aut mercurialis & cucumeris syluestris parum terito, & vino ac melle subactum apponito.

Purgatoriū puerperij purgamētorum ex partu. Triticum trimestre fractū ac fresum, dimidię choenicis mēsurā, in aquę heminis quatuor coquito. Quū autē efferbuerit ter aut quater, sorbendū dato. Aliud. Sambuci folia in aqua coquito, & aquā bibendā dato. Edat autē & brassicas coctas, & porrum, & fœniculum, & anethū, & polypōs, & locustas pisciculos. Aut rhois folia & erysimū ex vino, aut polentæ pollinem bibendū dato. Aut misy duorū obolorum pōdere tritū ac vino subactum apponito. Purgatoriū mensum & puerperij purgamentorū. Ducit etiā aquam & alia. Radicis struthij rufi triti quantū tribus digitis apprehendi potest, melle subactū apponito. Nascitur autē in Andro in littoribus. Aliud similiter purgans. Erysimū in aqua coquito, & vbi ebullit oleum affundito, ac bibendū dato. Cōmodum est etiā succū pro fomento adhibere per suffitum. & cibis mollibus vti.

Aliud quod puerperij purgamēta purgat. Erysimum placide terito, & corticem diffiato. Quum autē purum feceris, leuiter terito, & aquā a distillato, salemq; ac oleum ammisce-to. & vbi polentam insperferis coquito, ac sorbendum dato.

Aliud. Si nō descenderit purgatio, aut puerperij purgamenta nō prodierint. Cucumeris syluestris internā partem, trium obolorū pondere sume, & artemisiā herbam, & thus oboli pondere, & hęc trita, & melle ammixto, lanæ inuoluta, aduteri os appone. Et hoc semper noctu ac interdium per dies quinq;

A quinq; facito. Aut v' tis pampinos aut folia viridia terito, & melle ammixto lana excipito. & eodē modo subdito. Aut cupressi fructū & thus simul trita, rosaceoq; ac melle diluta, & lana excepta apponat. Aut abrotoni drachmā, & cucumeris syluestris medullæ obolum, & thus cum melle terito, & in lana inuoluta apponito. Aut elaterij obolū, & myrrham, cum melle terito, & lana excepta apponat. Aut cupressi fructum, & cucumeris syluestris internam partem, & thus, melle ammixto, in lana subdat. Purgatoriū si ex partu nō purgetur. *Puerperæ purgatio diuersa.* Trifolium in vino bibendū dato. Idem etiā appositum menses erumpere facit, & fœtum eiicit. Purgatoriū vterorum, quum puero mortuo sanguis in hoc māsērit. Cucurbitam syluestrem tritā cum melle delingat, aut apponat. *Secundā quæ educant.* Ad omnia puerperij purgamenta si nō probe prodeant, Erysimū coquito cū polenta, & oleo affuso vbi coctum fuerit torbeat. & cibis molliissimis vtatur. Aut scāmoniam cum lacte muliebri tritam, ac lana exceptā apponito. Aut radicem dulcem melle, & rosaceo aut Aegyptio vnguento subactam, in lana subdat. Aut farinam lotā similiter apponat. Bibat autē crethmi, & seselis, & rutæ, & sulphij semen, ita vt de singulis obolos duos simul teras, & in vino meraco, si non febricitarit, præbeas. Subdititium quod secūdā relictam eiicit. Ex sambuci foliorum decocto prius fomentum adhibeto, & id quod ex cātharide fit apponito. Hoc & ea quæ debilia sunt sanat. Si vero lācineæ ac mordeat statim tollito, & lanam rosaceo tinctam subdat. Potiones quæ secundā educere possunt, & menses detrahē, itemque fœtum enectum.

C Cantharidas quinque, alis & cruribus ac capite auulsis, & tribulum ad mare natum cum radice ac foliis tritum conchæ mensura, & euanthemi, ac seminis apij tantundem, & sepiæ oua quindecim, in vino dulci temperato bibenda dato. Et vbi dolor habuerit in aqua calida desideat, & aquam mulsam aquosam bibat, & vinum dulce. Alia. Ranunculi foliorum ac floris triti, stateris Aeginæi pondus, in vino dulci bibat. Si vero dolor habuerit, cicer album & vnaß passas, in aqua coquito, perfrigerato, ac bibendum dato. & vbi vrinæ stillicidium vexarit, in aqua tepida desideat. Aliud quod eiicit secūdā. Cucumeris syluestris succū in mazam cōpersum apponat, vbi prius ad biduum ieiunarit. Hoc nullū aliud

HIPPOCRATIS LIBER I.

Fœcūditas præstātius inueneris. Fœcūditatis experimentū. Caput al
lis expe- liij integrū deraſum appone, & vide an per os oleat. Aliud
rientia. experimentū. Netopon modicū lana inuolutū apponito, ac
videto an per os oleat. Alia ſubdititia. Scorpij marini fel,
lana exceptū & in vmbra ſiccātū appone. Aut pulegiū ſic-
catū & tritū ac melle ſubaſtū, in lana apponito. Aut florē
æris cū melle linteolo illigatū ſubdito. Aut cucumeris ſylue-
ſtris ſemē, & teſtā cōbuſtam, cū vino ſubigito, & leporinis pi-
lis ac lana excepta ſubdito. Aliud ſubdititiū. Alumē Ae-
gyptiū lana inuolutū apponito. Aut cātharidas tritas vinoq;
ſubaſtas ſubdito. Aut artemiſiam herbam vino ſubaſtam ap-
ponito. Aut melanthium cū vino tritū in lana ſubdito. Aut
bulbion ex tritico tritū & vino ſubaſtū apponito. Aut vini
veteris albi fecē cōburito, & vino albo extinguito, teritoq;
ac in linteo apponito. Aut galbanū, & netopon, & miſy cū ro
ſaceo vngtū in linteo ſubdito. Aliud. Elaterij portiones
duas, & fauū cū vino in linteo apponito. Aut butyrū & alu-
men melle ſubaſta ſimiliter. Aut ſcāmoniē ſuccū & adipem
cū maza miſceto, & vino imbuta in linteo apponito. Po-
tiones quę poſſunt ſecundā in vtero derentā educere. Colo-
cynthidis ſylaeſtris internā partē cū lacte muliebris tritā, in
linteo apponat. Ad idē. Silphiū magnitudine ſabæ in vi-
no bibedū dato. Aliud qđ fœtū expellit. Mulierē ſub alis
apprehēſam fortiter cōcutito. In potu vero dato, viticis folia
in vino. Aut diſtānū creticū oboli pōdere in aqua terito ac
exhibeto. Aut conyze graueolētis man⁹ plenē mēſurā cū por-
ri ſucco diluſto, & netopū chemæ plenæ mēſurā addito, atq;
hec trita in vino bibēda dato. Aut tēdā pinguiffimā cū vino
dulci coquito, triū cyathorū mēſura vini affuſa, & galbani o-
bolos tres, & myrrhā adiicito, & vbi cocta craſſa facta fuerint,
tepida bibēda dato. Aut porri ſuccū, & myrrhā, & vinū dul-
ce ſimul exhibeto. Aut portulacę ſemē terito, & in vino albo
veteri dato. Aut populi nigre creticę grana nouē ī vino trita
bibat. Aut ranūculi herbę foliorū ac floris triti, drachmæ Ae-
gingę pōdus, ī vino dulci bibat. Si vero adhuc ſecūda int⁹ de-
tineat, Senectæ anguiū obolū ī vino terito, ac bibedū dato.
Aut apij radicē, & myrti baccas coquat, & p dies quatuor bi-
bat. Aut cuminū Aethiopicū, & caſtorij obolū, & cātharidis
parū hec ī vino bibēda dato. Aut fœniculi radicē, in vino &
olco

**Que fœtū
expellat.**

- A** oleo ac melle feruefactā bibat. Si secūda nō p̄dierit, conyzā tritā in lana subdito. Meli⁹ autē est vt bibat. Aut conyzā quātū manus capit, & porri succū, & netopum chemē mēfura mifceat, & hęc in vino bibat. Aliud quod secundā eiicit. Holoconitidis dulcis radicem, est aut velut bulbus, & parua velut oliua: Hanc in vino terito, ac bibendā dato. Et si quidam parua fuerit duas dato. Si vero maior, vna sufficit. Ammifeto autem ex seminibus cuminū Aethiopicum, & feseli massiliense. Aut silphij libyci semen siccū chœnicis dimidiā mensura, in vini heminis tribus coquat, & ad dimidias redigat, & de hoc bibat. Aliud. Viticis semē, & feselis, pari portione simul cū myrrha terito, & cum aqua bibēda dato. Alia secundas expellentia. Viticis albæ recentis acetabulū, in vino albo odorato tritum bibendum dato. Aliud. Castorij aut sagapeni obolum, bituminis drach. i. nitri drach. ij. Hęc omnia terito, & in vino dulci, ac olei hemina dimidia obolos duos ieiunā bibendos dato. Et calida probe lauato. Aliud similiter habens. Herinaceos marinos tres totos tenuiter tritos, in vino odorato bibendos dato. Aliud. Mentæ fasciculum parū, & rutæ & coriandri, & cedri aut cupressi semē, in vino odorato bibendū dato. Et de herinaceis si habuerit, plurimum forbeat, postea vero similiter calida lauato. Aliud. Anisum, cedri baccas, semen apij, cuminū Aethiopicum, feseli, singulorū dimidium acetabulū, tenuiter tritum, ex vino albo bibendū dato. Aliud. Dictamni fasciculū, & dauci seminis drach. ij. & melanthij tātundem, tenuiter terito & in vino albo bibenda exhibeto. Et multa calida lauato. Dato aut iuxta corporis robur. Aliud. Galbanū oliuę magnitudine, in oleo cedrino tritum apponat. hoc corrūpere & eiicere morantes secundas potest. Aliud secundarum expulforium quod vteris infunditur. Quum secunda à frigore mortificata cōputruerit, vbi vētus frigidus fuerit, crocū leuiter tritum drachmæ pōdere, cum adipe anserino infundito, & ad plurimū tēpus finito. Potus ad idem probe cōferens. Conyzā suauē olentē, & mel, & resinam terito, inq; vino odorato, aut in syrma potione moderatē purgante bibēda dato. & calida lauato. Alius similis potus ad puerū & mala intus existentia. Aeruginē tritā cum melle, & syrma potione, bibendā dato. Aliud subdititium, ad eiiciendū fœtum immortuū. Aeris ramenta in molle lin-

HIPPOCRATIS LIBER I.

teum indita, ad os vteri apponito, & profueris. Aliud. Testam recentē, & adipē anserinū terat ac apponat. Aliud. Nitrum cum resinā coctū, & in glandē efformatū, gallinaceo adipe tinctum appone. Aliud. Charien appellatur herba, huius radicē nō multo adeo tempore ad vmbilicum apponito. Aliud. Cucurbitā syluestre, & muriū stercus, leuiter trita apponito. Aliud quod alligatur. Resinā & adipē gallinacē, trita ac simul mixta, super vmbilicū ac ventrē deliget. Aliud. subditium. Hederæ albæ semen, & cedri ramenta terat, & glandes hinc factas subdat. Aliud. Testudinis marinæ cerebrum, & crocū Aegyptiū, & salē Aegyptium terito, misceto glādes formato, ac subdito. Suffimentū expulsoriū quod & sanguinē ventris expellere potest. Salicis folia in ignē posita suffito, & mulierē circumlocatā finito donec fumus in vterū intrauerit. Abortus sanatio. Quum mulier abortū fecerit, & puer nō fuerit egressus, siue putrefactus fuerit, & intumuerit, aut aliud quid eiusmodi passus fuerit. Porri & apij succum per linteū expressum, de vtrisq; colligito, & olei rosacei heminam, & adipis anserini quadrantē adiicito, resināq; obolos tres in oleo liquefacito, & vbi mulierē ad pedes altiorē feceris, in vteros infundito, ac decubēs ad plurimū tempus cōtineat. deinde ad dies quatuor desidere iubeto, & egreditur puer putrefactus. Sin minus, salē Aegyptiū & cucurbitā syluestrem viridē accipito, & melle ammixto trita edēda dato. Et postquā ederit, hinc & hinc moueatur. Aliud. Salē Aegyptium, & muriū stercus, & cucurbitā syluestre sumito, & mellis semicocti quadrantem affundito, & resinæ drach. i. in mel iniicito, & cucurbitā ac muriū stercus, omnia probe cōterito, & in glādes efformato, easq; ad vterum subdito, q̄ diu opportunum esse visum fuerit. Aliud expulsoriū, quod puerū enectum eiicit. Helxinē in vino tritā bibendā dato. Aliud eiectoriū, quod puerū liuidum expellit. Veratri nigri radices tenues tritas, quātum trib⁹ digitis apprehēdere potes, & myrrham magnitudine fabæ, in vino dulci bibēda prebe. Aliud. expulsorium. Coriādrum cum radice, & netopū apponat, ac deābulet. Aliud qđ infunditur, si mortuus fuerit puer, vt ipsum eiiciat. Crocum terito, & anserinum adipē affundito, & excolata in vteros infundito, & ad plurimū tēpus relinquito.

*Abortus
sanatio.*

*Partus im
mortui cic
tio.*

Cū partus

Ad fortū immobilē corrūpēdū ac expellēdū. Aluminis scissi

- A** scissi drachmā vnam, myrrhæ tantundē, veratri nigri obolos tres, in vino nigro leuiter trita, in glandes afformato, & apponito donec paulatim fuerit exolutus. Collutiōes vteros purgātes, si ex partu aut inflāmatione fuerint exulcerati. Grossos hybernos aqua affusa feruefacito, & excolato. Deinde oleo tepido affuso misce, & duas heminas ad summū infunde. Omnes autē collutiones nō ampliore q̄ hac mēsurā vteris infundantur. Malicoriū item & mānam thuris, in vino nigro austero coquito, & excolato vinū infundito. Alia collutio, Fecem vini vstā liquefacito, & cum aqua infundito. Deinde malicoriū, myrti baccas, iuncum odoratum, lentes, in vino coquito, & diffusum vinū infundito. Alia. Butyrū, thus, resinam, mel, simul liquefacito, & affuso vino, tepida infundito.
- B** Aut sambuci fructū in aqua coquito, & excolata aqua, apium myrrhā, anisum, thus, simul in ipsa terito, & vinū odoratū pari aquæ mensura affundito, excolatoq; per linteum, & tepefactum infundito. Alia. Brassicā, & mercurialē, & lini semē, & linum viride, in aqua coquito, excolato, ac infundito. Aut foliorū myrti acetabulū, myrrhā, anisum, mel, resinā, vnguentum Aegyptiū, oīa terito ac vnito, affusiq; vini albi odoratisimi heminis duabus, excolato, tepefacito, infundito. Aut lauri fructum & pulegiū in aqua coquito, & vnguentū rosaceum affundito, & cum hoc tepido colluito. Aut anseris adipem resinæ ammisceto, affusoq; ad hoc vino, tepefactū infundito. Alia. Butyrum & oleum cedrinū, in modico melle tepefacto ac infundito. Aut mel, butyrum, iuncum odoratū, calāmū odoratum, muscum marinū sumito, & in vino coquito, excolato, ac infundito. Aut apij semē, fefeli, myrrhā, anisum, melanthium, in vino coquito, & excolato vinum infundito. Aut cedrum in vino coquito, & cum vino colluito. Aut hederā in aqua coquito, & aquā infundito. Aut elaterij, aut cnestri potiones duas in aqua coquito, & duas heminas ex hac tepida infundito. Aut cucumeris sylvestris interioris magnitudinem digiti in duabus aquæ heminis coquito, & melle ac oleo ad aquā affuso infundito. Aut radicis thapsiæ potiones duas leuiter terito, affusoq; oleo ac melle, in duab⁹ aquæ tepide heminis diluito, ac infundito. Aut veratri nigri potiones duas, vino dulci & aqua dilutas infunde. Aut grana cnidia sexaginta terito, melleque ac oleo & aqua affusa infundito.
- Collutio

non mouetur.

Lotiones diuersæ.

HIPPOCRATIS LIBER I.

Collutio corroborans, si vlcera pura fuerint. Gressos hy- D
 bernos terito, & aquā affundito, & per totā diem macerato,
 & oleo affuso colluito. Aut malicoriū, & loti ramenta in vi-
 no nigro coquito, & infundito. Quū autē impura fuerint,
 & sordes deferuntur, fecē vini vstā, cum vino & aqua infundi-
 to. Aut malicoriū, rhoem coriariū, myrtiq; ac rubi folia, in
 vino nigro coquito ac infundito. Collutiones quæ infun-
 dūtur ad vetera vlcera. Succo brassicæ cocto collue. Et mer-
 curialem similiter ac nitrū rubrum modicū ammisce, & myr-
 rhæ acetabulū, thus, seseli, anisum, apij semen, netopū, resinā,
 mel, adipē anserinū, acetum album, vnguentum album Aegy-
 ptium, Hęc oīa simul trita, & vini albi heminis duabus diluta,
 tepida infunde. Aut mercuriale in aqua coque & excola, &
 myrrhæ acetabulū, thus, seseli, netopū, singulorum pares por- E
 tiones adde, ac tepida infunde. Aut salurā & hypericum in
 aqua coquito, & cum aqua colluito. Aut sambuci fructū, &
 lauri baccas, æquis portionibus in vino coquito, & cum vino
 colluito. Aut pulegij aqua colluito. Aut adipē anseris in
 resinā liquefacito, & similiter oleum cedrinū modicū affun-
 dito, & cum melle liquefacito, ac tepida infundito. Aut ar-
 genti florē in vino & melle ac cera liquato, & cyperū, & iun-
 cum odoratū, ac calamū (quæ sanē etiā in vnguentum ammi-
 scentur) & iridem ac muscum, in vino coquito & infundito.
 Aut apij semen, anisum, seseli, myrrhā, melanthiū, in vino co-
 quito ac infundito. Aut cedrū creticā in vino coquito, aut
 in aqua, & infundito. Aut hederā creticā in aqua coqui- F
 to ac infundito. Atq; hæc facienda sunt si vulnus habet. &
 myrrhā in aqua dilutā infunde. Aut elaterij potiones duas
 cum aqua infunde. Aut colocynthidas sylvestres duas in vi-
 no aut in lacte cocto, quatuor heminarū mēsurā macerato, &
 excolato, ac infundito. Aut cucumeris sylvestris interioris, pal-
 mi magnitudinē in aquæ heminis quatuor coquito, & melle
 ac oleo affuso colluito. Aut radice thapsiæ duas potiones,
 in vino dulci dilutas, cū aquæ heminis duabus, tepide infun-
 dito. Aut veratri potiones duas, in vini dulcis heminis dua-
 bus dilutas infunde. Aut thlaspios acetabulū, melle ammi-
 xto in aquæ heminis duabus dilue, & tepido vtere. Aut cu-
 cumeris sylvestris magnitudinē palmi, & cneori potionē vnā,
 in aquæ heminis quinq; coquito, & melle ac oleo affuso col-
 luito.

- A** luito. Aut grana cnidia sexaginta, in melle aut in oleo diluta, cum aqua infundito. Si ex partu alui profluuium corripiatur. Bibat uiam passam nigrā, & punici dulcis malicoriū, & internū nucleū, & coagulū hœdi. Hæc vino nigro diluta, & caseo caprino, ac polenta triticea inspersis, bibenda dato. Triticū autē modice torreto. Si vero ex partu sanguinē vomat, huic hepatis fistula sauciata est. Hæc lac asini bibat, dein de vaccæ nigre, ad quadraginta dies. Et sesamū tritum donec probe habeat. Bibat autē lac ieiuna. Si ex partu sedem doleat, iuniperi fructū & apij radicē coquat, & ad dies quatuor bibat. & lactucæ semē cum anserino adipe tritū edat. Si vero ex partu vteri inflāmati fuerint, solani succum infundito, aut betæ, aut rhamni. Si ex partu crus ab vteris claudū factum fuerit, & exurgere nō poterit, semen hyoscyami chemē mensura, in vino nigro ad triduū bibat. Si vero mente percellatur ipsa bibēs, lactis asinini poculū bibendū dato. Deinde pharmacum à quo pituita purgatur, ex sandaracha aut & cerato, & pilis leporis, per triduū suffitus fiat. De inflāmatione ex partu. Si ex partu vteri inflāmati fuerint, solani sue cum intra pudenda infundito. Aut apij, aut rhamni, aut betæ, aut cucurbitæ succum expressum. Aut sambuci medullā ac tenerissimam partē derafam, oblongā indito. Aut absinthium in aqua terito, & lana exceptū subdito. Si vero horruerit tollito. Aut cotyledonis folia, & porrū, in crassiore tritici farina coquito, & oleo ipsis affuso præbeto. Bilé ex ytero purgantia, Cucumeris syluestris internā partem tritā ac melle subactā, in glandē efformato ac apponito. Pharmacū autē dare oportet, quāsi sursum ac deorsum purget. & calida lauare. apponere vero anisum, aut melanthiū: aut colocyntidis syluestris internam partē terito, & melle subactā apponito. Aut elaterij portiones quatuor, ammixto adipe anserino aut caprino, in oblongiorē glandē redactas apponito. Aut nitrū, & cuminum, & allium, & sicū, oīa leuiter trita & melle subacta apponito. Calida vero lauet, & à balneo bibat. Aut thlaspi leuiter tritū, & melle subactū apponito. Aut fic⁹ veteris pinguitudinē derafam elaterij portionib⁹ duab⁹ ammixtis, & nitro tantū quantum est elateriū, cum melle subigito ac apponito. Aut peucedani tres cyathos bibendos dato. Et anisum ac melanthiū vino diluta bibenda dato. Aut elaterij portiones quatuor, adipe ouilla

*Sanguinis
uomit
caussa.*

*Cōtra ute
rorū inflā
mationē.*

*Diuersæ
medicæ.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

pe ouillo ammixto apponat. Et hoc ablato aqua odorata la-
uer, quæ leniter adstringat. Aut elaterij portiones tres cū ouil-
lo adipe, in glandē circum pēnā efformato. & vbi amouerit,
sufficienti aqua probe eluatur. Aut thlaspis portione cū melle

*Collutioes
quæ.*

dato, Collutio si biliosa fuerit. Elaterij portiones duas
aqua dilue, & oleū narcissinum affunde, & cū tepido collue.
Aut colocynthides syluestres duas in lactis asinini cocti he-
minis quatuor macerato, & vnā excolato, ac oleū narcissinū

*Pituitosa
de biliosa
lauatio.*

ammisceto, & infundito. Alia collutio biliosa & pituitosa.
Cucumeris syluestris internā partē palmi magnitudine, in

aquæ potabilis heminis quatuor coque, & melle ac oleo an-
thino ammixto infundito. Alia pituita & bilē purgans. Gra-
na cnidia sexaginta, melle ac oleo anthino ammixto, cū aqua

infundito. Aut cnestrū in aquæ potabilis heminis quinq; co-
quito, & duabus excolatis, mel & oleū anthinū cū narcissi-
no ammisceto, ac colluito. Collutiones purgatoriæ. Grossi
hyberni vsti in aqua macerantur. & ad aquā excolatā oleum

ammiscetur, ac infunditur. Postea vero collutio fiat ex mali-
corio, galla, loti ramētis. Hæc autē in vino nigro coquere o-
portet. Aut fece vini vsta vterē cū aqua. Et postea hæc infun-
dito, myrti folia & rhoem coriariū. Coquantur autē in vino
nigro odorato. Et postea lentisici folia, & hypericū, & saluiā,
cū vino nigro odorato cocta infundito. Aut cū brassicæ a-
qua, in qua mercurialis cocta sit, modico nitro adiecto, col-
luito. Aut elaterij portione, cū oleo narcissino aut anthino, te-
pidā infundito. Si vero biliosa fuerit, colocynthidas duas, &
in lactis asinini cocti quatuor heminis macerato, & cū exco-
lato colluito, oleo narcissino aut anthino ammixto. Aut cu-
cumeris syluestris internā partē palmi magnitudine, in aquæ
potabilis heminis quatuor coquito, & melle ac oleo anthino
addito, colluito. Hæc collutio pituitosa ac biliosa conducit.

Collutio pituitā trahēs. Granū cnidiū, & mandragoræ li-
quorē terito cū aqua, Nā purgatio multa & omnis generis ex
hac collutione cōtingit. Aut allij caput integrū, nitrū, ficus
internā pingue partē, æquis portionibus trita ad gallæ ma-
gnitudinē efformato, ac apponito. Aut cumini folia cū vino
trita, in lana subdito. Aut radicē albā terito, & melle affuso
feruefactā in glandē redigito, ac apponito. Aut silphij liquo-
rē cū ficis emollito, & glandē efformato. Bonū est & cucu-
meris

- A** meris syluestris semē similiter tritū ac preparatū. Aut fel tauri, & nitrū rubrū, & netopū, ac cyclaminū, illorū quidē gallæ magnitudinē, cyclamini vero ampliorē portionē, melle ammixto mulier quæ curatur apponat. Aliud subdititiū. Cyclamini caput purgatū aqua terito, & lana tenera exceptū apponito. Aut myrrhā, salē, cuminū, fel tauri, cū melle eodē modo. Aut grana caidia triginta, & Indici pharmaci oculorum, quod vocatur piper grana tria, decorticato: & rotundi item tria. Hæc autē terito, & vino veteri tepido diluta, instar glādis circū volucris pennā efformato, & sic adhibero. Aut tithymali succū melle subactū. Aut scillæ radicē longitudine digitorū sex, duobus digitis lana obuolutis subdito. Aut ipsā
- B** scillā absq; radice terito, & similiter lana obuolutā apponito. Collutio si pituitosa fuerit mulier. Veratri potiones duas in vini duleis heminis duabus diluito, & permixta infundito. Si purgationē opus habuerit, porrū coquere oportet, aut sambuci fructū, anisum, thus, myrrham, vinū. Hæc omnia terito, & cū succo horū colluito. Aut brassicā in aqua coquito, & in huius succo mercurialē coquito, & nitri parum, & excolatū infundito. Aut cnestri potionē in melle dilutā immittito. Verū mēses cōsiderare oportet, an biliosi sint, aut pituitosi. Ad hoc arenā siccā tenuē in solē subiicito, & quū mēses prodierint, sanguinem superfundito, ac siccari finito. Et si quidē biliosi fuerint, sanguis in arena siccatus viridis euadit. Si vero pituitosi, velut mucus conspicitur. Si igitur pituitosi
- C** fuerint, cnestri potionē cū aquæ mulse hemina infundito.

Purgatoriū molle, aquā ducit & pelliculas, ac sanicē subcruentā. Detrahit & menses, nisi diuturni fuerint. & vterorū os mollit. Vnguentū narcissinū, & cuminū quod editur, myrrham, thus, abſſathiū, cyperū, vnguentū rosaceū, Horū singulorū pares portiones, narcissini vero quatuor partes sumito, & crudi lini puluillo dū à stupa depectinatur ammixto, omnia terito, & glandē circū penam efformato, & linteo tenui circumdaro deligato & in oleū albū Aegyptiū tingito, ac apponito, & per totā diē finito. Et vbi lauit & amouit, aqua odorata perluatur. Aliud purgatoriū. Ducit aquā & pel-

*Menses sunt
cogniti.*

*Pergamē
tū ad male
ta.*

ta.

HIPPOCRATIS LIBER I.

rur. Aliud. Salē, cuminū, fel tauri, melle subigito ac sub- **D**
dito. Et silphium ficui ammisceto ac apponito. Deinde vn-
gueto rosaceo illinito. Aut grana cnidia decorticato, potio-
nēq; ipsorum terito, ac in glandē efformato. Aut allium &
nitrū rubrū, & ficum, paribus portionib⁹ melle ammixto sub-
denda dato. Et vbi amouerit, cerui adipē apponat in vino li-
quefactū. Aut piperis grana quinq; cum modico elaterio,
muliebri lacte instillato, in lana vnguento tincta apponat, ac
amoueat eodē modo. Aut pinguiissimā ficus partē cum ela-
terij portione, & nitrū rubri ac mellis æquali portione, eodē
modo. Aut fel tauri, nitrū rubrum, netopū, cyclaminum, pa-
ribus portionibus eodē modo cū melle in glandē efformato.

Aut fel tauri oleo Aegyptio tinctū apponat. Et eo amoto **E**
rosaceū illinat. Aut cucumeris syluestris lōgi internā par-
tē, exēpto semine, cum lacte mulieris masculū alentis, & myr-
rhā purā, & modicum mel, & vnguentū Aegyptium, terito &
apponito. Aut cucumeris syluestris partem internā siccato, &
sine semine rundito, & adiecto melle feruefacito, & glandē
oblongā efformato, atq; oleo albo tinctū subdito. Aut syl-
uestre cucurbitā eodē modo. Aut elaterij portiones tres cum
farinē massa terito, & glandē formato. Aliud similiter faciēs.

Grana cnidia decorticata triū potionū mēsurā coquito, &
melle affuso apponito. Deinde rosaceū illinito. Quæcunq;
vero glandē subdunt, eas prius lanā in glandē infigere, dein-
de linteū tenuē circumdare oportet, atq; sic oleo Aegyptio
tinctā apponere. Ducunt autē hæc maxime, & pelliculas **F**

*Purgatio-
nes diuer-
sæ.*

auferūt. Subdititia purgatoria fortia, quæ aquā ducere pos-
sunt, & mucos, ac pelliculas, magis quàm priora. Piperis grana
quatuor maxima, aut etiā parua, si opus fuerit, ad elaterij po-
tionē ammixta terito, & muliebri lacte instillato, cū modico
melle subigito. Atq; hæc in lanā mollē circū pennā obuolui-
to, & linteo circūdato apponito, vbi prius in oleū Aegyptiū
tinxeris. Maneant autē subdita per diē, & vbi amouerit, adi-
pē cerui apponat. Potiones, similiter purgatoriæ, quæ se-
cundas eiicere possunt, & menses detrahère, & fœtū enectū
educere. Cantharides quinq; alis & cruribus ac capite aul-
sis: & tribulū ad mare natū cū radicibus ac folijs tritum cō-
chæ mēsurā: & euanthemi viridē siue luteā internā partem,
& seminis apij tantundē, & sepię oua quindecim, in vino dul-

ci tem-

A ci tēperato bibenda dato. Et vbi dolor habuerit, in aqua calida desideat, & aquā mulsam aquosam bibat, & vinū dulce.

Alia. Ranunculi foliorum ac floris triti, æginæ stateris pōdus in vino dulci bibat. Quū autē dolor habuerit, cicer album & uas passas in aqua coquito, & perfrigeratā bibendā dato. Et vbi vrinæ stillicidiū vexarit, in aqua tepida desideat, & vinū dulce bibat. Subdititia purgatoria si potiones non purgarint. Mercuriale tritā ac myrrhā apponito. Aliud ad omnē morbum, & aperire, & purgare potens. Myrrham modicā & saluiā, & anisum terito ac vtiō. Purgatorium quod sterile purgare potest. Si os vteri nō recte habuerit, stercus bubulum siccū tusum ac cribratum quatuor chœnicū

B mēsurā, & aceti heminas decē, & vrinæ bubulæ tantundē, & saluginis marinæ heminas viginti, pro fomento adhibeto. & ad multum tēpus hoc leniter facito. Deinde lota vbi lēticulæ decoctum, & mel ac acetum mixta bibit, vomat. Et farinā sorbendā dato. & vinū odoratū vetus sub dio per noctē expositum, insuper bibendū. Cibum autē ea die ne guster. Sequenti vero granum cnidium deuorādum dato. Tertia vero pharmacū vrinā ciens exhibeto, ita vt uas passas & cicer album, duarum chœnicum mēsurā sumas, & aquæ semicōgios tres affundas. Deīde facta coctura excoles, & sub dio per noctē exponas, & postera die bibendum præbeas. & subdititiis pharmacis vtatur. Aliud purgatoriū mēsum. Stercus bubulum velut cōchæ testā efformato, & cupressi ramenta am-

C misceto ac subigito, & in sole siccatō. & in hoc suffimēta iniicito, ac suffito. Aliud quod infunditur ad similē affectionē, si mēses nō prodeant. Spinæ albæ folia trita, & excolata ac tepefacta infundito. Illitio purgatoria, quæ vteros purgat. Porri & nasturtij semen tritum, & vino ac lacte cocto dilutum, imo vērri illinito. Illitio mollitoria. Ducit aquā, & mucos, & pelliculas. Et puerperij purgamenta detrahit, & nō exulcerat. Myrrhæ optimæ dimidiā partem, & salis granum, & picē aromatibus conditā, cōtundito ac trita misceto. Sit autē myrrhæ dimidia pars, ad salē ac picē cōtusam; Hæc in linteum ad gallē magnē magnitudinē efformata immittito. Sint autē duo linteā, vt alterum in die, alterū noctē habeat, donec colliquefiant. Lauetur autē calida. Et deīde vbi amouit, aqua odorata perluatur. Si voles mulierē cō-

Vt concipiat mulier.

HIPPOCRATIS LIBER I.

cipere, ipsam & vteros purgato. Deinde ieiunæ farinā edē- D
 dā dato, & vinum meracū insuper bibēdum. & nitrū rubrū,
 aut cuminum, & resinā, melle subigito, & in linteo subdito. &
 vbi aqua defluerit, nigros subdititios talos ad emolliendum
 apponito, & cum viro cōcumbat. Si vero os cōclusum fue-
 rit, etiā fici succum apponat, donec fuerit apertum, & statim
 aqua eluat. Cæteru accipitris sterces in vino dulci terat, &
 ieiuna bibat, & tunc viro condormiat. Aut vbi menses desie-
 rint, anseris aut vulpis sterces, in rosaceo vnguento terat, &
 pudēdum illinat, ac condormiat. Si vlcera fuerint acria &
 inflamata, hac collutione vtēre. Adipē anseris & resinam mi-
 sce, & aqua tepida diluta infunde. Aut butyrū melli ammix-
 tum liquefacito ac infunde. Aut bryoniæ albæ cōchæ testam E
 parua deradito, & myrrhā ac mel similiter. Hæc in vino ni-
 gro odorato diluito, ac tepidum infundito. Si vlcerata aut
 pustulis plena fuerint summa labra, carnē bubulā sumito, &
 butyrum siue adipē anserinum, & anisum aut crocū, aut spo-
 dium cyprium. Hæc omnia terito, & carni oblita apponito.

Si vlcera fiant ac mordeāt, Bubulā carnē adipe illinito, &
 carnē subdito. Et si sordida fuerint, eluito, & fomentum ex fi-
 ci radice adhibeto. Et postea etiā de pinguedine in vino dul-
 ci bibat. Si in pudendis fiant vlcera, bubulum adipē illini-
 to. Et myrtum in vino coquito, & cum vino perluat. Aut oleę
 folia, & rubi, & mali punicæ, eodē modo. Sit autē vinum prā-
 nium. Atq; hæc quidē sic facienda sunt. Et persæ arboris vi-
 delicet folia terito, & ad pudēda apponito. Aut anethi & a- F
 pij semen tritum illinito. Si feruido ac superficiario vlce-
 re pudenda laborēt, sic curare oportet. Carnem bubulā lon-
 gitudine duorum palmorū paruorū, crassitudine vero ligni
 quod in foramen bipennis immittitur, pudēdi videlicet vi-
 rilis forma, vsque ad vesperam apponat. Noctu vero auferat.
 Postera die autem rursus apponat vsque ad meridiem. & bi-
 bat vinum dulce, mellie ad vinum ammixto. Collutio si vl-
 cerati fuerint vteri, & si vrinæ stillicidium vexarit. Porrum,
 sambuci fructum, seseli, anisum, thus, myrrham, & vinum æ-
 quali mēsurā ad horum succum. Hæc mixta & fetuefacta fri-
 gefacito, & moderate colluito. Aut mel, butyrum, medullā, &
 cerā immittito, ac illinito. Ad vlcera quæ in pudēdo sunt
 ac enascūtur. Folia oleæ, & rubi, & hederæ, & mali punicę
 dulcis

*Medela
 omnium
 quæ in pu-
 dēdis na-
 scuntur.*

A dulcis terito, & vino veteri diluta, noctu in lana pudēdis ap-
ponito, & pro cataplasmate adhibeto. Quam aut dies vene-
ri, detrahito. & myrti baccas in vino coquito, ac colluito.
Aut anseris adipē & resinā liquefacito ac infundito. Aut bu-
tyrum & oleum cedrinū, modico melle ammixto infundito.

Ad vlcera in vtero reficcanda. Argenti florē in vino te-
rito ac infundito. Aut butyrum cum melle infundito. Aut
bryoniā albam, & myrrhā, & mel, vino diluta infundito. Po-
stridie vero vino nigro tepido eluito. Aut lentisici folia in a-
qua coquito, & cum hac postea colluito. Si vlceratum fue-
rit os vterorum, Butyrum, thus, myrrhā, resinā, medullā cer-
uinā infundito. Aut lenticulā in aqua coquito, & cum exco-
lata aqua colluito.

B Quū vero aqua ex vteris fluxerit, & vl-
cera fuerint, & lancinarint, anseris adipem & ouum illinito.
Aut ouillum aut suillum adipē, & lentem in vino coquito, &
hoc pari aqua tēperatum infundito. Quæ vero in pudendo
sunt vlcera, cum hoc perfundito, & mannā thuris, rubum, pi-
ni corticem inspergito. & cum aqua horum lauentur. Ex-
pulsorium si mortuus fuerit fœtus. Galbanū oliuæ magni-
tudine linteo inuolutum, ac oleo cedrino tinctum, ad os vte-
ri apponat. Aliud. Calamū odoratum, & cucumeris syl-
uestris medullā, cum adipe anserino terito. Deliget autē vm-
bilicum & pectinem, & de hoc modicum lanę instillatum, ad
os vteri apponat. Et ab hoc paulatim extrahetur. Aliud.

*Fœtus in
mortui co-
iectio.*

C Rubiā & cedri ramenta cōtundito, & aqua affusa sub dio
per noctem exponito. Deinde mane ad dolores partus exhi-
beto. Aliud. Silphij drachmā vnā, & porri succi aceta-
bulum, cedrini olei dimidio cyatho paruo ammixto, biben-
da dato. Aliud. Tauri fel oboli vnus aut semioboli pō-
dere, in vino terito ac exhibeto. Aut fermento oblitum, tor-
refactū deuoradū dato. Aliud. Cācros fluuiatiles quin-
que, & rumicis ac rutæ radicē, & fuliginem de furno, omnia
simul trita, & cum aqua mulsā vnita, sub dio per noctē expo-
nat, & ieiuna ter bibat. Aliud. Cucumeris syluestris me-
dullā tritā, in cedrina pice lanæ inuoluito, & cum filo ad pē-
nam deligato, apponat autem intro, ita vt pennæ dura pars
paululum foras promineat ex lana. Quam autem sanguis ap-
paruerit, amoueatur. Aliud. Veratri nigri virgulā lōgi-
tudine sex digitorū lana obuoluito, extremā vero ipsius par-

M tem nu-

HIPPOCRATIS LIBER II.

tem nudā finito. Deinde q̄ maxime intro apponat, & vbi extrema pars cruentata fuerit, amoueatur. Aliud. Veratrum nigrum, & cantharidas, & conyzam in aqua terito, & glādula mollem sex digitorū lōgitudine efformato, ficcato, & vbi dura facta fuerit, lana inuolutā apponat. Summā autem partem cedria illinat, sitq; ipsa nuda. Quum vero sanguis apparuerit, amoueatur. Aliud expulſorium. Si foetus mortu⁹ aut syderatus intus fuerit, ranunculum & elaterij parum in aceto meraco misceto ac bibēdum dato. Aut brassicæ tener coliculus, in summa parte netopo. illitus immittatur.

HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS MULIEBRIBVS

liber II. Iano Cornario medico

physico interprete.

*Diuersi
fluxus.*



Luxus albus in senioribus mulieribus magis fit, q̄ in iuniorib⁹. Fluxus fuluus in vtrisq; Fluxus ruber in iunioribus. Et ruber quidē fluxus fit ex febre. Magis aut̄ ex abortu. fit & ex mensium interceptione, quā cōclusi derepente eruprint. Fit etiā ex partu & febribus. & sanguis profluit valde multus, & grumi excidunt. Et dolor fit elai-

uicularum ac tēdinum, & corporis torpor, & crurum perfrigeratio. Aliquando vero etiā nasus effundit ad dentes, si amplior sanguis disceſſerit. & sudor multus diffunditur. Ad hec & stomachi morſus fiunt, & perfrigerationes, & febris bilis meracæ ac pruriginosæ. & eadē die ſape rigēt, & rursus ſudant. & aliquādo à ſupernis locis cōuulſiones ipſis fiunt, aliquando ab infernis. & ad inguina dolores acuti ac fortes irruunt, procedētes velut dolores partus. Quādoq; etiā vrinæ ſtillicidium adest, & os ſiccū eſt, & ſitis premit. & lingua aspera eſt. & digiti pedum magni cōtrahuntur, & ad ſuras ſemper eum femore diſtenduntur. Et lumbi dolore vexantur. & ma-

nus im-

Anus impotentes fiunt. Quū autem huiusmodi fiunt, tunc etiā
 neruorum antrorsum ac retrorsum distentiones fieri solent,
 à clauiculis iuxta iugulū, ad maxillas & linguā. A talibus ve-
 ro paulo post retrorsum, à tendinibus iuxta spinā, ad lumbos.
 atq; sic per violentiā pereunt. prædicere igitur oportet flu-
 xibus inchoantib⁹, & diartā cōstituere hoc modo. Mane qui- *Medela.*
 dem dandū est pharmacum ad fluxiones, ex his quæ ego de-
 scribā, quocunq; maxime opus habere visæ fuerint. Dandū
 autē & ter & quater, si multus sanguis discesserit. Diartā igi-
 tur cōstituatur, si quidem sine febre fuerint, ex cibis. Si vero
 febricitarint, ex sorbitionibus. Sunt autē ex sorbitionib⁹ hæ *Sorbitiones.*
 comodissimæ, panicū, lenticula, farina horni ac recentis tri-
 tici cocta, alica cocta sorbilis, zea cocta. Ex potionibus vero *Potiones.*
 polentæ pollen in aqua, & ramenta à panibus derafa cōtusa.
 Et polentæ recentes tenues in aqua madefactæ, quas etiam
 insulsas delingere prodest. Ex cibis vero panis exassatus in
 cinere. Obsoniū autem sit leporis caro, & columbæ, ac palu-
 bis, & cocta, & assata. Et hædi caro assata, nullo ascitio cō-
 dimento addito, sed vt in acetū saltem intingant. Hepar itē
 capræ aut bouis in cinere assatū. Oui tenue, aut ipsū luteū.
 Caseus insulsus. Ex oleribus autē nullum gustēt, neq; coctū,
 neq; crudum. Et à balneis abstineant. Et manus ipsis deliga-
 to, ita vt lana sordida ipsas circundes, & laqueū immittas su-
 pra cubitos, & ad poplites, supra genua. Et cū cucurbitis sub
 mammas affixis, ipsas eleuato, modo ad dextrā, modo ad si-
 nistrā partem translatis. Si vero spirandi difficultas oriatur
 ad cucurbitæ admotionē, cucurbitam amoueto, sanguinē au-
 tem ne detrahito. Verū subdititiis vtete, quæ ego describā,
 & ad sistendū sanguinem in talib⁹ sunt apta. Et si quidem ex
 fluxionibus mulier euaserit, vbi multus sanguis discessit: &
 color est exalbid⁹, & facies eleuata, & sub oculis tumores la-
 xi, & crura turgida, & vterus humidus, ac semper præter ra-
 tionem hians. Et quæ discedūt aquosa sunt, velut à crudis car-
 nibus succus. Talibus si robustæ fuerint, vomitus ciere oper-
 tet ieiunis, & post vomitus prandium exhibere. His cōducit
 modicus cibus. Vinum nigrum meracius. Illuuiēs, aut frigi-
 dæ lotio. Deambulationes. Semel in die cibū capere, omnis
 resiccatio. Si vero ad hæc nō sedentur, neq; confidant vteri,
 neq; à fluxionibus liberentur, respectu virium corporis ha-

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Quæ i his
consideretur.*
 bito, si quidem robusta fuerit, veratrum dare oportet. Si vero D
 nō obediat, caput purgare. facta autē purgatione, per diætā
 reliqua curare eodem modo velut circa steriles. Cōsiderare
 porrō oportet etiā naturas mulierum, & colores, & ætates, &
 tempora, & locos, & ventos. Aliæ enim frigida, aliæ humida
 ac fluida. aliæ calida quidē, sicciore autem & stabiles sunt.
 Nā quæ superalbida sunt, humidiores sunt ac fluidiores. Ni-
 græ vero, sicciore & acerbiores ac adstrictiores. Quæ vero
 vini colorē referunt, medium quiddā inter vtrāsq; habēt. Sic
 autē & in ætatibus contingit. Iuenculæ enim humidiores
 sunt, & multo sanguine plerunq; refertæ. Aniculæ vero sic-
 ciores, & modicum sanguinē habentes. Mediæ vero medium
 quiddā inter vtrāsq; habent, vt quæ nunc æquales existunt. E
 Oportet autē eum qui recte hæc tractare volet, semper mu-
 lierum naturas discernere, & tēporum occasiones, & ætates,
 & tēpora, & locos, & ventos. Si fluxus in vteris obortus fue-
 rit, sanguis multus fluit, & grumi cōpacti excidunt. & dolor
 occupat lumbos, & laterū mollitudinem, ac imum vētrem. &
 durus est venter, & ad cōtactum dolet. & rigor ac febris acu-
 ta corripit, & debilitas oboritur. & omnia præter humeros ac
 scapulas dolet. & calor inuadit, & rubescit. & venæ duræ fiūt
 ac renitentes. Morbus hic maxime fit ex abortu. Fit & quum
 mēses multo tēpore retenti derepēte eruperint. Huic vbi sic
 habuerit, grossum siccum cōtustum ac cribratum in linteū al-
 ligato, ac apponito. & imo vētri perfrigerantia imponito, ca-
 uens ne horreat. Postq̃ autem fluxus steterit, olea sylvestris F
 folia in acerrimo aceto coquat, eoq; pudenda perluat. Bibat
 autem vinacea. & rhoem rubrū in aceti acerrimi hemina di-
 midia coquat, & eo pudenda perluat. Aut mora rubi rubra
 siccata ac trita, cum farina recenti, pari portione mixta, ieiun-
 na bibenda dato. Si vero fortius facere voles, duabus farinae
 partibus ammixtis, bibendum dato. Et ne lauetur. Cibus au-
 tem vtatur siccis, & vino nigro vinoso. Si vero intumuerit, flu-
 xu iam sedato, pharmacum deorsum purgās bibendum dato.
 post pharmacū autem vteros grossorum decocto colluito. &
 postea acerbā infundito. Si vero his factis, humecta fuerit,
 suffitum faciat donec resiccet. Ruber fluxus fluit talis,
 qualis sanguis victimę recens mactata, & grumi pellucens.
 Aliquando vero etiā fluxum rubrum emittit, & venter imus
 attollitur,

Morbi
caussa.
Medela.

Qualis
flor.

- A** attollitur, & attenuatur, & impotēs fit, & indurefcit, & ad cō-
 tactum dolet, velut vlcere prāfente. & febris habet, & dentiū
 fremitus. & dolor ad ipfa pudenda, & pubem, & lateris mol-
 litudinem, & lūbos, & tendinem, & ventrem, & pectus, & ſca-
 pulas irruit. Et alias omnes partes dolet. & impotentia ac pu-
 ſillanimitas occupat. & color mutatur. In principio quidem
 morbi hæc corripunt. Si vero hæc omnia morā trahant, ad-
 huc magis debilitatur. & manifeſtus eſt morbus. & cauæ par-
 tes attollūtur, & pedes intumeſcūt. Morbus hic ex partu ma-
 xime corripit, ſi quid in ipſa dilaniatum nō prodierit, ſed in-
 tus cōputruerit, & fœtus exaſperatus fuerit. Hæc ſi in princi-
 pio cōtigeris, ſpōgiam humectā ipſi adhibeto, quū fuerit do-
 lor. Aut lintheum tenue molle raſum, aqua frigida madefaçtū,
 ventri imponito, & aqua perfundito. & lectū a pedibus al-
 tiorem facito, atq; ſic inſternito. & ad mēſes ciendos medi-
 camentum quodcunq; magis admiferit, bibendum præbeto.
 Apij ſemen torreto, tundito, ac cribrato, & eryſimum ſimili-
 ter, & peplij ſemen cum polēta cribratum, & vrticæ ſemē ſi-
 militer, & ſcabiem oleæ ſylueſtris, & gallam, & rutā, & origa-
 num, & pulegium cum polenta cribrato ac miſceto: polentā
 vero craſſam torreto, & triticeam polentam cōmolito: & ca-
 ſeum caprinum fordibus deraſis, & de aliis quidem ſingulo-
 rum æquales portiones miſceto. Origani vero & rutæ, & ſca-
 bieī, & gallæ dimidium. Hæc ieiunæ ante motū bibenda da-
 to. Miſcere vero etiā oportet ad vſum, ſi acriora prodierint,
 & cyceonem exhibere. Et de pharmaco quidē pars vna ſit,
 & caſei vna, & vna polētæ. Ad veſperā autem melle ammi-
 xto bibenda dato, & donec quidem principium morbi fuerit,
 & ſanguis multus prodierit, & modico tempore intermiſe-
 rit, & dolores acuti tenuerint, hæc facere oportet. Si vero ſan-
 guis paucior fluxerit. & per breuius tempus, ea quæ deorſum
 aut ſurſum ducunt bibenda dato. & pudenda lenibus fomē-
 tis foueto, prout ſemper opportunum viſum fuerit, & zeam
 vna cum cortice fractam, & groſſos ſiccatos, tuſos ac cribra-
 tos, & oleæ folia ſimiliter, ſingulorum pares portiones in ca-
 taplaſmate adhibeto. & lac bubulum coctum, aut crudum bi-
 bendum dato, reſpectu ad id quod recte habet factio, & pro-
 ut opportunum eſſe viſum fuerit. & videtur morbus hic de-
 bilis ac lethalis eſſe, & paucae ex ipſo effugiunt. Quum
 M iij mulieri re.

Medela.

Profluuiū
ex abortu
uel labo-

HIPPOCRATIS LIBER II.

Medela.

mulieri sanguis ab articulis fluxerit, à partu aut à labore corruptæ, quidam putant ex medicis hoc fluxum esse. Est autem aliud. Nam hoc quod ex articulis, & ex lumbis, ac coxendice aliud est, glutinosum est simul cū sanguine. Illud vero quod ab uteris & cauis venis fluit, sanguis purus est. Hâc suffire oportet hoc modo. zææ fractæ semodiu aceto modico subigito, vt ne per totum vteros humectes : & sulphuris viui semibolum ad zæas tritas ammisceto, & aceto subacta per noctem finito. Mane vero multo igne accenso, obturamenta de dolis oleariis imponito, & sordes officinæ fullonum, & serpentis semen ammisceto. Mox autem multum ignem tollito, & non vrito, sed maxime suffumigare facito. Oportet autem sellam perforatam adesse, & mulierem vestibus contactam insidere, vt ne quid præterspiret. In ignem vero medicamentum cum aceto præparatum inspergito, itemque de semine serpentis. Sed & myrrha ammixta efficax est, vt suffita pudendorum cruentationem sedet. Si vero satis habuerit, erysimum semen torrefactum terito, & in vino exhibeto. Fluxus fuluus fluit velut ex ovo vitioso multus & graueolens, & vteri inflammantur. & dolor ex lumbis & inguinibus emergit. & prodeuntia multa sunt, & si non liberetur, celeriter fluentia. At etiam si tempus accedat, quæ restant putrefacit, quàm maxime id fieri potest. Riget enim, & velut à carnibus assatis humor defluit. & cum his simul febres fortes ac rigores fiunt. Ex huiusmodi vero fluxibus multæ pereunt, paucæ effugiunt. & si quidem in principio accesseris, sic curare oportet. Si sine febre fuerint ac robustæ, veratrum ipsi dato. & intermissis tribus aut quatuor diebus, pharmacum deorsum purgans exhibeto. Post purgationem vero sic dietam constituere debes, quo fluxiones aquosæ sint ac tenues. Mane quidem ieiunæ pharmacum aliquod ex his quæ ego describam ad fluxum, ebibendum dato in vinum inspersum. Post pharmacum autem, alia diætâ curato. Vteros vero sic curato. Si quidem inflammati fuerint ac conclusi, fomenta adhibere oportet mollia, donec os vterorum molle fiat. Post fomenta, infusis qualibus opus habere visæ fuerint colluito, siue magis purgantibus, siue mollioribus. Post collutiones, mollitoria apponito. Si vero non facile solubile sit osculum, foueto & subdititiis mollito, quæ ego describam,

Curatio.

- A** ham, donec apertum fuerit. Quod si ad hæc fluxiones non sedentur, caput purgato, & sic victus rationem constituito. Si quidem sine febre fuerit, asininum lac bibat. & oleribus *Cibaria.* coctis hortensibus ac sylvestribus vtatur, excepto allio, porro, brassica & raphano longo. Ex marinis autem, raia leui, scorpio, congro, torpedine, anguilla, passere, gobio: coquere vero oportet cum cepis & coriandro, in muria dulci ac pingui, ita vt probe percoquantur. Ex carnibus autem, maxime suilla, deinde agnina, aut ouilla, coctis potius quàm assatis, & ipsarum iusculis. Vino vero albo mellei coloris, aut aquoso. Balneis autem non valde calidis, neque multis, excepto capite. Si vero ex hac diæta, ab vlceratione & inflammatione liberentur, humidi vero sint vteri, pro balneis quidem, illuuiæ. pro fuluis autem *Nutricatus mutatio.* vinis, nigris. & pro aquosioribus, meracioribus. & pro polenta panibus, & pro piscibus carnibus, assatis, & omnibus cibis siccantibus, quibus sanè in alui profluuiis vtimur. à collutionibus autem omnibus abstineat, excepto vino & aqua. Suffitus autem fiat per adstringentia. Optimū autem esset si conciperet. Si vero iuuacula fuerit, frequenter ieiuna vomat, & postea parum prædeat. Atque hæc harū fluxionum diæta est. Fluxus albus *Profluuiū albū quale* fluit velut alba asini vrina, & in facie sunt tumores albi, & partes ambæ sub oculis tumēt. & hydropiformes ac non valde bona specie præditi sunt oculi, & splendor abest. & lachrymosi sunt oculi ac hebetes. & color corporis exalbidus ac pustulosus. & venter imus tumidus. & in maxillis pustulæ paulatim rubentes, parue, aquosæ ac malignæ. & in cruribus, tumores laxi, & si presseris digito, notæ imprimuntur velut in fermento, & os saliuæ impletur. & stomachi morsus percipiunt quū ieiunæ fuerint, aut etiā vomuerint velut acidam aquā, & si ad accliuem locū procedunt, anhelatio citius corripit, & strangulatio, & crurum perfrigeratio, & genuum impotentia. & in ore vlcera feruida ac superficialia. & vterus præter rationē aperitur, & ad osculum procidit grauis, veluti plumbū. Et dolores per femora tendunt. & omnia inferna perfrigerantur, ab imo ventre inchoantia vsque ad pedes. & placentæ torpēt, ac ingredi non possunt. Tales difficile est à morbis liberare. Nam & ætate prouecta sunt, & afflictiones cōsenescunt. Nisi casus aliquis spontaneus forte fortuna allapsus ipsas soluat. Has exhaustire *Curatio.* oportet quū redundarint, per pharmaca quæ bilem flauam

HIPPOCRATIS LIBER II.

non purgant. Sed urinā cientes his pota conferunt, & capitis D
 purgationes, & illuuiēs, & epithymi albi potus, & deambula-
 tiones. & omnis reficatio in victu. Hæc ubi fecerint, sanæ
Profluuiū quidē penitus nō fiunt, facilius autem degunt. Fluxus albi
aliud albū alterius curatio. Purgatur album subluteū, & quum mingit,
 morsum percipit, & lancinatur, & vterus vlceratur. & febris
Curatio. corripit acuta, & calor multus, sitis, vigiliæ, & mente mouen-
 tur. Et quū aliquid festināter egerit, anhelatio ipsam inuadit.
 & mēbra exoluuntur. Hæc mecona, hoc est pepulum album bi-
 bere oportet, & vrticæ semē, & quod præstat, mali punicæ dul-
 cis radicem, & rhoem, ac gallam. Hæc in vino acerbo bibēda
 dato, & mali punici succū, aut caseum caprinum ammisceto.
 Subter autē suffito zeam, & grossos hybernos, & oleæ folia, E
 & scabiē eiusdem, & cucumeris syluestris cortices ex tertia
 parte, reliqua paribus portionib. Sorbeat etiam olera cocta,
 & sorbitiōes ex amygdalis & sesamo. & gestetur ac curru ve-
 hatur, & nō quiescat. Alius fluxus. Desiuit multum velut
Profluuiū vrina ouilla. color est albus, & tota intumescit, & in tibiis e-
aliud. minetiæ laxæ & rubicūdæ emergūt. & si digito attingas, no-
 tæ foveas præ se ferentes tibiis ac pedibus imprimuntur. & si
 quid edat, impletur ac inflāmur. & ubi iter fecerit, & opus
 aliquod obierit, anhelatio & dolor ipsam corripit, & color al-
 bus, quādoq; subluteus. huic si robusta & iuuecula fuerit, &
Medela. alia apparuerint, ab initio pharmacū sursum ac deorsum pur-
 gans bibendum dato. & caput purgato, si pituitosa est, per ea
 quæ pituitā purgāt. Si vero biliosa, per ea quæ bilē. & si tēpus F
 anni fuerit, & à natura nō est lienosa, & si quid ex relatis fue-
 rit, serū dato. Decoquat autē hoc & bibat q̄ plurimo tēpore.
 & ad vesperā vinum dulce aquosum, si opus habuerit. Cibus
 vero ne cōringat. Si vero debilis fuerit, sorbitione modica v-
 tatur. & nō lauet. Postquā autem tēpestiuum esse tibi videbi-
 tur, à potu cesset. & post purgationē cibis vtatur, ita vt absti-
 neat à pinguibus, & acribus, & dulcib. ac salis. & ab oleribus
 acribus. Vtatur autē piscibus petrosus, & carnibus ouillis, aut
 volucrium, aut leporinis. pane frumētaceo, aut ex ordeo fre-
 so. & oleribus coctis vtatur, & syluestribus quæ cruda edun-
 tur, itemq; hortēsis, acribus exceptis. & deambulet mane
 & à cibo. Vbi vero his factis sicciore esse visā fuerit, vteros fe-
 ce vini colluit. & trib⁹ aut quatuor dieb⁹ interpositis, post-
 ea acerba

A ea acerba infundito. & intermissiōe facta, si quidē sicca fuerit, quiescito. Et si à natura fuerit biliosa aut pituitosa, à victu vero & pharmacorum potiōe attenuata, & se recolligere nō poterit, lac bubulū bibat per quadraginta dies, calidū de vacca. Præstat tamē pituitosam cibis quā paucissimis vti, quādiu lac biberit. Sit autē mēsurā sex heminarū Atticarū. Incipiatque à duabus, & singulis diebus vnā apponat, donec sex fiant. & inde paulatim ad duas rursus descēdat. & post lactis potum, cibis reficito & per victus rationē & post lactis potū, mane ieiuna adiantū bibat. hoc siccātū, tūsum, & exacte cribratum, in vino nigro odorato diluto exhibeto. Si vero reuertatur morbus, totā ipsam foueto. & rursus pharmacis infra

B purgato. & postea vteros colluito, si quidē natura fuerit pituitosa, per cnidiū granum, aut thapsiæ radicē. Si vero biliosa, scāmonix succo, aut colocynthide syluestri. hāc enim cōiectā, duab⁹ aquæ heminis affusis, coquere ad dimidias oportet, & huic mel, & oleū narcissinū aut anthinū ammiscere. Sit autē mellis quadrās hemina, olei vero hemioliū mellis, hoc est mēsurā ipsius totā, insuperq; dimidia. Postea vero colluēdum est melle, & vino, & oleo solo. & suffitus adhibēdi, & tribus aut quatuor diebus quiescendū. Bibat autē ad iātum. & si in ventre nō conceperit, morb⁹ reuertitur. & si morb⁹ reuertitur, perit. Quū vero seniores morbus hic corripuerit, etiam vteri cōputrescunt. Valde vero pauca euadūt. Alius flux⁹. *Profliuū aliud.*

C Purgatur velut ex ovo crudo luteū subalbidum, & vlcera tumentū. & tument pedes ac tibiæ. & cauæ oculorum partes intumescūt. & oculi humidi ac lachrymosi sunt. & si iter faciat, anhelatio ipsam corripit, & debilitas oboritur. Si vero euaserit, morbus pituitosus fuerit, & si nō purgata fuerit, febricitat, bile vehemēter cōmota, Seniores autē hic morbus magis inuadit q̄ iuniores. Quū sic habuerit, si quidē vehemēter intumuerit, pharmacū deorsū purgās bibendū dato, quod pituitā & bilē purgat. Si vero nō fortiter tumuerit, & pituitā ipsam prefferit, pharmacum sursum purgās dato. & si quidem potens fuerit, veratro purgetur. Sin minus, pharmaco quod bilem & pituitā ducit. Post pharmaca vero serum coctum bibendū dato, per plurimos dies, cū modico sale. Edat autē insuper mentā. Ad vesperā cibum ne attingat, sed modicū sorbeat, & vinū dulce insuper bibat, si opus habuerit. Si vero nō affuerit

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Lac asini-
nū pro ser-
ro.* affuerit serum, lac asinū coquito, & exhibeto per quatuor **D**
dies. Ad vesperā vero eadē faciat, nisi febris noctu corripiat.
Si vero natura fuerit lienosa, aut flatuosa, & exanguis, neque
serū, neq; lac bibat. Sed purgātibus inferne purgato. & vbi ti-
bi tépestiū vīsum fuerit, vteros colluito, primū quidē medi-
camēto ex vini fece, bis aut ter. Post hoc scāmonia succo. Af-
fundito autē ad hunc, vinū dulce, hemina Atticæ mēsurā, &
olei narcissini maxime, quartā hemina partē. Postridie vero
cum vini hemina colluito, & mellis quarta hemina parte, &
resinæ tertia mellis parte. Oleū autē sit melli æquale. Si vero
ea quę ab infusa collutione secedunt, p̄dierint pituitosa, etiā
rursus colluito, interpositis tribus aut quatuor diebus. post-
ea grani cnidij duas potiones decorticato, & ipsas infundi-
to. Si vero nō affuerit cnidium granū, radice thapsiæ potio- **E**
nem vnā infūdito. & postea iisdē colluito. postq̄ autē purga-
ta fuerint ea quę secedunt ad has collutiones, & si prodierit
aliquid cruentū, velut ab vlcere, per acerba postea colluito.
& si post hęc ipsa interrogata, dixerit os vterorū durū esse,
& dolorē habere, eodē modo eo quod paratur cū butyro col-
luito, donec vteri fuerint resiccati, & sana esse videbitur. die-
bus vero inter collutiōes intermediis, sambuci fructū bibat,
& leporis coagulū, & pepli corticē, & vrticæ semē, & mali pu-
nici dulcis corticē, ita vt de singulis pares portiōes terat, &
polentā ac adiantū ammiscat, & in vino nigro odorato ier-
iua bibat. cibis aut vtatur mollib⁹, nō salis, neq; acrib⁹. Car-
*Caro quę
bis dāda.* nes autem prestāiores sunt pisciū, aut volucriū, aut leporinę. **F**
& lauetur calida nō multa. Si vero nō quiescat fluxus, sed re-
linquatur, & vteri humescāt, medicamentū ex malicorio suf-
fito. & postea virū accedat. & si in vētre cōceperit, sana eua-
dit. At seniores à morbo leuari nō possunt, sed pereunt præ
debilitate. Fluxus alius. Fluit subluteum velut ex ovo, &
*Profluuiū
aliud.* viscosum, & vter imus intumescit, ac durus fit. & si cōtingas
doler, & dentibus stridet, & febris occupat. & dolor ad pubē,
& ad pudēda, & ad imū vētrē, & ad lūbos irruit. & animi de-
liquium, & anxietates, & perfrigeratiōes, & sudor multus, &
pulsus ad manū accelerātes, debiles, deficientes. & statim pe-
*Medela
nulli his
datur tan-
quā despe-
ratis.* reunt. Si vero supstes māserit, & color ipsi mutat, & fit velut
faustus aut cera. & si corpus digito prematur, mollescit, & note
velut in massa farina subacta fermēto imprimūtur; & pedes
intume-

- A** intumescunt ac crura. Hic autē morbus fit maxime, si in ipsis aliquid dilaniatū fuerit, aut intus cōputruerit in partu. Seniores autē magis afficiuntur. & huiusmodi morbus nō est valde leuis. Alius fluxus. Purgatur velut à carnib⁹ assatis, hu- Profluxuū
aliud. mor, & pudendum exulceratur, & ad quācūq; aliā corporis partē destillat. Et rigor, & febris acuta, densa, magna, & simul horror corripit. Dolores autē quales in omnibus fluxibus. Hæc tota intumescit, & infra vmbilicū, & cruribus. & color fit morbi arcuati. Talis autē fluxus ex hoc fit. Postquam sanguis exhaustus, subbiliosus factus fuerit, & nō fuerit purgatus. Quum sic habuerit, pharmacū bibere oportet, Si quidē fortis fuerit, ex veratro. Si vero debilis, radicē & elateriū. &
- B** posteriore tempore lac caprinum. Aut pharmacum deorsum purgans dato, quod bilem & pituitam ducit. Vteros autē medicamento cum brassicæ decocto parato colluito. Bibat autem saluiam, hypericum, apij semen, singula in vino nigro austero. Ieiunæ autem hæc bibendā dato. Si vero vlceratū fuerit pudendum, postea butyro colluito. Deinde pharmacū bibendum dato, & vlcera butyro, resina, myrrha, flore argenti illinito. Perluantur autem myrti ac saluæ ex aqua decocto tepido. Cibis vtatur neq; salūs, neq; acris. vt ne mordax vrina fiat. & à marinis prohibeatur. & carnib⁹ bubulis, & ouillis ac porcinis. Aliis autē carnibus vtatur coctis. Edat etiam panem, & vinum vetus odoratum nigrum bibat. Si vero hæc fecerit, & sana nō fiat, totam foueto, & postridie pharmacum sursum purgās dato. Deinde intermissione facta, rursum quod infra purget. & si quidem manserit fluxus post pharmaca, decoctum serum quotidie bibendum præbeto. Vesperi vero sorbitionibus, & vino dulci albo vtatur. Si vero non affuerit serum, lac asininū coctum per dies quatuor bibat. Ad vesperam autem iisdem vtatur. Postea per dies quadraginta lac bubulum calidum bibat. & per diē nihil edat, vt ita dicā. Optimum enim hoc est. Nā & purgatur, & nutritur, & fluxus obtunditur ab huiusmodi lacte. Vesperi vero cœnet carnem volucris modicam assatam, & panem modicum subcineritium. Bibatque insuper vinū nigrum vetus vinosum, quādiu lac biberit, si multa prodierint, & acrimonia vexarit. & si his factis in ventre cōceperit, sana fit. Quæcūq; vero seniores sunt, in his morbus quandoque reuertitur, & pereunt. Iuuentulis autē Nutricat⁹ non est

HIPPOCRATIS LIBER II.

non est lethalis. Diuturna porrò est saniosi fluxus curatio. D
fluit autè talis suberuentus, velut à carnibus assatis humor, &
mordet velut muria, & corrodit ac exulcerat pudenda. & vte
rus exulceratur circūcirca, & fœmora, & aliæ partes. & vbi su
per vestes destillarit, tinguntur & egre elui possunt. & venter
attollitur ac durus fit, & ad cōtactum dolet. & calor corripit.
& dolor ad pudenda, & sedē, & imum ventrē, & laterum mol
litudinem, & coxas, & lumbos irruit. & impotētia adest. & co
lor mutatur, velut morbi arcuati. Si vero tēpus & morb⁹ pro
ducatur, hæc omnia amplius corripiunt. & caux partes attol
luntur, & pedes tumēt, & crura à lumbis. At hic morbus cor
ripit vbi quid de fœtu dilaniatū fuerit, aut in abortu, aut in
partu. Oportet autè fomenta adhibere, & suffire, & bibenda

*Causa hu
ius morbi.
Medela.*

præbere omnia ea quæ fluxū sistunt. & lac asininū & alia ex
hibere. & vomere si opus fuerit. Si vero sine febre fuerit, &
debilis febris habuerit, siccum fomētum adhibere melius est.

*Strangula
tio varia.*

Quum ad caput conuersi fuerint vteri, & hac parte suffo
catio definit, caput grauatur. Verum aliis alicubi aliàs finis ha
betur. Signū autem hoc est. Venas in naso, & partes sub ocu
lis dolere dicūt. & sopor altior tenet. & spumat, vbi leuius ha
buerit. Hæc multa calida lauare oportet. Si vero nō obediat,
frigida etiam circa caput, ita vt laurum & myrtū in aqua co
quas, ac frige facias. Vnguento aut rosaceo caput illinatur, &
odorata subter suffiātur. graueolentia vero sub nares. & bras
sicam edat, & succum sorbeat. Si vero ad cor progressi vteri
suffocent, & aer impeditus violenter attrahatur, anxia est & F
vomit. & quibusdā statim tractus deorsum cedit, & flat⁹ exit.
& aliqua quidem vomit spumosa. alicui vero quies cōtingit.
Quibus autem non decedunt, his porri semen, & peplū, trita
& tribus aquæ cyathis diluta, bibenda dato. Auxiliatur & a
ceti albi cyathus potatus. Aut iuniperi fructū & saluiā dato,
aceto aut vino ad has species ammixto. Oportet aut ipsam ca
lesceri. Aut adipē sumere anserinū, & ceratum resinatū ac pi
cem, in ipso liquefacere, & subdititias glandulas efformare.
Quum autè ad præcordia allapsi strangularint, vbi hic fuerit
affectionis soliditas, & vomitus feruidus acris corripit, & mo
dico tempore mitior fit, & dolor ad caput & ad collū pene
trans. Tepesfactoria igitur apponito, si sursum strāgularint.
Sub nares vero graueolentia suffito, sensum progrediendo: Si
enim

- A** enim aceruatim vteri infra decedunt, turba oboritur: Odo-
rata vero inferne. & castoriū ac conyzā bibēda dato. Quum
vero deorsum tracti fuerint, abomināda subter suffito, sub na-
res autē odorata. Si vero dolores quieuerint, pharmacū deor-
sum purgās bibendū dato. & postea lac asininū aut serum bi-
bendum præbeto, si nō lienosa fuerit à natiuitate, aut exan-
guis, aut decolor, aut auriū sonitus habuerit, velut hæ quibus
propter cognationē morbi à iuuentute sunt familiares. At si
pernum ventrē ne moueto. cæcutient enim, aut circa fauces
turbationes, & alia infestabūt. Verum ptisanæ succū dato. Si
vero etiam valde facilis sit ad vomitū, vomat. Collutio autē
optima est ex narcisso. Subdititiū vero id quod ex canthari-
dibus præparatur. Quum vteri apud præcordia constiterint, *Cum superi-
rior uterū
culus non
uexādus.*
suffocatur velut à veratro. & recta ceruice spirat. & stomach⁹
fortiter vellicatur. Quā dā etiam vomunt quādoq; saluā aci-
dam. & os aqua impletur. & crura perfrigerantur. Tales si nō
breui à præcordiis vteri discedant, loqui nō possunt. & par-
tes circa caput ac linguā torpor occupat. Proinde ad vteros
quidē lanam q̄ maxime fieri potest ad foramen apponito, ita *Curtis
que.*
vt pennę obuolutā, vnguento albo aut Aegyptio, aut Baccha-
rio, aut amaracino tingas. In nares vero, de pharmaco ni-
gro ad caput præparato, specillo exceptum infarcias. Si vero
hoc nō fuerit, filphij succo nares illinas. Aut pennā aceto tin-
gito, & immittito, naresq; illinito. Aut sternutatoriū apponi-
to. Quū autem cōclusum fuerit osculū & internus trames, ca-
C storium in vino bibendū dato. Nares vero phocæ adipe illi-
nito. Lanā autem appositā finito, donec cōfidant. Quum autē
quieuerint, auferre oportet. Si vero ea ablata rursus recurfa-
rint, lanā rursus eodē modo apponere. Sub nares vero cornu
capræ nigrū, aut ceruinū suffire. scalpum & in cinerē calidū
inspersum, quo maxime suffumigetur, & nidore sursum per
nares q̄ maxime potest trahat. Suffito etiā phocæ adipē, pruni-
nis testæ impositis, ipsaq; obuelata, & capite imminente, quo
odor maxime ingrediat, ita vt de adipe instilles. & ipsa odo-
rem sursum trahat, os vero clausum habeat. Et si quidē sursum
allapsi fuerint vteri, hæc facere oportet. Si vero ad hepar cō-
uersi fuerint vteri, mulier derepente voce destituitur, & den-
tes cōserti sunt, & color liuidus fit. Derepente vero hæc pati-
tur sana existens. Cōiungit autē maxime virginibus antiquis,
& viduis

HIPPOCRATIS LIBER II.

& viduis quæ pepererunt aliquâdo, & viduitatē agunt. Maxime vero contingit omnino nō ferentibus vterū, & sterilibus, ex partu. Non enim prodit puerperij purgamentū, & nō intumescit vterus, neq; molliitur, neq; vomunt. Quū sic habuerit, tumorē ab hepate cū manu infra leniter detrudito, & præcordia cum fascia deligato, & os aperito. Vinū vero odoratissimum dilutū infundito, quādo sanē etiā graueolentia ad nares adhibere ac suffire cōuenit. ad vteros vero odorata & suffimenta, & postq̃ sic curaueris, pharmacū deorsum purgans bibendū dare oportet, si quidē biliosa fuerit, qđ bilē purgat. Si vero pituitosa, quod pituitā. Et postea lac asininū coctū bibendum præbeto. & vteros odoratis foueto. & medicamentū quod cum hypræsti præparatur apponito. postridie vero ne-topum. Interpositis autē duobus diebus rursus vteros odoratis colluito. & postea intermisso die, aromatis suffito. Atque hæc vidua faciat. Optimū autē in ventre habere. Virginē vero persuadeto vt viro cohabitaret. Ad nares autē nihil adhibeto, neq; medicamentū ieiuna bibat. Verum castoriū & conyzam in vino odoratissimo bibat per dies viginti, & caput odorato aliquo ne vngat, neq; aliquod odoratū olfaciat. Si vero vteri inflāmati fuerint circa latus, si cōtingeris durū appareat. & quū ad præcordia allapsi fuerint, strangulant. & vomit pituitam acidā. & dentes stupeſcunt. & vbi vomuerit, melius habere videtur. Quum vero deorsum processerint, discedunt de ventre aliās alio. Maxime vero ad laterū mollitudinē quādoq; incidunt, & ad vesicā, & vrinæ stillicidium corripit. & ad sedem, & cacare sibi videtur. & menses prius aut posterius solito sunt, aut nō statim huic apparēt. In hoc morbo si sursum strangularint, tepeſactoria apponito. & graueolētia ad nares iuffito, ad vteros aut odorata. & conyzā fœminā, & castoriū, in vino ieiuna bibat. postq̃ vero ad naturā suam cōſederint, placide suffito. Bibat aut vrinā cientia. Atq; hæc faciat q̃ diu dolores tenuerint. Vbi vero quieuerint, totā foueto. Deinde pharmacum deorsum purgans bibendū dato, si biliosa fuerit, quod bilē purgat: si pituitosa, qđ pituitā ducit. & lac asininum bibendū dato, aut serum caprinū decoctum. Si vero lienosa fuerit, lac ne bibat, neq; serum. & in purgationib⁹, cibis vtatur mollibus, & per aluum ſecedentibus. pisces aut meliores sunt carnibus. & vteros foueto, aut subdititiis purgato, ipsosque

Medela.

*Vterorū
inflāmatio
diuersifq;
eorum af-
fectus.*

Medela.

Curatio.

Afoſque colluito. & vbi ſuffitum admifit, ad virum accedat. Solutio vero morbi cōtingit, vbi in ventre cōceperit. Si vteri *Cum uteri*
ad latera allapſi fuerit, tuſſis obtinet, & dolor ſublatus. & inſi *latera pe-*
det vterus durus velut pila: & ad contactū dolet, velut ab vl- *tunt.*
cere, & cōtabeſcit, & videtur ipſi peripneumonia eſſe, & con-
trahitur, & gibboſa fit, & menſes nō apparent, Aliquibus autē
quibus prius apparuerunt, etiā pereunt. & ſi tunc prodeāt, im-
becilles ſunt, & pauci, ac deteriores. & genitura nō fit hoc tē-
pore. Quum ſic habuerit, pharmacum deorium purgās biben- *Medela.*
dum dato. & multa calida lauato, & ex tepeſactoris quacun-
que admiferit adhibeto. & à quib⁹ ſanguis purgatur ea appo-
nito. Et lini ſemen torreto, tundito, ac cribrato: & peplū albū *Curatio.*
& ſaluia cum tenui polenta, & caſeum caprinū muria dera-
ſa. Hæc miſce, vt caſei ſint partes duę, reliquorū vero, & polen-
tæ nō ſalſa pars vna, & ieiuñe in vino bibenda dato. Veſperi
vero cyceonem craſſum melle aſuſo exhibeto, & ex poribus
quencunq; admiferit bibendū dato. Et frequenter fomētum
adhibeto. & calidā aſpergito. & per ceratū leniter mollito, ac
à latere detrudito. & latus ſcīa lata deligato. Et lac bubulū
q̄ plurimum ad dies quadraginta bibendū præbeto. Cibus au-
tem vtatur q̄ molliſſimis. Morbus hic vehemēs eſt & lethalis,
& pauca etiā ſic curentur effugiunt. Si vero in lumbis fue- *Cum uteri*
rint vteri, aut in lateris mollitudinē, & ſpiritus ſublimis iue- *lumbos mo-*
rit, & ſuffocatio habeat, & anhelatio denſa ipſam corripit & *leſtant.*
moueri nō vult: ſulphur, aut bitumen, aut cicutā, aut myrrhā *Medela.*
C terito, & melle cocto aſuſo, glādulā longā efformato ac craſ-
ſam, eamq; in ſedem indito. Si vteri deuoluerint ſeipſas ad
intermediā lumborū ac coxarū partem, dolor habet inum
ventrem, & crura cōtrahuntur, & iuncturas coxarū ad ſedem
dolet. & quum aliū exonerat, dolores emergunt acuti, & ſter-
cus cum violentia p̄dit exiguum, & vrina deſtillat, & puſilla
nimitas ipſam corripit. Quum ſic habuerit, fiſtulā ad veſicam
alligare oportet, & oleum calidū in vteros infundere. Et fo-
mentum adhibere, aut multa calida aqua lauare, & in oleū &
in aquam deſidere. Suffire autē ſubter pudēda, graueolentia.
ſub nares vero odorata. poſtq̄ autē dolor queuerit, pharmacū
ſurſum purgans dato. Infernū vero ventrē turbare nō oportet.
Vbi vero vteri cōfederint, pharmacū deorium purgans bi-
bendū dato, & lac aſininū, ſi nō fuerit lienofa. Poſtea ſomēta
adhibeto

HIPPOCRATIS LIBER II.

adhibeto vterosq; aspergito. & subdititium purgatoriū quod cum lauro præparatur, & nō mordet, apponito. Deinde aromatis suffita, ad virū accedat. & si in ventre habuerit, sana fit. Verum pleræq; steriles & cruribus mutilatæ sunt. Quibus *Cū os uterorū aliud uertitur.* cunq; osculum alio inclinatur, & ad coxam allabitur. Cōtin-
gunt enim & hæc, quæ vterum purgari phibent, & geniturā suscipere, & liberos gignere. Hæc odoratis fouere oportet. & postea *Curatio.* post fomentum, digito reuellere & à coxa disparare. Nō enim velociter cogi potest, velut dictū est. Quum autē ad naturālē situm redierit, & vteri aperti fuerint, subdititiis mollior purgato, & alia cōuenienter facito. Quibuscunq; vteri ad coxam colla-
buntur, si nō breui discedant, & rursus in locum suum redeāt, ad coxam resiccātur. Necessarium est autē osculum auersum esse, & in supernis detineri. Quum vero auersum fuerit, cōclu-
sum esse. Ex auersione vero ac cōclusionē, durum fieri, & mu-
tilatum esse. Vbi vero vteri cōclusi fuerint, menses sursum ad māmās delegare, & ad pectus ascendere facit & imus venter attollitur, & inexpertæ in ventre se habere putāt. Talia enim *Quid mulieres falsat.* patiuntur, qualia prægnantes, vsq; ad septem aut octo menses, & venter pro temporis ratione crescit. & pectora eleuantur, & lac innasci videtur. Quum autem hoc tempus præterierit, & māmæ gracilescunt ac minores fiunt, & venter idē per-
petitur. & lac euanescit. Venter item eo tempore in quo se pariturā sperabat, euanescit ac cōcidit. His vero cōtingentibus, vteri modico tempore fortiter cōtrahuntur, & osculū ipso-
rum reperire nō datur. adeo omnia contrahuntur ac resiccantur. & in māmīs tubercula fiunt dura, partim maiora, partim minora. Hæc autem non fiunt suppurata, sed semper duriora. Deinde ex ipsis nascuntur cancri occulti. Quum autē cancri futuri sunt, prius ora amarescūt, & quicquid ederint, oīa amara esse vidētur. & si quis plura dederit, accipere renuīt, & cōpescenda faciūt. Mente vero percellūtur, & oculi duri fiunt, & nō acute vident. & ex māmīs dolores ad iugulū trāsiliunt, & sub scapulas. & sitis tenet. & māmæ graciles, & ipsæ per totum corpus attenuatæ sunt. & nares siccæ ac obstructæ iunt, & nō leuant. Spiritus est imminutus, & nihil omnino olfaciunt. & in auribus dolor quidem nō oboritur, verū aliquando callosa cōcretio. Quū igitur ad hoc temporis pgressæ fuerint, sanæ

- A** sanę fieri nō possunt, sed pereunt ex his morbis si vero priusquam huc perueniant curatę fuerint, & mēses soluti fuerint, sanę sūt. At vero curare tales oportet hoc modo. Primū qui *Cura que* de omniū si adhuc fortē assumpseris, reliqui corporis respectu habito, quacūq; tandē purgatione opus habere videtur, medicamentū exhibeto. Vbi vero corpus pręparaueris sic ad vterorum medelam procedito. Si vero totū corpus minime mouendum esse videatur, neq; morbi causę hinc proficisci, verum vteri ā seipsis morbū habeant, curam hoc modo auspicare. Primum quidē vteros sic foueto. Ollę duas sextulas capienti, operculū imposito ac adaptato, vt nihil pręterspiret, deinde vero operculi fundum pertūdito ac foramen facito. *Fomentū aduerse.*
- B** In foramen autem arundinem indito lōgitudine cubitalem. Oportet autem arundinē operculo probe adaptari, vt penitus nihil pręterspiret. Quum autē hęc paraueris, operculum ollę obdito, lutoq; oblitito, & vbi hęc feceris, fossam duorū pedum altitudine effodito, ea magnitudine quę ollam capere possit, postea vero ligna immissa vrito, donec fossa ab igne exscandescat. Quod vbi factū fuerit, ligna ac prunas quę crassissimę ac ignitę fuerint eximito. Cinerē vero ac fauillam in fossa relinquito. Quum autem olla efferbuerit, vapor sursum processerit, si quidem valde calidus fuerit vapor, abstineat. Si vero nō, summę arundinis parti infideat, ipsamq; in vteri isto machum indat. Atq; sic fomentū admittat, Si vero perfrigeretur, prunas ignitas adiicito, cauēdo vt ne acutum fomentū facias. Si vero adiectis prunis, acutum fiat fomentū, magis q̄ cōuenit, prunas detrahito. At vero hoc fomentū clementi cōlo parare oportet, vbi vctus nō afflarit, neq; perfrigeret. Ipsam autem indumētis obuclatā esse oportet. Cæterum in ollam allium siccum iniicere oportet, idq; magis cōminutum q̄ ea quę sunt cōtusa, & aquā affundere, quo ipsum permadescat, & aqua tribus digitis ipsum excedat. & phocę oleum superfundere, atq; sic calefacere, ac fomentum adhibere per multū tempus. post fomentū vero si potens fuerit, lauetur toto quidem corpore ad voluptatē, lumbis autē & partibus infra vmbilicum, amplius. In cōnā porrō dato mazā, panem, & allium coctum. Postridie vero si quidem exoluta fuerit ā fomento, eam diem intermittito. Sin minus, rursus fomentū adhibeto. A fomento vero si cōsiderare hoc potest, osculum cōtingere
- N iubeto,

HIPPOCRATIS LIBER II

Cibus.

iubeto, num fomentum ipsum vteros flatu implet. Si enim fla-
 tu implentur, osculum ex valida auersione, & ad coxam alla-
 psu magis dirigunt, ac aperiuntur. Tanquā igitur tale sit fo-
 mentum, & hæc facere possit, sic fouere oportet. Quum autē
 fomētum adhibebis, allium iniicere oportet, & phocæ adipē
 superfundere. Atq; hoc faciendū est, donec vteri videbuntur
 inflati, & osculum fortiter sursum tractū. Nam ad hoc fomen-
 tum talia cōtingent. Post fomentum vero diartā constituito,
 velut priusquā fouebatur. Quum vero cōmoti fuerint vteri,
 ac facile solubiles fiant, scēniculi radicibus foueto, & aliā os-
 lam eodem modo præparato. Radices autē scēniculi elotas cō-
 tundito, & in ollam mittito, & affusa aqua eodē modo fomen-
 tum facito. Postea vero lauato, & ad vesperā mazam cœnet. Si
 vero panem voluerit, & bolbidia parui polyporū generis, &
 sepiolas paruas, in vino ac oleo coquito, & edenda dato. At
 inter fomenti adhibitionē, osculum cōringere coneris, an fo-
 mentum vteres propinquissime adducat, Hos fouere oportet
 ad dies quinq; vel sex, hominis cōsideratiōe habita. & si qui-
 dem exoluatur ac debilis sit, differre ad sufficiens tempus. Si
 vero nō exoluatur, fouere per omnē diem. Post fomēta vero,
 subdititia apponere conare, ex albicante tada pinguißima.
 Illitio autem sit oleum. facito autē hæc lōgitudine quidem di-
 gitorum sex. numero vero quinq; vel sex. figura vero in angu-
 stum abeunte. Sit aut alterum altero paulo breuius. crassitu-
 do vero eius qđ crassissimum est, sit digiti indicis, & forma si-
 milis digito, summa parte tenuissima, in p̄cessu vero crassior.
 Hæc aut leuissima ac rotundissima facito, cauēdo ne vlla ad-
 sit fissura. Apponat aut primum id quod tenuissimū est, & vbi
 apposuit quiescat, obseruans ne excidat. Apponatq; primum
 summā partē, deinde semper amplius, simulq; obtorqueat ac
 circumcirca tēdā intro tradat. & vbi parum suscepit, in hoc
 paruo se cōtineat, cauendo ne excidat. postea rursus eodem
 modo intro tradat, donec quatuor digitorum mensura intra
 osculum vterorū recipiatur. Quum aut hoc suscepit, alterū
 postea apponat simul vt prius insitum aufert, quo priusquam
 osculum cōiueat recipiatur, dum adhuc rectum est & aper-
 tum. Hoc autē ita cōtinget, si alterum eximatur, alterum aut
 indatur. Oportet aut & plumbū simile figura crassissime tēdē
 formatum intrudere, qđ cauum sit, quō cōtinere quid possit.

plumbi

A plumbi vero amplitudo sit talis fabricata, qualis in vlcera impellitur, ita vt os ipsius leue sit, & nō sauciet. formato autē hęc velut etiam subdititia ex tædis. Quum autē factus fuerit huiusmodi plumbeus penicillus, adipe ouilla trito ipsū expleto. & vbi ita pręparatus fuerit, tædā quidem subtrahito, plumbū autē indito. Si vero plumbū appositū ardorem exhibeat, plumbū quidē detrahito, tædā vero rursus apponito. Et plumbū in aquam frigidā immergito, & postea rursus apponito, ac tædam eximito. Semper autē aliquid appositum esse oportet, & interdū quidem melius est tædā habere, noctū autem plumbū. Si vero surgere voluerit, cum cautione hoc faciat, quo penicillus intus quiescat. Sin minus, statim rursus subdat.

B Si vero ex tædis apposis nullā suscipiat, tenuiorē facito, donec suscipiat, ex his ad illa trāscundo, & obediētes vteros faciēdo. Si vero neq; osculū aperiri poterit, neq; vteri prope accesserint, rursus ad veterē medicinā redito, à prima ad fecūdā, donec mollescāt, & propinquissime accedant. Et postq̃ aperti fuerint subdititia facta apponito. Sint autē magnitudi-
ne oliuę. Horum autē alterum appositū sit donec lique scat, & deinde alterum apponito. Quum autē apponere voles, ipsū subdititium medicamentum ex resina pręparatum, in oleum rosaceum aut irinum tingito. Nam aliās ab osculo vterorum recedit. Prius tamē plumbū appositum esse oportet, quo recto osculo, in internam osculi partem attrahatur. Postea vero mollitoria apponito. Lauet autem calida, & ante, & post subdititia medicamēta. Et in cœna exhibeto quid ex relatis marinis. Exhibeto autē duobus aut tribus dieb⁹ ab appositione, cōsideratione habita an osculum vterorū bene habeat, & purum sit. Quod si est, ab hoc subdititio quiescito. Postea vero mollitoria apponito. Quum vero inflāmatum fuerit os vterorum, rursus eodem modo pharmaca apponito, reliquaq; facito iuxta relatum modum. Vbi vero probe habuerit corpus, velut dictū est sufflato. Sed & osculum, & vteros sufflare oportet sic. Subdititium factū cum ficu apponito, duo autem subdititia facito, & antequā subdas fomētum adhibeto ex feniculo prius relatum. postridie vero post fomētum, apponito medicamentum. & quum apponere voles, prę omnibus subdititiis vbi vbi prius laueris ipsā ita apponito. postera autem die mollitoria auxiliantur quandiu inflāmati fuerint. post-

HIPPOCRATIS LIBER II.

inflammationem vero alia facito iuxta priorem rationem. fa
 cito item de hoc subditio talia, qualia de priore. Et si quidē D
 in mente semel appositū, satis videbitur inflasse vteros, quie-
 scito. Si vero aliqua opus habuerit, rursus apponito eodē mo
 do quo prius. Postea vero vbi bene habere tibi visa fuerit, &
 tempestiuum esse, fomentum ex suffimentis preparato. præ
 paratur autem hoc modo. Cyperum tusum preparato teste
 conche mensura, & calamus vnguentarium eadem mensura,
 & iunci vnguentarij tantundem. cardamomi tantundē. Cu
 mini item Aethiopici, & anisi, & rutę sicca, & hyperici ac fœ
 niculi seminis. Quum autē hæc preparaueris, vini austeri albi
 odoratissimi heminas sex in ollā infundito, & de cōtusis qua
 drantē inspergito ac permisceto. Deinde vnguenti Aegyptij E
 optimi, aut amaracini, aut irini, trium obolorum pōdus affun
 dito, permisceto, & molli fomento plurimo tempore foueto.
 Ante fomentū vero lauato, & duos aut tres dies foueto. Quū
 autem foueri desierit, operculum quoddā fomento impone
 re oportet, vt ne trāspiret. postea vero tædis & plūbis vtere.
 Quum aut duobus aut tribus diebus fomentum adhibueris,
 alias duas aut tres intermittito. Intermediis autē diebus bis
 in die lauato. Edat autē porrum coctum & crudum, & rapha
 nos, & nasturtium, & allium assatū ac coctum. & potus sit me
 racior. & marinis prædictis vtatur. Quū vero intermedij dies
 præterierint, rursus fouere oportet, ita vt modicum de singu
 lis cōculis ad prius fomentum inspergas, & vinum insuper af
 fundas, si opus esse videbitur, itemq; oleum, atq; cum hoc foueas. F
 Postquā autem fomēta bene habere tibi visa fuerint. &
 osculum molle esse ac apertum, velut cōuenit, & ipsi vteri p
 pe: postera die à fomento, pharmacū quod cum myrrha præ
 paratur apponito. Sunt autem appositicia duo. postridie vero
 post purgationem, mollitoria subdito, quandiu vteri fuerint
 inflammati. postea vero tædis ac plūbeis penicillis vtere. Post
 hæc intermissis diebus quotquot visum fuerit respectu ad in
 flammationes vterorū habito, & virium corporis coniectura
 facta rursus velut scriptum est resoueto. Si quidē prius fomen
 tum adhuc sufficiens esse videbitur cōiectis ad hoc suffimen
 tis velut prius, & vino ac oleo affuso. Si vero inutile esse prius
 illud fomēram videatur, aliud ex integro preparato. Opor
 tet autem hoc pharmacum renouare in singulis adhibitioni
 bus,

A bus,quandiu subcruenta purgantur.Si vero talia purgata fuerint,quiescat.Dieta porro hoc modo constituatur. Interrogato in quibus diebus menses ipsi prodierint,& ab his initio facto,hanc dietam præscribito. Primum quidem multa calida lauetur,capite excepto. Quum autem cessauerit, caseum acrem, & rutam, vino nigro pari aqua temperato diluito, & postea polenta inspersa,statim ex balneo bibenda dato. Deinde prandium tempestiue exhibeto.Edat autem mazam aut panem,& porrum coctum aut crudum,& de huiusmodi omnibus acribus præscriptis, & aliquando leguminis fracti decoctum:spumam autem ne detrahito,& sulphium multum de rasum addito,ac multa allia incoquito. Obsoniis autem vtatur piscium,chartilagineis omnibus coctis aceto mulso dulci,

B aut fauorum cremore cocto: bolbidiis,polypodiis, in vino & oleo. & silphij semen tritum bibat. & quam plurima tum in prædio,tum in cœna edat.Lauetur autem post cœnam, quum requiescere volet. Hac dieta ad dies quinque vel sex vtatur. post hos dies,mane ieiunæ sambuci fructus baccas sex, in vino meraco dato,& sepiæ oua decem aut duodecim.Hæc tria simul mane ieiunæ bibenda præbeto. post hoc vero pharmacum,potionem dato. At vbi interquieuit lauetur. Sit auté potio,ruta & caseus,atque sic prandeat præscripto modo.Serius autem cœnet.& semper bis in die lauetur.Hæc auté digesta ad dies tredecim aut quatuordecim procedat. Quum vero hi dies præterierint,catapotia ex succo silphij fabæ magnitudine formato,atque hæc primum dato,postea vero alia præscripta facito. Quum auté dies transacti fuerint viginti quinque in hac dieta,reliqua quidem facito eodem modo. Ante prandium vero vbi prandere volet,allij segmenta quatuor,& caseum acrem tali magnitudine, terito & polentam modicam ammisceto,ac massam efformato,eamque primum edendam dato. Ante cœnam vero meracum absorbeat, atque ita cibum capiat.De cætero vero eadem dieta vtatur. Quum autem nouem dies reliqui fuerint ad tempus mensium,primum hoc dato. Cum ouis & sambuco, cuminum Aethiopicum, & castorij obolum,Vbi vero duo dies reliqui fuerint,ab his omnibus potionibus ac catapotiiis abstineat. Verum pharmacum cum tæda præparatum ieiuna vbi lauit,umat. Post medicamentum vero potum,mercurialem & brassicam simul in aqua

Victus.

HIPPOCRATIS LIBER II.

cocta dato, cum aceto mulso dulci, aut fauorum cremore co-
cto, sale, silphio & oleo condita. Atque hæc in prandio eden-
da præbeto, & succos sorbendos. & potum meraciorem bi-
bat. Obsoniis autem vtatur polypodio cocto aut sepiolis. &
hæc quidem in prandio. In cœna vero sumat carnem capri-
nam, aut ouillam, aut agninam percoctam, & porrum, & alia
acria, quæcunque voluerit. A cœna vero lauetur. & hæc sit
diæta postremis duobus diebus. Si vero ex hac diæta men-
ses non fuerint detracti, sequenti mense eandem diætam ab
initio repetito, vsque ad postremos duos dies. In quorum
priori apposititia facta apponat, iuxta superiorem rationem,
ex pharmaco in aqua facto. Apponat autem prælota. Ve-
rum cōsiderare oportet etiam vteros quomodo habent, quo
semper omni tempore bene habeant, & os rectum ac aper-
tum sit, & si ita visum fuerit ante appositionem fomenta ad-
hibeto. Quod si eruperint menses, si quidem frequentes fue-
rint, paucioribus lauacris vtendum est, & reliqua diæta ac cu-
ratione. Si vero pauciores, pluribus. Si vero significationem
de se præbuerint, rursus eadem diæta vtendum est, ac cu-
randum donec menses apparuerint. Quum autem semel ta-
libus prodierint, optimum fuerit in ventre concipere. At-
que hæc est omnium huiuscemodi morborum curatio. Si
vteri contingant coxam, & incumbant, dura ac solida sit co-
xa ad lateris mollitudinem. & dolores imi ventris. & ad ip-
sam lateris mollitudinem, & lumbos ac crura dolor incidit
ac extenditur. & suppurantur, & linamentis opus habent, &
pereunt, nisi quid feces aut vras. Quum sic habuerint, phar-
macum deorsum purgans bibendum dato, & multa calida la-
uato, & vteros foueto, ita vt vrinam veterem in peluim in-
fundas ac feruefacias, & supra ipsius cavitatem mulierem col-
loces vestibus contectam, vt ne præterspiret. & si frigeat
vrina, ferri igniti frusta in vrinam immittas, & fomentum fa-
cias donec se obscure videre, & animo deficere dixerit. La-
uato autem calida aqua, & postea digito contingens os vte-
rorum ad sanam coxam trahat. Et noctu mollitoria apponat.
Postquam autem dixerit directum esse, facto prius cum odo-
ratis fomento, rursus mollitoria quædam apponito. Imò &
plumbeos penicillos per triduum, singulis diebus vnum. post
hos vero bryoniâ albam, aut scillam per triduū, postea vera
consideratis

*Cum vteri
coxæ dicitur
petunt.*

Medela.

A cōsideratis mēſibus diſce, an bilioſi ſint, aut pituitoſi, aut an ſanguis ſit corruptus. & ſi opus fuerit ipſi ſanguinē purgare, quocunq; maxime opus habere tibi viſa fuerit, id apponito. Et poſtea cū eiufmodi colluito. Apponito autē ſubdititia medicamēta, donec ſanguis purus educatur, & hoc per trideū fa cito. Deinde ceruinū adipē liquatū, molli lana eo imbuta apponat. poſtea per diē pulegium ſubdat. & aromatis ſuffita ſic ad virū accedat. Si vero ex partu morbus fiat, vbi ex vrinæ ſomēto penitus purgata eſt, ſtatim ad odorata accedat. & poſtea lota, oleum albū Aegyptiū ad ſanam coxā apponat, & ſuper hanc decūbat. Si vero neq; ad hāc tranſmoueantur vteri, ieiuna pæoniæ grana nigra quinq; in vino odorato bibat. Et in cibo ſumat allia cruda, & aſſata, & cocta. Obſoniis autē

B vtatur pauciſſimis. Si vero ſana nō fiat, ſimiliter ipſam purgato velut in priore dictū eſt. Caterum in hoc morbo ſi non ſtatim in vêtre habuerint, ſteriles ſiūt. Si vero ſic habuerint, menſeſq; nō ſiant, neq; febrilis calor corripiat, primū pharmacis ſurſum maxime purgato. Si vero debilis fuerit, deorſum. Et poſt pharmaci potionē, ſi pituitoſa eſſe viſa fuerit, vomat ieiuna, & accepto cibo. & plerūq; ſana fiet. Si vteri ad coxam decurrerint, menſeſ craſſi exiſtentes nō prodeūt. Verum dolor ad imum ventrē procedit, & ad lateris mollitudinem, & morſum percipit. Quū ſic habuerit, multa calida lactuaro, & allia plurima edenda dato, & lac cōuenienter bibendū. deinde vinum meracum. & totā foueto. & pharmacū ſurſum purgans exhibeto. Si vero debilior fuerit, infra. Si vero curata fuerit, vteros cū ſceniculo foueto, & abſinthium ammiſceto. Poſtquā autem recens ſota fuerit, os vterorum ſenſim, cum digito ad ſanam coxam detrahito, ita vt & ipſum os, & partes circūcirca affectas leniter mollias, & mollitoriū quoddā apponas, & poſtea plumbeos penicilloſ, & mox ſcillam, deinde narciſſinū vna die interpoſita. Quum vero pura eſſe viſa fuerit, netopū apponat in lana. & poſt ridie oleum roſaceū. At menſibus prodeuntibus, melius eſt nō apponere. Si vero nō prodeant, cantharidas quatuor ſine aliſ, ſine pedibus, & ſine capite, & pæoniæ grana nigra quinq; & ſepiæ oua, & apij ſemen modicū, in vino bibat. Et ſi dolor aſſuerit, & vrinæ ſtillicidiū vexarit, in aqua calida deſideat. & aquā mulſam aquoſam bibat. Si vero nō purgetur, ruruſ pharmacum

Cū morb²
ex partu
contrahit.

Medela.

Cum uteri
coxendicē
petunt.
Curatio.

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER II.

bibat. Si autem purgatio prodeat, ieiuna cum viro coeat. Si vero non prodeat, dato quod detrahat ipsam, respectu ad vires mulieris habito. & tunc tutum est ut ad virum accedat. Si enim in ventre habuerit, sana euadit. In purgatione vero si multa prodeat, mercuriale edat, & polypos teneros coctos. & cibis mollibus vtatur. Si puerperæ vteri in coxâ incubuerint, aut ad lateris mollitudinem, ad alteram coxam oleum Aegyptiû album, aut rosaceum apponito. Sed & in sanam coxam decubere melius est. Bibat autem prœoniæ grana nigra quinq;, & sambuci fructus in tædis conchæ testam maiorem, & castorium magnitudine fabæ. Et cibis vtatur mollibus. Conuenienter autem mercurialis ante cibum, cocta velut brassica. Sorbeat autem & ipsam decocti aquâ. & acria comedat, exceptis raphano & cepis ac nasturtio. Optima est & lactuca.

*Cum coxæ,
dicem ue-
xant.
Medela.*

*Vterorū
morbi.*

Quot vero morbos ex vteris fieri contingit? Dico autem quum vteri ex loco moti fuerint, alio alias allabuntur. Ad quæcunq; vero locum allapsi fuerint, dolores ingētes incumbunt. Et si quis vesicam cōtingat, dolorem exhibent. & vrinam nō suscipiunt, neq; genituram in seipsos trahunt. & ambo dolēt. & si nō celeres solutiones fiāt, vteri postea suppurantur iuxta eosdem locos, si ad ipsos decurrerint. Cōtingit autem hoc & in laterum mollitudine, & in inguinibus, & super pectine. Cæterum in principiis quum dolor habuerit, sic curare oportet, & tepesfactoria adhibere, & in aqua calida sedere, Bonū enim & hoc est: aut ipōgiis ex calida aqua expressis fouere. & pharmaca vteris cōmoda bibere. Si vero ad hæc nō soluantur, pharmaco sursum aut deorsum purgare, utro tandē opus fuerit. cognosces autem id hoc modo. Si enim ad inguina, & pectinē, & vesicam irruerint, hæ purgatione sursum opus habent. Si vero ad laterum mollitudinē, & præcordia, hæ pharmaco deorsum purgante indigēt. At vero huiusmodi morbi omnes senioribus magis q̃ iunioribus fiunt, ad menses superpressos. fiunt etiā iuenculis, vbi multo tempore viduæ māsenerint. Si vero ad sedem cōuertantur vteri, secessus recrementa impediuntur, & dolores occupant lumbos, & imū vētrem, & intestinū rectum ac podicem. Quum sic habuerit, calida ipsam lauare oportet, & lumbis fomentum adhibere, & postea graueolentia subter suffire, & apponere quæ purgant & impellunt vteros. & bibenda dare quæcunq; libenter ad-

*Cum uteri
sedem pe-
tunt.
Medela.*

miserit

- A** miserit ex maxime cōferentibus. Si vero incumbant in inguina, & vrinæ meatus, dolores fiunt fortes, & torpor in cruribus. & vrinæ meatus obturatur, & vrinā nō emittit. Curare *Curatio.* vero oportet hoc modo. Ad nares quidē odorata apponito, & vnguenta. Ad vteros vero graueolentia suffito. Porro omnis occasio vteros propellere potest, si quid mali habeāt. Nam & à frigore pedum ac lumborum, & à saltatione, & terrore, & lignorū sectione, & cursū ad accliuē ac decliuem locum, & ab aliis multis propelluntur. Proinde hæc cōsiderare oportet, ad totum corpus respectu habito, quum præsentēs morbi affuerint. propter talia enī omnia necesse est plus aut minus ægrotare. & postq̃ hæc reluxerint, maxime hac parte
- B** repētini morbi manifesti fiunt. Quū igitur hæc aduenerint, penitius ex tota homine deprehendere oportet. Nā quæcūq; perfrigerationes crurum, aut stupefactiones ex frigore fiūt, hæc omnes etiā in vterorū morbis vteros eleuant. In talibus itaq; aquā calidam affundere oportet vteris & circūfisis locis. & ipsos ac crura excalefacere, quū allapsi fuerint. Si circūcūuersi fuerint vteri ex partu ad dextrā partem, & puerperij purgamenta nō fiant, & dolor imum vētrem habet, & lumbos, & laterum mollitudinē. & dextrū crus grauatur, & torpor occupat, & nō tremit, & osculum vterorum contingere nō potest, sed ipsos leues ac fortiter planos deprehēdet. Quū sic habuerit, pharmacū bibendum dato, à quo iursum ac deorsum purgetur. magis vero deorsum. & totū corpus foueto, & præsertim vteros leniter. & calida bis in die lauato. & ex potibus quæcūq; libenter admiserit, experimento facto præbeto. & viro frequenter cōdormiat. & brassicā edat. Si vteri ad sinistram partē, aut coxam declinauerint, dolor acutus ac vehemens habet lumbos, & laterum mollitudines, ac ipsum crus. & claudicat. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendū dare oportet, & postera die suffire hoc modo. Ordei chœnices duas, & oleæ folia parum cōfringito. & gallā contundito ac cribrato, & hyoscyami tertiam chœnices partem. Hęc mixta & olei hemina dimidia subacta in olla noua, per dies quatuor suffito. Nocte vero lac bubulum, & mel, & aquā bibat. & calida lauetur. Si vteri transuersim situm habeāt, & obliqui fuerint, iteq; os ipsorum, menses ipsi partim occultantur, partim prius cōspicui euanescent. & non similes
- Quam facile uteri moueātur.*
- Cum post partum ad dexteram declinant.*
- Medela.*
- Sin sinistru petant.*
- Medela.*
- Cum obliquantur.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

Medela.
 miles fiunt, sed deteriores & pauciores q̄ antea. & genitura D
 nō fit hoc tempore. & dolor habet imū ventrē, & lumbos, &
 coxā, & ipsa attrahitur. Quū sic habuerit, pharmacū infra pur
 gās bibendū dare oportet. & calida lauare, ac fouere. Vbi ve
 ro recens fota & lota fuerit, digito immisso os vterorū cor
 rigit ac dirigat. & odoratorū suffitū admittat. & ex potibus
 dato iuxta experimentū, quē libenter susceperit. Cibus autē
 vtatur mollibus, & allia edat cruda ac cocta. & cum viro dor
 miat. & in sanam coxam decumbat. Alteri vero fomentū ad
 hibeat. Morbus autē hic ægre cedit. Si vero propinquissi
 mi fuerint vteri frequēter vomat. Vteros autē graucolentib⁹
 suffiat, donec in locū suū firmati fuerint. Diæta vero ventrē
*Cum uteri
extra nat
urā pro
grediunt.
Medela.*
 nō emolliente vtatur. Si vteri extra naturā progressi fue
 rint, febrilis calor habet pudendū & imū ventrē. & vrina fre
 quenter ac paulatim destillat. & pudendū vehementer mor
 detur. Patitur autē hæc si recens ex partu viro cōdormierit. E
 Quū igitur sic habuerit, myrti baccas, & loti ramēta, in aqua
 coquito, & aquā per noctem sub dio exponito, atq; sic frigi
 dissimā pudendo affundito, & leuiter trita hæc apponito. Po
 stea aquā lentiū cum melle & aceto bibens vomat, donec vte
 ri fuerint retracti. Sed & lectū à pedibus altiorē facere opor
 tet. & pudendū graucolentibus suffire, nares autē odoratis.
 Cibus vero vtatur mollissimis ac frigidis. & vinū aquosum al
 bū bibat. & ne lauetur, neq; cū viro coeat. Si penitus ex pudē
 do exciderint vteri, dependēt velut scrotū. & dolor corripit
 imum ventrē, & lūbos, & inguina, & quū tempus processerit, F
 nō volunt in suū locū redire. Morbus autē hic corripit, quū
*Morbi hu
ius causæ.*
 recens ex partu laborarit, aut fatigata fuerit, vt vteros cōta
 ctu læserit: aut cū viro coiuerit in puerperiorū purgatione.
Curatio.
 Quū sic habuerit, frigefactoria mitigantia apponere oportet
 ad pudendum. & quod extra propendet depurgatū, malo pu
 nico in vino nigro cocto abluere, & intro protrudere. De
 inde mel & resinā pari vtriusq; portione colliquare, & in pu
 dendū infundere. Et decūbat supina pedes sursum extentos
 habēs. Postea spōgias apponat, & ad lumbos deliget. Quādiu
 vero sic habuerit, à cibus quidē abstineat, potu vero parcissi
 me vtatur, donec septē præterierint dies. & si quidē sic obe
 dire voluerint & redire, satis sit. Sin min⁹, summas vteri oras
 derasas & ablutas, picato cerato illinito. Deinde pedes ad sca
 lam de-

- A** lā deligato, vt caput deorsum pēdeat, & manu intro detrudito. Postea lauato, & crura ipsius vicissim colligato, atq; sic p noctē ac diē finito. & modicū ptisanæ succū frigidū dato, aliud autē nihil. Postera vero diē reclinato, & cucurbitā q̄ maximā ad coxā affigito, & multo tēpore trahere finito, & vbi ipsam detraxeris ne scarificato, sed reclinatam finito, & nihil præter succū ptisanæ exhibeto, donec septē præterierint dies. Si vero sitis vexet, modicū aquæ bibat. Quī autē septē transierint diēs, cibis mollissimis ac paucissimis vtatur. Vbi vero ventrem exonerare voluerit, decumbens id faciat, donec quatuordecim prætereant dies. Deinde tepidis fomētis colluatur, melius autē est calida velut ex sole. & q̄ parcissime deambulet, & ne lauetur. Ventrem autem ne solueris. Cibis vero paucissimis vtatur, neq; acribus, neq; salis. & pudendū graueolentibus suffiatur. & postquam obābulare inceperit, subligar gestet. Si vero extra pudendum os vterorū exciderit, vtpote ceruice vterorum prope pudendū sita, & ampla existente: sit autē hoc magis sterilibus, contingitq; maxime ex fatigatione, quum mulier laborarit, & vteri calefacti fuerint ac exudarint: tunc eueritū os ipsorū per ceruicem vt quod in humidiorē ac lubriciorē & calidiorē sit loco, q̄ in priori tēpore. & vbi hoc cōtigerit, procedunt vteri foras ad frigus, & osculum ipsorum euersum prodit. Et si quidem breui curata fuerit, sana sit. Verū sterilis penit⁹ relinquitur. Si vero nō breui, osculū durū semper ipsi extra erit, & fluct illic alias atq; alias saniosus humor viscosus ac graueolens. Et si mēses prodierint, si adhuc eius ætatis fuerit, in lecto decumbet. Temporis autē progressu huiusmodi morbus incurabilis fit, & consenescent vteros foris habentes. Si vero vteri extra prominuerint, ablutos ipsos aqua tepida, oleoq; ac vino illitos rursus indito ac deligato, & graueolentia subter suffito. Sub nares autē odorata. Si vero multo tempore vteri promineant, & stupide perfrigerentur, multā calidam aquam affundito, quo refocillentur. Si vero iam infletur, etiam aceto ad aquā ammixto foueto: Sitq; hæc aqua aut lauri aut myrti decoctum, & leniter protrudito, & cerato vnguento illinito, & si paruerint, satis est: Sin minus, cum aqua abluito, & aceto modico tepesfacto perfundito. Deinde illinito. Vbi vero cōsederit, ablutos velut dictū est indito, & alia prædicta facito.
- Oleum
- Cum vteri
procidunt.*
- Modell.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

Cū os ute-
rorum tor
quetur. Oleū vero ne adhibeto, neq; aliud pingue, aut pinguitudinē **D**
habens. Si quid ex osculis vteri cōplicatū fuerit, mēses nō
fiunt, aut pauci & prauī ac dolorifici. & quū viro cōdormie-
rit, dolet, & quicquid vir immiserit ex coitu exit, & contingi
nō vult, neq; attrahit geniturā. Et dolor habet inum ventrē
Curatio. ac lumbos. & os vterorū ad cōtractum non cōparet. Quum
igitur sic habuerit, vrina veteri foueto. deinde vomat à lentis
decocto, melle & aceto ammixto, postea aqua calida lauetur.
Deinde oleo albo Aegyptio in phialā argenteā aut æneam
infuso, & sale addito cōtecta phialæ infideat, & si quidē odor
olei per os ipsi penetrarit, ipsam pariturā esse, & postera die
sanā fore, pñucia, ac cōfidere iube. & vbi dormire volet, oleū
Aegyptiū in lana apponat. Postridie vero cōsideret an os vte- **E**
rorū magis sit directū. & si esse dixerit, per tridū odoratis
foueto, & subdititia quę nō mordeāt apponito, purgatoq; &
cum odoratis ac mollib⁹ postea colluito, totidē diebus velut
prius. quū autē menses p̄dierint, ieiuna, & illota, aromatis suf-
fita, ad virū accedat. Pleraq; vero ex hoc morbo steriles fiūt,
Vterorū
ulcera. si nō curatus fuerit. Si vlcerati fuerint vteri, & extreme fo-
ras processerint, oleo illitis manibus indito. & myrrhæ puræ
pilulas tres deuorādas præbe. & laurū viridem tritā bibat vi-
no dilutā. & sic sana fiet. Si in arcum cōtracta fuerint pu-
denda, subdititium apponito. Anisi videlicet semen & apij
tritum pudendis subdito. Si vteri nō in loco māserint, sed
Cū ualde
prociunt
& nusquā
sistuntur. modo huc, modo illuc trāserint, vt dolores exhibeāt, & nūc
incōspicui fiant, nunc exeāt velut sedes & quū quidem supi- **F**
na fuerit, in loco maneant, quū vero surrexerit, aut ex som-
no expergiscatur, aut se inclinauerit, aut alium quendā motū
fecerit, exeunt. sæpe vero etiā dum quiescit. Hanc q̄ maxime
quiescere, & nō moueri oportet. & lectū à pedibus sternere
altiore, & vomitibus vti. Oportet enim ipsos sursum reuel-
lere, & acerbis perfundere. & graueolētia subter suffire. Sub
nares autem odorata. & ex malis punicis quodcūq; maxime
cōuenierit & nihil impederit, in medio per vmbilicū perfo-
ratum, in vino tepesactū quā penitissime subdito. dinde la-
ta fascia deligato ac circūdato, vt ne elabatur, sed maneat, &
quod opus est faciat. & de peplo, cū caseo, & polenta biben-
dum dato, quēadmodum supra in allapsu scriptum est. & de
portionibus experimento facto, quācunq; maxime admiserit,
bibendā

- A** bibendā præbeto. Cibis autē molliſſimis vtatur. & cum viro ne dormiat, donec ad locū ſuum redierint. Si vteri exciderint, hederā ſicciffimam tritā, ac linteo alligatā apponito. & nihil pingue adhibeto. In potu autē exhibeto triticū recens, & pepłū album, & ſaluiā, & cyperum, & aniſum. Hæc trita vino diluta, cum furfuribus ordeï bis in die dato, pro vice heminā dimidiam. Si ad crura & pedes vteri cōuertantur, cognosces ſic. Magni pedū digiti eōuelluntur ſub vngues, & dolor habet crura ac femora, & incūbit ac premit neruoſcirca femur. Quū ſic habuerit, multa calida frequēter lauare oportet, & fomentū adhibere ſi ferre poterit, & graueolentia ſubter ſuffire. Et femora roſaceo oleo inungat. Si vero loqui
- B** nō poterit, crura derepēte frigida repereris, & genua, & manus, & ſi vterum cōtigeris, nō in ſuo mundo eſt. & cor vibratur, & dentib. frendit, & ſudor eſt multus, & alia quæ à ſacro morbo correpti patiuntur, & quæ ab aure exſudāt. Hiſ frigidā aquam multā affundere oportet ſuper crura & man⁹, & alia facere velut prius dictū eſt. Si cōmoti vteri aliquo allapſi fuerint, & dolorē exhibuerint, oleæ ſcabiem, & lauri ac cupreſſi ramēta in aqua cocta, lana excepta ſubdito. Quū mulier recens enixa, onus maius q̃ pro natura leuarit, aut timuerit, aut ligna ſecuerit, aut cucurrerit, aut alia quēdā huiuſmodi fecerit, vteri excidunt ob hæc maxime: aliquādo vero ad ſternutationē. Nō enim violatur, ſi per vim ſternutans, nō apprehēderit nares. Proluere itaq; aqua tepida vteros oportet.
- C** Deinde betæ ſucco ſeruſfacto ſimiliter. poſtea vino nigro meraco. Si vero nō obediāt, mollitoria facere oportet. Verū hæc facere oportet priuſq̃ perfrigerētur, & leniter intro indere. Deinde crura extendere, ac ſubalternatim ponere, & molle quiddā ipſis ſupponere. à potu vero coerceri oportet tales q̃ maxime, & ventrē cuſtodire, vt ne exturbēt. Naribus autē odorata adhibere. Huiuſmodi vero poſtea ſi nō quieuerint, ſed moueātur, veratro purgare oportet. Et ſi nō ſatis fuerit, etiam vomitus facere, & nō lauari, tacereq; ac quieſcere.
- Si inflati fuerit vteri, vēter attollitur, & inflatur, ac ſonitū edit. & pedes & cauæ faciē partes intumeſcūt, & color iniucūdus fit. Et mēſes occultātur, & genitura hoc tēpore nō manet int⁹. & anhelat, ſpumatq; ac anxia eſt. & quū expurgicitur è ſomno, recta ceruice ſpiratio ipſam corripit. & quicquid

*Proceden-
tie mede-
la.*

*Cū uteri
crura &
pedes pe-
tunt.
Medela.*

*Que repē
te obmu-
teſcunt.
Curatio.*

*Proceden-
tia uulue.*

Medela.

*Cū inflati
uteri ſunt.*

ederit

HIPPOCRATIS LIBER II.

- ederit aut biberit, ipsam molestat, & suspirat, ac tristatur ma- **D**
gis quā priusquā edit, & suffocatur, & nervi contrahuntur. Et v-
teri ac vesicae dolēt, & manus contactum nō admittunt. Neq;
Curatio. lotium emittunt, neq; geniturā suscipiunt. Quū sic habuerit
pharmacū deorsum purgans bibendū dato, & calida lauet, ac
frequēter infideat toto corpore. Quādoq; etiā vsq; ad vmbi-
licū fomētum adhibeto, & interposito tēpore ea apponito à
quibus purgetur, & nō mordeatur. Suffumiget autē odorata
subter pudenda: sub nares vero graueolentia. Et potiōes da-
to quā vteros purgāt, & ad locum impellunt. Et mercuriale
edat, & postea lac bibat, velut de latere scriptū est. Morb⁹ au-
Vtererū tem hic nō est diurnus. Si velut in callū indurati fuerint
duritiā. vteri, & osculum exasperatur, & menses occultātur. Quū au-
tem prodierint, asperi apparent velut arena. Si vero etiā di-
Medula. gito cōtigerit, os vteri asperum cōperiet, & semper velut cal-
lus accrescit. Quū sic habuerit, cyclaminū terere oportet, &
salem ac ficum simul miscere, & cum melle glandulam effor-
mare ac subdere, & fomēto adhibito, purgātibus eluere. Edat
autē mercurialem & brassicā coctam, & succū sorbeat. Itēq;
Duritiā porrum, & calida lauetur. Si vero velut in callum indura-
alia. ti fuerint, & menses obtorquentur, & osculum ipsorū claudi-
tur, & nō concipit, & velut aliud quid est, & si cōtigeris, velut
lapis illic esse videtur, & est os asperū ac multis radicib⁹ præ-
ditum, & nō leue aspectu, & qui ipsum cōsiderat, digitū in-
tromittere nō potest, & febris circūfrigerans corripit, & fre-
mitus, & dolor vteros habet, & imum ventrē, & laterū molli-
Morbi hu tudinē, ac lumbos. Patitur autem hæc, si ipsū corrupti menses
ius caussa. cōpurruerint. Quādoq; vero etiā ex partu, & frigore, aut ma-
Medela. la diata, & aliter. Medicamentū igitur bibendū dare oportet,
& multa calida aqua lauare. Oleo item vtere, & fomentū
adhibe. Quum autē recens lota aut fota fuerit, specillo im-
misso aperito, & os ipsorū dilatato, idemq; cum digito simi-
liter efficito, & mollitoria velut dictū est apponito, & potiō-
Cū uteri nes similiter bibendas dato, & eodē modo curato. Si vero
obdure- obduruerint vteri, osculum ipsorū durum fit, & clauditur, &
scunt. menses nō prodeunt, sed pauciores & deteriores, & dolor in-
cidit, & febris & rigor corripit circa imū ventrē, & lumbos,
Curatio. & laterum mollitudinē. Quum sic habuerit, multa calida la-
uato, & tepesfactoria adhibeto, si dolor habuerit, & vteros
multo

- A** multo tēpore cum aqua decocti cucumeris sylueſtris foueto: deinde mollitoria apponito. Atq; hæc per triduum facito. & ſi ex cōtactu oſculum vterorū molle apparuerit, ex crudo lino tres penicillos ſuppuratorios indito, primū reuēnem, ſecūdum paulo craſſiorē. Craſſiſſimus autē ſit magnitudine digiti parui, lōgitudine vero quinq; digitorū, ita vt hoſ adipe anſerino illitoſ ſubdas. Sed & vbi fomentū adhibueris ex odoratis, glandē mollitoriā apponito: Aut nitrū tali magnitudine illitum, vt ne ſauciet. Nō enim pungere oportet. & appoſitum ſit ad duos dies. Decedit autē velut cortex & pellicula craſſa. Intermiſſis vero trib⁹ diebus, cyclaminū cum narcifſino ſubdito. Si vero hæc nō purgarint, cum multa cōſideratione apponito id quod eū bupreſſi paratur, & appoſitum maneat per diē. & vbi fortiter momorderit, glandē extrahat, & pudendū colluat cū aqua calida, & in oleo infideat. poſtridie vero lota, ceruinū adipē liquatū, & molli lana exceptum apponat. & ſi tibi adhuc purgatiōe opus habere videatur, tribus interpoſitis dieb⁹, id quod cū narcifſino paratū ſubdito. poſtridie autē netopū. Deinde rurfus trib⁹ diebus interpoſitis, yteros odoratis & pinguib. colluito. poſtridie vero pulegium per vnū diem apponito. & ſequēti die cū aromatis ſuffito ac foueto. Vtatur autē cibus acrib⁹, marinis, aut carnib. In mēſibus vero caſtorii bibat. & ieiuna illita ſuffita, & cyceonem bibēs ad virū accedat. Si vero os vterorū nō ſuſcipiat
- B** geniturā, ſed durū fuerit ac cōcluſum, plumbeū penicillū apponat, velut dictū eſt per triduū, vbi calida lota eſt. & mollitoriiſ vtatur, & ſupina decūbat. & in aquā calidā infideat. & lanā vnguento imbutā apponat. Verū noctu magis apponere oportet. Iuxta coxas vero veſteſ laneas aut lineas molles ſupponat, vt ne corpus in alterutrā partem diſabatur. Vtatur & ſubdititiis mollib⁹, ex myrrha pinguiſſima, pice, cera, & adipe anſerino. Sit autē myrrhæ dimidiū, reliquorū vero duplum, & in lana ſubdat. duo vero ſint ſubdititia quorū alterū lota per diē ſubdet, alterū per noctē, donec molle factū fuerit. & vbi hoc detraxerit, aqua odorata colluat. Aut granatulum decorticata quindecim, & Indici medicamēti aliquātulum, ſi itauiſum fuerit, in lacte mulieris maſculum lactantis terito, & cerui medullam, & alia quæ dicta ſunt, ac modicum mellis ammiſceto. Sit autē lana qua hæc excipiuntur mollis
- & pura

*Cū ſemen
nō admittitur.
Medela*

HIPPOCRATIS LIBER II.

& pura, & ad diem subdat. Si vero fortius facere voles, myrrhæ parū quid amisceto. Optimū autē est oui cādidum, & adeps caprin⁹, & mel, & oleum rosaceū: his ammiscere farinā, & tepescere ad ignem oportet, & quod destillat lana colligere ac apponere. Aut adipē rubrum anseris aromatibus cōditum, & vnguentum rosaceū, permixta & lana excepta apponito. Præstat autē anseris adipem, & adipē ouillum, cerā albam, resinā, netopum, oleū rosaceum, hæc simul liquare ac miscere. Vbi vero lota est, hæc tepida intro ad vterorum osculum apponat. Aut cerui medullā, & anseris adipem liquato, & rosaceo aut irino oleo ammixto, in valde molli lana apponito.

Duritia vterorum Medela. Quū mulieri vteri duri facti fuerint, & ad pudēda exierint, dura fiunt inguina, & ardor in inguinib⁹ est, & omīa cācerantur. Quum igitur sic habuerit, cucumeris syluestris internā partem, & fauū terito, & aquæ hemina affusa in sedem infundito, & purgatur. Si os vterorū durum fiat, & ceruix, præ siccitate, & morbus leuiter hæserit, ex digiti cōtactu cognosces. & si ad coxā deuoluātur, nihil acre adhibeto. Si enī exulceretur aut inflāmetur, periculum est ne penitus sterilis fiat. Verū apponito ea quæ nō mordent, à quibus purgetur.

Medela. Quū vero duri fuerint vteri, & sic doluerint, subdititia apponito, velut est cerui medulla, aut anserinus vel suillus adeps. & vnguētum irinum cum melle. & oui luteum, ac cerā albam, velut cataplasma emollito, & ordeaceā aut triticeam farinā, cum aqua & ruta coquito. Si vteri cōclusi fuerint, oscula ipsorum dura fiunt, & geniturā nō amplius suscipiunt, sed statim vbi cū viro cōdormierit, dum crura mouet, exit. & dolores inum ventrē, & lumbos, & inguina occupāt. & mēses omnino non prodeunt. Si vero eant, pauci & prauī ac decolores prodeunt. Quū sic habuerit, multa calida lauato. post balneū vero castorium cum pæoniæ radice, in vino nigro odorato permixta bibenda dato. Orbis autē velut puerpera vtatur. & si manifesti fuerint menses, diem vnā intermittito, & totā foвето, & pharvacū potādum dato, si adueta fuerint, sursum purgās, aut si egere visa fuerit, deorsum. Lac itaq; afininū, aut serum exhibeto. & leniter foueto, & mollitoria vtero apponito, & cyclaminū, & narcissinum. Cucumerū vero paruorum syluestrium internā partem sumito, & ex diuulsis semen eximito, ac lacte mulieris masculum lactātis affuso terito, myrrha

- A** rha pura & melle optimo ammixtis, oleoq; Aegyptio albo. & ne liquidū facito medicamentum, sed siccum, atq; hoc in lanam mollem purā infarciat, & in oleo Aegyptio albo tingat, & lota apponat. Subligetur autē & sub tecto maneat quū purgatur. Postq̄ autē sufficiēter habere tibi visū fuerit, quiescat. Sin minus, rursus aliud apponat. postea vero obuolutā lanam mollem, rotundā faciat, & netopum immittat, & diem vnam subdat. postridie vero oleum rosaceum itidē in lana. Deinde rursus cerui adipem, etiā ipsum liquatum in lana. Lauetur autem calida aqua semper ante subditiorum appositionem. Et odoratis leniter foueatur multo tēpore. Postea vero vna interposita die, colluito. si quidē pituitosa fuerit, eo quod cum grano cnidio paratur. Si vero biliosa, eo quod cum scāmonia. post hęc ambo, postridie etiā narcissino cum vino dulci colluito. Si vero narcissinum nō fuerit, cum anthino aut irino q̄ optimo. Sit autē olei tertia vini pars. deīde interpositis duobus diebus, id quod cū pulegio pręparatur vnū diem apponat. Si vero prodierint menses, ieiuna per triduū bibat castorium, cum vino odorato albo: vbi vero desuerint menses, & stabiles fuerint, lauetur. & aqua frigida perluta, cyceonem bibat nō salsum. Cibum autem ne cōtingat, & cum viro dormiat duobus aut tribus dieb. Quāto vero tempore purgatur, mercurialem in aqua coquens, vbi cocta fuerit exprimat, & allium ac cuminū, & salem subterat, & oleum his ammisceat, & modico succo affuso feruefaciat. Atq; hoc edulium ante cibos edat. Allium item coctū ac assatum q̄ plurimum accipiat. Si vero mercurialis nō fuerit tenera, tritā cum brassica coquere oportet, & cōdire, & lenis erit. & si in ventre cōceperit, sana euadet, & omīa ipsi iuxta ornatū procedent. Si os vterorum cōclusum fuerit, sit forte velut grossus. & si digito cōtigeris, deprehendes durum ac cōuolutum, & digitum nō admittit. & menses occultantur, & geniturā nō suscipit hoc tempore. & dolor habet imum ventrem, & lumbos ac laterū mollitudinem. Quādoq; vero etiam sursum ascendit & suffocat. Quum sic habuerit, pharmacū deorsum purgās bibendum dare oportet, & multa calida lauare, & apponere ea quæ os molliunt. & specillum immittere ac aperire, itemq; digitū, & similiter leuigare. Quum autē molle fuerit, apponere ea quæ sanguinem purgāt. & potiones exhibere, & experiri vt
- O præbeas

*Pituitose
& biliose
purgatio.*

*Cū os uul-
ue clau-
ditur.*

Mede.

HIPPOCRATIS LIBER II.

præbeas quodcunque aliud libenter susceperit. Brassicam au- D
Cum uteri tem edat, & succū forbeat. Si vteri conclusi fuerint, & men-
clauduntur. ses non apparuerint, colocynthidem syluestrem, & silphij se-
 men, & cuminum Aethiopicum, & nitrum, & salem thebaicū,
 & adipem rhenalem, & farinam, & myrrham, & resinam, om-
 nia simul feruefacito, & trito mixta, & in glandem efforma-
 ta apponito. Si grumosi facti fuerint vteri, os ipsorum vē-
Cum gru- lut eruo plenum sit, & si contigeris, videbis ita habere, & mē-
mosi fiūt. ses non fiunt, neque genitura intus manet. *Quandiu* sic ha-
uteri. buerit, cyclaminū cortice detractō, & allium, & salem, & fi-
Medela. cum, ac modicum mellis, terito, misceto, ac glandem forma-
 to, & ad os vterorum apponito. Itemque alia subdititia, quæ
 acria sunt ac corrodūt, & à quibus sanguis purgatur. & de po- E
Cū uteri tionibus dato eas quæ vteros purgant. Si vteri præter na-
hiant. turam hiarint, menses plures prodeunt & viscosi, & frequen-
 ter, & genitura intus non manet, & osculum hians est. & fie-
 ri non potest vt genituram attrahat. & febris ac rigor corri-
 pit infernum ventrem, & lumbos. Morbus autem corripit ex
 fluxu sanguineo. fit & quum menses suppressi derepente eru-
 perint. Dixit itaq; ratio prius relata est. Oportet autem sub-
 dititiis curare in principio quidē purgatoriis simulque mol-
 libus. Deinde leniter adstringentibus. & partes infra umbili-
 cum per spongiās fouere, cum myrti aut rubi aqua, aut ex o-
 leæ aut rosarum, aut cœnantes, aut vitis foliorum decocto.
 Si os vterorū hiarit amplius quàm in mensibus solet, men- F
Cum per ses ita fiunt plures & deteriores omnes, & liquidiores, & per
menstrua longius tempus. & genitura non attingit, neq; manet, sed rur-
hiant. sus exit. & si permanserit, osculum comperies disparatum, &
 impotentia præ mensibus obtinet. & levis est ac debilis vte-
 rus, & vterius procedit. & vires laxantur. & febris debilis, ac
 rigor, & dolor habet imum ventrem, & laterum mollitudi-
 nem ac lumbos. patitur autē hæc maxime, si quid in ipsa cor-
 ruptum computruerit ac compactum fuerit. Quadam vero
 etiam ex partu patiuntur. alia etiam aliter. Quum itaque sic
Medela habuerit, pharmacum bibendum dare oportet, & facilius iu-
 dicabitur. & si dolor habuerit, tepefactoria adhibeto. & fri-
 gida lauato, ac intermissione facta colluito. & ex portioni-
 bus dato quamcunque maxime libenter admiserit. & suffi-
 to ea quæ resiccant, & polypos edat ac mercurialem. Si ve-
 ro

- A** ro non conclusi fuerint vteri velut oportet, in aqua desideat in qua cocta sit myrtus, aut lentiscus, aut vitis aut olea folia, aut rosarum. Diæta vero sit quæ relata est in rubro fluxu. Optimum vero ipsi auxilium est sitis, frequentes vomitus, & prohibitiones balneorum. Quum vteri magis quam conuenit fuerint aperti, & non conclusi, & purgatione opus habent, & collutionibus, & suffimentis. Si vero menses effluerint, plures fiunt & deteriores, & liquidiores, & frequentes. Et genitura non manet intus, sed quando illi prodierint, perit. Et si os contingas digito, comperies ipsum leue. Et impotentia ipsam præmenibus corripit. Et febris ac rigor obinet, & dolor imum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem corripit, maxime si quid in ipsa corruptum cõputruerit, itemque ex partu, & aliter. Quum igitur sic habuerit, curare oportet, vbicunque tandem dolor fuerit, velut in superioribus scriptum est. Si vteri inflammati fuerint, menses obtrorquentur, & ceruix multis tenuibus venulis, ad telarum aranea similitudinem variegatur. Et febris est acuta, & mentem percellens, & menses prauis ac paucis ipsi comparent. Et quum ieiuna fuerit, vomitus quidam ipsi superuenit. Quum vero quid comederit, reuomit. Et dolor occupat imum ventrem & lumbos, & animo linquitur, & per totum corpus perfrigeratur. Venter autem nunc durus, nunc mollis est, & incenditur & attollitur, & putat se in vêtre habere. Quâdoque vero ventris moles vacua apparet, & aluus aqua impletur, & umbilicus prominet. & osculum gracile fit. & derepente apparent menses stridentes, & pauci ac prauis. & attenuatur circa clauiculas & collum, & pedes intumescunt, & præsertim pedum extremitates. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendū dato, & subdititiis vtatur, & fomentis vteri foueantur odoratis. Per diem vero plûbeis penicillis vtatur. & ante appositionē, aqua calida non mordēti colluito. & post appositionem hoc infuso colluito. Cnestri duas potiones in aquæ hemina coquito, & aquam excolato ac infundito, oleo narcisino aut anthino anmixto. Post hæc tres dies intermittito, deinde cū eo quod cū aceto paratur colluito. & ante cibū, mercuriale cū aliquātulo vino coquēs edat velut brasicā. & succū sorbeat. Si vero permanferit, pharmaca bibēda dato, à quibus aqua de vteris purgatur. Cibis autē vtatur panibus.

Cū vteri non satis clauantur vel nimis patent.

Cum vteri inflammantur.

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER II.

& olerib⁹ coctis, flaccidis. Marinis autem potius q̄ carnibus. **D**
 Aut extremis partib⁹ coctis, flaccidis. & laboret q̄ plurimū,
 & ante & post cibū & q̄ minimum laugetur frigida. & à dālci-
 bus ac pinguib⁹ omnis generis arceatur. Diebus autē pur-
 gationum intermediis, adiātum bibat ieiuna in vino diluto.
 At morbus hic lethalis est, & pauca effugere possunt, si nō in
 ventre cōceperint. In vterorum inflāmatione menses ob-
 torquentur, & quum ieiuna est vomit. Vbi vero comedit, do-
 lor habet imum ventrem & lumbos. Et totus venter modo
 durior, modo mollis fit, & nō valde confidet. Alius magna
 fit, & non purgatur, & sibi pręgnans esse videtur, & patitur
 quęcunq; pręgnātes perpeti solent. Et si ventrem cōtigeris,
 leuem cōperies tumorem velut in vtre. & quum partus tem- **E**
 pus esse visum fuerit, vteri cōcidunt, & mēses pauci ac de-
 teriores fiunt. Huic pharmacum deorsum purgas bibendum
 dare oportet, & purgatoria apponere. Purgata vero sana euadit.
 Si inflāmatus fuerit vterus, vellicatur. Si vero quid cor-
 ruptum fuerit, ac vitiatum recruderit, febris corripit acuta
 & magna, & horror durus, partes circa pudenda. & horribi-
 liter afficitur, & mordetur, & concitatur. & si quis digito cō-
 tingat, rursus peius habet. & pungitur, & caput dolet ac sin-
 ciput. & caligo adest, & sudor frontis. Extremę partes per-
 frigerantur ac tremunt. & sopor profundus aliquando occu-
 pat, & audire non potest. Neq; reliquus sensus operatur. fa-
 stidium cibi est multum, & stomachus & venter omnino non
 continent cibum & vociferatur, & exilit. & pectinem dolet, **F**
 & inguina. & lumbos, & occultos pudendi locos. & cito mori-
 untur. Si vero dolores ad extremam debilitatem deduxe-
 rint, spōgiis calidis ex aqua & oleo expressis foueto. & sub-
 diticia mollia apponito, medullā cerui, adipem anserinum,
 & ceram albā, & oui luteam. Aut ceratum picatum cum res-
 sina subdito. Vino vero aut lacte caprino purgato, aut volu-
 cris iusculo. Vinum autē ne bibat, & prisanę succum sorbeat.
 Ad dolorem vterorum medicamentū infusile. Si dolor
 solum fuerit vehemens & violentus, caligo in vteris inest,
 & flatus non exit, sed isthic manet malum. Oportet igitur
 sic curare. Atriplicis syluestris semen, & betas simul trita ac
 reperfacta, in vteros infundito. Aliud dolores vterorum
 sedans. Vini suauissimi pari aqua temperati tres semicon-
 gios

*Cū dolor
 uteros mo-
 lest. it.
 Medela.*

A gios Atticos sumito, & fœniculi radices ac seminis eiusdem trientem, & olei rosacei heminâ dimidiam. Hęc in ollam nouam immittito, & vinum superfundito, deinde foueto. Apponito autem & scillam, donec osculum molle factum fuerit & ad lationem idoneum ac apertum. Et quum in purgatione pustulæ circa osculum vteri exortæ fuerint, sic curato. Carnem bubulam, cum butyro aut adipe anserino & aniso tritis illine, & ipsam carnem in pudendum inde. Si ignis sacer habuerit vteros, intumescunt pedes, & mammae, & corpus, & dolor ipsam corripit. & recta ceruice spiratio fit, & dolet laterum mollitudinem, & partes sub ventre, & pectora, & caput. & tremor occupat, & torpor manus, & inguina, & poplites tremunt. Quandoque vero & in poplitibus liuidæ fiunt, & modico tempore melius habent ex hoc colore. Maxime vero mammae attolluntur iuxta gentilitatis cognationem. Attamen non valde dolet. & febris ac rigor corripit. & facies rubicunda fit. & sitis fortis est. & hepar resiccatur. Hęc si prægnanti acciderint, moritur, & non poterit effugere.

*Erysipelas
uterorū.*

B Si ignis sacer in vteris fiat, tumores fiunt liuidissimi, à pedibus exorsî vsque ad crura tota, & ad lumbos. Quanto vero tempus amplius progressum fuerit, etiâ pectus percipit, & intumescit. & tota perfrigeratur. & febris habet magna, & rigor superuenit, & spiritus densus, & animi deliquium, & debilitas, & dolor totius corporis. & tristatur, & mente variatur. Et affectio ascendit ex inferno vêtre ad lumbos, & ad dorsum, & præcordia, & pectora, & collum, & caput, & stomachum, & mortua esse videtur. Quum autem dolor solutus fuerit, torpor habet lumbos, & inguina, & crura. & in poplitibus liuores fiunt, & modico tēpore melius habere sibi videtur, deinde rursus affligit. & corpus pustulis cōpletur, & rubores cōspicui ac manifesti faciē occupant. & guttur siccum est, & lingua aspera. Hic morbus si prægnantē inuasērit, occidit. Sin minus, medelâ adhibere oportet; & lac asininum bibendum dare ac purgare. Si vero sic nō soluatur, ventrem mollibus frigefactoriis perfrigerare, & subdititiis non molestis & leuibus paulatim purgare. Itemq; vomere. Ad hoc commodū est sambuci folia sumere cocta, cum origano, aut thymo, aut ruta. Si vero febris dimiserit, etiâ vinū ac cibos dulces dato. Verūtamen pauca curātur.

Medela.

Aqua intercus.

HIPPOCRATIS LIBER II.

D
 menses prodeunt arenosi & aquosi, & non valde cruenti. Intumescit & vterus, & venæ, & propinquissimæ partes. & prægnans sit, deinde suffocatur, & mammæ fluunt, & imus venter durus est, ac intumescit, & omnis circûcirca locus, & dolet si quis ipsum attingat. Et febris ac stridor dentium corripit, & dolor vehemens laterum mollitudinē ac lumbos. & semen in somnis effundit, & peius habet. Hanc calida lauare oportet ac tepefacere. pharmacum autem bibendū dare, & cum debilibus fouere. & cyclamini obolos tres in linteo deliget ac apponat. Et cupressi succum in aqua madefaciat, ac cantharidas eadem terat, & modico tempore apponat, & per multum tēporis interuallū. Efficax est. Subdititium. Cuminum chemæ mensura, vna passa alba. Aliud. Vrticæ semen, ari radix. Horū quodcunq; voles leuiter apponito, vbi vero expurgaueris colluatur, ita vt detrahas & cū infuso pudenda colluas. & simul cū viro dormiat. & si foetum ad partus tempus gestarit, tota expurgatur, & sana fit. Alia aqua intercus vterorum. Subcruentum quiddā fuit saniosum, & purgatur, & mordet valde, & vlcerat pudenda velut muria, & circumfusas partes. & quocunque destillarit vlcerat, & color est morbi arcuati. De cætero vero purgatur copia velut in aliis fluxionibus. Morbus autem hic & debilior est, & aliquādo lethalis fit. si vteri egressi fuerint. Hanc curato velut eam quæ à fluxu albo vexatur. & lac asininum bibendum dato, & extenuato, & prædictis pharmacis curato. Eclegma. Quod delingitur ad aquā intercutē. Si aqua ex vteris fluat, sulphur & anseris adipem delingat. Si ventus in vteris fuerit, flatu exit, & stridet, & tota intumescit, & febris habet & ardor. & ad hæc valde exilit præ dolore. & virū nō admittit, & valde agre fert coitum, & erigi non potest, & velut onus graue ipsi in vteris iacet, & caput dolet, & anxia est, & loqui non potest. Si vero dolor accesserit, clamat, & dolet omīa, & lūbos, & pubem, & sedem. & vrina supprimitur, & vter suffocatur, & mori cupit. & præcordia distenduntur. & stomachus mordetur. & os amarum est. & vomit acida & pura ac meraca. & frequenter ructat, & melius habet. Sin minus, intumescit. & si attigeris, renititur & dolet. Proinde vterum cum aqua mulsa, & aceto mulso ac oleo colluere oportet. Et cuminum aut anisum tritum sumere, & lini folia terere, & volucrium adipem

Medela.

Vetus vterorum.

Medela que.

Adipem cum ouis in aqua infundere. Subdititiis vero ac portionibus vtcre, quæ ego describam. Desideat autē in oleo calido, & aromata in ipsum immittito, iunci adorati florē. Aut in aqua lauri, aut marina desideat. Optimum autem est molibus infusis ventrem purgare, aut glandem apponere quemadmodum puero venter soluitur, lanam illotam cum melle. Si vero antiquior fuerit, cepam in oleum aut mel tinctam apponito. Aut taurinum fel, aut nitrum cum melle. Aut mali punici acidi nucleum, cum melle & ordeacea farina. Si mola ipsa innascitur à crassa genitura intus retenta, thymbrā tritā in aceto & aqua, liquidam bibendā præbeto. Aut hyoscyami semen tritum, & cum muria ac silphij succo & aceto colluito.

But si opus fuerit cum aqua. Optimum vero est aquam mulalem infundere, cum aqua lentium, aut erui, aut floris violæ. Si vero purgata fuerit à talibus quæ sunt velut igne ambusta, myrtum coquito ac perluito, & myrrhā ac netopum cum lana apponito. Si ventus in vteris fuerit, ac momorderit, & qua transit colorem facit, & præ ardore intumescit, & dolet, & virum auersatur, & coitum valde ægre fert. & tenditur ac intumescit pectē, & erigi non potest, nec dirigi. Quum sic inueneris, scito quod ventus & genitura in vteris est, & propterea nunc ægrotet. Accipe itaque mel, ceram, lini folia trita, & adipem volucrinum, & hæc in vino odorato tepescēta per clysterem in vteros infunde. Apponat autē folia lini. Aut semen lini terito, & in lanam inuoluito, & ad os vteri apponito. Sin minus, efficaciore vtcre. Irinum & crocum, & lini folia, & adipem volucrinum terito, & lacte muliebri diluta, rasura de tenuibus linteolis derafa excipito ac diligato, & ad vteri osculū apponito. Et si pinguitudo carnosior enascatur, quod consummat indito, & mediocriter attenuato. Quæ enim valde attenuantur, raræ sunt & abortiunt. Si vero genituram non suscipit vterus, sed dimittit, & calorem in seipso non habet, instrumentum parare oportet, cui insidens vaporem intra vterum recipiat, ita vt vestes circūcirca ponantur. Suffire autē oportet casiam, sinamomū, myrrhā, singulis pari portione vino fixo siue sapa subactis, & super prunas cōiectis. Modice vero lauetur, & modice cibum sumat. Opitulatur & subdititiū huiusmodi. Myrrhā mollem cum melle efformato. Sit autē oblonga velut glans, & sæpe hæc facito virum respectu habito.

Vētris facilis solutio.

Mola quæ fiat, & discuriatur.

Cum uentosa sit uetus.

Medela.

Cum semē reiciit.

Suffimentum.

HIPPOCRATIS LIBER II.

Profunt & pelecini in frumento nascentes, cum myrrha triti. **D**
 Mel quoq; coquito, & cum tædis agitatum permisceto, & fabæ Aegyptiæ magnitudinem apponito. fel item taurinum, & rhoem rubrum pari portione. Conyza herba est similis apio crispo, nascitur autè prope mare in locis arenosis, odor vero eius ægre tolerari potest. Hanc cum melle & vino apponito. Aut bulbion, cõspicitur aut in tritico, maxime Aegypto, acre simile cum mimo Aethiopico: hoc & allium & nitrum simul apponito. Verum antea lauetur. Quum mulier caput dolet, & sinciput ac collũ, & vertigo præ oculis obuersatur, & timeret, & tristis fuerit, & vrinẽ nigre, & similia etiã per vterũ prodeunt, & anxietas ac mœror ipsam tenuerit: atra bilis in vteris inest, **E**
Capitis dolor. Curetur autem sic. Cucumeris syluestris anniculi internã partem, fel tauri, florem aris, cum bacchare terito, & subdititiis formato. & pharmacũ bibendum dato, ac lauato. Quũ vero mulier vteros mordetur, & dolet, lancinaturq; , & bilem fla uam mingit, & vterus hiarit, & oculi fuerint velut morbo regio affectorũ: scito qd bilis in vteris est. Quapropter optimũ est expurgare totũ corpus, & ipsos vteros subdititiis, quæ bilem educunt. Quum vero perfrigeratur vterus, & onus infirmum esse videtur, & color nõ est clarus, & cõpactus est vterus. **E**
Medela. Quum sic habuerit, purgare oportet cum eo quod pituitã ducit, & attenuare, ac frequenter vomere. Quum mulieri male oluerit ex ore, & gingiuarũ nigra fuerint ac praua, caput leporis, & mures tres seorsum exure, & ex duobus muribus ventrem exime, hepar autem & rhenes nõ. & in pila lapidea mar F
 mor, aut lapidem album tere ac cribra, deinde singulorum partes portiones miscere, ac dentes cõfricare oportet & locos in ore. & postea lana succidissima fricet, & cũ aqua colluat. Tingat autem lanam succidã in melle, & confricet dentes ac gingiuas, & internas ac externas partes. Terat item anisum, & anethi semen, & myrrham pondere duorum obolorum, atq; hæc in vini albi meraci hemina dimidia diluat, & cum his os colluat, & multo tempore in ore contineat. Hoc aut frequenter faciat, & ieiuna gargarisset, & post cibum. Optimum vero est modico cibo vri, & optima quoq; ingerere oportet. Hoc pharmacum dentes purgat, & bene olentes facit. Vocatur autem Indicum medicamentum. Quum mulieri mãma aspera facta fuerit, stœbes aut rubi fructum, cum aqua & oleo coquito, &

- A** quito, & cataplasmate facto mammas integito, & betæ folia superponiro. Deinde ex linteo velut pileū cōsuito, & magnitudine vt māmam capiat, atq; sic māmam indito. Si vero suppuretur, secato, & ex lana succida linamentum siue penicillū immittito, & eadem superponito. Postea vero ex lēticula cōcta cum polenta permixta, cataplasma adhibeto. Si in pundo mulieris, aut intestino recto ascarides nascantur, viticis semen aut folia, cum fellis bubuli obolo permiscuntur, & oleo cedrino subiguntur, & lana succida molliissima excipiuntur, Induntur autem tertio quoq; die, per noctē ac diem. Postridie vero vbi amouit, calida lauetur. & allium cōctū ac crudum edat. & Ascarides exeunt ac moriuntur. Muria vero etiā
- B** colluere oportet. Ad faciem ornandam. Hepar tauri terito cum oleo. illinito autem cum vino macerato. Fel autē furfures exterit. Sed & ptisanæ succus similiter illustrat, & ouorum candidum. & farina lupinorum, & erui cum ficis in cataplasmate adhibita. Et brassicæ radix ac semen. Hęc etiam lentigines tollunt. Itemq; alcyoniū. Et si puluis faciē læserit, ceratum liquidum ex rosaceo præparatū sublinito, & aquam frigidam affundito. Et rugas leuigat hoc. In pila lapidea plumbaginem terito, & menstrua ex situ aqua affusa pastillos formato, qui vbi reficcati fuerint, oleo dilutos rugosæ faciei illinito. At si capilli defluant, ladanum cum rosaceo aut anthino vngueto terito, & cum vino illinat. Aut terram cimoliam cū vino, aut rosaceo, aut omphacino, aut acacia. Si vero calua facta fuerit, cuminum impone, aut stercus columbinum, aut raphanum tritum. Aut cum cepa cōfricet, aut cum beta, aut vrtica. Cæterum solares appellatas maculas tollit, erui decoctum, betæ succus, ouorū candidum, ptisana cucumeris syluestris radix sicca, cum vini fece trita, ac illita. Aut fici folia adhibita. Item sesamo trito fricari, aut amygdalis amaris. & vrticæ semen, & allij cortex superligatus, & lepidium. Impetigines omnes extrahit. Acetum, manna thuris, pumex sulphur cum aceto, nasturtiū syluestre vstum & in cinerem redactum, viperæ exuium, rumicis syluestris radix. Teratur autē cum aceto vinoso, Si vero pustulæ emergāt, etiā spuma argenti vttere. Potio ad fluxum rubrum cōmoda. Cornu cerui vstum, ad duplū crudæ ordeacæ farinæ ammisceto, atq; hæc in vinum pramniū inspersa bibat, & sistitur. Alia. Adianti radicem

*Ascaridū
cicctio.*

*Que faciē
ornat.*

*Que eru-
gent.*

*Que capil-
lum fluens
tem sistit*

*Que na-
uos & simi-
lia tollant.*

*Impetigi-
nes que
curent.*

*Pocula ru-
bri proflu-
uii.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

radicem tritam, & cicer torrefactum, & lentium farinam ex D
melle bibat, aut velut potum exhibeto. Aut farina tritici re-
centis acetabulum, gummi albi dimidiam, manna thuris ter-
tiam partē, & iunci odorati parū. Aut de pinu, vel cupresso
aqua dilue, & bibendū præbe. Bibat autem in die. Aut cornu
cerui cōburito ac terito, & crudā ordeaceam farinā cum ce-
dri baccis quinq; , & vinum austerū nigrū cum tædis ammi-
sceto. Aut mali punici dulcis assati succū, cum vino nigro bi-
bat. Aut cupressi baccas tres aut quatuor. & myrti baccas ni-
gras, & simul, & ipsas per seipsas, ad robur corporis mulieris
respectu habito. Cum vino vero potio fiat. Aut castorij obo-
lum in vino nigro austero terat, ac bibat. Potio ad fluxū, &
omnia uul
uarū mala
Sanguinis
narium se-
datio. omnes morbos qui ab uteris fiunt. Præniē semen & radices, E
cuminū Aethiopicū, & melantiū in vino albo exhibeto. Aut
ferulæ rase acetabulū, & porri succū, in vino albo diluto. Hoc
etiam ex naribus manantē sanguinem sistit. Aut malū puni-
cum in vino nigro coquito, ac decorticato, & interna in vino
nigro terito, & cum polentæ farina exhibeto. Aut linum, vel
erysimū tostū, & oleæ folia viridis, & radicē nigrā aspaiathi,
& peplum plenū, hæc trita in eodē vino diluto bibenda dato.
Coagulum
asininum. Aut coagulū asininum & mali punici dulcis radicē, & gallam,
omnia æquis portionibus, & mali punici dulcis succū, cum vi-
no bibat. Aut rumicis semē, cū gallæ parte externa circūrafa.
Hæc simul terito, & postea cyceonē facito ac exhibeto. Si
Sanguinis
sistentia. sanguis largus ex uteris fluat, viricis folia cum vino nigro da-
to. Acerba item orania fluxum sistunt, vino nigro ammixto. F
Quæ fluo-
res sistant
& dolores
sedent. Ad fluxum & dolorē. Cancryos radicē in vino nigro bi-
bat, Si vero amplior fuerit, terebinthi fructus tritus prodest.
Oportet aut vino & aqua diluere ac bibere. Si fluxus fiat,
cancros fluuiatiles in vino suffocato, & de tali vino cū aqua
bibendū dato. Si vero adhuc feratur fluxus, pmalon siue myr-
ricam torreto, & tritā in vino dato. Aut porri succū. Si vero
multus defertur fluxus, mali stercus cōburito, terito & cū vi-
no dato. Si aut diuturnus fiat fluxus, spongia cōbusta auxilia
tur. Terēda est aut spōgia, & cū vino odorato exhibēda. Ca-
Emplastrum
fumētāq;. taplasma ad fluxus. Allium & portulacā, & apiū, & loti ac ce-
dri ramēta trita simul misceto, & cū aqua mulsā diluito, & ca-
taplasma facito. Aut rubi, & rhāni, & oleæ folia trita simul mi-
sceto, & in aqua mulsā diluito, & cū polenta in cataplasmate
adhibeto.

- A** adhibeto. Aut sambuci & myrti folia in cataplasmate adhibeto. Aut loti ramēta, & mori folia, ac rosę folia, cū vna passa ad cataplasma redigito. Fomēta ad fluxus. Loliaceam farinā torrefactā in polca meraciore coquito, & linteo illitā pro fomēto adhibeto. Aut lētes torrefactas ac decorticas in crassiorē instar alicę farinā redigito, & in aqua coquito, ac similiter adhibeto. Aut eruum eodē modo. cōmoda est & saluia. Aut paleas ordeī in saluix & hyperici decocto coquito, & imponito. Aut loti ramēta & cupressi, in vna passę cremore cocta, linteo inducito, ac p fomento adhibeto. Aut oleę folia, aut hederę, aut myrti, in aqua coquito, & cū his etiā ordeī paleas coquito. Aut fursures triticeos in aromatū aqua coquito.
- B** Aut fursures triticeos in vna passę cremore coquito. Aut violę albę semē, vel radices coquito, & ad aquā decocti fursures triticeos iniicito, ac foueto. Aut cū eo decocto fursures triticeos subigat, & panē faciat, eoq; calido lanę inuoluto foueāt. Aut in serpilli decoctū fursures triticeos iniicito, & eodem modo foueto. Sed & fomentū adhibendū est cū spongiis calidis, & cū mollib⁹ lanis, si dolore vexetur. & cū vatis testaceis aqua infusa, & cū vesicis oleo calido plenis. Collutiones ad fluxus. Myrti folia, & lauri, & hederę in aqua coquito, & cū hac tepida colluito. Sābuci & lētisci folia in aqua coquito, & cū excolata leuiter tepida colluito. Aut cēnāthen, & cyperum, & vnas passas in aqua mulsā coquito, ac colluito. Aut cū scēnogrāci aqua, aut rubi decocto, aut oleę viridis, aut cupressi, aut serpilli, aut mali punicę, aut radicis violę albę, aut lentisci decocto leuiter tepido colluito. Aut medicamentum ex butyro, & resina, & adipe anserino infundito. Aut id quod ex medulla & adipe suillo pręparatur. Suffitus ad fluxus. Ordeum tostū prunis inspersum suffito. Aut cerui cornu cū oliuis immaturis. Aut rhoē rubrū, & polentā torrefactā, cū oleo & vino duplo. Aut paleas ordeī, & stercus bubulū similiter. Aut loti ramenta, aut rhoem, aut cupressū siccam, cum vino nigro austero suffito. Aut galbanum, aut mannam thuris, aut resinam vino subactam. Aut caprę cornu, & gallam. & sistetur fluxus. Alij suffitus. Effodere oportet scrobē, & vinaceorum vna duarum chœnicū Atticarum mēsuram torrefacere, & de cinere in scrobem mittere, & vinum odoratū irrorare. Mulier aut circuminsidens, ac seipsam cōtegens ac cōuoluēs, suffitum

Diuersa fomenta.

Collutiōes

Sicca suffimenta.

HIPPOCRATIS LIBER II.

suffitum admittit. Aut sordes pilorū circa sedē capræ siccās **D**
 tundito, & torreto, atque cum ordeo fracto, & oleo subactas
 suffito prunis insperfas. Aut ordeī paleas iisdē prunis iniici-
 to. Aut cupressi ramenta vnguento subacta suffito. Aut cicū-
 tā, aut myrrhā, aut thus, vnguento affuso suffito. Aut bitumē
 & ordeī paleas similiter. Aut cupressi radicem rosaceo oleo
 perfusam suffito. Aut ad calāmū, iuncum odoratū, cyperū, a-
 pij semen, anisum, oleo rosaceo affuso suffito. Similiter autē
 & resinā, prunis iniicito. Et cinamomū, & myrrhā, cum rubi
 foliis, aut rosarū foliis, aut mēta, addito modico croco & sty-
 race. Hæc omnia simul terito ac suffito, oboli Attici pōdere,
 in cinere sarmentorū vitis, aut in stercore bubulo instar ace-
 tabuli formato. Sit autē ignis ex sarmentis vitis. Mulierē ve-
 ro imposito prius, vt ne odorē percipiat. Nā si odorē sense-
 rit, melius est non suffire. Subdititia ad rubrū fluxum. Myr-
 rha & bulbion cū melle tritū, optimū præstant subdititium. **E**
 Aut rosæ in aqua coctæ, quas sanē cū rosaceo vnguento tri-
 tas, ac lanē inuolutas apponito. Aut loti florē in aqua coqui-
 to, & deinde cū rosaceo vnguento terito, & in lana ad vteri
 os adhibeto. Aut cyperū, & irim, & anisum, singula pari por-
 tione, cū rosaceo vnguento trita, intro in vteri osculū detru-
 dito. Aut myrti nigræ folia, in vino albo terito, & pini corti-
 cē ammisceto, & similiter facito. Aut cupressi fructū, & thus,
 pari portione simul ambo in vnguento terito, & apponito.

*Fluorem
que sic-
cent.*

Si resiccare fluxū opus fuerit, calaminthā in vino nigro co-
 quito, & linteo inuolutā apponito. Aut hyoscyami folia, & ci-
 cutā final coquito: Similiter porrū, & maluā: & cerā ac anse-
 ris adipē ammisceto. Deinde tepida ad pudēda subdito. Aut
 vinū meracū, cum resina & malicorio cocto terito, ac simili-
 ter apponito. Aut enicum cū vino tritū subdito. Aut lori ra-
 menta similiter. Aut lentisci folia. Aut rhoē melle cocto am-
 mixto apponito. Si vero nō cesset, Suisinū, aut blitum herbā,
 quæ velut lingua est, in lana ad subdititium efformato. Ad

*Fluoris &
quasi me-
dele.*

fluxū aquæ subdititium & infusile. Si mulieri aqua fluat ex
 pudendis, resinā siccā, & myricæ folia, & lini semen, in vino
 terito, & volucrinū adipē ammisceto, & per clysterē in pudē-
 da infundito. Aut farinæ purissimæ chemæ sive cōchæ te-
 stā cauiorē, aut amyllum in lana ad vteri stomachū apponat.

Aliud similiter infusile. Quā aqua ex pudēdo fluxerit,
 myricæ

- A** myrica folia, & thus, & refinā, cum anserino adipe terito, & per clysterē in pudenda infundito. Si pecten præ fluxu aquoso doleat, viticis semen cū melle terito, & in cataplasmate pectini probe adhibeto. Si fluxus sanguinolentus, aut albus, aut qualiscūq; fuerit, Sulphur & mādragorā in vino meraco terito, & lana excepta apponito. Et supina dormiat, & imota maneat. Aut malicoriū siccū in vino pramnio terito, ac bibendū dato. Ad fluxū albū potus. Hederæ albæ semen, & pini corticē, in vino austero exhibeto. Aut cornu cerui vsti partē vnā, crudæ ordeacæ farinæ partes duas, & cedri baccas quinq;, aqua terat ac bibat. Quū ab vteris strāgulatur, castoriū & conyzā in vino, & seorsim, & simul vtrāque bibat. Aut bituminis obolos tres. Aut phocæ adipis quātū duobus digitis apprehendi potest. Aut radicis pæoniæ dimidiā potionē, in vino odorato bibendā dato. Quū vero vteri suffocant, & simul tussierit, sandaraches obolū, & sulphuris viui tantundē, & amygdalas amaras depurgatas tres aut quatuor, misceto & in vino odorato exhibeto. Si vero adhæserint vteri, ordeū terito, & vnā cū paleis, & cornu cerui, oleo subigito, & suffito. Quū autē sursum ascenderint, & cor ac stomach⁹ prematur, & substiterint, myrrhā aut refinā, aut netopū, aut castoriū, aut silphij succum bibendum dato.
- Quū vterus strāgularit, spiritus autē aceruatim sursum commotus fuerit, & grauitas incubuerit, & mens perculsa fuerit, & loqui nō potuerit, & perfrigeratio adest, ac spiritus offendens, & oculi obscurantur: caput q̄ citissime radito, & per fasciā supra vmbilicū, si opus fuerit, deligatam detrudito. Dato autē castoriū, & conyzā, & rutæ aquā, cuminū Aethiopicū, raphani semen, sulphur, myrrhā. Ad nares graueolētia, ad vteros bene olentia adhibeto. Si vero sustinuerit, etiā grani cindij internā partē, albā illā, melle subactā ac mixtā, naribus illinito. Aut schinū scillæ specię quæ mordeat. Quū autē dolor habuerit ac suffocatur, maluæ radicē, aut acetū mulsū, aut sceniculi corticē, aut crethmū in aqua bibendū dato. Optimū vero est eructare, & sedētē collocare, & sternutationē facere, aut veratrum naribus admouere. Si vero sub septo trāuerso ac præcordius vteri sedere videātur, derepente voce destituitur, & præcordia dura fiunt, & strāgulatur, & dentes cōserit, & vocata nō audit. Oportet igitur sub nares suffiri lanam

*Pecten si
dolet.*

*Si albus
fluor des
fluit.*

*Vulue
strāgula-
tio.*

*Vulue
strāgula-
tionis uer-
ratio.
Medela.*

*Cum uteri
superiora
petunt.
Medela.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

D
 ri lanā accēsam, bitumen in ignē coniectū, & castoriū, & sulphur, & picē. Inguina vero & femora vngento odoratissimo intus inungere. Aut stellas marinas nigras, & brassicā vino odorato misceat, ac bibat. Aut myrrhæ obolos tres, coriandri parū, resinā, præoniæ radicē, cuminū Aethiopicū, hæc in vino albo & aqua trita, aut cum aqua multa diluta, leuiter tepida bibat. Auxiliatur & peucedanū, aristolochia, cepæ lachryma, panaces in vino aut aqua leuiter tepida datū. Vteros ad locum suū reducit, crotonis radix pota, aut cuminū Aethiopicum, aut apiū, aut fœniculi & anisi semen, aut piper, aut myrrhā, & papaueris succus potus. Si cor strāgulatur, ab vtero reprimitur, & spiritus habet, & anhelatio: Vitis, & præoniæ semen in vino bibere oportet. Aut abrotonum, & panaces, & ammoniacum. Aut rutā, aut somnificū papaueris succū. Rursus igitur si similiter habet, melanthiū terito, & melle subigito, & velut glandulā efformato, ac pennæ circūdate, & apponito. Aut philistion similiter subdito. Aut telephū, aut anemones folia trita, in hiatū indito, & modica myrrhā ammixta apponito. Si in lumbos vteri incubuerint, suffocatio vtero caput nō cōtigerit, polypos cōcios edat, & vinum nigrum odoratū meracū q̄ plurimum bibat. Quū vero velut ad viscera cōuersi strāgularint, vinū cedrinū, & vinū Aethiopicū bibat, & calida lauetur. & odoratis fomentis vtatur. Si venter inflatus fuerint vteri, aromata omnia in vngentū immittuntur, & laurus, & myrtus, & saluia, & cedri ac cupressiamenta. Hæc cōtundito, & trita cribrato, & in vinum odoratum inspergito, & oleū rosaceū superfundito. Quum vero transmoti vteri presserint, ordeū vnā cum paleis, & myricā, & cerui cornu, vino subigito, ac suffito. Quū assistētes strāgularint, funiculū lucernariū accendito, & præ naribus extinguito, quo fuligo & nidor ipsas ingrediatur. & picē, & castoriū, & peucedanum, & myrrhā, vngento irino diluito, & subacta apponat. Bibat autē resinam oleo dilutā. Si valde strangularint, Aut testudinis iuxta mare nata obolos tres, in vini albi hemina, vel cyathis tribus tritos, bibēdos dato. Aut cedro in lucernā infuso, lucernā accēdito, & vbi extincta fuerit, ad nares adhibeto. Aut cœnū fetidissimū similiter. Aut lanā incensam sub nares mulieris suffito. Aut bituminis parū tritū in vino albo bibat. Aut erysimi cōchæ testā, & castoriū in vino

Cum cor
uulua uer
xatur.

Cālumbi
uexantur.
Si intesti
na moles
staret.
Cum infla
tur uteri.

Cum tras
mouetur.
Cum strā
gulant.

Medela
uaria.

F

- A** in vino albo bibenda dato, & lauato. Si vero etiā tuffiat, sandarachæ obolū, sulphuris vini obolos duos, amygdalas amaras depurgatas tres aut quatuor, & castorij obolū, cū vino odorato misceto, & bibēda dato. Si vero strāgularint vteri, & strāgulatione cor cōtigerit, & os cōclusum fuerit, acetū calidū sorbendū dato, & os paxillo aut radio aperito, & vinū inodorū similiter exhibeto, & cū aceto mulso. Si vero valde strāgul. rint, & voce destituta fuerit, cepā in vino tepido tritā, in nares instillato & excitato. Si vero vsq; ad hepar ascēderint, & suffocatur, voce destituitur, & nihil videt, & dētes cōserit, & dura fit, & nihil sentit, & frequēter respirat, & non audit. Hāc sub prācordiis manibus cōprehensam frequenter inungito. Et dētribus cū paxillo diductis, vinū meracū tepidū infundito, si nihil prohibuerit. Et plerunq; statim melius habet. Si ad inguina incūbant ac innitant, caprini stercoris pilulas, & leporis pilos, phocæ adipe subigito ac suffito. Aut hederæ fructū, aut folia, aut corticē siccato, & quercus folia ac resinā ammisceto, oleoq; subigito ac suffito. Aut coaguli phocæ pellē cōterito, & spongiā ac muscū, cum phocæ adipe ammisceto ac suffito. Aut stercoris caprini pilulas, & phocæ pulmonē, ac cedri ramenta suffito. Sed & bubulū stercus suffito. Aut cornuū bouis ramenta, & bitumē. Aut spinæ Aegyptiæ fructū, & cedri ramenta, & myrti folia sicca. Hāc molli vnguento subacta suffito. Multa vero aromata in vnguentū iniicito. Aut vinacea tusa trita, & cedri baccas, & resinā pineā, simul mixta & passo cocto subacta suffito. Fomenta à quibus discedit. Stercus bubulū cōtusum, aceti dimidia mēsurā, & decocti erui ex aqua marina aut dulci similiter dimidia adiecta, pro fomēto adhibeto. foueto autē leuiter & lenticulę decoctū bibendū dato, ac reuomendū. Et farinā sorbendā, & in super vinū. Postridie vero granū cnidiū dato. Sed & quod vrinā ciet. Ciceris partes duas tritas, vix passæ optimæ tertiā partē, affuso aquæ cōgio coquito, deinde excolatā aquā per noctē sub dio exponito, & postridie bibendā dato. & de cetero saluā & lini semē, & polentā bis per diē in vini diluti heminis quatuor dato. Aut olei heminas dimidias tres foliorū sambuci manūs plenā mēsurā, hāc coquito, & cuni calidis foueto. aut testis calidis immissi fomentū facito, muliere in fella collocata, & vestimentis cooperta. Aut sambuci

*Strāgula
tio uulue.*

Medela.

*Diuersa fo
menta.*

folia

HIPPOCRATIS LIBER II.

folia cum myrto coquito, & in excolata aqua paleas ordeï co-
quito, & fomentū facito, si calorē sūfferre poterit. Aut acetū,
oleum, mel, aquā. Hæc permixta ac valde seruefacta, in vesicā
infundito. Aut pini corticē, & rhois folia in aquā iniicito, &
fortiter coquito, & in excolatā aquā etiā ordeï paleas immit-
tito ac coquito, & affusō oleo foueto. Aut loti & cupressi ra-
menta, aqua & oleo affuso, probe coquito, ac foueto. Aut cū
aromatis vnguentū infundito, & gallam iniicito, & rhamni

*Cum uteri
procidūt.* corticē, & polentā triticeā cum aqua. Si vero vteri extra
prominuerint, & dependēt velut scrotū: myrti baccas, loti ra-
menta, rubi & oleæ folia, simul coquito, & leuiter tepide fo-
ueto. Aut cū vino vna cum illis & cū graueolentib. similiter.

*Lenimēta
uariā.* Externas autē partes cum oui candido oblinito. Quum vero
perfrigerātur, & liuidæ factæ fuerint, cū aqua calida. Mol-
litoria vteri. Adipē ouillū, ouorū vitellum, mel, oleū rosa-
ceum sumito, & cū his farinā subigito, & ad lentū ignē tepe-
facito, & quod destillat lana exceptū emollito ac apponito.
Aut adipē ouillū aromatis cōditum, & nitrum rubrū, anseris
adipē, & oleū rosaceum colliquata & lana excepta apponat.
Aut anseris adipē, ouillū adipē, ceram albam, netopum, rosa-
ceum oleum. Hæc q̄ optime permisceto, & tenuibus linteis
excipito, & statim vbi lota est, apponat tepida osculo vtero-
rum. Aut cerui medullā, & anseris adipē, in rosaceo oleo li-
quefaciat, & molli lana excepta subdat. Mollia subdititia,
quæ aquā ducunt, & mucos, & pelliculas, & nō exulcerant.

Myrrhā q̄ optimā, & salis granum, & picem aromatis imbu-
tam, terito & apponito. Aliud. Grana cnidia decortica-
ta triginta. Indicū quod Persæ piper vocāt, & in hoc inest ro-
tundū, quod appellant myrtidanū, cum lacte muliebri simul
terito, & melle diluito. Deinde lana molli ac pura excepta, &
pennæ obuoluta subdito, & per diē finito. Si vero fortius fa-
cere voles modicū myrrhæ ammisceto, tertiā videlicet partē
siue trientem. & lanā mollē purā semisuccidā. Ex vteris e-
ducunt, & osculū molliunt, narcissus, cuminū, myrrha, thus,
abfinthiū, cyperis. Hæc ipsa per seipsa, & cū oleo rosaceo, aut
albo, aut Aegyptio. Apponantur autem vbi lota est. Aliud
quod sanie cruentā educere potest. Cū tædis misceto myr-
rham, salē, fel taurinū, cuminum, mel, & in lana subdito. Aut
cumini folia similiter in vino trita. Aut silphij succū ad ficū
ammi-

- A** ammisceto, & glandulā inde factam subdito. Idē facit & mori radix cū melle, & postea rosaceo illinito. Efficax est & alij caput integrū, & nitrum rubrū, & ficus pinguis, pari portione. misceto autē & gallā paruam, & glandē facito, eāq; liquore aliquo tinctam subdito. Et postea lota cerui adipē in lana subditū habeat. Aliud quod cruenta omnia magis prioribus ducere potest, & mollire, Piper, elateriū, & lac muliebre misceto, & cū his terito etiā mel, & oleum albū, & cerui adipē, & linteo excepta subdat. Vehementer vero ducit omnigena hoc. fici pingue, elaterij portiones duas, nitrum rubrum quantum elaterij, mellis parum, cū linteo aut cū lana glandē facito. Aliud. Netopum, fel tauri, nitrum, cyclaminū, gallam, cum melle terat. Postea vero lota adipem cerui subditū habeat. Aut pulegium & fel tauri tritum pennæ obducāt, & in oleum Aegyptium tinctū subdat. Aut cyclaminum magnitudine tali cum aris flore. Aut anemones caput cum farina tritum pennæ obducito, & in oleo albo tingito. Aliud quod omnia ducit. Cucumeris sylvestris oblōgi internā partem, exempto semine, cū lacte terito, & myrrham purā vna cū ipsis, adiectoq; modico melle, & oleo Aegyptio, molli lana excipito. Aut cucumeris sylvestris internā partē siccato, & melle affuso terito, ac glandē formato. Postquam autē lota fuerit, adipē subdat. Aut elaterij portiones tres cū aqua. Mollitoria. Oui candidum, farinā, mel, ceram albā, hæc simul tepē facito, & quod destillat lana exceptum apponito. Aut adipē
- C** anseris, cerā albā, resinā, vnguentum rosaceum, cerui medullā liquefacito. Aut ouillū vel caprinū adipē, oui candidū, vnguentum rosaceū. Ex his aut glandē facito, aut lana excipito.

Fomenta per quæ vteri purgantur, si duri fuerint. Vinū suauissimū pari aqua tēperare oportet, triū semicongiorum Atticorū mensura & forniculi radices ac seminis eiusdē quadrantē, & olei rosacei heminam dimidiā, in ollam mittere, cuius operculū foramē habet, & vinum superfundere, & arundine indita fomentum facere, & postea scillā apponere. Si dolores repentini irruerint, & animi deliquia affuerint, rosarum folia, cinamomū, myrrhā purā, netopū, papaueris succū, hæc in pastillos drachmales efformato, & super frusto amphoræ candēti ponito, & pro suffimento vti tor. Aut styracis modicū in oleum mittito, ac vti tor velut priore. Omnia quæ in

HIPPOCRATIS LIBER II.

vnguenta iniiciuntur tundito ac cribrato, & super sterco bubulū mittito, itemq; styracē, & netopum, rosaceum oleum q̄ optimum, & Aegyptium albū affundito, & post purgationes suffito. Aut lauri & myrti folia tundito, & cyperi fructum, cū vnguento albo Aegyptio subigito, addito etiā netopo, & super stercore bubulo suffito. Auxiliatur & manna thuris, & cupressi ramenta, & cyperi radix tusa. Sed & iuncū odoratum aromaticū, & cardamomū, & iridem tundito ac cribrato, atque hæc omnia misceto, & rosacē oleum ac netopum ipsis affundito, & vitior in crassiore tritici farina. Aut resinam recens formato fictili suffito, castorio, aut aliquo ex aromaticis adiecto. Caput vero oleo rosaceo tingito, in aures autē myrteum, aut melinū oleum infundito. Et cicer albū, & vvas passas coquito, ac decoctū bibendum dato. & in aqua calida desideat. Et oliuas albas priusquā oleum remittunt lancinato ac siccato, & in vino odorato terito, & acetabulū Atticum præbeto. Aut cantharidū ventres, aut adiantum, & nitrum rubrum Aegyptium, & ferulæ radicem, & apij semen tritū, hæc exhibeto. Si vero vrinæ stillicidiū corripiat, in aqua desideat, & vinū dulce bibat. Si maxime strangulatur in vterorū dolore, vinū suauissimū pari aqua temperatū, trium semicōgiorum Atticorū mēsurā, & sceniculi radices, & seminis eiusdem trientē, & olei rosacei heminā dimidiā. Hæc in nouam ollā mittito, & vino superfuso foueto. Et scillā apponat, donec osculū molle & amplū esse dixerit. & si exulceratū fuerit, ac pustulæ vbiq; in ipsis fuerint, præstat adipe anserino cū thure curare. Ad vterorū dolorem. Peucedanum, aristolochiā, panaces, hæc simul in vino dulci misceto, & tepesacta bibenda dato. Et peplū albū sorbeat, & vrticæ semen. Aliud fomentū siue suffimentum. Si dolor habuerit, malicorium punici dulcis, loti ramenta oleæ folia sicca tusa. Hæc cū oleo subigere oportet, & super ignitū sterco bubulū mittere. Aut galbanum, myrrhā, thus, oleum albū Aegyptium, super vitis farmenta. Aliud fomētum fortius ex bitumine. Bitumē, radicē xanthij, pilos leporis, rutā, coriandrum siccum, hæc omnia terito, & formatas inde placētulas siue pastillos suffito. Aut ad picē, & sandarachā tusam tritā, cupressi ramenta ammisceto, & vnguento affuso placētulas formato, & in igne missas suffito. Aut cornu capræ in ramenta cōsectum oleo subigito,

*Strangu-
rie mede-
la.*

*Vterorū
dolor qui
sedetur.*

A bigito, & in ignem missum suffito. Aut effossa scrobe, vinacea vix torreto, & cinerem in scrobem mittito, & vino odorato insperso, mulieri circūinsidenti fomētum facito. Sint autem vinaceorum chœnices duæ, atq; hæc ipsa quàm maxime sicca. Si vero vterus doleat vsq; ad vesicam, porri semen cū aqua tritum bibat. Aut cyclamini radicem, in vino albo ieiunæ bibendam dato, & calida lauetur, & subcalidam ieiuna bibat, & tepefactoria apponat. Aut allij caput integrum, & nitrum tostum, & cuminum, trita ac melle subacta apponito. & calida lauetur, & subcalidā bibat. Ad omnem vterorū morbum curandum. Linī scissi vnā cum stipula pugillū tenuiter tusum, in vino albo quàm suauissimo per noctem madefacito, deinde excolatum in ollula tepefacito, & in eo lanam molliissimā tinctam apponito, & vicissim priore detracta aliā subdito. Opitulatur autem & crocus, & myrrha, & ponticæ nuces, alba & pura lana excepta, & cū adipe anserino ac vnguento irino apposita. Si dolor vexarit ex subdititiis purgatam, myrrhæ acetabulum, thuris tantundem, melanthium, cyperum, feseli, anisum, apij semen, netopum, mel, resinam, adipem anserinum, oui candidum, vnguetum Aegyptium, singula paribus portionibus in vino albo dulci, duarum heminarum mensura terito, & tepidis infusis colluito. Si dolor vehemens habuerit, cantharides, cyperus, calamus, iuncus odoratus, & iris profunt. Hæc in vino nigro coquito, ac vitior.

Morbi cuiusq; uterorū sedatio.

Doloris sedatio.

Alia collutio. Si dolor & vrinæ stillicidiū vexarit, porri succū, sambuci fructū, feseli, anisum, thus, myrrhā, vinū, in succum redigito, misceto, ac infundito. Aut myrrhæ acetabulū, thuris tantundē, melanthij & cyperi tantundē, feseli, anisum, apij semen, netopū, mel, resinā, anseris adipem, oui cādidum, vnguentum Aegyptiū, singula paribus portionibus in vino albo dulci diluito, ac infundito. Aut mercurialis aquā decoctā cum myrrhā, thure, netopo. Aut saluiā, & hypericum, in aqua coquito ac infundito. Aut apij semen, anisum, melanthium, feseli, myrrham, castæ fructum, in vino coquito ac colluito.

Collutiones variae.

Alia collutio. Si dolor fuerit vehemens post purgationem. Sambuci fructum, & lauri baccas, in vino nigro coquito ac colluito. Aut sambucū in aqua coquito, & aquam excolato, & vino dulci affuso colluito. Si post collutionem infusam dolor oborietur, aromata quæ in vngueta iniiciuntur coqui-

NOTHA

to, & de aqua duas heminas excolato, misceto autē adipē an-
seris, & oleū rosaceū, & tepida infundito. Amplius autē in-
fufum nulli, vt ſemel dicā, cōpetit q̄ duarum heminarū. Aut
mercurialē in aqua coquito, & ad ſuccū, myrrhā ammiſceto,

Doloris & aut thus, & netopū pari mēſura, & tepidū infundito. Si ve-
ulcerū ute ro vteros doleat cyclamini radicē in vino albo ieiunæ bibē-
rorū me- dam dato. Et calida lauetur, & ſubcalidā bibat. Si ex ferui-
dela. do & ſuperficiario vlcere pudēda fuerint exulcerata, myr-
ti baccis in vino coctis colluat, & melilotū apponat. Et mali
punici dulcis putamina in vino coquito, & myrrhā ac refinā
ſimul mixta vino diluito, & intinctū in his linteum ſubdito.

Strāguria Et ſivine ſtillicidiū corripiat, ſomētū adhibeto, & pectinē
Vētus V- illinito. Deſideat autē in decocto roſarū, aut rubi, aut myrti, E
teri. aut oleæ, aut pāpinorū vitis, aut iuniperorū baccarū, aut ſal-
uiæ. Si vētus in vtero obortus fuerit, & dolor vehemens, &
ſtatus nō exit, cuminū apponat. Et ſaliā ac cyperū tuſa ma-
defacito per noctē, & mane excolato, & lucidū ac clarū cre-
morē in vas infundito, & craſſiorē tritici farinā cū vino albo
ammiſceto, & ſilphij ſuccū magnitudine fabæ, cū farina co-
Columella quito, & crudius ſorbēda dato. Si columella in pudēdis na-
ulue. ſcatur, dolor obtinet. Et doloris quidē medela eſt apij ſemē.
Columellam vero reſecare oportet. Si vlcera in pudendis
oboriantur, & pruritus corripiat, oleæ folia, & hederæ, & ru-
bi, & mali punici dulcis trita, & vino veteri diluta, cum re-
cēti carne apponito, ita vt folia carni oblinas. Et habeat ſub-
ditam per totam noctem. Mane vero eximens, & myrtum in
vino coquens, cum vino pudenda colluat.

Notha ad finem primi libri De morbis muliebribus adiecta.

Tuſſis pue- Ad tuſſim pueri. Thapſiā in polēta edendā dato. Aliud.
ri quī di- Ex ovo aſſato vitellū acceptū terito, & ſeſamū albū toſtū,
ſcutiatur. & ſalem, cū melle delingēda dato. Ad aluū pueri ſoluendā.
Vēter qui Lanā illotā melle tinctā indito. Si vero antiquior fuerit
monſcatur puer, ceparū internas partes tritas cum melle indito. Si lac
nō fuerit. Recētis tritici farinā elotam, melle ac oleo am-
mixto, tepidā ſorbendam dato. Ad anhelitum pueri facit.

Thus in vinodulci, & illuuiēs. Purgatoriū. Glāduſas fa-
cito ex mellis hemina, aniſi acetabulo, bituminis drachmis
duabus, felle bouis, myrrhæ drachmis tribus, elaterij portione.

Hæc

A Hæc in vase æneo coquito, & anseris adipē ammisceto. & vbi
vti voles, glādulis anserino aut ouillo adipe illinito. Lana au-
tē vttere molli. Vomitu soluit. *Ocymi succ^o in vino albo.* *Vomitiois
remediū.*

Aliud. Farinæ tritici recētis exsuccata aqua. Aut de ma-
lis punicis dulcibus & acidis succū exprimito, & deinde mel
ammisceto. Corrosiuū sic paratur. Veratrū nigrū, sanda-
rachā, squamā æris, singula paribus portionibus seorsim teri-
to. Quū autē trita fuerint, ad vnā partē, duplā calcem ammi-
sceto, & cedrine subacta illinito. Aliud corrosiuū pharma-
cum sic paratur. Florem æris pure cōbustum donec ruber
fiat, terito ac vtitur. Pharmacū nigrū. Squamā æris, & flo-
rem æris, seorsim ambo terito. Vbi vero cōtriuieris, ita misce-
to. Duas aut tres pharmaci species facito. Vnam fortissimam
quæ habet ad squamā, tertiā floris partē. Alterā, quæ quartam.
Tertiā, quæ quintā. Hoc pharmacū ad omnia cōueniens est.

B Illitio ad anginam. Roris marini semen, staphis sylvæ-
stris, absinthiū, elateriū, mel. In dolorib^{us} podagricis. Ab-
scessu nitro trito aqua diluto, cataplasmatibus modo integito,
& tribus diebus nō lauato. Vbi vero laueris, rursus nitrū ru-
brum crudū cum modico melle terito, & hoc semper vtitur.

Inflammata illine portulaca cum farinæ massa, & lactuce *Angine
& Pod-
græne-
dela.*
Inflāmata
rubræ drachma, ex aqua dissoluta. Medicamenta oculato-
ria. Aes vstum, ærugo, fel capræ, myrrha. hæc dissoluuntur,
& omnia simul trita vino albo diluuntur, postea in arundi-
nem coniecta, sicca in vsum veniant. Puluillus. Misy præ-
paratū in pila terito, & spumę argēti chrysitidis appellatę ci-
nerem lotū ammisceto. Sint autē cineris partes tres, misyos
vna. At misy in maza cōburito vitans ne diffluat. Nā dum tor-
retur liquefcit, vbi vero probe tostum fuerit, puniceum fit.

Alius puluillus. Cerusa eodē modo cum misy tosto mi-
scetur, velut chrysitidis cinis. Alius puluillus fortior prio-
re. Spodiū cyprum ex fuligine lota, & cerusa, & misy tor-
refactum. Sunt autē duæ partes. cerusæ de spodio, vna vero
misyos. In hæc anemonæ folia cōrussa exprimito, & in eris ru-
bri vase ad solē exponito, & vt nihil illabatur cōtegito. Quū
vero crassa facta fuerint, pastillos formato, deinde siccato, &
siccatos quā maxime fieri potest cōburito, & postea perfri-
geratos leuiter terito, & de spodio ex fuligine loto parē por-
tionem misceto, deinde netopon instillato, & parum terito,

NOTHA

deinde melle diluito, & rescicata in vase æreo asseruato, ac v-
ditor. Puluillus mollis. Spodiū cypriū, chalcitis nō lota le-
uiter trita, flos æris. Hæc parib⁹ portionib⁹ misceto ac terito.

Alius. Spodium cypriū, chalcitis leuiter trita, & cinis chry-
sitidis illotus. Hæc inter se terito. Alius. Spodium lotum,
chrysitidis, & æris flos, paribus partib⁹ trita. Alius. Vuæ acer-
bæ succus, & spodium cyprium. Vuam immaturam in vigo-
re constitutā sume, & succū per linteum, in vas æris rubri ex-
prime, & aceti albi acerrimi tertiam partē amasce, atq; sic in
sole coque, & quinquies in die agita ac cōturba. Et vbi crassus
factus fuerit succus, spodiū cyprium tritū ac adiace ac permi-
sce, ita vt vbi sex aut septē dies in sole positus steterit, ad he-
minam succi Atticæ, spodij drachmas octo immittas. Si vero
acrius efficere medicamentū voles, minus de spodio: sin mol-
lius, plus. Postea vero siccato hæc, donec in pastillos formari
possunt. Deinde domi siccato, sursum in fumū suspensa, atque
hoc tādū, donec testacea fiant, vt inter terendū non adhere-
ant. postea sic vtere. Reponito autē in loco humiditatē nullā
habere. Alius. Spodium, chalcitidē, aceto albo subigito. de-
inde factos inde pastillos siccato, & vbi oculū sublinire voles,
quām optime terito, & vino veteri dulci concalescito. Ad
argemon oculi vlcus. Populi nigræ lachrymā, lac muliebre,

Lachryma misce ac vtere. Si oculus lachrymetur, & dolor vexet. Mali
tio. punici dulcis succum expressum in æreo vase coquito, vt ni-
ger fiat instar picis. Si vero æstas fuerit, ad solē exponito, de-
inde liquidum sublinito. Si vero dulci lachryma fluat oculus,
quum vna fuerit alba, valde matura, & gracihs in vite, decer-
ptam exprimito ac excolato, deinde in solē siccato, & vbi sic-
cus factus fuerit succus deradito, & eruginis dimidiū obolam
attici pōderis ammisceto. Deinde hoc sublinito. Puluillus
inspersilis. Plūbum & spodiū, æquis partibus, myrrhæ deci-
mam partē, succi papaueris parum, vinum verus, arida tere ac
vtere. Alius. Accipitur scoria siue recremētum plumbi, &
spodij tertia pars, & cerusæ tertia, & chartæ vstę tertia, & myr-
Deglabra rhæ pars decima. Si pilos ex corpore extirpare voles, vitis la-
tio. chrymam cum oleo illinito. Si vero etiam circa oculū tollere
velis, euellito & illinito, & cū tenui cuticula discedet, & locus
rubicundus ac boni coloris erit. Ad intestinorū leuitatem.

Lienteria. Lentescit ac triticū recens duarū chœnicū mensura aqua ma-
cerato,

- A** cerato, & vbi mollia facta fuerit, in pila aut mortario fortiter coterito, deinde aque heminis sex affūdito, ac fortiter cōmo ueto. & vbi purgamēta discefferint, in ollā infundito, & modico melle affuso coquito, & valde cocta torrefacito, ac edēda prębeto. Si vero sitierit, vinū vetustissimū bibat, atq; hoc vtiā donec sanus fiat. Ad grauedinē. Si quis grauedinē habeat, *Grauedo.* myrrhā tritā ammixto melle, līteo excipiat, & nares cōfricet. Infusum sedis pituitā ducens. Thapsiæ potionē, & vuas *Pituitæ et duffio.* passas quadraginta; aut grani cnidij, aut cnestri potionem sumito, & mellis dimidiā heminā, ac olei tantundē ammisceto, & aqua marina diluito, in qua fursures cocti sunt, aut ptisanā donec pinguis facta fuerit. Aut adipē betæ succo ammisceto, & nitri drachmas decē. Aut salis heminā plenā aquæ marinæ ammisceto. Si vero bilē ducere voles, succi silphij potionē, elaterij drachmā vnā & dimidiā, colocynthidis drachmā, terito & iisdē quibus prius diluito. Si autē vehemētius ducere velis, cucumeris syluestris internā partē quarta drachmæ parte in dimidia aquæ hemina macerato, & per sedē infundito, & si in egressu mordeat, ptisanæ succum postea infundito. Aliud. In lacte asinino cocto, aut in betæ succi heminis tribus, internā cucumeris syluestris partē macerato, & salē, mel, ac oleū ammisceto. & postea ptisanæ succū infundito. Aliud. Colocynthidis drachmā terito, & in lacte asinino macerato, eadēque misceto. Aliud. Cucumeris syluestris interioris drachmā, elaterij potionē, salis quantum tribus digitis apprehēdi potest, mel, oleū, aqua marina diluito. At si sterco⁹ educere voles, nullū pharmacū bibito, sed aliis vtete. Infusum ad dysenterīā. Punici dulcis malicoriū in vino ad dimidias coquito, & olei, quartā heminæ partē ammisceto, & thuris quartam drachmę partē. Aliud. Vnguenti rosacci dimidia hemina, ptisanę succus, aqua marina cocta. Aliud. Veratri potionē duas tritas, in aque dimidia hemina diluito, & olei tantundē affūdito. Potio. Mala cotonea difsecato, & in aqua macerato, & vbi aqua odorē acceperit, bibendā dato. Alia. Ptisane farinā in congiū aquæ missam, coquito donec pinguis fiat. Alia. Mala cōcisa siccata, & fauū mellis, in aqua macerato, ac simul terito, & vbi subdulcis facta fuerit excolato, & appij folia iniicito. Alia. Vuā passā albā, & calaminthē, & fauū mellis, in aquam mittito ac terito, donec aqua subdulcis fiat.

HIPPO-

A HIPPOCRATIS COI

LIBER DE STERILIBVS,

Iano Cornario medico phy-

sico interprete.



E his quidem quæ accidunt mulie-
ribus in singulis affectionibus, pri-
dictum est. Nunc autem ostendam
ob quas causas mulieres omnino
steriles sunt, & cur nõ pariunt an-
tequam sanentur. Causam vero
hanc esse dico, si os vterorum om-
nino auersum fuerit à pudendo, nõ
conciipiunt. Non enim suscipiunt
vteri genituram, sed statim foras

*Cur quæ-
dã nõ se-
runt con-
ceptum.*

exit. cõtingit autem hoc etiam si parum distortum fuerit os
vterorum præter naturam à pudendo. Et si omnino conclu-
sum fuerit os vterorum, neque sic suscipiunt. Neque si recens
conclusum fuerit magis quàm oportet. Singula vero relata
manifesta sunt. Etenim si omnino auersum fuerit, aut conclu-
sum, menses non prodeunt omnino, aut prodeunt violenter
cum morbo, si sanguis coegerit vteros pro more conuerti. Et
si purgata fuerit mulier, aliquando os vterorum ipsi à pudẽ-
do auertitur. Si vero parum distortum, aut recens conclusum
fuerit, prodeunt quidem menses, prodeunt autem violenter,
& paulatim per multos dies. Hæc autẽ omnia manifesta sũt,
si sic habent, contingenti mulieri. & si horum aliquid fuerit,
curata mulier fecunda fit. Quandoque vero etiam sua spõ-
te. Hæc autem singula cur fiant, dicetur. Dictum autem est &
in muliebribus morbis. Si leues fuerint vteri. Cõtingit au-
tem hoc & ex natura quibusdam, & si vlcera innata magnas
cicatrices reliquerint: Si leues igitur vteri fuerint, mulier in
ventre non concipit. Nam genituram suscipiunt quidẽ vte-
ri, si non alia aliqua causa obstiterit, non autem concipiunt,
sed semen foras emittunt. Hoc autem maxime clarum fit cõ-
tingenti, & si interrogetur an aliquando vicera in vteros ipsi
oborta fuerint. Menses vero sano quidem modo prodeunt in

*Cur quæ-
dã non cõ-
cipiant.*

Q hoc mor-

HIPPOCRATIS LIBER

*Cur ulcus
culuarum
cito curā-
dum fit.*
*Sterilitas
causæ.*
*Sterilitas
naturalis.*
*Cur nō cō-
cipiant.*

hoc morbo. Verum talis plerunque incurabilis est. & hæc cau-
 sa est, ut in ventre ne concipiat. Si vlcus in vteris factū fue-
 rit ab affectione quadam ex relatis, & nō statim sanatum, sed
 impurum factum fuerit, permanet vlcus ad multum tempus,
 quemadmodū & id quod in aure existit. & male olet mulier.
 & quandoque sanies male olēs ipsi ex pudendo fluit. & quā-
 diu sanē vlcus habuerit, in ventre non concipit. Non enim
 concipiunt vteri genituram. Huic autem menses sano modo
 procedunt. Verum ex cōtactu, & interrogatione, maxime cla-
 rum fit de relatis. Curata vero fœcunda fit, exigua tamen
 spes est. Si quid ex mensibus in vteris remanens scissuram
 ac segmentum habeat, quod circa osculum aut paulo peni-
 tius cale scat, & rursus frigescat, neque sic in ventre concipit. E
 Impedimentum enim hoc incumbens, genituram quō opor-
 tet transire non permittit. Et si quidem in principio curetur,
 sanescit, & fœcunda fit. Si vero tempus accesserit, sterilis ma-
 net. Manifesta est autem affectio maxime ad cōtactum. Du-
 rum enim quiddam intus est. Et si magis quàm conuenit
 vteri hiarint, neque sic pręgnās fit. Nō enim concipiunt vte-
 ri semen genitale. Sed & hoc ad cōtactum clarum fiet, & mē-
 ses acruatim prodeunt, & per paucos dies. Fit autem & na-
 tura hæc affectio, & à relatis morbis. Et si quidē à natura fue-
 rit, incurabilis est morbus: Sin minus, non sani prodeunt mē-
 ses, utpote muliere nō existente sana, neque sic pręgnans fit.
 Non enim compingitur semen à sanguine morbofo. Sed san-
 guis qui à corpore morbosus descēdit, genituram serosam fa- F
 cit. Serosa vero facta genitura, tempore modico aut multo, fo-
 ras progreditur vnā cum sanie. Atque hoc ex corpore mulie-
 ris, & ex mensibus manifestum fit. Prodibunt enim ipsi mē-
 ses velut dictum est, siue biliosa, siue pituitosa, siue aquosa fue-
 rit. At breui curata fœcunda fit: Sin minus, nō. Si vero mu-
 lieri menses non prodeant omnino, aut ab omnibus relatis,
 etiam sic nō concipit. Venæ enim sanguine plenæ, geniturā
 non suscipiunt. & in vteris aliquid inueterati sanguinis ines-
 se necesse est, quod geniturā nutriri prohibet. Si vero pau-
 ciores quàm debeant menses prodeant, neque sic pręgnans
 fit. causæ vero in priore morbo relatæ sunt. fit autem hoc ma-
 nifestum ex interrogatione. & si quidem à natura pauci mē-
 ses prodeunt, incurabilis est. Si vero ab affectione aliqua ex
 relatis,

A relatis, breui curata, fœcunda erit. Et si plures quàm debet menses mulieri prodeant, neque sic in ventre concipit. Vteri enim sanguine euacuato, genituram non concipiunt, præ debilitate. Si vero etiam conceperint, sanguis multus derepente in vteros mulieris descendens, genituram suffocat. Manifestum autem & hoc est ex mensibus qui multi prodibunt. Et si quidem natura mulier multos menses demittit, sterilis fit. Si vero non natura, sed ab aliqua ex relatis affectione, breui curata fœcunda erit. Et si os vterorum ex pudendo exciderit, neque sic concipit, Nam os durum fit, & genituram non suscipit, & intumescit, & propterea in totum infœcunda fit. Manifesta est autem hæc affectio, ex eo quod contingit. Et

B si non prodeant menses velut debent, sed deorsum processerint in sedem, neque sic in ventre concipit. Manifestum est enim, quod os vterorum à pudendo auersum est, aut conclusum, & si quidem ad sedem auersum fuerit osculum, aut conclusum, curata fœcunda fit. Vtrunque vero ex interrogatione ac responsione manifestum fit. Si enim menses semper sic prodierint, clarum est quod his morbus causa est. Atque tot ac talia mulieribus contingunt, propter quæ non pariunt antequam curentur, & propter quæ omnino steriles fiunt. Quare mirari mulieres non oportet, quando coeunt quidem, non autem sæpe pariunt. Experimenta per quæ indicatur an prægnans fiet mulier. Si cognoscere voles an mulier prægnans fiet, Butyrum & lac mulieris masculum alentis bibendum dato, & si eructauerit, concipiet, Sin minus, non. Aliud.

*Conceptus
ra signa.*

C Netopum modicum lana exceptum subdat, & postea mane, an quod subditum est per os oleat, consideret. & si quid oleat, concipiet. Sin minus, non. Aliud. Cuicumque mulieri à subdititiis non valde fortibus, dolores ad articulos processerint, & stridor dentium ipsam habuerit, & vertigine affecta fuerit, & oscitarit. Huic maior spes est ut prægnans fiat, quàm ei quæ nihil horum patitur. Aliud. Caput alij integrum depurgatum ac derafum, ad vterum apponat, & postridie videat an per os oleat. & si oluerit, concipiet. Sin minus, non. Aliud. Si cognoscere voles an mulier concipiet, anisum in aqua tenuissime tritum bibat, ac dormiat. & si quidem pruritus ipsam circa vmbilicum corripuerit, concipiet. Sin minus, non. Prægnantem mulierem si non ex alio co-

*Prægnantis
signa.*

Qij gnoſcas,

HIPPOCRATIS LIBER

gnoscas, ex hoc cognosces. Oculi videtur distracti ac caui-
res. & candidum in oculis, albedinis naturam non habet, sed
liuidius apparet. Quæ in ventre habent, maculam solarem
in facie habent. & postquam conceperunt, vinum odio ha-
bent, & cibos auerſantur, & oris ventris morſu, ac ſaliua ple-
næ fiunt. Mel & anifum tenuiffime terito, deinde in aqua
diluito, ac exhibeto, & dormire ſinito. & ſi quidem tormen-
tū ipſi fiat circa umbilicum, prægnans eſt: Sin minus, non eſt.
Poſt hæc autem omnia, farinam bibat, & mel, & origanum, in
vino & oleo. Quæcunque in vtero habentes, maculam ſo-
larem in facie habent, ſœmellam geſtant. Quæ vero bene co-
loratæ permanent, maſculum plerumque geſtant. Si papil-
læ ſurſum conuerſæ fuerint, maſculum geſtat. Si deorſum, ſœ-
mellam. Accipe de lacte, & farinam miſce, & paſtillum for-
ma, & ad lentum ignem aſſa. Et ſi quidem comburatur, ma-
rem geſtat. Si vero diffundatur, ſœmellam. Aut idem hoc lac
ſuper folia emulſum contemplare. Et ſi quidem condenſa-
tur, maſculum geſtat. Si vero diffuſum fuerit, ſœmellā. Cu-
rationes ad conceptionem experimento cognita. Si qua
liberorum generationem expetat, quæ ſine liberis ſit, & ſi
qua iam antea prægnans fuerit, nunc autem non pariat.

*Conceptus
ſigna.*

*Signa ma-
ris uel ſœ-
mellæ.*

*Stomach⁹
uulue.*

*Mēſes cur-
renti à
natura.*

*Medela
quæ conce-
ptum re-
parat.*

Quum ſtomachus vteri durus fuerit tot⁹, aut ſumma par-
te, & conſuſus ac non rectus fuerit, ſed ad alteram coxam a-
uerſus, aut ad inteſtinum rectum inclinatus, aut in ſeipſum
contractus, aut labium ſtomachi ſibiipſi incubuerit. Vnde-
cunque igitur aut aſper fuerit, aut calloſus. ſit autem durus &
à conſuſione, & à calloſitate. His mēſes non apparent, aut
multo pauciores aut peiores quàm oportet apparent, & per
longius tempus, Et mēſes quidem iuxta ſanitatē corporis
& vterorum, exitum inueniunt. Itemque iuxta naturalem ac
iuſtum modum, & à calore & humiditate mēſium, & ſto-
macho non valde læſo. At genituram rursus nō ſuſcipit, pro-
pter læſionem, quæcunque tandem impediſſet ſuſceptionem
à ſtomacho non bene habente. Huic poſt fomentū toto cor-
pori adhibitu, pharmacum bibendum dare oportet, & cor-
poris purgationem primum facere, ſive ſurſum & deorſum,
ſive deorſum ſolum. Et ſi quidem ſurſum purgans pharmacu
dederis, ante purgationem fomentum ne adhibeto, ſed po-
ſtea. At fomento prius factō, pharmacum deorſum purgans
bibendum

A bibendum dato. Si vero sursum purgante nō opus habere videatur, præmisso fomento, deorsum purgans bibendum dato. Quum autem corpus probe habere visum fuerit, postea fomentum adhibeto, ita vt vteros frequenter insidere facias, in fomento quod maxime conferre visum fuerit. Iniicito autē in fomenta, cupressi ramenta, & lauri folia contusa. & multa calida sæpe lauato. Quum vero recens lota & fota fuerit, vteri osculum dilatato, simulque dirigito si opus fuerit, cum specillo stanneo aut plumbeo, à tenui auspicatus. Deinde cū crassiore si admiserit, donec probe habere videtur. Tingito autem specillum in mollitorio diluto, quodcunque liquidum factum conferre videbitur. Specilla vero retro lata facito.

B Deinde lignis longis adaptato, ac sic vtitur. At vero hoc tempore, in vino albo dulci q̄ suauissimo, tædam pinguissimā in tenuia frusta concisam coquens bibat, & apij semen contusum, & cumini Aethiopici semē, & thus q̄ optimum. De hoc ieiuna bibat moderata copia, per quot dies bene habere visa fuerit. & edat catulos pingues percoctos, & polypū in vino dulcissimo coctum, & de iusculo bibat. & brassicam coctam, & vinum album insuper bibat, & ne cœnet. & bis in die lauetur. A cibis vero hoc tempore abstineat. Postea vero si processerit secundum stomachum, & purgationem aliquam foras ostenderit, de potionē aliquid bibat, per vnum atque alterum diem, & à specillorum vsu cesset. & conetur vteros purgare subdititiis, & medicamentis. Quicumque vero, stomacho recto, & molli & sano, & probe habente, & in debito loco sito, menses omnino nō apparuerint, aut pauciores, & per amplius tempus, & non sani; morbum perscrutat⁹ quem vteri habent, & an corpus etiam aliquid conferat, cōperies causam à qua prægnans non sit. & quum quidem sic habet, curationem facito adhibens id quod conuenit, si admiserit, curationem incipiens à fortibus, prout tempestiuum esse videbitur, desinens autem in molliora, donec vterus probe purgatus esse visus fuerit, & stomachus consistere recte habēs in sufficiente loco situs. Si vero à pharmaco & à potionē non processerit, neque vbi ipsū bibit moderato tempore, à potionē quidem hac cesset. Quum vero probe habuerit, per vsum specillorum os stomachi mollito, & vt hiet facito, ad viā subdititio præstandam, tum à medicamentis suffumigabili-

Q iij bus, tum

HIPPOCRATIS LIBER II.

bus, tum à mollitoriis . Postquam autem probe mollitum ac **D**
suffitū esse videbitur , appositis pharmacis vteri purgationē
facito, donec probe habere visum fuerit , incipiens à molli-
bus ad fortiora, definens autem rursus in mollia odorata. ple-
raque vero ex fortibus medicamentis stomachū exulcerant,
& prohibent ne rectus consistat, & probe habeat ad genitu-
ræ iusceptionem, & vterum siccum faciunt. Si vero mulier
Cū mulier à pinguedine vteros sibi laesos esse putet ad conceptionem,
pinguis nō attenuato ipsam quā maxime, & ad reliqua gracilem facit.
concipit. Vernum autem tempus optimum est ad cōceptum. At vir
Vinū ni- non sit ebrius, neque vinum album bibat , sed fortius ac me-
grū ad cō- racius, & cibos edat fortissimos. & calida ne lauetur . & ro-
ceptū fa- bustus sit ac sanus, & à cibis abstineat qui ad rem non condu-
cit. cunt. Quum autem mulier purgata visa fuerit , & stomachus
vteri recte habere, lauetur, & caput fricetur, & nihil omnino
illinatur. Postea linteo inodoro loto capillis circumdato , re-
ticulo loto nihil olēte deliget, linteo primum supposito. De-
inde vbi galbanum ad ignem aut solem calefactum , ac pro-
be mollitum subdidit, quiescat. Postea mane exoluto reticu-
lo ac linteo , caput suum alicui olfaciendum exhibeat . & si
probe fuerit purgata, olet. Sin minus, non olet. Verum hæc à
cibis abstinens faciat. Si vero non fecunde apposueris, nun-
quam olet, neque purgata, neque alias. & si pręgnanti appo-
sueris, neque sic olebit. Quæ vero sæpe concipit , & fecunda
est ac sana, ei si apposueris, etiam si non purgaris, olebit ipsius
vertex, alibi vero nō. Quum vero cognoueris ipsam recte ha-
bere, ad virum accedere iubeto. & mulier quidem à cibis ab-
stineat. Vir autem non sit ebrius. Verum frigida lotus, & ci-
bis paucis conducentibus pastus. & si mulier geniturā se cō-
cepisse cognouerit , primo tempore non amplius ad virum
accedat, sed quiescat . Cognoscet autem si quidem vir dixe-
rit se emisisse, Mulier autem præ siccitate ignorat. Si vero v-
terus rursus reddiderit genituram eadem die, humidus erit,
& si humidus factus fuerit, rursus cum viro misceatur, donec
concipiat. Alia curatio. Vbi fomentum toti corpori ad-
hibueris, medicamentum bibendum dato sursum ac deorsum
purgans. Deinde lacte asinino postea in potu exhibito , vte-
ros per fistulam duobus diebus foueto, cū vrina muliebri pu-
trida, nitro iniecto. Tertia vero die, cū vrina bubula. Quarta
autem &

Curatio a-
lia,

A autem & quinta, fœniculi semen tritum, & sambuci folia ac lauri, & cupressi ramenta. Hæc coquito aqua affusa. Oportet autem post fomentum, multa calida lotam, apponere adipem aromatis imbutum, statim à fomento, & ad noctē. Postea vero hoc præparato. Myrrham statim, butyrum, adipē anserinum, medullā cerui, resinam, & netopū. Horum singulorum æquales portiones permixtas ac liquefactas apponat in lana Milesia molli quàm optima. Deinde plūbeis penicillis quinque, ad octo digitorum longitudinem fabricatis, vterum aperito. Primus ex his sit tenuis, alter crassior, & reliqui alius alio crassior sit. Aperitur autē per dies quinque, & semper lota apponat, & ex lumbis deliget, vt ne excidant, & semper vterius intrudat. Postremum vero quàm penitissime. Postquā autem aperueris, purgatoriū appone, catharidas tritas quinque, & colocynthidis longæ internam spōgiosam partem, & myrrham, Hæc melle cocto subacta, & in glādem efformata, lana inuoluito, excepta summa parte. Deinde in oleū suauissimum tingito ac apponito. Vtere autem & hoc purgatorio, felle tauri, & flore eris affato, & nitro, & myrrha modico melle dilutis, ac linteo tenui deligatis, & linteo superne pharmaco obducto apponito. Vtere & buprestis cum myrrha. & elaterio cum melle cocto. & cantharidibus cum elaterio & myrrha. Postquam autem purgata fuerit, postridie vbi lauit vterum colluito. Cuminum Aethiopicum tritum, & melanthium, & resinā, & oleum, & mel, ac vinum dulce. Hæc mixta & tepefacta infundito. Postquā vero infuderis, erectā obambulare iubeto, quo collutio infusa cōcutiatur. Subdito autem crocum, & myrrhā, & thus, singula paribus portionibus sicca linteo illigata, ita vt anserinum adipem ammisceas ac linteo oblinas. Atque hæc apponito per dies septem. Octauo vero suffitū facito, cum myrrha, bitumine, & ordeo, oleo odorato subactis: his lento igni iniectis, ac suffito per fistulam factō. Postquā autem suffitum feceris, postridie castoris testem terito, vino albo affuso, & ipsum melle oblitum, & lanæ inuolutum, apponat in noctem. Mane vero eo sublato, ac emollito, ad virum accedat, & vbi cōdormiit quiescat. & si non prima vice cōceperit, eodem rursus appposito, virum adeat. Cæterū hunc medicationis ductum incipere oportet vbi menses prodierint. Desinentibus autē menibus, cōceptorio medicamē-

HIPPOCRATIS LIBER

*Et ampli
non concipi-*

*Pus si in
uulua est
semē per-*

dit.

Medeia

to appposito cōdormire. Priore vero tēpore neq; mulier ad vi-
rum accedat, neq; vir ad mulierē. Quum autem mulier nō
cōceperit, prius cōcipere solita, vteri vero viri genituram in
seipsos suscipiunt: penitus necesse est mulierē, ferosam hanc
facere. Quādoq; enim in vteris pus innascitur. pus autē in v-
teris à tuberculis fit, Et sanē ob hoc genitura viri, quādo cum
viro coit, vteros nō contingit, quo videlicet ipsa viri genitu-
ra cōpingatur. Nam pus ipsam dissipat, vt ne afferatur. Mor-
tificat enim pus, & putrefacit genituram. proinde & pus ex
vteris expurgare oportet. & tuberculum in vtero sedare, quo
de cetero ne impediatur geniturā compingi ac afferri. Festi-
nare itaque oportet ad expurgandū, priusquam pus in vte-
ris in callū cōcrescat, & vteros colluere hoc modo. Lac equi-
num coctum exacte colato, vt tenuissimū & purissimum euad-
at, & hoc infundito, clysteris instrumento idoneo facto.
Et summa quidem clysteris pars leuis sit, argentea velut spe-
cilli, & statim modico intercedente spacio foramē perforetur.
Sint autem & alia foramina, nō magna, sed angusta, hinc
atque hinc, ex transuerso clysteris æquali interstitio distan-
tia. & clysteris quidem apex solidus sit. Reliquum vero totū
cauum sit, velut fistula. Alligare autē oportet vesicam suis for-
aminā, atq; hanc probe radere ac confricare. postq̃ autē alli-
garis, lac in vesicam infundito, foramina vero tenui linteo
obstruito, ne lac affluat. Vbi vero obturaueris, vesicam deli-
gato, & ipsi mulieri dato, cui collutionē infundere paras. Illa
vero exemptis obturamentis, in vterū indat. Ipsa enim sciet
vbi indere oportet. Postea autē tu vesicam manu premito,
quādiu pus foras effluerit. Manifestum autem hoc erit, vbi
non amplius pus simul cum lacte exierit. palām enim clarum
est, quod non amplius inest. Atq; tunc cessare oportet, & post
hoc vbi paululū recreata fuerit, ad modicum tēpus, cucurbitæ
siccae fundū reseccato, itemq; apicis summam partem, quo
perforata sit, ita vt similē efficias in reliquis, excepto apice,
velut clysterē: crassitudine vero paulo tenuior sit q̃ virile pu-
dendum. Hanc cucurbitam sic formatam vasi circumponito,
vase vino impleto. Sit autem vinum odorum fragrantissimū,
& siccissimū ac vetustissimū. deinde lapidem nigrum pel-
lucidum in vinum iniicito. deinde cucurbitam ex ære albo
factam circūponito, & mulier circūinsideat, pudendum circū
cucurbitæ

A cucurbitæ glandē adhibens qualiter oportet, quo cucurbita vera super æream emineat, duorū digitorum intra pudendū mensura. Quum mulier geniturā suscipere nō poterit, necesse est mēbranam superexcreuisse in osculo vterorū. Oportet igitur æruginē æris, & fel tauri, & serpentis adipem, simul miscere, deinde pharmaco hoc lanam imbuere, & in byssinū linteum inuoluere, linteo melle sublito, & facere subdititiū magnitudine maximæ oliuæ, & apponere ad pudendum per totam noctem. Supina autem iaceat. & in die auferat, & calida aqua lauetur quā plurima ex myrti decocto. Apponat autem & postea singulis noctibus. & deinde cum viro coeat.

*Quā genitura non suscipitur.
Medela.*

Alia curatio. Marrubij foliorū manus plenæ mensurā, in **V**as atticū iniicito, & aquæ potabilis heminas Atticas quatuor affundito, & ubi per nouē dies præmacerauit, per alios nouem dies ieiuna, lota, duos cyathos de hoc bibat, pari mēsurā passi albi ammixta. Quum autem tertiā diem potando trāsegerit, fomentum adhibeatur, cicutæ foliis in ignem missis, per nouem dies. & post fomentū lauetur. Atque sic rursus de hoc bibat. Quum vero per triduū fomentū adhibuerit, marrubium ipsum tritum in die apponat per triduum. & mercurialem tritam in melle Attico bis in die. præmaceretur autē in vini albi congio, hippomarathri & fœniculi radix, & tædæ pinguiissimæ ramuli, & rubiæ quarta pars, & fœniculi semen, & verbenacæ radices multæ. præmacerenturq; diebus non minus quā nouem. & postea loto capite, in balneo heminam per diem de meri cremore bibat. & postea reclinata seipsam cōcalefaciat. Atque hinc post potum, alternis diebus id quod ex felle paratur, per diem ad dies sex apponat. Quū autem iam virū accedere vult probe purgata, hyoscyami folia ac radices in aqua feruefaciat, & ex his quā calidissimis per triduum ad noctem fomentū adhibeat, & lota virum accedat, post hoc vero fomentum, etiā cerui pudendum siccum sufficit: & de hoc in vinum album dilutū deradens, per triduū bibendum, & quum partus dolor institerit, bibendū dato. Nam hoc partum accelerat. **Alia curatio.** Fel tauri feruefacito, & alumē melium, & cornu cerui vstū terito, & permixtis ac in glādulas efformatis vtor. Aliud curatiū. Cum minū in vino nigro coctū tritum, in glandē efformato, & ad noctem apponito. post hæc vero fecem vini albi, tenuissimā videlicet

HIPPOCRATIS LIBER

videlicet fecis partē, cōburito, & cōbustā in pēna auferas. **lin-**
teoq; illigatā, ad noctē subdas. & porrū coctū edat. post hoc
 tragiū terat, & melle dilutū in noctē apparet. & deīde tragiij
 fructū tritū, in vino albo dilutū, tādē ramētis adiectis bi-
 bendū dato. & postea origanū alternis suffito. & sic ad virū
 accedat. Alia curatio ad mulierē parere nequeuntē. Si mu-
 lierem parere nequeuntē, puerperā facere velis, in mensib;
 cōsiderare oportet, an biliosa sit, siue pituitosa. cognosces au-
 tem utrū horum magis sit, si vbi mēses prodeunt, arenā tenuē
 & siccam in sole substraueris, & de sanguine infuderis, & si
 quidē biliosa fuerit, sanguis in arena ficcatus, luteus fit. Si ve-
 ro pituitosa, velut mucus. Utrū igitur horū fuerit, ventrē pur-
 gabis, siue sursum siue deorsum opus habere videtur. Deinde
 intermissis tribus diebus, vteros purgato. & si humidius vte-
 rorum osculum fuerit, acria apponito, quo cōmorsum & in-
 flammātū os vterorū durū euadat. Si vero mulier internis
 partibus non febrat, neq; prae vteris cōcipiat, neq; viro mi-
 sceri queat, sed dormiat, & cibū auerfetur, vinum melle am-
 mixto pudēdis infundatur. & myrrhā suffito. In sedem vero
 glandes indat, & vinū adipe anserino ammixto, in pudendū
 infundat. Deinde etiam oleum pari melle mixtum infundat.
 Si mulieri yteri gracilescent, & osculum ipsorū exaspere-
 tur, & concludatur, & menses ipsi non appareant, neq; con-
 cipiat. Sed febris corripit lenta, & dolores incidunt ei in lū-
 bos, & imū ventrem. Morbus autem hic maxime fit, quum
 quid in ipsa fuerit corruptum. fit autem & ex partu. Hanc ca-
 lida lauare oportet, & fouere. Quū autē lota ac fota fuerit,
 os vterorū dilatare cum specillō. & myrrham tritā cum pari
 netopo apponat. Aut vnguentū, aut oleū rosaceū in linteo.
 & plumbum instar glandis formatū apponat, felle bubulo il-
 litum. Et in quatuor diebus infecundas cognosces. & fomē-
 tum adhibeto, & pharmacū bibendum dato. Si vero prae-
 ter naturam mulier fuerit crassifaccta, in ventre nō concipit.
 Nam omentū crassum ac multū incumbēs, os vterorū depri-
 mit, & genituram non suscipiunt. Hanc attenuare oportet, &
 pharmacum deorsum purgans bibendū dare. & ad vteros ap-
 ponere quod purgat, ac flatum inducit. Si os vterorū du-
 rum fiat, aut ceruix, ex digiti cōtactu cognoscer. Itemque si
 ad coxam auersū vteri fuerint. Quum sic habuerit, nihil acre
 adhibeto

*Quā cōce-
ptus pare-
tur.*

*Cognitio
biliosae &
pituitosae.*

*Si qua alia
cōceptum
impediāt.*

Medela.

*Cū pigue-
do conce-
ptum im-
pedit.*

*Cū os uul-
uae durum
est.*

- A** adhibeto. Si enim os vterorū exulceraueris, quū inflāmatum fuerit, omnino periculum est ne sterilis fiat. Verū apponito quæ nō mordent, à quibus pituita purgatur. Quum mēses mulieri prodierint, & præterierint, primum quidē caput purgare oportet. Deinde veratrū exhibere, siue semel siue bis opus fuerit. Postea vero fomentū adhibere, fomētatorio ex cucurbita cōstructo, sic autem facto. Aquam marinā in vas infundito, & porro immisso, fistulam cucurbitis imponito, & cum luto quā optimo illinito, vt ne transpiret. Deinde per fellam erectā quadrangularem, transmittito ipsam fistulam, quo duorum digitorum mensura emineat vltra sectionem. deinde prunas subaccendito. & in desessu caueat, & quum desidet, & quū surgit, vt ne cōburatur. Sed desideat dum adhuc frigidum est fomētatorium, & surgat dum fistula est perforata. In hoc vero fomento plurimam diei partem consumat, & in huiusmodi fomenti vsu ad quinque dies perseueret. Per decem vero dies pro porro, allium in fomentum immittito. & huius fasciculum contusum in aquā marinā iniicito. Postea vero reliquis dieb⁹, ipsa sola aqua marina foueatur, vt vltra ne procedat per totā curationē. Cæterū postremum fomētū quū à curatione desistere voles sic facito. Catulum recentissimum refecato, & aromatum omnis generis odoratissimorum ac siccissimorum species contundito, & interaneis catuli exemptis, aromata indito ac expleto. Subiectis autem lignis, & catulo in vas misso vinum odoratissimū affundito, & fomētum per fistulam facito. & si vires permittunt, totam diē cum hoc fomento ipsam foueto, ac interrogato, an odor aromatum per os olere videatur. non enim exiguum hoc signum est ei quæ curatur, ad conceptionem. Subdititiis vero vttere, croci quantum voles, & myrrhæ magnitudinem fabarum duarum, & salem sufficientem permisce illorum respectu, & fellis taurini fabarum duarum magnitudinē. Si vero mitiore vti voles, minus fellis amisce: Si fortiore, plus. Hac trita melle intillato tere, donec id quod teritur fiat tale, vt digito efformare possis. Quāto aut magis triueris, tāto siccior, & viscosior, ac melius erit. Vbi aut efformaris crassius q̄ glandem, & summā partem acutam, & medium crassius, & deinde consequenter quo ad vterum apponatur, in hoc ipsum surculos origani duos leuigatos infigito. Sint autem

*Cū mēses
plus iusto
desiunt.*

HIPPOCRATIS LIBER

autem longitudinis sex digitorum. Deinde lana mollissima **D**
 furculos inuoluito, & filo tenui superne deligato, & præmi-
 neat filum quatuor digitorum longitudine præ furculis infi-
 xis. postquam autem perfudit & puram seipsam fecit, ipsum
 ad vteri os apponat, linteum sub coxas subiiciens, & per no-
 ctem appositum sinat. Erit autem ipsi purgatio aquosa. post tri-
 die ubi surrexit, lauetur & ea die super fomentum ne infideat.
 Quum autem fomentum adhibuerit, & de fomento surrexe-
 rit, ceratum sit quam optimum prima illa die factum, & in ip-
 sum cervi maxime medullam commisceto: Sin minus, adipem
 anserinum, & quum à fomento surrexerit, quotidie ubi se per-
 fudit, & puram circa ventrem fecit, cerato vterum inungat.
 Aut reliqua quidem omnia superioribus ammisceto, excepto
 felle, origanum vero leuissime tritum in glandem permisce,
 & apponat. Aliud. Reliqua quidem omnia ad eundem mo-
 dum facta, verum pro origano absinthium ammisceto, & eo-
 dem modo efformata apponat. Aliud. Ex tritico melan-
 thium deligito, & probe terito, melleque ammixto in pilæ for-
 mam redactum apponat. Verum febres inducit, & articulum
 tumefacit, & vehementer mordax hoc est. Aliud. Mel, &
 veratrum nigrum tenue non multum, coquito. Vehementer
 enim mordax euadet. Sed & hoc febrificum est. Eodem mo-
 do mel coctum, & elaterij potionem coquito, & factam inde
 glandem subdendam dato, & hoc febrificum est. Ducit autem
 & sanguinem. Quædam vero ex his etiam pelliculas. Si ve-
 ro voles, etiam draconantium derade (Est autem lene) & hoc **F**
 cum melle cocto aut crudo, in pilæ figuram velut magnam
 gallam efforma. Cæterum conare ut physicus sis, ad hominis
 habitum ac robur respiciens. Ex his enim nullus est qui non
 omnia ad amissum faciat. Proinde ex his ipsis coniecturam fa-
 ciens, totius corporis, & capitis purgationibus, medicamentis,
 & vteri fomentis, ac appositionibus uti conare. Hæc autem ele-
 menta tibi sunt. Verum medela horum unicuique particula-
 ris est. Et ubi horum quid non feceris semper in fomento per-
 seueret. Hoc enim est quod mollit, & ducit serosos ac saniosos
 humores. Postquam vero ab hac curatione desueris, his quæ
 secundum naturam sunt desinentibus, sanguinem de manu
 detrahare oportet. si quidem fortis fuerit, de ambobus bra-
 chiis. si vero debilior, de altero sufficit. At vero diata qua in
 his cu-

A his curationibus uti oportet, alibi à me indicata est. Si vero suffire voles, lolium ex tritico deligito, & molito, factoque igne sarmenticio lentissimo, in catinum mittito, & mulierem super sellam impositam, mollibus linteis instratam, sedere iubeto, cruribus quàm maxime diductis. Atque hæc curatio si quidem sufficiens tibi fiat in quatuor mensibus, bene est: Sin minus, ad hæc præcipe etiam ut ad virum ne accedat, eo tempore quo curatur. Inter curandum autem, tædam in aqua macerato, & ieiunæ cyathum bibendum dato. & penicillū stanæneum assidue subditum habeat. & coryledonas siue vmbilicos veneris, vnà cum sale & cumino, in aqua coquito, & tepidam sorbendam exhibeto. Et latæ quidem coryledones scæmellas gignere videntur: paræ vero & conclusæ, masculos.

Coryledonis natura

B Conceptorium summum. Melanthium mulieri in vino nigro acerbò bibendum dato. Mulierem iuuentulam fluxus ruber infestabat, & medicamentis datis, & capite purgato, ac vena secta, nihil melius habebat. Videbatur autem hæc causa ipsi esse, ut ne conciperet. Dabam itaque ipsi vinum album, in quo aspalathi radices efferbuerant, mane & ante coenam. & fluxus sedatus est, & non longe post concepit, & peperit masculum, Erat autem corpore coloris candicantis, & probe carnosæ. De mola. Molæ porro cõceptus causa hæc est, Quum multi menses, modicum & morbosum semen conceperint, neq; fœtus rectus sit, & venter plenus est velut prægnantis. Nihil autem in ventre mouetur, neque lac in mammis generatur. Mammæ autem turgidæ sunt. Hæc itaque & ad duos annos, sæpe etiam tres sic habet. Et si quidem vna caro fiat, mulier perit. Neque enim fieri potest ut superstes maneat. Si vero plures, erumpit ipsi per pudendum sanguis multus ac carnosus. Et si hoc moderate fiat, seruat. Sin minus, à fluxu correpta perit. & morbus quidē talis est. Iudicare vero oportet ex plenitudinis mole, & quòd in ventre non mouetur. Nam mas trimestris, fœmina quadrimestris motum habet. Postquam igitur tempore hoc prætergresso non mouetur, nimirum hic morbus est. Est autem hoc magnum signum, quòd lac in mammis nō generatur. Hanc igitur maxime quidem ne, curato, aut certe cum prædictione. Et primum quidem totum corpus foueto. Deinde per sedem clysterem adhibeto, quo sanguis multus erumpat. Fortassis enim quod compactum

Molæ cõceptus.

Qui hoc dignoscas.

Curatio. que.

compactum

HIPPOCRATIS LIBER

compactum est commoueris, id quod foetus esse putatur, muliere à pharmaco cōcalefacta. Sed & vteros colluito, quo sanguinē educas: Sin minus, subdititiis vtatur è buprestis, & dictamnium creticum in vino bibat: Sin minus, castoris testem. & retro cucurbitam ipsi ad laterum mollitudinem affigito, & plurimum sanguinem detrahito, atque hoc maxime coniectura virium ipsius facta. Ad vteri purgationes, quum nō sunt, siue ex partu, siue etiam aliàs. Tādam pinguissimam contusam in vino albo coquito, & trium cyathorum mensura vtatur. Aut pæoniæ grana quatuor, cumini Aethiopici parum, & seselis paulo plus. Aut cedri baccas. Si vero suffocationes affuerint, castorij parum. Si vero purgatione moderata ex partu facta, venter maneat, aut etiam flatus conclusus, & dolore vexetur, siue cum febre, siue citra febre, succi scammonia quintam potionis partem, aut seseli, aut aliud quoddam ex odoratis, & rutam in vino albo bibendam dato. Si autem bibere nolit, illitionem ad sedem facito, velut verbi causa, ex felle taurino, & melle, ac litro. Si vero ex purgationis corruptione dolore vexetur, & odoratis exhibitis nihil cedat, & febris adsit, lactis caprini heminas duas decoquito, deinde eo perfrigerato pinguedinem detrahito, excolatoque, & aquæ mulsæ tertiam partem ammisceto, quo dulcius fiat. Bibat autem hoc ter ieiuna. Si vero dolor non quiescat, neque venter subeat, ad vesperam in calidam aquam in folio insideat. Quum autem perfota fuerit, vbi inde surrexit, cum vino nigro austero aqua diluto, olei dimidia parte addita, tepide colluito, & inde dormiat. Subdititium vterorum. Si conclusum fuerit, aut durum osculum vterorum. Ficum albam expurgato, & nitrum Aegyptium purissimum tritum ammisceto, & subdititium facito magnitudine gallæ non magnæ, quod in lana molli in vnguentum irinum tinctū apponat, per tres aut quatuor dies, prout visum fuerit. Post hoc conducit fomentum odoratum. Postea vero molli quodam opus est subdititio, quod saniosa maxime ducat. Deinde mercurialem, si tenera fuerit, cum vnguento rosaceo, in lintheo ad diem ac noctem subdat. Ad idem, Fel taurinum & salem feruefacito & sulphure trito ammixto, in oblongam spiram ac tractum efformato, & ad duos dies ac noctes nudam, ad ipsos vteros apponito. Et deinde rursus mercurialem.

Post hoc

Vteri purgationes.

*Que vult
ue os aper
riant.*

- A** Post hoc myrrham puram inspergito, & rosaceo ac irino vnguento ammixto diluito, indeque vteri osculum quàm penitissime illinat. Ad idem. Iridem odoratam contusam ac cribratam seorsim, & cyperi tantundem, & crocomagma magnitudine massæ manum implentis, vino odorato diluito, & ad vnguenti formam redigito, & splenis palmi longitudine inducta ac illita, in paruam pyxidem reconde, vt ne transpirent, & apponat. Si vero vlcerati fuerint vteri, aut osculum exasperatum fuerit, aut ab aliquo subdititio commorssi fuerint, adipem in lana illinito, & rosaceum ac eera parum inungito. Quum pregnans corruperit fœtum menstruum, & ad finem perferre non poterit, & tenuis præter naturam fiat, huius vteros purgare oportet, & ipsam medicamentis curare, & crassefacere. Non enim ad perfectionem gestare poterit, donec seipsam refecerit, & vteri robusti facti fuerint. Si vero concipiat quidem, corrumpat autem fœtus bimestres, exacte eodem tempore, & neque prius neque posterior. & hoc perpessa fuerit bis aut ter eodem modo. Aut etiam ad amplius tempus progressum corrumpat eodem modo. Huius vteri nõ amplius extenduntur, fœtu in ipsis augeſcente, & ex bimestri aut trimestri, ad ampliorem modum excedente. Verum fœtus quidem augeſcit. Vteri vero non crescunt, & propterea multæ eodem tempore corrumpunt. Huius vterum colluere oportet, & subdititiis quàm maxime inflare, aut hisce medicamentis. Colocynthis internam partem tuſam cribrato, & filphij parum, cum paulo ampliore melle cocto ammisceto. & hæc circum specillum obducito, ea crassitudine quantam stomachus ad vteri os suscipere potest, & semper vltra protrudito, donec ad internam vteri partem penetrarit. Quum autem pharmacu colliquerit, specillum eximito, & rursus eodem modo paratum elaterium, & colocynthidem syluestrem, similiter velut prius medicamentum apponito. Edat autem hoc tempore allium multum, & filphij caulem, & reliqua dicta vtatur, quæ flatum maxime in ventre inducere potest. Apponat autem subdititium tertio quoque die, donec bene habere visa fuerit. Quandoque vero pluribus diebus interpositis. & in summa, prout libenter admiserit. Interiectis autem diebus, vtatur mollibus, postquam vero per emollitoria osculum vteri preparauerit, & menses apparuerint, paulum remota,

*Vulue
ulcera.*

*Quæ ante
tēpus fœ-
tus perdūt*

Modelis

HIPPOCRATIS LIBER

rata, vbi iam sicca fuerit, cum viro coeat. Quum autem fla-
tum in vterum inducere voles, alij caput integrum, & filphij
succum, ad subdititia ammisceto. Quod si qua pręgnans de-
cem menses perficere non possit, sed corrumpit, & hoc sæpe
patitur, ex huius vtero aquam purgato, & ipsam medicamen-
tis curato, quo aqua purgetur. Si vero geniturā continens,
Cur que non pręgnans fiat, id quod multis contingit, stomacho vteri
semen reti præter naturam hiant: menses plures quàm conuenit, & hu-
nent nō cō midiores prodeunt, vt & id quod à fœmina prodit semen, ad
cipiunt. fœtificationem non concipiatur, & viri genitura insuper ac-
cedens corrumpatur. Contingunt autem hæc, & corpore, &
Curatio. vteris ægrotantibus. Verum oportet huic medicamenta de-
orsum purgantia dare, & interposito aliquo tempore, totum
corpus fouere, & vteros cum aceto & aqua marina, specillis
ac ferramentis ignitis immisis. Coniiciantur autem in fo-
mentum cupressi ramenta, & lauri viridis folia contusa, & po-
lycnemi folia. faciendum est hoc fomentum tempore oppor-
tuno. post hoc vero lauetur, & fomentum adhibeatur ex loti
ramētis, & rosis, ac polycnemi foliis aceto incoctis. Ad finem
autem suffitus fiat, ex verbasci foliis contusis ac loti ramen-
tis. Verum aute lotionem suffito myrrham & thus, vtraq; æ-
quis partibus trita, & myrti ac lauri folia. His permixtis & in
lentum ignem coniectis, recens adhibito fomento suffito, bis
in die, fomentum autem adhibeatur recens lotæ, Sed & post
suffitum lauet, & vteri stomachum ad pristinam naturam re-
ducatur. Et si vires sufficiant, ante hæc omnia venam in manu
sinistra secato, atque ita reliqua facito. Si vero stomachus sic
habeat, menses autem non prodeant, aut vitiose, aut minus,
ad reliqua omnia ampliorem purgationē adhibeto, & sic cu-
rato, subdititiis etiam vtens si opus habeat, & ex prioribus la-
Cum abor uans, & suffitum faciens, ac siccans. Si mulier inuita abor-
tus non e- tum faciat, nec ita eiicere velit, triticum torrefactum & mo-
mittitur. litum, & vuam passam albam contusam, aqua mulsa dulci dilu-
ta, modico oleo affuso, ieiunæ bibenda dato. postea raphani
semen tritum, & acetum ac adipem anserinum, permixta bi-
bat, & lauri folia trita apponat. Deinde bibat origanum, & pu-
legium, & polentam ex aqua, ita vt lauri folia tusa ac trita am-
mixto gummi, aquæ inspergat, diluat, ac bibat. Aut adipem
ouillum, & anserinum, & mel simul mixta ac trita delingenda
præbeto.

- A** præbeto. Aut pastinacæ semen leuissime terito. & lacti superstantem concretionem ammisceto, & adipem anserinum eliquatum. Hæc feruesceta sorbenda dato. Aut origani folia viridia, si haberi possunt, sin minus, sicca leuissime trita, ex aqua bibenda dato. Aut lauri baccas leuissime terito, & suis fœminæ adipem liquatum, & mel ammisceto, & simul omnia trita delingenda præbeto. Aut pastinacæ semen leuissime tritum ex vino diluto bibendum dato. Si vteri genituram non contineant, plumbum, & lapidem qui ferrum ad se rapit, leuiter terito, & linteo illigato, quo in muliebri lacte tincto, substitutio vtatur. Aut æris florem tritum ac melle dilutum subdat. Quum vteri genituram viri eruantur tertia die, necesse est mulieris, quæ hæc patitur, vteros callo repletos esse, & nō potest viri genitura intus in vtero manere, sed excluditur, & propterea concipere nō potest, quandiu callus in vtero fuerit. At calli expulsio sic fit. Pennas sumito minutissimas ac mollissimas, hisque simul colligatis vteros illinito, quemadmodum oculos illinere solent, ita vt pennas exæques, ipsarumque summas partes tenuissimo filo deliges, & multo rosaceo illinas. Sic autem facito. Supinā reclinato, & sub medios lumbos puluinar subiicito, & specillum immittito, ita vt cruribus mulieris extensis, & hinc atque illinc diductis, specillum sursum ac deorsum vertas donec promineat. postquam autem videris in osculo vteri callum, optimum quidem hoc fuerit, si non adhæreat in coxa, sed vltro sequatur. Si itaque in osculo vteri inhæret, volsella tenuissima prehensum extrahere conare. prouidus vt placide hoc fiat, & non violenter. Et postea vito condormiet. Si prægnanti menses compareant, stercus asininum ficcum, & rubricam, & sepiæ testam terito. & linteo illigata apponito. Aut præoniæ semina nigra, in vino diluto trita bibenda dato. Si vero à coitu, imum ventrem dolet, & sanguis recens ipsi appareat, lini semen tusum, & muscum mollem, & adipem anserinum, mixta ac molli lana excepta imponito. Si vteri extra naturam progressi fuerint, calor habet maxime pudenda, & sedem: & vrina paulatim destillat & pudendum mordet. patitur autem hæc si recens ex partu viro condormierit. Quum sic habuerit, myrti baccas & loti ramenta in aqua coquito, & aquam per noctem sub dio exponito, atque sic frigidissimam pudendis affundito,

*Cum semē
non retinetur.*

*Cū uulua
procidit.
Medela.*

HIPPOCRATIS LIBER

affundito, & trita hæc apponito. Postea aquam lentium bibens, melle & aceto ammixtis, vomat donec vteri fuerint retracti: & lectus à pedibus altior sit. & graueolentia sub pudenda suffito, odorata vero sub nares. Cibus vtatur quàm mollissimis ac frigidis. & vinum aquosum album bibat, & non laetetur, neque cum viro dormiat. Si vero omnino ex pudendis exciderint, dependent velut scrotum, & dolor corripit. Hoc autem contingit quum ex partu laborarit, vt vteros concusserit, & cum viro dormierit in puerperij purgatione. Quum sic habuerit, frigefactoria apponat, & quod foris est depurgatum, ac cum vino nigro vinoso, in quo malum punicum coctum est ablutum, intro detrudat. Deinde mel & resina, pari mensura eliquata, in pudenda infundantur. & decumbat supina pedes sursum extentos habens. postea spongas apponat, & ad lumbos deliget. Quandiu vero sic habuerit, à cibis abstinere oportet. Potu vero quàm paucissimo vti, donec septem dies prætereant. & si quidem sic redire voluerint, bene est: sin minus, summas vteri partes deradito, lauato, & cerato picato illinito. Deinde pedes ad scalam deligato, scalamque iuxta caput pulsato, & cum manu intrudito. Postea crura ipsius alternatim colligato, & diem ac noctem finito in quiete, & modicum prisanæ succum frigidum dato, aliud autem nihil. Postera die ipsam reclinato, & cucurbitam quàm maximam ad coxam affigito, & multo tempore trahere finito: & quum detraxeris, reclinatam iacere finito, & nihil aliud præter prisanæ succum exhibeto, donec septem præterierint dies. Cibus autem tunc mollissimis ac paucissimis vtatur. Si vero ventrem exonerare voluerit, decumbens id faciat, donec quatuordecim dies prætereant. postea surgat, & quàm parcissime deambulet, & ne laetetur, & cibus modicus vtatur, sub pudenda vero suffitus per graueolentia fiat. Et postquam obambulare inceperit, subligar gestet.

HIPPO.

A HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS POPVLARI-

bus, Liber. I. Iano Corna-
rio medico physico
interprete.

SECTIO PRIMA.

Constitutio temporis prima.



N Thaso autumnni tempore, circa *Vergilia*
æquinoctium & sub pleiadas, aque *Thasos.*
multæ, assiduæ, molles, velut in au- *Temporæ*
strinis. hyems austrina. parui ven- *uarietates*
ti aquilonares, squalores. & omni-
no hyems quale ver fieri solet. Ver
autem austrinum, frigidum, pluuie
paruæ. Aestas plerunque nubila, a-
quarum inopia. Et esæ parum, mo-
dice, sparsim spirarunt. Quum au-

tem totus hic aeris status ad austrina vergeret, ac cum siccita-
tibus fieret, ante ver quidem ex priore statu, subcontrario

& aquilonio fiente, paucis oborte sunt febres ardentes. atque

his omnino boni status. & paucis sanguis erupit, neque ex his

moriebantur, Tubercula vero circa aurem alteram multis e-

rant, plurimis ex vtrisque, citra febrem erecte obambulantibus.

Quibusdam vero etiam parum incalescebant. Extincta

sunt omnibus absque nocumento. Neque cuiquam suppura-

runt, quemadmodum ea quæ ex aliis causis sunt oborta. Erat

autem natura ipsorum hæc, laxa erant, magna, diffusa, non

cum inflammatione, doloris exortia. omnibus obscure eua-

nuerunt. Fiebant autem hæc adolescentibus, iuuenibus, in vigo-

re constitutis, & ex his plurimis qui circa palestram & gymna-

sia exercebantur. Mulieribus vero paucis fiebant. Plurimis ve-

ro tusses sicca, qui tussiebant & nihil reieciabant, & voces nõ

longe postea raucofæ. Quibusdam vero etiam interposito

R. ij tempore

*Causas.**Tubercu-
la secundæ
aures.**Quib' hæc
fierent.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

tempore inflammationes cum dolore, in altero testiculo, quibusdam in utroque. Et aliis quidem febres, aliis non. Hæc autem plurimis laboriose fiebant. De cætero vero, quantum ad ea quæ in officina medica ad chirurgiam pertinentia sunt, sine morbo degebant. At vero ante æstatis initium, & per æstatem ac hyemem, multi ex his qui longo iam tempore subcorrupti erant, tabidi decubuerant. Nam & multis qui ambigui erant, tunc tabes confirmata est. Quibusdam vero primū cœpit. Et his natura ad tabem vergebat. Moriebantur autem multi, & plurimi ex his. Et de his qui decubuerunt haud scio an quis etiam modico tempore superuixerit. Moriebantur autem citius quàm tales morbi transigere solent. Nam alios & longiores, & cum febribus coniunctos, facile ferebant, & non moriebantur. De quibus paulo post scribetur. Solus enim & maximus ex his qui tum vigeant, tabidus morbus multos occidit. Erant autem plurimis ipsorum affectiones huiusmodi: febres horridæ, continuæ, acutæ, in totum non intermittentes. **Hemittiticos.** Modus autem erat semitertianus, una die leuiores, altera amplius exacerbescerent, & in summa acutiores increbrescentes. Sudores vero semper, non per totum, frigiditas extrematum multa, & quæ vix recalesceret. Alui turbatæ, biliosæ, ex paucis, parvis, tenuibus, mordacibus. frequenter ad exonerandos se surgebant. **Vrinæ quales.** Vrinæ tenues, & crudæ, & decolores, & paucæ: Aut crassitudinem habentes, & subsidientiam parvam, non probe desidentem, sed cum cruda quadam ac intempestiva subsidientia. Tussiebant autem, pauca, condensata, concocta, paulatim vix educentes. Quibus vero violentissima accidissent, his neque modice concoctio aderat, sed cruda spueret perseuerabat. Fances autem plurimis horum ab initio, & perpetuo dolebant, ruborem habentes cum inflammatione. fluxiones parvæ, tenues, acres. Breui colliquecebant, & affligebantur, omnes cibos perpetuo fastidientes, sitis exortes, & plerique circa mortem deliri. Et circa tabidos quidem hæc. Cæterum æstate iam & autumnō, febres, multæ, continuæ, non violentæ, diu quidem ægrotantibus, non autem aliàs ita male habentibus oboriebantur. Plurimis alui turbatæ, ita ut valde toleranter ferret, & nihil memorabile lædebant. Vrinæ item plurimis boni quidem coloris & puræ. Verum tenues, & post tempus circa indicationem concoctæ. Tussiebant autem non valde,

A valde, neque ea quæ per tussim reieciuntur difficultatem exhibebant, Neque cibum fastidiebant, sed etiam valde licebat ipsis offerre. In summa subægrotabant tabidi, non tabido modo, febribus horridis parum insudantes, aliàs aliq, vt qui erroneo modo exacerbarentur, febribus quidem in totum nõ intermittētibz, sed quæ iuxta naturæ febris tertianę morem exacerbarentur. Iudicabantur autem quibus inter hos breuissimæ essent, circa vigesimum diem. plurimis circa quadragesimum. Multis circa octuagesimum. Quibusdam neque sic, sed vago modo & circa iudicationem deficiebāt. horum autem plurimis febres rursus non multum tempus intermittētes reuersæ sunt. Ex recidiuis autem in iisdem circuitibus iudicabantur. Multis vero ipsorum producebantur, vt sub hyemem ægrotarent. Ex omnibus porro in hac temporis constitutione descriptis, solis tabidis lethalia acciderunt. In alijs autem febribus, non.

*Tabes hæc
quæ.*

SECTIO SECUNDA.

Constitutio temporis secunda.

IN Thaso ante autumnum tempestates non tempestiue, sed derepente in aquiloniis & austrinis multis, humide & præerumpentes. Huiusmodi vero durabant vsque ad pleiada, & sub pleiade. Hyems autem aquilonia. Aquæ multæ, largæ, magnæ. Niuēs. Plerunque mixta aeris serenitas. & hæc quidem fiebant omnia. frigora vero nõ admodum intempestiua. Iam vero post brumale solstitium, & quando fauonius spirare incipit, posterior hyems magna erat. aquilonia multa. Niuēs & aquæ assidue multæ, & cælum procellosum ac nubilum. Hæc autem durabant & non remittebāt vsque ad æquinoctiū. Ver autem frigidum, aquilonium, aquosum, nubilum. Aestas non valde æstuosa fiebat. Etesia assidue spirarūt, Mox circa arcturam in aquiloniis, aquæ valde multæ. Quum autem annus totus humidus & frigidus & aquilonius esset, per hyemem fa no modo plerunq; habebant. Ante ver autem multi quidam & plurimi morbose degebant. Primū igitur coeperunt lippitudines fluidæ, dclorosa, humidæ, crudæ. Lemæ paræ & multis difficulter erumpentes, plurimis reuertebantur. defecerūt sero ad autumnum. Aestate iam & autumnno, lienteria, & dysenteria, & tenesmi, & alui profluvia ex biliosis, tenuibus multis, crudis, & mordacibus: quibusdā vero etiam aquosis. Mul-

Thasus.

*Solstitium
hybernū*

*Ver.
Aestas.
Etesia.
Arcturus.*

Ophthalmia.

Vētris fluores diuersi.

R. iij tis autem

HIPPOCRATIS LIBER I.

Straguria tis autem & vrinæ fluxiones cum dolore biliosæ, aquosæ, ra-
mentosæ, purulentæ, cum stillicidio, non rhenales. sed his alia D

Vomitio. pro aliis. Vomitus pituitosi, biliosi, & ciborum crudorum re-
Sudor. iectiones. Sudores. Omnibus vndiquaque multa humiditas.
Fiebant autē hæc multis erecte obambulantibus, non febrien-
tibus. Multis item febrientibus, de quibus paulo post scribe-
tur. In quibus autem omnia hæc præscripta apparebant cum
dolore, tabidi fiebant. Iam vero autumnō & sub hyemem, fe-
Febres di- bres continuæ, & quibusdam ipsorum paucis ardentes, diur-
uerse. næ, nocturnæ, semitertianæ, tertianæ, exactæ, quartanæ, erro-
neæ. Singulæ vero prædictæ febres multis fiebant. At arden-
Quartana, tes & paucissimis obortæ sunt, & ex ægrotis hi minimum la-
erratica. horauerunt. Neque enim sanguis erupit, nisi valde parum, & E
paucis. Neque delirabant, aliaque omnia tolerabilia erant. Iu-
dicabantur autem plurimis valde bono ordine, cum intermit-
tentibus in septem ac decem diebus, Neque mortuum aliquē
tunc in febre ardente noui, neque phrenitim tunc cuiquam
factam scio. At vero tertianæ plures quidem quàm arden-
tes febres erant ac grauiores, verū ordinate in his omnibus à
prima accessione quatuor circuitus habebāt, in septem autē
perfecte iudicabantur, neque vlli horū reuersæ sunt. Quar-
tanæ vero multis quidem ab initio ex ordine quartanæ cœ-
perunt. Quibusdam autē non paucis, ex aliis febribus ac mor-
bis abscessus ad quartanas fiebant, atque hos diu, quemadmo-
dum solent, & adhuc diutius tenebant. Diurnæ vero quo-
tidianæ, & nocturnæ, & erroneæ multæ, multis & multo tem-
pore permanebant, & erecte obambulantibus, & decumben-
tibus. Plurimos horum sub pleiada, & vsque ad hyemem, fe-
bres consequebantur. Multos conuulsiones, magis autē pue-
ros ab initio, & febriebant. & in febribus conuulsiones fie-
bant. & erant hæc plerisque diuturna, verum innocua, nisi ad
hæc, etiam ex aliis omnibus perniciēs adesset. At continuæ
quidem in totum, & nihil intermittentes, exacerbescentes au-
tem omnibus ad naturæ tertianæ modum, vna die subleuan-
tes, & vna exacerbescentes, omnium quæ tunc fiebant violen-
tissimæ erant, & longissimæ, ac cum maximis doloribus, leni-
ter auspicantes, & in totū semper augescentes, & in iudicato-
riis diebus exacerbescentes, & in peius procedentes, parū al-
leuantes, & statim rursus ex intermissione violentius exacerbe-
scentes, F

A scentes, in iudicatoriis plerunque diebus peiores fiētes. Rigores vero omnibus quidē inordinate & erroneo modo fiebant, parcissime autem & minime his. Verum in aliis febribus maiores. Sudores multi, his minimi, nihil alleuantes, sed subcontrario modo damna inferentes. Frigiditas extrematum his multa, & vix recalescens. Neq; somni in totum, maxime vero hi etiam rursus soporosi. Ventres autem omnibus turbati & mali, his autem longe pessimi. Vrinæ vero plurimis horum aut tenues, & crudæ, & decolores, & post temp^{us} parum concoctæ iudicatorio modo. Aut crassitudinem quidem habentes, verum turbatæ, neque consistētes, neque subfidentes neq; concoctæ. Aut paucae, & crudæ, ac malæ, & subfidentes. Pessimæ autem hæc omnes. Et tussis quidem ad febres comitabantur, Verum non habeo quod scribam, an detrimentum aut utilitas tūc ex tussi contigerit. Diuturna igitur & molesta, & valde inordinate ac erroneo more, & citra iudicationem, plurima horum perseverabant, tū his qui perniciose habebant, tum his qui non. Si enim aliquos ipsorum paululum relinquerent, statim rursus reuertebantur. Quibusdam vero paucis ipsorum iudicabatur, quibus brevissime adessent, circa octogesimam diem. & horum aliquibus reuersa sunt, vt plurimi ipsorum per hyemē adhuc ægrotarint. plurimis autem citra iudicationem defecerunt. Hæc vero pariter acciderunt, & his qui superstites manserunt, & qui non.

C Quum autē multa & varia fieret iudicationis impeditio ex morbis, maximum etiam ac pessimum signum perpetuo comitabatur, quod plerique omnes cibos fastidirent, & ex his maxime hi, quibus etiā alia exitialia erant. Siticulosi vero nō adeo intempestive in his febribus erant. Quum vero tempus produceretur, & dolores essent multi, ac colliquatio mala, his abscessus succedebāt, aut maiores quā vt ferre possent, aut minores quā vt quicquam prodesse: sed statim recurrerent & ad peius courgerent. Erant autem quæ his fiebant hæc: dysenteria, tenesmi, lienteria & alui profluuia. Quibusdam etiam hydropes, partim cum his, & partim absque his. Quicquid autē ex his violenter accedebat, statim vires deiciebat: aut rursus nihil proderat. Papulæ parvæ, & non prodignitate rationis excretionis morborum, & statim rursus evanescentes. Aut iuxta aures tumores, qui non soluebantur,

Tussis cum febre.

Ventris mala.

HIPPOCRATIS LIBER I.

& nullam de se significationem præbebant. Quibusdā in articulos, maxime vero in coxendicē, paucis iudicatorio modo cessantes, & statim rursus ad habitum ab initio inualescētes. Moriebantur autem ex omnibus, & plurimi ex his pueri iam ab lactati, & maiores natu, octennes ac decennes, & nōdum puberes. Fiebant autem hæc his, non sine prius scriptis. Priora vērō multis, sine his. Solum vero bonum & maximum inter ea quæ fiebant signū, & quod plurimos in maximis periculis constitutos liberauit, quibus ad vrinæ stillicidium cōuertebantur, & ad hoc abscessus fiebant. Accidit autem plerisque vrinæ stillicidium, maxime his ætatibus. Fiebat & aliis multis, tum erecte obambulantibus, tū in morbis. Statim vero etiam magna quædam mutatio omnium, his fiebat. Alii enim etiam si humectæ essent, maligno modo mox sistebantur, cibosque omnes libenter sumebant. Et febres postea mitiores erant. Verum vrinæ stillicidium his diuturnum & laboriosum erat. Vrinæ vero his erant multæ, crassæ, variæ, rubræ, purulentæ cum dolore. Atque hi omnes superstites mæserunt, & nullum ex his mortuum noui. Quæcunque vero non periculose fiunt, concoctiones excrementorum cūnes vndiquaque tēpestiuas aut bonas, & iudicatorios abscessus, considerare oportet. Cōcoctiones celeritatem iudicationis, & securitatē sanitatis significant. Cruda vero & incōcocta, & in malos abscessus conuersa, aut iudicationis sublationem, aut dolores, aut diuturnitatē, aut mortem, aut eorundē reciduias. Quod vero ex his potissimum futurum sit, ex aliis F

considerandum est. Præterita dicito, præsentia cognoscito, futura prædicito. Hæc tractato. Exerceto circa morbos duo, vt iuues, aut nō noceas. Ars ex tribus constat, morbo, ægroto, & medico artis ministro. Aegrotum cū medico aduersari morbo oportet. Capitis & colli dolores ac grauitates cum dolore, cum febribus, & sine febribus, Phreniticis quidem conuulsionibus, Sed & virosa vomunt, & quidam ex his subito moriuntur. In ardentibus autē & aliis febribus, quibus colli dolor, & temporū grauitas, & caligo vertiginosa circa oculos, aut etiam præcordiorum dissentio, non cum dolore fit, his sanguis per nares erumpit. Quibus autem grauitates quidem toti⁹ capitis, oris autem ventriculi morsus adsunt, & nausea budi sunt, hi biliosa & pituitosa vomunt. Plerumq; vero pueris in

*Digesta
cruda que
quid por-
tendant.*

*Medici
munus.
Medica
ars quibus
constet.*

Aris in talibus afflictionibus cōuulsiones fiunt. Mulieribus autem tum eadem, tum ab uteris dolores. Senioribus autem & quibus iam calor superatur, paraplegiæ vocatæ, leues siderationes, aut insanix, aut cecolorum priuationes.

Constitutio temporis tertia.

IN Thaso paulo ante arcturum, & sub arcturo, aqua multa, magna, in aquiloniis. Circa æquinoctium autem & usque ad pleiada, austrinæ pluuiæ pauca. hyems aquilonia, siccitates, frigidi venti, magna niues. Circa æquinoctium hyemes maximæ. Ver æquiloniū, siccitates, pluuiæ pauca frigida. Circa solstitium æstiuum aqua pauca, magna frigora usque ad canem. Post canem usque ad arcturū, æstas calida, æstus magni, non ex accessione augescentes, sed continui ac violenti. Aqua non delapsa est. Etesix spirarunt. Circa arcturum pluuiæ austrinæ usque ad æquinoctiū. In hac autem constitutione, per hyemem quidem receperunt resolutiones ex sideratione, & multos inuaserunt. & quidā ex ipsis subito moriebantur. Nā hic morbus satis popularis erat. Cætera incolumes degebant. Ante ver autem cœperunt febres ardentes, & usque ad æquinoctiū, & ad æstatem durabant. Quicūque igitur vere & æstate ineunte statim ægrotare cœperunt, plurimi seruabantur. pauci vero quidam moriebantur. In autumno iam & quum pluuiæ fierent, lethales erant, & plures peribant. Erant autem febrium ardentium affectiones. Quibus quidem bene ac large sanguis per nares erupit, per hoc maxime seruabantur. & nullum noui qui in hac constitutione mortuus esset, si recte ipsi sanguis profluxisset. In Philisco enim & Epaminone ac Sileno, quarta ac quinta die parum de naribus stillauit, & moriebantur. Plerique igitur ægroti circa iudicationem rigeant, maxime hi quibus sanguis nō erupisset. Idem vero etiam postea insuper riguerunt, & exsudarunt. Quibusdam morbus regius accidit sexta die. Verum his purgatio per vesicam, aut alius exturbata profuit, aut larga sanguinis eruptio. Velut Heraclides qui decūbebat apud Aristocydem. nam huic & ex naribus sanguis erupit, & alius turbata est & per vesicam purgatus est. Vigesima die iudicatus est. nō velut Phanagoræ seruus, cui nihil tale factum est, & mortuus est. Sanguis autem plurimis erupit, maxime a adolescentibus & in vigore constitutis, & talium plerique perierunt,

Qualis terra constituta in Thaso.

Ver quales.

Etesix.

Autumnus semper malus.

Philiscus. Epaminō. Silenus.

Heraclides. Aristocyes. Phanagoras.

HIPPOCRATIS LIBER.

perierunt, quibus sanguis nō erupit. Senioribus vero ad morbum regium res deuenit aut alui ipsis turbata sunt, aut dysenterici facti sunt. Velut Bioni apud Silenum decumbenti contigit. Populariter grassabatur etiam dysenteriae per aestatem, & quibusdam qui aegrotarunt, quibusque etiā sanguis erupit, ad dysenteriam transitus factus est velut Eratonis filio & Mylo, qui multa sanguinis eruptione facta, in dysentericum statum delapsi superstites manserunt. Multis igitur maxime hic humor redundauit. Nam & quibusdam circa iudicationem sanguis nō erupit, sed tubercula iuxta aures excitata euauerunt. Quae ubi euauissent, iuxta sinistri lateris mollitudinem, & ad summam coxam grauitas fuit. Quum autem dolores post iudicationem fierent, & urinae tenues prodissent, parum sanguinis profundere coeperunt. Verum circa quartam & vigesimam, abscessus ad sanguinis eruptionem fiebant Antiphonti Critobuli filio, quae sedata est, & perfecte iudicatus est circa quadagesimā. Mulieres porro multae quidem aegrotarunt, pauciores autem quam viri. & pauciores etiam mortuae sunt. Plurimae vero grauiter ex partu laborarunt, & post partus in super aegrotarunt, & haec maxime perierunt. Velut Telebuli filia, quae sexta à partu die mortua est. Plurimis itaque in febribus menses apparebant. Quibusdam vero ex naribus sanguis erupit. & virginibus multis id primum factum est. Quibusdam & ex naribus sanguis, & menses proruperunt. Velut Datharsei filiae virgini apparuerunt tunc primum, & sanguis largus ex naribus fluxit. Neque vllā mortuam noui, ex his quibus aliquid horum probe factū esset. Quibus autem praegnantibus contigit aegrotare, omnes foetus perdiderunt, quas ego noui. Urinae vero plurimis boni quidem coloris, verum tenues & subsidentias modicas habentes, ex recrementis tenuibus ac biliosis. Multis autem aliis iudicatis ad dysenterias res deuenit. Velut Xenophani & Critiae. Urinae aquosae, multae, purae, tenues post iudicationem, & subsidentia bona facta, & aliis probe iudicatis. Mentionem faciam eorum quibus factae sunt, Bioni qui apud Silenum decubebat. Cratae quae apud Xenophanem. Aetoni filiae uxori Mnesistrati. Postea vero omnes hi dysenterici facti sunt. Quod urinas minxerunt aquosas, considerandum est. Circa arcturum autem multis undecima die iudicatio facta est, & bis recidit.

uaz non

- A** uæ non pro ratione fientes reuerſæ ſunt. Erant autem ſoporofi circa tempus hoc, plures autem pueri. & hi omnium minime moriebantur. At vero circa æquinoctium, & uſque ad pleiada, & ſub hyemem, comitabantur quidem febres ardentes. Sed & phrenitici plurimi tunc fiebant. & plerique horum moriebantur. fiebant autem & per æſtatem pauci. Quæ igitur febres ardentes inciperent, ſignificationem de ſe præbebant quibus pernicies immineret. Statim enim ab initio febris acuta, parum inſuper rigeabant, vigilæ erant, ſiticuloſi, anxij, parum exudantes circa frontem & clauiculas, nullus per totum, multum delirabant, tumores, triſtitia, extremitates ſubfrigidæ, pedes ſummi & maxime manuum ſummæ partes. Exacerbationes in diebus paribus. Plurimis autem quarta die dolores maximi, & ſudores plerunque ſubfrigidæ, & extremitates non amplius recaleſcentes, ſed liuidæ, ſubfrigidæ. & neque ſitiebant. Ad hæc vrina his nigræ, pauca, tenues, & alui ſiſtebantur. neque ſanguis è naribus erupit ulli ex his quibus hæc accidiſſent, ſed parum ſtillauit. Neque ad recidiuam ulli horum res deuenit. Sed ſexta die mortui ſunt cum ſudore. Phreniticis autem acciderunt præſcripta non omnia. Iudicabantur autem his plerunque die vndecima, quibusdam vigefima. Quibus non ſtatim ab initio phrenitis cœpit circa tertiam aut quartam diem, ſed moderate habebant primo tempore, his circa ſeptimam morbus ad acumen tranſiit. Magna itaque erat morborum multitudo. Ex ægris autem maxime moriebantur adoleſcentes, iuuenes, in vigore ætatis cõſtituti, leues, ſubalbicâte cute, rectos itemq; nigros capillos habentes, & oculos nigros, & qui in quiete & ocio vixerat, & alta voce, aut gracili, aut aſpera præditi, balbi, iracundi, & mulieres plurimæ ex hac ſpecie moriebantur. At in hac conſtitutione ex quatuor ſignis maxime ſeruabantur. Quibus videlicet ſanguis è naribus probe erupiſſet. Aut vrina multæ, & multam ſubſidentiam habentes per veſicâ prodiſſent. Aut per ventrem turbata, bilioſa tempeſtiue proceſſiſſent. Aut qui dyſenterici facti eſſent. Acciditque multis vt non ex vno præſcriptorum ſignorum iudicaretur, ſed per omnia percurrerent. & grauius quidem habere videbantur, conſeruabantur autem omnes quibus hæc accidiſſent. Mulieribus autem & virginibus accidebant item præſcripta

Acquinoſtium.

Poſtrema qualia in his.

Qui hoc morbo perirent.

Quatuor hæc languentes ſeruabant.

HIPPOCRATIS LIBER I.

scripta signa omnia. Quibus autem vel horum quippiam be-
ne accideret, aut menses large apparerent, per hæc seruabā-
tur ac iudicabantur, neque vlla in interiisse noui, cui ex his
aliquid accidisset. Philonis enim filia sanguis ex naribus lar-
ge fluebat. Septima autem die intempestiuius cōtrauit &
mortua est. Quibus in febribus acutis, magis ardentibus, la-
chrymæ inuitæ defluunt, his sanguinis à naribus eruptionem
expectare oportet, si etiam alia perniciose nō habeant. Nam
his qui male habent, non sanguinis eruptionem, sed mortem
significant. Tubercula iuxta aures in febrientibus cum
dolore oborta, quibusdam febre indicatorio modo deficien-
te, neque sedantur, neque suppurantur: hæc biliosum alui
profluuium, aut dysenteria, aut crassarum vrinarum subsidē-
tia soluit. Velut Hermippo Clazomenio. Iudicationes au-
tem ex quibus cognoscimus, aut similes sunt, aut dissimiles.
Velut duo fratres qui simul eadem hora ægrotare cōperūt.
Decumbebant autem iuxta theatrum Epigenis fratres. Ho-
rum seniori sexta die iudicatio facta est, iuniori vero septi-
ma. Recidiua facta est vtrisque simul eadem hora. Inter-
misit dies quinque. Ex recidiua iudicatio facta est vtrisque si-
mul in totū, die decima septima. Plurimis autē sexta die iudi-
catio facta est, intermisit sex. Ex recidiuis autem iudicatio fa-
cta est quinta die. Quibusdam vero septima iudicatus est
morbus, & septem diebus intermisit. Ex recidiua vero iudi-
catus est tercia. Quibusdam autem iudicatus est quinta, ia-
termisit septem, rediit per tres, intermisit vnam, insuper-
que vnam rursus occupauit. Aliquibus vero iudicatus est
sexta, intermisit sex, rediit per tres, intermisit vnam, & vna
iudicatus est: Velut Euagonti Daipharis filio. Quibusdam
autem iudicatus est sexta, intermisit septem: ex recidiua ve-
ro iudicatus est quarta. Velut filia Aglaidæ. plerique igitur
ex his qui ægrotarunt in hac constitutione, hoc modo ægro-
tarunt, & nullum noui ex his qui superstites manserunt, cui
non rediissent recidiuæ secundum rationem fientes, & ser-
uari sunt omnes quos ego noui, quibus hoc genus recidiuæ
factæ sunt. Neque ægrotantium hoc modo vllum aliquem
nouī, quem recidiua iterum repetisset. Moriebantur au-
tem in morbis his plurimi sexta die: velut Epaminondas, &
Silenus, & Philiscus Antagoræ filius. Quibus autem tu-
bercula

*Philonis
filia cur
perierit.*

*Lachry-
mæ non
spōte de-
fluentes.*

*Tubercu-
la iuxta
aures.*

*Iudicatio-
nes variæ.*

*Theatru
Epigenis.*

Euagon

*Aglaidæ
filia.*

*Epaminō-
das.*

*Silenus
philiscus.*

Abercula iuxta aures facta essent, his iudicatio facta est vigesima die. Restincta autem ac sedata sunt omnibus, & non suppurata sunt, sed ad vesicam conuersa. Cratisthonacti qui apud Heracleium habitabat, & Scymni fullonis ancilla suppurauerunt, & mortui sunt. Quibus autem iudicatus est septima die, intermisit nouem, reuersus est morbus. Iudicatus est ex recidiua quarta die. Quibus autem iudicatus est septima die, intermisit sex, deinde rediit, & iudicatus est septima velut Phanocrito, qui decumbebat apud Gnathonem pictorem.

*Tubercula
post aures
Cratistho-
naz.
Heraclaei
Scymnus.*

Sub hyemem circa solstitium hybernum, & vique ad æquinoctium, perseuerabant quidem & febres ardentes, & phrenitides, & multi moriebantur. Iudicationes tamen transmutatae sunt, & iudicatio facta est plurimis ab initio die quinta, intermisit quarta, recidiua facta est, ex recidiua vero iudicatio facta est quinta die. In summa quatuordecim diebus. Sic autem facta est iudicatio pueris plurimis, immo etiam senioribus. Quibusdam vero morbus iudicabatur die vadecima. Reuertebatur decimaquarta, iudicabatur perfecte vigesima. Si vero aliqui insuper riguissent circa vigesimam, his iudicabatur quadragesima. Superriguerunt autem plurimi circa iudicationem ab initio. Qui vero circa iudicationem ab initio riguerunt, etiam in recidiuis vnâ cum iudicatione riguerunt. Riguerunt autem paucissimi vere, æstate plures, autumno adhuc plures, hyeme longe plurimi. At sanguinis eruptiones cessabant.

*Phanocri-
tos.
Gnatho.*

C S E C T I O T E R T I A.

Morbos dinoscimus edocti, ex cõmuni omnium natura, & ex vniuscuiusq; propria, ex morbo, ex ægroto, ex his quæ offeruntur, ex eo qui offert. Ex his enim & breuiiores, & grauiiores redduntur: ex tota ac partiali constitutione coelestium, & vniuscuiusque regionis, ex victu, ex vite studiis, ex ætate cuiusque, sermonibus, moribus, taciturnitate, cogitationibus, somnis, vigiliis, insomniis quibusdam & quando, vellicationibus, pruritibus, lachrymis, exacerbationibus, secessibus, vrinis, spuris, vomitibus. & quæ ex quibus, in quos, successiones morborum: & qui abscessus ad perniciem, & ad iudicationem: Sudor, rigor, frigiditas, tussis, sternutationes, singultus, spiritus, ructus, flatus silentes, strepentes, sanguinis eruptiones, hæmorrhoides. ex his au-

*Morbore
cognitio
et obser-
uatio us-
ria.*

tem, &

HIPPOCRATIS LIBER I.

Februm species que. tem, & quæ per hæc sunt, considerandum. Febres quædam **D** continuæ sunt, quædam interdiu tenent, noctu intermittunt. Aut nocte tenent, die intermittunt. Semitertianæ, tertianæ, quartanæ, quintanæ, septimanæ, nonanæ. Sunt autem acutissimi, & maximi ac gravissimi morbi, & maxime lethales, in continua febre. Securissima vero omnium, & facillima ac longissima est quartana. Non enim solum ipsa à seipsa talis est, sed etiam ab aliis magnis morbis liberat. At in semitertiana appellata, contingit quidem & acutos morbos fieri, & est hæc præ ceteris maxime lethalis. Sed & tabidi, & quicumque ex aliis longis morbis ægrotant, ex hac maxime ægrotant. Nocturna non admodum lethalis est, verum longa. Diurna longior. Quibusdam autem & ad tabem vergit. Septimana longa est, verum non lethalis. Nonana adhuc longior, & non lethalis. Tertianæ exacta cito iudicatur, & non est lethalis. Quintana pessima omnium est. Nam & ante tabem, & iam tabidis superveniens, occidit. *Quartana.* Sunt autem modi, & constitutiones, & exacerbationes singularum harum febrium, æque continuarum ac intermittentium. Velut verbi causa, Continua quibusdam ab initio flores, & viget maxime, & ad deterius procedit. Circa iudicationem vero & vñ cum iudicatione, imminuitur. *Semitertiana.* Quibusdam vero molliter incipit & submisit, augetur autem & exacerbatur quotidie, Circa iudicationem vero & vñ cum iudicatione, acervatim elucet. Quibusdam leniter auspicata augetur & exacerbatur. & ubi aliquandiu in vigore fuit, rursus remittit usque ad iudicationem, & circa iudicationem. Atque hæc contingere solent in omni febre, & in omni morbo. Oportet autem victus rationem ex horum consideratione offerre. Multa vero etiam alia signa his sunt cognata, de quibus partim scriptum est, partim scribetur. Ad quæ ratiocinari oportet, examinareque ac considerare, cui horum acutus ac lethalis sit morbus, aut à quo superstes sit futurus. & cui offerendum sit, aut non, & quando, & quantum. & quid offerendum erit. Quæ vero paribus diebus exacerbantur, paribus iudicantur. Quorum autem exacerbationes in imparibus sunt, ea in imparibus iudicantur. Est autem primus iudicatorius, ex circuitibus diebus paribus iudicantibus, quartus dies. Deinde sextus, decimus, decimusquartus,

A cinus quartus, decimus octauus, vigesimus, vigesimus quartus, vigesimus octauus, trigesimus, trigesimus quartus, quadragessimus, sexagesimus, octogessimus, & etesimus vigesimus. Ex circuitibus vero in imparibus diebus iudicantibus, primus est dies tertius. deinde quintus, septimus, nonus, vndecimus, decimus septimus, vigesimus primus, vigesimus septimus, & trigesimus primus. At vero nosse expedit, si aliter iudicatio fiat, extra præscriptos dies, recidivas fore significat, & fuerit sane perniciofa. Oportet autem animaduertere nosse, in his temporibus iudicationes futuras esse, ad salutem, aut perniciem: aut inclinationes ad melius, aut deterius.

B Erroneæ porro febres, & quartanæ, & quintanæ, & septimanæ, & nonanæ, in quibus circuitibus iudicentur considerandum est.

ÆGROTI QVATVORDECIM. I.

Philiscus prope muros habitabat, decubuit. Primo die febris acuta, sudauit, noctem laboriosam habuit. Secundo die omnia exacerbata sunt. Vesperis ab infuso per clysterem adhibito bene habuit, noctem quietam. Tertio mane & vsque ad meridiem, visus est à febre liber esse. Ad vesperam febris acuta cum sudore, siticulosus erat, lingua rescabatur, nigra minxit, noctem molestam habuit, non dorminit, omnino delirauit. Quarto omnia exacerbata sunt, vrinæ nigræ, nox tolerabilior, vrinæ melioris coloris. Quinto circa meridiem parum de naribus stillauit non mixtum. Vrinæ variæ, quæ habebant innatantia quædam rotunda, genituræ similia, dispersa, non subsidebant. Subdita glande, flatuosa pauca prodierunt, noctem habuit laboriosam, somni parui, sermones, deliramenta, extremitates vndique frigidæ, & non amplius recalescentes. minxit nigra, dorminit parum, ad diem voce destitutus est, frigidum sudauit, extremitates liuidæ. Circa meridiem sexta die mortuus est. Huic spiritus ad finem vsque velut reuocati, rarus & magnus. Splen eleuatus est orbiculari gibbositate. Sudores frigidi perpetuo. Exacerbationes diebus paribus.

*Philiscus
quàm uas
ric agitat
tus.*

*Philisci
mors.*

ÆGROTVS II.

Silenus habitabat in Platamone, prope filios Eualcidis. Hunc ex lassitudinibus, & potationibus, ac exercitiis in-tempestiuis febris corripuit. Cæpit autem ægrotare ex lûbis, & caput

Silenus:

HIPPOCRATIS LIBER I.

Quarta uas
tictas uis
dcto.

Sileni
mors.

Herophon

& caput grauitas tenebat & colli distentio erat. Ab aluo pri.
ma die biliosa, mera, spumosa, abunde colorata, multa pro-
dierunt. Urinae nigrae nigrae subsidentiā habentes, siticulosus,
lingua resiccata, nocte nihil dormiuit. Secunda die febris a-
cuta, secessus plures, tenuiores, spumosi. Urinae nigrae, nox
molesta, parum delirauit. Tertia omnia exacerbata sunt, pre-
cordij distentio vtrinque oblonga ad vmbilicum submollis.
Secessus tenues, subnigri. Urinae turbatae, s. bnigrae. Nocte
nihil dormiuit, sermones multi, risus, cantus, continere se
non potuit. Quarta per eadem. Quinta secessus meri, bilio-
si, leues pingues. Urinae tenues, pellucidae. parum respi-
scebat. Sexta circa caput parum sudauit. extremitates fri-
gidae, liuidae, lactatio multa. ab aluo nihil prodit. Urinae
suppressae sunt, febris acuta. Septima die voce destitutus est.
extremitates non amplius recalescebant, nihil minxit. Osta-
ua sudauit frigidum per totum sudorem. papulae cum sudo-
re rubrae, rotundae, paruae, velut vari permanebant, non ab-
scedebant. Ab aluo vero cum parua irritatione, stercora te-
nuia velut inconcocta, multa prodibant cum dolore. Uri-
nam reddebat cum dolore mordacem. Extremitates parum
recalescebant. Somni tenues, soporosi. Vox intercepta: Uri-
nae tenues, pellucidae. Nona per eadem. Decima potum non
suscipiebat. Soporosus erat, somni autem tenues. Ab aluo si-
milis. Minxit acervatim subcrassum, depositum subsidens
subsidentiā crassae farinae similis, alba. Extremitates rursus
frigidae. Vndecima mortuus est. Ab initio huic & ad finem
vsque spiritus magnus rarus, praecordij palpitatio assidua.
Aetas erat circa annos vingiti.

AEGROTVS III.

Herophonti febris acuta. Ab aluo pauca ab initio velut
in tenesmo. Postea vero tenuia prodibant biliosa, fre-
quentiora. Somni non aderant. Urinae nigrae, tenues. Quin-
ta mane surditas. Exacerbata sunt omnia. Splen eleuatus est.
Praecordij distentio. Ab aluo pauca, nigra prodierunt. deli-
rauit. Sexta delirabat. ad noctem sudor, frigiditas. delirus
permanebat. Septima perfrigerabatur. Siticulosus, delirabat,
noctu respicebat, obdormiuit. Octaua febricitauit, splen
minuebatur, intelligebat omnia. doluit iuxta inguen, tumor
primum e directo splenis. Deinde dolebat utraque tibias.

noX

A nox tolerabilis. Vrinæ coloris melioris parua subsidetiā habebat. Nona sudauit, iudicatus est morbo⁹, intermisit. Quinta reuersus est. Statim autem splen eleuatus est, febris acuta, surditas rursus. Post recidiuam tertia die splen minuebatur, surditas minor erat. crura dolebant, noctu sudauit. Iudicatus est die septimadecima. Neque delirauit in recidiua.

AEGROTVS IIII.

IN Thaso Philini vxorem, quæ filiam pepererat, quum purgatio secundum naturam facta esset, & aliàs leuiter degeret, decimaquarta à partu die febris vehemens corripuit cum rigore. Ab initio vero cor dolebat, & circa præcordium dexterum. muliebrium partium dolores. purgatio cessauit. Vbi vero glandem subdidisset, hæc quidem leuiora facta sunt. Capitis autem colli & lumborum dolores permanebant. Somni non aderant. Extremitates frigidae. Siticulosa erat. alius combusta. pauca egerebat. Vrinæ tenues, ab initio decolores. Sexta die ad noctem multum delirauit, & rursus resipiscebat. Septima siticulosa. secessus biliosi, abunde colorati. Octaua superriguit. febris acuta. conuulsiones multæ cum dolore. multum delirabat. Glande subdita exurgebat, multa que cum fluxione biliosa prodibant. Somni non aderant. Nona conuulsiones. Decima parum resipiscebat. Vndecima dormiuit. omnium recordata est. Statim autem rursus delirauit. Vrinam autem reddebat cum conuulsionibus, aceruatam, multam. illis autem parum admonentibus, crassam albam: qualis est ex his quæ subsiderunt, vbi multo tempore sita, fuerint conturbata. non subsidebat. color & crassitudo talis, qualis est in vrinis iumentorum. Talia mingebat, quæ & ego vidi. Circa decimum quartum diem palpitaciones per totum corpus, sermones multi, parum resipiscebat. Verum statim rursus delirabat. Circa decimum septimum voce destituebatur. Vigesima mortua est.

AEGROTVS V.

EPicratis vxorem, quæ decumbebat apud Archegetem, partui iam propinquam, rigor fortiter corripuit. non incaluit, velut dicebant. Et postridie eadem erant. Tertia die peperit filiam, & alia omnia iuxta rationem venerunt. Postridie à partu febris acuta eam inuasit, cordis dolor & muliebrium partium. Vbi vero glādem subdidisset, hæc quidem

S leuiora

Herophon
liberatus
est.Philini cō,
iuxta pu-
erperat.
Thasus.Morsus⁹Epicrates.
Archege-
tes.

HIPPOCRATIS LIBER I.

leuiora facta sunt. Capitis autem & colli ac lumborum dolor. **D**
 Somni nō aderant. Ab aluo modica biliosa, tenuia, pura pro-
 dibant. Vrinæ tenues, subnigræ. Sexta die à quo febris ipsam
 corripuit, ad noctem delirauit. Septima omnia exacerbata
 sunt. vigilans delirauit, siticulosa, secessus omnes biliosi a-
 bunde colorati. Octaua superriguit, plus dormiuit. Nona
 per eadem. Decima crura laboriose dolebat. Cordis dolor
 rursus. capitis grauitas. non delirauit. magis dormiuit. aluus
 restitit. Vndecima sudauit. minxit melius colorata, multam
 subsidientiam habentia. leuius degebat. Decimaquarta su-
 perriguit. febris acuta. Decimaquinta vomuit biliosa, flaua,
 satis multa. Sudauit sine febre. Ad noctem febris acuta. Uri-
 næ crassæ subsidientiam albam habentes. Decima sexta ad **E**
 noctem exacerbata est, & cum molestia non dormiuit, deli-
 rauit. Decima octaua siticulosa, lingua combusta est. non
 dormiuit. multum delirauit. crura dolebat. Circa vigesi-
 mam mane parum rigit, soporosa, quiete dormiuit. vo-
 muit biliosa, pauca, nigra. Ad noctem surditas. Circa vige-
 simam primam lateris sinistri grauitas, per totum cum do-
 lore. parum insuper tussit. Vrinæ crassæ, turbatæ, subrubræ,
 quæ depositæ non subsidebant. cætera leuiora. non sine
 febre. Statim ab initio fauces dolebat, rubor aderat, colu-
 mella reuulsa, fluxio acris, mordax, salsa, perpetuo perseue-
 rabat. Circa vigesimam septimam febris libera, in vrinis sub-
 sidentia. latus dolebat. Circa primam & trigessimam febris **F**
 corripiebat. aluus ex biliosis turbata est. Quadragesima die
 vomuit pauca biliosa. Iudicata est perfecte libera à febre die
 octogesima.

*lateris
dolor.*

Nō perit.

AEGROTVS VI.

*Cleana-
stides.*

Cleanastiden qui supra Heracleum decumbebat, febris
 corripuit erroneo modo. Dolebat autem caput ab ini-
 tio, & latus sinistrum. & aliarum partium dolores aderant,
 lassatorum modo. febres exacerbabantur aliàs aliter inordi-
 nate. Sudores quandoq; quandoq; nō. Exacerbationes ut plu-
 rimum in iudicatoriis diebus magis accedebant. Circa vi-
 gesimam quartam summas manus dolebat. Vomuit biliosa,
 flaua, satis multa. Paulo post autem æruginosa. Ab omnibus
 alleuatus est. Circa trigessimam sanguis ex vtrisque naribus
 erumpere cœpit, atque hoc erroneo modo paulatim vsque
 ad iu-

A ad iudicationem. Non autem fastidiebat cibum, neque siticulosus erat per totum tempus, neque insomnis. Vrinæ tenues, non decolores. Circa quadragesimam minxit subrubra, subsidentiam multam valde rubram habentia. alleuatus est. post hæc autem urinae variae, quandoque subsidentiam habebant, quandoque non. Sexagesima urinis subsidentia multa, & alba, & leuis. Remiserunt omnia. febres intermittebant. Vrinæ tenues quidem, verum boni coloris. Septuagesima à febre liber permanfit diebus decem. Octogesima riguit, febris acuta corripuit. multum sudauit. Vrinis subsidentia rubra, leuis. perfecte iudicatus est. *Non moritur.*

AEGROTVS VII.

B Metonem febris vehemens corripuit, lumborum grauitas dolorosa. Postridie ubi aquam bibisset satis multam, ab aluo probe prodiit. Tertia capitis grauitas. Seccessus tenues, biliosi, subrubri. Quarta omnia exacerbata sunt. Fluebat à dextra nare bis sanguis modicus. Noctem moleste tulit. Seccessus similes tertiæ diei. Vrinæ subnigræ, habebant quiddam in medio innatans, subnigrum, diuulsum. non subsidebant. Quinta effluxit ex sinistra nare sanguis largus, merus. Sudauit. iudicatus est. Post iudicationem insomnis, delirabat. Vrinæ tenues, subnigræ. Capitis lotionibus vsus est. dormiuit. resipiscebat. Huic recidua facta non est. Sed sanguis erupit sæpe etiam post iudicationem. *Meton.*

AEGROTVS VIII.

C Erasimum qui habitabat circa Bootæ torrentem, febris vehemens corripuit post cœnam. nocte turbatus fuit. diem primam quiete, noctem laboriose transexit. Secunda omnia exacerbata sunt, ad noctem delirauit. Tertia dolore, multum delirauit. Quarta molestissime, ad noctem nihil dormiuit. Insomnia & ratiocinationes. deinde peiora, & magna, & periculosa, timor, molestia. Quinta mane resipiscebat ac intelligebat omnia. Verum ad meridiem multum insanit. continere se non potuit. Extremitates frigidae subliuidæ. Vrinæ inconcoctæ. Circa solis occasum mortuus est. Huic febres perpetuo cum sudore. præcordia subliuia. distentio cum dolore. Vrinæ nigræ habentes quædam *Erasimus. Bootæ. Moritur.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

dam in medio suspensa innatantia rotunda, non subsidebant. Ab aluo stercora prodibant. Sitis perpetuo non valde. Convulsiones multæ cum sudore, circa mortem.

ÆGROTUS IX.

*Critonis
casum ui-
deto.*

CRitoni in Thaso erecte obambulanti, pedis dolor fortis à magno digito cœpit. Decubuit eadem die: horridus, anxius, parum subcalescens. nocte desipuit. Secunda die tumor laxus per totum pedem, & circa malleolum subrubens cum distentione. Pustulæ nigræ. febris acuta. infan-
niit. Ab aluo vero mera. biliosa, satis multa prodibant. Mor-
tuus est altera ab initio die.

*Secundo
die hic mo-
ritur.
Clazome-
nius.*

ÆGROTUS X.

CLazomenium qui ad Phrynichidæ puteum decumbebat, febris vehemens corripuit. Dolebat autem caput, collum, lumbos ab initio. Statim autem surditas. Somni non aderant. Febris acuta inuasit. Præcordium eleuabatur cum tumore. distentio non valde. lingua sicca. Quarta ad noctem desipuit. Quinta laboriose omnia exacerbata sunt. Circa vndecimam parum remiserunt. Ab aluo vero ab initio & vsque ad decimamquartam, tenuia multa aquei coloris prodibant. Toleranter ea quæ ad secessum pertinent ferebat. Postea aluus restitit. Urinæ perpetuo tenues quidem, verum boni coloris, & multa in medio suspensa habebant diuulsa, non subsidebant. Circa decimam sextam minxit paulo crassiora, habebant subsidentiam paruum, paululum alleuarunt, resipiscebat magis. Decima septima rursus tenuia. Circa vtrasque aures tubercula extiterunt cum dolore. Somni non aderant. delirabat. Circa crura dolebat. Vigesima à febre liber iudicatus est. non sudauit. omnia intelligebat. Circa vigesimam septimam coxæ dextræ dolor fortis, cito quieuit. Tubercula vero iuxta aures neque sedata sunt, neque suppurata, verum dolebant. Circa trigessimam primam profluuium alui ex multis aquosis, cum eiusmodi quæ in dysenteria prodire solent. Urinas crassas min-
gebat. Tubercula circa aures sedata sunt. Circa quadagesimum oculum dextrum dolebat, obscurius videbat. Restitutus est.

ÆGROTUS XI.

*Dromes-
des.*

DRomeadæ uxorem quæ filiam pepererat, & aliis omnibus

Anibus secundum rationem factis, secunda die rigor corripuit. febris acuta. Cœpit autem prima die dolere circa præcordia fastidiosa ac nauseabunda, horrida, anxia. & sequentibus non dormiuit. Spiritus rarus, magnus, statim reuulsus. Altera à rigore die, stercora ab aluo bene prodibant. Vrinæ crassæ, albæ, turbatæ: qualis sit ex his quæ subsiderunt, vbi multo tempore sita, fuerit conturbata: non subsidebant. nocte non dormiuit. Tertia circa meridiem super-riguit. Febris acuta. Vrinæ similes. præcordij dolor, fastidiosa ac nauseabunda. nox molesta, non dormiuit. Sudauit per totum subfrigida. Statim autem rursus recalefacta est. Quarta die circa præcordia parum alleuata est. Capitis grauitas cum dolore, in soporem incidit, parum de naribus stillauit. lingua sicca, siticulosa. Vrinæ tenues, oleosæ. parum dormiuit. Quinta siticulosa, fastidiosa. Vrinæ similes. nihil ab aluo. Circa meridiem multum delirauit, & statim rursus parum resipiscebat. exurgens in soporem incidit. frigiditas parua. nocte dormiuit. delirauit, Sexta mane super-riguit. Statim autem recalefacta est. Sudauit per totum. Extremitates frigidæ. delirauit. Spiritus magnus, rarus. Paulo post conuulsiones à capite cœperunt. Statim mortua est.

*Moritur
hæc.*

AEGROTVS XII.

Homo quidam calefactus cœnauit, & bibit amplius. Vomuit omnia noctu. febris acuta. Præcordij dextri dolor. Inflammatio submollis ex interna parte. noctem moleste tulit. Vrinæ ab initio rubræ, crassæ, depositæ non subsidebant. Lingua sicca. non valde siticulosus. Quarta febris acuta. Dolores omnium. Quinta minxit leue, oleosum, multum, febris acuta. Sexta vespere multum delirauit. Nec nocte dormiuit. Septima omnia exacerbata sunt. Vrinæ similes. sermones multi. continere se non potuit. Ab aluo cum irritatione prodierunt liquida turbata, cum lumbricis. Nox laboriosa. Mane riguit. febris acuta. Sudauit calidum. A febre liber esse visus est. non multum dormiuit. A somno frigiditas, sputatio. Vespere multum delirauit. Paulo post vomuit nigra, pauca, biliosa. Nona frigiditas. multum delirabat. non dormiuit. Decima crura dolebat. Omnia exacerbata sunt. delirauit. Vndecima mortuus est.

Hic periit.

HIPPOCRATIS LIBER I.

AEGROTVS XIII.

Mulierem quæ decumbebat in littore, trimestri foeta grauidam febris vehemens corripuit, statimque lumbos dolere coepit. Tertia dolor colli, capitis, iuxta claviculam, & manum dexteram. Statim lingua voce destituta est. dextra manus resoluta est cum conuulsione, velut his qui aliqua siderantur parte contingere solet. Delirabat penitus. noctem moleste tulit, non dormiuit. aluus turbata est, ex biliosis, meris, paucis. Quarta die lingua voce soluta est. Conuulsiones eorundem. dolores omnium permanebant. Iuxta praecordia tumor cum dolore. non dormiebat. penitus delirabat. aluus turbata. Vrinae tenues, non boni coloris. Quinta febris acuta, praecordij dolor. planè delirabat. secessus biliosi. ad noctem sudauit, à febre libera. Sexta resipiscebat. Ab omnibus alleuata est. Verum circa sinistram claviculam dolor permanebat. siticulosa. Vrinae tenues. non dormiuit. Septima tremor. in soporem incidit. parum delirauit. dolores iuxta claviculam, & sinistrum brachium permanserunt. Reliqua allenata sunt. Omnia intelligebat. Tres dies à febre libera mansit. Vndecima reuersa est, superriguit, febris vehemens corripuit. Circa decimam quartam vomuit biliosa, flaua, fatis multa. sudauit. A febre libera iudicata est.

Nō moritur hæc.

AEGROTVS XIII.

Melidia, quæ decumbebat iuxta Iunonis templum, capitis & colli, & pectoris dolor fortis coepit. Statim autem febris acuta corripuit. Menses pauci apparebant. Dolores omnium horum continui. Sexta die soporosa, anxiosa, horrida. rubor in maxilla. parum delirauit. Septima sudauit. febris dimisit. Dolores permanebant. Rediit. somni pauci. Vrinae perpetuo boni coloris, verum tenues. Secessus tenues, biliosi, mordaces, valde pauci, nigri, graecolentes prodiebant. In vrinis subsidia alba leuiss. Sudauit. Iudicata est perfecte vndecima die.

*Melidia.
Iunonis
templum.*

HIPPO-

A HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS POPVLARI-

bus, Liber. II. Iano Cor-

nario medico physi-
co interprete.

SECTIO PRIMA.



Arbunculi in Cranone æstiu, plue-
bat in ardoribus aqua larga. Con-
tingebat hoc per totum, & maxi-
me ab austro. & subnascebantur
quidem in cute sanies. dum autem
intro concipiebātur, calefcebant,
& pruritum inducebant. Deinde
pustulæ velut ab igne inustæ exci-
tabantur. & sub cutem vri sibi vi-
debantur, in ardoribus siccitatis.

*Carbunculi
Cranon.*

Febres plerunque citra sudorem. In his vero si minutę imbris
guttæ deciderint, magis iudatorię fiunt ab initio. At hæc dif-
ficiliora iudicatu manent, quàm aliter: Attamen minus, si
non propter hæc fuerint, sed propter morbi modum. Fe-
bres ardentes in æstiuis magis fiunt, & in aliis téporibus. Re-
siccantur autem magis æstate. Autumno maxime ferinum, &
oris ventriculi dolor, quanquam & ipse minus maleficus fue-
rit, ipso morbo tali existēte. Ascarides vesperi similiter huic.
& illæ tunc infestant in die plerunque, non solum ideo quod
magis affligunt, sed etiam ipsæ per seipsas. In autumno acutis-
simi morbi & maxime lethales. & omnino similitudinem ha-
bent, eo quod vesperi exacerbantur: tanquam annus ipse ha-
beat circuitum morborum. Quale est dies morbi, quale est ve-
spertinum tempus ad exacerbatiōē: Tale est morbi, & vniū-
cuiusq; constitutionis inter se, vbi non quid in superiori spe-
cie fuerit innouatum. Sin minus, alia sanē constitutionē hæc
imperium obtinuerint. Quare etiam annus ad seipsum hoc
modo se habet. In quietis ac constantibus temporibus, & an-

*Ascarides
quādo ma-
gis uexāt.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

Perinthus

nis tempestiue tempestiua præbentibus, boni status & iudicatu facillimi morbi fiunt. In inconstantibus vero, inconstantes & qui difficulter iudicantur: quum sanè in Perintho defecerit aut abundauerit quid, ut aut venti sint, aut non venti: aut aquæ, aut siccitates: aut ardores, aut frigora. Ver autè omnino saluberrimum, ac minime lethale. Circa principia morborum considerandum, an statim florent. Clarum autem hoc fit ex incremento, Incrementa vero ex circuitibus. & iudicationes quoque hinc manifeste fiunt, itemque ex acerbationibus in circuitibus, si citius accedat, aut non: & si diutius durent, aut non: & si magis affligant, aut non. Ex omnibus autem continuis aut intermittentibus, & diuturnis, & vulneribus, & spuris, & doloribus. Itemque tuberculorum inflammationes, & quæcunque alia posterius apparent, fortassis autem & ex aliis cõmunibus rebus, quæ quidem citius fiunt, breuiora sunt: Quæ vero tardius, longiora: quum etiam in circuitibus citiorem recursum, ac reliquum augmentum, morbus neget. Nam & eorum qui statim pereunt, velociores sunt iudicationes, quoniam & dolores, & continui ac fortes. Quæ vero ad melius iudicant, non statim apparent. Iudicatoria non iudiciãtia, partim lethalia sunt, partim difficilis iudicationis.

Quæ recedant.

Quæ præiudicata sunt, si crude iudicata fuerint, reciditque fiunt: Sin minus, iudicationis impeditioes aut male iudicationes. Possunt etiam fieri perniciofa, ea quæ nõ parua sunt. Quæcunque iudicatoria signa fiunt, eadem hæc si non fiunt, difficilis sunt iudicationis. Quæ vero contraria significant, malũ: non solum si recurrant, sed etiam primariæ naturæ contraria repentia. Quemadmodũ etiam malorum signum, ea quæ ad contrarias repunt. Considerare vero sic oportet, in cibis, compressionibus venarum, tumoribus præcordiorũ, sursum vergentibus, deorsum vergentibus. Sed & multa sunt eiusmodi, velut abortientium mammæ graciles fiunt, neque enim contrarium est: Neque tussis diuturnæ, quoniam ubi testis intumuit, cessant: & testis tumor à tussi cessat & alleuatur: quæ res commune facit nos cõmunionis pectorum, mammarum, genituræ, vocis. Abscessus aut per venas, aut per ossa, aut nervos, aut cutem, aut alias emotiones. Boni autè sunt qui infra morbum fiunt, velut varices, lumborum grauitates ex supernis.

Tussis scdatio: testis tumor, & cõrd. Abscessus boni.

Optimi vero potissimum sunt inferni, & longissime infra ventrem,

- A.** ventrem, & remotissimi à morbo: & qui per effluxionē sunt, velut sanguis è naribus, pus ex aure, sputum, vrina, quæ per effluxionem sunt. At abscessus quibus hæc non sunt, sunt velut dentes, oculi, nasus, sudor. Sed & quæ sub cutem abscedūt foras tubercula, velut putrescentia, & quæ suppurantur, aut vlcus, aut eiusmodi pustulæ, aut squamæ, aut defluuium capillorum, vitiliginēs, lepræ, aut eiusmodi quæ abscessus sunt acervatim fluentes, & non semirepentes, & quæcunque alia dicta sunt. & si non pro rationis excretionis morbi dignitate fiant, velut Temeni nepti, ex morbo forti ad digitū decubuit, qui quum non sufficeret ad suscipiendum morbum, recurrit, Mortua est. Abscessus aut per venas, aut per aluū, aut per nervos,
- B.** aut per cutem, aut iuxta ossa, aut secundum spinalem medullam, aut secundum alias effluxiones, os, pudendum, aures, nares, ex vtero menses. Iudicationes posttridie fiunt, velut ad lumbos, aut ad femur, & ad testes: Quandoque ex tussi, & restis ipse à seipso. Tussiculosi abscessus, qui supra ventrem sunt, non similiter perfecte liberant. Sanguinis eruptiones large ex naribus plerumque liberant, velut Heragoras, quod medici non animaduerterunt. Qui voces asperas natura habent, his etiam linguæ subasperæ sunt, & quæcunque asperitates à morbis similiter. Quæ igitur duræ sunt linguæ à natura, etiam sine morbo hoc habent. Molles vero tardiores sunt, & ad peccatum, & ad bonum, quàm prior natura. Consideranda sunt etiā longa capita, ex viuendi ratione, & ceruices longæ, ab inclinationibus. & venarum amplitudo & crassitudo, ab eadem, & angustia, ac latitudines, & breuitates, ac tenuitates, ex contrariis. Quorum venæ amplæ, & ventres, & ossa ampla, hi sunt qui tenues sunt. Pingues vero his contraria habent, & in his qui fame macerantur, mediocritates. Ab his consideranda ea sunt quæ præpropere incrementa unicuique detrahunt, & quæ diminutiones adaugent, & ea quæ incrementa coadaugent, & quæ corroborant. Et quæ sint communes venarum dissectiones. Peccinum ruptiones quæ quidem circa pubem fiunt, vtp plurimum statim sunt innoxie. Quæ vero paululum supra umbilicū in dextera parte, hæc dolorosæ sunt, & anxiosæ & stercoreis vomitum inducunt, velut etiam Pittaco accidit. Fiunt autem hæc, aut à plaga, aut vulsura, aut alterius insultu: Quibus id quod medium est inter abdomen & cutem

*Temeni
neptis.*

Heragoras.

*Linguæ
uocisq; di-
uersitas.*

*Caput ab-
longum &
ceruix.*

*Macri.
Pingues.*

*Quæ in his
obseruen-
tur.*

Pittacus.

HIPPOCRATIS LIBER

Que iecur affectu & lien crect cutem inflatur, & non sedatur. Color est velut qui multum pallidus est, & qui ex candicante pallet: quoniam omne huiusmodi ab hepate est, & ex hoc sunt hepatici in his morbi, & morbi regij ab hepate, ad subalbidum colorem vergunt, & qui ex aqua inter cutem, & ex pituita alba laborant. Qui vero à splene sunt, tum hydropes, tum morbi regij, nigriores sunt. Sed & vlcera quæ ægre persanantur ex albidorum sunt, qui ferè lentis colorem referunt: & cutis diffringitur ac labia, velut Antilochus habuit & Aleuas, ab humoribus ex corpore saluginoso, quod sub cute maxime, & à capite contingit, quum à pulmone fuerit calefactum. Occasiones unde quis ægrotare cœpit, considerare oportet, siue capitis sit dolor, siue auris, siue lateris. Signum autem sunt in quibusdam dentes, & in quibusdam inguinum tumores. Vlcerasientia ac indicantia febres, & tubercula: Quibus hæc non fiunt, indicatio sublata est. Quibus intus relinquuntur, certissimæ recidiunt ac celerrimæ. Crudos ac liquidos feces, milium solidum in oleo coctum sistit. Exemplo est nauta puer, & Myriochaune.

SECTIO SECVNDA.

Cordis dolens mela. **M**ulier cor, hoc est os ventriculi dolebat, & nihil remittebat dolor. Huic polentæ pollen in mali punici succum inspersus, & semel in die acceptus in cibo satis fuit, & non reuomebat, velut Charioni contigit. Mutationes profunt, si non ad praua mutantur, velut his qui à medicamentis vomunt febrium gratia. Fines in meraciore desinentes, putrefactionem significant, velut Dexippo. Serapis ex liquida aluo intumuit. Pruritus autem haud scio quot diebus, non ultra. Habebat autem & abscessum quandam in lateris mollitudine, qui nigrefactus occidit. Et Stymargi vxor ex ventris per paucos dies turbatione, vbi multum in sistendo laborasset, & post pueri sexus foeminei quadrimestris ex corruptione discessum sana facta esset intumuit.

Mofhus. Moscho è calculo laboranti fortiter, in superna palpebra ordeolum obortum est magis ad aurem. Deinde intro exulceratum est. Quinta & sexta die ex internis pus erupit. Infernas affectiones soluit. Glandularum tumor ac inflammatio circa aurem erat, itemque infernè in collo, è directo superni

- A** superni tumoris. Aristæi vxoris frater fatigatus in via incalcescebat. Deinde in tibia tumores fiebant terebinthi fructui similes. Postea febris continua fiebat, & postridie sudor factus est, & aliis paribus diebus semper idem fiebat. Adhuc autem febris tenebat. Erat autē sublienosus. Ex sinistra nare sanguis erumpebat frequenter & paulatim. Iudicatus est. Postridie iuxta sinistram aurem tumor. Sequenti die etiam circa dextram, sed hic minor, & insuper tepefcebat. Hi euenerūt, & nō suppurati sunt. Qui ab Alcibiade venit, ei ex febribus modicis ante iudicationem testis sinister intumuit. Habebat autem splenem magnum, & sanè tunc iudicata est febris vigesima die. Deinde aliàs atque aliàs subincalcescebat, & subfloridum spuebat. Cuidam manus dextra, & crus sinistrum quum ex tussi parum & nihil memorabile eiecisset, fiderationis modo resoluta sunt; alia vero nulla re alterata est, neque facie, neque mente: Nec vero adeò fortiter illis partibus. Cœpit ad melius procedere circa vigesimā diem. Factum autem hoc est illi ferè circa mensium eruptionem, & fortassis tunc primum apparebant. Erat enim virgo. Apocemantus & pater fabri illius qui caput fregit, & Nicoftratus non extussiebant quicquam. Erant autem alibi circa rhenes dolores. Interrogationes factæ sunt. dicebant ipsos semper repleti potu aut cibo. Dolores fortissimos quo modo dinouerit quis conspicatus, fuga, tolerantia, experientia, & timiditates indicant. Aqua quæ cito calefcit, & cito frigescit, semper leuior est. Cibi & potus experientia opus habent, an ad æqualitatem mancant. Dicendum quòd vbi sanguis effluxit, excalescunt, & quæcunque alia huiusmodi. Abortus masculus sexaginta dierum, in partium suppressionibus salubris. Hercules intumescebat mali ipsius die octaua. Magis ex dysenteria laborat, quisquisianè etiam è tensesmo vexatur. Quædam lactans pustulas per corpus vbique habebat. Postquam autem lactare cessauit, sedate sunt per ætatem. Coriarij illius qui coriacea preparabat, vxori, quum peperisset & perfecte exoluta esset, visum est de secunda membranosum quiddam remanere; discessit autem quarta die male. Nam vrinx stillicidio vexabatur. Statim concipiens peperit masculum. Habebat autem iam multos annos, & postremū neq; mēses prodiebant.

Aristæus.

Apocemāt.

Nicoftrat.

Aque cognitio.

Hercules.

Que lac præbebat.

Coriarij uxor.

HIPPOCRATIS LIBER II.

bant. Quando autem peperisset, vrinæ stillicidium paululum D
intermittebat. Quædam priusquam conciperet, coxam do-
lebat. Postquam autem concepit, non amplius dolebat. Vbi
vero peperit, vigesima die rursus doluit. Peperit igitur ma-
sculum. Prægnati in tibia inferne dextera, tertio aut quar-
to mense pustulæ, ad quas manna thuris vtimur, itemque in
manu dextera iuxta magnum digitum; haud scio an peperit,
Archelaus reliqui enim ipsam semestrem, habitabat autem velut ego pu-
Antigenis to, in ædibus Archelai ad rupem. Antigenis vxor habita-
uxor. bat iuxta Nicomachum, peperit puerum carnosum quidem,
Nicomachus. verum qui haberet maximas partes discretas, magnitudine
vero esset quatuor digitorum, & sine ossibus, deinde crassus
ac rotundus. Hæc autem anhelos. erat ante partum. Deinde
simul cum partu pus reuomuit modicum, velut ex furuncu-
lo vocato tuberculo. Quæ filias peperit gemellas, & diffi-
Partus ge- culter peperit, & non valde purgata est, tota intumuit. Dein-
mellarum. de venter ipsi magnus fiebat. Reliqua vero reprimebantur,
& rubicunda prodibant vsque ad sextum mensem. Deinde
alba valde per omne iam tempus. Atque hæc fluxiones vene-
Intestino- ri officiebant, & mera rubicunda ipsi profuebant. In diu-
rum leuitas. turnis intestinorum leuitatib⁹ ructus acidus fiens, antea nū-
quam factus, signum bonum, velut Demænetæ contigit. For-
Demene- tassis autem licet etiam arte parare. Nā turbationes eius-
tas. modi alterant. Fortassis autem & ructus acidi intestinorum
Lycia. leuitatem soluant. Sanata est veratri potione Lycia. postre-
mum splen magnus, & dolores, & febris, & ad humerum do-
lores. Et vena quæ in splene est, in cubito secabatur. & salie-
bat quidem sæpe, Aliquando vero etiā non est secā, sed vnā
cum sudore sanguis penetrauit, aut sua sponte. Ex quo autē
prodibat, Splen dextera parte intēdebat, spiritus intus du-
plicabatur, non tamen magnus. mente mouebatur, contege-
batur, flatus inerat, non prodibat inferne quicquam, neque
mingebat. Mortua est ante partum. Quæ circa fauces ad
alterutram partē repentia processerunt, exulcerata nō sunt,
ad sinistra transuerunt, ad splenem dolor venit citra iudica-
Hieron. tionem. Hieroni iudicatio facta est decima quinta die.
Coi sorori hepar eleuatum est splenico modo. Mortua est
Bion. secunda die. Bion simul multum mingebat quod non sub-
sidebat, & sanguis ex sinistra nare manabat. Erat enī & splen
sursum

A sursum in gibbum eleuatus, ac durus, superstes mansit, recidiua. Erant auté anginosorum affectiones hæ: Colli verticula intro vergebant, quibusdam amplius, quibusdam prope. Et collum forinfecus conspicuam cauitatem intro habebat, & hac parte ad cōtactum dōlebat. Erat autem & cuidam infra os dentis appellatum, quod non similiter acutum est: quibusdam vero etiam valde rotundum, maiore circumferētia.

Qualis angina.

Si non cum dente appellato, fauces non inflammata, verū iacentes. Partes sub maxilla tumida, nō inflammatis similes. Neque glandulæ vlli intumuerunt. Sed magis secundum naturam. linguam non facile vertebant, ipsisque & maior esse videbatur, & prominentior. & sub lingua venæ cōspiciunt. **B** deglutire non poterant, aut valde difficulter. Immo ad nares fugiebat, si valde cogerent: & per nares loquebantur. Spiritus autem his non valde sublimis. Quibusdam vero venæ in temporibus, & in capitibus ac ceruice eleuata. At recrudescētibz, ex his, parum quiddam tempora calida, etiāsi alias non febricitarent. Non suffocabantur plurimi, nisi quum deglutire cupiebant, aut saliuam, aut aliud quiddam. Neque oculi intus desidebant. Quibus igitur tumor erat rectus, nec in alteram partem vergebat, hi neque leuiter sideratorum modo resoluebantur. An vero aliquem periisse viderim, in memoriam reuocabo. Quos autem nunc noui, superstitēs manserunt. Erant autem partim celerrime alleuantia. Plurima vero ad quadraginta dies deueniebant. & in hoc plerique etiā **C** sine febre. Multi vero etiam ad valde longum tempus, partē aliquam tumoris habebant. Et deglutitio, & vox indicabat. & columellæ liquecentes significationem quandam prauā exhibebant, quamuis nullam grauius malum habere videbantur. Qui vero tumores ad alteram partem vergētes habebant, hi vnde verticula inclinata fuerunt, isthic resoluebantur. Atque inde ad alteram partem distrahebantur. Erant autem hæc in facie maxime conspicua, & in ore & intersepto iuxta gurgulionem. Sed & maxime inferne pro ratione immutabantur. Cæterum resolutiones leuiter sideratorū modo, non per totum corpus fiebant veluti ex aliis, sed vsque ad manum, ab anginosa affectione. Atque hi & matura expuebant, eaque pauca ac difficulter. Quibus autem in rectum tumor tendebat, itidem expuebant. Quibus vero etiam cum febre,

HIPPOCRATIS LIBER II.

febre, hi multo magis & difficulter spirabāt, & aliena loque-
bantur, & venæ his magis eleuatę. Et pedes omnibus qui-
dem frigidissimi erant, maxime autem his. Et hi ad erecte
standum impotentiores erant. Et quidam non statim morie-
bantur. Quos autem ego noui, omnes mortui sunt.

SECTIO TERTIA.

Constitutio temporis.

Perinth^o.

Ætate.

*Quę fe-
bres uige-
rent.*

*Aspretudi-
nes culicū
morsib. su-
miles.*

IN Perinthum circa solstitium ferē æstiuum venimus. fa-
cta autem est hyems clementi cœlo, austrina. Ver & æstas
valde sine aquis vsque ad pleiadum occasum. Nam si etiā
quid aquę cecidisset, id erat velut minutę roris guttę. Et
Etefix non valde spirarunt. Et qui spirarunt, diuulse id fece-
runt. Aestate febres ardentes populariter grassatę sunt
multę. Erant autem sine vomitu. & alui turbatę ex tenuib^{us},
aquosis, non biliosis, spumosis, multis, quę aliquando depo-
sita etiā subsidentiam habebant, ex quibus sane etiā id
quod sub dio noctu exponebatur, simile erat. Aequales spe-
cie alui secessus semper, malum. In his multi soporosi erant,
& mente moti. hi vero ex somnis tales fiebant. Quum autem
suscitati essent, omnia intelligebant. Spiritus sublimes, nō ta-
men valde. Vrinę tenues quidem plurimis & pauca, alias au-
tem non decolores. Sanguinis eruptiones ē naribus non fie-
bant, nisi paucis: neque parotides iuxta aures, de quibus po-
stea scribam: neque splenes attollebantur, neque dextrū præ-
cordium, neque dolorosum valde, neque fortiter intentum
erat. Erat tamen quid quod iudicationem faciebat. Et maxi-
me iudicabantur omnia plerunque circa decimam quartam
diem, pauca cum sudore, pauca cum rigore. & valde paucis
recidiuę fiebant. At vero sub minutas velut roris guttas
quę in æstate fiebant, apparebat sudor. In febricitantibus
etiā quidam sudores statim ab initio fiebant, non tamē ma-
ligno inodo. & quibusdam sub hoc tempus etiā iudicatio fa-
cta est cum sudore. Fiebant autem in febrisbus æstiuis, cir-
ca septimam, octauam & nonam diem, aspretudines in cute
miliacę, culicum morsibus maxime similes, non valde pru-
riginosę. Hę perseuerabant vsque ad iudicationem. Nulli e-
quidem masculo tales erupisse vidi. Mulier autem nulla mor-
tua est, cui hę fiebant. Et graui auditu præditę & soporose
erant.

A erant. Prius autem non valde soporosa erant hæ, quibus illæ affuturæ essent. Non tamen in totum durabant. Verum soporosa & somnolenta erant per æstatem, & vsque ad pleiadum occasum. Postea vero magis vigiliæ aderant. Sed neque in totum ab hac constitutione moriebantur. Alium igitur per cibos sistere non dabatur, immo præter rationem putasset quis mederi conducere, etiam si minus multa quibusdā prodiret, per hoc quod in frigore quis iaceret strato supposito. Nam vicerat quidem frigidum, calefacit autem eiusmodi species sensim progrediendo adhuc magis, etiam si nulla afflictio naturæ accedat. & in quibus, & qualia signa, & plura aut pauciora

*Quib. per
rituris fice
rent.*

B ne, eructatio, flatu: omnia talia corrumpunt. Quibus in febribus anxiosis, horridis, rubescunt facies, lassitudines, oculorum dolores, capitis grauitates, resolutiones leuiter sideratorum modo, & menses si apparuerint, maxime quibus primum, sed & virginibus & mulieribus, quibus per tempus: Sed & quibus non in quo solet tempore, aut venit oportet apparent. Deinde pallidæ fiunt. Magnum autem in omnibus, id quod & consequenter fit, & in quo tempore, & in quibus. Valde biliosis, in febribus maxime, omnino quibusdā ad crura purgatio. Medicamentorum modos scimus, ex quibus qualia, & quæ fiunt. Non enim omnes similiter, sed alij aliter componuntur. Et alibi citius, aut serius, in manuum tractationes assumuntur, velut est aut ficare, aut tundere, aut coquere, &

*Quæ ob
seruanda.*

C eiusmodi. Omitto plurima, quæ vnicuique, & in quibus morbis, & quo tempore morbi, ætatem, speciem, victum, qualis hora anni, & quæ, & qualiter procedat, & huiusmodi. Zoilo iuxta murum ex tussi matura, febris acuta, & faciei rubor, & alius intercepta, præterquam ad necessitatem coactè, lateris sinistri dolor, & auris è directo valde dolorosa, & caput non vsque adeo. Spuens semper suppuratum ægrotabat. Sed alia iudicata sunt, & iuxta aurem pus multum erupit, circa octauam aut nonam diem. Principia vero noni diei ex dolore auris. Haud scio quomodo sine rigore iudicatio facta est. Sudauit caput valde. Et hic sudor firmus erat, quod quidem ardor etiam sinistri lateris esset. Superne vnà cum aure dolor sedatus, maxime circa scapulas. Sed & ante sputa multa, ab initio florida reiecta, & circa septimam aut octauam diem.

Zoilus.

Deinde.

HIPPOCRATIS LIBER II.

Deinde laboriosa. Alius restitit vsque ad nonam & decimā diem. Dolor extinctus est. Tumor remittebat, & sudores fiebant parui, non autem iudicabant. Manifesta autem erāt hæc tum ex aliis, tum ex secessu. Nam incipiente auri dolore, etiam venter turbatus est. Erupit autem ex aure nona die, & iudicatus est morbus decima quarta sine rigore eadem die.

Febres male in glandularū tumoribus. Sed & sputum largius ibat, & maturius, postquā auri erupit. Sudores autem, & serpentina vlcuscula ad multum tempus, in capite fiebant. Resiccata sunt tertia die. Quæcunque sine signo indicationis iudicatorio disparent, male iudicata sunt, velut Erysipelas ancillæ Polemarchi. In glandularum tumoribus febres, malum, exceptis diariis. Et in febribus glandularum tumores, deteriores, qui in acutis ab initio vigorem remiserunt. Spiritus, præcordiis eleuatio mollis, & intentio neutra, in ipsis superne rotundum, in dextris velut circumferentia suppuratoria, aliud longius magis, aliud diffusum, aliud deorsum repens, & hinc atque hinc distentio vsque ad vmbilicum. In omni sursum versus è directo latitudo, si reuocetur, & in rotunditatem concludatur, quatenus quidem spiritus fuerit, citra iudicationem calore attenuatur. Si vero hunc effugerit, ad suppurationē procedit. Spiritus densi, parui: magni, rari, parui, rari: extra magnus, intra paruus, alius quidem extendens, alius vero vrgens, dupla intro reuocatio, velut superinspirantibus, calidus, frigidus.

Medela assiduorum oscitationum spiratio longa. Non potantibus, & vix, spiratio breuis. E directo etiam laterū intentio dolorosa, & præcordiorum intensiones, & splenis eleuationes, è naribus eruptiones. Quæ relinquuntur post iudicationem, recidivas facere solent. Primum itaque lienis eleuationes, si non ad articulos finierint, sanguinis è naribus eruptio fit, aut præcordij dextri intentio, si non penetrauerint vrinæ. Hæc enim est interceptio vtriusque, & recidivæ horum merito fiunt. Abscessus igitur horum facere oportet si non fiant. eos vero qui iam fiunt declinare. Eos autem excipere, si prodierint iam, & qualia oportet, & qua parte oportet. Qui vero non valde, eos coadiunare. Eos vero auertere, si omnino incommodi fuerint, maxime si hi affuturi sunt: sin minus, si iam veniunt. Quarta die fientes sanguinis è naribus eruptiones ægre iudicāt. Febres quæ vna die intermit-

A intermittentes, altera superrigent, vnà cum iudicatione, ad septimum circuitum durant. *Scopus* Scopo ex mucosis, biliosis, & faucium inflammatione, malo victu vso aluus suppressa est, & febris acuta facta, & lingua florida, & vigil sine somno. Pectinis intectio fortiter, æqualiter, paulatim ad infernam partem in dextris. Spiritus subdensus, præcordia dolebat, & respiras, & quum verteretur. Sine tussi vero excreabat subcrassa. Peplus ipsi data, à præcordio quidem depulit, transiuit autem nihil. Postridie glandes duæ appositæ non apparuerunt. Vrina crassa & turbata. Subsidentia leuis & plana. & restitit aluus in turbulentia, venterque mollior erat. Et splen eleuatus, & deorsum vergens factus est. Potu utebatur aceto mulso dulci, aut fauorum cremore cocto. Decima sanguis ex sinistra nare aquosus paucus venit: non autem valde infirmus erat ob hoc ipsum: & vrina subsidentiam habens. In subsidentia vero subalbum quiddam adhærens vasi, tenue, neque genituræ simile, neque dissimile. Defluxit hoc breui. Postridie iudicatus est, à febre liber, & subiit subuiscosum vndecima die. Hoc vero circa defluxum erat quid biliosum.

Vrinæ vero purgatio multa, tum copia, tum subsidentia. & priusquam vinum bibere inciperet, ferè pituitæ similis. Penetravit autem vndecima die, vt quæ non esset multa. Viscosa vero erant stercora & turbata. Huiusmodi autem iudicatorio modo fiebat. Nam & Antigenis in Perintho tale erat. *Antigenes.*

Quæ circa linguas eleuantur collectiones, & humiles calculi, & quæ podagricis fiunt, circa debiles illorum articulos sunt. Nam ossium natura causa est, vt hæc & indurentur, & distendantur. Collectio Hippostrati vxori ex quartana annua ad fastigium eleuata est, quum subfrigida palam esse videretur, impetus in totum corpus factus est, & sudor. iudicata est hoc modo. & postea menses plures copia & tempore. Tunc enim suppressi fuerant. Abscessus non consistere visus est. In pulsantibus sanguinem fundentibus figura ampla, & in totum si ex omnino decliui accliuæ fiat. Quapropter etiam deligationes in venarum sectionibus impetum faciunt. fortes vero sanguinem impediunt. Sanguineum & subbiliosum, ructum acidum facit. Fortassis autem ad atræ bilis morbum his desinet. Rigores incipiunt mulieribus quidè *Principiæ horreis.* magis à lumbis, per dorsum ad caput. Sed & viris posteriore

T corporis

HIPPOCRATIS LIBER II.

corporis parte magis quàm anteriore, velut cubitis, femoribus. Sed & cutis rara. Indicat autem pilus animantium.

Quibus nihil intra constitutum tempus accidit, singulis partus vitales fiunt. Apparentia in quibus mensibus fiunt.

Labores in circuitibus, Quicquid in septuaginta-mouetur, in triplicitatibus perficitur. Post menses, dextera & sinistra hiant. Humiditas per prodeuntia, requirit diætam siccissimam. Quod citius motum est ac discretum, rursus augetur etiam tardius, & ad longius tempus. Labores, circa quinquagesimum tertium diem, & circa eētesimum sextum.

Labores tertio, quinto, septimo, nono mense, & secundo, ac quarto. Quæ nosse oportet ad septimum mensem, aut à mensium fluxu numerandi sunt nouem menses, aut à conceptione. & ad septuaginta ac ducentos dies, græci menses fiunt. & si quid amplius vltra hos est, & aut masculis, aut etiã foemellis, hæc fiunt, aut contraria. A cibis & potibus humeri ac manimæ instantur. & impotentia, & inflationes in capite, incrementa faciunt, donec ossa fuerint solida facta.

Menstruârum purgationum circuitus est. Quæ ante has fiunt grauitates, similes sunt laboribus octimestribus. Primipararum lac, alimento quidem transmutationem accipiēte, octimestri vero perficiente. Si in vulneribus fortibus, tumor non appareat magnus, malum. Laxi bonum: sursum pascentes, perius Menstruâ purgationes similes octimestribus, in tendentibus ad decimum mensem fientes, malum. Quibus tumores in vlceribus, non valde conuellantur, neque insaniant. His autem derepente dissipatis, quibus quidem ad posteriores partes, conuulsiones cum doloribus, quibus autem ad anteriores, aut insaniant, aut dolores lateris acuti, & dysenteria rubra. Tumores præter rationem alleuantes, prauum: velut Andronici filio Erysipelas recurrit: si non ad eundem locum rediens, bonum quid significet. Hoc ex natiuitate circa aurem, ad pubem distributum est. Alteri tertia ex natiuitate die factum, suppuratum est nona. Hic septima die sanus euasit. Maligniora sunt quæ derepente disparent.

SECTIO QUARTA.

De venis.

*Hepatis
vena.*

Hepatitis in lumbis vsque ad magnum verticillum, inferne etiam verticulis se ingerit: hinc subleuata per hepar, &

A. hepar, & per septum transuersum ad cor. & quæ quidem recta est, ad clauiculas: hinc aliæ quidem ad collum, aliæ vero ad scapulas, aliæ deorsum deflecentes, ad verticula & costas declinant. Et ex sinistris quidem, vna prope clauiculas. Ex dextris vero ad quendam ipsarum locum. Alia vero vtrinque deflexa. Alia paulo inferius deflexa, vbi quidem illa deficit, costis se ingerit, donec ad venam in ipsum cor accesserit, ad sinistras deflexa. Infra autem decuruata ad vertebrae descendit donec perueniat, & inde incipit eleuari ingerens se costis reliquis omnibus, hinc atque hinc singulis ramulos præbens, quum sit vna: à corde quidem ad locum quendam à sinistris magis procedens. Deinde infra arteriam, donec consumpta fuerit, & venerit eo vnde hepatitis subleuata est.

B. Priusquam autem eo venit, circa extremas duas costas diuisa est, & partim ab hac, partim ab illa verticulorum parte progressa consumitur. Quæ vero recta à corde ad clauiculam tendit, supra arteriam est: & ab hac, velut etiam iuxta lumbos infra arteriam, ad hepar insilit, partim in portas & pinas, partim in reliquum deinceps procedit paulo infra septum transuersum. Septum autem transuersum adhæret hepati, neque facile est ipsum separare. Duplices porro venæ à clauiculis, alteræ hinc alteræ isthinc, sub pectus ad pectinem procedunt: quo vero hinc, nondum scio. At Septum transuersum infra iuxta verticulum quod est infra costas, qua rhene ex arteria, ea parte consurgunt: Verum arteriæ ex ipso rhene oriuntur, hinc atque hinc ab arteria neruum habentes. Atque hac parte alicubi in recurrente à corde Hepatitis desinit.

C. Cæterum ab hepatide per septum transuersum maximæ duæ, altera hinc, altera isthinc, sublimes feruntur, multitudineque per septum sunt, & circa ipsum consistunt in superna parte, atque hæc magis sunt conspicuæ. Duo vero nerui à cerebro sub os magni verticuli, ex supernis & ad gulam magis, ab vtraque arteriæ parte descendunt, & vterque in seipsum incidens, vni similis, vbi verticula & septum sunt, ibi desinunt. & quidam ambigui, ex hac societate ad hepar & splenem ipsos tendere putauerunt. Alius neruus ab vtraque verticulorum parte iuxta clauiculam ad spinam procedit, ex obliquo verticulorum, & ad costas distribuitur. & quemadmodum venæ, sic hi per septum, ad mesenterium mi-

*Due aliæ
venæ.*

Duo nerui.

Neruus alius.

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Nervorum
discursus.
Sacri os.*

hi tendere videntur. Vbi autem hæ deficiunt, rursus hinc vbi septum exoritur, ab eo coherentes ac continui existentes, iuxta medium infra arteriam, deinceps ad verticula distribuuntur, quemadmodum venę, donec ad sacrum os progressi consumuntur. In Aeno ex assiduo leguminum esu, forminx & masculi, crurum impotentes facti sunt, ac vitam degerunt. Sed & his qui eruo vescuntur, genua dolent. Diligentia adhibenda est vt excandescencia inducatur, & coloris reparandi, & sanguinis in vasa subter cuticulam colligendi gratia: itemque leticia, & timor, & huiusmodi. & si quidem reliquum corpus simul ægrotarit, simul curare: Sin minus, fatiis est. Styrmargi famula Idumæa erat, quæ vbi filiam peperisset, conuersum est ei vteri osculum, & dolor ad coxam & crus. Iuxta malleolum secta vena liberata est, & quidem quum etiam tremores totum corpus detinerent. Verum ad causam deuenire oportet, & ad causæ principium.

SECTIO QUINTA.

Naturæ indiciorum notio.

*Physiognomia.
Varix testium quid possit.*

Quicumque fului, naso acuto, oculis parvis, mali. Quicumque fului, simi, oculis magnis, boni. Hydropici raui oculos habent, & calui sunt. Vocis gracilitatem soluit varix, ad sinistrum & dextrum testem, absque horum altero fieri non potest vt soluatur. Magni, calui, balbi, gracili voce præditi, boni. Morbos autem habent, balbus, aut caluus, aut gracili voce præditus, aut hirsutus, fortiter atrabiliarios. Qui lingua offendunt, & labiorum non sunt potestates, eos necesse est dum illa soluantur, suppuratos fieri. Dorem in locis infernis fortem, surditas soluit, itemque sanguis multus ex naribus erumpens. Insania magni morbi ex more fientis solutio. Si puerperis conuulsio fiat, febrem excitato: & cerato multo tepido in vesicam immisso, ac per clysterem infuso colluito. Si capitis os confractum fuerit, lac, & vinum ammixta aquæ pari mensura, bibenda dato.

*Puerperæ
spasmos.
Capitis os
dolis fra-
ctum.*

Si vero vlcus fuerit, internas venas secato, si non febriciter. Si autem desipiat, caput irrigato, si non præcordia fuerint eleuata. Si caput doluerit, ad pectus descendit, deinde ad præcordia, postea ad coram, Omnia vero vt doleant fieri non potest. Vtositatem flatuosam venæ sectione, fluxionem pharmaco illito sistito. Fluxus enim ex vena magna est.

Si vero

A Si vero sua sponte multum fluat, ieiunet: aut aquæ partes duas, lactis quatuor bibat. Infœcundas fomentis ac medicamentis curato. Quicunque derepente voce destituuntur, *Vocis reparatio.* si sine febre fuerint, ipsis venam secato. Pituitæ fluxiones ex mammis trahunt oculi, & eructant per nares ad pulmonem. Quibus tussis sicca est, his non soluitur, nisi dolor fortis ad coxas, aut ad crura, aut ad testem irruat. Si hydro- *Tussis sicca.* picum tussis corripiat, siquidem statim animo linquatur, calidis omnibus vtatur: Sin minus, inebriato, ac cibis ipsum impleto. Venas autem internas secato, dum morbus magnus in intentione est. Solutio coxarum doloris, oculorum distortionis, cæcitas; testium tumoris, mammarum eleuatio. Si febre tenente, partes circa faciem graciles fuerint, in die impari, sequenti die soluetur. Hydronicus si tumorem in cruribus habens tussiat, malum. Si auris doleat, lacte vtatur.

Si non in die impari febris dimittat, recidiuare necesse est. Cui vena in cubito pulsarit, infanus & iracundus est: cui vero quieuerit, stupidus. Vulnus si sanguinem fundat, *Vulnus quando nō Lauandum.* ne madefacito, verum caput calida rigato. Si os ventriculi doleat, panem calidum cum vino meraco exhibeto. Vomitus solutio. aquam calidam bibendam dato, & vomat. *Vomitio*

Quæcunque corrupta torpescunt, euulsa vena vlcerato, qui *partetur.* ac sanato. In conuulsione digitorum manus citra febre, venam secato, si non caput doleat: Sin minus, aquam calidā affundito. Ad oculos. Spodij partem duodecimam, cro-

C ci quintam, nucleoli oliuæ vnam, cerusæ vnam, myrrhæ vnam. *Diuersa medela.* Aquam frigidam super caput fundito. & allia cum maza edē-

da dato. Varices caluorum si non magni fuerint, furiosi sunt. Ad vitiliginem & lepram. Calcem in aqua adhibeto, vt ne exulceres. Secundarum purgatio si non discedant. Sternutatorium ad nares apponito, vt sternutet. & sternutantis nares ac os apprehendito. *Varices.*

SECTIO SEXTA.

Naturæ indiciorum notio.

C Aput magnum, oculi parui, balbi, iracundi sunt. Qui *Diuersa per asper* longæ vitæ sunt, plures dentes habent. Balbi, celeri lingua præditi, atræ bilis humori obnoxij, biliosi que sunt, oculis non nictantes, iracundi. Magnum caput, oculi nigri & *sum cognitio.*

T iij magni,

HIPPOCRATIS LIBER II.

Pueri natura.

Morbi natura.

Mors quæta.

Medela anginae, lippitu dinisque & percussis infirmi.

Mas dextris hæret.

magni, nasum crassum & simum habentes, boni. Oculi rai D
 magni, caput magnū, ceruix tenuis, pectora angusta, congrue
 adaptati hominis sunt. Caput paruum habens, neque bal-
 bus esse poterit, neque caluus, nisi fuerit glaucus. In con-
 uulsionibus si vox in die impari soluitur, à magno morbo li-
 berat. Puerperæ febricitanti & dolenti aquam affundito,
 & ptisanam crassam ter in die calidam dato. Puer nutritur
 septimo mense, aut nono, aut decimo, & voce firmatur, & ro-
 bur sequitur, & manibus validus fit: dum vox soluitur, omnia
 soluantur. Solutio enim similis est voci. Soluitur autē in die
 impari. Si venæ pulsauerint in manibus, & facies sana ac ro-
 busta fuerit, & præcordia non fuerint mollia, diuturnus fit
 morbus, qui sine conuulsione nō soluitur, aut sanguinis mul- E
 ti ex naribus eruptione, aut dolore ad coxas. In gutturis
 dolore, aquam calidam super caput fundito, si non frigus fue-
 rit: Sin minus, farinam quā calidissimā dato, & vinum me-
 racum. In turbatione ventris, fabas coctas dato, si non su-
 pernæ partes abunde fuerint biliosæ. Aut cuminum cum fa-
 bis edendum dato. At interceptio morbi fieri non poterit,
 nisi in die impari. Neque principium fieri poterit, nisi in die
 pari, itemq; mense ac anno pari. Nitrum autem Aegyptium,
 & coriandrum, ac cuminum cum oleo terito, & ventri illini-
 to. Qui moriuntur eos necesse est die impari, & mēse im-
 pari, & anno impari mori. Bonū autē fuerit prædicere mor-
 tē, aut dolores fortes. Quorum oculi robusti non sunt, his
 mors breui imminet. Si vero in impari anno fiat, ab utrisque F
 impares fieri necesse est. Si autē in anno pari & die pari, ne-
 cessariū est in impari die mori. Ex numero tertia fortissi-
 ma est. Anginā & lippitudinē venæ sectio. Vulnerato in-
 testino, respiratio prodit inferne incōspicua iuxta vulnus, &
 euacuatur pectora. Dato igitur lac & vinū, pari aquæ mēsu-
 ra ammixta. Quorū pectora bilē generant, balbi, furiosi, &
 calui sunt. Quicūq; horū ex pueritute etiā strabones, hi im-
 prudētes sunt, aut calculosi aut insaniētes. Quibus autē non,
 alterius mali solutio fit. Circa naturā plurimā vim habet mā-
 ma dextera, oculus dexter, & quæ infra sunt hac parte. Nā &
 masculi dextris inharēt. Mulieribus mēses vt sistas, cucurbi-
 tam maximam ad mamam affigas. Trimestris puer om-
 nia præ se fert, & lac tunc habet. Si multū fluat lac, necesse
 est fortum

A est fortum debilem esse. Si solidiores fuerint mammae, sanior est fortus. Vena crassa est in vtraque mamma: quapropter maximam habent prudentiae partem. Vrinae stillicidium soluit venae sectio. Si superni loci turgent qui sunt circa caput, vlcera purgatio, vomitus, hydrops. *Stranguria qui soluitur.*

A ventris turbatione, aut à tussi, si cancer fiat, os amare scit. Dato autem elaterium bibendum bis aut ter, si non balbus fuerit. Deligare vero oportet florem aris vstum, donec fuluus euaserit, & spongiam, si non balbus fuerit. In anxietate, horrore, oscitatione, dato vinum pari aquae mensura ammixta. Ad auri dolorem cucurbitam affigito.

B Quicquid supernarum partium doluerit, dolor ad coxas, aut ad genua, & anhelatio fiens, omnia haec soluit. In voluulo molli, frigidum vinum multum meracum pro ratione dato, donec somnus, aut crurum dolor fiat. Soluit autem & febris, & dysenteria citra dolorem. Si praecordia distenta fuerint, manu comprimato ac lauato. Ad paronychiam vnguium abscissum, galla nigra cum melle. Aqua secedente, lactis heminas octo bibendas dato. Si vero vomat, & non bibat, alij aut ceparum intritum dato. Ut mulier in utero concipiat, polypos paruos super flamma calidissima asfatos, & ferè semibambos, edendos dato. Et nitrum Aegyptium tritum, coriandrumque ac cuminum, in pastillos efformato, in pudendumque subdito. Si ex crapula caput doleat, vini meraci heminam bibat. Si vero aliter caput doleat, panem quam calidissimum cum vino meraco edat. *Capitis dolor qui discutitur.*

C Si hominem calor corripiat, non à bile, neque à pituita, sed aut à lassitudine, aut aliàs febrat, aquam multam calefacito, deinde ea superinfusa caput rigato, donec pedes sudarint: & farinam crassissimam coquito. Postquam autem pedes sudarint, farinam plurimam & calidissimam edens, ac vinum meracum insuper bibens, vestimentis contactus facile quiescat. Aut narcissi duo aut tria capita in cena edat.

Qui infania corripietur, ei hoc signum praesagit, sanguis colligitur ipsi ad mammas.

Signa furoris.

HIPPOCRATIS LIBER III.
HIPPOCRATIS COI D
 DE MORBIS POPVLARIBVS
liber III. Iano Cornario
medico physico in-
terprete.

SECTIO PRIMA. AEGROTVS I

Pythion.



Pythion qui habitabat iuxta tellu-
 ris templum. Cœpit tremor à ma-
 nibus prima die, febris acuta, deli-
 rium. Secunda omnia exacerbata
 sunt. Tertia eadem. Quarta ab al-
 uo pauca, mera, biliosa prodierunt.
 Quinta omnia exacerbata sunt.
 tremores perseuerabāt, somni te-
 nues, aluus restitit. Sexta sputa va-
 ria, subrubra. Septima os distra-

ctum est. Octaua omnia exacerbata sunt. Tremores perseue-
 rabāt. Vrinæ ab initio quidem, & vsque ad octauam tenues,
 decolores, in medio pendens nubilosum quiddam habebāt.
 Decima sudauit. Sputa aliquantulum matura, iudicatus est.
 & vrinæ subtenues circa iudicationem. Post iudicationē ve-
 ro, quadraginta dieb⁹ postea suppuratio circa sedē, & absces-
 sus factus est cum vrinæ stillicidio. P. M. V. Q. S. hoc est,
 probabile multitudine vrinæ quadragesima sanatum.

AEGROTVS II.

*Hermoc-
 rates per-
 vit.*

Hermocraten qui ad nouum murum decumbebat, febris
 vehemens corripuit. Cœpit autem dolere caput, lum-
 bos. Præcordij distictio molliter. Lingua ab initio adusta est.
 Surditas statim. somni non aderant. Siticulosus non valde,
 Vrinæ crassæ rubræ, depositæ non subsidebant. Ab aluo ve-
 ro non pauca combusta prodibant. Quinta minx̄ vrinæ
 tenues, habebant quid in medio pendens, non subsidebant.
 Ad noctem mente motus est. Sexta morbo regio correptus
 est, omnia exacerbata sunt. non resipiscebat. Septima mole-
 sta fuit.

- A** sta fuit. Vrinæ tenues similes, similiter etiam sequentibus diebus. Circa vndecimam omnia visa sunt alleuata esse. Sopor cœpit. Vrinæ crassæ subrubræ, infra tenues, non subsident. Placide resipiscebat. Decima quarta à febre liber, non sudauit, dormiuit, intelligebat omnia. Vrinæ consimiles. Circa decimam septimam rediit, calefactus est, sequentibus diebus febris acuta. Vrinæ tenues. Rursus autem vigesima die iudicatus est, à febre liber, non sudauit. Cibum fastidiebat per totum tempus. resipiscebat, loqui non poterat, lingua arida. non sitiebat. dormiebat soporosus. Circa vigesimam quartam calefactus est. aluus lubrica multis tenuibus fluens. & sequentibus diebus febris acuta. lingua
- B** combusta est. Septima & vigesima mortuus est. Huic surditas perpetuo perseverabat. Vrinæ crassæ & rubræ non subsidentes. Aut tenues decolores, & in medio quid pendens habentes. gustare autem non poterat. P. S. S. V. S. M, hoc est, probabile secessibus suppressis vigesima septima mortuum.

AEGROTVS III.

Qui in Dealcis horto decumbebat, capitis grauitaté, & *Dealcis.*
tempus dextrum dolorosum habebat multo tempore.

- Cū occasione vero febris corripuit, decubuit. Secunda die ex sinistra nare modicus merus sanguis fluxit. Ab aluo stercora probe prodierunt. Vrinæ tenues, variæ, in medio pendens quiddam habentes minutim dispersum. velut fa-
- C** rinæ crassiores, & genituræ similes. Tertia febris acuta. Seceffus nigri, tenues, spumosi, subsidentia secessibus liuida. somno grauiore aliquantulum premebatur, moleste surgebat. Vrinis subsidentia liuida, subuiscosa. Quarta vomuit biliosa, flaua, pauca, paulo post æruginosa. De sinistra nare modicus merus sanguis fluxit. Seceffus similes. Vrinæ similes. sudauit circa caput & clauiculam, splen eleuatus est. femoris dolor è directo. Præcordij dextri distentio submolli. nocte non dormiuit. parum mente motus est. Quinta seceffus plures, nigri, spumosi, subsidentia secessibus nigra. nocte non dormiuit, mente motus est. Sexta die seceffus nigri, pingues, viscosi, graueolentes. dormiuit, intelligebat magis. Septima lingua sicca, siticulosus, non dormiuit, mente motus est. Vrinæ tenues, non boni coloris. Octaua seceffus,

HIPPOCRATIS LIBER III.

sus nigri, pauci, compacti. dormiuit. intelligebat. siticulo- **D**
 sus non valde. Nona riguit. febris acuta. sudauit. frigiditas.
 mente motus est. dextro oculo distortus est. lingua arida,
 siticulosus, infomnis. Decima circa eadem. Vndecima in-
 telligebat per totum omnia, à febre liber. sudauit. vrinæ te-
 nues circa iudicationem. Duobus diebus à febre liber fuit,
 decimaquarta reuit. Statim autem nocte non dormiuit, pe-
 nitus mente motus est. Decima quinta vrina turbata, qua-
 lis ex his quæ subsiderūt sit, quum fuerint agitata. febris acu-
 ta. penitus mente motus est, non dormiuit. genua & tibiae
 dolorosa habebat. ab aluo subdita glāde, stercora nigra pro-
 dierunt. Decimasexta vrinæ tenues, habebant quid in me-
 dio vehens nubilosum. mente motus est. Decima septima **E**
 mane extremitates frigida, contegebatur, febris acuta. su-
 dauit per totum. alleuatus est. intelligebat magis. non à fe-
 bre liber, siticulosus. Vomuit biliosa, flaua, pauca. Ab aluo
 stercora prodierunt paulo post nigra, pauca, tenuia. Vrinæ
 tenues, non boni coloris. Decima octaua non resipiscebat,
 soporosus. Decimanona per eadem. Vigesima dormiuit, om-
 nia intelligebat. sudauit. à febre liber. non sitiebat. Vigesi-
 ma prima parum mente motus est. paululum sitiebat. præ-
 cordij dolor, & circa vmbilicum palpitatio perpetuo. Vige-
 simaquarta vrinis subsidencia. intelligebat omnia. Vigesima
 septima coxæ dextræ dolor. Vrinæ tenues, & subsidenciam
 habebant. in reliquis commodissime habebat. Circa vige-
 simam nonam oculi dextri dolor. Vrinæ tenues. Quadragesi- **F**
 ma egressit pituitosa, alba, aliquanto plura. multum sudauit
 per totum. perfecte iudicatus est.

SECTIO II. AEGROTVS IIII.

*Philistes
cito perit.*

IN Thaso Philistes caput multo tempore dolebat. & quan-
 doque etiam aliquanto grauiore somno pressus decubuit.
 Quum autem ex potationibus febres continuæ obortæ ef-
 sent, dolor exacerbatus est. nocte excalescens est primum.
 Prima die vomuit biliosa, pauca, flaua primum. postea vero
 plus æruginosa. Ab aluo autem stercora prodibant. noctem
 habuit molestam. Secunda die surditas. febris acuta. præcor-
 dium dextrum distentum est, declinauit ad internas partes.
 Vrinæ tenues, pellucida, habebant quiddam in medio pen-
 dens genituræ simile. Parum infaniuit circa meridiem. Ter-
 tiam

A tiam diem moleſtam habuit. Quarta cōuulſiones. exacerbata ſunt omnia. Quinta mane mortuus eſt.

AEGROTVS V.

C Hæriõnem qui decumbebat apud Demænætum, ex po-
tu febris corripuit. Statim autem capitis grauitas do-
loroſa. non dormiuit, aluus turbata ex tenuib⁹ bilioſis. Ter-
tia die febris acuta. capitis tremor, maxime autē labij infer-
ni. paulo poſt rigor, cōuulſiones, penitus mente motus eſt.
Noctem moleſte tulit. Quarta per quietem, parū dormiuit.
parum delirauit. Quinta laborioſe omnia exacerbata ſunt.
delirium. noctem moleſte tulit. non dormiuit. Sexta per ea-
dem. Septima ſuperriguit. febris acuta. ſudauit per totum.
iudicatus eſt. Huic perpetuo ab aluo ſceſſus bilioſi, pau-
ci, meri. Vrinæ tenues boni coloris, in medio nubilolum
quiddam pendens habentes. Circa octauam minxit vri-
nas melioris coloris, habentes ſubſidentiam albam, paucam.
reſpiſcebat. febris intermiſit. Nona rediit. Circa decimam
quartam febris acuta, ſudauit. Decima ſexta vomuit bilio-
ſa, flaua, ſatis multa. Decima ſeptima ſuperriguit. febris a-
cuta. ſudauit. à febre liber, iudicatus eſt. Vrinæ poſt reci-
diuam & iudicationem, melioris coloris, ſubſidentiam habē-
tes. Neque mente motus eſt in recidiua. Decima octaua pa-
rum caleſcebat. inſuper ſitiebat. Vrinæ tenues, quod in me-
dio pendebat nubilolum erat. parum mente motus eſt. Cir-
ca decimam nonam à febre liber, collum doloroſum habe-
bat. Vrinis ſubſidentia. perfecte iudicatus eſt vigeſima. P.
M. B. V. V. S. hoc eſt, probabile multitudine bilioſarum
vrinarum vigeſima ſanatum.

AEGROTVS VI.

E Vryanaetis filiam virginem febris corripuit. Erat autem *Euryanax*
ſine ſiti perpetuo, nihil ad guſtandum admittebat. Ab
aluo pauca prodibant. Vrinæ tenues, paucae, non boni colo-
ris. Incipiente autem febre circa ſedem dolebat. Sexta die à
febre libera, non ſudauit. iudicata eſt. Quod vero circa ſe-
dem erat, parum ſuppuratum eſt. erupit vnā cum iudicatio-
ne. Poſt iudicationem ſeptima die riguit, parum incaluit,
ſudauit. poſt iudicationem octaua die, riguit non multum.
poſtea vero extremitates frigidae ſemper. Circa decimam
poſt factum ſudorem, mente mota eſt. & rursus breui reſpi-
ſcebat.

HIPPOCRATIS LIBER III.

Hec perit. scēbat. Dicebant autem ex gustato botro ipsam hęc pati. Die vero vna intermissa, rursus duodecima multū delirabat, aluus turbata est ex biliosis, paucis, meris, tenuibus, mordacibus, frequenter surgebat. Die septima ab ea qua mēte mota fuit, mortua est. Hęc incipiente morbo fauces dolebat. & perpetuo ruborem habebat. & gurgulio reuulsus, fluxiones multe, paruę, tenues, acres, Tussiebat, maturum nihil educebat. Omnes cibos per totum tempus fastidiebat, neque vllum aliquem appetiuit. sine siti erat. neque quicquam memorabile bibit. Tacens nihil loquebatur. Tristitia desperata rursus corripiebat. Erat autem & innata quędam tabes.

AEGROTVS VII.

Biton. **A**nginosa illa quę apud Bitonem erat, primum à lingua cępit. Vox non clara, lingua rubra rescicata fuit. Prima die horrida, incaluit. Tertia rigor, febris acuta, tumor subruher, durus, colli & pectoris ex vtraque parte. extremitates frigidę, liuidę. Spiritus sublimis, potus per nares fundebatur, deglutire non poterat. alui secessus & vrinę suppressa erant, Quarta omnia exacerbat. Mortua est anginosa. P. S. S. Q. M. hoc est, probabile secessibus suppressis quinta mortuā.

AEGROTVS VIII.

Forum medicum. **A**dolēcentem qui decumbebat in mendacium foro, febris corripuit, ex lassitudinibus, & laboribus, ac cursib⁹, insolitis. Prima die aluus turbata ex biliosis, tenuibus, multis, Vrinę tenues subnigrę. nō dormiuit. siticulosus. Secunda omnia exacerbat. Secessus plures, intēpestiuiore. non dormiuit. Mens turbata. parum sudauit. Tertia moleste habuit. siticulosus, anxius, multa iactatio. desperatio. mente motus est. Extremitates liuidę ac frigidę. pręcordij intensio submollis vtrinque. Quarta non dormiuit. Malum in peius procedebat. Septima mortuus est. Aetate circa vigesimū annum erat. P. N. S. M. hoc est, probabile nouationibus septima mortuum.

AEGROTVS IX.

Tisamenus **Q**uę apud Tisamenum decumbebat mulier, ei voluolosa moleste procedebat. vomitus multi. potum continere non poterat. Dolores circa pręcordia. Et in infernis partibus iuxta ventrem dolores, tormina cōtinua, non siticulosa. incalēcebat. Extremitates frigidę perpetuo. anxia. insomnis. Vrinę paucę, tenues. secessus crudi, tenues, pauci, prodesse

A prodesse non amplius quicquam poterat. Mortua est.

AEGROTVS X.

Mulierem ex his quæ apud Pantimedem degebant, ex abortu infantis, prima die febris corripuit. Lingua arida, siticulosa, anxia, insomnis. Aluus turbata ex tenuibus, multis, crudis. Secunda die superriguit, febris acuta, ab aluo prodire multa, non dormiuit. Tertia die dolores maiores. Quarta mente mota est. Septima mortua est. Aluus semper lubrica, ex secessibus multis, tenuibus, crudis. Urinæ paucæ, tenues, febris ardens.

*Pantimedem
des abortu
perit.*

AEGROTVS XI.

Alteram ex abortu circa quintum mensem, febris corripuit. Ab initio soporosa erat. & rursus insomnis. lûborum dolor, capitis grauitas. Secunda aluus turbata est paucis, tenuibus, meracis primum. Tertia plura, deteriora, nocte non dormiuit. Quarta mente mota est. Timores. Tristitia. dexter oculus distortus est. sudauit circa caput sudorem modicum, frigidum. extremitates frigida. Quinta omnia exacerbata sunt. multum delirabat. & rursus breui resipiscebat. Sitis, insomnis. Ab aluo multa, intempestiua, perpetuo prodibant. Urinæ paucæ, tenues, subnigræ. Extremitates frigida, subliuida. Sexta per eadem. Septima mortua est phrenitide.

*Mortua
est delira.
Primipara
perit.*

AEGROTVS XII.

Mulierem quæ decumbebat in mendacium foro, primum tunc enixam dolorose masculum, febris corripuit. Statim ab initio siticulosa, anxia, cor dolebat. lingua arida, venter turbatus est tenuibus, paucis, non dormiuit. Secunda die parum riguit. febris acuta. parum circa caput sudauit frigidum. Tertia laboriose ab aluo cruda, tenuia, multa prodierunt. Quarta riguit. Omnia exacerbata sunt. Insomnis. Quintam laboriose tulit. Sexta per eadem. Ab aluo vero prodierunt liquida, multa. Septima riguit. febris acuta. sitis multa. iactatio.

Circa vespërâ frigidum sudorem per totum sudauit, frigiditas. extremitates frigida, non amplius recalescebant. & rursus ad noctem riguit. Extremæ partes non recalescebant. non dormiuit. parum mente mota est. & rursus breui resipuit. Octaua circa meridiem recalesceta est. Siticulosa, soporosa, fastidiosa ac nauſeabunda. Vomuit biliosa, pauca, sublaui. Noctem moleste tulit, non dormiuit. Urinam minxit multam acruatam

uatam

HIPPOCRATIS LIBER III.

uatam inficia. Nona remiserunt omnia. soporosa. Ad vesperā parum riguit. Vomuit pauca, biliosa. Decima rigor, febris exacerbata est, nihil dormiuit. Mane multam vrinam subsidentiam habentem minxit, extremitates recalescētes sunt. Vndecima vomuit virosa, biliosa. Non ita longe postea superriguit, & rursus extremitates frigidæ. Ad vesperam sudor, rigor. Vomuit multum, noctem laboriose trāsegit. Duodecima vomuit multa, nigra, graueolentia, singultus multus, sitis laboriosa. Decimatertia nigra, graueolentia, multa vomuit, rigor. Circa meridiem voce destituta. Decimaquarta sanguis per nares. Mortua est. Huic perpetuo alius lubrica, horrida. Aetas circa annum decimumseptimum.

SECTIO TERTIA.

Constitutio temporis pestilens.

*Tempestas
tis & anni
pestilentis
descriptio.*

Annus austrinus, pluuius. Venti perpetuo quiescentes, Quum squalores fuissent superioribus téporib⁹ ad autumnum, in austrinis circa arcturum aquæ multæ. Autumnus vmbrosus, nubilus, aquarum copia. Hyems austrina, humida, mollis. Post solstitium longe postea, prope æquinoctium seræ hyemes. Et iam circa æquinoctium aquilonares venti niuosi non multo tempore. Ver rursus austrinum, sine ventis. Aquæ multæ perpetuo vsque ad canem. Aestas serena, calida, æstus magni. Etesiæ parum dispersum spirarunt. Rursus circa arcturū in aquilonaribus aquæ multæ. Quum autem esset annus austrinus, humidus, & mollis, per hyemem quidē sani degebant, exceptis tabidis, de quibus scribetur. Ante ver autem simul cum fientibus frigoribus, sacri ignes multi, quibusdam cum occasione, quibusdam non, atque hi maligni multos peremerunt. Multi fauces doluerunt. Voces vitiatæ, febres ardētes. phrenitici, ora vlcere feruido affecta, in pudendis tubercula. Lippitudines. Carbunculi. Alui turbatæ. Ciborū fastidia. Aliqui siticulosi, aliqui non. Vrinæ turbatæ, multæ malæ. Diu soporosi, & rursus insomnes. Multæ iudicationes penitus interceptæ. Quædam ægre fientes. Hydropes, tabidi multi. Atque hi quidem erant populares morbi. In singulis autem relatis speciebus ægroti, & moriebantur multi. Acciderūt autem singulis horum hoc modo. Multis equidem ignis facer cum occasione, ex vulgaribus & valde paruis vulnusculis, in toto corpore, maxime sexagenariis, circa caput si vel parū neglecta essent.

Acta essent. Multis vero etiam in ipsa curatione, inflammationes magnæ fiebant. & sacer ignis multus, breui, vndique depascebatur. Plurimis igitur ipsorum abscessus ad suppurationes contigerunt. carnum & neruorum ac ossium elapsus magni. Erat autem & fluxio collecta nõ puri similis. Sed alia quædam putredo, & fluxio multa ac varia. Quibus igitur circa caput horum quid fieri cõtigat, his glabrics totius capitis ac menti fiebat. & ossium denudationes ac elapsus. & multæ fluxiones, & hæc in febribus, & sine febribus. Erant autem hæc horrida magis quàm mala. Quibus enim ad suppurationem talium maturatio peruenit, horum plerique seruabatur. Quibus vero inflammatio quidem & ignis sacer discessit, talem autem nullum abscessum fecit, horum multi perierunt. **B** Similiter autem & si alicubi in alia corporis parte horum quid oberraret, hæc acciderunt. Multis enim brachiis, & totus cubitus defluxit. Quibusdam vero hæc affligebant latera, aut anteriorem aut posteriorem aliquam partem. Quibusdam autem totum femur, vel tibiam denudabantur, & totus pes. Erat autem ex talibus omnium grauissimum, vbi circa pubem & pudendam accidisset. & circa vlcera quidem, & cum occasione, huiusmodi erant. Multis autem in febribus, & ante febrem, & ex febribus ignes sacri inciderunt. & qui quidem horum abscessum fecissent per suppurationem, aut per alium turbatio quædam tempestiua, aut vinarum bonarum excretio cõtigisset, per hæc soluebantur. Quibus autem nihil horum accidisset, **C** verum obscure disparuisset, hi lethales erant. Plerumque igitur plurimis accidit sacer ignis vere. consequebantur autem & per æstatem, & sub autumnum. Multa vero turbatio quibusdam, & circa fauces tubercula, & lingue inflammationes, & abscessus circa dentes. Vocesque multis significationem de se præbebant, quod essent vitiatæ ac impeditæ & inuolutæ, primum quidem, tabidis incipientibus, immo etiam ardenti febre correptis & phreniticis. Cœperunt igitur febres ardentes ante ver, itemque phrenitis, post facta frigora. & plurimi tunc ægrotarunt. Acuta vero & lethalia symptomata his aderant.

Erat autem constitutio febrium ardentium hoc modo. Ab initio soporosi, anxij, horridi. febris acuta. non valde siticulosa. non diliri. De naribus parum stillauit. Exacerbationes plerisque diebus paribus. Circa exacerbationes obliuio, exolutio, & vocis

Similia hæc sunt morbo gallico quod nunc uiget.

Febris ardens morbus.

HIPPOCRATIS LIBER III.

& vocis priuatio . Extremitates manuum ac pedum semper his frigidiores, præsertim circa exacerbationes. & rursus tarde ac non bene recalescebant: rursusque & intelligebant & loquebantur. Detinebat etiã ipsos sopor continuus, non somnulosus. Aut vigiliæ cum doloribus. plurimis horu alui turbulenti, secessibus crudis tenuibus, multis. Vrinæ multæ, tenues, nihil neque iudicatorij, neque boni habentes. Nec vero aliud aliquod iudicarium ita habentibus fiebat. Neq; enim sanguis bene erumpebat, neque alius aliquis abscessus iudicatorius fiebat. Moriebaturque vnusquisque prout contigit erroneo modo, plerumque circa iudicationes. Quidam vero diu voce priuari. Multi sudantes. & his quidem qui perniciose habebant, hæc accidebant, Confimilia vero etiam phreniticis. Sine siti autem hi erant. Neque quisquam phreniticus insaniuit, velut ex aliis, sed alia quadam mala ac lenta in somnū delatione grauiter peribant. Erant insuper etiam aliæ febres, de quibus scribetur. Ora multis vlcere feruido affecta, vlcerosa. Fluxiones circa pudenda multæ, vlcerationes. Tubercula foris, intus, circa inguina. Lippitudines humidæ, longæ, diurnæ, cum doloribus. Eruptiones palpebrarum foris, intus, multorum oculos corrumpentes, quas ficos vocant. Erumpebant etiam in aliis vlceribus multæ, & in pudendis. Carbunculi per ætatem multi, & aliæ quæ seps vocantur, pustulæ magnæ. Herpetes multis magni. At vero circa aluum multis multa & nociua acciderunt. Primum quidem tenesmi multis dolorose. plurimis autem pueris, & omnibus qui erant ante pubertatem, & plurimi horum peribant. Lienterici multi, dysenterici, neque hi valde dolorose. Secessus autem biliosi, & pingues, & tenues, & aquosi. Et multis quidẽ ipse morbus ad hoc decubuit, & sine febribus & in febribus. cum doloribus, tormina, & voluuli maligni, multorum quæ in corpore erant, & suppressa erant exitus. & exeuntia progressa dolores non soluentia, & his quæ offerebantur difficulter cedentia. Nam purgationes plurimos amplius lædebant. Ex his autem qui sic habebant, multi quidem cito peribant. Multi vero longius vitam degebant. & in summa, omnes & qui longis morbis ægrotabāt, & qui ex acutis, maxime ex his quæ per aluum secedebant mortui sunt. Omnes enim aluus sustulit. Cibum autem fastidiebant omnes, ob cunctos præscriptos morbos, in quos

Mala uaria.

Palpebrarum ficos.

Vētris malū hos oēs ægrotabat.

A quos sanè ego incidi. Multi vero, & maxime hi ipsi, & qui tales erant, sed & alij, perniciose habebāt. & siticulosi alij erāt, alij non. Ex his qui febribus alijsq; laborabant, nullus siticulosus intempestiue. Sed licebat circa potum victus rationem constituere, prout velles. Vrinæ autem prodeuntes multæ quidem erant, non pro potus ingesti ratione, sed multum excedentes. Verum multa quædam malitia vrinarum erectarum erat. Neque enim crassitudinem, neque concoctiones, neque purgationes bonas habebant. Nam in multis morbis purgationes per vesicam fientes bonæ sunt. Significabant autem plurimis colliquationem, & turbationem, & dolores, & nullam iudicationem. Soporosi vero maxime phrenitici, & febre ardente laborantes erant. Sed & in aliis morbis omnibus maximis, qui cum febre fiebant. In totum autem plurimos aut grauis sopor comitabatur, aut paruos ac tenues somnos habebant. Multa præterea alia febrium genera populariter grassata sunt tertianarum, quartanarum, nocturnarum, continuarum, longarum, erronearum, anxiarum, inconstantium. Omnes autem hæc cum multa turbatione fiebant. Nam alui plurimis turbatæ. horrores. sudores non iudicatorij. & vrinæ velut præscriptum est. Atque hæc plerisque horum longa erant. Neque enim abscessus his fientes iudicabant, velut in aliis. Et omnia quidem omnibus difficulter iudicabantur, & nullæ iudicationes fiebant, & diuturnæ, maxime vero his. paucis autem horum iudicatio circa octogesimum diem fiebat. Plurimis prout contigit defecerunt. Moriebantur autem horum pauci ex hydrope erectè obambulantes. Multos vero etiam in aliis morbis tumores infestabant, maxime vero tabidos. Maxima autem & grauissima erat tabes, & plures occidit. Nam multi per hyemem incipientes, partim decumbebant, partim erectè obambulabant. Ante ver autem plerique ex decumbentibus moriebantur. Aliorum vero tusses nihil defecerunt. Verum æstate remiserunt. At sub autumnum omnes decubuerunt, & multi mortui sunt, plurimi vero horum diu ægrotauerunt. Cæpit igitur plurimis horum derepente ex his afflictio. frequentes horrores erant, sæpe febres continuæ, acutæ. sudores intempestiui, multi, frigidi perpetuo. Multa frigiditas, & vix rursus recalescebant. Alui variè adstrictæ, & rursus breui humescentes.

Que febres uiguerant.

Tabes grauissima fuit.

HIPPOCRATIS LIBER III.

mescentes. Et quæ circa pulmonem erant omnia, infra distri-
buebantur. Multitudo vrinarum non bonarum, colliquatio-
nes malæ. Tussēs autem aderant quidem perpetuo multe,
& multa educentes matura ac liquida, non autem valde cum
doloribus. Sed etsi aliquantulum dolerent, valde tamen le-
niter omnibus purgatio à pulmone fiebat. fauces non valde
mordaces. neque falsugines quicquam infestabant. Viscosa
tamen, & alba, & liquida ac spumosa multa de capite descen-
debant. Magnum autem malum & hos, & alios comitabatur
ciborum fastidium, velut præscriptum est. Nam neque po-
tum cum cibo libenter sumebant, sed valde sine siti debebat.
Grauitas corporis. Soporosi. Plurimis ipsorum tumor, & ad
hydropem deueniebant. Horridi delitri circa mortem. For-
ma tabidorum erat leuis, subalbida, lentis colorem referens,

*Quæ tabi-
dis species
hæc uexa-
bat.*

subrubra, raua. Pituïta alba referti. Scapulas alarum modo e-
minentes habentes. & mulieres sic. Atrabilis item forma, &
sub sanguinea. febres ardentes, & phrenitides, ac dysenteria
hos tentabant. Tenesmi iuuenibus pituitosis. longa alui pro-
fluua, acresq; secessus & pingues, biliosi. Erat autem omni-
bus præscriptis grauissimum quidem ver, & multos occidit.
Aestas autem facilima, & paucissimi perierunt. Autumno ve-
ro & sub pleiada rursus multi moriebantur quartanarij.

AEGROTI SEDECIM. PRIMVS.

Parijs.

IN Thasio Parium quendam, qui decubebat supra Artemi-
sij ædes febris corripuit acuta. ab initio continua, ardens,
stictulosa. Principio soporosis, & rursus insomnis. Aluus tur-
bata in principio. Vrinæ albæ. Sexta die minxit urinā oleo-
sam, mēte motus est. Septima exacerbata sunt omnia. nihil
dormiuit. Sed & urinæ similes, & mens turbata. Ab aluo verò
biliosa, pinguis prodierūt. Deinde octaua parum de naribus
stillauit. Vomuit virosa pauca, parum dormiuit. Nona per ea-
dem. Decima omnia remiserunt. Vndecima sudauit, non per
totum. Circumfrigit quidem, verum breui rursus incaluit.
Duodecima febris acuta. Secessus biliosi, tenues, multi. In v-
rinis quiddam in medio vehabatur: mente motus est. Deci-
ma septima laboriosè transmissa est. Neque enim somni, neq;
febris aufercebat. Vigesima sudauit per totum, insomnis: se-
cessus biliosi, cibum fastidians, soporosis. Vigesima quarta
recidua facta est. Trigesima quarta à febre liber, aluus non
suppressa

A suppressa est. Et rursus incaluit. Quadragesima à febre liber, alius non multo tempore suppressa fuit. Cibum fastidiens, parum rursus febricitauit, & temper erroneo modo, partim sine febre, partim non. Nam etsi reliquisset & alleuata esset, rursus reuertebatur. Eduliis quoque multis & vitiosis utebatur. Somni mali circa recidiuas, mente motus est. Vrinæ crassitudinem quidem habentes tunc mingebat, verum turbatas & prauas, & alius iam adstricta erat & rursus soluta, febriculæ continuæ: secessus multi, tenues. Centesimavigesima die mortuus est. Huic alius assidue à prima die lubrica erat, ex biliosis, liquidis, multis. Aut adstricta ex feruidis ac crudis. Vrinæ verò perpetuo malæ. Sopores plerunque cum doloribus insomnis, cibum fastidiens, febris ardens continenter.

AEGROTVS II.

IN Thaso decumbentem apud frigidam, à partu vbi filiâ peperisset, & purgatio facta non esset, febris acuta, horrida, tertia die corripuit. Multo autè tempore ante partum febriculosa erat, decumbens, cibum fastidiens. Postquam autem riguisset, febres cõtinuæ, acutæ, horridæ. Octaua multum mente mota est, & sequentibus diebus, & breui rursus resipiscebatur. Alius turbata, ex multis tenuibus, aquosis, bile permixtis: sine siti erat. Vndecima resipiscebatur, verù soporosa erat. Vrinæ multæ, tenues, & nigrae, insomnis. Vigesima parù circumfrigit, & breui rursus incaluit: parum delirauit, insomnis. Alui secessus iidem. Vrinæ aquosæ, multæ. Vigesima septima à febre libera, alius adstricta est. Non multo tempore postea coxæ dextræ dolor fortis multo tempore. Febres rursus comitabantur, & urinae aquosæ. Quadragesima dolores circa coxam alleuari sunt. Tussis autem assiduæ, humidæ, multæ: alius substitit. Cibum fastidiens. Vrinæ in iisdem, febres autem in totum quidem non deficientes, erroneo vero modo exacerbescerent, partim ira, partim non ita. Sexagesima tussis quidem obscure defecerunt. Neque enim aliqua sputorum concoctio fiebat, neque alius consuetus abscessus. Maxilla verò ex dextris diuulsa est: soporosa, rursus delirabat, & breui resipiscebatur. Cæterum à cibis auersum animum habebat, & maxilla quidem ad locum suum rediit. Alius autem biliosa, pauca egressit, febricitauit acutius, horrida, & sequentibus diebus voce destituta est, & rursus resipiscebatur ac loquebatur. Octoge-

HIPPOCRATIS LIBER III.

simam mortua est. Urinae huic perpetuo erant nigrae, & tenues, & aquosae, & sopor comitabatur. Cibum auersans. Tristis insomnis: ira, molestia. Mens melancholica.

AEGROTUS III.

*Pythion
Herculis
templum.*

IN Thaso Pythionem qui supra Herculeum templum decumbebat, ex laboribus, & lassitudinibus, & neglecta virtute ratione, rigor magnus, & febris acuta corripuit. lingua arida, siticulosus, biliosus, non dormiuit. Urinae subnigrae, quod in medio ipsarum pendeat, sublime erat. Secunda die circa meridiem frigiditas extremarum partium, & magis circa manus & caput. loquela & voce destitutus. Breuispirus ad multum tempus, rursus incaluit. Sitis. Nox quieta. Sudauit parum circa caput. Tertia dies quieta. Vespero vero sub solis occasu parum friguit. Turbatio nocte dolorose. nihil dormiuit. Ab aluo pauca compacta stercora prodierunt. Quarta mane quietus. Circa vespere omnia exacerbata sunt. frigiditas, loquela & voce destitutus. in deterius recalescens est post tempus. Urinas minxit nigras in medio quid pendens habentes. Nocte quiete dormiuit. Quinta visus est alleuatus esse. Verum iuxta aluum grauitas cum dolore: siticulosus. Nocte laboriose tulit. Sexta mane quietus. Vespere dolores maiores, exacerbatus est. Vespere clystere adhibito, ab aluo probe egressus. Nocte dormiuit. Septima die anxius, submolesse ferebat. Urinam minxit oleosam, noctu turbatio multa, delirabat, nihil dormiebat. Octaua mane parum dormiuit. Mox autem frigiditas. Vocis interceptio. Spiritus tenuis imminutus. Vespere rursus excalescens est, mente motus est. Iam autem ad diem parum alleuatus est. Secessus meri, pauci, biliosi. Nona soporosus, anxius, quum excitaretur, non valde siticulosus. Circa solis occasus molesse ferebat, delirabat, noctem malam habuit. Decima mane voce destitutus, frigiditas multa, febris acuta. Sudor multus: mortuus est, dolores huic in diebus paribus.

AEGROTUS IIII.

*Phrenitis
& moritur*

Phreniticus prima die decumbens vomuit æruginosa, multa tenuia. febris horrida. sudor multus, continuus per totum. Capitis & colli grauitas cum dolore. Urinae tenues, in medio ipsarum pendentia, parua, diuulsa: non sudauit. Ab aluo stercora aceruatim egressus, multum mente motus est. nihil dormiuit

Aminuit. Secūda mane voce defututus, febris acuta, sudauit: nō intermisiit. Palpitationes per totum corpus. Nocte conuulsiones. Tertia exacerbata sunt omnia. Quarta mortuus est.

AEGROTVS V.

IN Larissa caluus, femur dextrum doluit derepente. ex his quæ offerebantur nihil proderat. Prima die febris acuta, ardeas, quiete tenebat. dolores autem consequebantur. Secunda femoris quidem remisit dolores. febris autem acuta est. submolestè ferebat. non dormiebat. extremitates frigidae. Vrinarum non bonarū copia prodibat. Tertia femoris dolor quieuit. Mēis emotio, & turbatio, & multa iactatio. Quarta circa meridiem mortuus est celerrime & acutissime.

AEGROTVS VI.

IN Abderis Periclem morbus corripuit acutus, continuus, cum dolore. Sitis multa. anxietas. potum continere non poterat. Erat autē sublienosus, & capite grauatus. primo die sanguis ē sinistra nare erupit, multa tamē febris augescebat. Vrinam minxit multam, turbatam, albam. deposita nō subsidebat. Secunda omnia exacerbata sunt. Vrinæ tamē crassæ quidem erant, verum magis subsidebant. & anxietas leuata est. dormiuit. Tertia febris emollita est. Vrinarū copia: quæ concoctæ multam subsidentiam habebant. Nox quieta. Quarta circa meridiem, multum calidum sudorem per totum exclusit. A febre liber. iudicatus est. non rediit. morbus acutus.

AEGROTVS VII.

CI IN Abderis virginem quæ decumbebat in sacra via, febris ardens corripuit. Erat autem siticulosa & infomnis. Menses autem primum ipsi descendebant. Sexta anxietas multa. rubor. horrida. mœsta. Septima per eadem. Vrinæ tenues quidem, verum boni coloris. Venter non vexabat. Octaua surditas. febris acuta. infomnis. anxia. horrida. intelligebat. Vrinæ similes. Nona per eadem, itēmq; sequētibus sic surditas perseuerabat. decimaquarta mens turbata. febris remisit. Decima septima sanguis per nares fluxit multus. Surditas parum remisit. & sequētibus anxietas. surditas aderat. & delira erat. Vigesima pedum dolor. surditas, delirium intermisiit. sanguis paucus per nares erupit. sudauit. à febre libera. Vigesima quarta febris rediit. surditas rursus. pedum dolor permanfit. mēis emotio. Vigesima septima sudauit multum à febre libera.

V iij Surditas

HIPPOCRATIS LIBER III.

Surditas defecit. pedum dolor restabat. De cætero perfecte indicata est.

ÆGROTUS VIII.

*Anaxion.
Thraciæ
portæ.*

IN Abderis Anaxionem, qui decumbebat ad Thracias portas, febris acuta corripuit. lateris dexteri dolor assiduus. Siccam tussim habebat, neque expuebat primis diebus. Siticulofus. Insomnis. Urinæ boni coloris, multæ, tenues. Sexta delirus. Ad calefactoria nihil remisit. Septima dolorose agebat. Nam & febris augefcebat, & dolores non remittebant, & tussés vexabant, difficulterque spirabat. Octaua cubitum secui. effluebat sanguis multus. velut debebat. Remiserunt quidem dolores, tussés tamen siccæ comitabantur. Vndecima remiserunt febres. parum circa caput sudauit. Tussés adhuc. & quæ à pulmone prodibant, liquidiora erant. Decima septima incœpit pauca, matura spuer. allenatus est. Vigesima sudauit, à febre liber post iudicationem. alleuatus est. Erat autem siticulofus, & à pulmone prodeuntium purgationes non bonæ. Vigesima septima febris rediit. Tussit, eduxit matura multa. Urinis subsidentia multa, alba. Sine siti erat. bene spirans. Trigesima quarta sudauit per totum, à febre liber. penitus iudicatus est.

ÆGROTUS IX.

*Heropy-
thus.*

IN Abderis Heropythus erectè obambulās caput dolebat. Non multo autem tēpore postea decubuit. habitabat prope superiorem viam. febris ipsum corripuit ardens, acuta. Vomitus ab initio multorum biliosorum, siticulofus, multa molestia. Urinæ tenues, nigra, id quod in medio ipsarum pende-
bat, sublime erat aliquando, quādoque non. noctem dolorose transegit. Febris aliàs aliter exacerbescebat, plerunque inordinate. Circa decimam quartam surditas. febres augefcebant. Urinæ per eadem. Vigesima multum mente motus est, itēq; sequētib; . Quadregesima multus sanguis ex naribus erupit, & magis intelligebat. Sorditas aderat quidem, sed minor. febres remiserunt. Sequentibus diebus sanguis erumpebat frequenter & paulatim. Circa sexagesimam sanguinis eruptiones cessarunt. Coxæ autem dextræ dolor fortis. & febres augefcebāt. Non longo tempore postea dolores omnium infernarum partium. Contigitque aut febres esse maiores, & surditatē multā: aut hæc quidē remittere & leuiora fieri, infernarum

A fernarum autē partium circa coxas, dolores esse maiores. Iā vero circa octogessimam omnia remiserunt. Nihil tamen defecit. Vrinæ enim boni coloris, & plures subsidentias habentes prodibant, & deliria minora erant. Circa centesimā alu^o multis biliosis turbata est, & tempore non modico multa talia prodibant, & rursus dysenterica cum dolore. Reliquorum vero quies erat. In summa, & febres defecerunt, & surditas cessauit. In centesima vigesima perfecte iudicatus est, febris ardens.

AEGROTVS X.

IN Abderis Nicodemum ex venere & potu, febris corri- Nicodemus.
puit. Initio autem erat anxius. & cordis dolore vexabatur. siticulosus. lingua combusta fuit. Vrinæ tenues, nigre. **B**
Secunda febris exacerbata est. horridus. anxius. non dormiuit. Vomuit biliosa, flaua. Vrinæ similes. Nox quieta. dormiuit. Tertia die remiserūt omnia & quies erat. circa solis occasus rursus molestie ferebat. noctē laboriose tulit. Quarta rigor. febris multa. dolores omnium. Vrinæ tenues, & quid in medio ipsarum pendens. Sexta mente multum motus est. Septima quies. Octaua alia remiserunt omnia. Decima & sequentibus diebus aderant quidem dolores, verum omnes minores. Exacerbationes autem & dolores huic ad finem vsque in diebus paribus magis erant. Vigesima minxit urinā albam, quæ crassitudinem habebat, & deposita non subsidebat. Sudauit multum. visus est sibi à febre liber esse. Vespero vero rursus incaluit. & dolores iidem. horror. sitis. parum mente mot^o est. **C**
Vigesima quarta multam urinam albam, multam subsidentiam habentem minxit. Sudorem multum calidum per totum exsudauit. à febre liber. iudicatus est.

AEGROTVS XI.

IN Thaso mulier morosa, ex mœrore cū occasione, erectē Mulier Thasia.
obambulans, insomnis facta est, & cibi fastidiēs. & erat siticulosa, & anxiosa. habitabat autem prope Pyladæ ades in Leio. Prima die sub initium noctis timores, sermones multi, tristitia, febricula tenuis. Mane conuulsiones multæ. Quum autem intermisissent conuulsiones illæ multæ, delirabat. turpia loquebatur. Dolores multi, magni, continui. Secunda per eadem. nihil dormiebat. febris acutior. Tertia cōuulsiones defecerūt. Sopor autem & in somnum grauiorem delatio ade-
V iij rat, &

HIPPOCRATIS LIBER III.

rat. & rursus vigilia. exiliit. continere se non potuit. multum **D** delirauit. febris acuta. Ad hanc noctem multum sudorem calidum per totum corpus exiit. à febre libera. dormiuit. Penitus respuit. iudicata est. Circa tertiam autem diem vrinae nigrae, tenues. quod in medio ipsarum pendeat aliquandiu rotundum, non subsidebat. Circa iudicationem menses multi prodierunt.

AEGROTVS XII.

Virgo Larissa.

IN Larissa virginem febris corripuit ardens, acuta. insomnis. siticulosa. lingua fuliginosa, arida. Vrinae boni quidem coloris, sed tenues. Secunda die laboriose degebat. non dormiuit. Tertia ab aluo multa prodierunt aquosa cum virore pallida. itidemque sequentibus diebus prodierunt eiusmodi tolerabiliter. Quarta vrinam egressit tenuem, paucam: habebat in medio pendens illud sublime, non subsidebat. mente mota est ad noctem. Sexta per nares sanguis multus large fluxit. quumque inhorruisset, sudorem multum calidum per totum effudit. à febre libera. iudicata est. In febris autem, & iam iudicatae, menses tunc primum prodierunt. Erat enim virgo. Perpetuo vero anxiosa erat. horrida. faciei rubor. oculorum dolor. capitis grauissimas. Huic non rediit, sed iudicata est. Dolores diebus paribus.

AEGROTVS XIII.

Apollonius Abderitanus.

Cur hic adeo laborauit.

APollonius in Abderis erecte titubans obambulabat multo tempore. Erat autem magnis visceribus praeditus. & circa hepar dolor multo tempore familiaris ipsum comitabatur. & sanè tunc etiam morbo regio tenebatur. flatuosus. coloris subalbi. Quum autem edisset ac bibisset intempestiuus carnem bubulam, incaluit parum primū. decubuit. Lacte vero usus cocto & crudo, multo, caprino ac ouillo, & victu malo, omnium laesiones magnae sequutae sunt. Nam & febres exacerbatae sunt, & aluus nihil memorabile de ingestis egressit. Vrinae tenues & paucae prodibant. Somni non aderant. inflatio mala. sitis multa. soporosa. praecordij dextri eleuatio cum dolore. extremitates vndique subfrigidae. parum delirabat. Obliuio omnium quae loquebatur. mente mouebatur. Circa decimam quartam ex qua quum riguisset incaluit, decubuit, & insaniit. clamor. turbatio. sermones multi. & rursus quies. & tunc sopor accessit. postea vero aluus turbata, multis, biliosis, meris,

A fis, meris, crudis. Vrinæ nigræ, pauca, tenues. Multa molestia. Seceſſus varie habebant. Aut enim nigri, & pauci, ac æruginosi erant: aut pingues, crudi, & mordaces. Per tempora vero videbatur etiam lactoſa egerere. Circa vigefimam quartam lenitas erat. & reliqua quidem in iſdem perſeuerabant, parum autem reſpiſcebat: ex quo vero decubuit, nulli⁹ meminit: Rurſus autem breui deſipiebat. Omnia in peius procedebant. Circa trigefimam febris acuta. Seceſſus multi, tenues. delirius. extremities frigidæ. voce deſtitutus. Trigefima quarta mortuus eſt. Huic ppetuo ex quo ego noui, aluus turbata. Vrinæ tenues, nigræ. ſoporofus. inſomnis. extremities frigidæ. delirius perpetuo. phreniticus.

AEGROTVS XIII.

B IN Cyzico mulierem, quæ gemellæ filias magna difficultate peperit, & non valde purgata eſt, primum inuaſit febris horrida, acuta. Capitis & colli grauitas cum dolore. Inſomnis ab initio, taciturna ac tetrica, & non obſecundans. Vrinæ tenues & decolores. ſiticuloſa. anxia plerunque. aluus erroneo modo turbata. & rurſus adſtrieta. Sexta ad noctem multū delirabat. nihil dormiuit. Circa vndecimam inſaniit. & rurſus reſipuit. Vrinæ nigræ tenues. Et rurſus tempore interpoſito oleoſa. Et aluus multis tenuibus turbata. Decima quarta conuulſiones multæ. extremæ partes frigidæ. nihil amplius intelligebat. Vrinæ ſuppreſſæ ſunt. decima ſexta voce deſtituta eſt. decima ſeptima mortua eſt. phrenitis.

*Puerpera
Cyzicena
gemellæ
peperit
& mortua
eſt.*

AEGROTVS XV.

C IN Thoſo Dealcis vxorem, quæ decumbebat in Leio, febris horrida, acuta, ex mœrore corripuit. Ab initio contegebatur, & ad finem perpetuo, ſemper tacita manibus palpabat, vellebat, ſcalpebat, pilos legebat. Lachrymæ, & rurſum riſus. non dormiebat. ab aluo irritationes. nihil prodibat, parum commonita bibeat. Vrinæ pauca, tenues. Febres ad manū tenues. extremarum partium frigiditas. Nona multum delirabat. Et rurſus ſedata eſt. tacita. Decima quarta ſpiritus rarus, magnus, per tempus. Et rurſus breuiſpira. decima ſeptima ab aluo irritatio turbulenta. poſtea vero ipſi potus percurrabant, neque conſiſtebant. omnino nihil ſentiebat. Cutis aridæ circumtenſio. Vigefima ſermones multi, & rurſus ſedata eſt. voce deſtituta. breuiſpira. Vigefima prima mortua. Huic perpetuo

*Dealcis
uxor Thoſa
ſia.*

HIPPOCRATIS LIBER III.

perpetuo ad finem vsque erat spiritus rarus magnus. Omni-
no nihil sentiebat. semper contegebatur. Aut sermones mul-
ti, aut tacita perpetuo. phrenitis.

AEGROTVS XVI.

*Adolescēs
in Meli-
boea.*

Adolescēs in Melibœa, ex potationibus & venere mul-
to tempore calefactus decubuit. Horrid⁹ autem & an-
xius erat. insomnis. & nō siticulosus. Ab alio prima die ster-
cora multa prodibant, cum multa defluxione. & sequentibus
multa aquosa cum virore pallida prodibant. Urinæ tenues,
paucæ, decolores. Spiritus rarus, magnus, per tempus. Præcor-
dij intentio submollis, oblonga ex vtriusque. Cordis palpi-
tatio perpetuo continua. Urinam minxit oleosam. decima sen-
sim mente motus est. moderatusque erat ac quietus. Cutis a-
rida & circumdistenta. Secessus multi & tenues, aut biliosi &
pingues. Decimaquarta omnia exacerbatæ sunt. mente mo-
tus est. multū delirauit. Vigesima insaniit. iactatio. nihil min-
gebat. paucos potus cōtinebat. Vigesimaquarta mortuus est.
phrenitis. Videtur porrō mihi æstas illa quæ tunc fuit, iux-
ta rationem commoditatem attulisse. Nam æstiuos morbos
hyems succedens soluit. Et hyemales æstas succedens trans-
mutat. Quamquam ipsa in seipsa quæ tunc erat æstas, non sta-
bilis erat: sed derepente calida, & austrina, & sine ventis. At-
tamen ad aliam tempestatem transmutata profuit. Magnam
vero artis partem esse arbitror, etiam de his quæ scripta sunt
recte, posse considerationem facere, ac iudicare. Qui enim
hoc nouit, & his vtitur, non videtur mihi in arte multum fal-
li posse. Oportet autem exacte perdiscere vnamquamque tē-
porum constitutionem, & ipsum morbum. Et quid boni cō-
munis sit in constitutione, aut in morbo. & quid mali com-
munis sit in statu, aut morbo. & qui morbus longus sit, & le-
thalis. & qui longus, & non perniciosus ad vitam. & qui acu-
tus, ac lethalis. & qui acutus, & superesse sinens. Ex his enim
ordinem dierum iudicatoriorū considerandi, ac præ-
dicendi facultas datur. Et harum rerum gna-
ros scire contingit, quibus & quando,
& quomodo victum præscri-
bere oportet.

*Quæ & in
anni tēpo-
ribus &
in morbis
obseruan-
tur.*

Hippocra-

A HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS POPVLARI-

buslib. IIII. Iano Cornario

medico physico in-

terprete.



Ost æquinoctium & post pleiada, qualia sunt erodentia & mucosa, quæ caput aperuerunt, supra auræ prodierunt. Ei qui apud Leocydis ædes habitabat, in pede. Phanodico digitum in pede, in pectore. Qui tibiâ secus est, hac parte etiâ nigrefactus est. Erat vlcus magnû in externa tibiæ parte, & retro prodibat. Quû purû factum esset, la-

teris dolor & pectoris sinistri è directo, & febres. Mortu⁹ est à febre. Biliosum restiario abunde coloratû. Et vstoria adhibenti circa æquinoctium, sanguis multus deorsum prodit.

Seni valde vehementer abscessit, non vltra quatuordecim dies. Vulnerato ab Antiphilo, vsto iudicatio facta est die septima, bilioso, stupido. Tertia post iudicationē, sanguinem

Antiphil⁹.

C sput, superstes manebat. & recidiua facta est postea. Iudicat⁹ est velut par erat, circa pleiadû occasum primû. Post pleiadû autē occasum, biliosus ad insanîâ vsq;. iudicatio facta est, superuixit, circa nonâ diē, absq; sudore. Circa æquinoctium

Chalcidonium à portis delatus ad forû, ex ruptione circa mâ-
mâ dextrâ dolēs, spuebat alias atq; alias pallēs subuiride. Vē-
ter egerebat. Sudor auspicatus septima, tenuit plerunq; vsq;
ad octauâ, iudicatus est decimaquarta. Circa quadragesimâ
tubercula exorta ipsi circa vtrasq; aures, haud immerito pu-
tabatur suppuratus fore, nō factum est. Pectus Aristodemo
vstû est. Philidis filio quû abscessus factus esset ex casu, &
ipsi pect⁹ vstû est. Erat aut dolor quidâ etiâ antea, post æqui-
noctiû autûnale recidiuē, & alias vsq; ad solstitiû hyemale, &
cû sole æstiuo. Acheloi vxor sexta diē abortiuit, quû esset
sanguinea,

Chalcido-
nius.Aristode-
mus.Philidis fi-
lius.

Achelous.

HIPPOCRATIS LIBER III.

Morbus regius. sanguinea, & horrida. & sudores. Iudicatio facta est decima-
 quarta, quot mēsum fuerit fœtus, haud scio. Masculum aut e-
 tiam alium ad dies viginti se abortuisse dixit, an vera dixe-
 rit non scio. Circa solstitium hybernum aquilonares ven-
 ti erant. Morbo regio corripiebatur abunde colorati. & par-
 tim horridi, partim nō. Linguae combustæ tertia die. Et tur-
 bationes circa sextam & septimam, atque hæc diu durantes.
 Decimaquarta ventres resistentes, & in medicationibus non
Diuerſi morborum affectus. obediētes. Pro ratione febrium etiam nulli sudores. Sple-
 nes quibusdam parui ad præcordia dextra extēti, & ad ma-
 nū submurmurātes. Sanguinis fluxiones. & vrinis purgatio ac
 iudicatio. Multo autem magis infra nitebantur. Nam & hoc
 sub illud tempus corripiebat. Quibus non sic erat, splenes
 vero etiam eleuati, his sanguis ex sinistra nare. Solstitium
 præterierat, hyberna hyberno modo in Aquilonaribus, pau-
 lo vero post austrina erant, ad quindecim dies. Postea vero
 niues quatuordecim diebus. Circa hanc anni constitutionē,
 morbi regij abunde colorati vigeant. qui non sincere iu-
 dicabantur, recidiuabant. Post niues, austrina succedebant, &
 pluiæ, grauedines eruperunt, & cum febribus, & sine febrī-
 bus. Cuidam vero etiam, ad dentes, qui autea ex medio do-
 luerat: ad dextra, supercilium, & oculos. Erant autem & rau-
 cōsi, & fauces inflammatae. & glandulae isthic spongiæ appel-
 latae intumescēbant. & tubercula circa aures, & maxillā mol-
 lia, & cū febre sedabātur. Incipiētibus febricitare fiebant su-
 pernē, & in vtraq; partes pleraque horū. & Spōgiæ quibus-
 dam sub autūnum & hyemem. Sed & porrigines. Et mul-
 ta omnibus modis abortiebant, & difficulter pariebant.
Virginis morbus. Sexta die virgini iudicata. sexta reuerterunt. iudicata ve-
 ro sunt per sextam. Omnia in his temporibus sexta & o-
 ctava iudicabātur, circa pleiadum occasus. Meandri caci v-
 xor statim cum pallore viride, & statim purulētum spuit cir-
 ca sextam. & hepatis feruor, & deorium secessus modicus,
 carnopurulenta sursum pauca, alba, lata expuebat. cibum fa-
 stidiens. Mortua est prope vigesimam diem. Ex vicinis
Thestoris famula. Thestoris famula, ex vstoriis: secessu bilioso, multo; præcor-
 dio intenso: Sexta die ex suppressione alui ipsi tenuia, mul-
 ta, vna vice egeffit. & statim sudauit, & iudicata est. & alui
 substitit. eadem autem hora quum riguisset febricitauit &
 rursus

- A** rursus.eadem hora. Therсандri vxor quum pituita alba prædita non valde esset, lactans acuta febre correpta est. Huic lingua cõbusta est, dum alia combureretur, sub hoc tẽpus: linguaque exasperabatur, velut grandine multa. Et lumbrici per os. Circa vigesimam autem non perfecte iudicata est. Circa pleiadum occasus Metrophanti filius, caput percussus ab alio puero, per testam: quum peruenisset ad duodecimam diem febricitauit. Occasio autem erat quod quum detergeret partes circa vlcus perfricuit, & perfrigeratus est. & labia statim sunt eleuata. Attenuata est autem cutis, multis locis vterius ab vlcere. quum autem sectus esset non tarde, neque pus effluxit, neque alleuatus est. Iuxta autem vero videbatur suppurari, in maxilla ad dextram. Hac enim parte etiam vlcus erat. Postea & hoc non suppuratum est, & humerus dexter suppuratus est cito. Mortuus est circa vigesimam quartam. Post pleiadum occasum is qui aurem doluit, circa vigesimam diem postea voce destitutus est, & dextrarum partium impotens. sine febre sudauit. dextra auris, dexter oculus, consistebat nõ valde, & attrahebat quid ex inferna parte. A sinistris autem distortus est oculus grauiter dolens. collum durum factum est, tertia hora posteaquã doluit.
- Post pleiadum occasum, seruus Attici à quartana correptus, stupidus sedatus est. Ahus eodem tempore vera stupida infania, ex phrenitide ac lethargo mixta, correptus est. Ad coxas & crura venit dolor, quieuit, quoto die haud scio.
- C** Eodem tempore horridi, vomentes, & post iudicationem cibum auersantes, & biliosi & splenes magni, duri, dolorosi, & sanguinis eruptiones. Quibusdam vero eodem tempore, post pleiadum occasum, ex naribus sanguis biliosus ob splenes. In Cranone vxorẽ Nicostrati correptã decimaquarta die, statim occupauit impotentia colli, & aliarum partium. & cibus inclusus fuit vsque ad decimã. Spiritus densus paruus. impotentia. palpans digitis. delirans. sudores. distracta sunt ad dexteram partem, collum, os, oculus, nasus. Vrinarum subsidencia alba, eruum referens. alia alba. alia ramentosa, cū pallore subuiridis, farinam lentium referens. Huic quandoq; velut adiposum quiddam superstabat, atque hoc aceruatum, non multum dispersum, velut quod in medio ipsarũ pendere solet. disparatũ. velut extrinsecus ex ouicula. postea vero etiã non

*Thersan-
dri uxor.*

*Metro-
phanti fili.*

*Attici ser-
uus.*

Nicostrati.

*Vrinarum
uarietas.*

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

non subsidens mingeatur. & alia quidem talis erat, alia sub-
 fidens. alia talis modice ad latitudinem dispersa. alia contur-
 bata. alia talis. Quod in medio vehi solet, nubecula subni-
 gra simile, quæ putaretur crassitudinem habere. Laxum autè
 aliud tenue. aliud tenue tale. aliud velut equi. aliud velut sùr
 caliginosa. Qui primus delatus est adolescens, huic vrina
 pura tenuis. Omnium secessus tenuis, multus sine bile. lin-
 guavalde aspera. Febris adurens. infomnis. aluus gibbosa. Hic
 mente motus est octaua arbitror die, proteruum in modum.
 exurgebat. pugnabat. turpia fortiter loquebatur, quum talis
 non esset. Huic quum vrinae multae tenues prodissent ex sup-
 pressionè, somnus obortus est continuus. & sudor, qui iudi-
 catorius esse putabatur, ex quo talis erat forte circa decimam
 diem. Verùm postea rursus infaniit, & breui mortuus est vnde-
 cima die. Occasionem fuisse puto quod meracum multum
 bibisset, priusquam insaniret. Paucos habebat annos, prope-
 modum viginti. Eumenis vxor autumno vomuit bilem a-
 tram. Sed & odores manifesti erant. & febres horridae. & cor-
 dis siue osculi ventris dolores. biliosa pauca vomebat, & lù-
 bricum. Secessus tenues per omne tēpus. Ante pleiadum oc-
 casum desinebant statim sanguinis eruptiones. & breuiiores
 erant febres ac statim reuertentes breuibz recidiuis. & ci-
 bum auerfantes, & velut excocti, & anxij, & cor dolentes, &
 ferini in iudicationibus, & rigore affecti. & biliosi. Adoles-
 cens peregrinus erat, cui tertia die sanguis ex naribus mul-
 tus fluxit. itemque quarta ac quinta. Sexta compositè confis-
 sebat. mente motus est. Septima die aluus substitit. soporo-
 sus erat. Recidiua tertia die. aluus eniti cessauit. Vrinam non
 vidi. Circa iudicationē velut debebat. At vero circa pleia-
 dum occasum austrina, & pluuiæ erant. & tunc Adolescens
 mucosa, subbiliosa, viscosa, multa recrementa egerebat. febris
 vehemens continua. lingua arida. Sexta iudicatus est. Septi-
 ma rursus inuasit, dimisit eadem die cum tremore. auris si-
 nistræ fluxio viscosa, crassa, die sexta. Puer ab vlcere Pha-
 gedæna eroso, dentes inferni, & ex supernis ac infernis ante-
 riores, emergebant, cavitatem habebant. Quibus os ex pa-
 lato discedit, his medius confidet nasus. Quibus vero super-
 ni dentes anteriores, his latus est summus nasus. Qui quin-
 tus dens ab anterioribus numeratur, quatuor radices ha-
 bet, sin-

Eumenis
 vxor.

Iuuenis
 alter.

Puer phae-
 gedæno-
 sus quid
 tulerit.

bet, singulis paribus ad vtrunque vicinum dentem connexis, extremitatibus omnibus ad internam partem reflexis.

Circa tertium dentē suppurationes plures quàm iuxta alios omnes. Et ex naribus fluxiones crassæ, & à temporibus dolores, ex hoc maxime fiunt. Corroditur hic, maxime quintus, ex medio quidem nodum habebat vnum, duos autē antèrius. Paruus primus intrinsecus iuxta duos corrodebatur. Septimus radieem vnā crassā, acutam habebat. Athenadz puero masculo doluit à sinistra parte infernus dens, à dextra supernus. Huius auris dextra suppurata est, dum non amplius doleret. Post pleiada clemens cœlum, nubilosum, & caligines. iudicationes quintanæ, & sextanæ ac septimanæ. Iam vero etiam diuturniores, febres recidiuantes, & quandoque erroneæ, & cibum auersantes, & biliosæ. & dysentericæ cibum fastidientes, febriculosæ. Circa pleiadum occasum, austrina fortiter erant. sanguinis eruptiones, & febres tertianæ naturam referentes, & lenes. Qui in fœtrina decumbebat, sanguinem abunde biliosum è naribus effudit. Secessus modicus iudicatus est septima cum rigore. Seruus in extrema caupona, quarta die sanguinem è narib⁹ effudit. multa statim nugabatur. aluus renitebatur. Præcordium dolorosum, durum. Ad subditam glandem sexta die subierunt mala, cū pallore viridia. Septima mane iactatio. clamor multus, venarum pulsationes circa vmbilicum. In acutissimis febribus pulsus densissimi, & maximi. Quale est, ad vesperam C exacerbari, tale erat in omni morbo. Cæterum ad principia, considerandæ sunt etiam exacerbationes, & an citius redeant, & continuitas, & anni tempus. Post pleiadum occasum, austrina. Quæ quinta die iudicabantur, intermissa vna repetebant. At vero laxa, pustulosa erant, velut Acanthio Lapyto. Circa pleiadum occasum, subscabra, & aspera erant pruriginosa, nullas lachrymas emittentia, & magis quidem hoc tempore. Sed & impetiginosa turgentia. Hæc erant in Pythodori vxore, & Capelio, cum febre, sub cuius initium ferè Pythodori vxori coxæ impotentēs. Post pleiadum occasum horrores. sanguinis è narib⁹ eruptiones. Sutor quidam septima iudicatus est, vna intermissa, altera rediit. Rursus quarta iudicatus est. Alius ex his qui à Leocyde venerant, septima iudicatus est. Alius quarta. Moschus nona. Largus

Puer alter

Quæ pateretur nā

Quæ consideranda.

Acanthio Lapyto.

Pythodorus.

Sutor Glaucius nomine. Moschus.

HIPPOCRATIS LIBER III.

Tuberculum auris. Largus sanguis ex sinistra, modicus è dextra nare. Ad decimam quartam ad iudicationem, si quatenus debebant ab initio exacerbarentur. Delinquentes circa edulia decima septima fiebant. Circa autem in dextra parte tuberculum, paruum intus durum, foris paruum laxum, dolorosum, nihil remittens, decima nona noctu factum est. Valde biliosis suppuratis, purgatio sepiæ atramento maxime similis. Qui cucurbitam affixit, quæ in coxâ esset dolor, huic ad crus dorsum venit, & melius habuit. Qui in Ceramico ab equo lapsus est, cui non statim cucurbita affixa est: vltus est intro, & vigesima die recrudit malum. sanguinis eruptiones feculentæ, & erodentes. Tenedia quarta die abortiuit, masculum triginta dierum. alius liquida, tenuia, egressit. lingua combusta fuit. iudicatio quarta die. Post pleiadum occasum lienosa, vsque ad quintum diem fluebant, iudicata sunt.

Equo lapsus quid tulerit. Cuidam septima die vrina velut crui lotura, similis ipsa sibi ipsi. postea pura recidiua. Intermissit etiam Megaris filio, verum sanguis non fluxit. Vrina velut Antigenis alba, crassa, similis. Circa solstitium hybernum, sydus non paruum,

Terræmotus. quinta & sexta postea terræ motus. Quæ in Perintho morabatur anhelosa, Antigenis vxor, quæ non sciebat an prægnans esset, menses comparentes rubri. Venter aliàs atque aliàs paruus, aliàs magnus. Tussiens semper, velut si celerius iter perfecisset. Mensis erat octauus, sedata est prius febricitans.


Antigenis vxor. Apemanti fratris vxor, septima die abortiuit foetellam velut dixit sexaginta dierum. Circa nonam turbata est post iudicationem, dexteras partes dolebat, velut à recidiua. Hæc & concipiebat cito, & perdebat. Alia quædam in albis mensibus filiam peperit. Alia in rubris, velut conueniebat. Horridi, anxij, cibum auersantes, recidiuantes, biliosi, sanguine manantes, subsplenici, doloroso modo plurimi ex sinistris affecti. Apemanti vxori hac parte oculus distortus est dexter, ad alteram vero partem lateris mollitudo. Aristophotis filia tertia & quinta febricitauit. sicca plerunque peruerat. Venter tamen huic turbatus. ægre iudicatio nebat. vltra triginta dies cessauit. Pustulæ ex lassitudinibus non valde fortibus, perueniunt ad septimam liuidæ. Rigor ancillæ retro Heroum abortus est. At vero albæ magnæ, neque ipsæ valde bonæ, grati sopore pressorum, & somnulentorum,

A torum, & non confidentiū, & bile renitente : & siue lubrica, siue dura fuerit aluus, non confidentes. Zoili fabri pulsus tremuli tardi, Vrina & alui secessus moderate decolor. pectinis distentio vtrique in directum, vsque ad vmbilicum, cum febre acuta. cibum auersans. fisticulosus. Filia edilis apud Tecomæum, quum obscurum esset ipsi quod vterum gestaret, secundi mensis initio erupit vomitus pituitosus, aliquando vero biliosus, difficulter peperit, perfecte purgata est. Vomitus similiter vsque ad trigessimam diem perseuerauit. postea venter turbatus est, & vomitus cessauit. Lienteria. menses non prodibant per duos annos hyeme habuit hæmorrhoidas. Duo fratres Cecropis familiares, quibus nigra ab initio prodibant, subfeculenta, edulia ex sanguine confecta colore referentia, ea ex spumosis bile abunde coloratis viridia erant. Qui asinum ex pacto eleuauit, statim fabricitauit. Tertia & quarta, & quinta, & septima, & octaua sanguis erupit. iudicatus est. aluus lubrica. Vir metallicus. præcordium dextrum intentum, splen magnus. aluus intenta, subdura. spirituosus. decolor. Huic ad genu sinistrum. recidiua. per totum iudicatus est. Temenæ filius habebat quid spiritus, vt viridantis palloris esset, ad dorsum : ad manus viridantis palloris. Maritus Lechus puerperæ apud Sitodochum, arquato morbo infestatus, ad quem septima die ingressus sum, octaua moriebatur, neque mingens, neque egerens. Præcordia magna & dura, & spiritus densus. Hic moriens ne frontem quidem sudore humectauit præ dolore. Huius vxor eiecit scæmellam septimestrem, septima die. Apparuit autem quarta die. Hanc à principio quidem pedum dolor tenebat. Desinente vero febre spiritus non est solutus, sed intus relictus. dolor ad manus & brachium. Recidiua per longissimum tempus corripuit eos quibus vrinae ante iudicationem suppressæ fuerant. Quæ erat apud Temenæ ipsius soror, cum rigore iudicata est. Quum autem viridans pallor cito desineret, manus & humeri doluerunt : horum autem cessante dolore, caput : oculorum palpebræ supernæ eleuatae sunt, & lachrymæ profluebant. reliqua non noui. Iudicata est primum septima die. Menandri vinitor similiter, verum aluus ab initio tenuia egerebat. postea suppressa est, itemque vrina iudicata est, non riguit, septima die : quoniam

Zoilus.

Tecomæ.

Cecrops.

Temenæ
filius.

Menander

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

*Potamonis filius.
Hegesistratus.*

niam alius antea turbata fuit. Potamonis filio alius non egerebat septima die. duobus diebus ante iudicationem non riguit, quapropter neque urina supprimebatur. Dens Hegesistratio, cui suppuratio iuxta oculum, suppuratus est iuxta extremum. & rursus sanatus est oculus. & secundum nares pus descendit crassum. Iuxta gingivam caruncula parva rotunda abscesserunt. Huic circa tertiam diem suppuratio affutura putabatur. postea auertebatur. Derepente vero intumuit maxilla, & oculi. Quibus abscessus ad oculos in febris ardentibus, hi maxillas rubent, & sanguinem ex naribus fundunt. Sed & quibus ad aures fiunt. Fortassis autem & abscessus ad articulos magis, non tamen clare novum. Rigores tremulis, praecordii intentio. Menses apparuerunt decima septima, iudicatio fiebat ita perpetuo. Si tamen non sic intus permanissent, iudicabantur tertia. quaedam quinta. quaedam septima. Hegesistratio postremi duo dentes parte inter se contigua corrodiebantur. postremus habebat supra gingivam duos nodos, unum iuxta cavernam, alterum ex altera parte. Qua vero parte duo nodi erant, ibi radices latae similes singulis paribus coincidebant, ad alteram partem medietas una rotunda. Mulier cui sanguis e naribus erupit quarta & sexta. Septima iudicata est, rubicunda erat. Mulieri ex capite fortiter grauatam, iudicatio facta est circa vigesimam. Vigesima praecordia aestuosa. Septima die non valde sanguis e naribus erupit. Secessus tenues. ad oculum dextrum circa octavam. Viro eadem, verum septima iudicatus est. Sublienofus e sinistra parte. Huic octogesima die, & diuturniores oculi affectiones: fortassis quoniam post iudicationem, & quia multae. Vxor Temenae spirituosa praecordia, & intenta. Menses per tempus apparuerunt. An vero etiam praegnans fuerit, haud scio. alius primum suppressa, & tunc vomebat. postea non amplius. alius enim multa viscosa ac biliosa egerebat. praecordium non impediabat. Undecima ad magnum dextrae digitum inflammatio. alui egestio etiam penitus procedebat. Quibus contingentibus, melius habebat. Nam & in somnum delatio minor erat, & febris: & quodammodo facilius spirabat, quoniam supra malum vomitum, vomuerat. Decima sexta sensim factus est spiritus densus, & febris. mortua est.

*Mulierum
diversi
morbi.*

*Temenae
uxor.*

- A** Hæc febricitauit ante abscessum. Septima post abscessum periit. Erat & hæc rubicunda. Filius mulieris ipsius Apemanti sororis, præcordia magna & splen, spiritus, secessus amaræ bilis, aliquantulo stercore ammixto, lassus ex operibus. Vigesima die ad pedes, & iudicatio certe lassus ad articulos, non ad oculum. præcordia vero erant intenta. & sanè erat etiam tussicula quædam modice sicca. Quæ relinquuntur post iudicationem recidiuam faciunt. & in ipsis morbis quæ excernuntur, sputum præmaturum, alui secessus, intemperies, & similia. Apemantus cui dolores in sede, in dextri lateris mollitudine, & iuxta umbilicum paulo inferius, & è dextra parte: ante dolorem vrinam cruentam mingebat. desitit tertia die. Et faber in altera parte, ex eadem in directum, & hic quoque vrinam cruentam eiecibat. Quæ ubi cessasset, ambo subsidentias in vrinis habebat, & hoc tertia die. Apemantus autem plurimum fouebatur. Alter vero nõ sentiebat, nisi in dextra parte. Et Nicosttrato accidit aliquid iuxta vltimas partes à dextris, inferius quàm quibus in sinistris. longe vero subter lateris mollitudinem, vsque ad umbilicum vtriusque. Anicula apud Sosileū alba pituita referta: Tibiæ duris tumoribus, albis, laxis, itèque pedes, verum minus. Erant autem & in partibus infra femora, etiam si plerisque difficilis huc exitus patet: immo & in lumbis. & venter tenuis erat, præcordia submollia, spirituosâ non valde. Erat autem desinentibus plurimis, etiam alia cura ubi glauci facti erant oculi. Atque oculorum quidem cura paulo moderatior erat. Coxæ vero ac cruris affectiones vterinæ erant, quum dolores esse putarentur. Apposito enim ac subdititio medicamento odorato, ex farina & vnguento, cõtiguit vt breui discuterentur ac desinerent. Tèpus autem abscessus ad oculum, annus. Circumcirca durus fuit, cui etiam pustulæ non perfecte contabuerunt. Sunt autè & à disquamatis talia. Seruus in Hippolochi villa, cui in præcordiis vtrinque; quid collectum erat durum, & fulgorem aliquantulū habens inferne, qualis erat in fabri ferrarij vxore hydropica: Cui tenuia recrementa progressa partem aliquā euacuauerunt. Erat autem & hoc ipsum ad dextrum planum quiddā, supra ea quæ circumferentiam habent eleuatū. Huic umbilicus ex natiuitate denigratus erat, & vlcus pro-

*Apemanti
sororis fili-
us.*

Apemantus

*Vrina cruen-
ta.*

Nicosttrato

Anus.

*Hippolochi
villæ.*

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

fundum fiebat, & vmbilicus non valde cicatricem contrahebat. & pudendum summa parte denudatum erat, quum non statim tale fuisset, neq; cōnatū, & adhuc magis fiebat. Hic plurimum vomebat. febris. cibi fastidium. sanatus est. Verum circa septimam à decubitu diem (nam & antea ægrotarat) aquā multam bibens, & fortassis aliter contemnens, iactabatur & aliquantulum conuellebatur. Desinente autē conuulsione, circa animaduersionem extinctus est. Ante hoc vero vrinam acruatam minxit, & status cum crepitu prodierunt. & supernæ partes minime sunt euacuatae. Quum autem mortuus esset, statim etiam & illæ fortiter emollitæ sunt, & reliquæ rubefactæ sunt, velut à flagris per totam corpus, excepta ea parte vbi tumor ille maxime eleuatus erat. & multū quoque calidus erat. Cuidam vero in Abderis deorsum erupit. Cuidam autem anteriore parte intumescere sine febre. Tumor ad contactum suppurato similis erat. Famulæ anhelosæ, quum vasa menstruum sanguinem funderent, anhelationes illæ cessabant: febris fiebat. mamma sinistra superne suppurata est. & ab initio etiam auris. Olympiodori famulæ sanguis ex sinistra nare, & iudicata est ad vigesimam, quemadmodum etiam febricitantibus. & secessus quales etiam æstate populariter grassati sunt, & quales Hipponactis. Hyle famula Aristidis, octaua die in pharmacorū purgatione, inferne signa habuit, qualia facile ferunt. & si non præter rationem debilitantur, & neque spumosa, neque subfanguinolenta, sed qualia sunt oua, velut Heraclidæ vxor purgata est multum, & facile tulit. Quæ in Bulagoræ villa depurgata erat, cœpit febricitare ex splene. (Qui vero dextrum præcordium habent, non quidem sublime, verum intentum, hi etiam magis rubicundi sunt) rubicunda quum esset, aluum in principio turbatam habuit. expectabam ad oculum decubitum. Huic septima die saluginosa lachryma mordax ex oculis prodiit, & secundum nasum, & fauces, & aurem sinistram. Decima quinta sudauit cum rigore. non iudicabatur ante rigorem, pallida facta est valde. & faciei circumtensio ac contractio. Aurē è directo splenis ac lateris dolebat. Pueris ventres turbati, & tussis sicca: quandoque ad humerum suppuratio fiebat in tussibus, posterioribus diebus. Fullo collum, caput. septima manus torpida. Nona crur

Famula
anhelosa.

Olympio-
dorus.

Hyle an-
cilla.

Heraclidæ
uxor.
Bulagoræ
villa.

Lachryma
falsa.

Puerorum
uitæ.

Fullo qd
tulit.

Acrus torpidum. tussis cessauit. Cui maxilla distracta fuit, in quinto mense in ventre distracta erat ad sinistram partem.

In Cranone Lycino Grammarico, ex febre biliosa ex splene, capitis grauitas. stridebat secundum pulmonem. in labiis utrisque vlcera, intus rotunda, parua. postea etiam sanguinis quid ex nare è directo manauit. Famulae quam recens emptam vidi, cui duricies in dextris erat magna, non valde dolorosa. & venter magnus ac circumtensus. non similis hydropticæ, & aliàs pinguis ac mollis. & non valde difficulter spirans, verum decolor. Menses septem annis non prodierant. facta est dysenteria, & non tenesmo tentata. Et sub hæc duricies in dextra dolorosa erat. & febres tenues. & non vltra septem dies etiam aluus turbata est, secessus electrum referens, subuiscosus, muſtus ad aliquot dies. Sanata est. & menses postea prodierunt. & partes secundum ventrem molles fiebant.

B & corpus boni coloris ac crassum ipsi erat. Minois vxor ex sectione, pressa ab eam administrantibus durius, marcorum ac corruptionem incidit, malo ad pulmonem deueniente, breui significationem de se dedit quotquot diebus supererat. erat & aliud quiddam intrinsecus. Quæ induitur in nares si febricitarint, si quidem solutus fuerit dolor, crassa per nares effluunt. Si vero neque dolor, neque febris, tenuia: & fortassis feruida: Veluti tenue quidem Hegesippo, quum ad noctem quid indidisset. Crassum vero illi in Corintho eunucho simili, Celeuris filio erat. Maturi in morbis abscessus an iudicent, signum est, si dum feruida sunt mala, non febricitarint: & dum molesta sunt, facile portarint: Velut quæ in sede acciderunt Charoni. Leambio vero quum intestinum vlcerosum esse putaretur. in dysenteria pharmacis curato, humerus & sedes vlcerata sunt in sinistra parte, citra febrem.

C Cui à flatibus laterum mollitudo eleuabatur, & aliquantulum dolebat, huic quum lac vberius & meracius bibisset, & insuper dormiisset, statim nausea & calor accedebat. Deinde ignem incendenti, & pro cibis farinam crassiorem in craticula coctam comedenti, aluus substitit. & purulentum tamen quiddam egressit. Quum autem sedes esset inflamata, sine febre & sine dolore sufficienter erat. hoc assero. Senex in lapideis vestibulis, lumbos doluit, & ambo crura, & utriusque dolores descendebat ad femora, & quandoque tibias, & aliquando ad

*Lycinus
Grammaticus.
Famula
quedam.*

*Minois
uxor.*

*Hegesippus.
Celeuris
filius.*

*Charon.
Leambius*

Senis morbus.

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

*Que ob-
seruentur.*

genua. & quum diutissime durarent, recursiones multæ fie-
bant. tumor in pedib⁹, lumbis, tibia. breues inguinum tumo-
res. venter durus. & totus pecten intensus ac dolorosus. Ple-
runque compertus est etiam vesicam durā habere ac doloro-
sam. & papularum eruptiones, & calores oculis, auribus, nari-
bus, manu. Iudicationes, & alia per quæ cognoscimus de ipso
ægro, an sudet, aut tangat, aut aliquid olfecerit, aut gustaue-
rit, itemque alia cognoscuntur. Pili, color, cutis, venæ, nervi,
musculi, carnes, ossa, medulla, cerebrum, & à sanguine viscera,
veter, bilis, alij humores, articuli. & postea an doluerit iux-
ta aurem, iuxta ipsam collectum tuberculum, glandulā non
attingens, os non suppurans, & hoc disparuit. & tunc statim
febricitauit. Pulsus, tremores, cōuulsiones, singultus, circum-
spiratio, secessus, per quæ cognoscimus. Suppuratis ocu-
lis, & dum erumpunt, vlcera magna fiunt, & dum secantur,

Aristeas.

profunda. & vtroque modo oculi vlcerantur. Aristeas ex
pago Amphilocho quarta die mente motus est. alius subui-
ridia egerebat. & somni salubres. albicantis coloris. Qui-
busdam ab initio subteremuli digiti, & labia vbi loqueren-
tur, itidemque aliæ partes: & proterue lingua citiore ac vo-
lubiliore præditis his rubor in facie maxime erat. Hi ebriosi
erant, aut vomitu commodè vsi intumescabant. Qui iuxta
Medosadæ ædes habitabat, cui tenuia, nō biliosa, aquosa, mul-
ta, per secessum prodibāt. præcordium cedens & gibbosum.
soporosus fiebat. Circa decimāquartā ad iudicationem ma-
xime progressio, rigor sine tremore. dissolutio. resolutio. con-
tractio secessus & egestionis. soporosus. mēte motus. ex som-
no non insaniit. iudicatus est circa decimāquartā. nihil è iu-
dicantibus contrarium. Alius similiter in principis seces-
sus subuiscosi, ex quibus quod crassum est iudicatorium est.
insomnis. postea subuiscosi, subbiliosi, maturi, biliosi, non te-
nues: qui vbi compacti fieri cōpissent. iudicationes celeres.
Præcordium intentū apparuit inflammati, aut venarum in-
tentarū modo, circa sextā. Postea dormiuit septima. iudica-
tus est circa nonā. albicantis coloris ambo, non fului. Quum
secessus aquosi sub dio expositi essent, superne leues, tenues,
isatidi valde similes fuerūt: inferne vero subsidetiā habebāt.

Quibus in dextris distentio submollis, phrenitici sunt: si
nō soluatur febre desinēte. Quibus autē à mollitudine vē-
tris in

Aris in hac ipsa febre, quiddam collectum aut durum, dolorosum fit, & valde malignum diffundi non potest, ex talibus for-
tassis suppurantur. In dextris tumores eleuati, si quidem si
quis plurimum ac maxime premat, submutmurarint, non val-
de maligni putandi sunt. Velut in dextris illi qui ex Amphi-
lochi pago erat, & ei qui iuxta Medosadæ ædes habitabat. Hi
soporosi erant, & in somnis mente moti. Constitutiones
quales in quibus temporibus ac regionibus magis & minus
sunt. Vigores morborum, & ad iudicationem, & quotidie. &
an citius fiant aut serius, tertia, quarta, circuitu. & in quibus
circuitibus iudicantia, tumētia, cruenta, & non. Quibus ab-
scēsisbus recidiuæ fiant, venę temporum, & contractiones, &
colorum mutationes ante iudicationes, ex rubro ad viridem

B ac pallidum, si non iudicent. & cutis circumtensionēs absque
iudicatione. & oculorum contractio, corporis duritia sicca.
Qui quidem volentes lachrymantur, non malum est. Quibus
autem inuitis lachrymę profluunt, malum. Quibus in den-
tibus circumcirca viscosa sunt, malum est subhiare ac fixis o-
culis intendere. Qui in tibia vlcus habebat, & Attico vsus
est, huic pustulæ eleuatæ, rubræ magnæ; atque hoc pro tussi
quæ postea accessit, prius enim nō tussit. In Aeno quicun-
que capite vulnerati horridi erāt, maligni & suppurati ex te-
nesmo, ex peregrinatione ac itinere dolor pedum, & in tur-
bationibus lassitudines. Clinia cibū auersans, colliquescēs,
purulentum, aliquando parum cruentum, purulentum tumi-
dum eiecit.

C Hippeæ vxor hydropica, quæ etiam, per tres
annos vere incipiēte tussit, amplius autem suppurata est. ad
hyemem aquosa facta est, ab illis autē pharmacis curata me-
lius habuit. Mortua est ancilla. Ex tussitibus qui manibus
laborabant, velut seruus ille qui sarmenta obtorquebat, & A-
myntæ filius, ambo sola dextera resoluti cessauerunt, quando-
quidem perpeffi sunt hoc tussientes. Qui vero aut equitarūt,
aut iter fecerunt, in lumbis ac femoribus resoluti sunt. Pla-
rimæ vero tusses siccæ erant; Sin minus, violentæ sanē.

*Hippeæ
uxor.*

*Qui tussit
manus agi-
tent.*

*Vxor Em-
myris.*

Vxor Emmyris modo non morboſo, absque febre, stupi-
da esse videbatur. postea ad tremorem totius corporis res ip-
si deuenit, & ad colliquationem, & cibi fastidium ac sitim,
& frigida erat. Nyctalopes qui plurimam minxissent postea
parum quiddam mingeabant. Verum tussientes & insuper

*Nyctalo-
pes.*

X iij febrien-

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

*Emmyris
filia.*

febrientes tubercula ad aures habebant, erumpētia circa se-
primam aut octauam diem. Emmyris filia febricitabat, &
ex aure purulentum fluebat, circa octauam, aut pro comper-
to habeo. Quibusdam vero etiā dens corrosus fuit, tertius
maxime ex supernis. Præ omnibus autem hic reperitur corro-
sus ad hunc dolor, & quibusdam etiam circumsuppuratio.

Quibus vero ad aures, hi magis tussiebant quā illi. Qui-
bus autem cum febribus ad suppurationem, septima recedit.

Cuidam postquam exacerbatus fuit, præcordium solutum
non est. alio autem emollita, inerant pauca subuiscosa, compa-
cta, non bona vrina cruenti coloris. spuebat autem sputum
spumofum. Ille ad quem Cynicus me induxit, septima exa-
cerbatus est. circa decimam quartam iudicatus est. Disparen-
tia mala sunt. purus fauces. pauca, lata, matura expuens. ex na-
ribus parū sanguinis stillauit. capite grauatus erat. Manuum
ac pedum dissolutio. aluus soluta profuit. pedes semper cali-
di. somni aderant ipsi, & iuxta aurem non extuberabat, quo-
niam matura spuisset.

*Demarati
coniux.*

*Senex cū
uxore.*

Demarati vxor, pedes etiam in hor-
roribus callidi: siue ad suppurationem, siue non tendebat, pe-
riit. Senex qui è vita decessit, ægrotabat simul cum vxore
sua, furiosum quiddam in se habebat. Postea vero vbi prodiis-
set, ab ipso lumbicus subcrassus, & modicus cibus, statim se-
datus, & dormiuit, & sanus erat hic senex, & corporis cutis
circumtentio. extreme partes frigida, mollis, tremulus ab ini-
tio & labiis, & manibus, & voce. mente motus est, moderate
hiabat, ac fixis oculis intendebat. non valde difficulter spirā-
bat. diebus haud scio quot ultra viginti mortuus est. Qui-
busdam præcordia & aluus subegesserunt compressa, acrua-
tim, non cum murmuratione, velut in Abderis vermium spe-
ciem præ se ferentia. Quicquid contingit priore iudica-
torios dies præcedēte die, & mala & bona signa fiunt in die-
bus, quibus qui exacerbātur diuturniores fiunt: & quibus de-
sinentes remorantur. Quædam non fideliter alleuabant, &
quædam per se ipsa exacerbabantur. Sputa peripneumoni-
cis quibusdam biliosa, quum desinere volunt. Valde flaua bre-
uia fiunt. Si qualia sunt quæ in principiis adsunt, talia postea
appareant, hæc non valde concoqui puto: sed iudicare velut
ei qui apud præceptorem erat, & velut aliis quoque vidi.

Nicippus.

Nicippus in febribus per somnum semen effudit: & nihil
ad peius

Ad adpeius processit. & hoc ipsum sæpe ipsi factum est, & nihil læsit. Prædictum est ipsi id desitutum, postquam febres iudicatæ forent, & sic factum est. Critias in febribus ab insomniis vexabatur quæ nouimus, & cessauit etiam ipse eadem somnare vnâ cum iudicatione. Alcippus quum haberet hæmorrhoidas, à curatione prohibebatur. Curatus insaniit. febre acuta succedente cessauit. In febribus acutis siticulosi, à medicis potu interdicto, aut etiam à seipsis abstinētes, multū sibi bibere posse videntur: his aqua frigida data vt reuomāt, prodest. Biliofa enim aderunt. Quod nervi ipsi in seipsos trahunt, signum est. Si quidem enim nervi in supernis manus sauciati fuerint, manus deorsum nutabit. dum ab infernis nervis trahitur. Si vero contrā, vice versa. Tussient siccam tussim, qui testes affectos habēt. & ex tussi vena secta, ad testem solutio fit, & inflammati tussiuunt. & in febribus ex inguinum tumoribus insuper tussiuunt.


HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS POPVLARI-

bus, Liber. V. Iano Cor-

nario medico physi-

co interprete.

C  N Helide Olitoris vxor. febris Olitoris vxor. corripuit ipsam acuta. & medicamenta bibēs nihil sentiebat opis. In ventre infra vmbilicum erat quid durū, & altius altero, & dolores exhibebat fortes. Huc enim manibus cum oleo fortiter compressum ac emollitum est. & postea sanguis frequens ipsi deorsum processit, & sanata est, & vixit.

In Helide Timocrates amplius bibit. Insaniens autē ab atra bile, bibit pharmacū. hic purgatus est. pugatio multam pituitā ac bilem atrā egerebat per diem. & ad vesperā purgatio cessauit, & dolorem pertulit in purgatione multum. & quum polentam

HIPPOCRATIS LIBER V.

potentia bibisset, somnus ipsum corripuit, & tenuit per noctē,
 donec sol oriretur. In somno autē præsensibus nihil respira-
 re videbatur, sed mortuus esse. & neq; quid diceretur, neq;
 quid fieret, sentiebat. Extentū autem fuit corpus & rigidum.
Scomphus Verū viuebat, & excitatus est. Scōphus in Oeniadis pleu-
 ritide correptus, mortuus est septima delirus. Pharmacum au-
 tem bibit infra purgās. priore ante potionē die mentis cōpos
 erat, & purgatus est non multū. quum autē purgaretur, deli-
 ravit. *Phœnix*. Phœnici in Oeniadis & Andræa fratribus maxilla al-
 tera intumuit, & labium quod est ante maxillā & oculum. &
 neq; intrinsecus quicquā spectārī apparebat, neq; forinsecus
 suppurabat. Sed tumens arida putredine putrescebat. Et alter
 eadem perpeffus est. Mortuus est autem alter septima die, &
 pharmacū bibit, & nihil profuit. Verum Phœnici circulus pu-
 tridus exsectus est. & vlcus purgatum est magna ex parte pri-
 usquā moreretur. Mortuus est autē & hic, vbi diutius vixisset.
Euridam. Euridamus in Oeniadis, in peripneumonia decima die in-
 cœpit delirare. curatus ad mentem rediit, & sputa erant pu-
 riora, & morbus ad melius procedebat, & somno multo per-
 fusus est. & oculi morbum regium contrahebant. & mortuus
 est ad viginti dies. In Oeniadis vir quidā morbo teneba-
 tur, quum sine cibo esset, fortiter in ventre ipsius fugebat, &
 dolebat. & quum edisset ac cibi cōtriti essent, tempusq; post
 cibi esum accessisset, non longe postea idem hoc patiebatur.
 & tabescebat corpus ac consumebatur. & alimentum ipsi nō
 contingebat à ciborum esu. & per alium secedebat cibus præ-
 uis & cōbustus. Quum verō recens cibum accepisset, eo ipso
 tempore minime fugebat, neque dolor aderat. Hic omnis ge-
 neris pharmaca bibens sursum ac deorsum purgantia, nihil
 opis sentiebat. Vbi vero vena ipsi secta esset, in vtraq; manu,
 donec exanguis redderetur, postea utilitatē percepit, & à ma-
 lo liberatus est. *Eupolem*. Eupolemus in Oeniadis, dolebat coxā dexte-
 ram, & inguē, & cōmissuram propinquā ad coxā, ab inguine
 & coxa in anteriore parte. Huic sanguis detractus est à talo,
 multus valde, & niger, ac crassus. & pharmacum bibit alium
 deorsum purgās, & multum purgatus est. & melius quidē ha-
 bebat, dolores autē non remittebāt. Sed suppuratā habebat,
 & coxā, & commissurā in ipsa ad sedē, & partem circa inguē,
 quibus locis etiā amplius dolebat. Pus autem ad os magis fie-
 bat,

A bat, quàm ad carnē, in profundo, & per tempus sic habēs negligebat, donec valde debilis fiebat. postea crustę ipsi inuistę sunt, valde multę & magnę. ac inter se propinquę. & pus effluxit multū ac crassum. & mortuus est postea paucis diebus, tum prę magnitudine ac multitudine vicerū, tum ex corporis debilitate. Huic si vna ampla sectio incisa fuisset, & per sectionē pus emissum esset, & si opus fuisset, etiā altera sectio facta esset: Hęc sanē in tēpore si facta fuissent, mihi quidē videtur quòd sanatus esset. *Lycon* in Oeniadis, reliqua quidē eadē patiebatur, Verū dolores etiā ad crus non ita valde progrediebātur, & nō factus est suppuratus, sed sanus multo tēpore. Bibebat autē pharmaca. & cucurbitas adhibebat.

B & venam secabat. Atque his factis melius habere videbatur.

Homo quidā Athenis prurigine toto corpore vexabatur, maxime autē testibus ac frōte, vexabatur autem valde vehementer. & cutis crassa erat per totū corpus, & velut lepra aspersa, & ex nulla parte cutē apprehendere potuisset, prę crassitudine. Huic nemo opirulari potuit. Transgressus autē ad melos, ubi sunt calidę balneę, à pruritu quidē & cutis crassitudine liberatus est, verū hydropicus factus mortuus est. *Atheniensis quidā.*

Athenis virum cholera corripuit, vomebātque & deorsum egerabat, & dolebat: & neq; vomitus, neque per aluum secessus, fisti poterat, & vox ipsum destituebat: & ex lecto moueri non poterat: & oculi caliginosi ac caui erāt, & cōuulsiones tenebant ab aluo, & intestino, & singultus. Verū secessus multo copiosior erat q̃ vomitus. Hic veratrū in lentium succo bibit, & alterum lētium succum insuper bibit, quātum potuit, & postea vomuit, & coacta sunt ac adstricta ipsi ambo. frigidus autem factus est. & lauabat inferne vsque ad pudenda, calida valde multa, donec etiam supernę partes calefactę sunt. & viuebat. postera vero die, polentam bibit ex aqua. *Melos insula.*

C alterum lētium succum insuper bibit, quātum potuit, & postea vomuit, & coacta sunt ac adstricta ipsi ambo. frigidus autem factus est. & lauabat inferne vsque ad pudenda, calida valde multa, donec etiam supernę partes calefactę sunt. & viuebat. postera vero die, polentam bibit ex aqua. *Atheniensis alter.*

In Larisī Gorgię menses suppressi erant per annos quatuor, pręter valde modicos. Verum in vtero, ad quācunq; partem se inclinasset, pulsus exhibebant ac grauitatem. Hęc mulier concepit & peperit, & puella viua nono mense edita est, vlcus habens in coxa. & secundę consequentes, ac sanguinis fluxus valde multus, successerunt. postē die, & tertia die, ac quarta, etiam grumi sanguinis concreti. & febris tenebat vsque ad decem primos dies. & de cætero prodiit ipsi sanguis ruber, & fa-

Lycon.

Atheniensis quidā.

Melos insula.

Atheniensis alter.

Gorgię coniunx.

Partus eū u'cere in coxendice nono mēse editus.

& fa-

HIPPOCRATIS LIBER V.

& facies fortiter intumefcebat, itemque tibiæ, ac pedes am-
 bo, & alterum femur. & cibos non admittebat. Sicim autem
 habebat vehementem, & frigidissima aqua conferebat. Vi-
 num autem nequaquam. At venter post primum puerum mo-
 dice emollitus est, valde autem non confidit, sed durior erat.
 dolor autem non aderat. Quadragesima vero die à prima su-
 perfoetatio excidit, caruncula quædam. & venter confidit om-
 nesque tumores. & fluxio tenuis, ac sanguis olens prodit,
 & sana euasit. Mulier in Pheris caput circûcirca dolebat
 multo tempore, & nemo poterat illi quicquam opis confer-
 re, neque dum caput purgaretur. Melius autem habebat, quû
 menses ipsi facile prodibant. Hæc quû caput doleret, ex sub-
 dititiis odoratis ad vterum apposis opem sentiebat, & mo-
 dice depurgata est. & quum concepisset, dolores caput relin-
 quebât. Mulier in Larissa prægnans erat. Huic decimo mē
 se sanguis prodit multus per quatuordecim dies. Plurimus
 autem tribus diebus ante pueri editionem. Decimaquarta
 excidit ex vtero puer mortuus, habens dextrum brachium
 lateri adnatum. & tertia die noctu eadē hora qua puer, pro-
 diit secunda, & purgamenta alba. deinde post hæc per tres
 dies ac noctes multa moderate prodierûnt. Postea febris cor-
 ripuit, per duos dies totidemque noctes. & dolebat omnem
 ventrem, & coxas, maxime vero pectinem. In Larissa Hip-
 posthenes peripneumonia apprehensus esse medicis videba-
 tur, erat autem nequaquam. Verum principio lucians in du-
 ro loco cecidit supinus, aduersario ipsi illapso, & lauratus est
 frigida, & cœnauit, & grauior factus esse sibi videbatur. Se-
 quēti autem febricitauit, & tussis apprehendit siccior, & spi-
 ritus densus. Quinta die cruentum excreauit, non multum.
 & delirare incipiebat. Quando tussiebat, dolebat pectus &
 dorsum. Sexta autem vbi sternutasset, sanguis fluxit è nari-
 bus, quatuor heminarum mensura. Ad vespērā neque loque-
 batur, neque sentiebat, neque quid fieret, neque quid dice-
 retur. Vndecima mortuus est. Per quinque vero dies, modo
 sapiens erat, modo non. Erat & sine febre. Spiritum autē nul-
 lum recipiebat, neque stertorem habebat. Non enim erat spu-
 tum. Scamandrus in Larissa, & in coxa marcorem habuit,
 & in osse diu disparato. Ipse vero sectus est sectione magna,
 etiā ad os ipsum, & postea vstus est & tunc die duodecima
 post

Pheræ.

*Mulier
Larissæ
decimo mē
se abortit.*

*Hippost-
henes.*

*Scamand-
drus.*

A post sectionem cœpit conuulſio, & valde obrinuit. conuulſebatur autem crus hoc vſque ad coſtas, & ad aliam quoq; partem cœuulſio progrediebatur. ſectebatur autem crus, & extendebatur: & alia membra mouebat. & maxillæ compactæ riguerunt. Hic mortuus eſt cœuulſus octaua die poſt cœuulſionis inuaſionem. Curabatur autem tepeſactoris vtriculis, & fomentis erui, per totum corpus. & inſuſum per clyſterem immiſſum eſt, & tunc modicum ſtercoris prodiit. & pharmacum bilem abunde purgans bibit, ac inſuper catapotium deglutiuit, & ſeceſſit quidem, nihil autem à catapodio opis ſenſit. & ſomnus modicus venit. & rurfus pharmacum idem forte ad vesperam bibit, ac ſole emergente mortuus eſt. Videba-

B tur autem multo tempore morbuſſe potuiſſe, niſi ex phar maci vi periſſet. Equiſo Palamedis in Lariffa vndecim annorum, percuſſus eſt in frontem ſupra oculum dextrum, ab equo: & videbatur os nō ſanum eſſe, & exiliebat ex ipſo modicus ſanguis, & ſectus eſt ſectione magna vſque ad ſecundā laminam, & curabatur ſic habens ipſum os, quod etiam antea ſtatim os peperit. Vigefima tumor cœpit circa aurem, & febris & rigor. & in die magis intumeſcebat ac dolebat tumor. & ab initio febricitauit ex rigore. & oculi intumuerunt, & froas, & tota facies. Patiebatur autem hæc in dextra magis capitis parte. Progreſſus eſt autem tumor etiam ad ſiniſtram. nihil tamen hic læſit. Demum febris continua corripiebat. Atque hæc minora erant, vſque ad octauam diem. Vixit autē

*Palamedis
equiſo.*

C vſtus, & per catapotium purgat⁹, & cataplaſmate tumori im poſito. At vero vlcus nullius mali cauſa erat. In Lariffa Theophorbi filius veſicam ſcabioſam habebat, & viſcoſam vrinam mingebat. & dolebat dum & inciperet mingere, & dum deſineret. & confricabat pudendum. Hic quum biſſet pharmacum vrinam ciens acre, in veſicam quidem nihil proceſſit, verum multum purulentum & bilē euomuit, & deorſum alia huiuſcemodi egerebat. & ventrem dolebat, & intrin ſecus ardebat. Reliquum vero corpus frigidum erat, & totus reſolutus eſt. & nihil aſſumere volebat. Huic exulceratus eſt venter fortiter valde, à vi medicamenti, & mortuus eſt tertia poſt potionem die. Vxor Antimachi in Lariffa, prægnans erat diebus circiter quinquaginta, & reliquo tempore præ ſtudio à cibo abſtinebat, & per ſeptem dies vterum dolebat,

*Theophor
bi filius.*

*Antimai
chi uxor.*

& cor. &

HIPPOCRATIS LIBER V.

& cor. & febris corripiebat. eo tēpore nihil per aluum ege-
 rebat. huic datum est catapotium deorsum purgans fortius q̄
 cōueniebat, & euomuit bilem combustam, præ cibi abstinē-
 tia & febre. Nam neque vllō potu utebatur. euomuit autem
 paucam violenter, & grumosa. & vbi concitata fuisset, ac ip-
 sam emisisset, debilis esse videbatur. & non volebat aquam bi-
 bens euomere. Postea vero dolor fortis tenebat infernum vē-
 trem: exulceratus enim erat à medicamento, & prodibat ipsi
 statim post stercus, subcruentum ramentosum. Semper autem
 amplior fiebat & debilitas, & cibi fastidium: & purgamenti
 erant heminae quinque. Sisfiebatur autem aluus, aqua multa
 super ventrem affusa. aliud autē nihil potuit admittere. Mor-
 tua est circa mediam noctem. Videbatur viuere potuisse, si a-
 quam bibere potuisset, ac statim vomere priusquam degluti-
 uisset. Famula Onesidemi in Larissa, vlcera est aluum &
 intestinum, à bile sponte cōmota. & prodibat fursum ac de-
 orsum bilis & sanguis. & febris tenebat. Huic debili datum
 est pharmacum deorsum purgans in potu, debile, aquosum, ac
 modicum. & vomuit ab ipso multum. & infra amplius subiit.
 & vesperi rediit. Postridie febris erat, sed debilis. Aluus autē
 vlcerebatur, & adhuc eadem egerebat. Tertia die ad vesperā
 mortua est, quum febris valde fortis ipsam corripuisset. Qua-
 propter omnino moritura esse videbatur. Minime vero ideo
 quod aquam frigidam biberat, donec vomitus tenebat. Post-
 quam autem perfrigeratus est supernus venter, depurgatus
 per aquam, succo frigido postea potu, sic postea infusum per
 clysterem immissum est. Eudemus in Larissa, hæmorrhoi-
 das habēs fortes, ac diuturnas, quum exanguis esset, bilis cō-
 mota est, sed leniter in corpore. & aluus turbata deorsum bi-
 liosa egerebat, & hæmorrhoides intumescebant. Pharmaco
 deorsum purgante potu, probe depurgatus est. & rursus bibit
 succum, & amplius aluus turbata est. & dolor ad præcordia
 consistebat. Huic quum venter non probe haberet, sed adhuc
 curatione indigeret, manus hæmorrhoidibus admotæ sunt,
 & vomuit. Postea quum cancer successisset, febris irruit, &
 non dimisit antequam occideret. Quandoque etiam quum
 rigor subrepens dimisisset, febris venit: & prodiit ipsi bilis &
 flatus, & partim prodibat, partim intus erat. & dolor in ven-
 tre. Hæmorrhoides autem extra intestinum rectum erāt, re-
 liquo

Oneside-
 mis famu-
 la.

Eudemus.

- A liquo tempore à purgationibus auspica. & flatus per ipsas prodibat. & ad sternutationem principium fiebat. In Larissa vir quidam sauciatus est cominus ex manu per hastā latam à tergo, & summum ei⁹ penetrauit infra vmbilicum per multum spatium, quod liuidum erat & tumidum: postquam autem vulneratus fuit, dolor obtinebat primum fortis, & venter intumescerebat. Huic postridie datum est pharmacum deorsum purgās, & egressit modicum eruentum, & mortuus est. Videbantur intestina huius non esse sana, & venter sanguine plenus esse. Apellæus Larissæus ætatem habebat annorum circiter triginta, aut parum aberat. Corripiebatur autē morbo, à quo vexabatur noctu magis in somno, quam interdium. Aegrotabat autem ad duos annos ante mortem. Vomebat bilem fuluam aliquando vbi excitatus esset. Vomebat etiam nigram. Hic purgatione à capite forti valde ad multum tempus purgabatur. & quum pharmacum bis bibisset, sex menses ipsum penetrauit. Erat valde vorax multi cibi. & quū corpus haberet biliosum, multum luctatus, valde riguit. & febris corripuit, ac morbus ad noctem. postridie sanus esse sibi videbatur, & rursus altera die. Sequenti vero nocte morbus inuasit cœnatum à primo somno, & per noctem ac diem, & vique ad cœnam tenebat. Mortuus est priusquam resipisceret.
- Cōuellebatur primum circa dexterās partes, faciemque ac reliquum corpus. postea in sinistris. & quum videretur quietus esse, soporem habebat ac stertebat. & rursus succedebat morbus. Eumelus Larissæus rigida habuit crura, & manus, & maxillas. & non poterat neque extendere, neque flectere, si non alius flecteret ac extenderet. Et neque maxillas diducere poterat, si non alius diduceret. Aliud vero nihil neque dolebat, neque edebat, nisi mazani, & aquam mulsam bibebat. Vigesima die sedens cadit supinus, & caput ad lapidem vehementer offendit, & vertigo ipsi caliginosa offusa est. & paulo post surgens, sanus erat. & soluta erant omnia, præterquam post somnum vbi excitaretur, articuli modice ligati erant. Erat autem duodecim aut tredecim iam annorum. & ægrotauit mēsis tribus aut quatuor. In Larissa virgo quæ sanguinem vomuit non multum, suppurata facta, febribus corripientibus, non liberabatur priusquam moreretur. Mortua est tercio mense. Ante mortem vero obsurduerunt ei aures, &

*Percussus
hastā mor-
ritur.*

Apellæus.

Eumelus.

*Virgo lar-
rissæa.*

HIPPOCRATIS LIBER V.

*Dyseridis
serua.*

*Malienfis
quidā cal-
catus cur-
ra.*

*Autonom⁹
cap ti. vul-
nere mor-
ritur.*

*Famula si-
militer.*

res, & non audiebat, nisi quis valde exclamasset. Verum ante
sanguinis vomitum debilis erat. Famula Dyseridis in La-
rissa, quum iuuenula esset, ybi venere vteretur, fortiter cir-
cumcirca dolebat. Alias autem sine dolore erat. Cōcepit au-
tem nunquam. Et quum sexaginta esset annorum dolebat à
meridie, velut ex partu vehementer laboraret. Hæc quū ante
meridiem porrum edisset multum, postquā dolor ipsam cor-
ripuit vehementissimus, & priores omnes excedens, exurgēs
asperum quiddam in ore vteri deprehendit. postea quum ip-
sa animi deliquium incideret, alia mulier immissa manu, ex-
pressit lapidem asperum, magnitudine verticilli fusi. Et sana
tunc statim, & postea erat. Malienfi currus onustus indu-
ctus est supra costas, & costas confregit. & per tempus substi-
tit ipsi pus infra costas. Vltus sub splenem penicillis ac lina-
mentis vtebatur, & peruenit ad decem menses. Resecta vero
cute, cauerna apparuit ad tenue intestinum vtrinq̃ proced-
dens, & ad rhenem, & ad ossa procedebat putrida. In hoc nō
animaduersum est, quod & corporis habitus biliosus erat,
& in corpore putredo sicca tenuis intestini multa, & aliarum
carnium, quas statim eiicere oportebat, si quis potuisset sic-
co pharmaco, dum robur aliquod homo habebat. Nam ab hu-
midis nihil remittebant, sed putrescebant. A linamentis ve-
ro inditis quū humor sisteretur, rigor corripiebat & febris,
& magis putrescebat. affluebat autem isthic putridum quid-
dam, subnigrum, graueolens. Priusquam vero curationis ag-
gressio fieret, quotidie multum foras penetrabat. Erat autē
nō probe fluidam. Cognitum est naturam morbi esse magis
remotam, quā subter cutem. Quod si vero etiam omnia re-
cte facta essent, tamen non videbatur seruari posse, etiam si
ventris profluuium ipsum corripuisset. Autonomus in O-
milo, ex capitis vulnere mortuus est die decimasexta, in me-
dia æstate lapide ex manu ictus, in suturas in medio sincipi-
te. Quare non animaduerti ipsum secari opus habere. dece-
perunt enim me futuræ habentes in seipsis iaculi læsionem,
postea enim conspicuum id fiebat. Primum quidem ad clauic-
ulam, postea ad lotus dolor fortis valde. & euulsio ad ambas
manns venit. In medio enim capitis ac sincipitis vicus habe-
bat. Sectus est autē die decimaquinta, & pus prodiit nō mul-
tum. Membrana vero. cerebri imputrefacta apparebat. Fa-
mula in

A mula in Omilo ex capitis vulnere, duodecim annos nata, moritur in media ætate, decimaquarta die. Ianuam quidam ipsi impegerat, & os contuderat ac ruperat. Sutura vero in vlcere erant. Quare cognitum est recte sectione opus habere. Secta est autem non velut oportebat, sed quantum relictum est, pus in ipso factum est. Octaua, rigor, febris inuasit. habebat autem non velut oportebat, sed quantum etiã prioribus diebus quando febris non tenebat. Nona vero die reliquum resectum est. & valde modicum pus cum sanguine subtus apparuit. & membrana cerebri pura erat. & somnus quidem occupabat. febris autem non dimittebat. Conuulsio vero manum sinistram inuadebat. Nam in dextris magis vlcus habebat.

B Cyrenius in Omilo suppuratus factus, infernum ventrem vltus est, triginta diebus serius quam oportebat. & mansuetum se habebat. & resiccatus est pus in ventre. Verum in calidissimo tempore edens fructus pomorum, & alios cibos non conferentes, à febre correptus est, & à ventris profluuiio. & mortuus est. Hecafon in Omilo, velut etiã alter serius vltus est, attamen resiccatus est venter, modico excepto. Dysenteria vero arripiebat ipsum, quam ubi effugisset, omnia edebat donec totus intumuit, & erupit ipsi pus deorsum, & venter profluuiio mortuus est. Hecafon in Omilo, ab immundicia non purgata, & à praua purgatione, dolorem acutum in coram habebat. & hic quidem discessit, successerunt autem ipsi febres. & multo tempore in lecto decumbebat, neque bibens quicquam, neque sitiens. & debilis, & horridus. Huic commodè quidem ablatus est morbus velut conueniebat. Opem autem percipiebat ex his quæ offerebantur. Tandem vero erupit morbus deorsum, & totus secessit præ multa bile. & mente mortuus est, & mortuus. Videbatur autem morbum euasurus esse.

Qui in Salamine in anchoram incidit, in ventrem sauciatus est, & circumcirca dolebat. Bibit autem pharmacum, & non egressus deorsum, neque reuomuit. Nulius quæ iugulauit seipsam, suffocabatur: & datum est ipsi longe postea pharmacum deorsum purgans, & per secessum ipsi exiit. Qui ex Eubœa venit adolescens, quum multum esset deorsum purgatus, intermissione facta quietus febricitauit. Deinde quum putaret se purgatione sursum versus opus habere, non validam radicem veratri bibit, & post portionem quarta die

*Cyrenius
purulētus.*

Hecafon.

*Salamini
anchora uul
neratus.
Mulier
perse iu
gulata.
Adolescens
moritur.*

Y mortuus

HIPPOCRATIS LIBER V.

*Serua bar-
bara per-
rit.* mortuus est, nihil expurgatus. Verum somnus ipsum tenebat, & fitis sedari non poterat. Serua illa cui à catapotio sursum quidem pauca prodibant, ac suffocabant: deorsum vero multa, nocte mortua est. Erat autem barbara. *Vir hic etiā perit.* Quidam homo Eubæus potio pharmaco deorium purgante, per tres dies purgabatur, & mortuus est. Habebat autem manum suppuratam vique ad cubitum. *Symmachi filius.* Symmachi filius à bile suffocabatur, noctu quum dormiret, & febris eum teneret. Pharmacum autem ubi bibisset, non continuit, neque purgatus est diebus sex antequam moreretur. Qui iuxta curriculū habitabat, quum noctu sanguinem vomuisset, postridie mortuus est, sanguinem vomens multum, & strangulatus. Ad splenem vero, & deorsum multus sanguis ipsi prodibat. *Puer à mulo lo vuln-
ratus.* Puer à mulo percussus ventrem & hepar, mortuus est quarta die. Spiritum autem densum habebat, & non intelligebat quicquam, & febris tenebat. *Hermophili filius.* Hermophili filius ægrotabat diebus undecim. Febris autem tenebat, & cibi non deorsum prodibant. & primum quidem delirauit, nocte vero cessauit. Sequenti autem die voce destitutus iacebat stertens, distortos habens oculos, febricitans. Penna vero immissa vomuit bilem atram, & quum infusum per clysterem immissum esset, stercus prodit multum. *Aristionis serua.* Seruæ Aristionis pes sua sponte marcore corruptus obtorpuit, iuxta medium pedis intrinsecus ex obliquo: & ossa putrida facta abscefferunt, & prodibant paulatim fistulosa, & ventris profluuium succedebat, & mortua est. *Mulier concipere cupiens.* Mulier sana, crassa, à catapotio conceptus gratia accepto, dolorem habebat ventris, & tormen in intestino, & intumuit. Spiritus autem sistebatur, & desperatio erat cum dolore: & sanguinem vomuit non multum. & emortua est quinquies, ut vita decessisse putaretur. & neque vomitu facto ab aqua frigida laxabatur, neque dolor præsens, neque spiratio. Superfusæ vero sunt ipsi aquæ frigidæ amphoræ circiter triginta super corpus. & sanè hoc solum prodesse videbatur, & postea deorsum processit bilis multa. *Antander.* Quum autem dolor obtineret, nihil poterat secedere. & vixit. Antander à catapotio accepto, cætera sanus erat. Verum circa vesicam dolorem habere videbatur. purgauit ipsam celeriter multo purgamento. & à meridie dolor tenebat fortis valde. & in postera diem strangulatio, & desperatio, & iactatio.

A Ratio . & vomebat , & nihil per secessum egerebat . & non
 quæ patiebatur . & somnus non accedebat . postridie vero e-
 gerebat multum , & postea sanguinem . & mortuus est.

Athenadæ puero masculino à Phagedæna ulcere corroso, *Athena-
 dæ puer.*
 doluit à sinistra parte dens infernus , à dextra supernus. Hu-
 ius auris dextera suppurata est, dum non amplius doleret.

Sutor in Pityo dum soleas veteramentarias fueret pupu-
 git seipsum supra genu in femur . & ferme longum digitum
*Sutor su-
 bula læsus
 perit.*
 immerfit. Huic sanguis quidem nullus effluxit . Vulnus au-
 tem cito clausum est. femur autem totum in tumorem eleua-
 batur , & procedebat hic tumor vsque ad inguen & lateris
 mollitudinem. Hic tertia die mortuus est. Quidam iuxta

B inguen sagitta percussus, quem nos vidimus, maxime præter
 omnem opinionem seruatus est. Neque enim cuspis exem-
 pra est, erat enim valde in profundo : neque sanguinis eru-
 ptio vlla memorabilis fiebat: neque inflammatio: neque clau-
 dicauit. Cæterum cuspidem inuenimus nos , ipsamque exe-
 mimus, quum sex iam essent anni, ex quo fauciatus erat . Su-
 spicio autem erat hæc, inter medios nervos cuspidem occul-
 tatam fuisse, nullamque venam aut arteriam dissectam esse.

*Sagitta
 percussus
 cuasit.*

Qui percussus est spiculo acuto retrorsum paulo infra col-
 lum, vulnus quidem habebat non memorabile aspectu, ne-
 que enim in altum ferebatur, verum non multo tempore po-
 stea exempto spiculo, distendebatur in posteriorem partem

*Contrà do-
 tor.*

C rursus relidebatur ad nares. Cæteraque statim peiora fiebāt.
 & secunda die mortuus est. Adolescens per asperam viam
 cursu facto, dolebat pernam, maxime inferna parte. Absces-
 sum autem locus accepit nullum, velut qui colligeret humo-
 rem . Verum tertia die totus locus nigrescebat , vsque ad ta-
 lum , astragalum appellatum , & vsque ad cavitatem quæ est
 ad pectus pedis . & quod denigratum erat non diffringeba-
 tur , sed prius moriebatur . Viginti vero dies ex toto à cursu
 vixit.

*Calce sub-
 atrato cur-
 su hic per-
 rit.*

Qui ad oculum percussus est, percussus quidem est in
 palpebram , descenderat autem cuspis alte satis , barbæ vero
 summum supereminebat . Secta palpebra , sublata sunt om-
 nia. Nihil erat mali . Oculus enim permansit , & compendio
 sanus factus est. Sanguis autem effluxit large, & multa copia.

*Supercilio
 percussus
 sine oculi
 læsione
 sanatur.*

HIPPOCRATIS LIBER V.

Virgo ma Virgo illa pulchra Nerij filia, erat quidē annorum viginti, **D**
nu aperta verum à muliercula amica ludente, lata manu percussa est in
uerticem finciput. & tunc quidem vertigine capta est, & sine spiritu e-
percussa rat. & quum ad domum venisset, statim febris vehemēs cor-
perit. ripiebat, & caput dolebat, & rubor circa faciem erat. Septi-
ma die circa aurem dextram pus processit graueolens, sub-
rubrum, amplius cyatho. & videbatur sibi melius habere, &
alleuata est. Rursus augebatur febris, & in soporē defereba-
tur, & loqui non poterat. & faciei pars dextera trahebatur,
& difficulter spirabat. & conuulsio ac tremor aderat. & lin-
gua detinebatur. & oculus stupidus erat. Nona mortua est.

Cleome- Cleomenis filius hyeme initio factō cibum auersabatur,
nis filius. & eius fastidio citra febrem vexabatur. & vomebat cibos ac
Cocus gib pituitam. & per duos menses cibi fastidium durabat. Co-
berosus. co in spina gibbositās facta est ex phrenitide. Huic nulla me-
dicamenti potio conferebat. Verum vinum nigrum, & panis
esus, & balneorum abstinentia, & frictio, & lenis fots nō cū
multo fomento, sed placide. Cuidam quæ circa vigesimum
ætatis annum, biberat pharmacum ad foetum perdendum,
accidit dolor, vomitus biliosorum, multorum, pallidorum ac
prasinorum. Quum bibisset, conuulsio tenebat, linguam con-
mandebat. Ad quartam diem ad ipsam ingressus sum. & erat
ei lingua magna, nigra. Oculorum autem alba, erant rubra.
insomnis. Quarta mortua est ad noctem. Origanum po-
tum, oculis, & dentibus malum est. Puella quæ de rupe ce-
cidit, voce destituta. iactatio aderat. & vomuit ad noctem san-
guinem multum. quum ad sinistram aurem impegisset, am-
plius inde fluebat. Aquam mulsam difficulter deglutiebat.
stertor. spiritus densus, velut morientium. Venæ circa faciem
distentæ. decubitus supinus. pedes tepidi. febris debilis. vo-
cis interceptio. Septima vocem rupit. calores tenuiores te-
nebant. superstes mansit. Pythocles agrotantibus aquam,
& lac multa aqua ammixta dabat. Perniones pertunden-
di, & calefaciēdi sunt pedes sic vt maxime excalefacias igne
& aqua. Oculis incommoda sunt, lenticula, fructus pomor-
um dulces, & olera. Doloribus circa lumbos, & crura, &
coxam, ex laboribus obortis, aquæ marinæ, aceti quæ calidum
fomentum confert, ita vt vel aspergas, vel spongiam his im-
butam adhibeas. Deligare vero oportet lanis succidis, & pel-
libus

Alibus agnitis. Fullonibus inguina extuberabant dura, & sine dolore. & circa pubem, & in collo, similia erant tubercula magna. febris ante decimum diem. Tussi vexabantur à ruptionibus. Tertio mense autem quarto venter colliquiuit. Calores successerunt. lingua sicca. sitis. egestionis deorsum malignæ. mortui sunt. Qui lapide in caput percussus est à Macedone, & corruit. Tertia die voce destitutus erat. anxietas. febris tenuis. pulsus non valde in temporibus. Nihil omnino audiebat, neque sapiebat. non quietus, sed quarta mouebatur. humiditas circa frontem, & sub nasum, & vsque ad mentum. & mortuus est. Eniates in Delo iaculo ictus retro in latus, in sinistra parte, vlcus quidem sine dolore habuit. Tertia vero ventris dolor vehemens. non egerebat. Infuso vero per clysterem immisso, sterqus prodiit ad noctem. afflictio intermittebat. Sedes ad scrotum extabat. Quarta & ad pubem, & ventrem, dolor irruebat. quiescere non poterat. biliosa vomuit abunde colorata. Oculi quales animi deliquium incidētium, Post quintum diem mortuus est. Calor quidam tenuis inerat.

*Fullo cur
moritur.*

*Caput las
pide per
cussus pe
riit.*

Eniates.

BEi qui hepar percussus est iaculo, statim color qualis est mortuorum per corpus diffusus est. oculi caui. anxietas, molestia. Mortuus est priusquam concio solueretur, quum sub diei exordium percussus fuisset. Polemarchi vxori hyeme anginosæ, tumor sub guttur. febris multa. vena secta est. cessauit suffocatio ex faucibus. febris comitabatur. Circa quintam genu dolor ac tumor sinistri. & circa cor videbatur ipsi aliquid colligi. & respirabat velut hi qui submersi fuerunt respirant. & ex pectore substrepebat, velut qui concluso ore loquuntur, Engastrimythi quasi ex ventre loquentes Græcis appellati. Tale quiddam contingebat. Circa septimam aut nonam ad noctem alius deorsum prorupit, & multa liquida quæ mala putantur egressit. Ipsa vero voce intercepta mortua est. Ventres subpurgare oportet in morbis, quum matura fuerint. infra quidem, vbi confidisse videris. Signum habes, si neque anxij, aut capite grauati fuerint; & quum calores mitissimi fuerint, aut quum post exacerbationes cessarint. Sursum vero, in exacerbationibus. Tunc enim etiam sua sponte eleuantur, quum anxij, & capite grauati fuerint, ac se iactant.

*Quidā he
par iaculo
percussus
statim mor
ritur.*

*Polemarchi
chus.*

*Cubiti læ
sio.*

HIPPOCRATIS LIBER V.

bito, ob corruptionem cubitus suppuratur. Quum autem iam matur⁹ est, viscosa sanies exprimitur. Velut etiam Cleogenisco, & Demarcho Aglaotelis filio. Similiter autem & valde ex iisdem pus nullum. Velut Aeschyli filio contigit. Suppuratis autem plurimis horror & febris succedebat. Pharnensis filio surditas accidit. Contulit clysterem auricularium non adhibere. Verum lana solum indita perpurigare, & oleum infundere, aut netopum. Præcipere vero ut deambulet, mane surgeret, & vinum biberet album. Aspasij vxori dolor dentis vehemens, & maxillæ in tumorem eleuatae sunt. Quum vero castorium & piper collueret, opem sentiebat. Callimedontis puero contulit ad tuberculum, quod habebat in collo durum, & magnum, & crudum ac dolorosum, sectio venæ brachij: & lini torrefacti cataplasma imponere subactum vino albo, & oleo imbutum, ita ut deligetur neque calidum, neque valde coctum. Aut cum aqua mulsâ coquatur fœni graci, aut ordei, aut tritici farina. Melissandro quum gingiua dolore corripere, & vehementer intumesceret, sectio venæ brachij, & alumen Aegyptium in principio sedabat.

Melissander. Hydropicum laboribus fatigari oportet, sudare, panem edere calidum, in oleo bibere, non multum lauari, & caput tepide. Vinum autem album & tenue, & somnus auxiliatur. Biantipugili quum natura vorax esset, contigit ut in affectiones cholericas, bilis sursum ac deorsum exeuntis, delaberetur, ex carnis esu. Maxime vero ex porcinis carnibus crudioribus, & ex ebrietate vini odorati, & placentis ac dulciariis ex melle, & cucumere, pepone, & lacte, & polenta recenti. In æstate vero affectiones cholericæ, & febres intermittentes. Timochari hyeme destillatio, maxime in nares, quum venere usus esset, resiccata sunt omnia. lassitudo, calor successit. caput graue. sudor à capite multus. defluebat autem & per totum corpus. Erat autem etiam sanus sudare adfuetus. Tertia die euasit sanus. Post canem febres fiebant sudorosa: & non perfrigerabantur omnino post sudorem, sed rursus amplius incallescabant: & longa, & leniter sine iudicatione, & non valde siticulosa. paucis in septem & nouem diebus cessabant. Vndecima & decima quarta, & decima septima, & vigesima iudicabantur. Polycratem febris in

- Abris inuadebat, & sudor qualis præscriptus est. Purgatio à pharmaco deorsum facta est. & febris erat lenis. Rursus in temporibus sudores parui, & circa collum, ad vesperam. Deinde in totum. & rursus incaluit. Circa duodecimam & decimam quartam diem febris augescebat, & secessus pauci post purgationem sorbitionibus vsus est. Circa decimam quintam ventris dolor circa splenem, & lateris mollitudinem sinistram. Calidorum adhibitiones minus profuerunt, quàm frigidorum. Quum autem leni ac molli per clysterem infuso vsus esset, dolor cessauit. Magnæ nauis gubernatori anchora digitum indicem, & infernum os dextræ manus confregit. inflammatio successit, & marcor, & febris.
- B Subpurgatus est moderate. Calores lenes, & dolores. de digito quid decidit. Post septimum diem, sanies exibat lenis, postea per linguam dixit se non omnia posse enunciare. Prædictum est opisthotonum aduentare. Ad hoc conferebant maxillæ consertæ, & ad collum rigidæ. Tertia vero die totus conuellebatur in posteriorem partem cum sudore. Sexta à prædictione mortuus est. Harpali filius ex liberta Telephane, luxationem infra in pede magni digiti accepit. inflammatus est, & dolorosus erat. & vbi repositus est, & dolor remisit proficiscebatur ad agrum. rediens lumbos doluit, lauit, maxillæ ad noctem conserebantur, & opisthotonus aderat. Salua spumosa vix per dentes foras prodibat. Tertia die mortuus est. Thrinon Damonis filius.
- C habebat circa tibie malleolum vlcus, iuxta neruum sanè iam purum. huic à pharmaco corroso contigit, vt opisthotono moreretur. Profecto in omnibus suppurationibus, & his quæ circa oculum sunt, dolores ad noctem. Tussis hyeme, maxime in austrinis, crassa & multa alba excreantibus. & febres succedebant leniter, & quinta die cessabant. Tussis autem circa quadraginta, velut Hegeſipoli. Euty chides ex choleris affectionibus, in cruribus ad neruorum distentionem desinuit. vna cum secessu deorsum. Bilem multam abunde coloratam vomuit ad tres dies ac noctes, valdeque rubram. & impotens erat, & anxius. Nihil autem continere poterat, neque ex potibus, neque ex cibis. & vrinæ ac transitus deorsum suppressio multa, per vomitum sex mollis prodit, & deorsum quoque erupit.

Harpali
filius,

Thrinon.

Euty chides.

Androphani nes.

- phani vocis interceptio . ignorantia . delirium . His solutis supererat adhuc diu multis annis, & recidiuæ fiebāt. Lingua vero per totum tempus permanebat sicca . & si non collutione vteretur , loqui non poterat , & plerunque erat valde amara . Aliquando etiam dolor ad cor , quem venæ sectio soluit . Huic aquæ potus , aut aqua mulsæ contulit . Veratrum nigrum bibit . neque biliosum prodibat , sed modicum . Tandem hyeme decubuit , & mente motus est . & linguæ affectiones similes . calor tenuis . sine dolore . lingua decolor , Vox peripneumonica . de pectore stragula reiciebat , & se educi iubebat . Nihil autem poterat clare loqui . Ad noctem mortuus est .
- Nicanor.** Nicanoris affectio erat , quum ad conuiuium progrediretur timor tibiae : quum sub initium vocis tibiae , in conuiuium tibia canere audiuiſſet , præ timoribus turbationes . Vix se sufferre posse dixit , quum nox esset . Interdum vero audiens , nihil commouebatur . Talia comitabantur ipsum multo tempore .
- Damocles** Damocles qui cum illo erat , cæcutire , & corpore exoluto esse sibi videbatur : & non accessisset sanè ad præruptum locum , neque trans pontem , neque minimi scrobis altitudinem transgredi poterat , sed per ipsum scrobem . Hæc per tempus aliquod ipsi affuerunt .
- Phœnix.** Phœnicis affectio ex oculo dextro talis quædam erat , plerunque velut fulgur elucere putabat . Quum autem non diu ipsum continuiſſet , dolor ad tempus dextrum instabat , & per totum caput ac collum . Caput intumescēbat . retro ad verticula . & distentio , & duricies circum tendines . & ubi caput commouere , aut dentes diducere conabatur , non poterat , vt qui valde distendebatur . Vomitus ubi facti fuissent , prædictos dolores auertebant , & leniores faciebant . Sed & venæ sectio proderat , & veratri potio . eduxit autem
- Parmeniscus.** varia & omnigena , maxime vero præsina . Parmenisco etiam prius incidebant tristitiæ , & decedendi è vita cupiditas .
- Conon.** Quandoque vero rursus lætitia . Cononis serua ex capitis dolore incipiente , mente mota est . clamor . querelæ multæ . raro quies . Circa quadragesimum diem mortua est .
- Adolescēs** Decem autem diebus ante mortem voce destituta , & conuulsa fuit . Adolescens quidam multo meraco poto , supinus in habitaculo quodam dormiebat . Huic serpens Arges appellatus in os ingressus est . & sanè quum sensisset , & loqui non

- A** qui non posset, dentibus stridit, & serpentem deuorauit. & dolore magno tenebatur. & manus prætensas adhibebat, velut qui strangularetur. & iactabat seipsum. & conuulsus mortuus est. Timocharis seruus, ex atrabiliariis esse putatus, à talib⁹ ac tot viris, similiter mortuus est circa eandem dies. *Timocharis seruus.*
- Nicolai filius circa solstitium hybernũ ex potationibus horruit. ad noctem febres. postridie vomitus biliosus, merus, modicus. Tertia die quum concio fori adhuc plena esset, sudor totius corporis cessauit. Diopithis sorori in semitertiana, circa accessionem etiam cor grauiter dolens, & concomitabatur etiam is dolor tota die. & huiusmodi cordis dolor etiam aliis similiter aderat. Verumtamen
- B** sub pleiadis occasum, viris talia rariora fiebant. Epicharmi vxori antequam pareret, dysenteria erat. dolor vehemens, secessus recrementa, subcruenta, mucosa, Vbi peperisset, statim sanata est. Polemarchi vxori in morbo articulari, coxæ dolor quidam vehemens. causã erat quòd menses non prodirent. Vox interceptiebatur, per totam noctem vsque ad meridiem. Audiebat autem & sapiebat, & per manum significabat, quòd circa coxam esset dolor. Epicharmo circa pleiadum occasum, dolor humeri, & grauitas in brachium. anxietas. vomitus multi. aquæ potus. Euphranoris filio pustulæ velut culicum morsus, verum modico tempore. postridie febricitauit. Siccitates multæ post Fauonium factæ sunt, vsque ad æquinoctium autumnale. Sub canem æstus magni. calidi venti. Febres sudorificæ. Tubercula iuxta aurem multis oborta sunt. Tychon in obsidione circa Datum, à catapulta percussus est in pectus. & paulo post risus erat circa ipsum tumultuosus. Videbatur autem mihi medicus eximens lignum, reliquisse aliquid de spiculo in septo transuerso. Et quum ipsi videretur, ad vesperam infusum per clysterem adhibuit, & pharmacum deorsum purgans dedit. Noctem primam transegit moleste. Statim vero vbi dies illuxisset, & medico, & aliis, melius habere videbatur. Erat enim quietus. prædictio facta est, quòd vbi conuulsio fieret, breui esset moriturus. Sequenti itaque nocte moleste habens, in somnis, plerumque in ventrem decumbens, tertia exoriente die conuellebatur, & tunc mortuus est. Billo percusso in dorsum, spiritus multus per vultum cum

HIPPOCRATIS LIBER VI.

nus cum strepitu processit. sanguis erumpebat. Vbi vero medicamentum cruentis vulneribus destinatum adhibitum ac deligatum esset, sanatus est. Contigit & infelicissimo

Phile. Philes filio, denudatione in fronte facta, nona die febris.
Phanias. deinde os liuefactum est. mortuus est. Et Phanias & Euergetæ filio, liuefactis ossibus, & febricitantibus, cutis ab osse discessit, & pus non comparuit. Aristippus in supernum

Aristippus ventrem violenter ac grauiter sagittæ ictu petitus est. ventris dolor vehemens, & breui ardebat. deorsum vero non egerebat. anxius erat. biliosa abunde colorata quum vomuisset, melius habere videbatur. paulo post rursus dolores vehementes, & venter velut in voluulis. calores. sitis. & in septem diebus mortuus est. Neapolis similiter percussus, eadem passus est: acri infuso per clysterem immisso, alius deorsum erupit. color per corpus diffusus est, reuulsus, pallidus, niger. oculi ficci, stupore rigidi, intus conuersi, intuentes in corde. Metrodori filio ex dentis dolore, maxilla marcor, & gingiuarum carnis superexcrecentia. Moderate suppuratus est. exciderunt dentes molares, & ipsa maxilla. Mulieri in Abderis, carcinoma obortum est circa pectus. & per mammam fluebat sanies subcruenta. obturata vero fluxione, mortua est. Plerique ex destillatione secundum dimidiam capitis partem dolebant. & humore secundum nares procedente febricitabant leniter. & in quinque diebus perfrigerabantur. Et quæ in partu concussa fuit, dolor circa pectus & latus factus est. excretaiones purulentæ. Tabes constitit. febres per sex dies. Rursus alui profluuium. quies. febris. alui adstricta est: & circa septimam diem mortua est. Anginosa quadam dextram manum & crur doluit. febris tenebat debilis. strangulatio tertia die remisit. quarta conuulsa, voce destituta, stertor, dentium contritio, maxillarum rubor. Mortua est quinta aut sexta die. Signum circa manum subliuidum. Alia quoque in palato stertorosa. lingua ficca, peripneumonica. non desiciens mortua est. Et in Olyntho hydropicus, derepente voce destitutus, desiciens per noctem ac diem, mortuus est.

Metrodorus.

Carcinoma pectoris hanc necauit.

Anginosa cur moritur.

HIPPO-

A HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS POPVLARIBVS

liber VI. Iano Cornario

medico physico in-
terprete.

Vibuscunque ex abortu circa vte-
rum, & tumoribus, ad capitis gra-
uitatem conuertitur, & iuxta fin-
ciput maxime dolores, & quicun-
que alij ab vteris: his in octo aut
decem mensibus ad coram mor-
bus definit. Acutum habentes
caput, qui quidem validam habēt
cervicem, robusti sunt tum aliās,
tum ossibus. Qui vero caput do-

Plini⁹ hinc
plurima
sumpsit.

lent, & aures fluentes habent: his palatum canum est, & den-
tes inter se non ē directo respondentes. Quibuscūque os
de palato discessit, his medius cōsider nasus. Quibus vero in-
de vnde dentes prodeūt, his summus nasus sinus fit. Pue-
rorum elucescentiæ simul cum pubertate, in quibusdā muta-
tiones habent etiā alias. In rhenem dolor grauis, quū im-
plentur cibo, vomunt pituitam. Quum vero redundarint do-
lores, eruginosa, & melius quidem habent. Soluuntur autem,
quum cibus euacuati fuerint, arenulæque fuluæ subsident, &
cruentū mingunt, torpor femoris ē directo, quiescere non cō-
ducit. Sed exercitia, nō impleri, iuuenes veratro purgare, po-
plitem secare, vrinā cientibus purgare, attenuare, & mollire.

Menses aquosis diu permanēt. Quū vero nō breui prodie-
rint, intumescunt. In Cranone antiqui dolores frigidi. re-
centes autem calidi. ex sanguine vero plurimi. & quæ ex co-
xa, frigida sunt. Quæ ad rigores fortes progressa sunt, non
valde mitigantur, nisi prope vigorem. Ante rigorem vri-
narum suppressiones, si ex bonis fuerint, & aliis egerat, &
somnia adfint. fortassis autem & febris modus. fortassis etiam
quæ ex lassitudinibus. Abscessus non valde, quib⁹ rigores.

Menses.
fœminarū.
Cranon.

Lotiū cum
retinetur.

Crurum

HIPPOCRATIS LIBER VI.

Tubercula quæ bona, quæ non. Crurum effœmationes, veluti si aut ante morbum iter fecisset, aut statim ex morbo: eo quod fortassis ex lassitudinib⁹ in articulos abscessit ex quo crurum effœmationes. Tubercula extra extuberantia, & acuta, & fastigiata, & æqualiter maturescentia, & non obdura, & deorsum vergentia, & non bifida, meliora: contraria vero, mala: & quanto plus contraria, pessima. Ferinum autumno, & oris ventriculi dolores, & horrores, & atra bilis. Circa initia exacerbationes considera, & in omni morbo, quale est ad vesperam exacerbari, & annus ad vesperam, & ascarides. Infantibus tussicula cum ventris turbatione, ac febre continua, significat post iudicationem bimestri, in totum vigesima die, etiam tumores ad articulos. Si quidem infra vmbilicum constiterint, in infernis articulis superna, bonum: si vero supra, non similiter morbum solvunt, nisi suppurata fuerint. Quæ vero in humeris suppurantur tantillis, mustellæ cubito præditos, parvumque ac macilentum brachium habentes faciunt. Soluerit autem & vlcusculorum inferne eruptio, si non rotunda & profunda fuerint. Talia enim perniciofa etiam alijs sunt pueris. Soluerit itidem sanguis fluens. Magis autem in perfectioribus is apparet. Lachrymæ in acutis male habentibus, vltionæ quidem bonæ. Involuntariæ vero defluentes, malæ. Quibus circuntenditur palpebra malum. Malus est etiam oculus inarescens, velut spuma. & obscuratio oculorum mala est. Et squalliditas malæ. & qui intrinsecus corrugantur, & rigentes, & qui vix conuertuntur, & qui intus conuersi sunt, & quæcunque alia omittuntur. Febres aliæ quidem mordaces sunt manui, aliæ lenes. Aliæ vero non quidem mordaces, verum augescentes. Aliæ autem acutæ quidem, sed quæ à manu vincantur. Aliæ statim adurentes, aliæ semper debiles, siccæ. Aliæ saluginosæ. Aliæ inflatæ horrédi aspectus. Aliæ ad manum humectæ. Aliæ rubicundæ valde. Aliæ valde pallidæ. Aliæ liuidæ, & alia id genus. Distentiones corporis, & articulorum duriciæ, malum. & ipse dissolutus. & contrafractiones articulorum, malum. Oculi audacia delirij signum est. & oculorum deiectiones ac peruerfiones malum.

SECTIO SECVNDA.

Dilatare, constringere, alia quidem, alia vero non. Humores alios quidem expellere, alios vero siccare. alios autem

A autem indere. & alia quidē parte, alia verò non. Attenuare, crassificare, corpus, cutem carnes, & alia. & aliqua quidē; aliqua vero non. Leuigare, exasperare, indurare, molliare, alia quidem, alia non. Excitare, torpescere, & quæcunque alia huiuscemodi. Deriuare, subcedentia statim reuellere; renitentibus concedere. Alium humorē non prodeuntem ducere, prodeuntem vero simul effundere, operari simile, velut dolor dolorem sedat. Dissimilia, si vergant sursum eleuata, inferne soluere, & contraria per eadem: velut est capitis purgatio, venæ sectio, quando non temere detrahitur.

Abcessus velut glādularum tumores, signum quidem sunt earum partium quæ germina habent, sed & aliarum. Maxime *Tumores quid possint*
B vero circa viscera. Maligni autem hi sunt. Spiritus parui densi, magni rari, parui rari, magni densi: extra magni, intus parui: intus magni, extra parui: alius extendens, alius vrgens: dupla intro reuocatio, velut superinspirationibus. calidus, frigidus. Medela assiduorum oscitationum, spiratio longa. In non potatibus, & vix, spiratio brevis. E directo & laterum & præcordiorū intentiones, & splenis eleuationes, & è naribus eruptiones, & aures è directo. Horum plurima etiam ad oculos. Vtrum igitur omnia? aut quæ quidem ex infernis sursum, è directo: qualia sunt quæ iuxta maxillas, aut circa oculū aut aurē: quæ vero ex supernis deorsum, non è directo? Atquæ & anginosi rubores, & laterum dolores è directo. Aut etiam quæ infra hepar sunt ex supernis distributa, velut in testes ac *Spiritus uarietas.*
C varices? Considerāda sunt hæc quo, & vnde, & propter quid.

Venæ temporum non confidentes, neque viriditas splendida, si spiritus intus relinquatur, aut tussis sicca, non ferina: vt in articulos decumbat expectare oportet, è directo differtionum secundum ventrem vt plurimum. Habent autem horum plurimi, & facies rubicundas, & ex natura sunt modi albidioris & de naribus sanguis non erumpit, aut parum erumpit. & si quidē ex affusis intus relinquatur, paratus est abcessus.

Sitis intus relicta, & oris resiccatio, & iniucunditas, & cibi fastidium, eodem modo. Febres autem non acutæ, eiusmodi sunt, verum reuertentes. Quæ relinquuntur post iudicationem, recidiuas facere solent. Primum itaque splenis eleuationes, si non ad articulos finierint, aut sanguinis è naribus eruptio fit, aut dextra præcordij intensio: si non penetrauerint

HIPPOCRATIS LIBER VI.

rint vrinx. Hæc enim est interceptio vtrorunque. & recidiuæ D
 horum merito fiunt. Abscessus igitur horum facere oportet, si non fiant. Eos vero qui iam fiunt declinare. Eos autem excipere, si prodierint iam, & qualia oportet, & qua parte oportet. Qui vero non valde, eos coadiuuare. Eos verò auertere, si omnino incómodi fuerint, maxime si hi affuturi sunt:

Quartanae diurnæ. sin minus, si iam incipiunt. Quartanæ sanguinis è naribus eruptiones ægre iudicant. Febres quæ vna die intermittentes, altera superrigét vnà cum indicatione, ex quinque ad septem circuitus durant. Quæcunque tertianæ naturam habet, his nox molesta ante exacerbationem: Quæ verò sequitur, tolerabilior plerunque est. Tusses siccæ parū irritantes à febre adurente, non pro ratione siticulosæ, neque linguæ torrefactæ, non feritate, sed spiritu. Cõstat id inde. Quum enim loquuntur, aut hiant, tunc tussiiunt: quum vero non, minime. Hoc autem in febribus ex lassitudinibus obortis maxime contingit. Nihil temere affirmandum, nihil contemnendum. Contraria paulatim facta accessione adhibenda sunt, & interquiescendum. Dolenti capitis partem posterioré, recta vena in fronte secta profuit. Successiones præcordiorum ex qualibus qualia alterant, & viscerum inflammationum qualia possunt, siue ex hepate spleni, & vice versâ: & quæcunque huiusmodi. Reuellere oportet, si non qua oportet repât. Si vero qua oportet, his oscula aperire oportet, qualiter singula repunt. Latæ pustulæ non valde pruriginosæ sunt: Quales Simon habebat hyeme, qui vbi ad ignem inungeretur, aut calida lauaretur, opem sentiebat. Vomitus non proderant. Arbitror si quis calida fomenta adhibuisset, opem ferre potuisset. Quæcunque concoqui oportet, conclusa esse conuenit. Contraria vero siccare, & aperta esse.

Oculorum fluxiones. Oculorum fluxiones, si aliàs conducere videtur, reuellere ad fauces conuenit. Et vbi eructatio conducit, & quæcunque alia huiusmodi. Transitus apertos esse oportet, veluti nares, & alia quibus opus est, & velut opus est, & qualia, & qua parte, & quando, & quantum opus est, velut sudores, & alia sanè omnia. In magnis malis facies si fuerit bona, bonum signum est. In paruis autem, contraria significans bonæ significationi, malum. Apud magnum Theatrum vbi mulier retro heroum, morbo regio superueniente permâsi ipsi, Apud

A Apud Temenæ neptim ille nigricantis erat coloris. In *Temenes.*
 Perintho genituræ similis vrina talis, quæ esset iudicatoria, *Lotii ge-*
 etiam pectinis affectionum. Nam huiusmodi vrinæ talia fa- *nit ali se-*
 nant: quoniam neq; flatu multo, neque stercore multo egres- *mini tale.*
 so euacuabantur. Non enim profecto magnum erat præcor-
 dium. Brafficam septima die quis comedit, quum adhuc dif-
 ficulter spiraret, postquam pecten emollitus est, recte spirans
 factus est. alius ipsi expulit. De sanguine seroso, quoniam *Sanguis se-*
 in pavidis talis, aut in his qui vigilarunt: & siue malus, siue bo- *rosus i qui*
 nus. Quibus splen deorsum vergit, pedes & manus, & ge- *bus fit.*
 nua calida sunt: nasus & aures semper frigida. Num propter *Lienosorū*
 hoc quod tenuis sanguis? Num & natura talem hi habent? *signa.*

B Suppurationibus vmbilicus terminus, quibus suppuratu-
 ris ventres turbantur. Splen durus non superne, infer-
 ne, rotundus, latus, crassus longus, tenuis longus. Minus capi-
 tis grauedine laborantibus. Circa ægrotantem administra *Quid me di*
 tio, & de morbo interrogatio: quæ narrat qualia, quomodo *co agendū*
 accipiendi sermones: quæ ad ægrotantem, quæ ad præsentem, *erga lan-*
 quæ ad externos. Quod in calidior, solidior, in dextris *guemtes.*
 & nigri propterea, & venæ extrinsecus, & multo biliosiores.

Concretum est, compactum est citius: vbi motum est, desi-
 nit, & tardius augefcit, & ad amplius tempus. Quod soli-
 dum factum est, & biliosius, & sanguinolentius est: Hic cali-
 dior est locus animali.

SECTIO TERTIA.

C Utis raritas, ventris densitas: cutis constrictio, carnum
 incrementum: ventris torpor, vniuersorum cōfusio: va- *Caluities*
 forum immundicia, cerebri consumptio. Quapropter & cal- *caussa.*
 uities, instrumentorum attritio. Detractio cursibus, luctis,
 quiete, multis celeribus deambulationibus, carne ouilla, ma-
 za cocta plerunque, panis modicus. Detractionis signum,
 eandem horam diei seruare. derepente enim trahitur. Re-
 mittito labores, aut defluet. Similiter enim totum concidit.

Quum vero iam conciderint, carnes suillas affatas exhibe-
 to. Quum autem implentur, signum est, quod corpus rursus
 floridum fit. In exercitationibus signum, sudor fluens gut-
 tatim, qui exit velut ex canalibus: aut collapsio ex eleuatio-
 ne. Mulier quam primum carauit in Cranone, splen ipsi ma-
 gnus natura, febris ardens, rubicunda, spiritus, decima sudor
 plerunque

*Mulier lie-
nosa.*

HIPPOCRATIS LIBER VI.

plerunq; superne. Sed & infernè, decima quarta. Minus his D
 qui ex capite grauedine ac raucedine laborât, vbi febre cor-
 repta fuerint, recidiuæ velut puto fiunt. Quicquid supp-
 ratur, non reuertitur. Ipsa enim maturatio, & iudicatio simul,
 & abscessus. Quibusdam vbi venere vtuntur, venter infla-
 tur, velut Damagoræ. Quibusdam vero in hoc strepitus, Ar-
 cesilao vero etiam intumescebat. Flatuofitas simul cau-
 sa est in his qui scapulas alarum modo eminentes habent.
 Sûnt enim flatuosi. Frigidum valde, venas rumpit, & tussim
 mouet, velut nix, glacies: & constringit, velut sunt eminen-
 tiæ oblongæ & rotundæ, Phereæ & Gongronæ, à satyrorum
 circa aures eminentiis, & arborum quarûdam tuberculis ap-
 pellatæ. Simul causæ sunt etiam duricies. Post mictionem con-
 cretio, pueris magis, num quod calidiores? Figuræ magis al-
 leuantes, velut qui sarmenta manu necabat & obtorquebat,
 præ doloribus decumbens, arrepta paxilli summa parte supra
 seipsum infixæ, inhærebat, & melius habuit. Quem ex mon-
 tano labore circa pontem ego vidi crura iactantem, altera ti-
 bia minime extenuabatur, femoribus autem valde. Vrinæ &
 genitura non supprimebantur. Quæcunque laterum natu-
 ræ scapulas alarum modo eminentes habent, propter causæ
 debilitatem in destillationibus malignis, siue excretio fiat, si
 ue non fiat, malum. Rigores incipiunt mulieribus quidem
 magis à lumbis, & per dorsum, & tunc ad caput. Sed & viris
 posteriore corporis parte magis quàm anteriore. Horremus
 enim magis exterioribus quàm interioribus corporis parti-
 bus, velut cubitis, femorib⁹. Sed & cutis rarior, Indicat autem
 pikus. A quibus autem aliis rigent, fortassis vlceribus, inci-
 piunt à vasis. Summa, ex natiuitate, & causâ, & plurimis ra-
 tionibus, & paulatim in cognitionem venientibus colligen-
 tem ac addiscentem, an similia sint inter se, & an non similia
 sint inter se: quo ex dissimilitudinibus similitudo fiat vna. Sic
 sanè fuerit via. Sic etiam eorum quæ recte se habent proba-
 tio, & non recte se habetium redargutio. Sanguinis ex na-
 ribus eruptio, aut subpallide nigricantibus, aut rubicundè pal-
 lentibus, aut subpallidis. Parum dimittentem crassè facere
 oportet sicco. Aliis vero minus crassificatione opus est. Sic-
 co autem opus est albo, velut galla, alumen. Postquam ve-
 nere vti inceperint, aut hircire, sanguis ipsus è naribus eru-
 pit.

*Damago-
ræ & Ar-
cesilao qd
in Venere
passi sunt.
Frigus ue
hemens
quid faciat*

*Rigores
unde incu-
piant.*

*Siquis de
narib⁹ qui
bus manet
& pueris
quâdo inci-
pit.*

pit.

- A** pit. In accessibus alij quidem strepitum edunt, velut Arce- *Arcefilaus*
 silaus. Alij vero accessuri, horridi fiunt ac rugosi. Alij post-
 quam accesserint, ventre inflantur, velut Damnagoras. Mu- *Damnago-*
 tationes cauendæ. Cibus modicus, non delassari, non sitire. *ras.*
 Omnis attenuatio laxat cutem, deinde circumtenditur. Re-
 nutritio vice versa. Cutis confidentis corrugatio, renutritæ
 extensio. Rugosum, leue, vtriusque signum: itémque subbilio-
 sum & subrubrum: Sic etiam detractas esse mammas, graciles
 autem sursum tractas esse & circumtensas, etiam si quis non
 propterea putauerit id fieri, sed in carnosus. Clauiculæ con-
 spicuæ, venæ pellucidæ. Herodicus febricitantes interfici- *Herodicus*
 bat circuitibus, luctis, multis fomentis, mala est febriculo-
 sitas, inimica fami, luctis, circuitibus, cursibus, frictioni: labo-
B rem labore. Ipsis venarum rubor, liuor, pallor, laterum do-
 lores molles. Non sitire faciunt, continere os, tacere, ven-
 tum cum potu frigidum inducere. Occasiones vnde ægrota-
 re cœperint, considerare oportet, siue capitis fuerit dolor, si-
 ue auris, siue lateris. Signum sunt dentes, & in quibusdam in-
 guinum tumores. Vlcera fientia ac tubercula iudicantia fe-
 bres. Quibus hæc non fiunt, iudicatio sublata est: Quibus in-
 tus relinquuntur, certissimæ, recidiuæ, ac celerrimæ. Sputa
 rotunda delirium significant, velut in Pleno. Qui Hæmor- *Hæmori-*
 rhoidas habent, neque pleuritide, neque peripneumonia, ne- *rhoidas pa-*
 que phagædena, neque furunculis, neque tuberculis terebin- *tientes à*
 thi figuram habentibus corripuntur, fortassis autem neque *quibus tuti*
C lepris, fortassis neque vitiliginibus. Multi tamen intempesti-
 ue curati, talibus non tarde correpti sunt, & sic perniciosæ
 fuerunt: & quicunque alij abscessus, velut fistulæ, aliorum me-
 dela sunt. Decubitus humorum ad aliquem locum, in qui-
 bus factos affectus liberat, in his prius ipse factus, illos impe-
 dit. Alterius loci morbos loca excipiétia, aut ob dolorem,
 aut ob grauitatem, aut propter aliud quiddam liberant, aut
 quòd aliis sunt communicationes. Propter inclinationem
 non amplius sanguis prodit, sed iuxta humoris cognationem
 talia spunt. Conuenit quibusdam sanguinem detrahere,
 tempestiue in talibus. In aliis autem velut in his, non con-
 uenit. Impedimentum in spuentibus cruenta, tempus an-
 ni, pleuritis, bilis.

HIPPOCRATIS LIBER VI.

SECTIO QUARTA.

Tubercula circa aurem quibus circa iudicationem ex-
orta non suppurata fuerint, his disparentibus recidiu-
fit, pro ratione recidiuarum. Recidiua vero fiente, rursus in-
tumescent, & permanent, velut febrium recidiuæ in simili cir-
euitu: his spes est ad articulos abscedere. Vrina crassa, alba,

*Archige-
nes.*

qualis Archigenis familiari erat, in lassitudinosis febribus
quarta die aliquando prodit, & liberat ab abscessu. Si vero
ultra hoc, etiã sanguis è naribus large eruperit, etiam valde.
Cui intestinũ in dextra parte dolebat, & articulari morbo
correptus est: erat quietior. Postquã autẽ hic curatus fuit, ma-
gis dolebat. Agasis filia quum esset puella, dẽsum spiritum
habebat. Mulier autem facta, à partu nõ diu dolore correpta
leuiter, magnum onus iustulit. & statim quidem in pectore
aliquid crepuisse visum fuit. Postera die & anhelationem ha-
bebat, & coram dexteram dolbat. & quum hæc doleret, tunc
etiam anhelatio habebat: coxæ verò dolore cessante, etiam
anhelatio cessabat. Spuebat spumosa, ab initio vero florida:
Vbi verò confidisset sputum, vomitui bilioso tenui simile e-
rat. Dolores maxime erant quum manu laboraret. Hanc ab
alio arcere visum fuit, porròque, ac ouicula, & boue. In re-
bus autem agendis, à clamore, & exandescencia. Cui in
capite tumor depascendo proserpebat, ei primum alumen
vsum profuit. Habuit alium abscessum, fortè quòd os ab-
scessurum esset. Abscessit sexagesima die supra aurem, sursum
ad verticem vulnus erat. Intestina crassa habet, qualia sunt

*Capitistur-
mar.*

*Quæ medi-
cus erga
læguentes
agat.*

canis, verum maiora. Dependent autem ex medianis mem-
branis. Mesocolis hac parte appellatis. Hæ vero ex nervis, de
spina, sub ventrem. Aegrotantibus gratificationes, velut
est pure præparare potus ac cibos, & ea quæ videt: molliter
ea quæ contingit. Aliæ gratificationes, quæ non magnope-
re lædunt, aut facile reparari possunt, velut frigida, vbi hac
opus est. Aliæ gratificationes sunt, introitus, sermones, ha-
bitus, vestitus ægrotanti, tonsura, vngues, odores. Aqua de-
cocta partim vt aerem admittat, partim vt vas non plenum
sit, & operculum habeat. Quòd ex sanguinis eruptioni-
bus, aqua inter cutem corripuntur. Si qualia oportet pur-
gari, purgentur, facile ferunt. In Aeno legumina comedentes
assiduas, scemina, mares crurum impotentes facti sunt, &
perman-

*Legumina
in Aeno.*

Apermanferunt. Sed & eruum comedentes, genuum dolores habebant. Palam vigilans calidior externis partibus, frigidior autem internis. Dormiens vice versa. Calidæ naturæ frigiditas, potus, aqua, quiescere, somnus in frigore, contactio, somnus sedetium, erectorum nictatio. Debiles victus, frigidi: robusti vero calidi. Aquarum arte non preparatarum, quæ quidem ab æthere excreta est, aut eum tonitruo, æstiuæ procellosa vero mala. Aqua vorax, vigilia vorax. Per calidam naturam calido tempore, in frigore cubile crassescit: in calido attenuat. Exercitatio sanitatis, est vesci citra saturitatem, non refugere laborem. Inter vigilandum siti leui somnus medela est. Siti vero ex somno, vigilia in quibusdam. Quib⁹ plurimus calor est, maxima voce præditi sunt. Nam & plurimus est frigidus aer. Ex duobus autem magnis magna etiam quæ generantur existunt. Ventriculo calidi, carne frigidi & tenues, hi eminentes venas habent, & iracundiores sunt. Terra siccitatibus squallida, volucrum genus abundat. Hircine incipiens, vter testis extra apparuerit, si quidem dexter, masculum: si vero sinister, foemellam protendit. Oculi prout validi fuerint, ita etiam corpus: Sed & color in peius aut melius vergit. Iustum est autem, prout se habuerit alimentum, ita & quod forinsecus est sequi. Signa lethalia, per cutem, nares, calidus vapor: vbi prius nares frigidum spiritum emiserunt. Signa vero vitalia, contraria sunt. Labores cibos præcedant.

*Qualitas et
boru & a
quarum.*

*Sanitas.
Somnus.*

*Volucrum
abundantia*

Oculi

*Mortis &
vite signa*

SECTIO QVINTA.

C Morborum naturæ medici. Inuenit natura ipsa sibi ipsi aggressiones, non ex præmeditato, partim velut est nictare, partim vero & ea quæ lingua subministrat, & quæcunque alia huiuscemodi, non edocta natura, & nullo magistro vsa, ea quibus opus est facit. Lachrymæ, narium humiditas, sternutationes, auris sordes, oris saliuæeductio, spiritus introitus, exitus, oscitatio, tussis, singultus, non eiusdem omnino modi. Vrinæ secessus, & flatus, & huius alterius, alimenti, & transpirationis, & ea quæ foeminis solis adsunt, & in reliquo corpore sudores pruritus, corporis distentiones cum oscitatione, & quæcunque huiuscemodi. Homini anima semper producitur vsque ad mortem. Si vero efforbuerit, vnà cum morbo etiam ani-

Z ij ma cor-

HIPPOCRATIS LIBER VI.

ma corpus depascitur. Morbi commutriti, in senecta, & per concoctionem, & per solutionem, & per rarefactionem desinunt. Sanatio, contra sentientem non consentire affectioni. Frigidum & auxiliatur, & occidit, quæcunque ex calido sunt. Excandescencia retrahit cor & pulmonem in seipsa: & ad caput calida ac humidum. Lætitia vero relaxat cor. Labor articulis & carnibus: cibus, somnus, visceribus. Animæ deambulatio est cura hominibus. In vulneribus sanguis concurrit, opitulandum igitur ut vacuum expleatur. Si auris doleat, lana digito obuoluta oleum calidum instillato. Deinde lanam intus in volam manus positam, sub aurem subdito, ut aliquid ipsi exiisse videatur. postea in ignem immittito, Dolus. Lingua vrinam significat. Linguae virides cum pallore biliosa, Biliosum autem à pingui: Rubicundæ vero à sanguine. Nigræ ab atra bile. Sicca à fuliginoso ardore, & vterina parte. Albæ vero à pituita. Vrina concolor cibo, & potui, & qualis intus est humidi colliquatio. Lingua concolor attingentibus ipsam humoribus: quapropter per hanc humores cognoscimus. Si falsæ carnes gustanti, redundantia signum. Si mammarum papillæ, & rubor pallidus fuerit, morbosum vteri vas est. Hominibus fordes in auribus, dulcis quidem lethalis, amara vero non. Terram mutare commodum est in longis morbis. Debiliores cibi breuem vitam habent. In fluxionibus ad coxam, venas retro aures secato. Coitus morbis ex pituita commodus. Calido ventriculo præditos, fortes potus ac cibi perturbant. Atra bilis velut similis est hæmorrhoids. Augescentes morbos coitus. Frigiditas ea quæ in ventre sunt indurat. Coitus ea quæ in ventre sunt indurat. Eum qui veratrum bibit, si citius purgare volueris, lauare oportet aut comedepurgatio. Sanguis in somno intro magis fugit. Rigor à superiore ventre, febris ab inferiore magis. Attractio, pulmo, siccus ardor: Superuacuatum siccatur & somnus multus. Frigidissimus cibus, lentes, milium, cucurbitæ. Vlcera exoriantur si quis dum impurgatus est laborauerit. Mulier, capra, elaterium aut cucumerem syueffrem comedentes, pueris purgatio. Calido corpori, id quod comedit, intrinsecus frigiditas est. forinsecus autem dolor à sole, igne, vestitu, in tempore

Dolor auris qui leuatur.
Linguae notæ uariæ.

Sordes auris quid portendat.
Cibaria qualia.
Destillatio nis remedium.
Coitus qui bus proficit.
Veratri purgatio.
Sanguis p somni intro fugit.
Cibi frigidissimi.
Cucumis agrestis.

tempore æstiuo. Contrario vero contrario modo. Cibi *Ciborum na-
partim celeriter superantur, partim tarde.* *rietas.*

SECTIO SEXTA.

Carnes attrahentes, & ex ventre, & extrinsecus. Indicio est sensus ipse, quod expirabile ac inspirabile est totum corpus. Calidissima venula sanguinis multitudine, id quod fuliginosum est exerit, & statim secernit. Et quibus quidem pingue, bilis flaua: quibus autem sanguis, atra. Mentis, memoriæ, olfactus, aliorum etiam famis instrumentorum exercitatio. Labores, cibi, potus, somnus, res veneræ, omnia mediocria. Frigidior in frigido tempore ac regione calidior erit. In doloribus proximum ventrem purgato, sanguinis autem ventrem secato. Vstio, sectio, calefactio, perfrigeratio, sternutationes, plantarum succi, in quibus vim habent, & cyceonis mixtura. Maleficorum autem lac, allium, vinum feruefactum, acetum, sal.

Homo ex lassitudinibus ex itinere, imbecillus, grauatus, expuit. Tussiuit enim ex vertice. febris acuta, ad manum submordens. Secunda die capitis grauitas, lingua combusta fuit, naris ynquibus conscalpta sanguinem non effudit. Sinister splen magnus & durus dolebat. A quartana correpti, à magno morbo non corripiuntur, Si vero corripiantur prius, & succedat quartana, liberantur. Pro qualibus qui morbi. Bilis fit, velut de vulneribus dixi, quod sint biliosæ. Caliditas acrimoniæ signum est. Turbationes, transitus. Nam mente motis dolores laterum desinunt: quibusdam & febres, quibusdam non, Sed cum sudoribus. quibusdam autem cum turbatione, quibusdam vero cutis arida & circumtensa ac falsuginosa. Torpefactiones quales ex qualibus, & quales illi cui coxa. Per aures, ex auribus, plerunque tertio die moriuntur. Quibus cutes circumtenduntur aridæ ac duræ, sine sudore: quibus laxæ sunt ac rare, cum sudore moriuntur. In recidiuis mutationes profunt. His transmutare oportet ad ea quæ conueniunt, antea quàm male afficiantur, velut Cherioni. Quæ irritantur ex qualibus, stridulæ faucium asperitates terminum præscribunt. Quibus quidem id quod sanum est relinquitur, causa deorsum submissa, eos aut purgato, aut deligato, aut eiicito, aut rescato, aut exurito. Quibus vero non, non.

*Quartana
à quib⁹ im-
munes
præstat tu-
tisque
Deliratio
quib⁹ pro-
fit.*

*Dolor au-
rium ma-
gn⁹ tertio
die plerū-
que tollit.
Locorum
mutatio
quos inuict.*

Z iij Quibus

HIPPOCRATIS LIBER VI.

Sanguis de Quibus sanguis multus fluit ex naribus, qui quidem de
narib⁹ flu colores mero modo sunt, his parum prodest. Quibus vero
ens quibus colores rubicundi, non similiter. Et quibus capita sunt quæ
proflu. facile tolerât, prodest: Quibus secus, non. Quibus nares na
Quales sint tura humidiores, & genitura humidior ac copiosior, hi mor-
qui nares bosius sani sunt. Plurimis autem quibus ex morbo, vice
humidas versa. Sputa rotunda, mentem emouent, velut illi in Plin-
habent. thio. Huic sanguis ex sinistra nare erupit, & solutus est quin-
Rotunda to die. Urina multam subsidentiam habens, à mentis e-
sputa. motione liberat, qualis erat Dexippi. Post pilorum de-
Dexippus fluxum, quartana febris non ultra annum. Aurium eru-
ptiones ætate quinta die fiunt. Quandoque vero etiam diu-
tius durant. Ita & circa gingiuas, & circa nares suppurationes.
Piper den Quibus in dentium dolore, de supercilio tenuia de-
tes iuuat. scendunt, his à pipere probe affricto postridie crassiora de-
scendunt, si etiam alia non obtinuerint. Nam Hegesippo so-
poriferum inditum non obtinuit, sed magis & violentius in-
super prouocauit. Ossium naturam ex capite colligere o-
Natura of portet, deinde neruorum, & venarum, & carnum, & aliorum
fiu, neruo- humorum, & supernorum ac infernorum ventriculorum, &
ru, uenaru mentis, & morum, & eorum quæ per annum fiunt, tempore
carnis. & quodam anni præcociore, velut pustulæ & huiuscemodi. Si-
cæterorū mile enim est his quæ quotidie citius aut serius accipiuntur.
qui cogno Similiter & biliosum, & sanguineum corpus atrabiliarium
scatur. fit, si non habet euacuationes. Lycino postremum splen ma-
Lycinus. gnus dolorosus, in quarta aut quinta.

SECTIO SEPTIMA.

Tussis, **T** Vses cœperunt circa solstitia hyberna, decimaquinta
aut vigesima die, ex frequenti australium & aquilonari-
um ac niuosorum transmutatione. Ex his aliæ breuiores,
aliæ diuturniores fiebant, & post has multæ peripneumoni-
cæ affectiones. Ante æquinoctium rursus plerisque reuer-
tebantur, quadragesima vt plurimum ab initio die: & aliqui-
bus sanè valde breues ac iudicatu faciles erant, aliquibus au-
tem fauces inflammatae sunt, quibusdam Anginæ oborta.
Anginæ. quibusdam leues syderationes, aliis Nyctalopes, atque hi ma-
Lusiosæ. gis pueris. Verum peripneumonicae affectiones valde breues
Syderati. erant. Faucium vero inflammationes post tussim, aut omnino
parum

Apud parum pro tussi fiebant, atque hæc breues, magis autem Nyctalopes. Anginæ vero & leues syderationes, aut duræ & siccæ, aut paruæ & raro matura educentes: quibusdam vero etiam valde. Qui igitur aut vocibus amplius se fatigarunt, aut rigerunt, in anginæ magis defecerunt. Qui vero manibus laborarunt, manibus tantum syderati ac resoluti sunt. Qui vero equitauerunt, aut amplius iter fecerunt, aut alios labores cruribus perfecerunt, his ad lumbos aut crura impotentie resolutoriæ obortæ sunt, & ad femora ac tibias lassitudo ac dolor. Durissimæ autem & violentissimæ tusses erant quæ ad leuem syderationem ac resolutionem perducebant. Verum omnia hæc in recidiuis fiebant. In principiis vero nõ ita valde. Plurisque autem horum tusses in medio remisissent, sed perfecte non defecerunt, verum cum recidiua affuerunt.

Vocis labor & ceterorum quid fecerit.

Tussis uarietas.

Quibus voces frangebantur ad tussim, horum plurimi ne febricitarunt quidem, Quidam vero parum. Sed neque peripneumonicæ affectiones ulli horum fiebant, neque leues syderationes, neque ullus alius morbus de se significationem præbuit, sed in sola voce iudicabantur. At vero Nyctalopice affectiones firmabantur, ut quæ etiam ex aliis causis fiebant. Fiebant autem pueris maxime. Oculorum autem nigre partes aliquantum variegabantur, quæ pupillas paruas habebant. In summa oculus niger ut plurimum erat. Et magnos magis quam paruos oculos habebant, & plurimi rectos capillos ac nigros. Cæterum mulieres non similiter à tussi afflicte sunt. Verum paucae febricitarunt, & ex his valde paucae ad peripneumonicam affectionem deueniunt, atque hæc seniores, & omnes superstites euaserunt. Causabar autem hoc fieri, eo quod non similiter velut viri prodirent, & quod nequaquam similiter ut viri morbis corripiuntur.

Lusciosi pueri quid fierent.

Mulieres aliter uexabantur.

At Anginæ liberis duabus oboriebantur, atque hæc manifestissimi moris erant: abundantius autem famulas corripiebant, quibus & violentissimæ fiebant, ipsasque celerrime perimebant. Viris vero multis fiebant, qui partim euaserunt, partim perierunt. In summa, qui solum deglutire non poterant, his valde mites ac tolerati faciles erant. Qui vero etiam insuper obscure loquebantur, his molestiores ac diuturniores. Quibus vero etiam venæ circa tempora & ceruicem attollebantur, his aliquantum malæ erant. Pessimæ ve-

Anginæ uexatio.

ro his quibus & spiritus sublimis coeleuabatur. Hi enim etiam incallescabant. Nam sicut scriptum est, ita consortia affectionum habebant. Et quæ quidem primum scripta sunt, etiam sine posterioribus fiebant. Quæ vero posterius, non sine prioribus. Celerrime autem moriebantur, ubi febrili rigore insuper riguissent. His ita pressis nihil memorabile proderat, non ventris turbatio, non venæ sectio, neque quæcunque alia tentavi. Secui etiam venam sub lingua, quosdam & sursum purgavi. Hæc igitur omnino in ætate fiebant, sicut etiam eruptiones omnino multæ, & potissimum in siccitatibus lippitudines dolorosæ populariter grassabantur.

Posidonix. Sanguinis venarum suppressiones faciunt animi deliquiū, figura alterata, interceptio, linamentum intortum, appositio, deligatio. Inguinum glandularumque tumores plurimi fiebant, eo quod hepatitis affecta esset. Erat autem & ab arteria male affecta malum signum, veluti Posidonix. Quibus sanguis erumpebat. morientes fronte non exudarunt, sed velut contracti præ siccitate erant. Et anhelosi, ac cum sudoribus pereuntes, male habebant. Ventrū abundantia turbationem ferunt, velut Posidonix: & quæ animalcula in aluo inducunt. In attenuatione circumtensio ante obitum, & umbilicus oblongus ipsi protractus est: & gingivarum dentes ambientium exulcerationes. Multa de vnoquoque recte præcipi possunt, quæ partim eadem possunt, partim non: velut est talia diffundi, exolui, & educi, & indurari, & maturari, & ubi mutatione opus est, de lecto propellere timidos, & torpentes excitare ad ea quæ relinquunt.

Xenarchus. Hydropicos citius secare oportet, tabescentes statim vivere, caput secare, & huiusmodi. Hydropicorum pectinem ne contingito, neque internas partes. Simile est enim multis genibus. Affectiones circa cor siue ventriculi osculum Xenarcho, & calidum aceruatim expirare, & vlcus per euacuationem ab initio fouere. Vox qualis est irascētibz, si talis fuerit non irato, ex natura fuerit. & oculi tales fuerint ex natura turbulenti, quales sunt ubi irascuntur hi qui tales non sunt. Et alia iuxta morborum rationem, velut verbi causa, Morbus tabidam speciem inducit, si talis ex natura æger fuerit, ex tali morbo superstes euadet: & alia eodem modo. Tussēs laboriosæ contingunt locos læsos, & maxime

Tabes.
Tussis sicca.

A maxime articulos. Sed & in febribus lassitudinem inducentibus, tussis sicca ad articulos decumbunt cum febre, si intus relinquuntur. Spiritus tabescentibus obscuri mali, & non parientibus, & quicumque alij tales ab eadem constitutione. Tabescentibus autumnus malus. Malum item ver, quum fici folia cornicis pedibus similia fuerint. In Perintho vere plurimi ægrotarunt. Simul causa fuit tussis per hyemem populariter vagata, & aliis quicumque diurni sunt morbi. Nam & in ambiguis confirmati sunt. Quibusdam vero diurni non sunt oborti, velut his qui dolores rhenales habent. Sed & aliis, velut homo ille ad quem Cyniscus me adduxit. Dolorum in lateribus, & pectore, & aliis parti-

Perinthus.

B bus, tempora an multum differant considerandum est. Nam quum melius habuerint, rursus deterius habebunt, non delinquentes. In longis dysenteriiis cibi fastidia mala, tum alias, tum si insuper febrierint. Ulcera circumglabra maligna sunt. Lumbos dolenti recursus ad latus, & pustula quæ seps vocantur. Rhenum affectiones non vidi sanatas supra quinquagesimum annum. Quæ in somnis exacerbantur, & quibus extremæ partes perfrigerantur, & mens turbatur, & alia quæ circa somnum fiunt eiusmodi: & quibus contraria. Quibus nihil intra constitutum tempus accidit, singulis partus vitales fiunt. Apparentia in quibus mensibus fiunt.

Cyniscus.

C Labores in circuitibus, quicquid in septuaginta mouetur, in triplicitate perficitur: & quicquid in nonaginta mouetur, in triplicitate perficitur. Post menses, dextera & sinistra hiant. Humiditas per prodeuntia, diata sicca opus habet.

Quod citius discretum ac motum est, rursus augefcit tardius, & ad longins tempus. Labores tertio, quinto, septimo, nono mense: & secundo ac quarto.

Hæc ex parua tabula consideranda sunt.

Vitus ratio fit repletionem, vacuationem, ciborum, potuum. Mutationes horum qualia ex qualibus, prout se habent.

Odores delectantes, offendentes, implentes, placantes. Mutationes ex qualibus, prout se habent. Illabentes, ingressos aut egressos spiritus, aut etiam corpora. Sermones qui audiuntur, alij meliores, alij offendentes. Et à lingua ex qualibus qualia alliciuntur. Spiritus, tanta caliditas, fri-

HIPPOCRATIS LIBER VI.

tas, frigiditas, crassities, tenuitas, siccitas, humiditas, plenus, imminutus & copiosior, à quibus mutationes, quales ex qualibus, prout se habent. Continentia, aut contenta, aut intus permeantia corpora. Sermonibus, silentio, dicere quæ vult, sermonibus quibus dicit, an magni aut multi, veri aut conficti. Prodeuntia & egressa nosse oportet, unde coeperunt: aut ubi desuerunt, aut quātum diuisa sunt, itemque colores, in quibus aut caliditatem, aut falsuginem, aut dulcedinem, aut tenuitatem, aut crassiciem, æqualiter aut inæqualiter, corpus, tempus: Mutationes quales ex quibus habent. Incepit eructationem, non obtinuit. Lachrymæ volenti, nolenti, multæ, paucae, calidæ, frigida, crassities, sapor. Sputum an per se exscreet, aut tussiendo reiciat, itemque vomitum. Solis calor, frigus, humectatio, siccitas: Mutatio per qualia, ex quibus, ad qualia se habet.

Hippotho-
us.
Quæ ob-
seruanda.

Labores, ocia, somni, vigilia. Quæ in somno fiunt, insomnia, cubilia, & in quibus, & ex quibus. Mentis intelligentia ipsa per seipsam, citra instrumenta ac negotia, tristatur, lætatur, timet, confidit, sperat, desperat; velut Hippothoi domestica famula mentis suæ per seipsam gnara erat, & quæ in morbo acciderant sciebat. Aetatem ab ætate discernere oportet, & an prius aut posterius quàm conuenit, quid fiat. veluti si resolutus est hyeme, & seni ætate, aut infanti, & ætate aut prius, aut posterius quàm conuenit. Dentium emissiones, pilorum productiones, genitura magis & minus, pilorum augmentum, crassitudo, robur, imminutio. quod cognatum est, & quod per seipsam, quanto magis & minus.

Anni tempus, in quo & citius aut serius. Tempus in quo factum est, pluuiosum aut siccum, frigidum aut calidum, sine ventis aut cum ventis, & qualibus ventis. Temporis in principio, aut medio, aut fine, aut semper, præterito aut præsentē. Morbi tempus & hora, accidentia, circuitus, & ex circuitibus maiores, & per amplius tempus: incrementa, & totius morbi incrementum, remissio, vigor, & magis & minus perficiens, & quando, & qualiter, & in quali hora ac ætate.

Populariter grassantium morborum modi, & si quis ex incipientibus inceperit sine vomitu, veluti aut ubi biberunt quid continentes, aut parum purgati. Febriculosi fortassis valde candidi, quorum etiam labia, qualis modus, tempora.

Corpus,

Corpus, actio, in considerationem ducatur. Visus, auditus, natus, tactus, lingua, cogitatio consideretur. Tumores in supernis palpebris relictæ, dum alia circumcirca grassescunt, recidivas faciunt: In extremitate vero subrubicundæ, duri, & valde viscosi, & insurgentes ac inhaerentes in his sunt, velut Pharfalio Polymedi. Erumpentes tumores aut liuores, in lippitudinibus aut vlcerebus: Sed & quæ defecerunt ex tuberculis ac suppurationibus, quia signa sunt.

Circa mensem tormina circa vmbilicum, & dolores, quandoque à porro: Sed & ab alio his postea. Sacri ignes quibusdam à collo, & circa has partes, in facie iudicabuntur: Nigri etiam quibus à collo, mali erant: & si pustulæ essent, malæ erant: & quibus alius turbata esset. Adamantus atrabiliarius à peplis pluribus vomuit aliquando nigra, quandoque à cepis. Febres in quibus vlcerantur labia, fortassis intermittentes: & tertianis perfrigerationes. At amburentes statim ad manum solvuntur semper. Quale in articulis considerandum, an non suppurantur.

Consuetudo autem, ex quilibet sani degimus, victus modis, regumentis, laboribus, somnis, rebus venereis, mentis affectionibus. Quomodo morbos ferant, à quibus quæ figuræ, ad quos locos conuersi sunt, quando ceperunt, affuerunt, desuerunt. In quibus intemperans horrendus. Contrariæ in morbo victus rationes, qui facile, qui ægre toleratur. Victus rationes quantum fieri potest cognoscendæ. Nam non posse, multarum calamitatum res est. Bonis autem medicis similitudines pariunt errores ac difficultates. Verum contraria facit causa & occasio. Scio quod difficile est ratiocinari ac cognoscere vias, veluti si sit acuto capite, simus, subaridus, biliosus, ægre vomens, facile vomens, niger, iuuenis qui temere vitam degit: Hæc simul inter se consentire difficile est. Cui fistula resringeatur, tussicula permanere impediabant.

Cui apex hepatis complicatus erat, cum concussi, repente dolor sedatus est. Satyrus in Thaso cognomento Grypalopex vocabatur, hic quum annorum viginti quinque esset, sæpe per somnum semen effudit: & interdum quoque frequenter ipsi prodibat. Quum autem ad annum trigésimum peruenisset, tabidus fiebat, & mortuus est.

In Ab-

HIPPOCRATIS LIBER VI.

*Palæstræ
custos.*

In Abderis palæstræ custos, qui Stheneus dicebatur, multum luctatus aduersus fortio- rem, & in caput lapsus, digressus multam bibit frigidam aquam. Postea illa nocte vigilæ obortæ sunt, angustia, & extremarum partium frigiditates. Postridie ingressus ad domum, & glandula aluo subdita, non subiit, verum parum minxit, prius autem nihil minxerat: ad noctem lauit, nihilo minus vigilæ & angustia aderant. delirauit. Tertia die frigiditas extremarum partium, excalefactus sudauit. pota autem aqua mulsâ tertia die mortuus est.

*Melancho-
lici comi-
tialesq; cõ-
municant.*

Atrabiliarij, etiam comitali morbo corripì plerunque solent, & vicissim comitiales fieri solent atrabiliarij, Vterque vero morbus magis fit, prout ad alteram partem inclinarit. Si quidem enim ad corpus inclinarit, comitiales fiunt. Si vero ad animum, atrabiliarij melancholici dicti. In Abderis

*Phaethusa
Pytheas.*

Phaethusa Pythæ vxor, priore quidem tempore fœcunda erat: quum autem maritus ipsius in exilium abiisset, menses multo tempore suppressi sunt. postea dolores & rubores ad articulos oborti sunt. Hæc autem vbi contigissent, & corpus virile factum est, & hirsuta penitus euasit. & barbam produxit, & vox aspera facta est. Et quum nos omnia tentassemus,

*Mensum
defectu
moritur.*

quæ ad menses detrahendos conferre visa essent, non prodierunt, sed mortua est, quum non ita multo tempore postea

*Namysix
Gorgipp^o.*

vixisset. Idem hoc contigit etiam Namysæ Corgippi vxori in Thaso. Visum est autem omnibus medicis, in quos sanè ego incidi, vnam spem esse, si menses secundum naturam prodirent. Verum & huic prolici non potuerunt omnia nobis molientibus, sed paulo postea mortua est.

HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS POPVLARIB.

lib. VII. Iano Cornario

medico pbyfico

interprete.

Post



Ost canem febres fiebant sudorificæ, & non perfrigerabantur penitus post sudorem, sed rursus incallescabant: & leniter longæ, & iudicatu difficiles, & non valde fitticulosæ. paucis in septimo & nono desinebant, aliis vndecimo, & decimoquarto, & decimosextimo.

Canis fyd³

Polycrati febris, & sudor, qualis descriptus est: à medicamēto pur-

Polycratus.

gatio deorsum vehementer. & febris adeo lenis facta est, vt obscura consisteret, præterquam in temporibus. & sudores ad vesperam; circa caput, collum, pectus. Deinde rursus etiam per totum ventrem, & rursus incallescerebat. At circa duodecimū & decimumquartum febris aucta est, & modicæ alui subegestiones. post purgationem vsus est sorbitionibus. Circa decimumquintum dolores ventris iuxta splenem, & sinistram lateris mollitudinem. Calidorum appositio minus profuit quàm frigidorum. Quum infuso per clysterem molli vsus esset, cessauit dolor. Idem quoque Cleocydi profuit, ad dolorem similiter habentem, itemque febrem. Circa decimam sextam calores leniores esse videbantur, & egestiones bilis meracæ, & animus audacior. spiritus autem moderatus. Quadoque vero acervatim attractum, rursus acervatim expirabant, velut præ animi deliquio, aut velut in C umbra desidens respirare solet, is qui per æstum inter fecit. Decimasextima itaque die desidens in Yellam, animi deliquium incidit, & multo tempore sine voce ac sensu iacebat, & vix aquam mulsam suscipiebat, fibras in collo distendens, vtpote faucibus resiccatis, ac omni virium exolutione præsentente. Vix itaq; intra seipsum erat. & calores leniores fiebāt. Postea vero desuit morbus vigesima secunda die. Pythodoro eodem tempore febris cōtinua. octaua die sudor obortus est. & rursus incallescerebat. Decima rursus sudor. duodecima forbuit succum, & vsque ad decimā quartam obscura erat, in temporibus autem comparebat. & sine siti erat. & ipse sibiip- si sanus esse videbatur. Sudores fiebant omni die. Decima- quinta iusculum pulli sorbens vomuit bilem, & aluus infra exturbata est. & febris exacerbata est. rursus desuit. & sudores

Cleocydes

Pythodorus.

res

HIPPOCRATIS LIBER VII.

res fiebant multi. & corpus totum perfrigeratum erat, exceptis temporibus. Pulsus non defecit. Videbatur quiescere modico tempore ut incalescere se putaret. Vigesimaquarta quam iam gustaret cibos multis diebus, & pransus esset, multa erat febris, & ad vesperam delirium, accedente simul etiam somno. Detinebat itaque iam continua & vehemens, & quandoque unam, quandoque duas noctes vigilabat. reliquo vero tempore somnus abunde contingebat, ut operosum esset excitare. & delirium in somno. & si quando ex somno excitatus esset, vix ipse suipsum erat. Sitis exors. Spiritus moderatus, talis aliquando, qualis Polycrati. Lingua non decolor. Post septimam recidivæ succi exhibebantur. post decimam quartam cibis. Circa primos septem eructabat, ac reuomebat: quandoque cum potu subbiliosum, citra anxietatem, donec alius deorsum soluta est. Sudores post recidivam defecerunt, nisi quis circa frontem esset tantillus ut vix significationem de se præberet, lingua ex somno si non collueretur, subbalba præ siccitate. & ruptiones ulcerum circa ipsam, & in labio inferno, & circa dentes. alui egestionis paucæ. Circa decimam quintam ut recidiva facta est, frequentiores & viscosæ. Decoctum malicorij sedavit ipsas. Urinæ quales sunt diurnæ. Sub ultimum tempus dolor pectoris deglutienti potum. & manus in pectore. Cuminum & ouum absorbenti sedatus est. linguæ raritas profuit. Quinquagesima à prima circa arthrum, sudores breues iuxta lumbos & pectus. & corpus perfrigerabatur, exceptis temporibus, valde modico tempore. Prima & quinquagesima remisit. nec iterum apprehendit. Eratolai filii circa æquinoctium autumnale dysentericus fiebat, & febris tenebat. Egestionis alui erant biliosæ, tenues, multæ, & moderate subcruentæ. Dolor autem ventris vehemens. Vbi serum & lac bibisset, filice candefacta immissa, dolores & subcruentæ egestionis moderatiores fiebant, sed biliosæ comitabantur. & sæpe ad exonerandam aluum surgebat, sed minore dolore. Febricula vero & ægroto, & multis, omnino non adesse videbatur per omne tempus, post primos sex dies, adeo obscura erat. Verum iuxta tempora pulsus erat. & lingua præ siccitate subbalba. & moderate stuculosus, & sine somno. Sorbitionibus autem iam utebatur & vinis. Quam iam ad decimum quartum diem peruenisset, tubercula circa aurem oborta

Eratolai.

*Tubercula
aurium.*

A oborta sunt, tum alterā, tum vtranque, dura ac cruda: omnia
 disparuerunt, moderate autem dolorosa erant. Quum autem
 non desinerent egestionēs, & semper biliosę egestionēs & dolores ad tempus
 aliquod mitiores facti sunt. liquidas vero multas sæpe ege-
 rebat, & cibos valde auersabatur, & omni necessitate coactus
 admittebat. Calor autem, & lingua, & sitis tales sequebātur
 quales dicti sunt. & sudores nulli. Oblivio vero huiusmodi *Oblivio hu-*
 quædam. Vbi interrogasset de eo quod paulo antea audiuis- *ius quæ.*
 set, modico interposito tempore rursus interrogabat: & rur-
 sus repetebat, velut qui non dixisset, & se desiderare obliuiscē-
 batur, nisi quis ipsum commonefecisset. & ipse sibiipsum con-
 sciū erat huius affectionis, neq; ignorabat. Spiritus qualis fa-
B no. Vltra trigessimū vero vsque ad quadagesimū diem, &
 dolor ventris multum augeſcebat, & supinus decumbēbat, &
 se conuertere ne tantillum quidem poterat. & quia dolor
 vehemens erat, aliis qui cibum exhiberent opus habebat. Al-
 ui egestio erat multa, & discreta, tenuis, & calores vincsi, quę-
 cūque tandem ingeſſiſſet, & quandoque subruenti. & cor-
 poris dolor. colliquatio extrema, & impotentia. & ne alio
 quidem subleuante surgere amplius poterat. In medio vero
 umbilici ac ossis pectoris, circa hanc sedem adhibita manu,
 talis palpitatio erat, qualis neque à cursu, neque à timore
 circa cor generari possit. Bibenti lac asininū coctum, nouem
 heminarum Atticarum mensura ad duos dies, biliosa purga-
C tio vehemens oborta est, & cessauerunt dolores, & ciborum
 appetentia accessit. Postea vero bubuli lactis crudi quatuor
 heminas Atticas bibit, pro vice vna cyathos duos, in diem,
 primum sextam aquę partem ammiscens, & vini nigri austeri
 parum. Semel autem in die cibum capiebat ad vesp̄am. Pa-
 nis erat ad mensuram dimidię chœnicis subcineritius, & pi-
 sciculus petrosus simplex, aut cœruncula caprę aut ouiculę.
 Potus lactis post primos decem dies, ad quadraginta vsq; sine
 aqua, cum vini nigri modica parte. Post septuagesimū iam à
 primo diem, à balneo ad noctem, sudor exiguus obortus est.
 Vtebatur autem modico potu, & post cibum potu austerio-
 re. Ctesicrati lac in farina magis quàm serum caprinū con-
 tulit, quum dolor esset circa totum ventrem, & dolores cum
 multa ad egerendum surrectione, ac subruenta egestionē,
 & tumor

*Ctesicra-
tes.*

HIPPOCRATIS LIBER VII.

Adrianus.
Ceneas.
Cydes.

& tumor circa pedes, ferè iam ad dies vigintriquinque esset. Et Adriano eadem contulerunt. Verum Caneas filio lac asinum coctum. Cydis filio circa solstitium hybernus rigor & febris, & auris dextræ dolor, & capitis dolor. Talis autem auris dolor statim à paruo puero ipsum comitabatur, fluidus, fistulosus, & grauis odoris. Quum autem ita se haberet, plerunque doloris exors erat. Tunc autem dolor erat vehemens, & capitis dolor. secunda aut tertia die bilis vomitus. desidenti exonerandi ventris gratia, prodiit excrementum subbiliosum viscosum, velut ex ovo subpallidum. Quarta & quinta ad noctem aliquantum delirabat. & dolor capitis ac auris vehemens, & febris. Sexta alui egestio à mercuriali. & calor, & dolor cessasse videbatur. Septima velut sanus. In temporibus autè dolor non defecit. sudor nullus obortus est. Octaua succum sorbuit. ad vesperam autè betæ succum. & in noctem somnus. & valde doloris exors. & nona laborabatur ad solis occasum. Verum ad noctem capitis & auris vehemens dolor. Contigit quoque aurem pure manare circa hoc tempus quum maxime doleret statim à principio. Toti vero noctem nonam, & sequentem diem, ac noctis magnam partem, neminem noscebat. Verum suspiras perseverabat, in die vero intra seipsum erat. & dolores cessabant, & calor moderatior erat. Quum autem sorbuisset mercurialem, vndecima egressit per aluum pituitosa, mucosa, maleolentia, duodecima & decima tertia moderate habebat. Decima quarta initio mane factò, vsq; ad meridiem per totum corpus sudabat, cum somno & sopore multo, vt operosum esset ipsum excitare. ad vesperam expectatus est, & corpus quidem moderate perfrigeratum est, in temporib; autem pulsus perseverabat. decimaquinta & decimasexta succis vsus est. Decimaseptima venit rursus dolor eorundem ad noctem, & delirium, & pus fluebat. Decima octaua & decimanona ac vigesima, infani modo degebat. Vociferabatur autem attollere seipsum nitens, sed capiti dominari non potens, manibus protentis semper aliquid frustra venabatur. Prima & vigesima sudor exiguus circa latus dexterum, & pectus, & caput. Vigesima secunda sudor circa faciem plurimus erat. Voce autem hoc tempore, si quidem valde conaretur, quæ volebat perficere loquebatur. Si vero ex tempore citra conatum semiperfecta.

fecta. & os exolutum. & maxillæ & labia semper in motu, velut qui loqui vellet. & oculorum frequens motus ac intuitus. & color in dextro oculo velut dictum est, subcruentus. & palpebra superna intumuit. & iuxta maxillam rubor in fine. & venæ omnes in facie manifestæ adeoque contractæ. & oculis non amplius nictabat, sed intente intuebatur, & palpebras diducebat ad supernam partem, velut fieri solet vbi quid in oculum incidit. & quum biberet, descendens potus in pectora & ventrem strepitus audiebatur, qualis & Chartadi. Spiritus leniter semper moderatus. lingua qualis est peripneumonicis cum pallore albicans. ab initio & semper capitis dolor. Collum semper immobile vt vnâ cum capite circumageretur opus habebat. & pars secundum spinam ex collo recta ac inflexibilis. decubitus² quales dicti sunt, & non semper supinus decumbebat. At pus iam serosum album, multum negocij ad detergendum cum spongiis exhibebat. odor eius valde excellens, circa postremum tempus pedum contactum non valde percipiebat. Harpalidæ³ tiori prægnanti circa quartum aut quintum mensem, tumores circa pedes aquosi fiebant. & oculorum cauæ partes intumescabant. & totum corpus in tumorem eleuatum erat, velut in pituita alba affectis. tussis sicca. rectæ ceruicis spiratio, & eiusmodi anhelatio. & quandoque strangulationes à spiritu, vt sedens in lecto perseveraret. decumbere autem non poterat, sed etiam si qua somni expectatio esset, desidebat. Sine febre erat leniter. & fœtus ad plurimum tempus immobilis erat, veluti corruptus, & translabebatur. Comitabatur autem anhelatio ferè ad duos menses. At quum fabis melle ammixto, & eclegmate mellis vsa esset, & Aethiopicum cuminum in vino bibisset, melius habuit. Postea tussiendo eduxit multa, matura, pituitosa, alba, & spiratio illa cessauit. peperit autem foemellam. Polycratis⁴ vxori æstate circa caniculæ syodus febris. Spiritus matutinus minor, à meridie magis & paulo densior spiritus. Tussis & excreatio statim ab initio, similis purulenta. Intus circa arteriam & fauces subsibilabatur stridula asperitate. facies boni coloris. in maxillis rubor, non abunde coloratus, sed leniter floridus. Progressu vero temporis & vox rauca, & corporis colliquatio. & circa lumbos eruptiones. & alius circa postremum tempus li-

*Harpalidæ
de forore*

*Polycra-
tes.*

Aa quidiior.

HIPPOCRATIS LIBER VII.

quidior. Septuagesima die febris extrinsecus valde friguit. in temporibus autem quies. Spiritus vero frequentior fiebat. Verum post hanc quietem spiritus densior, adeo ut sedens perseveraret, donec mortua est. In arteria strepitus multus inerat. & sudores pravi. & intuitus valde modesti, usque ad extremum tempus. Dies acceperunt ipsi perfrigerata plures quam quinque. Post primos autem purulentum excreare perseverabat. Mulieri supra portas habitanti iam seniori febricula oborta est: quæ quum iam desineret, colli dolor usque ad spinam & lumbos, & harum partium non valde potens erat. Maxillæ erant compactæ. & dentes in se ipsos, plus quam ut specillum admitterent. & vox balbutiens, eo quod resolutum, & immobile ac debile esset corpus. prudens tamē erat. Calefactoriis & aqua mulsa tepida, tertia ferè die hæc laxavit, & postea succis & iusculis sana evasit, id quod ad finem autumnalis temporis contigit. Apud Harpalidem victor, crurum ac manuum impotētiō circa autumnum factus, bibit temere medicamentum sursum ac deorsum purgans. ex purgatione febris. & ad arteriam defluebat fluxor, qui loquentem impediret, & faceret ut inter loquendum anhelaret, similiter ut anginosus raucosus. Stragulatio deglutienti, & alia quæ in angina. Verum tumor non erat. Febris autem & tussis augebatur, & excreatio liquidæ ac multæ pituitæ. Progressu temporis & dolor circa pectus ac mammam sinistram. Quum autem exurgeret, aut commoveretur, anhelatio multa, & sudor à fronte & capite. & faucium affectio mollior erat, dolore ad pectus descendente. Ab initio igitur fabis melle ammixto utebatur. Postquā autem febres detinebant, magis aceto mulso calido, & mellis delinctu multo. Vbi præterissent dies quatuordecim omnia desinuerunt, & manuum ac crurum non longe postea potens factus est.

Chartadi febris ardens, vomitus bilis multus, & infra alui egestio. vigilæ. & iuxta splenem tumor rotandus. Tertia die mane surrexit, strepitu circa ventrem citra dolorem percepto. Vbi vero aluum exoneraret, sanguinis recentis plus quam congiij mensura subiit. & vbi iterum atque iterum cohibuisset, grami cœcreti. anxietas circa cor & os ventriculi & sudor per totum ferè corpus. & febricula frigescente videbatur. & primum prudens erat, progrediente vero die, &

Vetula lū
guens c-
uasit.

Victor.

die, & inquietudo maior, & anxietas, & spiritus paulo densior. & confidentius ac benignius quàm pro tempore homines compellabat, ac excipiebat. & quædam animi deliquia accedere videbantur. Quum autem exhiberent aliqui iaccos, & aquam de farina crassa in ipsa macerata, non cessauit: sed spiritus, ad vesperâ valde multus erat, & iactatio multa, & ad dextera, & ad sinistra transinuens seipsum nullo tempore quiescere poterat. pedes frigidi. In temporibus & capite calor magis propinqua iam morte. & sudores multi. & bibenti strepitus audiebatur, circa pectus & ventrem, descendentis potus. Quod vero pessimum erat, vbi dixisset sibi aliquid infra subire velle, & oculis intente intuitus esset, non diu se cohibens mortuus est. Hermoptolemi vxori hyemis tempore febris. & capitis dolores. & quum bibisset, vt quæ difficulter deglutiret, surrexit, & cor se sanasse dixit. lingua liuida ab initio. Occasio videbatur ex horrore post balneum facta esse. Vigilabat & nocte & die. Post primos dies interrogata, non adhuc solum caput, sed & totum corpus se dolere dixit. Sitis quandoque vehemens, quandoque moderata. Quinta & sexta & vsque ad nonam fermè deliryû. & rursus ad seipsam loquebatur semiperfecta cum sopore. & aliquando manum ad dealbatum parietem protendebat, & puluinum quandam frigidum ad caput situm, etiam pectoribus adhibebat. & stragula quandoque reiciebat. & in oculo dextro subcruentum quid erat. & lachrymabatur. Vrina autem erat quæ in pueris semper pessima est. Ex aluo egerebat ab initio quidem subfulua. postea vero aquosa valde, & huiusmodi coloris. Vndecima moderatius calida esse videbatur. & quandoque sitis exors fiebat, adeò vt nisi quis dedisset, non peteret. Somni post primum tempus contingebant moderate interdiu. ad noctem vigil erat. & ad noctem magis dolebat. Nona venter exturbatus est aquosis excrementis. Similiter etiam vndecima. Sequentibus vero moderate multum ad egerendum surgebat, & talis egestio erat. Erant autem in prioribus diebus indignationes & ciulationes, velut pueri, & vociferatio, & timores, & circumspectiones, vbi sopore excitata esset. Verum decimaquarta operosum erat ipsam continere exilientem ac clamantem derepente & pertinaciter, velut ex plaga, & vehementi dolore ac timore, velut si quis ipsam

Hermoptolemos.

HIPPOCRATIS LIBER VI I.

apprehensam modico tēpore detineret. Deinde rursus quies-
tem habebat, & sopore pressa dormiens perseverabat omni-
no non videns, quandoque neque audiens. & totam hanc
diem ad utrunque, modo ad tumultum, modo ad quietem
transmutabat. Sequenti nocte per alium subiit quid crur-
enti, velut mucosum: & rursus velut limosum: postea prasi-
na valde ac nigra. Decimaquinta repentinæ iactationes, & ti-
mores, & vociferatio lenis fiebat. Sequebatur autem efferati-
o, & indignatio, & eiulatio, nisi ipsi cito quod vellet porre-
ctum esset. & cognoscebat quidem omnes & omnia statim
iam post primos dies, & oculi subcructum illud sedatum est.
Verum insania iuxta temporis occasionem, & vociferatio, &
mutatio prædicta sequebatur ad soporem. audiebat inæqua-
liter, aliqua valde, & si submisso quis loqueretur: aliqua ve-
ro clarius eloqui oportebat. Pedes semper æqualiter cum re-
liquo corpore calidi. vsque ad extremos dies. Verum deci-
ma sexta minus. Decima septima moderatius quàm aliis die-
bus habens, ad noctem horrore ipsi oborto, se cōtrahens ma-
gis febricitabat. & sitis multa erat. reliqua similia sequeban-
tur. Tremores autem circa manus fiebant. & aliquantum cō-
cutiebat caput. & oculorum intuitus pravi. & sitis vehemēs,
vbi bibisset rursus postulabat, & rapiebat ac large bibebat.
neque auellere ipsi poterant. lingua sicca, valde rubicunda.
& os rotum ac labia ulcerata erant ac sicca. & ambas manus
ad os admouens manducabat quum tremula esset. & si quis
aliquid ad manducandum aut sorbendum obtulisset, large ac
furiose deglutiebat ac sorbebat. & signa circa oculos mala.
Diebus autem tribus aut quatuor ante obitum, horrores
quandoque incidebant ipsi, adeò vt contraheret corpus, &
contergeretur, & anhelaret. crura distendebantur, & pedes
frigidi erant. Sitis similis. & mentis affectiones similes. &
surrectiones ad egerendum aut inanes, aut paucis & tenui-
bus prodeuntibus, cum modica quadam tensione. Postrema
tertia & vigesima, oculus magnus inane erat, & circumspe-
ctio brevis. & quietem agebat, quandoque etiam absq; con-
tentione ac sopore. Ad vespēram vero dextri oculi motus,
qualis videntis, aut aliquid volētis, ab externo angulo ad na-
sum. cognoscebatque & interroganti respondebat. Vox post
multa sublata, & præ vociferatione fracta ac raucosa.

Amphiphradis

A Amphiphradis filio ætate lateris sinistri dolor, & tussis. *Amphiphrades.*
& alui egestionēs multæ, aquosæ, & subbiliosæ. & febris cessasse videbatur circa septimam. Tussis aderat. Color subalbidus ac subpallidus. Circa duodecimam cum virore subpallidum spuebat. Spiritus pgressu morbi semper densior, & anhelatio, & stridula asperitas circa pectus & arteriam. Sorbitionibus utebatur, prudens per omne tempus. circa vigesimā octauam mortuus est. Sudores quandoque fiebant foras.

Caupo peripneumonicus. alui statim subibat. Circa quartam sudor multus. febricula cessasse videbatur. tussicula nulla, vt ita dicam. Quinta, sexta & septima detinebat febris. sudor octaua. Nona excreauit pallidum. decima subibat alui acruatim non sepe. circa vndecimam mitius habebat. *Caupo.*

B Decimaquarta sanus. Hermoptolemo post pleiadis occasum febris accessit. Tussis non valde. lingua peripneumonica. nona exudauit. totus frigefactus est, velut videbatur. obtulerunt ipsi succum. circa meridiem calescebat. Vndecima sudor. & alui erupit biliosis egestionibus. Tussicula accessit. Decimaquarta pallidum excreauit. & stertebat. Decimaquinta quum per totum tempus prudens mansisset, mortuus est. Alius quidam in palato stertens. lingua sicca, peripneumonica, prudens mortuus est. Et Posidonius ad huc ætate instante, iuxta pectus, & præcordia, & latus, multo tempore dolebat, citra febres. Multis autem annis antea suppuratus fuerat. hyeme vero quum inhorruisset, dolor augescebat. & febricula tenuis. & excreatio purulenta. tussis cum stridula asperitate circa fauces. & stertens, quum prudens esset mortuus est. *Hermoptolemos.*

C Balis filius quum ex monte penitus aberrasset, sexta lingua praua, subrubra. & vocem læserat inter aberrandum. oculi colorati, natantes velut dormitantium. color reliqui corporis non valde velut in morbo regio, sed subpallidum, liuidum. vox praua. lingua obscura, peripneumonica. non prudens. Spiritus ad manum malus, non densus, neque magnus. frigidi pedes lapidosi. Circa nonam mortuus est. Quædam apud Metronem anginosa, dexteram manum ac crus doluit. Febricula tenebat debilis. suffocatio die tertia remisit. Septima conuulsa. vox intercepta. *Posidonius.*
Stertor. dētium collisio ac confertio, maxillarum rubor. Hæc non longe vitam protraxit, quinta aut sexta mortua est. *Anginosus perit.*

HIPPOCRATIS LIBER VII.

- Bion hydropicus.** gnum circa manum subliuidum. Bion ex hydropico diuturno cibum auersabatur ad multos dies. & vrinæ stillicidio vexabatur. In sinistro genu abscessus fiebat. suppuratus est. mortuus est.
- Ctesiphon** hydropicus ex febre ardente multa, & prius hydropicus ac splenicus, valde repletus est & scortum, & crura, & peitonæum membranam aluum ac intestina ambientem. Ad finem tussis & suffocationes fiebant ad noctem, magis à pulmone, velut pulmonicis ac tabescentibus. Tribus aut quatuor diebus ante diem obitus, rigor. febris. circa femur dextrum intus ad venam mediam ab inguine collectio velut ignis feri, subliuidum habens ruborem. ad noctem cordis ac oris ventriculi dolor. & non longe postea vocis interceptio. strangulatio cum stertore. & mortuus est.
- Et in Olyntho hydropicus, derepente voce priuatus, noctem & diem desipiens, mortuus est. Prodromi filius, æstate subblæsus, æstuosus. lingua ipsi subarida, obscura. egestio alui deorsum multa. Superstes euasit.
- Leophorbide.** Leophorbida febris acuta post solstitium hybernæ præcordiorum & ventris dolor alui egestionem liquidæ, biliozæ, multæ. & interdum soporosus. lingua peripneumonica. tussis non inerat. Duodecima nigra pauca & præsina egestit. Decimaquarta febricula cessasse videbatur. Postea vero sorbitionibus utebatur. Decima sexta os valde fæluginosum siccum fiebat. ad summam vespæram horror, febris. Vigesima prima circa meridiem rigor, & sudor. febris desinit. verum calor adhuc suberat tenuis. ad noctem rursus sudor. & vigesima secunda ad noctem sudor. & calor remittit. At prioribus diebus omnibus sine sudore erat. Aluus autem humecta fuit etiam in putata postea recidiua. Quæ superne habitabat Theoclis cognata, sub pleiadas febris acuta. sexta videbatur cessasse. lauit velut febre sedata. septima mane maxilla valde rubicunda, vtra non memini. In vespæra febris venit multa. & animi deliquium, & vocis interceptio erat. non longe vero postea sudor, & quies cessante morbo septima die.
- Theodor.** Theodori uxori in febre vehementi sanguinis eruptio facta est, hyeme. ubi febris desisset circa nonam, non longe postea, lateris dextri velut ab vtero grauitas. Sed & primū, & sequētibus diebus, obortus est dolor vehemens iuxta pectus. & fomento ad latus dexterum adhibito, remiserunt dolores quarta die. spiritus densior.

Adēſor. arteria vix respirans ſubſibilabat. & ſupina difficulter ſevertere poterat. ad noctem febris acutior, & delirium breue fiebat. Quinta mane mitior eſſe videbatur, ſudor de facie diffundebatur primum modicus: deinde multo tempore per totum corpus ac pedes. Poſtea vero videbatur ipſi febris remiſiſſe. Erat autem ad manum frigidius corpus arteriarum. Quæ vero in temporibus ſunt etiam magis ſaliebant, & ſpiritus denſior, & aliàs atque aliàs delyrabat. & omnia ad deterius: lingua perpetuo alba valde; & tuſſis non inerat, niſi tertia ac quinta die ad breue tempus. Sitis non erat. Sputatio erat. Præcordium dextrum valde eleuabatur circa quintam. verū poſtea mollius. egeſtio tertia die à balneo ſtercoris modici. Quinta rursus liquidi modici. Venter autem mollis. Vrinæ acerbæ, cineris ſpeciem referentes. oculi velut deſaſſate difficulter ſuſpiciebat ac circūferebat oculos. Quinta ad noctem ægre affecta fuit, & delirium ſequebatur. Sexta rursus eadē hora qua plenum ſolet eſſe forū, multus ſudor diffundebatur, incipiebat à fronte ad totum corpus. ad multū tempus prudenter res ſuas disponebat. ad meridiem vero valde delyrabat. & perfrigeratio ſimilis erat. omnia vero circa corpus grauiora. Ad vespērā tibia ipſius ex cubili decidit, & puer præter rationē minabatur, & rursus ſilebat, & ad quietem conuertebatur. Circa primum ſomnum ſitis multa, & inſania, & erecta ſedebat, & præſentibus conuiciabatur. & rursus conticuit, ac in quiete erat. & videbatur reliquum noctis ſopore preſſa eſſe. Verum oculos non clauāt. Ad diem indicabat præque nutibus, corpore quieſcens, & moderate intelligens. Sudor rursus eadē hora. ſimiliter oculi demiſſi, ad infernam palpebram magis incumbentes, rigide ac ſtupide intuentes. alba oculorum partes pallidæ & mortiferæ. & totum corpus pallidum ac nigrum. manum plerunque ad parietem, aut ad ſtragula habebat. ſtrepitus autem bibenti magni fiebant, reſpuebat, & ſuſum ad naſum abſorbebat. & floccos legebat. & faciem obuelabat. Poſt ſudorem manus velut in glaciē congelatæ. ſudor ſequebatur frigidus. corpus ad manum frigidum exſiliebat, vociferabatur. inſaniebat. ſpiritus multus. manus tremulæ fiebant, ſub mortem progreſſæ iam etiam conuulſæ. ſeptima die mortua eſt. Sexta die in nocte ſtratum modice perminxit, quod minxerat de feſtucis deſtrahebatur, viſcoſū,

Aa iij genituræ

*Antipha-
nes.*

genituræ simile. Vigilabat per omnes dies. post sextam vna subcreuenta. Antiphanis filio hyeme, lateris dexteri dolor, tussis. febris. edebat, deambulabat etiam febriens. Videbatur ruptio facta esse. nona remisit. febris non reliquit, tussis multa. & crassa ac spumosa spuebat. latus dolebat. Circa decimam quartam & rursus vigesimam febres desinere videbantur, & rursus corripiebant. erat autem calor tenuis, & parum quid relinquebat. Tussis quandoque deficiebat, quandoque abundabat, cum multa suffocatione. Tunc vero remittebat. & excreatio post hos dies multa, cum strangulatoria tussi. & purulenta supra vas efferuentia ac spumantia prodibant. & in faucibus plerumque stridula asperitas subsistebat. anhelatio semper detinebat, & spiritus densior. raro bene spirabat. Ultra quadragesimum diem, prope sexagesimum opinor, oculus sinister excæcatus est, cum tumore, sine dolore: nec longe, postea etiam dexter. & pupillæ valde albæ ac siccæ fiebant. & mortuus est post excæcationem, non progressus ultra septem dies, cum stercore ac multa deliratione.

*Theffalio-
polemar-
chos.*

Similia & ex similibus eodem tempore cõtigerunt etiam Theffalioni. feruentia, & spumantia, & purulenta. & tusses, & stridulæ asperitates. Polemarchi uxori hyeme anginosus tumor sub gutture. febris multa. vena secta est. cessauit strangulatio ex faucibus. febris comitabatur. Circa quintam genu dolor & tumor sinistri, & circa cor dixit sibi videri aliquid colligi. & respirabat velut respirant, hi qui sub aquâmersi fuerunt. & ex pectore substrepebat, velut qui concluso ore loquuntur, engastrimythi, quasi ex ventre loquentes appellati. Tale quid contingebat. Circa octauam aut nonam ad noctem aluus prorupit, ac liquida multa, æceruata & graueolentia egressit. vox intercipiebatur. Mortua est.

Aristippus

Aristippus in superno ventrem violenter ac grauiter sagittæ ictu petitus est, ventris dolor vehemens. & breui ardebat. deorsum vero nihil egerebat. anxius erat. biliosa abunde colorata quum vomisset, melius habere videbatur. Paulo post dolores rursus vehementes. & venter similiter ardebat, velut in voluulis. calores & sitis. in septem diebus mortuus est.

Neapolis.

Neapolis percussus similiter, eadem passus est. acri infuso per clysterem immisso, aluus deorsum erupit. color per corpus diffusus est tenuis, pallidus, niger. oculi squallidi, stupore rigidi, intus conuersi,

A conuerſi, intente intuentes. Ei qui in hepar percuſſus eſt iaculo, ſtatim color qualis eſt mortuorum per corpus diſfuſus eſt. oculi caui. anxietas, moleſtia. Mortuus eſt prius quàm conſolueretur, in qua die percuſſus eſt. Qui caput percuſſus eſt lapide à Macedone ſupra tempus dextrum, ita vt fiſſura ſaltem facta diſſectio contigiſſet, vertigine affectus eſt & cecidit. Tertia die voce deſtitutus erat. anxietas. febris non valde vehemens. pulſus in temporibus velut tenuis caloris. nihil audiebat, neque ſapiebat, neque quieſcebat. humiditas circa frontem, & ſub naſum, uſque ad mentum. Quinta mortuus eſt. Eniates in Delo iaculo percuſſus eſt retrorſum in latus, iuxta ſiniſtram partem. vlcus quidem ſine dolore. Verum tertia die ventris dolor paruus. non egerebat. inſuſo per clyſterem immiſſo, ſtercus prodibat, & dolor deficiebat. ſedes extra ad ſcrotum extabat. quarta die etiam ad pubem, & totum ventrem, dolor vehementer irruerat. quieſcere non poterat. bilioſa vomuit abùde colorata. oculi cum virore pallidi, quales in animi deliquiis. Poſt quintam mortuus eſt. Erat autem calor quidam tenuis in ipſo. Billo percuſſo in dorſum, ſpiritus multus per vulnus cum ſtrepitu prodibat, & ſanguinem fundebat. Verum deligatus emplaſtro cruentis vulneribus commodo, ſanus euafiſt. Contigit & infœliciffimo Philes filio, denudatione in fronte facta, nona die febris. Deinde liuefactum eſt os. mortuus eſt. Et Phanix & Euergetæ filio, liuefactis oſſibus, & febricitantibus, cutis ab oſſe diſceſſit. & pus ſubtus depaſcebatur. His dum perforarentur, ex ipſo oſſe egreſſa eſt ſanies tenuis, ſeroſa, ſubpallida, graueolens, lethalis. Contingit autem talibus etiam vomitus accedere, & ad finem conuulſiones: & vt clangoroſam vocem edant, ac impotentes fiant, & ſi in dextris fuerit vulnus, in ſiniſtra parte: ſi vero in ſiniſtris, in dextra. Theodori filio nona die in ſole verſato, febris acceſſit decima die, ex denudatione iuxta os nullius momenti. In febre vero denudatum eſt. diſceſſit cutis. multum clangoroſus erat. Vigefima ſecunda venter eleuatus eſt maxime circa præcordia. Vigefima tertia mortuus eſt. Quibus oſſa fracta fuerint, his ſeptima die febres. Si vero calidius fuerit tempus, etiam citius. At ſi magis fracta fuerint, etiam euēſtigio. Et Exarmodi ſamulus ſimiliter dolorem habebat ad ſcēmur, non è directo

Eniates.

Billo.

Phanias
Euergetes.

Theodor⁹

Exarmod⁹

HIPPOCRATIS LIBER VII.

recto vulneris . & factus est clangorosus . & colli erat dolor .
Posidocreo Et Posidocreon tertia conuulſio . calor non relinquebat .
Iſagoræ. mortuus eſt die decimo octauo . Iſagoræ filius percuſſus eſt
retro in caput , conuulſo oſſe ac nigrefacto quinta die ſuper-
Nauiſtes ſtes euasit . os autem non diſceſſit . Magnæ nauis gubernatori
chor. anchora digitorum medium , & os dextræ manus confrigit .
inflammatio ſucceſſit . & marcor . & febris . ſubpurgatus
eſt . quinta calores moderate remiſerunt , itémque dolores .
de digito quid decedit . Poſt ſeptimum diem ſanies exhibet le-
niter . Poſtea per linguam dixit ſe non omnia poſſe enun-
ciare . Prædictio facta eſt opiſthotonum aduentare . Ad hoc
conferebant maxillæ conſertæ , & ad colum rigidæ . Ter-
tia die totus conuellebatur in poſteriorem partem , cum ſu-
Harpalus. dore . Sed à prædictione mortuus eſt . Harpali filius ex li-
berta Telephane , luxationem infra in pede magni digiti ac-
cepit , inflammatus eſt , & valde doloroſus erat . & ubi repo-
ſitus eſt , & dolor remiſit , proficiſcebatur ad agrum . rediens
lumbos doluit . lauit . maxillæ ad noctem conferebantur . &
opiſthotonus aderat . ſaliua ſpumofa vix per dentes foras pro-
dibat . Tertia die mortuus eſt .
Thrinon. Thrinon Damonis filius , habebat circa tibiā aut malleolum vlcus , iuxta neruum
iam purum . Huic à pharmaco corroſo contigit , vt opiſtho-
Menon. tono moreretur . Menoni ſub arturum & prius , ex febre
æſtīua , & alui profluuiio ægre affecto , & ex itinere deſaſſa-
to , dolor lateris ſiniſtri . & tuſſis quæ ex deſtillatione quidem
etiā prius aderat , verum tunc valde intenta erat , & vigila-
bat . & febrem ſtatim ab initio ægre ferebat . & erectus ſe-
dens tertia die ſpuebat pallidum . arteria ex ſtertore ſubſibi-
labat . Circa quintam ſpiritus moderatè denſus . pedes tibiæ ,
extremæ partes plerunque frigidæ , & extra ſtragula . alui e-
geſtio ab initio fiebat bilioſa , neque valde modica , neque
multa . ſeptima , octaua , & nona , leuius ferre videbatur , &
ſomni aliquid contingebant . & quæ exſcrebat crudiora e-
rant . decima , & vſque ad decimam tertiam , alba & pura . &
præcordium mollius fiebat . ſiniſtrum tamen diſtentum . &
melius ſpirabat . Subdita glande moderate alius ſubiit . Deci-
matertia rursus pallidum ſouebat . Decima quarta magis . De-
cima quinta pralinum . Alius autem maleolentia , bilioſa , li-
quida , multa demiſit . ſiniſtrum præcordium eleuabatur . De-
cima-

- A cimafexta autem etiam valde intumuit. & spiritus iam stertorofus. sudor circa frontem & ceruicem, raro ad pectus. extremæ partes, & frons, leniter permanebant frigida. Saltatio vero venarum circa tempora detinebat. Somni soporosi noctem ac diem postremo tempore. Vrina ab initio cruda, cineris speciem referens. Circa decimā, & vsque ad decimam tertiam tenues, & nō decolores, Verum à decimatertia quales ab initio. Cleocho lateris dolor & febris. remisit febris, Cleoachus sudauit per totum corpus. In vrina multa erant quæ ferebantur ac innatabant. postea turbata est. Circa Pleiadum occasum Olympiadæ uxorem, foetum octimestrem gestantem, ex casu febris acuta corripuit. lingua æstuosa, sicca, aspera, pallida. oculi pallidi. & corpus mortiferū. foetus corruptus quinta die facile liberata est. & somnus ut videbatur soporosus. vesperi excitantes non sensit. sternutatorium adhibitū percepit. potionem suscepit & succum. deglutiens potionem aliquantum tussit. vox non soluebatur, neque ipsa quicquam alleuabatur ex morbo oculi tristes ac submissi. spiritus sublimis per nasum trahebatur. color prauus. sudor circa pedes, & crura, ubi iam morti propinqua esset. mortua est. Nicolai concubinæ ex febre ardenti, abscessus iuxta horam fiebant ab utraque parte, paulo posterius alter, quum iam febris remittere videretur, velut tumor laxus. Circa decimum quartum magni citra signa sedati sunt. recidiva facta est. Color qualis mortuorum, lingua aspera, valde densa, subalbida. Siticulosa. alui egestio deorsum multa, liquida, male olens per omne tempus. Ante finem corruptum est corpus præ multitudine egestionis. Mortua est circa vigesimum diem. Andreae ante pleiadem horror, febris, vomitus. Ab initio semitertiana apparebat. Verū tertiana erat. Quum rursus in foro versaretur, inhorruit. febris acuta. vomitus bilis meracæ. delirium ad noctem. quarta rursus melius habebat. Quinta difficulter. Sexta à mercuriali probe egeffit aluus. Septima difficiliter & sequentibus iam diebus febris magis continenter affligebat, & sine sudore ab initio, & siticulosa. Maxime vero os resiccabatur, & potionem nullam libenter admittebat, quum multa inincūditas circa os esset, lingua sicca, inarticulata, asperitas efflorescebat, cum pallore albicans. Vigil, anxius. exolutus, fractus, lingua præ siccitate quādoq; subblasa, donec madesecisset,

Nicolaus.

Andreas.

HIPPOCRATIS LIBER VII.

defecisset. succum maxime admittebat. Nona aut decima circa aurem sinistram, atque etiam alteram, tumores parui citra signa apparuerunt. Urinae semper non decolores, verum sine subsidentia. Decimaquarta sudor circa supernas partes non multus, sed moderatior. Calor circa decimamseptimam euauit. Alius post decimam sicca, citra glandem subditam non egerens. Circa vigesimam quintam pustulae per totum corpus pruriginosae calidae, velut igne ambusta. Dolor autem erat circa locos sub aliis, & latera: transiit ad crura citra signa, & defuit. Balneum proderat & unguenti illitio cum aceto. Mense vero secundo aut tertio fortassis, ad rhenes dolor, qui etiam antea quandoque fuerat, sedatus est. Aristocrati circa solstitium hybernium lassitudo, & horror, & calor. Postea tertia die incepit lateris dolor itemque lumborum. & tumor sub alis initium sumens, per totum dextrum latus durus, rubicundus, luidus, velut ab igne calefactus & inustus. anxius. omnia moleste ferens. valde siticulosus. lingua subalbida. Urinae non procedebant. crura subfrigida, alui egestio à mercuriali modica, liquida, subalbida spumosa, ad noctem spiritus eleuabatur. sudor circa frontem, partes infernae frigidae. collum inflabatur. tussis non inerat. mortuus est prudens. Onesiacti circa autumnum lippitudo. postea vero febris quartana. Incipiente quartana cibos valde auersabatur, in progressu vero libenter accipiebat. Sed & Polychari in quartana, similia circa cibum accidebant. Mnesianaxi alui egestio ante febrem, & postea, ad multum tempus sequebatur, multisque albis mucosis prodeuntibus: & quandoque paucis sanguine, citra dolorem. Strepitus autem in ventre. Post febrem abscessit circa sedem tuberculum durum, quod multo tempore inconcoctum comitabatur. erupit ad intestinum, & foris fistulosum fiebat. Deambulante vero ipso in foro, splendores praeculis obuersabantur, & solem non valde videbat. Quum autem parum discessisset, extra seipsum erat. & collum conuulsum est. Postquam autem domum deportatus est, vix suspexit, & ipse vix suiipsum erat. Primum autem collustrabat circumstantes. & corpus perfrigeratum est. vix vero recalcatus est vtriculis & fomētis adhibitis. Postquam autem ipse intra seipsum esset, & exurgeret, non volebat exire, sed timere dixit. Si vero quis de grauibz morbis differeret, subducebat se prae

Aristocrates.

Onesiactus.

Polychares.

Mnesianax.

A se pre timore. Quandoque etiam caliditatem sibi ad præcordia allabi dixit, & oculorum splendores comitari. & alui egestio multa, & sæpe, & similis hyeme contigit. facta est venæ sectio, datum est veratrum. bibit lac bubulum, prius autem asininum. contulit, & alui egestionem sedauit. Aquæ potus ab initio. deambulationes quoque & capitis purgationes. *Anechētes.* Anechēti filio hæc contigerunt. hyeme in balneo dum vngeretur ad ignem, calefactus est. & statim in comitiales conuulsiones incidit. Postquam vero multæ factæ essent conuulsiones, circumspexit. non apud sese erat. quum autem intra seipsum esset, rursus postridie mane correptus est ac conuulsus. spuma non valde. Tertia lingua inarticulata. Quarta per linguam significabat. Quinta loqui non poterat, sed in principis nominum hærebat lingua valde. & conuulsio fiebat. & extra sese erat. Quum vero hæc remitterent, lingua vix in suum statum restituebatur. Sexta abstinere ab omnibus, & forbitione, & potu. & à nulla amplius affectione corripiebatur.

Cleocho ex lassitudinibus ac exercitiis melle per dies aliquot videnti, tumor ad genu dextrum obortus est. Immo potius ad infernam partem circa tendines sub genu. circumibat subclaudicans. & sura intumescerebat, ac dura erat, & ad pedem, & ad malleolum dextrum. & tubercula ad gingiuas circa dentes magna, velut vux acini, liuida, nigrescens, doloris exortia, ubi cibum non caperet. Sed & crura doloris exortia erant, si non exurgeret. Venit enim & ad sinistram tumor, verum minus liuescebat. In tumoribus circa genua ac pedes velut suppuraciones erant. Tandem vero fieri non poterat, ut staret, aut calcaneis insisteret, sed in lecto decubebat. Calores manifesti, quandoque cibum auersabatur. non valde siticulosus. neque ad sedem surgebat. anxius. & quandoque etiam pusillanimitas tenebat. veratrum exhibitum est, & capitis purgationes. Ad os pharmacum ex manna thuris, cum aliis ammixtis profuit. Ad vlcera in ore, forbitio lenticulæ commoda erat. Circa sexagesimam sedati sunt tumores à secundo veratro. dolores tantum ad genua decumbenti venerunt. Humor autem & bilis abcessit ad genua, etiam pluribus diebus ante veratrum. *Pisistratus.* Pisistrato humeri dolor, & grauitas diuturna deambulanti & alias sano. hyeme vero incidit multus lateris dolor, & calor, & tussis. & excretio sanguinis spumosi. & in fau-

HIPPOCRATIS LIBER VII.

Simon.

Euxenus.

Polemarchus.

Hegesipolis.

& in faucibus stertebat. Verum facile ferebat, & apud seipsum erat. & calor remissus, simulque & excreatio, & stridula asperitas. & circa quartam aut quintam diem sanus. Simonis uxori in partu concussa dolor circa pectus & latus, tussis, febres, excreationes purulentæ, tabes, ad sex menses febres. & alui profusio semper. Ad finem febres cessauerunt, post cessationem substitit aluus, & post septem dies mortua est. Euxeni uxorem ex fomentis ut videbatur, calores nullo tempore relinquebant, magis tamen ad vesperam augetur. sudores fiebant per totum corpus. Febre ad augmentum tendente frigiditas pedum, quandoque etiam tibiarum & genuum fiebat, tussicula sicca ad modicum tempus, febre exacerbari incipiente, deinde cessabat. per multum autem tempus etiam totius corporis rigor fiebat. Sitis exors semper. Vbi medicamentum bibisset, & serum, magis lasa est. Ab initio omnino sine dolore erat, & bene spirabat. Medio vero tempore lateris dextri dolor fiebat, & tussis commota est, & anhelatio, & excreationes parua alba ac subtenuis, & horror non amplius expeditibus, sed de collo & dorso. & aluus liquidior, remissit febris cum multo sudore, & perfrigerata est. Anhelatio vero erat varia, mortua est post remissionem septima die quum esset mente prudens. Polemarchi uxor ætate incepit febrile, dimisit autem ipsam febris sexta die, titubans obambulabat, ad noctem calores. Rursus interposito tempore corripuit febris, & non dimisit tribus fere mensibus, tussis multa, excreatio pituita. Postquam vero viginti durasset diebus, spiritus semper densus, in pectore strepitus, plerumque sudor, mane febris mitior, & horrores quandoque corripiebant, somni fiebant, & aluus aliquando humectabatur, & rursus restitabat, moderate cibum gustabat. At medio tempore ad genua & tibias dolor, & ad flexendum ac extendendum alio opus habebat. Perseuerabant crurum affectiones usque ad finem iam propinquum & intumuerunt pedes usque ad tibias. & ad contactum dolebat, & sudores ac rigores deseruerunt, Febris autem semper intendebatur. Ante obitum aluus erupit, prudens permanebat. Tribus ante obitum diebus, in faucibus stertebat, & spiritus reuertebatur. Mortua est. Hegesipolis filius quatuor fere mensibus dolorem circa umbilicum corrodentem habebat. Progressu temporis augebatur dolor. Percutiebatur ventris vellicabat.

A vellicabat. calores corripiebant. contabescebat. ossa reliqua
 erant. pedes tumeabant. Testes, venter, partes circa vmbilicū
 inflata. Num & quibus futurum est vt alius exturbetur? cibū
 auerfabatur. lac solum admittēbat recens. & alius liquida e-
 rat, & suberuenta sanies subibat; male olens; alius ardebat.
 mortuus est vbi vomuisset modicū pituitosum, adeo vt quis
 genituram putasset. Platea filio vbi mortuus esset futura
 capitis valde cauata est. Quum autem agrotaret, semper ma-
 nu sinciput contingebat, maxime morti propinquus. Nō do-
 lebat autē caput. & in femore sinistro sub inguen partes in-
 feriores liuidæ. Testes autem graciles erant. Similia etiam
 Hegetorida filio. mortuus est. Præterquā quod vomitus plu-
 res sub obitu contigerunt. Hippia soror hyeme Phreni-
 tica. mente aberrans. manibus negotium exhibens. lancinans
 seipsam. Quinta & sexta ad noctem voce destituta, soporosa.
 inflans in maxillas & labia, velut dormientes. septima mor-
 tua est. Osander vbi inhorruit, lateris dolor, & ad genua
 dolor, itemq; ad femur. vbi comedisset delyrabat. breui mor-
 tuus est. Cleotimo futuri alio liquefacta multo tempore,
 & calore oborto, iuxta hepar tumor tuberculosis ad imū vē-
 trem descendit, & alius liquida fiebat. & aliud ipsi tubercu-
 lum iuxta hepar sursum ad præcordium. mortu⁹ est. Qui-
 busdam capitis dolor vehemens cum calore: quibusdam qui-
 dem ad dimidiam capitis partem, & secundum nares humor
 quidam decedit tenuis, aut maturus: aut ad aures: aut ad fau-
 ces ex capite securius. Quibusdam vero hæc sicca. At marcor
 vehemens periculosus est. Si vero affuerit anxiosus, aut bilio-
 sus vomitis, aut stupor oculorum, aut vocis interceptio, & ra-
 ro quid loquitur, aut delyrium, lethalia hæc sunt & conuul-
 soria. Quicumque vero ex destillatione dimidiam capitis par-
 tem dolent, & humore secundum nares decedēte insuper fe-
 brierint leniter, in quinta aut sexta perfrigerantur. Eche-
 crati cæco capitis dolor vehemens magis ad posteriorem
 partem, & colli quo loco connexio est, & ad verticem proce-
 debat. Progrediēte tempore & ad aurem sinistram. & dimi-
 dia capitis pars dolorosa erat. mucosa semper procedebant
 leniter combusta. & calor comitabatur tenuis. & cibum auer-
 sabatur. in die meli⁹ habebat. ad noctem vero dolebat. Post-
 quam autem pus per aurem erupit, cessauerunt omnia. eru-
 pit autem

Platæa.

Hegeto-
rides.

Hippias.

Osander.

Cleotim⁹.Similia
hæc aphor-
ismis.Echecra-
tes.

pit autem circa hyemem. Num & omnibus suppurationibus, & affectionibus circa oculum, dolores ad noctem? Quibus tussis hyeme maxime austro spirante crassa & multa excreantibus, febres accedunt. leniter autem quinta die sedantur. Tussis vero circa quadragesimam, velut Hegesipoli. Quibus calores multi quandoque sedantur, hi non per totum corpus, sed aut circa ceruicem, aut sub alis, aut capite sudantes liberantur. Chariti hyeme ex tussicula populariter grassante febris aduentans, acuta corripuit. stragula reiciebat. sopor cum dolore. Urinae erant rubrae velut erui lotura. subsidencia statim ab initio multa, alba, postea etiam subrubra. Septima a glade subdita pauca prodierunt. sopor detinuit sine dolore. humiditas in fronte. somnus ad noctem, & calor mitior. octaua succum admisit. soporosus permanfit usque ad undecimam. Hac autem die etiam calor maxime cessauit. Postquam vero tussis erat, excreatio perseuerabat semper multa, facilis. primum viscosa, alba, crassa, postquam autem concocta esset, similis purulentis. Urinae ab undecima die puriores. subsidencia aspera. decimatertia dolor ad dexteram, usque ad lateris molitudinem, ad imum ventrem. Urina supprimebatur. Potus callyphylli contulit. Decimaquinta rursus dolor. decimasexta ad noctem magis dolor praecordij incipiebat ad ventrem. Mercurialis aqua subduxit. Calor intra vigesimum euauit. & excreationes sequuntur sunt crassae, Melius habuit ad quadragesimum. Subpurgandi sunt ventres in morbis, ubi purganda matura fuerint: Inferni quidem, ubi confidisse videris. signum habes si non anxij fuerint, neque capite grauati: & quum calores mitissimi, & quum post exacerbationes cessarint. Superni vero, in ipsis exacerbationibus. Tunc enim & hi eleuantur, quum anxij, & grauati supernis partibus fuerint. propterea vero in principiis purgandum non est, quoniam sua sponte in his temporibus expurgantur. In cubiti processu ex casu sauciato, cubitus marcore corruptus suppuratur. maturatione vero fecte, viscosa sanies ac glutinosa exprimitur, & breui supprimitur: velut & Cleogenisco, & Demarcho Aglaotelis filio. Similiter autem & valde ex iisdem pus nullus velut Aeschyli filio contigit. At ubi suppuratur plurimis horrores & febres accedunt. Alcmani ex rhenum affectionibus se recolligenti, & sanguine deorsum detracto, sursum ad hepar

*Cleogeni-
scus, De-
marchus.
Aglaote-
lis, Aeschy-
lus.
Alcman?*

- A** hepar conuersus est morbus, & ad cor dolor vehemens. & spiritus præ dolore detinebatur. & alu⁹ difficulter egerebat parua caprini stercoreis pilulis similia. anxietas non inerat. Verù rigor quandoque & febris corripiebat. & sudor. & vomitus, & in dolore non conferebat aqua marina per clysterem infusa. Verum fursurum decoctum infusum cõtulit. A cibo abstinuit ad dies septem. aquam mulsam meraciorem bibit. postea lentis succum, quandoque vero ex lenticula fresa decoctum. Inde bibit aquam. postea catulum coctum: & mazæ parum, quæ potissimum diu antea confecta esset. progressu vero temporis, aut ceruices bubulas, aut extremas partes suillas coctas, vnà cum priore aquæ potu. quies. tegmen. ad rhenum affectionem infusum per clysterem ex cucumere sylæstri. *Parmeniscus.* Surditatis medela. *Aspasius.*
- B** Parmenisci filio surditas. contulit clysterem auricularium non adhibere. Verum lana expurgare, & solum oleum, aut netopum infundere. deambulare. mane surgere. vinum album bibere. oleribus abstinere. pane & piscibus petrosi nutriri. Aspasij vxori dentis & maxillæ dolor vehemens. Castorium & piper colluens, ac in ore tenens, remisit. Et stillicidij vrinæ affectionem ipsi sedauit farina cum rosaceo. *Castorili.*
- C** pitis dolores ex vtero sedat castorium. Plurimas vteri affectiones flatu faciunt, Signum sunt ructus, & strepitus circa ventrem, & lumborû tumores, & dolores circa rhenes ac coxas. Ad hos autem confert, aromatatum tertiam partem, farinæ duas, in vino odorato albo coquere, & linteolo illta cataplasmatibus modo imponere, qua parte ventris dolores ab vtero affligunt. *Callimedon.*
- C** Callimedontis filio contulit ad tuberculum, quod habebat in collo durum, & magnum, & crudum ac dolorosum, venæ brachij sectio: & seminis lini torrefacti cataplasma, vino albo ac oleo subactum ac imbutum, ita vt neq; calidum, neque valde coctum deligatur, Aut cum aqua mulsâ coquatur fœni græci, aut ordeï, aut tritici farina. *Melissander.*
- C** Melissandro quum gingiua dolore corripèretur, & vehementer intumesceret, sectio venæ brachij, & alumé Aegyptium in principio sedabat. Eutychedi ex cholericis affectionib⁹, ad neruorum in cruribus distentionem desinit, vnà cum secessu deorsum. Bilem multam abunde coloratam vomuit ad tres dies ac noctes valde subrubram. sub vomitum bibit. & impotens erat, & anxius. Nihil autem continere poterat, neque ex potibus, ne-

HIPPOCRATIS LIBER VII.

tibus, neque ex cibis. & vrinx ac transitus deorsum suppressio, per vomitus sex mollis prodiit, & deorsum quoq; erupit.

Arcusti
morbi me-
dela.
Calligenes.

Regio morbo correpto prodest laborare, sudare, panem edere, bibere non multum, lauare caput calida multa, sed potius tepida, vinum album, somno non multo uti. Calligeni circa vigesimum quintum ætatis annum destillatio, tussis multa, quod defluebat per vim educebat, nihil infra persistebat, annos quatuor perseuerabat. Ab initio calores tenues fiebant. Veratrum non profuit, sed medicus cibus, & comprimere corpus, edere panem, bibere vinum nigrum, obsoniorum quorumcunque esus, abstinētia ab acribus, salis, pinguis, succo silphij, oleribus crudis, multa deambulatio. Lactis potus non contulit, sed sesamum purum, crudum, acetabuli mensura bibere, cum vino molli.

Timochares.

Timochari hyeme destillatio, maxime in nares. Quam Veneris usus esset, resiccata sunt omnia, lassitudo, calor successit, caput graue, sudor à capite multus, defluebat autem & per totum corpus. Erat autem etiam sanus sudare aduersus, tertia die sanatus est.

Cleomenes.

Cleomenis filius hyeme initio factum cibum auersabatur, & ei fastidio citra febrem vexabatur, & vomebat cibos ac pituitam. Duobus autem mensibus cibi fastidium durabat.

Cocus.

Coco in spina gibbositas facta est ex phrenitide. Huic nulla medicamenti potio contulit, Verum vinum nigrum, & panis esus, & balneorum abstinētia, & vinctio, & frictio ab vinctio, & fouere non valde, neque multo fomēto, sed leni. Quibus fluxiones in oculis tenues ac diuturnæ, si maturæ in nares procefferint, profunt. Quibus prægnantibus ex casu, aut conuulsione, aut plaga, dolores leniter fiunt, his in tribus diebus manifestum fit, an foetus corrumpet.

Cuidam que circa vigesimum ætatis annum biberat vltro pharmacum ad foetum perdendum, accidit dolor, vomitus biliosorum, multorum, pallidorum, prasinorum, nigrorum. Quam bibisset, tertia die conuulsio corripiebat, linguam comandebat. Ad quartam diem ad ipsam ingressus sum, lingua nigra, magna, oculorum albæ partes, erant rubræ, vigilabat, quarta mortua est ad noctem. Pythocles ægrotatibus aquam, & lac multa aqua ammixta dabat, & renutriebat. Perniones pertundere oportet, & calefacere, ita ut quam maxime excalefacias igne & aqua. Oculis incōmoda sunt lenticula, fructus pomorum dulces, & olera. Doloribus circa lumbos, aut coxas,

Pythocles.

aut crura

Aut crura, ex laboribus abortis, aquæ marinæ aceti quæ calidū fomentum confert, ita vt vel aspergas, vel spongiam his imbutam adhibeas. Deligare vero lanis oportet. Origanum potum, oculis & dentibus malum est. Puella quæ de rupe cecidit, voce destituta, iactatio ipsam tenebat, vomuit ad noctē sanguinem. Quum ad sinistrā aurem impigisset, amplius inde fluebat, & aquam mulsam difficulter deglutiebat. stertor habebat. Spiritus densus velut morientium. Venæ circa frōtem intentæ, decubitus supinus, pedes tepidi, febris multa, aliquando acuta, maxime expauescebat. septima vocem rupit, calores tenuiores erāt, superstes euasit. Nisantes humeri dolorem habebat, in ætate abortum ex abscessu, profuit ip

Nisantes
des.

B si corpus & humerum in aqua marina madefacere, ad multum tempus: & per tres dies vinum album aquosum bibere, simul vt in aqua marina decumberet, ita vt & in ipsa vrinam euceret. Fullo in Syro phreniticus, quum moueretur cruribus tremulis, corpus velut à culicibus punctum, oculus magnus, motus brevis, vox fracta, sed clara tamen, vrina pura subsiditiam non habens. Num propter alui ex thapsia egestionem, decima octaua die morbus remisit, euanescebat citra sudorem? Nicoxenus in Olyntho similiter septima die videbatur à morbo liber esse cum sudore. Sorbitiones assumebat, vinum, botrū ex sole. Decima septima die ingressus sum ad ipsum, lingua ardebat, calor forinsecus non valde fortis, exolutio corporis vehemens, vox fracta, vt operosum esset exaudire, clara tamen, tépora collapsa, oculi caui pedes molles ac tepidi, iuxta splenem distentio. Infusum per elysterem non valde suscipiebat, sed resiliebat, prodiit stercus compactum modicum, & aliquid sanguinis, arbitror ab infuso. Vrina clara, pura, decubitus supinus, crura diducta ac disparata, ob exolutionē, penit⁹ vigil. Intra viginti dies calor euauit. Potus erat aqua de farina crassa in ipsa macerata, Sed & de pomis simulque mali punici succus, & lentis torrefactæ, & farina lotura cocta, frigida, tenuis sorbitio. Superstes euasit.

Fullo.

Nicoxen⁹

C Fullonum inguina extuberāt dura & sine dolore. & circa pubem ac collum similia erant tubercula magna, febris antedicti decimum. Tussi vexabantur à ruptionibus. Tertio mēse aut quarto venter colliquiuit. Calores successerunt: lingua sicca, sitis, egestionem deorsum malignæ mortui sunt.

Fullonum
tubercula.

HIPPOCRATIS LIBER VII.

**Cholerica
bilis malū
quī fiat.**

**Pherecy-
des.**

Cholerica bilis sursum ac deorsum eruptiones, ex carnis
esu, maximè suillæ crudioris, & ex cicere, & ebrietate vini o-
dorati veteris, & insolatione, & ex sepiis, & locustis, & gam-
maris: & ex olerum esu, maxime porri & ceparum: Insuper &
à lactucis coctis, & brassica, & rumicib⁹ crudioribus: & à pla-
centis ac dulciariis & mellitis libis, & à fructibus pomorum,
& cucumere pepone, & vino lactei teporis, & eruo, & polen-
ta recenti. Cholerica affectiones magis in æstate fiunt, &
febres intermittentes, & quibus horrores accedunt. Hæ quā-
doque malignæ fiunt, & ad morbos acutos perueniunt. Ve-
rum cauere oportet. Iudicat autem tales morbos maxime
quinta & septima & nona dies. Melius tamen est cauere vsq;
ad decimam quartā. Pherecydē post solstitium hybernum, p
noctu lateris dextri dolor etiam prius fieri solitus cessauit.
præsus est. & egressus horruit. febris ad noctē. doloris exors.
tussicula quædam sicca. Vrina non multa. subsidencia multa.
Ab initio ramentosa, glabra, diuulsa: post dies quatuor tur-
bulenta, subsidebant. & vrina non decolor, subsidenciam ha-
bens, & collectio non apparebat in matula, vbi perfriguisset.
Tertia die alius sua sponte egressit. Quarta subdita glande;
stercoracea & biliosa prodierunt. fluxus erat liquidus. Som-
nus ad noctem non valde. Verum interdiu aliquantum dor-
miebat. Sitis non vehemens. Quarta ad noctem maxime cu-
tis circa frontem, & reliquum corpus mollis, semper superex-
cedens. febris vincebatur ad manum, & sub ea humescebat.
pulsus in fronte valde obscurus. venarum grauitas in conuer-
sionibus, & in omnibus egestionibus ad modicum tēpus. sem-
per doloris exors. ab initio anxius, & paulatim vomebat. Sep-
tima à glāde subdita, egressit ter biliosum ac stercoraceum,
liquidum valde ac pallidum. & iam aliquantum delyrabat. &
humiditas modice quandoq; circa frontem. stragula in faciē
ducebat. oculos frustra velut si quis videret contrahebat, &
rursus niſtabat. & stragula reiciebat. Nona die sudor manē
obortus ad pectus, perseuerabat donec moreretur. & febris,
& delyratio augescebat. Circa frontem sudor plurimus gra-
uolens. color valde albus. cutis sub pilis interpuncta. præ-
cordium dextrum eleuatum. demisit à seipso biliosa. Octaua
apparebant velut culicum moriūs. ante mortem tussiedo re-
iecit velut ex muco fungos, compacta quædam, alba pituita
circum

A circūdata. Exfcrearat autem & antea parua, alba, lactea. post
 cenam in fomno horruit. mane surrexit, capite grauatus hor
 ruit. vomuit. capite grauabatur. ad noctem remiſit. viſque ad
 meridiem leniter horruit. rursus noctem grauiter tulit. Se
 quenti die febris acuta. capitis torpor. vomitus multæ bilis,
 quæ plurima prafina erat. ceſſauerunt omnia. fomnus ad no
 ctem. mane perfrigerabatur. ſudor & humiditas per plurimā
 corporis partem. iuxta ſplenem manu indicabat ad modicū
 tempus collectionē doloris exortem, ſtatim euauit. ad no
 ctem vigil. circa fori tempus exacerbabatur febris. anxietas.
 vertigo. tormen. capitis dolor. vomitus prafinus, leuis, viſco
 ſus velut pituita. circa ſolis occaſum ceſſauerunt omnia. ſu
 dor capitis, colli. poſt vomitum egeſſit per aluum ſtercora
 cea, liquida, bilioſa, neque nigra, neque inconuenientia. No
 ctem moderate habebat, itemque ſequentē diem. ad noctem
 rursus vigil. Vomitus mane ſimiliter & ſequenti die, citra an
 xietatē. dolores capitis poſt ſudorē ceſſarunt. ad veſperā om
 nia remiſerūt. Nona nō ampli⁹ vomuit. magis calefactus eſt.
 Reliquis nō videbatur febrire. Venæ in temporibus ſaliebāt.
 doloris omnino exors. ſitis ſemper erat. Nona quum ad ſellā
 ſurrexiſſet valde animo linquebatur. à glāde ſubdita egeſſit
 ramenta nigra & bilioſa colore, quātum ſtercoracei deſtilla
 bat. vox fracta. in conuerſionib. grauſ oculi caui. catiſ fron
 tiſ circumtenſa. alioqui bene ſpirabat. moderatus erat. ad pa
 rietem plerunq; conuerſus. flexibilis in decubitu, incuruatus
 C quieſcens. lingua alba, leuiſ. Circa decimā & poſtea, vrinæ ru
 bræ in circuitu, in medio exiguum quid albū. Duodecima ad
 glādem ſubditā, ſimilia deſtillabāt bilioſa & ramentofa. poſt
 glādē animi deliquiū. poſtea os reſiccabatur. Colluebat ſem
 per. & ſi non valde frigida eſſet aqua, calidā eſſe dicebat. ni
 ſi leniter guſtabat. ſitiſ nō inerat. ſtragula ſemper de pecto
 re repellebat. Chlamydem caleſcieri nō ſinebat. igniſ procul;
 iſq; paruſ, vtriuſq; maxillæ rubor. poſtea lingua inarticula
 ta. recaleſcebat vnum aut duos dieſ. ceſſauit. Androphani
 vocis interceprio. ignorātia. delirium. Hiſ ſedatiſ ſupererat
 multis anniſ, & recidiuæ fiebāt. lingua permanebat per totū
 tempuſ ſicca, & ſi collutione non vteretur, loqui nō poterat.
 & plerunque erat valde amara. Aliquādo etiā dolor ad cor.
 Venę ſectio ſoluit hęc. aquæ potuſ, aqua mulſa. Veratrū quo

Androphani
 nos.

HIPPOCRATIS LIBER VII.

que bibit nigrum, biliosum nō prodibat, sed modicum. Tādē D
hyeme decubuit, & extra se positus mente motus est. & lin-
guę affectiones similes. calor tenuis. lingua decolor. Vox pe-
ripneumonica. de pectore stragula reiciebat, & se educi iu-
bebat, velut mixturum, quum nihil clare loqui posset, neq; a-
pud seipsum esset. educebāt ipsum. ad noctē mortu⁹ est. duo-
bus aut tribus dieb⁹ decubuit. Nicanoris affectio erat, quū
Nicanor. ad conuiuium progredere timor tibicinæ: quū sub initiū
vocis tibiar, in conuiuium tibia canere audiuisset. præ timori-
bus turbationes, vix se sufferre posse dixit, quū nox esset. In-
terdiu vero audiens nihil cōmouebatur. & hæc multo tem-
pore ipsum comitabatur. Damocles qui cū illo erat, circū-
Damocles. tire, & corpore exoluto esse sibi videbatur: & sanē præruptū
locum non accessisset, neq; trans pontē, aut minimæ altitu-
dinis scrobem, ausus fuisset trāsgredi, præ timore ne caderet,
sed per ipsum scrobem ibat. hoc ad tempus quoddā ipsi ade-
rat. Phœnicis affectio erat. ex oculo dextro plerumq; velut
Phœnix. fulgur elucere putabat. Vbi vero nō diu ipsum clausisset, do-
lor ad tempus dextrū vehemens oriebatur. postea etiā ad to-
tum caput, & collū. caput intumescebat retro ad verticula. &
distentio ac duricia erat circum tendines. Si itaq; conaretur
cōmouere caput, aut aperire dentes, nō poterat, vtpote valde
distentus. Vomitus si quādo oborti essent, relatos dolores a-
uertebāt, ac mitiores faciebāt. & venæ sectio profuit. & verā-
trum duxit omnigena, & nō minime prasina. Parmenisco
Parmenisco. etiā prius incidebāt tristitiæ, & desiderium excedēdi ē vita.
Olynthus. quādoq; vero rursus lætus erat. At in Olyntho aliquādo au-
tumni tempore, voce priuatus decumbebat, quietem agēs, ita
vt parū saltē loqui conaretur, ac inciperet. Immo etiā si quid
loquutus esset, rursus voce destituebatur. somni aderāt. quā-
doq; vero vigiliæ: & iactatio cum silentio, & anxietas. & ma-
nus ad præcordia velut dolenti. Aliquando auersus iacebat
quietē agēs. febris perpetuo. & facile spirabat. Postea dixit se
cognoscere ingressos. Bibere quādoq; tota die ac nocte, etiā
si potus exhiberetur, nō volebat: quādoq; vero vrina derepē-
te correpta, omnem aquā ebibeat. Vrina crassa velut iumē-
ti. Circa decimā quartam remisit. Cononis serua. ex dolore
Conon. capitis incipiente, extra se mēte mota erat. & clamor. & que-
relæ multæ. raro autem quies. Circa quadragesimum diem
mortua

- A** mortua est. Decem vero diebus ante mortem, voce destituta & conuulsa fuit. Timocharis seruus ex atrabiliaris esse quū putaretur à tot ac talibus viris, mortuus est similiter circa eodē dies. Nicolai filius circa solstitium hybernū ex potationib⁹ horruit. ad noctem febres. postridie vomitus biliosus, merus, modicus. Tertia die quū concio adhuc fori plena esset, sudor toti⁹ corporis cessauit, & statim rursus calefactus est, vomit⁹ similis. Quarta ab aqua mercurialis egressit stercoracea & liquida. Vrina cineris specie, qualis est aqua mercurialis, nō dissimilis, subsidētia non erat, neq; vrina multa, pauca quædā in medio vehēbātur innatātia. dolores præcordij sinistri & lumborum, Putabat se ex vomitu insuper respirare, & insuper respirabat, quandoque dupla respiratione. lingua alba, habens ex dextra parte cōcretionē adnaram instar lupini. Parum siticulosus erat. vigil. prudēs. Sexta dexter oculus maior dum videret. Septima mortuus est. Verum aluius ante mortem eleuata fuit. & mortuo posteriores partes rubefactæ sunt. Metoni circa pleiadum occasum febris. lateris sinistri dolor vsque ad clauiculā, atq; is adeo vehemens vt quiescere non posset. & inflāmatio tenebat. alui egestio multa, biliosa. In tribus ferē diebus cessauit dolor. Calor autē circa septimū aut nonū. Tussis inerat. excrectiones neq; biliosæ, neq; multæ fiebant, verū pituitosæ. tussis comitabatur. cibos gustabat. quādoq; velut sanus exhibat. Corripiebant autē aliquādo calores tenues modico tēpore. sudores fiebāt ad noctem. Spiritus in calore densior. maxillarū rubor. circa latus grauitas, & sub alas, & ad humerum, tussis tenebāt. medicamentū per superna eduxit biliosa. Tertia à medicamēto erupit pus, verū ab initio morbi quadragesima. repurgabatur circa triginta quinq; alios dies, & san⁹ euasit. Vxori Theotimi in semitertiana anxietas, & vomitus, & simul horror incipiente febre. & sitis. progrediente tempore incipiente febre calor ingens. Vbi aquam mulsam bibisset, & vomisset, & horror, & anxietas sedata sūt. & mali punici succū postea accepit. Diopithis forori in semitertiana, cordis dolor grauis circa accessionem, & comitabatur is totā diem. & huiusmodi cordis siue oris ventriculi dolor etiam aliis similiter aderat. Veruntamen sub pleiadis occasum viris talia rariora fiebant. Vxori Apomoti in semitertiana circa acturum, vehemens

Timochares.

Nicolaus.

Meton.

Theotimi uxor.

Diopithes

Apomotus

hemens cordis dolor circa accessionem. & vomitus. & strangu- D
lationes ab utero simul instabant, & ad dorsum dolores iux-
ta spinam. Quum autem huc ipsi pervenirent, cordis dolores
cessabant. *Terpidæ* matri à *Dorisco*, quum abortus factus
Dorif. us. esset mense quinto gemellorum, ex casu, ab altero quidem sta-
tim, velut in tunica quadam liberata est. ab altero vero prius
aut posterius quadraginta diebus. Postea autem concepit in
ventre. At anno nono dolores vehementes circa ventrem ad
multum tempus, quandoque incipiebant ex collo ac spina, con-
fidebant autem ad imum ventrem & inguina: quandoque ex
genu dextro, confidebant autem ad eundem locum. Et quum
quidem iuxta ventrem dolores essent, alius eleuabatur. quum
vero sedarentur, cordis dolor coincidebat. Verum strangula- E
tiones non aderant. Sed frigiditas corporis, velut in aqua ia-
centis. Tempore quo dolor fiebat, per totum corpus dolores
spargebantur, mitiores his qui ab initio erant. allium, silphium,
acria omnia non conferebant, neque dulcia, neque acida; neque
vina alba. Verum nigra, & balnea rara. Ab initio quoque vo-
mitus vehementes fiebant, & ciborum exclusiones. & circa do-
lores menses non apparebant. *Cleomenis* vxori circa fauo-
nes. nij status, ex nausea & lassitudine, lateris sinistri dolor, ex col-
lo ac humero auspicatus. febris & horror, & sudor. Inccepit
autem febris, & non desinit, sed augetur. & dolor vehemens.
tussis, excreatio subcruenta, pallida, multa. lingua alba. alui
egestiones moderatae, liquidæ. urinae biliosæ. Quarta ad no-
ctem menses prodierunt multi. cessauit & tussis, & excreatio, F
& dolor. calor autem tenuis. *Epicharmi* vxori ante partum
Epichar- dysenteria. dolor. alui egestiones subcruentæ, mucosæ. Vbi
mus. peperisset, statim sana erat. *Polemarchi* vxori in morbo ar-
Polemar- ticulari coxæ dolor de repente, mensibus non prodeuntibus.
chus. Vbi betæ succum bibisset, vox supprimebatur per noctem, &
usque ad meridiem, attamen audiebat, & sapiebat, & manu si-
gnificabat, dolorem esse circa coxam. *Cliniæ* sorori senio-
Cliniæ. ri vomitus, quicquid accepisset per quatuordecim dies, ci-
tra febrem. cruentorum vomitionum reiectiones. & contra-
cta strangulatio ad cor procedebat. Castorium, sceli, mali pu-
nici succus, sedauerunt omnia, abscessit autem dolor mode-
ratus ad lateris mollitudinem. bulbi succus. & vinum lactei tepo-
Pausaniæ. ris, austerum. & panes quam paucissimi cum oleo. *Pausaniæ*
filiam

- A filiam ex fungi crudi esu, anxietas tenebat. strangulatio. dolor ventris. Aquâ multam calidam bibere ac vomere profuit. & balneum. In balneo fungum euomit. & vbi illa cessatura essent, exsudauit. Epicharmo circa pleiadum occasum, humeri dolor, & grauitas vehemens ad brachium. anxietas. vomitus multi. aquæ potus. Euphranoris filio pustulæ velut à salicum morsu. Post fauonium siccitates fiebant, vsq; ad æquinoctium autûnale. Sub canem, æstus vehementes, & ventri calidi, & febres sudorificæ, & statim aliquantum recalescebant. Tubercula vero iuxta aurem multis fiebant. Aniculæ à tussi vexatæ circa nonam diem. Adolescenti splenico ancille filio, aluo liquefacta, circa idem tēpus. Ctesiphonti sub ar-
- B aurum, ferè circa septimam. Adolescenti solū suppurata sunt. Ctesiphon
Eratylli filio euauerunt. Circa vtraq; tēpora, nullæ exudationes. lingua præ siccitate blæsi. Recti venti spirauerunt multi ac frigidi. & nives ex clementi cœlo quandoq; fiebāt, & post æquinoctium, austrina aquilonaribus permixta. aquæ multæ. populariter grassatæ sunt tusses multæ, magis autē in pueros. Circa aures multis talia, qualia Satyri habent. Quandoq; vero ante hoc tempus hyems valde hyberna erat, cum niue & pluuiis aquilonaribus. Timonactis filio fermè bi-mestri pustulæ in cruribus, & in coxis, & lumbis ac imo ventre. & tumores valde rubicundi. His autem sedatis, conuulsionēs & comitiales fiebant, sine febribus, multis diebus. & mortuus est. Polemarchi filio contigit quidem vt priore
- C tempore suppuratus esset, & exscrearet. postea vero calores ipsi erant. & hydropicus erat, & splenicus, & anhelosus. ad locum accliuem si quando accederet, impotens. & siticulosus. quandoq; etiam cibum leniter auersabatur. & siccæ tussiculæ ad multum tempus ita fiebant. titubās obambulabat. & si nō facile solubilis esset aluus deorsum, plena reddebatur. & anhelatio ac strangulatio magis fiebant. Tandem autem defluxus & excreatio superuenit, ac tussis. Excreatio crassa, pallida, purulenta, & febris vehemens cessasse videbatur. & tussis mitior. & excreatio pura. Rediit rursus febris acuta. spiritus densus. mortuus est. Verum antea riguerunt pedes, & postea perfrigeratus est. Spiritus magis interclusus est. Vrina substitit. extremæ partes perfrigeratæ sunt. prudens mortuus est, tertia die à recidina. Thyni filio in febre ardente
- inedia

Epichar-

mus.
Euphras-
nor.Ctesiphon
Eratyllus.

Timonax.

Polemarchus.

Thynus.

HIPPOCRATIS LIBER VII.

- Epicharmus.** inedia macerato,alui egestio multa. Verum cum bile, & animi deliquio, & sudore multo fiebat. perfrigeratus est valde. & voce destitutus erat totam diem ac noctem. Instillatum pituitae succum continuuit. sapiebat. bene spirabat. Epicharmi filio accidit ex via & potu cruditas. Postridie mane anxietate oborta, ubi aqua, acetum, salem bibisset, euomit pituitam. Postea rigor apprehendit. lauit febricitans. Pectus dolebat. Tertia mane statim sopor modico tempore tenebat, & delirabat. & febris acuta. grauiter morbum tulit. Quarta vigil. mortuus est. Aristoni vicerato pedis digito, cum febre loquelae obscuritas. Carcinoma ascendit usque; ad genu. periit. Erat autem nigrum, subaridum, graueolens. Cui carcinoma in faucibus vsum est, sanus euasit a nobis. Polyphantus in Abderis caput dolebat in febre vehementi. Urinae tennes, multae. Subsidentiae densae & conturbatae. Quum autem non cessaret dolor capitis, sternutatoria decima die adhibita sunt. Postea ad collum dolor vehemens. Urina prodiit rubicunda conturbata velut iumentum. mente motus est phrenitico modo. Mortuus est in vehementibus conuulsionibus.
- Eualcides.** Consimiliter etiam Eualcidae famula, quum multo tempore densae urinae prodissent, & capitis dolores adessent, phrenitica facta mortua est, eodem modo ex vehementibus doloribus. Nam urinae densae ac conturbatae, certum signa sunt doloris capitis, & conuulsionis, ac mortis.
- Halicarnassensis.** Halicarnassensis qui in domo Xanthippi diuersabatur, aurem hyeme dolebat, & caput non mediocriter. Erat autem annorum circiter quinquaginta. Vena secuta est iuxta Mnesimachum. laesum est caput euacuatum, ac perfrigeratum. Non enim facta est suppuratio. Phreniticus factus est, & mortuus. Urinae erant & huic densae. In Cardia Metrodori filio ex dentium dolore corruptio maxillae, & gingivarum vehemens carnis excrescentia. mediocriter suppuratio facta est. exciderunt dentes molares, & maxilla.
- Anaxenor** in Abderis, erat quidem splenicus, & viciati coloris. Contigit autem ipsi ut tumor circa femur sinistrum obortus, derrepente euanesceret. Non multis vero postea diebus oborta est ipsi circa splenem velut pustula nocturna ab initio, insuperque tumor ac rubor durus. Post diem quartum febris ardens oborta est. & liuefacta sunt omnia circumcirca, & putrida videbantur. mortuus est. Verum prius

- A** prius subpurgatus est, & intelligentiam habebat. Clonigus *Clonigus.*
 in Abderis, erat quidem nephriticus, mingeat autem sanguinem paulatim plerumque, difficulter. Vexabat etiam aluus dysenterica. Huic mane quidem dabatur lac caprinum, & aquæ quinta pars, ita ut ex ambobus compositum totum essent heminae tres. Ad vespertinam autem, panis valde assatus, obsonia, beta aut cucumis, Vinum nigrum tenue. Dabatur etiam cucumis pepo. Hac vero victus ratione quum vteretur, & aluus substitit, & urinae purae prodibant. Bibit autem lac donec urinae restitutae sunt. Mulieri in Abderis carcinoma factum est circa pectus, erat autem tale, per papillam sanies subcruenta fluebat. intercepta autem fluxione, mortua est, *Mulier Abderitana.*
 Dinij *Dinij.*
 filio in Abderis umbilicum mediocriter sauciato, fistula parua relicta est. & quandoque etiam lumbricus per seipsum satis erassus penetrauit. & quum febriret, vomebat biliosa. quandoque vero & haec ipsa per fistulam prodibant. Allapsum est & intestinum ipsi ad fistulam, & velut fistula corrodebatur, & rursus refringebatur. & tussis permanere prohibebant. *Python.*
 Pythonis filio in Pella febris statim incepit multa. & in somnum collapsio, & cum vocis interceptione somni fiebant. & aluus dura per omne tempus. At glade ex felle subdita, multa egerebat, & statim remittebat. Verum breui aluus rursus eleuabatur. & febris exacerbabatur. & collapsio in somnum per eadem. Quum autem idem ductus esset, darum est medicamentum quoddam ex his quae cnico, & cucumere syluestri, & peplo constant. & biliosa egestio erupit. & statim *Pella.*
 sopor sedatus est. & febris mitigabatur. & omnia leuiora facta sunt. & iudicatus est die decimaquarta. Eudemus *Eudemus.*
 nem vehementer dolebat. imperarunt ipsi medici ut multum ederet, & vinum biberet modicum, tenue, & multum deambulet. non mutatum est quicquam. Vena secta est. cibos ac potus parce sumpsit. deambulationes fecit sensum augmento facto. Vinum bibit nigrum, tenue. sanatus est. *Philistides.*
 Philistidi Heraclidae uxori coepit febris acuta. rubor faciei, ex nulla manifesta causa. paulo post in die rigorem habuit. quum non recalesceret, conuulsio facta est in digitis manuum ac pedum. paulo post recalescens. minxit urinas compactis quibusdam innatantibus, nubeculosas, diuulsas. nocte dormiuit. Secunda die rursus riguit. paulo magis calefacta est. & rubor minor. & conuulsiones

HIPPOCRATIS LIBER VII.

cōuulsiones fiebāt moderatiores. Vrinæ cōsimiles. noctē dor-
 miuit, parū vigilauit, quū nulla molestia premeretur. Tertia
 die minxit coloriora, modicā subſidentia habentia, eadem
 hora rigor apprehendit. Febris acuta, sudor ad noctē per totū
 corpus. Verum vesperi color ad morbi regii modū permuta-
 tus est, noctu dormiuit, ac per totum corpus sudauit. Quarta
 sanguis ex sinistra nare probe fluxit. & mēses pauci cōparue-
 runt ordinate. Rursus autē eadē hora febris exacerbata est.
 Vrinæ compactis quibusdā innatantibus paucæ. Alius natu-
 ra quidem dura, verū multo magis substituit, neque quicquam
 prodibat, si non glādem subdidisset. noctem dormiuit. Quin-
 ta febris mitior. & ad vesperam per totum corpus sudabat. &
 mēses prodierūt. & noctē dormiuit. Sexta minxit acruatam
 multam vrinā, compactis quibusdam innatantibus, modicam
 subſidentiam habentem, concolorē. Circa meridiem vero pa-
 rum rigore tenebatur. aliquantum incaluit. sudauit per to-
 tum. noctem dormiuit. Supina parum calefacta est, facile tu-
 lit. sudauit per totum. vrinæ boni coloris. Iudicata sunt om-
 nia. Tychon in obsidione circa Datum, ictus est catapultā
 in pectus. & paulo post risus erat circa ipsum tumultuosus.
 Videbatur autē mihi medicus eximens lignū, reliquisse fer-
 rum in septo trāuerso. & quū ipsi ita videretur, ad vesperam
 infusum per clysterē adhibuit, & pharmacū deorsum purgans
 dedit. Noctē primā transegit. Statim vero vbi dies illuxisset,
 & medico, & aliis melius habere videbatur. erāt enim quieti.
 Prædictio facta est, quod vbi conuulsio fieret, non tarde mo-
 riturus esset. Sequentē noctem moleste ferēs, insomnis ple-
 runq; in vētrem decūbens. Tertia mane cōuellebatur. Circa
 meridiem mortuus est. Eunuchus ex venatione & discursu
 hydropicus factus est. Quidam circa Elealcis fontē, ad sex an-
 nos habuit ex equitatione inguinū tumorem, varices, & co-
 xendicum dolores. Qui lateris mollitudine tabuit, septima
 die mortuus est. Præpotent crudi salsa cum melle. Scor-
 ratio turpis, dysenteria medela est. Leonidæ filiæ natura
 concitata, auersa est; auersa, in iram excaudit; vbi ira exca-
 duit, reconciliata est. Medicus non intellexit. puella mortua
 est. Philotimi filius puber venit ad me in Iechina, caluaris
 os habens medicina destitutum; in quo videbam occultas ra-
 tiocinationes non esse constantes.

HIPPO-

HIPPOCRATIS COI LI-

BER DE VICTVS RATIONE IN

Morbis acutis, Iano Cor-

nario medico physi-

co interprete.

Priscorum medicorum tres fuisse familias meminit Galenus li-
bro primo de Curandi uia & ratione. Vna eorū fuit medicorū, qui
Coom insulā incolebāt, quorū fuit princeps Hippocrates. Alia Rho-
diorum. Tertiæ sectæ auctores Cnidii uocabantur à Cnido insulā,
una ex quinque Cycladibus. Horum placita Hippocrates, hoc loco
Cnidias sententias uocat.



Vi Cnidias appellatas sententias
conscripterunt, recte quidem scri-
pserunt ea quæ patiuntur ægroti
in singulis morbis, & quomodo
quædam ipsorum euenerūt: & ha-
tēⁿ quidem etiam qui medicus
non sit, recte conscribere possit, si
probe ex singulis ægrotis quæ pa-
tiuntur didicisset. Quæ vero me-
dicum ante discere oportet, egro-
to non referente, horum pleraque omiſſa sunt, alia in aliis, &
quædā valde commoda ad cōiecturā. Quum autē ad conie-
cturā dicatur, quo modo singula curare oporteat: in his mul-
ta aliter sentio, quam velut illi prodiderūt. Et non solum ob
hoc non laudo. Verum quòd etiam paucis numero vſi sunt
medicamentis. Nam exceptis morbis acutis, plurima ab ipsis
relata sunt pharmaca aluum deorsum purgantia exhibenda,
& serum ac lac pro tempore. Si quidem igitur hæc bona es-
sent, & morbis conuenientia, in quibus exhibenda esse mo-
nuerunt: longe magis laudanda essent, eo quòd quum pauca
sint sufficiunt. Nunc vero res non ita habet. Qui tamen post
ea eam tractationem repetiuerunt, magis sanè medico mo-
do, de his quæ singulis exhibenda sunt tranſegerunt. At
neque

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

*Acuti mor-
bi qui.*

neque veteres quicquam memorabile de victus ratione con-
scripserunt, & quanquam magna hæc res sit, eam omiserunt:
attamen multos in singulis morbis modos, multiplicemque
ipforum diuisionem non ignorarunt aliqui. Cæterum nu-
meros singulorum morborum clare pronunciare volentes,
non recte scripserunt. Non enim facile sit enumerare, si ex eo
quis ægrotantiū morbū æstimet, quod alter ab altero aliqua
re differt: & ideo non putet eundem morbū esse, si non idem
nomen habeat. Mihi vero placet, vt in vniuersa arte mentem
adhibeamus. Nam quæcunque opera bene ac recte tractat,
ea singula bene ac recte facere oportet: & quæ cito, cito: &
quæ pure, pure: & quæ citra dolorem tractare oportet, ita fa-
cere vt quàm minimus dolor sentiat: & alia omnia eiufmo-
di insigniter præ aliis ad meliorem modum transigere oportet.
Maxime vero laudauerim medicum qui in acutis morbis, qui
plurimos homines occidit, præ aliis insigniter ad meliorem
partem excellat. Sunt autem hi acuti, quos veteres nominaue-
runt pleuritidem, peripneumoniam, phrenitidem, & febrem
ardentem, & alij morbi qui ex his hærent, quorum febres o-
mnino continuæ sunt, & occidunt. Quum enim non pesti-
lētis morbi modus quis communis grassatus fuerit, sed sparsi
fuerint morbi, & non similes ab his morbis plures moriuntur,
quàm ab aliis omnibus. Idiotæ igitur non valde cognoscunt
eos qui in his, aliis præstant: aliarumque curationum magis
aut laudatores, aut vituperatores existunt. Et profecto ma-
gnum signum hoc est, quod populares minime de his morbis
intelligentiam habeant, veluti quos studio consequi oportet.
Nam qui medici non sunt, medici esse videtur, maxime pro-
pter hos morbos. Facile est enim nomina ediscere, quæ pro-
ferri solent apud ægros his morbis affectos. Si enim quis pi-
sanæ succum nominarit, & vinum tale, aut tale, aut etiam a-
quam mulsam, omnia hæc eadem plebeis hominibus, & me-
liores, & deteriores medici dicere videntur. At res hæc non
ita se habet, sed in his sanè vel maxime alij ab aliis differunt.
Videtur autem mihi digna esse quæ scribantur maxime hæc
quæ ignorantur à medicis, maxime scitu cōmoda, & quæ ma-
gnas utilitates, aut magna detrimenta afferunt. Quæ itaque
ignorantur hæc sunt. Cur nam in acutis morbis, aliqui medi-
ci omne quum terunt, piisanas non colatas exhibentes, & re-
de se

A & se medicari putant. Aliqui vero plurimi faciunt, vt nulum ordeum æger deuoret. Magnum enim detrimentum asserere arbitranter. Verum per linteum excolantes succum exhibent. Quidam vero ipsorum neque ptisanam crassam dederint, neque succum: atque hi partim donec ad septimum diem æger perueniat, partim vero perpetuo, donec iudicatus fuerit morbus. Sanè huiusmodi quæstiones ne proponere quidem medici consueuerunt. fortassis autem neque si proponantur, comperiantur. Proinde calumniam incurrit tota ars apud vulgus adeò magnam, vt neque omnino medicinam esse putent. Nam in acutis morbis intantum inter se differunt artifices, vt quæ alter exhibet optima esse putas, ea alter iam mala esse existimet: & ferè ob id artem vaccinationi similem esse dixerint. Quia vates eadem auè, si sinistra appareat, bonam esse ducunt: si dextra, malam. Et in aruspicina talia sunt, alia in aliis. Verùm aliqui vates contraria his dicunt. Affero autem hanc speculationem pulcherrimam esse, & cognatam plurimis ac maxime comodis in arte. Nam egrotantibus omnibus plurimum ad sanitatē confert, & sanis ad securitatem, & his qui se exercent, ad bonum habitum, & ad quod quisque voluerit.

*Artificum
differètia*

C Ptisana igitur recte omnibus frumentaceis eduliis prælatam esse videtur, in morbis acutis, & laudo sanè eos qui ipsam præulerunt. Nam viscositas ipsius leuis est, & continua, & iucunda, & lubrica, & moderate humida, & sitim eximit, & facile eluitur. si forte & hoc opus sit: & neque adstrictionem habet, neque malam turbationem, neque in ventre intumescit. Intumuit enim in coctura, quam maxime tumesceri solet. Quicunque igitur ptisana in hisce morbis vtantur, nulla die vasa vacua fieri permittant, vt ita dicam, sed vtantur, & non intermittant, si non aut ob medicamentū, aut infusi per clysterē vsum, intermittere oporteat. Et qui quidē bis in die cibum capere soliti sunt, eis bis danda est: qui vero semel edere consueuerunt, his semel primo die danda est. Verum sensum progressu facto, si fieri poterit, etiam his bis detur, si sanè opus habere visum fuerit. At vero copia sufficit ab initio dare non multa, neque minus crassam: sed vt consuetudinis gratia quid ingeratur, & vt ne multa vasorum vacuatio fiat. Cæterum quod ad augmentum copię forbitionis attinet, si quidem siccior fuerit morbus, quam quis putarit, non ita magna

*Ptisana
laus.*

*Ptisana
quādo ex-
hibenda.*

copia

copia dare oportet, sed ante sorbitionem, aut aquam mulsam,
 aut vinum præbibendum exhibere, vtrum ex his conuenien-
 tius fuerit. Vtrum vero conueniat, in singulis modis refere-
 tur. Si vero os humectetur, & à pulmone prodeuntia qualia
 oportet fuerint, sorbitionis copiam, vt in summa dicam, au-
 gere oportet. Quæ enim citius & magis humectantur, cele-
 ritatem indicationis significant. Quæ vero tardius & minus,
 tardiozem indicationem significant. Et hæc quidem per se ta-
 lia omnino existunt. Verum multa quoque alia commoda o-
 mittuntur, ex quibus coniecturas facere oportet, quæ postea
 referentur. & quāto copiosior purgatio fuerit, tanto plus da-
 re oportet, vsque ad iudicationem, maxime duobus à iudica-
 tione diebus, quibus sanè quinta, aut septima, aut nona iudi-
 care videtur. ita vt etiam parium ac imparium dierum ratio-
 nem habeas. Postea vero sorbitione quidem mane vtendum
 est. Vespere vero ad cibos transeundum. Conueniunt au-
 tem talia vt plurimū his qui statim tota ptisana vtuntur. Nam
 & dolores in pleuriticis statim sua sponte cessant, vbi memo-
 rabile quid spueri ac expurgari cœperint: & purgationes lon-
 ge perfectiores sunt, & minus suppurati fiunt, quàm si quis a-
 liter victum suppeditet: & iudicationes simplices, & me-
 lius iudicantes, & minus reuertentes. Ptisanam porrò ex opti-
 mo hordeo factam esse oportet, & quàm optime coctam, &
 præsertim si non solo succo vti velis. Nam vnà cum reliqua
 ptisanæ virtute, lubricitas facit, vt ordeum dum deglutitur
 non lædat. Nusquam enim adhæret. neque secundum thora-
 cis rectitudinem morâ trahit. Lubricissima autem est, & ma-
 xime sitim eximit, & facillime concoquitur, & debilissima
 est, quæ optime cocta est, quibus omnibus opus est. Si quidē
 igitur non opem tulerit quis quantum opus est, vt sufficiens
 sit eiusmodi ptisanæ sorbitionis modus, multis modis læde-
 tur. Etenim verbi causa, quibus cibus intus conclusus est, si
 quis non facta deorsum euacuatione, sorbitionem dederit,
 dolorem si adest amplius exacerbauerit: & si nō adest, statim
 induxerit. & spiritus densior fiet. Hoc vero malum est. Pul-
 monem enim resecat, & præcordium, & pectinem, ac septum
 transuersum dolore affligit. Quinetiam si lateris dolor affi-
 duus est, & ad calefactoria non remittit, & sputū non prodit,
 sed citra putrefactionem ac cōcoctionem valde viscosum sit,
 si non

- A** si non soluerit quis dolorem, aut v̄trem mollito, aut vena se-
cta, vtruna t̄dem horu conducet: p̄tisana autem ita habentibus dederit, cita mors taliu cotinget. Propter has igitur causas, & alias huiusmodi adhuc magis, qui tota p̄tisana vtuntur, septima die & citius moriuntur, partim m̄te l̄ti, partim ab erectæ ceruicis spiratione, & stertore suffocati. Tales vero veteres syde eictos esse putauerūt, ob hoc quidē maxime, non minus autem quod & mortuis ipsis latus liuidum reperitur, vt simile quid plagæ appareat. Causa vero huius est, quod prius quā dolor soluatur moriuntur. Cito enim anhelosi fiunt. Præ multo autem ac denso spiritu, velut iam dictum est, valde viscosum circa concoctionem fit spatium, & egressum fieri prohibet. Immo stertorem inducit.
- B** chartilaginosis pulmonis arteriarum partibus brōchiis appellatis impactum. & vbi ad hoc deuenerit, lethale iam plerunque existit. Nam & ipsum sputum impactum, prohibet quidem spiritum intro ferri, cogit autem cito extra ferri. Atque sic mutuam opem ad malum inter se conferunt, dum & sputum impactum, densum spiritum facit: & hic quum densus sit, sputum insuper viscosum facit, & lubricum fieri, ac elabi impedit. Occupant autem hæc, non solum si p̄tisana intempestiue vtantur: verum multo magis, si quid aliud ederint, aut biberint, quod minus quā p̄tisana idoneum sit, proinde plerunque cōsimilia sunt auxilia, & his qui tota p̄tisana vtuntur, & his qui succo ipsius: his vero qui neutro hōrum, sed solo potu, quandoque etiam
- C** diuersimode auxiliari oportet. At vero hoc modo omnino facere oportet. Si cui à cibo recens accepto, & aluo nondum subeuacuata, febris incēpit, siue cum dolore, siue sine dolore, inhibenda est sorbitionis exhibitio, donec putarit cibum ad infernam intestini partem secessisse. Vtendum autem est potu aceti mulsi, si dolor affuerit, hyeme quidem calidi, æstate vero frigidi. Si vero multa fuerit sitis, etiā aqua mulsa, & aqua. Postea verō si dolor aliqs affuerit, aut periculosi aliquid apparuerit, danda est sorbitio neque multa, neque crassa, atque hæc post septimum, aut nonum diem, si validus æger fuerit. Si vero non subiit vetustior cibus ei qui recens cibum accepit, si quidem validus sit, & ætate vigeat, infusum per clysterem adhibendum est. Si vero debiliior fuerit, glande vtendum est, si non sua spōte probe prodierit. Tempus per rō ex-
- Cc hibendæ

*Quid obser-
uandum.*

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

hibendæ sorbitionis hoc maxime obseruare ab initio, & per D
omnem morbum oportet. Quum quidē pedes frigidi fuerint,
inhibere oportet sorbitionis exhibitionē. Maxime vero & à
potu abstinendum est. Vbi vero calor descenderit ad pedes,
tunc exhibere conuenit, & putare in omnibus morbis, & non
minime in acutis, & maxime in his qui magis febriles ac pe-
riculosissimi sunt, tempus hoc magnam vim habere. Utēdum
est autem primum quidē maxime succo. Deinde vero pitana
iuxta prædictas coniecturas diligētī facta cōsideratione. Cæ-

*Lateris do-
lorib⁹ qui-
bus subue-
niendum.*

terum pleuritis, hoc est dolor lateris, siue ab initio fiat, siue
postea, calefactoriis quidem primum non alienum est tētare
dissoluere. Ex calefactoriis vero optima est aqua calida in v-
tre, aut in vesica, aut in vase æneo, aut testaceo, admota. Verū E
molle quid antea ad latus supponere oportet. Lenitatis ergō.
Cōmode etiā spongia mollis, magna, ex aqua calida expressa
apponitur. Cōtegere vero stragulis ipsum fōmētum oportet.
Nam & ampliore tempore sic sufficiet & durabit, & simul vt
ne vapor ad ægotātis spiritum afferatur, nisi fortassis & hoc
ad aliquid commodum esse visum fuerit. Aliquando enim ad
aliquid commodat. Insuper autem & ordeum, & eruum, in a-
ceto diluto, ita vt paulo acidior sit quā vt quis bibere possit,
dissoluta ac feruescēt, & in marsupia coniecta, apponere o-
portet: & furfur eodem modo. Siccum autem fōmentū præ-
bent sal & mikum torrefactum, in laneis sacculis conuenien-
tissimum. Nam & leue, & lene est milium. Soluit autem huius
modi mollitorium fōmentum, etiam dolores ad clauiculam
pertingentes. Sectio autem venæ non similiter soluit dolorē,
si non ad clauiculam pertingat dolor. Quod si ad calefacto-
ria dolor non soluatur, non multo tempore calefacere opor-
tet. Resiccat enim hoc pulmonem, & suppurationem facit.

*Ad clauic-
ulam do-
lore extē-
sio medela.*

At si quidem dolor ad clauiculam de se significationem præ-
beat, aut grauitas ad brachium, aut circa mammam aut supra
septum transuersum: venam secare prodest in cubiti flexura
internam, & non cunctari copiosum sanguinem detrahare,
donec multo rubicundior fluxerit, aut pro puro & rubicun-
do liuidus. Vtrunque enim contingit. Si vero sub septo trans-
uerso fuerit dolor, ad clauiculam autem de se significationē
non præbeat, aluum mollire oportet, aut veratro nigro, aut
pephio, ita vt veratro quidem daucum, aut seseli, aut cuminū,
aut

A aut anisum, aut aliud quid ex odoratis ammisceas, peplio vero silphij succum. Sed hæc inter se si misceantur, consimilis modi existunt. Ducit autem nigrum veratrum melius, & ad iudicationem commodius quàm peplium. Peplium vero flatus magis erumpere facit. Ambo autem hæc dolorem sedât. Sedant item alia multa aluum subducentia medicaméta. Verû hæc inter ea quæ ego noui optima sunt. Alioqui & ea quæ in sorbitionibus exhibentur aluum subducentia medicamenta opitulantur, quæcunque non valde iniucunda sunt, aut ob amaritudinem, at propter aliam quandam iniucunditatem, aut ob copiam, aut colorem, aut aliquam suspicionem. Ptisana tamen statim insuper sorbendam dare oportet, postquâ medicamentû bibit, non memorabili copia pauciorê, quàm quantâ sumere adfuetus est. Nam & rationi consentaneum est, in media purgatione sorbendam non dare. Quum autem cessauerit purgatio, tunc minus sorbeat de ea, quàm adfuetus est. Postea vero reducat semper ad maiorem copiam, si & dolor sedatus fuerit, & nihil aliud aduersetur. Idê mihi sermo est, si etiam ptisanæ succo uti opus fuerit. Melius enim esse assero, statim omnino incipere sorbere, quàm præuacuat is iam vasis sorbere auspicari, aut tertia, aut quarta, aut quinta, aut sexta, aut septima die, si sanè non iudicatus fuerit morbus ante hoc tempus. Præparationes autem & his consimiles faciendę sunt, quales dictę sunt. De sorbitionis igitur exhibitione ita sentio. Sed & de potu, qualem cunque tandem quis ex describêdis sumpturus est, eadem mihi penitus sermonis ratio est.

C Noui autem etiam medicos maxime cōtraria facere his quæ fieri oportebat. Omnes enim volunt, vbi sub morborum initia homines fame præmacerarunt, duobus aut tribus, aut etiã pluribus diebus, sic sorbitiones exhibere, itemquę potus: & fortassis etiam par ipsis esse videtur, ut magna corpori mutatione fiente, etiam magnû quid valde contra obiciatur. Verum mutare quidem non parum, bene habet. Recte tamê mutatio transferenda est, & ex mutatione adhuc magis exhibitio eorum quæ per os sumuntur. Maxime igitur lædi poterint, si non recte mutationem fecerint, hi qui tota ptisana vtuntur. Poterint etiam lædi qui solo succo vtuntur. lædi quoque possunt qui solo potu vtuntur. Minime vero hi. Oportet autê & in sanorum adhuc hominum victu addiscere quæ cōferunt,

Cc ij Si enim

Error medicorum.

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

*Esustudo
multū po-
test.*

Si enim sanis tales aut tales victus multum differre videtur, tum in aliis quibusdam, tum in mutationibus: quomodo non etiam in morbis multum differant, & maxime in acutis? Atqui facile est hoc addiscere, quod simplex victus cibi ac potus, ipse sibiipſi ſemper ſimilis, ſecurior omnino eſt ad ſanitatē, quā ſi quis derepente ad alium meliorem, magnā mutationē faciat. Nam & his qui bis in die cibum ſumunt, & his qui ſemel, repentinæ mutationes noxas ac ægitudines inducunt. & eos ſanè qui prandere non adſueti ſunt, ſi prænſi fuerint, ſtatim infirmos facit hoc, & toto corpore graues & debiles, & pigros. Si vero etiam inſuper cœnauerint, acidum ratiōes. Quibusdam vero etiam alui liquida egeſtio oboritur, quum præter conſuetudinē ventriculus grauetur, ſolitus reſiccari, & non bis intumeſcere, neque bis cibos coquere. Auxiliatur igitur his, mutationem rurfus adæquate. dormire enim oportet velut nocte reducta poſt cœnam, hyeme quidē, abſque frigore, æſtate vero, abſque calore. Si vero dormire nō queat, ubi multam lentam deambulationem non ſtando oberrauit, nihil cœnet, aut pauca, eaquē innoxia. Inſuperq; minus bibat, & potum non aquoſum. Talis autem adhuc magis affligetur, ſi ter in die ad ſatietatē cibū acceperit, & adhuc magis ſi ſæpius. Quanquā ſanè multi ſint, qui facile ferunt, ſi ter in die cibū copioſe accipiant, qui ita ſunt adſueti. Quā & hi qui bis in die cibum capere ſoliti ſunt, ſi prænſi non fuerint, debiles & infirmi ſunt, & ad omne opus timidi, & ventriculi oſculum dolent. Viſcera enim pendere ipſis videntur: & calidam ac cum virore pallidam vrinam mingunt, & alui egeſtio comburitur. Quibusdam etiam os amareſcit, & oculi caui fiunt, & tempora palpitant, & extremæ partes perfrigerantur. Et plerique ex his quī prænſi non ſunt, cœnam edere non poſſunt. Si vero cœnam ſumpſerint, ventriculum grauāt, & multo magis ægre in lecto degunt, quā ſi etiam prænſi fuiſſent. Quum igitur talia hæc ſauis ſiant, ob victus dimidia diei mutationem præter conſuetudinē, apparet neque apponere, neque detrachere commodum eſſe. Si igitur hic præter conſuetudinē ſemel in die cibum accepit, ubi tota die vaſa vacua fecit, quantum conſueuit cœnauerit, verifiſimile eſt ipſum, ſi tunc quum impræſus eſſet doluit ac ægrotauit, & ubi cœnauit grauis fuit: multo magis grauari. Si vero etiā longiore

longiore tempore euacuatis vasis, postea derepente cœnauerit, adhuc magis grauabitur. Qui igitur præter consuetudinem vasa vacua fecit, ei hanc diem rursus ad æquare sic conducit absque frigore, & calore atq; labore. Hæc enim omnia grauiter tulerit. & cœna multo minor exhibenda est, quàm consuevit, cæque non sicca, sed modi humectioris. & postea bibat potum non aquosum, neque pauciorē quàm pro cibi ratione. Sed & postera die pauca prandeat, quo sensim progressu fiēte ad cōsuetudinē reuertatur. Qui tamen supernas partes amara bile infestantur, talia molestius ferunt. Pituitosi autem supernis partibus, cibi præter morem abstinentiam omnino facilius ferunt. Quare etiā semel in die cibum præter morem capere, facilius vti que iidem tulerint. Sufficiens igitur & hoc signū est, quod maxime mutationes eorum quæ circa naturas nostras ac habitus cōtingunt, maxime morbos faciunt. Non igitur licet intempestiue, neque vehementissimas vasorum vacuationes facere, neque vigentibus morbis, & in inflammatione cōsistentibus, cibos exhibere, neque licet derepente in tota re quicquam, aut huc aut illuc mutare. Multa vero his cognata, ex his qui ventri cōtingunt, itemque alia referre quis possit, quod facile quidem ferunt cibos, quibus adsuēti sūnt, etiā si natura non sūnt boni, Similiter etiā potus; ægre autem ferunt cibos, quibus adsuēti non sūnt, etiā si non sūnt mali, similiter etiā potus. & quæ quidem multus carnis esus præter consuetudinem assumptus facit, aut alliu, aut silphium, aut succus ipsius, aut caulis, aut alia huiusmodi, magnas quasdam peculiares vires habentia, minus admiretur quis vbi talia dolores ventriculis magis quàm alia inducunt. At iusta fuerit admiratio, si didiceris quantam maza turbationem, & molem, & flatum, & tormen ventriculo inducat, si præter morem ingesta fuerit, ab eo qui mazam edere non est solitus: aut qualem sitim panis ipse calidus ingestus inducat, & repentinam repletionem, ob siccandi vim, & quod tarde trāsīt; & quàm diuersas inter se affectiones faciant, & panes valde puri, & qui ex toto sūnt collati, præter consuetudinē in cibo accepti, itemque maza sicca præter morem, aut liquida, aut viscosa: & quale quid faciant polentæ recentes non adsuēris. & aliæ his qui recetibus vti adsuēti sūnt, itemq; vini & aquæ potus, præter morē derepente vicissim per-

Calidus panis sitim adfert.

Cc-ii] mutatus,

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

mutatus, & aquosum vinū, & meracum, præter cōsuetudinem D
derepente potatū. Illud enim humiditatē in superno ventre
inducit, & flatū in inferno. Hoc vero venarū palpitationem,
& capitis grauitatē ac sitim. Quin & album vinū, & nigrum,
si quis præter cōsuetudinem permutet, etiam si ambo vinosa
fuerint, tamē multa in corpore alterarint, vt minus mirum es
se quis dixerit. dulce & vinosum vinū non idem posse, si de-
repente permutata fuerint. Porro huiusmodi aliquā partem
sermoni contrario patrocinarī oportet: quod mutatio victus
his facta est, corpore non mutato, neq; ad robur, vt cibos ap-
ponere opus sit, neq; ad debilitatē, vt detrahere oporteat. In-
super autē & robur coniectandum est, & morbi vniuscuiusq;
modus, & hominis natura, & cōsuetudo victus ægri, non ci-
borum solū, sed etiam potuum. Multo autē minus ad additio- E
nem procedendū est. Nam detractionem omnino tollere se-
pe conducit: vbi suffecturus est æger, donec morbi vigor ma-
ture scat. In quibus autem hoc faciendum sit, scribetur. Mul-
ta vero etiam alia relatis cognata scribere quis possit. Hoc ta-
men melius testimoniū est. Non enim cognatū est rei illi de
qua plurimus à me sermo habit⁹ est, sed ipsa res opportunisti-
mum est documentū. Nam ab acutorū morborum initio, ali-
qui quādoq; eadem die qua morbus incēpit, cibos comede-
runt: aliqui postridie: quidā etiam sorbuerunt quicquid obla-
tum esset, quidā etiam cyceonem. Omnia autē hæc deteriora
quidē sunt, q̄ si quis alio modo victū instituisse, multo tamen
minus detrimentum afferunt in hoc tēpore peccata, quā si
quis primis duob⁹ aut tribus diebus, penitus vasa vacua fecis- F
set, & quarta aut quinta die, tali victu vsus esset. Deterius ta-
men est, si omnibus his diebus vasis euacuatis, in posteriorib⁹
diebus hoc modo victum instituat, prius quā conualescat ac
maturus sit morbus. Etenim hoc modo mortem plurimis ma-
nifeste affert, si non omnino facilis fuerit morbus. Quæ vero
ab initio cōmittuntur peccata, non similiter, vt illa medelam
omnem respuunt, sed multo facilius correctionem admittūt.
Hoc igitur maximum documentum esse arbitror, quod pri-
mi dies sorbitione tali vel tali, nō sint priuadi, in his qui pau-
lo postea talibus, aut talibus sorbitionibus vsuri sunt. Fun-
ditus igitur ignorāt, tum hi qui granosa prisana vtūtur, quod
ab ipsa læduntur, quā sorbere inceperint, si duobus, aut trib⁹,
aut

*Errores
ab initio
commissi
faciliter
corrigun-
tur.*

aut pluribus diebus antea vasa euacuauerint: tum hi qui succo vtuntur, quod sorbentes læduntur, vbi nõ recte sorbitionem inceperint. Tunc tamen cauent, & magnam noxam afferre cognoscunt, si priusquam maturus factus fuerit morbus, granosam prisanam sorbuerit æger, succo vti adsuetus. Omnia igitur hæc magna testimonia sunt, quod medici ægros non recte ad victum perducunt. Sed in quibus morbis vasa vacua facere non oportet, his qui sorbitionibus vti debent vasa vacua faciunt. In quibus vero ex vasorum vacuatione, ad sorbitiones mutationem facere nõ oportet, in his mutatione faciunt, & hoc plerunque absolute. Aliquãdo vero in his temporibus mutationem ad sorbitiones faciunt ex vasorum vacuatione, in quibus sepe ex sorbitionibus ad vasorum vacuationem accedere expediebat, si ita morbum exacerbari contingat. Aliquãdo autem & cruda attrahuntur de capite, & à thoracis regione, biliosa, & vigilie ipsis coincidunt, ob quas nõ coquitur morbus: & tristes ac amarulenti fiunt, & delyrãt, & splendores ipsis ob oculos obuersantur, & aures sonitu plene sunt, & extremæ partes perfrigeratæ, & vrinæ incoctæ, & sputa tenuia, & salia, & mæsto colore tincta, ac pauca, & sudores circa coelum, & anxietudines, & spiritus in latione fursum versus offendens, densus, aut etiã valde magnus, supercilia distenta ac grauata, deliquia animi praua, & stragulorum de pectore reiectiones, & manus tremulæ. Quãdoque vero labium infernum concutitur. Hæc autem in principijs comparentia, vehemẽtis delyrii significatione præbent, & plerunque ægri moriuntur. Qui vero effugiunt, aut cum abscessu, aut cum sanguinis è naribus fluxione, aut ex crassi puris sputo effugiunt: alias vero minime. Neque enim talium rempitos medicos esse video, quomodo debilitates in morbis dinoscere oporteat, & quæ ex vasorũ vacuatione efficiuntur, & quæ propter aliam aliquam irritationem, & quæ propter dolorem, & præ acumine morbi: itemq; quot affectiones, & omnigenas species, natura nostra & habitus singulis pariat: & quidem quum talium cognitio, aut ignoratiã, salutẽ aut mortem afferant. Maius enim malum est, si ob dolorem & morbi acumen debilitato, exhibet quis potum, aut sorbitionem copiosorem, aut cibum, ob vasorum vacuationem debilem esse existimans. Indecorum etiam est ob vasorum vacuationem

*Corporis
labor.*

debilitatum non cognoscere, & victu premere. Affert equidem periculum aliquod & hoc peccatum, verum multo minus quàm alterum. Multo autem magis risu dignum hoc peccatum est quàm illud alterum. Si enim alius medicus, aut etiam idiota, ingressus cognouerit ea quę contigerunt, & edenda ac bibenda dederit ea quę alter prohibuit, palam auxiliū tulisse putabitur. Talia vero faciunt, vt artuces maxime ab hominibus vituperetur. Videtur enim ipsis ille qui ingressus est medicus aut idiota, velut mortuum suscitasse. Scr. bentur autem de his quoq; signa, ex quibus singula dinoscere oportet. Consimilia tamen illis quę circa ventrem contingūt, & hæc sunt. Nā si totum corpus præter consuetudinem multum quiescat, nō statim magis robustum fit. Si vero etiā vbi multo tempore quieuit, derepente ad labores prodierit, vitiosum quiddā palam operabitur. Ad eundem modum etiam singulę corporis partes. Nā & pedes tale quiddam operabuntur, & alij articuli laborare non adfecti, si interposito tempore derepente ad laborandum prodeant. Eadem etiā oculi & dentes perperientur, & quęcunque tandem pars. Nam & lectus præter morem mollis dolorem inducit, itemque præter consuetudinem durus. Sed & si sub dio lectus præter morem sternatur, corpus indurat. Quin & talium omnium exempla scribere satius fuerit. Si quis enim accepto vlcere in tibia, neque valde periculoso, neque adeo contemneri. do, ita vt neque ipsi ita difficulter, aut adeo facile vlcera sanescāt: statim prima ab initio die decumbens curetur, & nequaquam crus eleuet, hic sanè hoc modo citra inflammationem fuerit, & sanus multo citius sic fiet, quàm si obambulans curetur. Attamen si quinta aut sexta die, aut etiam prius surrexerit, & progredi voluerit, magis vtique affligetur ac dolebit, quàm si statim ab initio obambulans curatus esset. Si vero etiam multū derepente se fatigauerit, multo magis dolebit, quàm si illo modo curatus, in illis diebus ita se fatigasset. Perpetuo igitur hæc omnia inter se testimonium præbent, quod omnia quę derepente multum supra modum huc & illuc mutantur, lædūt. Multiplex igitur in ventre læsio est, si ex multa vasorum vacuatione, plus moderato derepente ingeratur. Quin & in reliquo corpore, si ex multa quiete, ad ampliorem laborem derepente deueniat, multo magis lædetur, quàm si ex multo cibo ad

A cibo ad vasorum vacationem transmutetur, & si ex multo labore derepente ad ocium ac segniciem exciderit. Oportet tamen & his corpus quiescere. Oportet item illis ventrem à ciborum copia quiescere. Sin minus, & dolorem in corpore inducet, & totius corporis grauitatem. Plurim⁹ itaque sermo de mutatione huc atque illuc à me habitus est, eo quòd hæc nosse ad omnia commodum sit, & ad hoc præsertim de quo nobis sermo erat, quòd in acutis morbis ad sorbitiones mutationem faciunt ex vasorum vacatione. Facienda enim est mutatio velut ego iam iubeo. deinde non est vtendum sorbitionibus priusquam morbus maturus fact⁹ fuerit, aut aliud quoddam signum apparuerit, vel vacuatorium, vel irritatorium, circa intestinum, aut circa præcordia qualia scribentur signa. Vigilia fortis, potus & cibos crudos & inconcoctiores facit. Et rursus in contrariam partem mutatio, dissoluit corpus, & excoctionem ac capitis grauitatem inducit. Vinum porro dulce, & vinosum, & album, ac nigrum, & aquam mulsam, & aqua, & acetum mulsam, his notis distinguere oportet in morbis acutis. Vinum dulce minus caput grauatur, quàm vinosum, & minus mentem ferit, & magis quàm alterum per album & intestinum subit. Viscera vero magna facit, splenē & hepar. Quare neque his qui amara bile abundat commodum est. Nam & siticulosum in talibus est, & flatuosum in superno intestino: non tamen inferno intestino inimicum pro flatu ratione, & quidem quum non valde penetret flatu à vino dulci, sed circa præcordia moretur. Certè per vrinam hoc minus exit omnino quàm vinosum album. Sputum vero magis educit dulce quàm alterum. & quibus quidē siticulosum est dum bibitur, his minus quàm alterum vinum educit. Quibus vero siticulosum non est, his magis quàm alterum educit. At vero album vinosum vinum, plurima ac maxima ex parte iam & laudatum & vituperatum est, in dulcis vini enar ratione. Ad vesicam autem magis penetrat quàm alterum: & quum vrinā cieat, ac semper perrumpat, multum in his morbis profuerit. Nam & si ad alia incommodius sit altero, attamen quæ in vesica sit ab ipso purgatio, liberat, si quale oportet propellatur. Bonæ vero hæc notæ sunt de vini vtilitate ac detrimento, quas seniores me non nouerunt. Fuluo vero vino, & nigro austero, in his morbis ad hæc vti poteris, si capitis gra-

*Vigilia
innocua.
Vinū dul-
ce.*

*Vinū al-
bum.*

*Fuluo ui-
num.*

pitis grauitas non affuerit, neque mentis percussio, neque sputum ab ascensu prohibeatur, neque vrina suppressa sit: alui autem egestiones humectiores ac ramentosiores fuerint. In talibus sanè, vel maxime conuenerit ex albo transmutationem facere, & si qua his similia existunt. Hoc verò insuper intelligere oportet, quod si aquosum fuerit vinum, supernas partes omnes, & eas quæ circa vesicam sunt minus laudet. Verum partibus circa intestinum magis proderit, si meracius fuerit. Aqua vero mulsa si bibatur per totum morbum in acutis morbis, in totum quidem his qui amara bile abundant, ac magna viscera habet, minus commoda est quam his qui tales non sunt. Siticulosa tamen minus est dulci vino. Pulmonem enim molliat, & sputum moderate educit, & tussim lenit. Habet enim vim quandam exterioriam, quæ magis moderato sputum viscosum facit. Vrinæ etiam sufficere ciet aqua mulsa, si non aliqua ex visceribus affectio prohibeat. Sed & biliosa per aluium magis egerit, quandoque bona, quandoque magis quam conuenit colore saturata, ac spumosa: atque hoc biliosis & magna viscera habentibus magis cõtingit. Sputi igitur educationem, & pulmonis mollitionem, aquosior aqua mulsa magis facit. At spumosas alui egestiones, & biliosa magis quam cõuenit colorata, ac magis calida, meraca aqua mulsa magis ducit quam aquosa. Talis autè egestio habet quidem & alia magna nocumenta: Neque enim ex præcordiis ardorem extinguit, sed concitat, & anxiam molestiam, ac membrorum iactationem facit: Verum & intestina & sedem exulcerat. Horum autem auxilia scribentur. Qui igitur aqua mulsa vitur, absque sorbitionibus, pro alio potu, in his morbis, hic multum successum percipiet, & non in multis successu destituetur. Quibus autem danda sit, & quibus non, & ob quas causas non danda, maxima ex parte dictum est. Damnata vero est aqua mulsa ab hominibus, veluti quæ bibentes ipsam extreme debilitet: & propterea mortem accelerare putata est. Verum hoc propter eos qui seipsos fame conficere constituerunt dictum est. Aliqui enim aqua mulsa sola in potu vituntur. nimirum velut talis existat. At hoc non omnino hoc modo se habet. Sed si sola bibatur, multo quidem fortior est, quam aqua, si non aluium exturbet. Sed & vino albo ac tenui, & parum aquæ ferente, & in odore, aliqua-

Aqua mulsa.
sc.

A aliquatenus fortior est, aliquatenus debilior, Multum tamen differt & vini & mellis meracitas, ad vtriusq; vires. Nam etiam si duplam mensuram vini meraci quis bibat, respectu mellis quod delingat, multo tamen fortior fuerit ex melle solo, si alium non turbarit. Nam & multo plus stercoreis ipsi prodibit. Si tamen ptisanæ sorbitione vtatur, insuper autem aquam mulsam bibat valde ipsum replebit ac flatus excitabit, & visceribus circa præcordia incommoda erit. At si ante sorbitionem aqua mulsâ bibatur, non ita lædit velut si insuper bibatur, sed etiam aliquo modo proderit. Caterum cocta aqua mulsâ, aspectu quidem multo melior est quam cruda. Splendida enim & tenuis, albaque ac pellucida fit: Sed quam ipsâ virtutem attribuam, qua crudam præcellat, non habeo. Neque enim iucundior est quam cruda, si mel bonum esse contigerit, debilior tamen, & minus stercoreis ducens, quorum neutro vt castigetur aqua mulsâ opus habet. Proxime vero vtendum tali cocta, si mel prauum fuerit, & impurum, & nigrum, & non boni odoris. Coctura enim maiorem partem turpitudinis prauitatis ipsius detrahere poterit. At vero acetum mulsam appellatum si bibatur, sæpe quidem commodum esse in his morbis comperies. Nam & sputum educit, & facilem spirationem facit. Tempora vero huiusmodi habet. Et enim quod valde acre est, nihil moderati fecerit, ad sputa quæ non facile prodeunt. Si enim educeret ea quæ stridulam asperitatem faciunt, & lubricitatem induceret, & guttur velut dilataret, pulmonem vtrique leniret. Ipsum enim molliat, & si quidem hæc contingerent, magnam sanè utilitatem afferret. Aliquando vero id quod valde acre est, educationem sputi non obtinet, sed insuper viscosum id facit, & lædit. Maxime autem hoc perpetiuntur hi qui etiam alias perniciose habent, & qui neque tussire, neque exscreare inhærentia possunt. Ad hoc igitur vires ægroti insuper coniectare oportet, & si spem de ipso habeas, exhibere. Exhibere autem oportet si dederis, summe tepidum: atque tale paulatim, & non large. Quod vero parum acre est, humectat quidem os & fauces, sputum item educit, & sitim sedat, & præcordio & visceribus quæ sunt hac parte lene est, & detrimenta ex melle hac parte prohibet. Quod enim biliosum est in melle castigat. Flatus etiam erumpere facit, & ad mictionem proritat. Intestini

tamen

Aqua mulsâ quando obfit & contra.

Oxymel.

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

tamen infernā partem humectiorem facit, & ramenta inducit. Quādoq; vero etiā malum hoc fit in acutis morbis, maxime quidem, quod flatum penetrare, imò recurrere facit. Insuper autem & aliās debilitat, & extremas partes frigefacit. Atque hāc solam lēSIONem ex aceto mulsō contingere noui, quæ sanē digna sit vt scribatur. Parum autem de huiusmodi potu, nocte & ieiuno. ante sorbitionem præbibendum dare commodum est. Sed & vbi multum temporis post sorbitionē intercessit, bibere nihil prohibet. His vero qui solo potu degunt absque sorbitionib⁹, propterea non est cōmodum semper & perpetuo hoc vti, maxime propter rasurā aut exasperationem intestini. Quum enim stercore vacuum sit, magis vtiq; hæc induxerit; & quum vasorum vacuatio adsit, postea etiam aqua mulsā vires detraherit. Si tamen opitulari apparuerit ad totum morbum multus huius potus vsus, parum acetī affundere oportet, vt saltem cognosci possit. Ita enim & ea quæ lædere solet, minime læserit; & his quæ auxilio opus habent, opem tulerit. Cæterum vt in summa dicatur, acridines siue aciditates ex aceto, amara bile abundantibus magis conferunt, quā atrabiliaris. Amara enim dissoluuntur, & in pituitam transeunt, dum ab ipso attolluntur. Nigra vero fermentantur, & attolluntur ac multiplicātur. Acetum enim nigra sursum ducit. Mulieribus autem omnino magis aduersatur acetum, quā viris. Dolores enim vteri inducit. Aquæ porro potui in acutis morbis, nullum aliud opus habeo quod attribuā. Neque enim lenit tussim in peripneumonicis, neq; sputum educit, sed minus quā alia, si quis semper aquæ potu vtatur. Si tamen inter acetum mulsū & aquam mulsam, parum aquæ absorbeatur, sputum educit, propter qualitatis potuum transmutationem. Inundationem enim quandā inducit, aliās autem neque sitim sedat, sed exacerbat. Est enim naturæ biliosæ biliosa, & præcordio mala, imò pessima fit ac biliosissima, & vires maxime prosternt, vbi in vacuitatē ingressa fuerit. Sed & splenē auget & hepar, vbi inflammatū fuerit, & fluctuat ac superinnatat. Nam & tardi transitus est, eo quod frigida est & cruda ac incoctilis, & neque per aluū secedit, neque per vrinas transit. Insuper autem & propterea lēSIONem inducit, quod à natura stercus non subducit. Si vero etiam dum adhuc frigidi sunt pedes aliquando bibita fuerit,

Acetum.

Aqua.

A fuerit, hæc omnia multo plus lædit, ad quodcunque tandē ipsorum peruenierit. Vbi tamen in his morbis suspicatus fueris, aut capitis grauitatem vehementem, aut mentis percussione, penitus à vino abstinendum est, & aqua in tali vtendum: aut vinum aquosum & album penitus dādum, & penitus inodorum, & post ipsius potum aqua modica insuper bibenda. Ita enim robur vini caput & mentem minus percellet. In quibus autem potu ipsius maxime vtendum sit, & quando valde multa, & quando moderata, & quando frigida, & quando calida, partim prius dictum est, partim pro temporis occasiōe dicitur. Cæterum de reliquis potibus, qualis est ordeaceus, & qui ex herbis fiunt, & qui ex vua passa, & vuarum expressarū re-

B trimentis, & ex tritico: & cnico, & myrti baccis, & malo punico, & de aliis, vbi alicuius ipsorum vsus cōtigerit, scribetur circa ipsum morbum: quemadmodum etiā de aliis compositis medicamētis. Balneū vero in multis morbis opē tulerit

Balneum.

eo vtentibus, ad aliquos quidem assidue, ad aliquos nō item. Quandoque vero minus eo vtendum est, propterea quod homines ad hoc sint imparati. In paucis enim domib. præparata sunt necessaria instrumenta, & nec ministri velut opus est parati habentur. Si vero non omnino bene quis lauetur, non modicam læsionem incurreret. Nam & tugurio fumum nō habere opus est, & aqua larga, & balneo multo, & non valde large affuso, si sanè non ita opus fuerit. Et defricione quidem potius vtendum non est. Si vero defricetur, calido vtendum

C est ipso defrictorio medicamēto, eoq; multiplici magis quàm aliàs receptum est, & insuper non pauca aqua perfundendū, & cito perfundendum. Breui quoque via ad solium opus est, & vt facilis sit insensus, & facilis item exitus. oportet autem eum qui lauatur esse moderatum ac taciturnum, & nihil ipsum operari, sed alios & perfundere, & defricare. Debet etiā postea multa aquæ mixtura parata esse, & celeres perfusiones fieri, & spongiis vtendum est pro strigili, & nō valde siccum inungendum est corpus. Caput tamen resiccatum esse oportet, quātum eius fieri potest maxime, ita vt spongia extergatur. & neq; perfrigerari caput oportet, neq; extremas partes, neque reliquum corpus. & neq; eum qui recens sorbitionem accepit, neque eum qui recens potum sumpsit lauare oportet. & neque sorbere, neq; bibere cito post balneū. Ma-

quam

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

gnam tamen partem agro tribuere conuenit, si sanus balnei valde amans fuit, & lauari adfuetus. Tales enim magis appetunt, & loti vtilitatem sentiunt, & non loti leduntur. Conuenit autem in totum magis peripneumoniis, quàm febribus, ardentibus. Nam dolorem lateris & pectoris ac dorsi balneum lenit, & sputum maturum facit, ac educit: & facilem spirationem reddit, & lassitudinem eximit. articulos enim & cutis su perficiem mollit. Sed & vrinam ciet, & capitis grauitatē soluit, & nares humectat. tot igitur bona balneo adsunt, quibus omnibus opus est. Si vero apparatus penuria aliqua fuerit, in vna re vel pluribus. periculum est ne magis lædat balneum quàm proficiat. Singula enim ex ipsis magnum detrimentum afferunt, si non à ministris velut conuenit præparata fuerint. Minime vero tempestiuum est eos lauare, quibus aluus in morbis liquidior iusto est. itemque eos quibus pius iusto adstricta est, & non prius subiit. Sed neque debilitatos lauare oportet, neque ex ciborum fastidio nauseantes, aut vomentes, neque eos qui biliosum eructant, neque eos quibus sanguis ex naribus erupit, nisi minus quàm pro occasione cōuenit, fluat. Occasiones autem nosti. Si vero minus quàm pro occasione fluat, lauare expedit, siue totum corpus ad reliqua inde opem sentiat, siue caput solum. Si igitur præparationes cōmodæ fuerint, & æger bene suscepturus est balneum, quotidie lauare conuenit. Eos vero qui balneo delectantur, etiam si bis in die laueris, nihil peccaueris. Cæterum balneis vti, multo magis licet his qui tota prisana vtuntur, quàm his qui solo vtuntur succo. Licet autem & his aliquando. Minime vero his qui potu solo vtuntur. Sunt tamen ex his quoque quibus licet. Coniectare vero ex præscriptis oportet, & quibus balneum in singulis victus modis profusurum est, & quibus nō. Quibus enim aliquid horum deest cōmodorum, quæ balneum facit, & quæ balneo commodant, lauare non oportet. Quibus vero nihil horum deest, & adsunt ipsis signa in quibus lauari conducit, lauare oportet. Febris autem ardens sit quum resiccata venulæ, hora æstiuæ acres ac biliosos serofos humores, in seipsas attraxerint: & febris multa detinet, & corpus velut ex ossium lassitudine detentum, delassatur ac dolet. Fit autem plerunque & ex longo itinere, & longa siti, quum resiccata venulæ acres ac calidas fluxiones in seipsas attraxerint. Fit autem

Febris ardens qui fit.

autem lingua aspera ac sicca, & valde nigra, & dum circa vē-
 trem mordetur, dolet: & alui egestiōes valde liquidæ ac pal-
 lidæ fiunt: & sitis vehemens inest, itemque vigiliæ. Aliquādo
 etiam mentis emotiones. Huic & aquā, & aquam mulām a-
 quosā coctam, quātum voluerit, bibendam dato. & si amarū
 fuerit os, vomere conducit, & ventrem per clysterem subluē-
 re. Si vero ad hæc non solvatur, lacte asinino cocto purgato.
 Salsum autem nihil, neque acre exhibeto. Nō enim iufferet.
 Sorbitionem vero donec extra iudicationes fuerit, ne dato.
 Et si sanguis ex narib. fluxerit, soluitur affectio, itemque si ſi-
 dores accedāt iudicatorij, genuini, cū urinis albis & crassis,
 ac subsidentiis leuibus: & si abscessus aliquis fiat. Si vero abs-
 que his soluta fuerit, recidiua rursus ægritudinis continget.
 Aut coxæ, aut crurum dolor emerget. & crassa expuet, si sa-
 nus futurus est. Febris ardentis genus aliud. Alius subit, *Causos.*
 siti plena est, lingua, aspera, sicca, saluginosa. Urinæ interce- *alius.*
 ptio, vigilia, extremitates frige factæ. Tali si non sanguis ex
 naribus fluxerit, aut abscessus circa collum fiat, aut crurū do-
 lor, & sputa crassa spuerit (hæc autē suppressa aluc fiunt) aut
 coxæ dolor, aut pudendi liuor, non iudicatur. & testis inten-
 sus iudicatorium signum est. Sorbitiones attractorias dato.
 Verum in acutis morbis venam secabis, si vehemens appare-
 at morbus, & qui ipsum habeant in vigoris ætate fuerint, &
 robur ipsis affuerit. Si quidem igitur angina fuerit, siue ali-
 quis alius ex pleuriticis morbus, eclegmatis delinctu repur-
 gato. Si vero debiliores appareant, si plus de sanguine detra-
 xeris, infuso alui per clysterem tertio quoq; diē vtere, donec
 intuto fuerit æger, aut etiā fame opus habeat. Præcordia *Præcor-*
 inflāmata non ex flatuum interceptione: septi transuersi in- *diorum in*
 tensiones, aut spirituum protensiones: in rectæ cervicis spi- *flamma-*
 ratione sicca, quibus pus nō subest. Verum ex flatuum inter- *tiōes unde*
 ceptione, affectiones hæc accedunt. Maxime autem & hepatis
 dolores, & splenis grauitates, & alix inflāmationes, & supra
 septum transuersum dolores ac morborum collectiones, sol-
 ui non possunt, si quis prius medicamētis purgare aggredia-
 tur. Nam venæ sectio in talibus principalis est. Deinde infu-
 sa per clysteres, si non magnus & vehemens fuerit morbus.
 Sin minus, etiam postea medicamēto purgante opus est. Sed
 & post venæ sectionem, purgans medicamentū securitate ac
 modera-

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

moderatione opus habet. Quicumque vero ea quæ inflàmata sunt, statim in principio morborum medicamento soluere aggre-
 diuntur, hi de intento quidem ac inflàmato nihil aufe-
 runt: non enim remittit affectio quæ adhuc cruda est: quæ
 vero morbo resistunt ac sana sunt, colliquefaciunt. Debili ve-
 ro nente corpore, morbus inualefcit. Quam autem morbus
 corpori præualuerit, tale iam incurabiliter affectum est. Ut
 aliquis derepente voce priuatus fiat, venarum interceptio-
 nes faciunt, si sano hoc contingat absque manifesta, aut alia
 forti causa. Venam igitur secare oportet, in brachio dextro
 internam, & sanguinem detrahere, iuxta habitum ac ætatem
 rationem ineundo, an plus aut minus oporteat. Coincident
 autem plurimis ipsorum hæc: rubores faciei, oculorum sta-
 bilitates, digitorum in manibus distentiones, dentium stri-
 dores, pulsationes, maxillarum contractiones, extremitatum
 perfrigeratio, spirituum per venas interceptiones. Quum
 dolores accefferint, atræbilis & atrium fluxionum affluxus
 fiunt. Dolent autem partes internæ dum mordentur. Cõuer-
 sæ vero, & valde siccæ fientes venæ intenduntur, & inflàmata
 affluentia attrahunt. Vnde corrupto sanguine, & spiritib⁹
 non potentibus naturales in ipso vias permeare, perfrigera-
 tiones fiunt ex statione, & vertigines, & vocis interceptio, &
 capitis grauitas, & conuulsiones, si iam ad cor, aut hepar, aut
 ad venam deuenerint. Hinc morbi comiciales fiunt, aut semi-
 syderati, si in ambientes locos fluxiones inciderint, & à spi-
 ritibus pertransire non potentibus resiccatae fuerint. Quare
 talibus, fomentis prius adhibitis, venam secare oportet sta-
 tim ab initio, dum adhuc eleuati sunt omnes affligentes spi-
 ritus, ac fluxiones. Facilius enim auxilium admittunt, & refe-
 ctis viribus, & consideratis iudicationibus, medicamentum
 exhibere sursum purgans, si non alleuetur: ad infernam vero
 aluum, si non subeat, insutum per clysterem adhibere. Postea
 vero lac asininum coctum dato, & non minus quàm duode-
 cim heminas bibat. Si vero virium robur adsit, plures quàm
 sedecim. Angin⁹ fit quum fluxio ex capite multa ac glati-
 nosa, tempore hyberno aut verno, ad venas iugulares influ-
 xerit, & hæ fluxionem ampliolem, propter amplitudinem,
 attraxerint. Quum autem frigida & glutinosa sit, spiritus trá-
 situs obturabit, & sanguinis transitus obturans, propinquas
 sanguinis

Vocis in-
 terceptio.

Comitia-
 les morbi
 unde.

Angin⁹
 quâlo fit.

sanguinis partes congelat, ipsumque immobilem ac stabilem facit: quum natura frigida sit, & obturandi vim habeat. & propterea suffocantur, lingua liuescente, & rotunda fiente ac reflexa, propter venas quæ sunt sub lingua. Precisa enim vena, quam aliqui columellam vocant, vena crassa ab utraque parte est. Quum igitur hæ plenæ sint, & in linguam innitantur, quæ rara est ac spongiosa, propter siccitatem: cõtingit vt ipsa præ violẽtia humorem ex venis suscipiens, ex lata fiat rotunda: ex bene colorata, liuida: ex molli, dura: ex facile flexibili, inflexibilis: adeo vt æger cito suffocetur, si nõ quis cito auxilium ferat, venæ sectionem à brachiis faciens, & venas sub lingua secans, & eclegmatũ delinctu curans, & calidos gargarismos exhibens, & caput radẽs. Debet autẽ & ceratum collo ac capiti circũponere, & lanas obuoluere, & spõgiis mollibus ex aqua calida expressis fouere. Bibat autẽ æger aquam, & aquã mulsam, non frigida. Succum vero prisa-
næ tunc sumet, quum iam ex iudicatione in tuto fuerit.

*Aliud an-
ginae ge-
nus.*

Quum vero æstiuo vel autumnali tempore, fluxio calida ac nitrosa, de capite defluerit, vt pote ex tempore acris ac calida facta: talis vbi est mordet, & vlcerat, & spiritu implet, & ceruicis spiratio accedit, & siccitas multa, & quæ videtur gracilia apparent. & tendines posteriores in collo distenduntur, & velut in tetano distenti esse videntur. & vox abrupta est, & spiritus paruus est, & retractio spiritus densa ac violenta accedit. Talibus arteria vlceratur, & pulmo ardet, quum non possint extrinsecum spiritum inducere. Et si his affectio non vitronea ad externas colli partes deferatur, grauior ac inuitabilior est, & propter tempus, & quod à calidis & acribus sit humoribus. Si febris corripiat, veteri stercore non subeunte, aut à cibo recens accepto, siue cum dolore lateris, siue absque eo, quietem agere oportet, donec cibi descenderint prius ad infernam aluum: potu vero vt acetum mulsio. Quum autem ad lumbos grauitas deuenierit, infuso per clysterem eluere, aut medicamento purgare oportet. Vbi vero purgatus fuerit, victum præscribere ex sorbitione primum, & aqua mulsæ potu. Deinde ex cibis ac piscib⁹ coctis, & vino aquoso, modico, ad noctem. Interdiu autem, ex aqua mulsæ aquosa. Quum vero flatus graueolentes prodierint, glandula subdititia, aut infuso per clysterem vtendum erit. Sin minus, in
Dd aceti

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

aceti nulli potu cohibere oportet, donec ad infernam alu-
uum descenderint cibi, deinde sic per infusum clysteris sub-
ducere. At si mollem ac vacuum ventrem habenti febris
ardens accedat, si tibi commodum esse visum fuerit medi-
camentis purgare, intra tres dies id ne feceris, sed quarto.
Postquam vero medicamentum exhibueris, sorbitionibus
utere, obseruans febrium exacerbationes, vt nunquam exhi-
beas quum sunt, aut futuræ expectantur, sed vbi desinunt, aut
quieuerunt, & quàm longissime à principio. Quum vero
frigidi sunt pedes, neque potum, neque sorbitionem, neque
aliud quicquam eiusmodi dato: verum maximum hoc esse
ducito, vt expectes donec valde fuerint calfacti. Deinde
sic id quod conducit exhibe. Plerunque enim futuræ exa-
cerbationis febris signum est pedum frigiditas. Si vero in
tali tempore exhibueris, maxime per omnia peccaueris.
Morbum enim non parum augebis. Quum autem febris de-
finit, vice versa pedes reliquo corpore calidiores sunt. Au-
getur enim frigesaciens pedes, accensa ex thorace, ad caput
flamam remittens. Vniuerso autem calore acervatim sur-
sum concurrente, & ad caput exhalante, merito pedes fri-
gidi sunt, vt qui excarnes & nervosi natura existant. Insu-
per autem etiam quum longe à calidissimis locis absint, per-
frigerantur, calore ad thoracem coacervato. Et rursus iuxta
proportionem, quum febris soluitur, & in tenues partes diri-
mitur, ad pedes calor descendit. Hoc igitur tempore & ca-
put, & thorax ipsorum perfrigeratur, qua de causa sorbitio ex-
hibenda est. Nam vbi pedes frigidi fuerint necesse est ven-
triculum calidum esse, & multo fastidio plenum, & præcor-
dium intentum, & corporis iactationem, propter internam
turbationem; & mentis abalienationem, & dolores, & æger
distrahatur, ac vomere cupit, & si prava vomuerit, dolet.
Postquam vero calor ad pedes descendit, & vrina progres-
sa est, etiamsi non sudarit, omnia desinunt. Hoc igitur tem-
pore sorbitionem dare oportet: alioquin perniciofa est.

Quibus vero perpetuo aluus in febribus liquida est, his
præcipue pedes calefaciens, & ceratis integens, & fasciis ob-
uoluens, animum aduerte vt ne sint reliquo corpore frigi-
diores. Si vero calidi sunt, calefactorium nullum adhibe, sed
conserua vt ne perfrigerentur. potu autem utendū est quàm
paucissimo,

*Pedū fri-
gus febris
accessum
denotat.*

*Pedū ca-
lor.*

*Alui solu-
tæ curatio*

A paucissimo, aqua frigida, aut aqua mulsa. Quibus autem in febribus aluus liquida est, & mens perturbata, & multi ex talibus floecos auferunt, & nares scalpunt, & paulatim quidem respondent si interrogentur, ipsi vero à seipsis nihil aptum dicunt: talia atrabilia esse mihi videntur. Talibus igitur ita se habentibus, si aluus liquida fuerit, ac colliquuerit, videtur mihi sorbitiones frigidiores ac crassiores exhibere oportere, & poriones aluum sistentes, & vinosiores magis quàm adstringentes. At quibus in febribus vertigines ab initio, & capitis pulsus fiunt, & vrinæ tenues, in his expectare oportet, vt ad iudicationes febris exacerbetur. Nec vero admirarer, si delirarent. Quibus in principio vrinæ nebulosa, aut etiam crassa sunt, tales depurgare oportet, si etiam alia contulerint. Quibus vero in principio vrinæ tenues, tales ne purgato, sed si visum fuerit, infusum per clysterem adhibeto. Hos sic curare conducit. Aeger corpore quietem agat, vngaturque ac æqualiter contegatur. Potu utatur aqua mulsa aquosa: & sorbitione succi ptisanæ ad vesperam. Aluum vero ab initio per clysteris infusum subducito. Medicamenta autem his ne exhibeto. Si enim quid circa ventrem commoueris, vrina non concoquitur, sed absque sudore ac iudicatione, febris ad multum tempus durabit. Sorbitiones autem vbi prope iudicationem fuerit, ne dato, si turbetur: verum quum remiserit turbatio, & ad melius procedet. Obseruare vero etiam omnium febrium iudicationes oportet, & in hoc tempore sorbitiones detrahare. Solent autem C lōgæ fieri hæ febres, & impetuosos humorum de loco ad locum illapsus habere, si quidem infernæ partes frigidæ, fuerint, circa aures & collum. Si vero non fuerint frigidæ, alias mutationes habent. Fluit autem sanguis ex naribus, & aloi his exturbantur. Quibuscunque vero febres anxiosæ sunt, & quæ præcordia intendunt: & decubentes in eodem loco decubitus non sustinent, & extremæ partes perfrigerantur, hi plurima omnino diligentia ac custodia opus habent. Degant autem hi vt nihil ipsis exhibeas aliud, quàm acetum multum aquosum. Sorbitionem vero ne exhibe, donec febris desierit, & vrina concocta fuerit. Decumbere autem debet æger in domo obscura, & in stratis quàm mollissimis reclinatus esse, ita vt multo tempore decubitus in eodem loco toleret.

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

*Vrinarū
cognitio.*

& quàm minimum se iacet. Hoc enim talibus maxime prodest. Super præcordium vero, lini femen linteum impositum, obseruando vt ne horrescat æger dum apponitur. Sit autem summe tepidum, aqua & oleo coctum. Coniectare vero ex vrinis oportet id quod futurum est. Si enim crassiores ac pallidiores fuerint, meliores sunt. Si vero tenuiores ac nigriores, deteriores. Si autem mutationes habent, temporis diuturnitatem significant: & necesse est vt morbus & ad deterius, & ad melius, inæqualitatem permutet. Cæterum inconstantes febres finire oportet, donec constiterint. Quum vero constiterint, & victu, & curatione conuenienti occurrere, speculatione secundum naturam facta. Sunt autem aspectus ægrotorum multi. Quare animaduertendum est medico, vt ne aliqua manifesta causa ipsum lateat, neque ex his quæ ratiocinatione cognoscuntur, neque ex his quæ ad numerum parem aut imparem apparere oportet. Maxime igitur numerum imparem vereri oportet. Nam hi dies in alterutram partem ægrotos inclinare faciunt. Primum itaque diem obseruare oportet, quo æger debilis esse cœpit, cognito principio ex quo, & quando. Præcipuum enim hoc est vt sciatur. Quum vero ægrum interrogaueris, etiam hæc omnia considerabis. Primum quidem quomodo caput habet, an doloris exors sit, nec grauitatem in seipso habeat. Deinde præcordia & latera an doloris exortia sint. Si enim præcordiū dolorosum fuerit aut eleuatum, aut obliquitatem aliquā habuerit, aut fatietatem: aut lateris dolor affuerit, & vnà cum dolore, tussicula, aut tormen, aut ventris dolor. Quum horum quid affuerit in præcordio, aliu maxime infusus per clysterē soluere oportet. Bibet autē aquā mulsam calidam coctam. Considerandum vero est an dum exurgit, animi deliquium incidat, an bona spiritus tolerantia ipsum habeat: & inspicienda alui egestio, num vehementer nigro colore prodierit, aut pura, quales sani hominis sunt egestionis: & an febris ad tertium diem exacerbetur. Vbi vero valde probe tales consideraue-
ris in his morbis tertia die, ad hæc iam etiam alia contemplare, & si quarta simile quid tertiæ habuerit ex iisdem illis, æger in periculo versatur. Ex signis autem, nigra alui egestio, mortem significat. Quæ vero sani hominis egestionis similis est, si per omnes dies apparuerit, salutare signum est. At si glande

*Signa alui
ejectionis.*

A si glande subdita non obedierit, & spiritus bona tolerantia affuerit, si ubi ad sedem exurrexit, aut isthic in lecto, animi deliquium inciderit: Hæc ubi ægroto, aut ægrotæ, ab initio affuerint, delirium futurum expecta. Intentus autē sūs quoq; ad manus. Si enim tremulæ fuerint, tali sanguinis de naribus destillationem futuram expecta. Inspicere vero ipsas nares oportet, an spiritus æqualiter per utraq; feratur. & si multus feratur è naribus, conuulsio fieri solet. Si vero conuulsio fiat, tali mors expectanda est: & bene habet si quis hoc prædicat. Si vero in febre hyberna, lingua aspera fiat, & animi deliquia adsint, tali remissio febris contingere solet: at tamen fame talem macerare oportet, & aquæ mulæ potu, ac prisanæ succo conseruare, ita ut fidem ne habeas febrium remissioni. Nam qui talia signa habent, de vita periclitantur. Vbi vero hæc cognoueris, ac probe contemplatus fueris, ita fore prædicere potes, si placuerit. Quum vero in febribus horrendum quid acciderit quinta die, aut alius de repente liquida deiecerit, & animi deliquium incadat: aut vocis priuatio contingat, aut conuulsio, aut singultus fiat: ex his anxiosus fieri æger solet, & sudores sub naso, & circa frōtem ac ceruicem à posteriore capitis parte oboriri. Qui vero hæc patiantur, spirituosī facti non longe postea moriuntur. Quibus autem in febribus crura sunt tuberculosa, atque hæc tubercula moram traheantia non maturantur, febribus perseverantibus, & strangulatio acciderit in faucibus, ita ut partes circa fauces graciles existāt, & tubercula nō maturata facta, sed extincta fuerint: talib⁹ sanguis è naribus fluere solet. Et si quidem multus fluxerit, solutionē morbi significat. Sin minus, morbum longum. Quanto autem minus fluxerit, tanto deterius est, & longitudo maior. Si vero reliqua facilima fiant, tali dolores ad pedes expectare oportet. Si autem contigerint pedem, & dolorosus esse perseveret æger, & calore affligatur, ac non solvatur, paulatim & ad ceruicem dolores peruenient, & ad claviculam, & humerum, & pectus, & articulum. Nam & hunc tuberculosum fieri oportebit. His autem extinctis, si manus contrahantur, aut tremulæ fiant, conuulsio talem corripit, & delirium. Sed & pustulæ in supercilio oriuntur, & rubores habet, & palpebra altera ad alteram progerminat, & inflammatio dura detinet, &

*In ægro
que con-
sideranda*

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

Delyrii signa.
 oculus vehementer intumescit, & delyrium valde augefcit. D
 Noctes autem plus quam dies delyrij significationem præ-
 bent. Multa vero signa ad imparé numeru magis sunt, quam
 ad parem. Vtro autem horum numerorum fiant, lethalia exi-
 stunt. Tales vero si quidem ab initio medicamentis purgare
 volueris, ante quintum diem id facito, si venter murmurarit.
 Sin min⁹, impurgatos finito. Si vero murmurarit, & alui ege-
 stiones biliofa fuerint, scammonio dato moderate purgato.
 In reliquo vero victu potus ac forbitiones parcissime exhi-
 beto, quo melius æger habeat, si non remissione facta deci-
 mumquartum diem transgressus fuerit. Quum febricitan-
 ti decimaquarta die vocis interceptio accesserit, non cita so-
 lutio contingere solet, neque liberatio à morbo fieri, sed té-
 poris diuturnitatem tali significat. E
 Quum itaque apparuerit in hac die, longius protrahetur morbus. Quum febrienti
 quarta die lingua conturbata loquitur, & alius biliofa li-
 quida egerit, talis delyrare solet. Sed obseruare ac assequi e-
 uentus oportet. Aestiuo ac autumnali tempore in mor-
 bis acutis, sanguinis destillatio repentina, firmitatem ac mul-
 tam inflammationem circa venas significat, & in posterum
 diem tenuium vinarum apparitiones. & si ætate viguerit, &
 corpus in exercitio, aut bene carnosum habuerit, aut atrabi-
 liarius fuerit, aut ex potu manus tremulas habuerit, bene
 habet vt delyrium, aut conuulsionem prædicas. Et si qui-
 dem in diebus paribus accedat, melius est. In iudicatione
 vero perniciosum, si non multus acervatim concitatus san-
 guis, redundantia exitus faciat per nares aut per sedem: aut
 abscessus, aut præcordiorum dolores, aut ad testes, aut ad cru-
 ra dolores inducat. His autem cōcoctis, exitus sunt sputorū,
Singultus medela.
 crassarum vinarū, leuium, albarum. Febri singultuosa sil-
 phij succum, acetum mulsum, daucum tritum, bibenda dato.
 & galbanum in melle. & cuminum in eclegmate delingen-
 dum. & pūsanæ succum post hæc forbendum. Talis autem
 effugere non potest, si non sudores iudicatorij, & somni
 æquales accesserint: & vrinæ crassæ & acres decurrerint,
 aut ad abscessum morbus decubuerit. Nux pinea, & myr-
 rha, in eclegmate dentur. Bibendum autem talibus ace-
 tum mulsum quam minimū dato. Si vero valde siticulosi
Peripneum.
 fuerint, aquā ordeaceam. Peripneumonicas ac pleuriticās
affectiones

- A**ffectiones sic considerare oportet, an acuta sit febris, & dolores lateris alterius, aut vtriusque: & dum spiritus sursum fertur an doleat: & an tussis adsint, & sputa prodeant fulua, aut liuida, aut etiam tenuia, & spumosa, & florida: & si quid aliud diuersum habeat, ab his quæ illis fieri solent. Hunc sic degere oportet. Si quidem dolor sursum tendat ad claviculā aut circa māmam, & brachium, venam in brachio secare oportet internam, vtra tandem fuerit parte, in ea ipsa: detrahere vero sanguinē iuxta corporis habitum, & tempus, & ætatem, & colorem, plus & confidenter. & si acutus fuerit dolor, ducere vsq; ad animi deliquium. Postea vero infusum per clysterem adhibere. Si vero sub thorace fuerit dolor, & valde distēdat, pleurítico medicamento aluum subpurgato, & interim dum purgatur, nihil dato. Post purgationē vero acetum mulsim. Medicamentum autem purgās exhibeto quarta die. Verum per tres ab initio, infusum per clysterem adhibeto: & si hinc non alleuetur, sic subpurgato. Custodia autem fiat vsq; ad febris quietem ac septimum diem. Deinde si in tuto esse videatur, succum modicū ac tenuem primum melle, ammixto exhibeto. Si vero facile educat sputū, & bene spiret, ac doloris exors sit circa latera, etiam paulo crassiorē ac ampliorem, & bis in die dabis. Si vero non facile liberetur, potionem pauciorē, & modicam sorbitionem, succum tenuem, eūmq; semel, & in quo tempore melius degit, exhibeto. Cognosces autem hoc ex vrinis. Sorbitionem enim exhibere in his morbis non prius oportet, quā vrinas concoctas, aut sputa matura facta esse videris. Si vero is qui medicamentum accepit, frequēter & multum purgatus fuerit, necesse est dare, verū pauciorē ac tenuiorem. Non enim poterit dormire, præ vasorū vacatione, neque similiter coquere: neque iudicationes sustinere ac expectare. At vbi crudorum colliquationes factæ fuerint & ea quæ renituntur abiecerit, nihil obstat. Matura vero sunt sputa quidē, quum similia fuerint, puri. Vrinæ autem subsidentias habentes subrubras, velut est eruum. Nihil autē prohibet & ad alios laterum dolores tepefactoria apponere & cerata. Inungere autē crura ac lumbos oleo calido, & pinguedinem illinere. præcordia vero ex lini semine integere vsq; ad mamas. At vbi in vigore est peripneumonia, auxilium non admittit, si non expurgetur, & malum est si æger difficulter spirare
- Dd iijj raueri;

Peripneumoniae medicata.

rauerit: & vrinę tenues & acres, & sudores circa collum ac caput fiant. Tales enim sudores prauī sunt, prae suffocatione, & impetu ac violentia, superantibus morbis, si non vrinae multę ac crassę prodierint, & sputa matura exierint. Vtrum autę horum sua sponte venerit, morbum soluit. Ad peripneumoniā medicamentum quod delingitur. Nux pinea & galbanum, in melle Attico. Abrotonum in aceto mulso. Piper veratrum nigrū feruefacito, & pleuritico in principiis dum dolor vexat, bibenda dato. Bonum est & panacem in aceto mulso feruefacere, & excolare, ac bibendum dare, tum hepaticis, tum in doloribus septi transversī. Et quęcūque ad ventrem, aut ad mictionē impellere oportet, hæc in vino & melle dabis, illa ad ventrem, cum aqua multa aquosa copiosiore bibenda dato. Dysenteria sedata abscessum, aut tumore aliquem faciet, si non ad febres, aut sudores, & vrinas crassas, & albas, ac valde perspicuas, aut ad tertianas, aut ad varicem, aut ad testem, aut ad crura, aut ad coxam dolor decubuerit. In febre biliosa ante septimum diem, cum rigore morbus regius accedens, soluit febrem. Verum sine rigore si accedat, extra temporis occasiones, perniciosus est. Tetanus lumborum in anteriorem ac posteriorem partem distentio: & in atrabiliariis, vbi spirituum per venas interceptiones fuerint: venesectione solvuntur. Quum autem a tendinibus vehementer in anteriorem partem reuelluntur, & circa collum ac faciem sudores fiunt, dum prae dolore mordentur ac resiccantur tēdines vsque ad sacri ossis finem exporrecti, qui crassiores spinam continent, qua parte maxima ligamenta exorta, deorsum ad pedes vsque definunt: Tali si non febris & somnus accesserit, & sequentes vrinę concoctionē habentes prodierint, & sudores iudicatorij, vinum creticum vinosum bibendum dato, & farinam coctam edendam. Et cerato vngito ac illinito, & integito crura vsque ad pedes, vbi calida aqua prius in scapha perfudisti: brachia quoque ad digitos vsque integito: & lumbos ac spinam à collo vsque ad coxas pinguedine incerata molli pelli illita circumdato, ita vt etiam anteriores partes complectatur: & interposito tempore, per vtriculos calida aqua infusa foueto, & circumtento linteo ipsum reclinato. Alium vero ne valde soluas, nisi glandula subdiaphragmatica, si multum tempus fuerit, quo absque egestionē permāsit.

& si

A & si quidē in melius res tibi procefferit, satis est. Sin minus, mei radicem in vino odorato trita, & daucum bibenda dato, mane vbi ieiunus est ante calidę perfusionē. & post hęc breuī farinam coctam, tepidam, plurimam edat. & vinum vbi voluerit, bene temperatum insuper bibat. & si quidē in melius res tibi procefferit, satis est. Sin minus, prædicere oportet. Morbi porro omnes solvuntur, aut per os, aut per alium, aut per vesicam, aut alium aliquē eiusmodi articulum. Verum sudoris species omnibus communis est. Veratrum dare his oportet, quibus à capite fluxio fertur. Quicunque vero ex abscessibus, aut venę ruptura, aut propter intemperantiam, aut ob aliam quandam fortem causam, suppurati sunt, talibus veratrum ne dato. Nihil enim profuerit, & si quid perpetietur, æger, veratrum in causa esse videbitur. Si vero corpus dissolvatur, aut dolor in capite sit, aut aures obturatę sint, aut nares, aut sputatio; aut genuum grauitas sit, aut corporis tumida moles præter consuetudinem, dato quicquid tandem horum contigerit, si non ex potibus, neque ex rebus venereis, neque ex tristitia, neque ex curis, neque vigiliis hæc fiant, & si quidem horum quid in causa fuerit, ad hoc ipsum curationem instituito. Dolores ex itinere, laterum, dorsī, lumborum, coxarum, & quicunque respirantes dolent, causam manifestam habentes. Sæpe enim ex crapulis & cibis flatuosis, dolores procedere solent, & ad lumbos, & ad coxam. Quibus vero ipsorum talia fuerint, vrinę difficultas ipsis accedit. Horum autē causa iter est, & grauedinū ac raucedinum. Quicunque ex victus ratione contingunt, Pleraque vnusquisque prout præter cōsuetudinem victu vsus fuerit, maxime annotat. Nam qui nō soliti sunt prandere, si pransi fuerint, multus ventris tumor ipsis accedit, & dormitatio ac repletio. Si vero insuper cœnauerint, aluus exturbatur. His vbi balneo vsi sunt, dormire conducit. Vbi vero dormiuerunt, deambulare lenta ac multa circumsione. & si quidem aluus euacuata fuerit, cœnare, & bibere vinum paucum, meracius. Si vero euacuata non fuerit, corpus oleo calido illinere, & si sitierit, vinū aquosum album aut dulce bibere ac quiscere. Si vero non obdormierit, amplius quiescere. Reliquus victus similiter vt his qui crapula grauantur constituatur. Quod vero ad potus attinet, qui quidem aquosi sunt, tardioris trāsitus sunt, & intus obuol-

Morbore
solutio.

Veratro
purgandi
sunt quib⁹
à capite
dissolutio
finit.

Crapula
morborem
parens.

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

obuoluuntur, & circa præcordia redundant, & ad mifionem non decurrunt. Tali vero potu repletus, nullum opus celeriter perficere poterit, ex his quæ intento corpore per violentiam aut celeritatem perfici folent. Quiefcat autem quàm maximè, donec vnà cum cibis concoctus fuerit. Quicunque vero potus meraciores funt, aut austeriores palpitationem in corpore, & pulfationem in capite inducunt. His commodum eft vt infuper dormiant, & calidū quid forbeant, ad quod maxime iucunde affecti funt. At vero ieiunium ad capitis dolorem ac crapulam malum eft. Caterum qui femel in die cibum capiunt, hi & impotentes funt, & calidam vrinam min gunt, præter confuetudinem vafa vacua habentes. fit autem & os falum ac amarum, & in omni opere tremunt, & tempora ipsis diftenduntur, & cœnam concoquere non poffunt, velut fi pransi effent. Hos autem minus bibere oportet quàm foliti fuerunt, & mazam liquidiorē pro pane fumere: & ex oleribus, rumicem, aut maluam, aut prifanam, aut betas. Bibere vero vinum inter cibum, moderatum & aquofius: & à cœna modice deambulare, donec vrina defcēderit, ac minxerint. Vtatur autem & pifcibus coctis. Edulia porrò maxime de fe fignificationem præbent. Allium flatum, & colorem circa thoracem facit, & capitis grauitatem, & anxietatem. & fi quis alius dolor antea fieri confuevit, eum exacerbauerit. Vrinam autem ciet, & hoc bonum habet. Optimum vero eft vt quis ipfum edat, fi aut ebrius eft, aut ad potationē ire volet. Caseus flatum, & adftrictionem, & ciborum accenfionem facit, quum crudum & incoctile fit edulium. peffimum autē eft repletos ipfum inter potum edere. Legumina omnia flatuofa funt, & cruda, & cocta, & fricta, & macerata, & viridia. His autem vtendum non eft nifi cum cibis. Vnumquodque vero ex ipsis fua peculiaria vitia habet. Cicer flatum, tum crudum, tum frictum, & dolorem inducit. Lens adftringit, & turbationē inducit, fi cum cortice fumatur. Lupinus minime inter hæc mala habet. Silphij caulis & fuccus, quibufdā quidem maxime, in expertis autē non tranfit per ventrē. Verum vocatur hoc malum cholera ficca. Fit autem maxime vbi cum multo caseo mixtus fuerit, aut cum carnis bubulę eſu. Nam & atrabiliaræ affectiones à bubularū carniū eſu exacerbantur. Eft enim inſuperabilis ipſarū natura, & non cuiufvis ventriculi

Allii natura.

Casei operatio.

Legumina

Cicer.

Lens,

Lupinus.

Silphium.

Atriculi est ipsas concoquere. Optime tamē ipsas concoxerint, ac summouerint, qui percoctis & quā vetustissimis vtantur. At caprinæ carnes quæcunq; in bubulis insunt mala, omnia habent, itēq; à concoctione alienitatē: & flatuosiores sunt ac ructus ampliores faciunt, & cholera generant. Sunt autem odoratissima, solida, ac iucundissima, optime, & percoctæ, & frigida. Verum iniucundissima & graueolentes ac duræ, pessima: imò etiam recentes. Optima vero sunt æstatis tēpore: pessima autūno. Porcinæ vero carnes prauæ sunt, quæ fuerint crudiores aut ambustæ. Magis autē cholera generat, & turbationē faciunt. Suillæ autem optima sunt omnium carnum. Sed præstant etiā ex his quæ non vehementer pingues sunt, neq; tenues, neq; veteris victime ætatem habent. Edere vero ipsas oportet absq; pelle, & subfrigidas. In cholera sicca vter inflatus est, & strepitus insunt, & dolor laterum ac lumborum. Secedit autē nihil deorsum, sed aluus adstricta est. Talem adseruato vt ne vomat, sed aluus subeat. Infusum itaq; calidum ac pinguius quā citissime per clysterē immittito: & oleo illitū in aquam plurimā calidam demittito, in solum reclinās, & calidā paulatim affundēs. Et si calescēt ipsi aluus subierit, morbus solutus est. Dormire quoq; tali cōducit, & bibere vinū tenue, & vetus ac meracius, & oleū dato, vt & quiescat, & aluus subeat, & soluatur morbus. A cibis vero & aliis abstineat. Si vero non remisit dolor, asininū lac bibendum dato, donec purgatus fuerit. At si liquida fuerit aluus, & bilis subeat, & tormina sint, & vomitus, ac suffocationes: his optimum fuerit quiescere. Bibere vero aquam mulsam, & non vomere. Hydropum duæ naturæ sunt: quorum alter sub carne si fieri aggreditur, inuitabilis est. Qui vero cum inflationibus sit, multa bona fortuna opus habet, maxime autem ærumnis, & fomentis, ac temperantia. Edat autem sicca & acuta. Sic enim vel maxime vrinam eiecerit, & plurimum viribus polluerit. Si vero difficulter spirauerit, & tempus verum fuerit, & simul ætas vigerit, & viriū robur adsit, de brachio sanguinem detrahare oportet. Deinde panes calidos ex vino nigro & oleo tinctos edat: & quā minimum bibens, quamplurimum laboret. & carnes suillas carnosas edat cum aceto coctas, vt aduersus accliuēs deambulationes reniti possit. Quicumque infernum ventrem calidum habent, & alui egestionēs

*Caprinæ
carnes.*

*Porcinæ
carnes.*

Suillæ.

*Aque in-
ter catem
duo gene-
ra.*

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

egestiones acres & inæquales ipsis prodeunt præ colliquatione: his si quidem potentes fuerint, veratro albo reuellere oportet. Sin minus, succus tritici horni crassus, frigidus datus est, & lenticulæ frææ decoctum, & panes subcineritij, & pisces febrienti quidem cocti, non vero febrienti, affati: & vinum nigrum non febrienti: sin minus, aquam à mespilis, aut myrti baccis, aut malis, aut sorbis, aut palmulis, aut vitium cenanthe. Si vero febris non habeat, & tormina adsint, lac asininum calidum modicum primum, deinde sensim fiente progressu amplius, & lini semen, & triticeam polentam, & fabas Aegyptias, exempto eo quod in ipsis amarum est, molita ac trita hæc inspergens bibat: aut oua semiconcreta assata edat, & similaginem, & milium, & alicam coctam in lacte, hæc cocta frigida edat, & quæ his similia existunt, tum pocula, tum edulia in cibo assumat. Maximi momenti circa victus rationem, est obseruare ac cauere, tum in acutis, tum in longis morbis, & intensiones febrium, & remissiones, quo temporum occasionem scias, quando cibos exhibere non oportet, & quando tuto exhiberi possunt. Insuperque quando plurimum ab intentione absunt. Nosse porro oportet eos quibus caput dolet ab exercitationibus, aut cursibus, aut profectionibus, aut venationibus, aut ex alio quopiam intempestiuo labore, aut ex re venerea; decolores item, raucosos, splenicos, exangues, spirituosos, & siccam tussim habentes, ac siticulosos, & flatuosos, & venarum interceptiones: & eos qui intenta habent præcordia, & latera, & dorsum, & torpescit, & obscure vident, & quibus aurium sonitus incidunt, & qui vrinariam fistulam vrinam non continentem habent, & morbo regio laborantes, & quorum alui cruda eiiciunt, & quibus ex naribus, aut per sedem sanguis vehementer erumpit, & qui tubercula habent, & quibus vehemens dolor incurrit, & non superauerint, ex talibus nullum medicamento purgandum esse. Periculum enim habebis, & nihil opis afferes, & spontaneas liberationes ac iudicationes tolles. At si sanguinem alicui detrudere conducit solidam aluum facere oportet, atque sic detrudere, & fame macerare, ac vinum auferre. Postea victu conueniente, & fomentis humidis, reliquam curationem perage.

Si vero aluus densa ac adstricta esse videatur, molle infusum per clysterem immitte. Si vero medicamentum dare visum fue-

*Sanguis
quo mittere
dus.*

A sum fuerit, per veratrū tuto sursum purga. Deorsum vero nullum talium. Optimū autem est ad mictionē, & ad sudores, & ad deambulationes perducere, & leni frictione uti, vt ne habitum densum efficias. Si vero in lecto decumbat, alij ipsum fricent. Et si quidem in thorace supra septum transuersum, affectio ipsum infestaret, plurimum resideat, & minime ipsum reclinent, quandiu vires tolerant; & sedentem multo tempore multo oleo calido defricent. Si vero in inferna alio sub septo transuerso dolores habeat, decumbere conducit, & nullo motu moueri tali corpori cōfert, extra defricionem. Qui vero ex inferna alio soluuntur dolores, per vrinās & sudores, si moderate delabuntur, sua sponte soluuntur, qui

B parui sunt. vehementes autem prauī sunt. Tales enim aut pereunt, aut absque aliis morbis sani non fiunt. Verum qui huiusmodi sunt incumbunt ac firmanantur. Potio hydropico.

*Hydropicū
potio.*

Cantharidas tres, detracto capite vniuscuiusque, & pedibus, & alis, corpora videlicet ipsarū in tribus aquæ eyathis terito. Quū autem is qui bibit doluerit, calida aqua perfundatur. Bibat autē prius illitus, ieiunus: & edat panes calidos ex oleo. Medicamentum sanguinem sistēs. Fici succum lana exceptum intus ad venam appone. Aut coagulo intorto nares obturato. Aut chalcitidem digito prius efformatam apprime, & cartilagine extrinsecus vtrinque comprime: & aluum lacte asinino cocto solue, & caput rade, & perfrigeratiā adhibe, si calidum tempus fuerit. Sesamoides sursum pur-

*Sanguinem
sistētia.*

C gat. potio ei⁹ est drachma dimidia in aceto mulso trita. Cōmiscetur etiam veratris tertia potionis pars, & minus suffocet. Ad trichiasin, id est pilos pungentes in palpebris enascentes. Immissum in acum foramen habentem filum, in summa supernæ palpebræ margine deorsum versus perpunctione facta trans mitte, & aliud itidem sub hoc inferne trahice: & extēta fila consue ac deliga, donec decidant. & si quidem satis habuerit, bene est. Sin minus, & quid defecerit, rursum eadem facito. Sed & hæmorrhoidas eodē modo transmittes, filo lanæ succidæ crassissimo ac maximo in acum immisso, ac deligato. Securius enim fit curatio. Deinde cōpressionē facta medicamento erodente vtere, & ne proleue donec deciderint: & semper vnā relinque. Postea vero refectis viribus veratrum dato, deinde exerceatur & exudet, & ante

Trichiasis.

Hæmorrhoides.

exercitā

Suppurati.

exercitationem mane frictio multa fiat. Verum à cursu abstineat, & ebrietate, & ab acrob^o, organo excepto. Vomat autem per interpositos dies septem, aut ter in mense. Sic enim quàm optime habuerit corpus. Vinum vero sulum, austerum, aquosum ac modicum bibat. At vero ad suppuratos, scillæ frusta rotunda secta in aqua coquito, & vbi valde bene efferbuerit, diffundito, & alia affusa coquito, donec ad contactum percocta ac mollia apparuerint. Deinde leuiter tritis cuminum frictum ammisce, & sesama alba, & amygdalas recentes tritas, & hæc melle excepta delingenda præbe, & postea vinum dulce bibendum. Sorbitiones vero sumat, peplum, appellatum meconium album, tritum acetabuli parui mensura, in aqua loturæ farinæ recentis dilutum ac coctum, melle affuso tepidum absorbens. Atque sic degat per diem. Deinde supputans ea quæ eueniunt cœnam dato. Fabarum in depuratarum quadrantem, & rubiæ sarmenta duodecim, terito, misceto, coquito, & pingui addito delingenda præbeto.

Oculorum medelæ.

Ad oculos. Spodium iotum probe velut farinæ massam subactum, non liquidum, vix immaturæ acerbæ succo humectatum leuiter terito, in sole resiccato, & vt ad illitionem commodum sit humectato: quum vero siccum factum fuerit, leuiter trito sicco oculos sublinito, & angulos conspergito. Ad eosdem. Ebeni drachmam, æris vsti obolos nouem, croci obolos tres. Hæc trita in coticula terito, & vini dulcis heminam Atticam affundito. deinde ad solem obuelata exponito, & vbi cocta exaruerint, ipsis vtere. Ad dolores oculorum. Chalcitidis drachmam, vix expressæ vt duæ partes fiat reliquæ, myrrham & crocum terito, & mustum admisceto, & ad solem coquito, ac illinito. Sint autem in vase æneo.

Stragula tio uulue.

Hydropicorum catapotia.

Earum quæ ab vtero strangulantur cognitio. Digitis duobus comprimito, & si senserit, vteri strangulatio est. Si non, conuulsio. Ad hydropicos. Pepli meconij appellati, acetabulum paruum Atticum rotundum, potio vna, squamæ æris specilla lota tria. Hæc leuiter trita, & cum farina recenti agglutinata, ac in catapotia efformata, deglutienda dato. Purgant aquam deorsum. Aliud, quod stercora per aluum expellit. In caricas succum tithymalli instilla, in singulas septies. deinde in nouum vas compositas reconde, ac exhibe antecibum. Aliud. Peplum, quod & meconium appellatur, aqua affusa trito

Solutio uetris.

fusa trito ac excolato, & farinam placentarum torrefactarum ammiscens, & mel coctum affundens, hydropicis edendam dato: & vinum dulce aquosum, aut aquam mulsam aquosam insuper bibendam. At meconium, quod primum excrementum à pueris prodit, collectum recondito, ac curato. *Meconis.*

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE IUDICATIONIBVS

*nibus, Iano Cornario medico
physico interprete.*



E iudicationibus quæ cito ad melius tendunt, plerunque eadem signa sunt, quæ etiam sanitatis. Sudores enim optimi sunt, & celerime febrè sedant, qui in iudicatoriis diebus fiunt, & febrem perfecte summouët. Boni quoque sunt qui per totum corpus fiètes, morbum facilius ferre faciunt. Qui vero nihil horum faciunt, incommo-

*Sudores
qui boni*

di sunt. Densari vero oportet alui egestionem, morbo ad iudicationem tendente. Sit autem subfulua, & non valde gra-

Oletum.

ueolens. Commodum est & lumbricos exire ad iudicationem. Vrina autem optima est, quæ habet albissimam subsidetiam, & leuem ac æqualem, per totum tempus donec iudicatus fuerit morbus. Significat enim securum ac breuem fore morbum.

Vrina.

Si sudore oborto morbus deficiat, & vrina fulua albâ subsidetiam habens conspiciatur: his eadem die recidua febris fiet, atque hæc quinta die citra periculum iudicatur.

His qui in breuissimo tempore sani euadēt, omnia maxima signa fiunt. Nam magis sine dolore degunt, & extra periculum, & noctu dormiunt, & alia signa secunda præ se ferunt.

Quibus in febre non lethali capitis dolor, & alia signa circumstant, in his bilis dominatur. Quibus inceperit dolor primis diebus, & quarta ac quinta magis premūtur, hi septima à febre liberantur. Febres iudicantur in iisdem numero diebus, ex quibus

Capitis dolor.

HIPPOCRATIS LIBER

*Febres le-
nes.*

*Morbus
regius.*

ex quibus & superstites euadunt homines, & ex quibus pe-
reunt. Etenim placidissimæ febres, & signis securissimis fi-
tes, quarto die desinunt, aut prius. Lethalissimæ vero & signis
horrendissimis fientes, quarto die aut prius occidunt. Primus
igitur ipsarum insultus sic desinit. Alter ad septimum dedu-
cit. Tertius ad undecimum. Quartus ad decimumquartum.
Quintus ad decimumseptimum. Sextus ad vigesimum. Atq;
hæ in acutissimis morbis, per quatuor ad viginti, appositio-
nes fiunt. Non potest autem quicquam horum integris dieb'
exacte numerari. Neque enim anni ac menses totis diebus co-
stant. In febribus ardentibus bona signa apparêtia, qualia in
sanis scripta sunt, si quidem minora fuerint, ad tertium diem
remissionem indicant. crassiora vero, in crastinum. crassa au-
tem, eadem die. In febribus ardentibus si posterius septimo
die morbus regius accedat, iudicium est sudoris. Nam mor-
bus non solet exudare, neque usquam alibi abscessum face-
re, sed sanus fit. Necesse autem est ubi calor febris discessit, &
humorem in seipsum attraxit, febre contingere iudicatione,
per urinas prodeuntes, aut etiam alui egestionem, aut sangui-
nis ex naribus fluxum, aut mictionem multam, aut per multâ
humiditatem, sudorem, aut vomitum, Mulieri vero etiâ per
mensium viam. Maxime igitur hæc iudicationem faciunt, &
quicquid his propinquum contingit. Facit autem & alias iu-
dicationes, sed minus quàm has. Si vero septimo die morbus
regius accedat, aut posterius, in febre ardente, & difficilis mul-
ti spûs secessus, tum in ardentibus, tum in aliis febribus: si nul-
lo talium signorum fiente dimiserit febris, necesse est tales
iudicationes pro illis fieri, aut magnorum tuberculorum ab-
scessum, aut dolores ex abscessu vehemêtes, aut colliquatio-
nes humorum ex calore. Iudicationes & remissiones eorum
quæ febrem ardentem significant, longiorem morbum faciunt.
Si vero fortia fuerint, mors plerunque sequitur. Reliquæ ve-
ro ardentes securæ desinunt septimo aut decimoquarto die.
Solet autem & ad lipyriam deuenire, & detinet maxime tri-
dies, & in Epialum transit. & lipyria eadem quoque die cor-
ripit ac dimittit. Fit autem & capitis dolor. Si vero lipyria nō
dimiserit in xl. diebus, sed producta fuerit, & dolor habuerit
caput, & deleret æger, ipsum purgato. Desinente vero febre
ardente si accedat morbus regius, non solet amplius exuda-
re, neque

A re, neque vsquam alibi abscessum facere, sed san⁹ fit. Tertia-
na in septem circuitibus plerunque iudicatur. Quibuscūque
in febribus intolerabilibus septima, aut nona, aut decima-
quarta morbus regius accedit, bonum; si non dextrum præ-
cordium durum fiat. Sin min⁹, ambiguum. Acuti morbi in
quatuordecim diebus plerunque iudicantur. Sudores fe-
bricitanti si fiant tertia die, & v. & vij. & ix. & xi. & xiiij. &
xxj. & xxxj. hi sudores morbos iudicant. Qui vero non sic
fiunt, dolores significant. Concoctiones vrinarum paula-
tim maturescences, si in iudicatoriis diebus concoctæ fue-
rint, morbum solunt. Exemplum vrinarum vlcera facere o-
portet. Nam vlcera si repurgantur pure albo, celerem cura-
tionem indicant. Si vero in saniosos humores trāsmutentur,
B maligna fiunt. Eodem modo & vrinæ significant. Si ex dolo-
re tenues fiant, ex occasione ratiocinari oportet, ex qua mor-
bus accessit, & hanc inspicere vbi sedatur. Nam hac deficiē-
te, aliis signis qualia conueniunt accedentibus, non putan-
dum est morbo liberationem contingere. Si doluerit ca-
put, & ex hoc febris accedat, & hinc non sedetur: dolore non
cessante febris nō iudicatur: & plurima talia iudicationis lō-
gæ sunt ad melius, etiam in his quæ ad sanitatem tendunt.

In præcordiis tumores molles, & doloris exortes, & ad
contactum cedentes, diuturniores quidem iudicationes fa-
ciunt, minus autem horrendas tuberculis his contrariis. Eo-
dem modo habet & de tuberculis in reliquo ventre. Ex v-
C rinis si quidem id quod mixtum est purum fuerit: subsiden-
tiam vero albam ac leuem habuerit, diuturnior fit morbus,
& minus quā optima secuta est hæc vrina. Si vero & vrina
subrubra fuerit, & subsidencia subrubra ac levis: diuturniorē
quidem hæc morbum quā prior significat, sed valde saluta-
rem. Quicumque podagrici morbi fiunt, hi in quadragin-
ta diebus ab inflammatione liberi sedantur. Sed in his plera-
que longæ iudicationis ad melius sunt. Quæ ad mortē tē-
dunt, in die ac nocte iudicantur, quæ videlicet debilitatio-
nis signa sunt, velut epti medicamēti, exturbationis alui &
sursum, & deorsum, anxietatis, & aliorum huiusmodi. Si igitur
horum signa in die ac nocte submoueantur, bene est. Sin
minus, lethalia esse putanda sunt. Sudores pessimi sunt fri-
gidi, & circa ceruicem fīctes. Hi enim mortes, & morborum

Acuti mor-
bi.Sudor des-
cretorius.Lotioram
maturatio
digestio-
ne.

Vlcera.

Capitis do-
lor cum fe-
bre.Præcor-
dia turgi-
da.Tubercu-
la.

Vrina.

Podagri-
ci.Debilita-
tis signa.Sudor frī-
gidus.

Ec longitu-

HIPPOCRATIS LIBER

longitudinem præsignant. Alui egestionēs variæ, diuturniores quidem sunt nigris & aliis lethaliſibus egeſtionibus, nihilo vero minus pernicioſæ. Sunt autem tales, ramentofæ, bilioſæ, cruentæ, præſinæ, nigræ: & aliquândo ſimul omnes prodeunt, aliquando ſingulæ particulatim. Vrina ſi quandoque pura miſta fuerit, quandoque ſubſidentiam albam ac leuem habens, diuturnæ tales ſunt, & minus ſecuræ quàm optima vrina. Si vero fulua ac tenuis fuerit vrina multo tempore, periculum eſt ne ſufficere homo poſſit, donec concocta fuerit vrina. & ſi alias ſuperſtitis futuri ſigna fuerint, his abſceſſum affore expecta ad locos infra ſeptum tranſuerſum. In febribus ſi mutationes habeat vrina, diuturnitatem temporis ſignificat, & necesse eſt ægrotum mutari & ad deteriora, & ad alteram partem. Si vrinæ ab initio non ſimiles fuerint, ſed ex tenuibus craſſæ fiant, & penitus tenues, tales ægre iudicant ac inſtantes ſunt.

Vrina.

Sudor frigidus.

Frigidi ſudores cū ætate quidem febre, lethales ſunt: cum mitiore vero, longitudinē morbi ſignificant. Et ubi in corpore caliditas aut frigiditas, hic morbus eſt. & ubi in toto corpore mutationes repētine ſiūt, & ſi corpus perfrigeretur, aut rursus caleſcat, aut color alius ex alio tranſmutetur, morbi longitudinem ſignificat. Si febricitanti ſudor accedat, febre non deficiente, malum. prolongatur enim morbus, & humiditatem ſignificat. Febricitanti frigidi ſudores accedentes, longam febrem ſignificant.

Sudor ſanctus.

Sudor multus intemperate ſiens ſano, morbum ſignificat, ætate minorē, hyeme maiorem. Alui egeſtionēs ſi in idē concedere ac conſistere permiferis, velut ramenta ſubſident: ſi pauca, modicus eſt morbus: ſi multa, mult⁹: his inſuſum per clyſterē adhibere conducit. Quibus vero in egeſtione inferne bilis atra ſubſidet, ſi copioſior, maior eſt morbus. Si paucior, minor. Si venæ pulſarint, & facies ſana fuerit, & præcordia non mollia, ſed in tumorem elevata, diuturnus eſt morbus, & abſque conuulſione non ſoluitur, aut multa ſanguinis ex naribus fluxione, aut vehementi dolore. Et palpitatiōes in manibus, diuturnæ febris ſignū ſunt, aut brevis iudicatiōnis in deterius: & in his pleraque quæ ad mortem tendunt.

Pulſus uenarum.

Breui morituri ſigna.

Febris continua.

His qui breuiſſimo tempore perituri ſunt, maxima ſigna ab initio ſunt. Nam & difficulter ſpirant, & noctu non dormiunt, & ſigna periculofa præ ſe ferunt. In febre continua

ſi quis

A si quis quarta die & septima affligatur, & vndecima non iudicatus fuerit, plerunque perit. Quicumque à distentione antorsum ac retrorsum corripuntur, in quatuor diebus pereunt. Si vero hos effugerint, sani fiunt. In febribus ardentibus si accedebat morbus regius, & singultus quinto die, lethale est. Recidivæ fiunt in his, quibus desinētibus vigilie fortes accedunt, aut somni turbulenti, aut corporis robur, aut dolores vniuscuiusque mēbri: & quibus febres sedantur, neque signis solutoriis fientibus, neq; in iudicatoriis diebus: & si deficiente febre, & sudore accedente, vrinā fuluam minxerint, albam subsidentiam habentem, his febris recidivam eadē die expecta. Hæ vero recidivæ quinto die iudicantur extra periculum, & si ex iudicatione facta vrinam rubicūdā, rubram subsidentiam habentem minxerint, etiam his recidiva febris fit eadem die: & pauci ex hac servantur. Quū recidit febris ardens, plerunque etiam exudat. Et si reuertēs tot diebus detineat quot prius, etiam tertio reciduat, si non impari die dimiserit reuersa. Plerunq; si crudæ sint vrinæ, & alia signa non secundum rationē eueniant, morbus in die iudicatoria reciduat. Quandoque vero etiam reuertitur in die iudicatoria, his talibus relictis. Abscessus circa aurem quibus circa iudicationem fientes non suppurantur, his submotis recidiva fit, iuxta recidivarum rationē, similis circuitu: in his spes est ad articulos abscessum fieri: aut vrina crassa, qualis est alba in quartanis de lassatoriis, liberat ab abscessu. Quibusdam vero horum etiam sanguinis è naribus eruptiones fiunt. Hæc autem sanguinis eruptio quartanas non soluit, neque morbos qui per alui egestionem sanari solent.

Atrabiliariis cum phrenitide occupatis, si hæmorrhoides oboriantur, bonum est. Quicumque insaniunt sua sponte liberati ex morbis, his insaniā soluit dolor ad pedes progressus, aut ad pectus: aut tussis vehemens oborta. Si vero horum nihil fiat, insania soluta oculi priuatio contingit. Qui lingua offendunt, & labiorum non sunt potentes, si hæc sedata fuerint, suppurati fiunt. Dolorem in locis infernis fortem soluit aut surditas, aut sanguis multus è naribus erumpens.

Insania magni morbi ex more fiētis solutio. Quibus in febribus ardentibus coxarum dolor, oculorum distortio, aut cecitas, aut testium tumores, aut mammarum eleuatio, febrē

Tetanos.

Morbus regius.

Febris ardens.

Vrinæ crudæ.

Abscessus circa aurem.

Phrenitis. Insania.

Causa solutio.

Ec ij ardentem

HIPPOCRATIS LIB. DE IUDICAT.

Tremor. ardentem soluit, aut etiam sanguinis ex naribus fluxus. In **D**
Surditas. febre ardenti si insuper corripit rigor, exudare solet. A fe-
bre ardente occupato, rigore accedente, solutio fit. Quib⁹
in febribus ardentibus tremores oboriuntur, metis emotio-
soluit. Quibus in febribus aures obsurduerunt, his non so-
luta febre, insanire necesse est. Soluit autem sanguis ex na-
ribus erumpens, aut alius biliosa egerens, aut dysenteria ac-
cedens, aut coxarum, aut genuum dolor. Quibus febribus
Subiti do- rigor accedit, febris soluitur. Quibus dolores fiant dere-
loris mei pente, præcordium eleuatum est superne, & si circa spuriam
dela. costam graues dolores fiunt, his solutio fit venę sectio, & pur-
Morbus gatio deorsum. Nō enim corripit febris vehemens locis im-
aque sub potentibus. In his qui ab hydropē detinentur, si aquositas
ter cutē. per ventrem ad vesicam aut ventrem fluat, solutio fit. **E**
Pituita al- Si à pituita alba occupato, alui profluuium vehemens accedat, so-
ba. lutio fit. Qui ab alui profluuium multo tempore detinentur
Alui pro- vnā cum tussi, non liberantur, si non dolores vehementes in
fluuium. pedibus inciderint. Si vero vult commutatio ac correctio
naturę fieri, postquam non amplius alius profluit, aut ina-
nem omnem egestionem habuerit, status foras prodeuntes
accidunt. Nullum itaque humorem manifestum habent.
Quare ei qui ita habet secure exhibere scies ea quę conue-
niunt, & si voluulus accedat, vinum frigidum multum mera-
cum paulatim bibendum dato, donec somnus, aut crurum
Capitis do- dolor fiat. Soluit autem & febris, aut dysenteria. Caput
lor. circuncirca dolenti ac ægrotanti, si pus per aures, aut per na-
res fluxerit, soluit morbum. Quibusunque sanis derepen-
te dolores oboriuntur in capitibus, & statim voce priuantur,
ac stertunt, hi in septem diebus pereunt, si non febris corri-
puerit. Caput circuncirca dolenti, quicunque ex supernis
locus doluerit, cucurbitam affige. Soluit dolor ad coxas, &
Lippitudo. genua, & anhelatio, quicquid horum factum fuerit. Lip-
Spasmos. pienti ab alui profluuium corripit, bñ nam est. A con-
uulsione aut distentione neruorum vexato, fe-
bris accedens soluit morbum. Si à febre
detentum conuulsio corripuit, seda-
tur febris eadem die, aut
postridie, aut ter-
tia die.

Hippo-

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE DIEBUS IVDI-

catoriis, Iano Cornario me-

dico physico inter-
prete.



Agnam artis partem esse arbitror, de his quæ recte scripta sunt posse considerationem facere ac iudicare. Qui enim novit, & his utitur, non videtur mihi in arte multum falli posse. Oportet autem exacte perdiscere unquamque temporum constitutionem. & quenque morbum. & qui morbus sit bonus, & qui periculosus, aut in constitutio-

*Potissima
huius artis
pars.
Mēs quā-
do nō fal-
litur.
Prima
morborum
observa-
tio.*

ne, aut in morbo. & qui morbus longus sit & lethalis: & qui longus, & non perniciosus ad vitam. & qui acutus ac lethalis: & qui acutus, & superesse finens. Ex his enim ordinem dierum iudicatoriorum considerandi ac prædicendi facultas datur. & ex his cognoscere datur, quibus, & quando, & quomodo victum præscribere oportet. Maximum itaque signum in ægrotis qui victuri sunt, si non præter naturam fuerit febris ardens, & alij morbi eodem modo. Nihil enim horrendum, neque lethale sit in his quæ secundum naturam sunt. Secundum est, si non etiam ipsum tempus simul cum morbo impugnet. Plerumque enim hominis natura, uniuersum potestatem non superat. Postea vero si partes circa faciem gracilescent; & venæ in manibus, & in oculorum angulis, & superciliis quietem habeant, quam prius non quievisset. Huic si vox fuerit debilior, & sit leuior: & spiritus rarior ac tenuior, sequenti die remissio morbi contingit. Hæc igitur considerare oportet ad iudicationes: & an bifida linguæ pars velut salina alba obducitur, & an in summa lingua hoc idem factum sit, verum minus. Si quidē igitur parua hæc fuerint, ad ter-

Secunda.

Tertia.

*Lingua sa-
liuosa.*

Ee iij tium diem

HIPPOCRATIS LIBER

*Oculorum
note.*

Morbi acuti unde.

Cacutionis signū.

Præ oculis quæ cursu tunc videtur.

Somnia quæ vexant.

Morbi huius causa.

Tetanos quotus plex.

tium diem remissio fit morbi. Si vero aliquanto crassior sit fa-
liua, in crastinum. Si vero adhuc crassior, eadem die. **Quin**
& albas oculorum partes in principio morbi denigrari ne-
cesse est, si inualuerit morbus. Hæc igitur si puræ fiant, perfectâ
sanitatem indicant: leniter quidem, tardius: vehementer au-
tem, citius. Cæterum acuti morbi fiunt à bile, ubi in hepar
influxerit, & ad caput constiterit. Hæc igitur patitur hepar.
Intumescit & expanditur ad septum transversum præ tumo-
re. & statim ad caput dolor irruit, maxime vero ad tempora:
& æger auribus non acute audit. Sæpe etiâ oculis non videt.
& horror, & febris corripit. Atq; hæc quidem ab initio mor-
bi ipsi fiunt ex intervallo, quandoq; vehementer, quandoq;
minus. Quâto autem morbi tēpus magis progressum fecerit,
tanto maior fit dolor in corpore: & pupillæ oculorum spar-
guntur, & obtuse videt: & si digitū admoueris ad oculos, nō
sentit, eo quod non videt. Quod autē non videat, inde co-
gnoueris. Non enim nictat dum digitus admouetur: & floc-
cos aufert de stragulis, si quidē viderit, pediculos esse putās.
Et quum hepar magis expansum fuerit ad septum trāsversum,
delirat: & ob oculos sibi obuersari putat reptilia, & alia om-
nigena animantia fera, & milites armatos pugnantes, & ipse
aduersus ipsos pugnare sibi videtur: & talia dicit velut qui
videat, & egreditur, & minatur si quis ipsum egredi nō per-
mittat. Et ubi surrexerit, crura eleuare non potest, sed cadit.
Pedes autem semper sūt frigidi. Et quum dormierit, exilit à
somnia, & insomnia horréda videt. Hoc autē cognoscimus,
ab insomniis exilit ac perterretur, postquā ad sanā mentem
rediit. Exponit enim insomnia hæc, qualiaq; & corpore fecit
& lingua loquutus est. Atq; hæc quidē sic patitur. Quandoq;
vero etiâ voce priuatur, per totā diem ac noctē multū acer-
patum spiritū respirās. Postquā vero delirare cessauit, statim
ad sanā mentē redit. Et si quis ipsum interroget, recte respō-
det, & intelligit oīa quæ dicuntur. Deinde rursus paulo post
in iisdem afflictionibus iacet. Hic morbus accidit maxime in
peregrinatione, & si alicubi desertā viam iuerit, & timor ip-
sum ex spectro corripuerit. Corripit etiam aliis modis.
Tetani tres. Siquidem ex vulnere tetanus, siue disten-
tio neruorum antrosum ac retrorsum fiat, æger hæc patitur.
Maxillæ cōgelantur ac rigent, velut ligna: & os aperire non
potest.

- A** potest, & oculi frequenter lachrymantur ac distrahuntur, & dorsum riget, & crura flectere nō potest, neq; manus, neque spinam. Quū vero lethalis fuerit, potus & cibi quos prius acceperat, per nares quādoq; redeūt. At opisthotonos, retrorsum siens distentio, reliqua quidem eadem ægro inducit ut plurimum, sit autē quum in cervicē tēdines retrorsum egrotarit. Aegrotat autē, ab angina, aut ab vna, aut locis circa tōssillas suppuratis. Aliquādo etiā à capite febribus accedentibus cōuulsio succedit. Iam vero etiā à vulneribus. Hic trahitur in posteriorem partem, & præ dolore dorsum ac pectora rigent, & eiulat. Hic cōuellitur vehementer, ut vix detineatur à præsensibus, ne è lecto excidat. *Opisthotonos.*
- B** nus lethalis prioribus. fit autē ab iisdem, & totum corpus similiter conuullitur. Febris ardens prædictis non similiter fit. Vrit enim semel ut necesse sit febricitare. Sitis igitur multa hominem tenet, & febris vehemens. lingua vero rumpitur exasperata, & sicca fit: & color ipsius primū quidem pallidus est, velut solet. progressu vero tēporis nigrescit. Et si quidē in principis nigrescat, citiores iudicationes fiūt. Si vero posterius, diuturniores. Coxendicum morbus ex his maxime causis fit in plerisq;: si quis diutius in sole versetur, & coxendices fuerint calfacti, & humor qui est in articulis, à calore fuerit resiccatus. Quod autem id quod resiccatur condensatur ac cōpingitur, hoc magnum signum est. Aeger enim articulos vertere ac movere non potest, præ dolore articulorū, *Ischias.*
- C** & eo quod verticula sunt cōpacta. Dolet autem magis lumbos & verticula ea quę sunt ex obliquo coxarū, & genua. Cōsistit autem dolor plurimo tēpore in inguinibus simulq; coxendicib⁹, acutus ac æstuosus. & si quis ipsum erigat aut trāsmoueat, eiulat præ dolore quā maxime potest. Quandoq; vero etiā cōuulsio accedit, & rigor ac febris. Fit autem à bile & pituita. fit etiā à sanguine; & dolores cōsimiles ab omnibus morbis; & rigor & febris aliquando corripit debilis.

Morbus regius acutus est, & celeriter occidens. Color totus malicorij speciem refert, & est vehementer cum virore pallidus, quemadmodum lacerti cum virore pallidiores. cōsimilis autem est cutis. Et in vrina subsidet velut eruum fuluū: & febris & horror debilis habet. Quandoq; etiam stragula habere non sustinet, sed mordetur ac raditur matutino tem-

Ec iiij pore,

HIPPOCRATIS LIBER

*Peripneu-
monia.*

pore, vbi nondum cibum accepit, internis partibus. Deinde viscera plerunq; fugunt. Et si quis erigat ipsum aut alloquatur, non sustinet. Hic vtplurimū moritur intra quatuordecim dies. Has autem vbi effugerit, sanus fit. Peripneumonia talia facit. Febris vehemens tenet: & spiritum densum ac calidum respirat: & anxietas adest, & impotentia, & iactatio, & dolores circa scapulas, & clauiculas, & mammam: & grauitas in pectoribus, & delyriū. Quandoq; vero doloris exors aeger est, donec tussire inceperit. Verum hic morbus diuturnior ac difficilior illo est. Saluam autem albam & spumosam primū spuit. Lingua flaua est, verū progressu temporis nigrescit. Si quidem igitur in principio nigrescat, citius morbus finitur. Si vero posterius, tardius. Tandem vero etiam rumpitur lingua, & si digitum apponas inhæret. At liberationē à morbo significat lingua, similiter velut in pleuritide. Hæc autem patitur eger minimum diebus quatuordecim, ad summū vna & viginti: & tussit hoc tempore vehemēter: & vnā cum tussi purgatur, primū quidem saliuā multa ac spumosa. Septima vero & octaua die, vbi febris in vigore fuerit, & humida sit peripneumonia, crassior: sin minus, non. Nona vero & decima, cum virore pallida ac suberuenta. Duodecima autem vsque ad decimamquartam, multa & purulenta. Atq; hoc in his contingit, quorum naturæ & corporis affectiones humidae sunt, & morbus fortis est. Quorū vero & natura, & morbi cōstitutio sicca est, in his minus. Cæterū de iudicatoris diebus, etiam iam ante à me dictum est, Iudicantur autē febres quarta die, septima, vndecima, decimaquarta, decimasextima, vigesima prima. Ex his autem acutis quædam etiā trigesima. Deinde quadragesima. postea sexagesima. Quū vero hos numeros excefferint, diuturna iam febriū cōstitutio fit.

*Febrium
decretoria.*

HIPPOCRATIS COI

LIBER PRAENOTIO-

num, Iano Cornario

medico physico

interprete.

Medicum



Edicum prænotionem adhibere, *Quæ me-*
optimū esse mihi videtur. Præno- *citi sunt.*
scens enim & prædicens apud æ-
grotos, & præsentia, & præterita,
& futura, & quæ ipsi ægroti relin-
quunt exponens, fidem vique fe-
cerit, quod ægrotorum res magis
cognoscat, quare audebunt homi-
nes seipsos medico committere. At

ubi prænouerit futuras affectiones. Sanos equidem facere
omnes ægrotos impossibile est, hoc enim præstantius esset,
quàm prænoscere in posterum euentura. Quandoquidem
vero homines moriuntur, alij priusquam medicum vocent,
præ violentia morbi: alij vero accito etiam medico, dere-
pente vita decedunt, quidam ubi vnā vixerunt diem, qui-
dam tempore paulo diutiore, antequam medicus per ar-
tem aduersus singulos morbos repugnet: itaque nosse oportet
talium affectionum naturas, quantum corporum vires
excedunt. Simul vero & si quid diuini in morbis inest, etiam
huius prænotationem ediscere. Ita enim merito admirationi
fuerit, & medicus bonus extiterit. Nam quos superstites ma-
nere possibile est, eos adhuc magis recte conseruare pote-
rit, ex multo tempore antea consilium adhibens ad singu-
la, & tum morituros, tum seruandos, prænosens ac prædi-
cens, à culpa exors fuerit. Considerare porro hoc modo con-
uenit in morbis acutis, primum quidem faciem ægroti, an
similis sit his quæ in sanis sunt, maxime vero an ipsa sibi ipsi.
Ita enim optima fuerit. Si vero maxime contraria simili fue-
rit, horrendissima est, Talis autem fuerit, nasus acutus, ocu-
li caui, tempora collapsa, aures frigidae ac contractæ, & ex-
tremities aurium auersæ, & cutis circa frontem dura & cir-
cumtenta ac arida, & color totius faciei pallidus. aut etiam
niger, & liuidus, aut plumbeus. Siquidem igitur in prin-
cipio morbi facies talis fuerit, & nondum ex aliis coniectu-
ram facere licuerit, interrogare oportet, num vigilauerit ho-
mo, aut alui excrementa valde liquida sint, aut fames aliqua
ipsum teneat. Et si quidem horum aliquid confiteatur, minus
grauē esse putandum est. Iudicantur autem & cognoscū-
tur

*Quæ me-
dico co-
gnosceda.*

HIPPOCRATIS LIBER

gur talia in die ac nocte, si ob has causas facies talis fuerit. Si D
 vero nihil horum esse dicat, neque in prædicto tempore cō-
 fidat, nosse conuenit morti proximum esse. At si vetustiore
 existente morbo, aut triduo, aut quadriduo, talis fuerit
 facies, de his interrogare oportet, de quibus etiam prius ius-
 si: itemque alia signa considerare, & in vniuersa facie, & in
 corpore, & in oculis. Si enim lucem fugiant, aut inuolunta-
 rie lachrymentur, aut distorqueantur, aut alter altero minor
 fiat, aut albas partes rubentes habeant, aut venulas liuidas
 aut nigras in ipsis habeant, aut lemæ ac sordes circa oculos
 appareant, aut etiam instabiles, aut eminentes, aut caui ve-
 hementer facti, aut squalientes & obscuri fuerint: aut col-
 lor totius faciei alteratus fuerit. Hæc omnia mala & perni- E
 ciosa esse putandum est. Considerare vero cōuenit etiam
 oculorum subapparitiones in somnis. Si enim albæ quid par-
 tis subapparuerit, palpebris aon commissis, si id non ex alui
 profluuiō, aut medicamenti portione fuerit, aut ægrotus non
 ita dormire consueuerit, malum signum & valde lethale est.
 Si vero retorta, aut contracta fiat, aut liuida, aut pallida pal-
 pebra, aut labium, aut nasus, cum aliquo ex aliis signis, morti
 proximum esse sciendum est. Lethale est etiam habere la-
 bia resoluta, & pendētia, & frigida, & albicantia facta. De-
 cumbentem ægrotum à medico deprehendi conuenit in la-
 tus dextrum aut sinistrum, & manus, & collum, & crura mo-
 dice inflexa habentem, & totum corpus flexibile situm. Ita
 enim plurimi ex sanis decumbunt. Optimi autem sunt decu- F
 bitus qui sanorum decubitibus similes existūt. At vero supi-
 num iacere, & manus, & collum, & crura extenta habere, mi-
 nus bonum est. Si vero etiam pronus fiat, & de lecto ad pedes
 delabatur, magis horrēdum est. Si vero nudos quoque pedes
 habere comperiat, nec admodum calidos: & manus, & col-
 lum, ac crura inæqualiter dissecta, ac nuda, malum est. Anxie-
 tatem enim significat. Lethale est & hiantem semper dor-
 mire: & crura supini iacentis valde incuruata esse ac compli-
 cata. At in ventrem decumbere, si quis non fit adfuerus dum
 sanus fuit ita dormire, delirium significat, aut dolorē loco-
 rum circa ventrem. Cæterum erectum sedere velle ægrum
 in morbi vigore, in omnibus morbis acutis malum est, pessi-
 mum autem in peripneumonicis pulmone inflammato.

Dentibus

A Dentibus stridere in febribus, quibus nō familiare id est à *Stridor de*
pueris, furiosum ac lethale est. Verum prædicere oportet ab *tium quid*
vtrisque periculum futurum. Si vero etiā delyrius hoc faciat, *portēdat*
perniciosum valde iam existit. Vlcus autem siue prius fa-
ctum fuerit, siue in morbo accesserit, considerare oportet. Si
enim periturus est homo, ante mortem liuidum ac siccū erit,
aut etiā pallidum & siccū. At de manuū latione ita sentio.
Quæ in febribus acutis, aut peripneumoniis, aut in phreniti-
de, aut capitis dolore, ante faciem feruntur, & frustra venan-
tur, & festucas legunt, & floccos de vestibus euellunt, & de
pariete paleas detrahunt, eas omnes malas & lethales esse.

Spiritus densius dolorem significat, aut inflammationem,
in locis supra septum transuersum. Qui vero magnus exspi-
B ratur, & per multum temporis interuallum, delyrium indi-
cat. Si vero frigidus è naso & ore expiretur, valde iam per-
niciosus est. Bonam autem spirationem valde magnam vim
habere ad salutem, in omnibus acutis morbis putare conue-
nit, qui cum febribus sunt, & in quadraginta diebus iudicā-
tur. Sudores optimi sunt in omnibus acutis morbis, qui in *Sudores*
diebus iudicatoriis fiunt, & febrem perfecte submouent. Bo- *qui salu-*
ni vero sunt, qui per totum corpus fientes, hominem facili- *bres &*
us morbum ferre faciunt. Qui vero tale quid non effecerint, *contra.*
incommodi sunt. Pessimi autem sunt frigidi, & tantum
circa caput & faciem fientes, & circa ceruicem. Hi enim cum
acuta quidem febre, mortem præsignificant: cum mitiore
vero, longitudinē morbi. Et qui per totum corpus fiunt, simi-

C liter significant his qui circa caput. At vero milioformes, &
solum circa collum fientes, mali sunt. Qui vero cum guttis fi-
unt, & euaporant, boni sunt. Considerare porro conuenit
sudores in summa. fiunt enim aliqui propter corporum exo-
lutionem, aliqui propter inflammationis vigorem. Præcor-
dium optimum est doloris exors, & molle, & æquale, tum in
dextra, tum in sinistra parte. At inflāmatum, aut dolorē ex-
hibens, aut dextræ partes inæqualiter affectæ ad sinistras:
hæc omnia obseruare oportet. Si vero etiam pulsus inquit
in præcordio, turbationem significat aut delyrium. Verum
oculos talium insuper intueri oportet. Si enim oculi frequē-
ter moueātur, furiosos hos fore timor est. Tumor in præ-
cordio durus existens & dolorosus, pessimus quidē est si per
totum

*A præcor-
diis notæ.*

HIPPOCRATIS LIBER

gotum fuerit præcordium . Si vero fuerit in altera parte, minus periculosus est in sinistra. Significat autem eiusmodi tumores, in principio quidem, mortem breui affuturam. Si vero viginti dies transgrediatur, tum febris detinens, tum tumor non confidens ad suppurationem conuertitur. Contingit autem his in primo circuitu, etiã sanguinis eruptio è naribus, & valde prodest. Verũ interrogare conuenit, an caput doleant, aut hebetem visum habeant. Si enim horum quid fuerit, ad eum locum repit. Magis tamen in iunioribus quinque ac triginta annis, sanguinis eruptionem expectare cõuenit. At vero molles tumores, & doloris exortes, & qui digito cedunt, diuturniores iudicationes faciunt, & minus illis sunt horrendi. Si vero transgrediatur sexaginta dies febris detinens, & tumor non confidat, suppuratum fore significat & hunc, & eum qui in reliquo ventre est eodem modo. Quicũque igitur tumores dolorosi sunt, & duri, & magni, periculum mortis breui affore significant. Qui vero molles, & doloris exortes sunt, & digito compressi cedunt, diuturniores illis sunt. Ceterũ tumores in ventre minus faciunt abscessus, quàm hi qui sunt in præcordiis. Minime vero hi qui sub vmbilico consistunt, ad suppurationem conuertuntur. Sanguinis vero eruptionem, ex supernis locis maxime expectare oportet. Omnium autem tumorum diuturnorum circa hos locos, suppurationes considerare conuenit. Sunt autem suppurationes hinc fientes hoc modo confiderandæ. Quæcunque extra vertuntur, optimæ sunt, quæ paræ sunt, & quàm maxime foras eminentes, & in acutum fastigiata. Quæ vero magnæ sunt, & latæ, & minime in acutum fastigiata, pessimæ sunt. Quæcunque vero intro rumpuntur, optimæ sunt quæ nihil cum externo loco communicant, sed sunt contractæ, & doloris exortes, & totus externus locus concolor apparet. At vero pus optimũ est, si est album & æquale, & leue, & quàm minime graueolens. Quod vero huic contrarium est, pessimum est. Aquæ porro inter cutem, ex acutis morbis obortæ, omnes malæ sunt. Neque enim à febre liberat, & valde dolorosæ sunt, ac lethales. Incipiũt autem pleræque à laterum mollitudine, & à lumbis; aliquæ vero etiam ab hepate. Quibus igitur à laterum mollitudine & lumbis, principia sunt, his & pedes intumescunt, & alui profluvia diuturna ipsos tenent, quæ neque dolores

*Hydropis
origo.*

ex laterum mollitudine ac lumbis soluant, neque ventrē mol-
lunt. Quibuscunque vero ab hepate aqua inter cutem o-
riantur, his tussis tussientiūque proptitudo accedit, & nihil
memorable expiunt, & pedes tument, & venter non egerit
nisi dura, & coactus, & circa aluum fiunt tumores, aliqui in
dextra, aliqui in sinistra parte, tum consistentes, tum cōden-
tes. Caput autē & manus, & pedes, si frigida sunt, malum est,
vbi & venter, & latera calida sunt. Optimū vero est & totum
corpus calidum esse, ac molle. Conueri autē facile con-
uenit egrotum, & in attollendo se leuem esse. Si vero gra-
uis esse appareat, & reliquo corpore, & manibus, & pedibus,
magis periculosum est. Si vero supra grauitatem, vagues & di-
gitu liuidi fiant, mors euestigio expectanda est. At si digiti
ac pedes penitus nigrescunt, minus perniciosi sunt quā liui-
di. Verū & alia signa considerare oportet. Si enim facile fer-
re videatur malum, & aliud quoddam ex salutaribus ad hęc
signa subindicer, morbum ad abscessum verti spes est, ita vt
eger quidē superstes mansurus sit, corporis vero partes nigre-
scent casuræ. Testes & pudenda reuulsa, dolores fortes fi-
guificānt, & periculum lethale. Quod vero ad somnos atti-
net, quemadmodum secundum naturam cōsuetum nobis est,
interdiu vigilare oportet, noctu dormire. Si vero hoc fuerit
transmutatum, peius est. Minime vero lædi æger poterit, si
dormiat mane ad tertiam partem diei. Qui vero ab hoc tem-
pore fiunt somni, deteriores sunt. Pessimam autē est non dor-
mire, neque noctu, neque interdiu. Aut enim præ dolore ac
afflictionibus vigiliæ adfunt: aut deliriū aderit ab hoc signo.
Egestio alui optima est, mollis & cohærens, & secundum
horam, in qua etiam à sano egerebatur. Iuxta copiam vero,
pro ratione ciborum ingestorū. Tali enim contingente exi-
tu, vter infernus sanus fuerit. Si vero liquida fuerit egestio,
conducit neque stridere, neque frequente m esse, & paulatim
secedere. Delassatur enim homo ex frequenti desessu, & vigi-
lias utique contraxerit. Si vero sæpe aceruatim egerit, pericu-
lum est ne in animi deliquium incidat. Quin & iuxta copiam
ingestorū egerere oportet, bis aut ter in die, & noctu semel.
Plura vero mane, quemadmodum in consuetudine est homi-
ni. Inspissari autem oportet egestionem, morbo ad iudicatio-
nem tendente. Sit autem subfulua, & non valde graueolens.

Commo-

Hydropis
diuersitas.

Somnus

Aluicere
mentis

HIPPOCRATIS LIBER

Commodum est & lumbricos rotundos cum egestionem prodire, morbo ad iudicationem tendente. Oportet autem in omni morbo mollem esse ventrem, & iusta mole præditum. D

At vero aquosum valde, aut album, aut pallidum, aut viride, aut vehementer rufum, aut spumosum stercus egerere: Hæc omnia mala sunt. Malum insuper est & quod exiguum est, & viscosum ac album: & quod subpallidum aut subviride ac leue. His vero magis lethalia fuerint stercorea nigra, aut pinguis, aut liuida, aut æruginosa, & male olentia. Quæ vero varia sunt, diuturniora quidē his sunt, nihilo minus autem pernicioſa. Sunt autem talia, ramentosa, & biliosa, & cruenta, & præsina, & nigra, aliquando simul inter se excurrentia, aliquando particulatim. Flatum porro sine strepitu ac crepitu prodire optimum est. Melius autem est & cum strepitu exire, quàm isthic reuolui. & qui sic progressus est flatus, aut dolere quid hominem significat, aut delirare: nisi sua sponte homo ita flatum emittat. Cæterum præcordiorum dolores ac tumores, si fuerint recentes, & non cum inflammatione, soluit, murmur in præcordio obortum, & maxime quidem si pertransierit cum stercore, & vrina, ac flatu. Sin minus, etiam ipsum per se si transierit, prodest. Prodest item si subscederit ad infernos locos. Optima vero est vrina, quum fuerit alba subsidentia, & leuis & æqualis, per totum tempus, donec iudicatus fuerit morbus. Significat enim & securitatem, & morbum fore breuem. Si intermiserit, & aliquando quidem pura mingatur, aliquando vero subsidet album ac leue, diuturnior fit morbus, & minus securus. Si vero fuerit & vrina subrubra, & subsidentia ipsius similis, & leuis, diuturniorem quidem hæc morbum quam prior significat, sed valde salutarem. At subsidentia in vrinis crassiores polentę partes referentes, prauæ sunt. His autem peiores sunt, laminosæ. Albæ vero & tenues valde malæ sunt. Verū his deteriores sunt fursuracæ. Nubeculæ quæ feruntur in vrinis, albę quidem bonæ sunt, nigre vero malæ. Quandiu vero fulua fuerit vrina & tenuis, morbum incôcoctum esse significat. Si vero & diuturna fuerit talis existens, periculū est ne sufficere homo possit, donec vrina fuerit concocta. Lethaliores autem sunt vrinæ, & foetidæ, & aquosæ, & nigre, & crassæ. At tum in viris, tum in mulieribus, nigre vrinæ pessimæ sunt. In pueris au

Vrina

tem

- A** rem aquosa. Quicunq; vrinas tenues & crudas mingunt multo tempore, si alia veluti superstitibus futuris signa fuerint, his abicessum expectare oportet ad locos infra septum transfuersum. Sed & pinguetudines superne instantes, araneorum telis similes, damnare oportet. Sunt enim colliquationis signa. Considerare vero conuenit in vrinis in quibus nubeculae sunt, an superne aut inferne sint; & quales habeant colores. Et quae quidem deorsum feruntur, cum coloribus relatis, eas bonas esse putare, ac laudare. Quae vero sursum feruntur, cum coloribus relatis, malas esse, & tales damnare. Nec vero decipiat te, si vesica morbum aliquem habens, eiusmodi vrinas reddiderit. Non enim totius corporis signum est, sed ipsius per se vesicae. Vomitus comodissimus est, ex pituita ac bile quam maxime permixtus, & non crassus valde, neque multus. Nam meraciores, deteriores sunt. Si vero id quod vomitu reiectum est praesini fuerit coloris, aut liuidum, aut nigrum: quicunque horum fuerit colorum, malum esse putandum est. Si vero omnes colores idem homo vomit, valde perniciosum hoc est. Celerrimam autem mortem significat liuidus vomitus, si graueolens fuerit. Omnes vero subputridi ac foetidi odores, in omnibus vomitibus mali sunt. Sputum vero in omnibus doloribus, qui circa pulmonem & costas sunt, cito ac facile expui conuenit, & flauum sputo valde permixtum apparere. Si enim longe postea post principium doloris, expuerit quod flauum est, aut fuluum, aut quod multam ruffim inducit, & non valde permixtum est, deterius est. Nam & flauum meracum, periculosum est: & album ac viscosum & rotundum, inutile est. Malum est & quod viride est valde, itemque pallidum, & quod spumofum. Si vero ita fuerit meracum, ut etiam nigrum appareat, hoc ipsum deterius est quam illa. Malum etiam est si nihil repurgetur, neque emittat pulmo, sed plenus ferueat in gutture. Grauedines & sternutationes in omnibus circa pulmonem morbis, & antecessisse, & succedere, malum est. At in aliis morbis lethaliissimis sternutationes profunt. Sputum autem flauum, sanguine permixtum non multo, si in pulmonis inflammatione, in principio morbi reiciatur, salutare est, & valde prodest. Si vero septimo die, aut posterius, minus securum est. Omnia sputa mala sunt, quae dolorem non sedant. Pessima vero sunt nigra, velut descri-

Vomitus.

Sputum.

Pulmo qui
non purgat
malum estSputa quae
mala.

descri-

HIPPOCRATIS LIBER

*Suppura-
tiones.*

*Bona speci-
figna.*

*Suppuratio
signa
signa*

*Pus quan-
do erumpit.*

descriptum est. Quæ vero dolorem sedant, omnium optima existunt. Quicunque dolores ex his locis non sedantur, neque ad sputorum purgationes, neque ad stercoreum alui subductionem, neque ad venæ sectiones, & victus rationem ac medicamenta, eos ad suppurationem verti sciendum est. Ex suppurationibus quæcunque dum sputum adhuc biliosum est suppurantur, perniciosæ valde sunt, siue biliosum illud in parte, siue simul cum pure expuatur: & hoc potissimum si morbo ad septimum diem progressu, suppuratio ab hoc sputo procedere incipiat. Timor autem est eum qui talia expuit moriturum esse decimaquarta die, si non aliquod bonum signum ipsi acciderit. Sunt autem bona hæc: facile ferre morbum, bene spirare, à dolore liberatum esse, sputum facile tussiendo reicere, corpus æqualiter calidum ac molle apparere, sitim non habere, urinas & alui egestionem, & somnos, & sudores, velut descriptum est: hæc singula nosse conuenit accidere ut quæ bona sint. Nam omnibus his sic contingentibus, homo non morietur. Si vero aliqua ex his accesserint, aliqua non, non ampliore tempore vita producta, decimaquarta die homo peribit. Porro mala signa his contraria sunt: ægre ferre morbum, spiritum magnum & densum esse, dolorem non sedari, sputum vix tussiendo reicere, valde sitire, corpus inæqualiter à febre teneri, ventrem quidem ac costas fortiter calidas esse, frontem vero & manus ac pedes frigidos. Urinas autem & alui egestionem, & somnos, & sudores, velut descriptum est: hæc singula nosse oportet mala esse. Si enim ita accesserint horum aliquid ad sputum, peribit utique homo priusquam ad decimumquartum diem peruenerit, aut nono die, aut undecimo. Sic igitur coniecturam facere oportet, quod hoc sputum lethale sit valde, & non perducatur ad decimumquartum diem. Proinde & mala & bona signa expendentem ex his prædictiones facere oportet. Ita enim potissimum veritatem coniecturi quis poterit. At vero aliæ suppurationes rumpuntur, plurimæ quidem vigesimo die, aliæ vero trigesimo, aliæ quadragesimo, aliquæ vero ad sexaginta dies perueniunt. Considerare vero futuræ suppurationis principium oportet, suppuratione facta ab ea die qua primum homo febricitauit, aut si forte ipsum primum rigor apprehendit: & si pro dolore grauitatem sibi factam esse dixerit, in eo loco in quo dolebat.

Hæc

A Hæc enim in principiis suppurationum fiunt. Ex his igitur temporibus eruptionem suppurationū fore expectare oportet ad prædicta tempora. Si vero suppuratio fuerit in altero latere solum, vertere & considerare oportet in his, num aliquem habeat dolorem in altero latere, & an alterum altero sit calidius: & reclinato ægro in latus sanum interrogare ipsum, an videatur ipsi graue quid ex superno latere incumbere. Si enim hoc fuerit, in altero est suppuratio, in quo grauitas affuerit. Caterum omnes suppuratos ex his signis cognoscere oportet. Primum quidem si febris non dimittit, sed per diem quidem tenuis est, noctu vero amplior: & sudores multi oboriuntur, tussisæque ac tussendi promptitudo ipsis adest, & nihil memorabile expuunt: & oculi caui fiunt, & maxillæ ruborem contrahunt, & ungues quidem manuum curuantur, digiti vero caleſcunt, & potissimum summi: & in pedibus tumores fiunt, & cibos non appetūt, & pustulæ per corpus enascuntur. Quæcunque igitur suppurationes diuturnæ sunt, hæc signa habent, & fidem ipsis valde habere oportet. Quæ vero breues sunt, ex his signis cognoscere oportet, si quid apparuerit ex his, qualia in principiis fiunt. Simul autem & si aliquāto difficiliter spirauerit homo. At vero quæ ex ipsis citius & tardius rumpuntur, his signis cognoscere oportet, si quidem enim dolor in principiis fiat, & spirandi difficultas, & tussis, & sputatio perseverans, ad vigesimum diem pertingat, eruptionem tunc expectare oportet, aut etiam prius. Si vero quietior fuerit dolor, & alia omnia pro huius ratione, eruptio posterius expectanda est. Necessè vero est accedere & dolorem, & spirandi difficultatem, & sputationem, ante puris eruptionem. Ex his autem maxime superstites manent hi quos febris eodem post eruptionem die dimiserit: & qui cibos cito appetiuerint, & à siti liberati fuerint: & si venter parua & compacta egerit, & pus album & leue & eiusdem coloris fuerit, & à pituita liberum, & citra dolorem ac tussim fortem repurgetur. Ac optime quidē sic ac celerissime liberantur. Sin minus, hi quibus proxima his contigerint. At vero intereunt hi quos febris non dimiserit, aut ubi ipsos dimisisse putata fuit, rursus recalcens apparuerit: & qui sitim quidem habuerint, cibos autem non appetiuerint, & si venter liquidus fuerit, & pus pallidum siue viride, & liuidum

Suppurato
rum cogni
tio.

Ff expue-

HIPPOCRATIS LIBER

expuerint, aut pituitosum & spumosum. Si hæc omnia cōrige
 rint, pereunt. Quibus vero ex his quædā accesserint, quædam
 non, horū aliqui intereunt, aliqui in multo tēpore superstites
 euadunt. Verū ex omnibus signis quæ adsunt, tum in his, tum
Tubercula in aliis omnibus coniecturā facere oportet. Quibuscumq;
aurium. ex inflammati pulmonis morbis, abscessus circa aures fiunt, &
 suppurantur, aut ad infernas partes, ac fistulantur, hi supersti-
 tes euadunt. Verū huiusmodi sic considerare oportet. Si & fe-
 bris detinuerit, & dolor non sedatus fuerit, & sputū pro ra-
 tione nō prodierit, neq; biliosæ, neq; solutu faciles, & mera-
 cæ alui egestionis fuerint, neq; vrina valde multa, & multam
 subsidentiam habēs: indicatur autē superstes futurus ab om-
 nibus reliquis salutaribus signis: tunc abscessus huiusmodi se-
 re sperandū est. Fiunt autē partim ad infernas partes, quibus
 videlicet inflāmatio aliqua circa præcordia affuerit: partim
 in supernis, quibus præcordiū molle & doloris exors perma-
 serit, & vbi spirandi difficultas, quæ per tēpus aliquod affuit,
 desierit citra aliā manifestā causam. Cæterū abscessus ad cru-
 ra, in pulmonis inflāmationibus fortib⁹ ac periculosis, omnes
 quidē viles sunt, optimi vero sunt, qui dum sputū iam in mu-
 tatione est fiunt. Si enim tumor & dolor fiat, sputo pro sano
 purulēto fiente, & foras procedēte: ita securissime homo su-
 perstes euaserit, & abscessus absq; dolore celerrime sedabitur.
 Si vero sputū non bene processerit, neq; vrina subsidentiam
 bonā habēs apparuerit, periculū est claudum fore articulum,
 aut multum molestiarū exhibiturum. At si euanescat & recur-
 rant abscessus, sputo non prodeūte, febrēq; permanēte hor-
 rendum est. Periculū enim est ne deliret homo & moriatur.

Ex suppuratis à pulmonis inflāmatione, seniores magis
 intereunt. Ex aliis autē suppurationibus, iuniores magis mo-
 riuntur. Dolores cum febre fientes circa lūbos & infernas
 partes si septū trāsuersum attigerint, infernas partes relinqui-
 tes, perniciosi valde sunt. Proindē aliis quoq; signis animum
 aduertere oportet. Nam si quod etiā ex aliis signis malum ap-
 paruerit, desperatus est homo. Si vero affiliēte ad septū trās-
 uersum morbo alia signa non mala accesserint, hunc suppara-
 tum fore multa spes est. Quicūque vero suppurati vruntur,
 quibus quidem purum pus fuerit, & album, & non fœtidum,
 hi seruantur: quibus autem subcruentum, & cœnosum, hi pe-
 r eunt.

A reunt. Porro vesica dura & dolētes, penitus quidē horrendae ac perniciose sunt, perniciosissimae vero quae cū febre continua fiunt. Etenim dolores ab ipsis vesicis ad occidendū sufficiunt, & alui non egerūt hoc tēpore, nisi durum quiddam, & hoc coactae. Soluit autē vrina purulenta micta, quae albam ac leuem subsidētiam habet. Si vero neq; ab vrina quicquā remiserit dolor, neq; vesica molliatur, & febris continua fuerit, in primis circuitibus morbi aegrum moriturū esse timor est. Atque hic modus potissimū pueros corripit septēnes, donec ad quintūdecimum annum peruenerint. Febres iudicantur in iisdem numero diebus, ex quibus & superstites euadunt homines, & ex quibus pereunt. Etenim placidissimae febres, & signis securissimis nitentes, quartodie desinunt, aut prius. Malignissimae vero, & signis horredissimis fientes, quarto die aut prius occidunt. Primus igitur ipsarum insultus sic desinit. Secundus autem, ad septimum producit. Tertius ad vndecimum. Quartus ad decimumquartum. Quintus ad decimūseptimum. Sextus ad vigesimum. Hi igitur impetus ex acutissimis morbis, per quatuor ad viginti, ex additione desinunt. Non potest autem quicquam horum integris diebus exacte numerari. Neque enim annus, & menses, integris diebus numerari possunt. Postea vero eodem modo iuxta eandem additionem, primus circuitus quatuor & triginta dierū est, secundus quadraginta dierum, tertius sexaginta dierum. At in horum principiis difficillimum est cognoscere eos qui in plurimo tēpore iudicabuntur. Simillima enim sunt ipsorum principia. Verum à primo die animaduersionem facere oportet, & prout singuli quaternarij adduntur considerare, & non latebit te quo vertetur morbus. Fit autem & quartanarum febrium constitutio ex huiusmodi ordine. Qui porro morbi in breuissimo tempore iudicabūtur, faciliores cogniti sunt. Maximae enim differentiae ab initio ipsis sunt, Qui enim superstites ab ipsis euasuri sunt, facile spirantes, & doloris exortes sunt, & noctu dormiunt, aliāque signa securissima habent. Qui vero morituri, aegrē spirantes fiunt, delirātes, vigilantes, aliāque signa pessima habentes. Vt igitur his ita contingentibus, coicētare oportet, & iuxta hoc tempus, & iuxta vnamquamque additionem tendentibus ad iudicationem morbis. Iuxta eandem rationē mulieribus quoque iudicationes fiunt

Ex vesicae
notae.

Febrium de
cretoria.

HIPPOCRATIS LIBER

Capitis dolor affiduus quando malus. Capitis dolores fortes & continui cum febre, si quidem lethaliū signorum quid acceſſerit, pernicioſi valde ſunt. Si vero abſq; talibus ſignis, dolor viginti dies tranſmiſerit, & febris tenuerit, ſanguinis à narib⁹ eruptionē, aut abſceſſum quendam ad infernas partes expectare oportet. Sed & ſi diu dolor recēs fuerit, ſimiliter ſanguinis è narib⁹ eruptionē, aut puris eruptionem ſperare cōuenit, cum aliàs, tum ſi dolor circa tempora & frontem fuerit. Verum ſanguinis eruptio magis expectanda eſt iunioribus trigintaquinque annis, ſenioribus vero puris eruptio.

Auris dolor. Auris dolor acutus cum febre continua ac forti, horrendus eſt. Periculum eſt enim delirantium eſſe hominem, ac periturum. Proinde quum hic modus minime tutus ſit, cito mentem aduertere oportet etiam aliis ſignis, à primo ſtatim die. Pereunt autem iuniores homines ſeptimo die, & adhuc citius, ex hoc morbo. Senes vero longe tardius. Nam & febres & deliria minus ipsis accidunt. & hæc de cauſa aures antea ſuppurantur. Verum his quidem ætatibus recidiuæ morbi contingentes, plurimos occidunt. At vero iuniores priuſquam ſuppuretur auris, pereunt. Nam ſi pur album effluxerit ex aure, ſpes eſt iuuenem ſuperſtitem euſurum eſſe, ſi ſanè & aliud quoddam bonum ſignum ipſi accedat.

Faucium exulceratio. Fauces exulceratæ cum febre, horrendæ ſunt. Verum ſi quod aliud item ſignum accedat, ex his quæ antea mala eſſe iudicata ſunt, in periculo hominem verſari prædicendum eſt.

Anginae uarietas. Anginæ horrendiſſimæ ſunt, & citiſſime accidunt, quæ neque in faucibus quicquam conſpicuum faciunt, neque in ceruice: verum plurimum dolorem exhibent, & erecta ceruice ſpirationem inducunt. Hæ enim eodem die ſuffocant, ſecundo item ac tertio & quarto. Quæ vero alioqui ſimiliter dolorem exhibent, attolluntur autem, & in faucibus rubores faciunt, pernicioſæ quidem valde ſunt, verum prioribus magis diuturnæ, ſi rubor fuerit magnus. Quibuſcunque vero fauces & ceruix ſimul rubuerint, hæc anginæ diuturniores ſunt, & ex ipsis maxime euadunt, ſi & ceruix, & pectus ruborem habuerit.

Eryſipelas. Eryſipelas ignis ſacri non intro recurrit. Si vero neque in diebus iudicatoriis diſſipetur eryſipelas, neque tuberculum ad externam partem conuertatur, neque puſſiſſimo reiiciat, facilèq; ac ſine dolore degere videatur, mortem ſignificat, aut ruboris recidiuam. Securius eſt autem tumorem

A morē & ruborem q̄ maxime foras verti. Si vero ad pulmonē vertatur, & delirium inducit, & quidam ex ipsis suppurati plerunque fiunt. Gurguliones periculosi sunt vt & rescentur, & scarificentur, quā diu rubicundi fuerint & magni. Nam inflammationes ad hos succedunt, & sanguinis eruptiones. Quare tales aliis machinamentis attenuare conari oportet hoc tēpore. Quum vero totum iam fuerit secretum, quod sanē vuam appellant, & fiat extrema gurgulionis pars maior & rotunda, superior autem tenuior, in hoc tempore tutum est rem aggredi. Præstat tamen & aluo subducta, chirurgia hac vti, si & tempus permittat, & homo non stranguletur. Quibus febres cessant, neque signis solutoriis apparentibus, neque in diebus indicatoriis, his reuersuras esse expectandum est. Quæcunque febris longiorem moram traxerit homine alioqui ad salutem disposito, ita vt neque dolor teneat ob inflammationē, aut ob aliquam aliam manifestam causam: huic abscessum expectare oportet cum tumore ac dolore ad aliquem articulum, vel maxime infernum. Fiunt autem huiusmodi abscessus magis, & in breuiori tēpore, his qui iuniores sunt triginta annis. Expectare vero statim oportet abscessum, si febris detinens viginti dies transmiserit. Senioribus autem minus fiunt, diuturniore etiam existente febre. At vero huiusmodi abscessum expectare oportet febre continua existente. Verum ad quartanam deducetur, si intermiserit, & erroneo modo apprehenderit, & si hæc faciens ad autumnum appropinquet. Quemadmodum autem iunioribus triginta annis abscessus fiunt: Ita quartanæ magis his qui triginta sunt annorum, & senioribus. Ceterum hæc nosse expedit, abscessus magis hyeme fieri, tardiùsque cessare, & minus recurrere. Quicumque vero in febre non lethali, dixerit sibi caput dolere, aut etiam præ oculis obscurum quiddam apparere, si & osculi ventris morsus huic accefferit, ei biliosus vomitus aderit. Si vero etiam rigor accefferit, & partes infra præcordium frigidas habuerit, citius adhuc vomitus aderit. At si quid biberit aut edierit sub hoc tempus valde cito vomet.

Porro quibus horum dolor fieri inceperit primo die, hi quarto magis quā quinto premuntur: septimo vero liberantur. Plerique tamen ipsorum tertio die dolere incipiunt, vexantur autem maxime quinto, liberantur nono, aut vndeci-

Ff iij mo.

HIPPOCRATIS LIBER

mo. Qui vero inceperint quinto die dolere, aliâque iuxta rationem priorum ipsi fiant, his ad decimumquartum morbus iudicatur. Fiunt autem hæc & viris, & mulieribus, maxime in tertianis. Iunioribus vero fiunt quidem & in his, verum magis in continuis febribus, & in sinceris tertianis. Quibus-
cunque vero in huiusmodi febre caput dolentibus, pro eo quod obscurum quiddam præ oculis appareat, visus hebetudo contingit, aut splendores ob oculos obuersantur: & pro osculi vëtris morfu, in præcordiorum dextra aut sinistra parte aliquid tenditur, neque cum dolore, neque cum inflammatione: sanguinem de naribus his, pro vomitu fluxurum esse expectandum est. Magis tamé & hic in iuuenibus sanguinis eruptionem expectare oportet, his autem qui triginta sunt annorum, & seniores adhuc, minus: verum vomitus in his expectari debent. At vero pueris conuulsiones fiunt, si febris fuerit acuta, & venter non egefferit, & vigilarint, & terreantur, & eiularint, & colorem mutarint, & viridè siue pallidum, aut luidû, aut rubrum cõtraxerint. Fiunt auté hæc promptissime quidem pueris nuperrime editis, vsque ad septimum annum. Seniores autem pueri, & viri, non amplius in febribus corripiuntur cõuulsionibus, si non quid ex signis fortissimis ac pessimis accesserit, qualia sanè in phrenitide fieri solent. Perituros porro & superstites futuros, tum pueros, tum alios, ex omnibus signis coiectare oportet, prout singula de singulis perscripta sunt, Atque hæc & de acutis morbis, & de his qui ex ipsis fiunt, dico. Qui vero recte prænoscere volet, & superstites futuros, & morituros: & quibus per plures dies, & quibus ad pauciores morbus duraturus est: eum signa omnia ediscere, & iudicare posse conuenit, ita vt vires ipsorum inter se conferendo expendat, quemadmodum perscriptum est, & de aliis, & de vrinis, & de sputis, vbi simul & pus & bilè ægrotus tussiendo reiecerit. Quin & impetus morborû semper populariter grassantium cito animaduertere oportet, & tēporis constitutionem non ignorare. Probe tamen id nosse
Libya, De- expedit de cõiecturis certis, & aliis signis, & non ignorare q
los, Scy- in omni anno, & omni tempore, mala malum, bona bonum
thia, pro o- significant. Nam & in Libya, & Delo, ac Scythia, præscripta
mnibus po- signa vera comperiuntur. Proinde sciendum est, minime dif-
nuntur. ficile esse, in iisdē regionibus posse aliquem pleraq; ex ipsis
assequi,

A assequi, si memoria tenens ipsa, iudicare ac recte expendere sciat. Ceterum nullius morbi nomen desiderare oportet, quod hic non est adscriptum. Omnes enim qui in praedictis temporibus iudicantur, ex iisdem signis cognosces.

HIPPOCRATIS COI

PRAEDICTIO NV M LIB.

I. Iano Cornario medico

physico interprete.



Oporosi in principiis fientes, cū capitis, lumborum, praecordij, colli dolore, vigilantes, num phrenitici sunt? Nasus in his destillans perniciosus, tum alias, tum quarto ab initio die. Alui proluuiū valde rubicundum, malum quidē est in omnibus morbis, non minime vero in praedictis. Linguae asperae & resiccatae, phreniticae. In

Alui proluuiū.

Linguae asperae & resiccatae, phreniticae.

Insomnia Sreatio.

Thrasynō. Phrenesis. Vomitus.

Faucium dolor.

Archececrates. Melancholicum eacocithes.

turbatis vigilantibus, urinae decolores, nigrae, innatantes, in sudoribus, phreniticae. Insomnia etiam in phreniticis manifesta sunt. Sreatio frequēs, si sanē & aliud quoddam signum affuerit, phrenitica sunt. Qui relinquuntur in praecordio ardores, febre perfrigerata, mali sunt, tum alias, tū in sudoribus. Praedebilitatorum desipientiae pessimae, velut etiam Thrasynonti. Phreniticae vehementer affectiones, tremulae desinunt. Vomitus in capitis doloribus æruginosi, cum surditate & vigiliis, cito insaniam affore denunciant. Loci circa fauces in acutis morbis dolorosi, graciles, parui, suffocatorii, quando hiarit æger ut os claudere & aperire nō facile possit, mentis emotionem portendunt. Ex talibus phrenitici fiūt, & perniciose affecti. In phreniticis in principio mansuetudo. Verum frequenter transmutari, malum id est, & sputatio mala est. In phreniticis alba alui egestio, malum: quemadmodum & Archececrati. Num & in his torpor fit? Rigor in his pessimus. Quibus melancholico modo mente

Ff iij motis,

HIPPOCRATIS LIBER I.

motis, tremores accedunt, malignum hoc est. Mente moti acute, ubi insuper febrierint, cum sudore phrenitici fiunt.

Phrenitici paucibili, strepitum valde percipientes, tremuli.

Feriale signum. Ex vomitu nauseabundo oborta, clāgorosa vox, oculi puluillum incumbentem habentes, insaniam portendunt: quē-

Hermozygæ gas. admodum etiam Hermozygæ vxor, insaniam acute correpta, voce destituta mortua est. In febre ardenti sonitibus aurium

Tinnitus aurium qualis. accedentibus, cum visus hebetudine, & grauitate in naribus accedente, melancholico modo mente mouentur. Mentis

Lingue spasmi. perculsiones cum voce clangorosa, linguæ conuulsiones tremulæ: & voces tremulæ fientes, mortem alienant. duricies in

Lingue tremor. his pernicioſa est. Linguæ tremulæ signum sunt mentis nō firmæ. In biliosis meracis alui egestionibus, spumosa stoma-

Oletula spumosa. lentia mala, tum alias, tum si cui lūbi antea doluerint, & mēte motus fuerit. Rari circa latus in his dolores, desipientiā

Singultus quādo malus. significant. Vocis interceptiones cum singultu pessimæ. Vocis interceptiones cum exolutione pessimæ. In vo-

Vocis interceptiones. cis interceptione, spiritus veluti his qui strangulatur præ manibus expositus, malus est. Num & talis mentem emouet?

Aristagoras. Modice feroces mentis emotiones, ferinæ sunt. Molestē ferre morbum cum perfrigeratione, si non sine febre ex-

Vrinæ clādestinæ. sudent partes supernæ, phrenitim portendit: quemadmodū etiam Aristagoræ. Sed & perniciosum hoc est. Frequentes

in phreniticis permutationes, cōuulsoriæ. Vrinæ quæ minguntur à non recordantibus, nec commune factis, pernicio-

ſæ. Num his minguntur velut si subsidentiam conturbasses? Palpitantes per totum, num voce destituti moriuntur?

Sputationes in phreniticis cum perfrigeratione, nigre reuomuntur. Surditas, & vrinæ non confidentes, valde rubi-

cundæ, innatantes, mentis emotionē portendunt. His morbo regio corripī malum est. Mala est & ex morbo regio fatui-

tas. Hos voce quidem destitui, verum sentientes esse contingit. Arbitror autem & alios his perūpere, velut contigit Her-

Hermippus. mippo, & mortuus est. Surditas in morbis acutis & turbulentis consequens, mala. Mentis emotiones tremulæ, ob-

Surditas malum in his. scuræ, palparoriæ, valde phreniticæ sunt. Velut & Didymarcho in Co. Torpores ex rigore, nō valde apud seipsos sunt.

Didymarchus. Dolores circum vmbilicum palpitantes, habēt quidem aliquid quod mentem emouet. Verum circa iudicationem his spiritus

spiritus acervatus cum prompta tensione penetrat. Et dolores circa suram, in his mentis emotionem faciunt. Si innatatit quid in vrina, dolore circa femur dissipato, mentis emotionem portendit. & qualia circa aurium sonitus contingunt, talia existunt. In aluo liquida, lassato, caput dolenti, titiculofo, vigilati, obscure loquenti, impotenti, quibus talia sunt, his timor est vt mente moueantur. Exudantes & maxime circa caput, in morbis acutis submoleste ferentes, malum, tum alias, tum in vrinis nigris. & turbidus spiritus in his malus.

Impotentia praeter vacuatorum vasorum rationem contingentes, non existente vasorum vacuatione, malum. Alui interceptae, sed parua, nigra, velut caprarum stercora ad necessitatem coacte emittentes, natus in his erumpens, malum. Quibus lumborum dolor diutinus, cum ardore fastidioso ac nauseabundo, hi si exudent malum est. Num his tremores fiunt? Sed & vox velut in rigore conspicua? Extremitates si in vtranque partem cito transmutentur, malum est. Et sitis huiusmodi, mala est, Ex moderato ferox respiratio, malum. Vox acuta, his praecordia intro trahuntur. Oculus

Vox acuta.

Dentium stridor.

Lotii iterceptio.

Mortis signum.

Silentium in febribus.

perniciosum.

Sitis.

Sudor.

Vrinae malae.

Vomitibus malus.

hebes, malus: & fixus ac caliginosus, malus. Vox acuta clagorosa, mala. Dentium stridor perniciosus est, quibus non & sanis familiaris est, Suffocatio in his valde mala. Faciei bonus color, & vehemens toruitas, malum. Egestiones alui desinentes in spumosas meracas, exacerbatoriae sunt. Vrinarum in morbis acutis ex perfrigeratione interceptiones, pessimae. Perniciosa si citra signa, leuia facta fuerint, mortem significant. In morbis acutis biliosis valde albæ, spumosae, circumbiliose egestiones, malae. Malae item & vrinae eijusmodi. Num his hepar dolorosum est? Vocis interceptiones in febribus conuulsorio modo fientes, ad mentis emotionem cum silentio deueniunt, perniciosum. Vocis ex dolore interceptiones, dolorosam mortem inducunt. Febres ex praecordiorum doloribus malignae. Sitis praeter rationem soluta in acutis morbis, mala est. Sudor multus cum febribus acutis fiens, malus est. Et vrinae dolorosae, malae sunt.

Et rubicundae ex his florulentiae detentae, itemque æruginosae, malae sunt: & paruas apparere veluti stillas. Et vomitus cum varietate, mali sunt, tum alias, tum si propius inter se prodeant. Quaecunque in diebus iudicatoriis, cum anxietudine,

HIPPOCRATIS LIBER I.

Sopor.
Ignorantia
Oblivio.

Oculi di-
stortio.

Qui cito
moriuntur.
Colli do-
lor pess-
imus.

Perfrige-
ratio.

Pernicies
sceminaria.

xietudine, absque sudore perfrigerantur, malum est: Et quæ ex his insuper riguerint, mala sunt. Vomitus meraci, anxiosi, mali. Sopor num ubique malus est? Ignorantia cum rigore, malum. Malum item obliuio. Perfrigerationes ex rigore non recalescentes, malæ sunt. Sudantes ex perfrigeratione recalescentes, malum. In his ardor dolorosus in lateribus, & insuper rigere, malum est. Aestuarii rigores aliquatenus perniciosi: & flammea facies cum sudore in his mala est: In his posteriorum partium frigiditas, conuulsionem accersit. Exudantes vigilantes recalescentes, malum. Ex lumborum recursum, oculi distortio malum. Dolor in pectus firmatus cum torpore, malus. Hi si insuper febriant, acutè ardentes, moriuntur. Qui nigra reuomunt, cibos auersantur, deliri sunt, iuxta pubem parum dolorosi, oculum ferocem aut clausum habent, eos medicamentis purgare non oportet. Perniciosum enim est: Neque intumescences, vertiginosos, inleuiter vagando deficientes, cibos auersantes, decolores? Neque in febre fractos, si soporosi fuerint. Perniciosum enim est. Oris ventriculi dolor, cum præcordio distento, & capitis dolor, malignum, & quidpiam anhelosum. Num hi repente moriuntur? velut in Dysode. Hic etiam urinae vehementer fermentatae, erant valde rubicundae. Colli dolor malum quidem in omni febre, pessimum autem his quibus timor est ut insaniant. Febres soporosa, lassatoria, caliginosa, vigilias inducentes, exudantes, malignae. Horrores frequentes ex dorso, celeriter translabentes, molesti, urinae interceptionem dolorosam significant. Qui anxie se iactantes, citra vomitum exacerbantur, male habent. Perfrigeratio cum duricia signum malum. A ventre tenuia non sentienti prodire, ei qui est apud seipsum, perniciosum: velut Hepatico.

Vomitiones exiguae biliosae malae, tum alias, tum si insuper vigilauerint ægri. Nasus in his destillans, perniciosum est. Quibus ex parte alba detinentur cum febre, surditasque adest, & in latere dolor acutus, hæc perniciose mente mouentur. In febribus ardentibus subperfrigerantibus, egestionibusque alui biliosis aquosis frequentibus, oculorum distortio signum malum est, tum alias, tum si stupore prehensi detineantur. Siderationes repentinæ ei qui exolute ac diutine insuper febriit, perniciosae sunt: quale quiddam passus est Numenij

- A** Numenij filius. Ex lumborum dolore ad os ventriculi re- *Numenij*
 cursiones, febriculosa, horrida, reuoluentes aquosa tenuia,
 multa, mente mota, voce destituta, nigrorum vomitu facto
 moriuntur. Oculi contractio in morbo acuto, mala. Nū *Oculi con-*
 anxia se iactantibus citra vomitum, lumbos dolentibus, si fe *tractio.*
 rociter mente moti fuerint, spes est ut nigra per aluum pro-
 deant? Fauces dolorosa, graciles, cum ægre tolerabili mo- *Dolor fau-*
 lestia, strangulatorie, perniciose acutæ. Quibus spiritus re- *cium.*
 trahitur, vox autem strangulatoria est, & vertebra intro con-
 sider, his in fine velut contrahente quodam spiritus fit. Ca- *Capitis do-*
 put dolentes, & stupore detenti delirantes, alio intercepta, *lor.*
 oculum ferocem præ se ferentes, florescentes, opisthotono
 posteriorum partium conuulsoria distentione corripiuntur.
- B** In oculorum distortionem, febriculoso, lassato, rigor perni- *Oculorum*
 ciosus. Et soporosi in his, malum. In febribus ad præcordiū *distortio.*
 dolores, sine voce, si sudore non soluantur, maligni sunt. His *Præcordia-*
 dolores ad coxas, vna cum febre ardente, & si alius acerua- *rū dolor.*
 tim eruperit, perniciosum. Quibus voces cum febribus de-
 ficientes post iudicationem, hi tremantes ac soporosi mori-
 untur. Quibus affectiones ardentes, fatuitatem inducen-
 tes, stuporis detentionem inferentes, præcordia variantia,
 & ventris tumor, cibis interceptis, in sudoribus: Num his
 turbidus spiritus, & genitura simile quid superueniens, sin-
 gultum indicat? Sed & alius spumosa, biliosa, insuper ege-
 rit? Splendidum in his mictum prodest. Venter autem his
 insuper turbatur. Quibus sopor sit spumosis prodeunti-
 bus, his febris exacerbatur acuta.
- C** Ex capitis dolore vocis *Manus tre-*
 interceptiones si sint, cum sudoribus febriculosi laxantur in *mulae.*
 seipsos, fiuntque morbi reuertentes diutius durantes, His
 insuper rigere, non malum est. Manus tremula, caput do-
 lentes, collum dolentes, subfurdi, mingentes nigra den-
 sata: quibus hæc sunt, his nigra ventura esse expectare o-
 portet, perniciosum. Vocis interceptiones cum exolutio-
 ne, stupore detinente, perniciose. Lateris dolor, ex spu- *Lateris*
 tis biliosis, citra rationem si euauerit, mente mouentur. *dolor.*
 Ex colli dolore, soporoso, sudanti, alius inflata, si sa-
 nè ad necessitatem liquida demiserit, infuso immisso sub-
 luta: ex his ea quæ biliosa non sunt supprimuntur. Talia *Cervicis*
 vero si seruentur retenta, longius ægrotat. Num ita- *dolor cum*
 que pro- *sudore.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

que proluuia quæ biliosa non sunt, meliora sunt? & statuo-
fo tumori profuerint? Alui circumtensio, ad necessita-
tem liquida demittens, cito intumescens, habet quid con-
uulforium, velut etiam Aspasij filio. Superrigere his pern-
ciosum. Ex his conulsus factus ac inflatus, vbi diutius agro-
tasset, ori putrefactio viridis superuenit. Quibus circa lū-
bos tenues diuturni dolores, ad præcordium se reuoluentes,
& ciborum fastidium inducētes vnà cum febre; his ad caput
dolor intentus progressus, repente conuulforio modo occi-
dit. Affectiones insuper rigentes, & quæ ad noctem ali-
quanto magis exacerbantur, cum vigiliis, & delirio in som-
nis, aliquando vrinas inuoluntarie emittentes, in conuulsio-
nes soporosas desinunt. A principio exudantes vrinis cō-
coctis, ardentes qui citra iudicationem perfrigerantur, bre-
ui circum circa ardentes: Torpidi item, soporosi, conuulsi,
perniciose affecti sunt. Vterum gerētibus capitis dolores,
soporosi, cum grauitate fientes, mali sunt. Fortassis autem his
etiam conuulforium quid pati contingit. In faucibus gra-
cilibus dolores strangulatorij, habent quid conuulforium,
tum aliàs, tū à capite oborti, Velut etiam Thrasynontis con-
sobrinæ. Tremores cōuulforij fientes in sudoribus, reuer-
ti solent. Iudicatio his fit vbi superriguerint. Superrigent hi
ardore circa ventrem prouocati. Lumborum dolor, & ca-
pitis dolor, & oris ventriculi dolor, cum excreatione violē-
ta, conuulforium quid habet. A ventre subliuida, turbulē-
ta: & lotia tenuia ac aquosa, suspecta. Fauces exasperatæ
parum, & venter murmurans inanibus ad egerendum surre-
ctionibus, & frontis dolores, & palpantes, delassati, in fragu-
lis ac vestimentis dolorosi. Quæ ex his augentur, difficilia
sunt. Somnus multus in his conuulforius, & dolores in frō-
tem graues, & mictio difficilis. Vrinæ suppressio quibus
rigores, & in conuulforiis affectionibus: velut & ipsa vbi in-
horruit, sudauit. Meracæ desinentes purgationes, omni-
bus quidem exacerbatoriæ sunt. His vero etiam valde. Ex ta-
libus etiam circa aurem abscessus exurgunt. Turbulentæ
ferocissimæ è somno excitationes, cōuulforiæ sunt tum aliàs,
tum cum sudore. Et colli, & dorsi perfrigerationes appa-
rentes, sed & per totū corpus: In his etiam spumosa mictio-
nes, vnà cum animi deliquio, & oculorum obscuratio, cōuul-
sionem

A fionem prope adesse significant. Cubiti ac colli dolores conuulsorij. A facie autem hi. In faucibus sonitus frequentes, cum saluæ sputatione. In his in somnis sudores, boni. Nū & sudore leuari, plurimis non malum est? Dolores ad infernas partes, his toleratu faciles. In febribus exudantes caput dolentes, aluo intercepta, conuulsi fiunt. Subfriabiles liquidæ alui egestionēs, perfrigerantes nō sine febre, malæ sunt. Rigores ex his vesicam & ventrem occupantes, dolorosi. Proinde soporē his habere aliquid conuulsorij, non sanē mirum apud me fuerit. Quæ in acutis vomitorio modo trahūtur, mala sunt. Et albæ alui egestionēs, difficiiles. Non viscosa ex his progressa, cum multo ardore ad mentis emotionem perueniunt. Num ex his soporosi torpidi fiunt? Morbi ex talibus diutius durant. Num circa iudicationem hi arescentes difficulter spirantes? Quæ ex lumbis ad colulum ac caput progressa sunt, & leuis syderationis modo resoluerunt, conuulsoria fiunt & mentē emouētia. Num & soluantur talia conuulsione? Ex talibus varie agrotant, & per eadem progressi. Conuulsiones in his quæ ab vtero strangulantur sine febre, faciles sunt, velut etiam Dorcadi. Vesica intercepta tum aliàs, tum cū capitis dolore, habet quid conuulsorium. Quæ in his cum torpore exoluuntur, difficilia sunt, non tamen perniciofa. Num id quod tale est, etiam mentem emouet? Num & ossium circa tempora dissectiones, conuulsionem accersunt? aut si quis ebruius verberetur, C aut sanguis multus effluat in principiis, num hoc facit conuulsionem? In sudore sputa defluentia febricitanti, leuia sunt. Num ad dies aliquot alui humectantur? arbitror. Num his ad articulos abscessus fiet? Quæ modice ferociter mentem emouent, atrabiliaria sunt. Si vero à muliebrium purgationum retentione fuerint, ferina. Hæc vero sæpius accidunt. Num & conuulsæ fiunt hæ? Num & vocis interceptiones cū sopore, conuulsoriæ sunt? velut coriarij stitæ, quæ muliebris purgationibus præsentibus affici cœpit. Quibus conuulsis oculi intente relucēt, neque apud seipsos sunt, & diutius agrotant. Sanguinis eruptiones ex contrario, malæ sunt: velut in splene magno si ex dextra nare fluat. Et circa præcordia eodem modo res se habet. Verū cum sudore hoc peius est. Ex naribus erumpente sanguine, cum exiguis sudoribus,

HIPPOCRATIS LIBER I.

doribus, perfrigescentia maligna ac praua. Post sanguinis eruptionem, nigrorum per aluū trāitus, malus. Praua sunt etiam valde rubra. Num vero quarto die hæc sanguinis eruptio contingit? Soporosi ex his conuulsione moriuntur. Num nigris prægressis, & ventre tumefacto? Vulnere sanguinem fundentia, exudantia, maligna. Sic affecti loquentes latenter moriuntur. Post modicam sanguinis eruptionem, & nigrorum egestionem, in acutis surditas malum.

Sanguinis egestio in his pernicioſa. Verum surditatem soluit. Lumbis dolentibus oris ventriculi dolores accedentes, signa hæmorrhoidum fluxionis futura sunt. Arbitror autem & hos prægressæ hæmorrhoidum eruptionis signum esse. Sanguinis eruptiones statim temporibus fientes, siticulosæ, difficiles ac exoluentes, si sanguinem non effuderint, in comitiales morbum finiunt. Morbi qui statim turbulentis sunt, infomnes, sanguinem de naribus stillantes, sexta die alluati, noctu afflixi erunt, postridie exudarunt, in somnumque delati mentem emouerunt, hi large sanguinem fundent. Num & aquosa vrina tale quid significat? Quibus sanguinis eruptiones plures, his temporis progressu alui male afficiuntur, si non vrinæ concoctæ fuerint. In indicatoriis perfrigerationibus, sanguinis eruptiones fortes pessimæ sunt. Capite grauati, iuxta finciput dolentes, infomnes, sanguinem profundunt, tum alias, tum si quid ad collum contendat. Vigiliis infestati, derepente cum inquietatione, sanguinem fundunt, tum alias, tum si quid antea perfluxerit. Num ubi inhorruerunt? Colli dolores, oculi valde rubicundi, sanguinis eruptionem significant. Quibus aluo suppressa sanguinis eruptio fit, & insuper rigent, Num aluus intestinorum leuitate corripitur, & obdura fit, aut ascarides insunt, aut vtrunque? Quibus ex lumbis recursus fit ad caput, & manus, hi stupidi, os ventriculi dolentes, saniosis ac serosis humoribus pleni, large sanguinem profundunt. Sed & aluus his turbulentis erumpit. Quibus ex sanguinis eruptione larga ac frequenti, nigrorum multorum fit egestio, hi suppressa aluo dolorosi sanguinem profundunt. Cum quadam vero fluxione, facile ferunt. Num hi multos frigidos sudores excludunt? Conturbata in his vrina non mala, neque id quod genituræ simile in ipsa residet. Verum frequenter

A quenter hi aquosa mingunt. Quibus in surditate & torpore parua est à naribus destillatio, ea habet quid difficultatis. Vomitus his cōfert, & alui perturbatio. Quibus ex rigore febres cum lassitudine, his menses muliebres decurrunt. At collum in his dolorosum, sanguinis eruptionis è naribus signum est. Et per nāres sanguinē effundere spes est, ea quæ caput concutiunt: Et quæ aurium sonitum faciunt, sanguinem profundunt, aut menses deducunt, tum aliās, tum si iuxta spinam ardor consequetur. Fortassis autem & dysenteriam facient. Et circa ventrem palpitationes cum præcordij intensione sublonga ac tumente, sanguinis eruptionem significant. Inhorrescunt autem hi. Quæ larga, violenta, multa ex naribus fluxerint, aliquando ad conuulsiones adducunt. Venæ sectio soluit. Freq̃uentes & paulatim sientes ad egerendum surrectiones, sufflaux, viscosæ, modica stercorea habentes, cum præcordij ac lateris dolore, morbo regio participāt. Num autem his suppressis hi exoluantur? arbitror sanē: & sanguinem profundunt? His tensio lumborum, & dolores in his, sanguinis eruptionem significant. Præcordij tensio, cum capitis grauitate ac surditate, & quæ ad hæc consequenter diuexant, sanguinis eruptionem indicāt.

Vndecimo die sanguinis stillicidia difficilia, tum aliās, tum si superstillauerint. Qui in horroribus simul iudicatorie exudarunt, postridie vero postquam inhorruerunt præter rationem vigilant, eos sanguinem effusuros esse arbitror.

C Quibus ab initio largæ sanguinis eruptiones, rigor fluxionē sistit. Ex sanguinis eruptione, rigores longi. Quibus capitis dolores, ac colli dolores, & totius corporis impotentia quædā, sanguinis eruptiones soluūt. Sed è tempore sic soluuntur. Vrinæ quæ in his qui iuxta aures abscessus habent, cito & modicè concoquuntur; malæ sunt. Et perfrigerari hoc modo malum est. Subsoporati, morbo regio affecti, non valde sentientes, quibus singultus, his alius erumpit, fortassis & suppressa est. Hi exoluantur. Num his etiam abscessus iuxta aures fiunt? Suppressæ cum rigore urinx malæ, tum aliās, tum si antea sopor apprehenderit. Num iuxta aures abscessus parotides dictos, in his fore spes est? Ex tormentoso subsidentia limosa subliuida mala est. Num ex præcordiis dolet puro dexterum? & exoluitur? Num abscessus iuxta

HIPPOCRATIS LIBER I.

iuxta aures talibus parum dolorosi? Alius erumpens his in omnib⁹ pernicioſa eſt. In anxioſis quibuſdā vigiliis abſceſſus circa aures maxime. Ex voluulis graueſcentibus, in febre acuta, præcordiis ſublimib⁹ diutius permanētibus, abſceſſus circa aures oborti occidūt. Ex ſurditate leniter abſceſſus circa aures fiunt, tū aliàs, tum ſi anxioſum quippiā ſuccedat, & ſoporofis inter hos adhuc magis. Abſceſſus iuxta aures leuiter ſyderatis mali ſunt. Quæ cōuulſorio modo exacerbātur, cū ſtuporis detētionē, abſceſſus iuxta aures producunt. Cōuulſio, tremor, anxietas, cum ſtuporis detētionē, paruos circa aures abſceſſus exacerbant. Num quibus abſceſſus ſunt iuxta aures, capitis dolore affecti ſunt? Num & ſu pernis partib⁹ exudāt, num inſuper rigent quoq; aliquo modo? Deinde & alius erūpit, & ſoporofum quippiam habent? Num & aquoſæ vrinæ alba innatantia habētes, & quæ varie exalbidæ ſunt, ac foetidæ, abſceſſus iuxta aures faciunt? Num quib⁹ tales vrinæ, frequētes ſanguinis ē narib⁹, ſtillæ pſuūt? num & lingua his leuis eſt? Quib⁹ magnū & frequentem ſpiritū habentib⁹, morbus regius, & febres acutæ cū præcordiis duris perfrigeratæ ſunt, num his abſceſſus magni ad aures cōſiſtunt? Soporofa, anxioſa, præcordia dolentia, vomitoria parua ſymptomata. In his abſceſſus iuxta aures oboriūtur. Antea vero & ea quæ circa faciem fiūt. Alio nigra ſtercoracea egerēte, ſopor inſuper apparēs, abſceſſū iuxta aures pducit. Tuſſicula quæ ſunt cū ſputatiōe abſceſſum circa aurē ſubmouent. In capitis dolore ſopor & ſurditas, circa aurē abſceſſum aliquē eructat. Præcordij diſtētio cū ſopore anxioſo, ac capitis dolore, abſceſſus circa aurē attollit. Doloroſi auriū abſceſſus, citra iudicationem diſſipati, mali ſunt.

Tuſſicula
auris ab-
ſceſſus
mollit.

HIPPOCRATIS COI

P R A E D I C T I O N V M

liber II. Iano Cornario

medico phyſico in-

terprete.

Medicorum



Edicorum prædictiones narrantur multæ, & variæ, & admirandæ, quales ego quidem neque ipse prædixi, neque alium aliquem prædicere audiui. Sunt autem aliquæ ex ipsis huiusmodi. Hominem perniciose affectū esse, & medico ipsum curanti, & aliis videri. Verum medicum alterum superuenisse ac dixisse, Nō peribit hic homo, verum

*Prædictio-
nes has
derideto*

cacus euadet. Item ad alium qui omnino male habere videbatur, ingressum prædixisse, hominem quidem euasurum esse, verum manum claudam habiturum. & ad alium quendam qui similiter superstes fore nō putabatur, dixisse, ipsum quidem sanum fore, verū pedum digitos nigrefactos putrefactione corrumpendos esse. Et aliæ huiusmodi prædictiones in tali prædictionis specie dicuntur. Alius autem prædictionis modus est, ementibus ac negotiationes tractantibus prædicere, aliis mortem, aliis insaniam, aliis alios morbos: & ad hæc omnia, etiam ea quæ prioribus temporibus facta sunt prædicere, ac omnia vera narrare. Alia porro adhuc forma prædictionum est, athletas & eos qui morborum causa exercentur ac se fatigant cognoscere, si quid aut circa cibum deliquerint, aut alteratum quippiam ederint, aut potu vberiore vñ fuerint, aut deambulationem intermiserint, aut res venereas quasdam exercuerint. Horum omnium nihil illos latet, adeo vt etiam minima quæque, in quibus non paruerit homo, exacte cognoscant. Hi omnes prædictionum modi esse feruntur. Ego vero talia quidem non vaticinabor, Verum signa scribam, ex quibus & sanos futuros homines, & morituros cōiectare oportet: & tum breui tempore, tum longiore, sanos futuros, aut perituros. Scriptum est autem à me & de abscessibus, quomodo singulos considerare conueniat. Arbitror autem & eos qui de claudicationibus prædixerunt, aliisque eiusmodi, confirmato iam morbo prædixisse, & quū iam manifestum esset, quod abscessus non esset recursurus, si modo intelligentiam habuerunt: multo sanè magis quàm priusquam abscessus fieri inciperet. Spero item & alia prædixisse, magis humano more quàm refertur, quæ videlicet

*Quid præ-
dicendum
est.*

Gg emen-

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Per hæc
exempla
hæc confir-
mat.*

*Prædictio
de mari-
scis.*

*Parcius
prædictio.*

ementibus & negociationes tractantibus prædixisse dicuntur, mortes, & morbos, & insanias. Atque hæc mihi videntur talia facta esse, & nulla mihi videtur esse difficultas prædicendi, si quis circa talia studium ac curam adhibere velit. Primum etenim aqua inter cutem laborantes, & tabidos, quis non cognouerit? Deinde deliraturi non diu latere possunt, si quis nouerit quibus his morbus cognatus est, aut prius aliquando insaniuerunt. Si enim hi homines ebriosi fuerint, aut carnes vorauerint, aut vigilauerint, aut in frigore aut calore inconsiderate versati fuerint, multus timor est ex tali victus ratione, ipsos deliraturos esse. Et eos qui hæmorrhoidas habent, si quis hyeme multo potu uti viderit, & bono colore præditos, de his prædicere licet, quod ad ver multa spes sit sanguinis eruptionis, ut & decolores & aquatici sub æstatem fiant. Verum omnia hæc addiscere ac prædicere oportet, si quis in talibus studiis palmam ferre expetat. Licet enim ex scriptis prædicere, & mortem, & insaniam, & bonam habitudinem. Possem autem referre & alia multa huiusmodi, sed quæ facilima cognita sunt visam est mihi scribere. Consulo autem ut quam prudentissime agant, tum in reliqua arte, tum in huiusmodi prædictionibus, illius probe memores, quod si cui successerit prædictio, is apud ægrotum intelligentia præditum in admiratione fuerit. Si vero quis aberrarit, supra hoc quod odio habetur, fortasse etiam insanire videbitur. Quapropter iubeo, ut tum alias omnes, tum has prædictiones prudenter faciant: quanquam sanè & audiam, & videam, neque iudicare recte homines ea quæ dicuntur ac fiunt in arte, neque narrare. Cæterum de his qui exercentur ac laboribus se fatigant, eas asseuerationes quas afferunt hi qui ipsas afferunt, neque esse puto, neque si quis putat prohibeo. A nullo enim signo, neque bono, neque malo, læduntur suspensiones, cui signo fide habita quis sciat, an recte pronunciatum sit, aut seculus: alioqui per me licet ut si quis velit credat. Non enim ego impedimento sum. Arbitror autem si quid veri ab ipsis dicitur, aut his qui de his qui exercentur asseuerant, aut illis qui prius scripti sunt: primum quidem hunc qui cognouit, ex signis coniecisse. Deinde vero ambigue & humano more prædixisse. & simul eos qui id narrant monstrosius quam

- A quàm factum fuit recensere. Nam neque in morbis facile est peccata cognoscere, etiam si decumbant homines, & victu parum nutriente vtantur, vt non adeo multa intueri opus sit eum qui hæc considerandi curam suscepit. Alij enim bibunt solum. Alij ad hoc quod bibunt, aut sorbitionem, aut cibum paucissimum assumunt. Neceffe igitur est eos qui vberiore potu vsi sunt, magis difficulter spirare, & plus vrinæ eiicere. Eos vero qui sorbitionem aut cibum auxerunt, magis & fitire, & febrire. Si vero quis vtrisque, & potu & cibo, immodice vsus fuerit, ad hoc quod febrit, & difficulter spirat, etiam ventrem circumtentum & maiorem habebit. Licet porro & hæc, & alia omnia experimentis optime explorare, quæ & habemus, & omnibus recte vtimur. Primum equidem & intelligentia, & oculis cognoscere facile est, hominem in eodem loco decumbentem, & exacta victus ratione vtentem, si non paruerit, aut obambulando, aut multa edendo. Deinde qui manibus contrectauit ventrem ac venas, minus falli potest, quàm qui non contrectauit. Et nares in febrientibus quidem, & multa & bene significant. Odores enim multum inter se differunt. At vero in sanis & recto victu vtentibus, haud scio qua re vel in hoc experimento faciendo vti possim. Postea audiendo, vocem & spiritum auribus cognoscere datur, quæ in sanis non similiter sunt manifesta, sed qualiter etiam antea. Quod si etiam mores morborum ac agrotorum didicerit medicus, non tamen quicquam prædicere oportet. Non enim difficiliter spirabit homo, morbo adhuc errante, & febriet acutiore febre, & venter intentus fuerit. Quare propter hæc non tutum est prædicere priusquam statum accipiat morbus. Verum post hoc tempus, quicquid præter rationem acciderit, dicere oportet. Manifesta vero sunt mala, quæ propter ægri inobedientiam fiunt. Nam & spirandi difficultates, & alia huiusmodi postridie sedabuntur, si ob peccatum fiant. Si igitur quis hanc iudicationem considerans dixerit, non delinquet. Atque ego quidem hunc considerandi modum nunc consulo, tum de his qui domi manent, tum de his qui exercentur, itemque de aliis omnibus, qualia peccata committant. At exactam illam narrantes rationem & audio, & derideo. Quum enim parum inobedientes fuerint homines, haud scio quo

*Diuersitas
languetis*

*Varia ob-
seruatio*

*Quando nō
prædicen-
dum.*

*Mod⁹ ob-
seruationis
qui.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Que præ
cæteris
obseruen-
tur.*

modo id deprehendere possim. Si vero maiora fuerint peccata, quem in modum cōsiderare oporteat scribam. Oportet autem primum hominem, in quo quis per inobediētiā admīssa cognoscere volet, per totum diem intueri, & in eodem loco, & eadem hora, sōle præsertim recens orto. hoc enim tempore subeuacuatus fuerit, & adhuc ieiunus est, & nullo labore fatigatus est, præterquam niatutinis deambulationibus, in quibus minime inobediens est, si sanè ubi de somno surrexit homo, ad deambulandum prodierit. Quare necesse est eum qui iusta victus ratione utitur, hac hora maxime æqualiter habere, & coloris, & totius corporis constitutionem. Quapropter & is qui huius cōsiderationis curam gerit, acutissimus fuerit & mente, & oculis, eo tempore.

Contemplantur præterea oportet hominis mentem, & mores, & corporis vires. Alij enim alia facilius aut difficilius imperata faciunt. Primum igitur is cui inedia imperata est, si plura comederit & biberit, per hæc manifestus fiet. & tumidius corpus ipsius apparebit, & plenius ac coloratius erit, si non excremēta alui male ipsi processerint. Erit item animosior ad ferendum laborem. Considerandum etiam an ructum edat, aut à flatibus vrgeatur. Hæc enim fieri solent his qui ita affecti sunt, propter hoc peccatum. Si vero dum edere multa cogitur, & fortiter laborare, aut cibum imperatū non ederit, aut ebrius factus fuerit, aut à cœna larga nō obambulauerit, hoc modo explorare oportet. Si quidem cœnā non ederit, solito autem more deambulauerit, iucundiores aspectum præ se feret, & vegetior ac operosior in exercitiis erit. Verum alui egestio modica & compacta maxime in hoc fuerit. Si vero cœna sumpta non deambulauerit, ructū utiq; edet, & flatuosus fuerit, & plenitudo nō minor apparebit, & inter laborandum magis quàm antea sudabit, & difficulter spirabit, ac grauis erit. & transitus alui maiores, ac minus viscosi his fuerint. Quod si neq; cibū cōsumperit, neq; deambulauerit, pigrior utiq; fuerit ac tumidior. Si vero ebrius factus fuerit, sudabit magis q̃ antea, & difficulter spirabit, & ipse se seipso grauior erit ac humidior. Sed & lætior erit, si nō caput ipsi affligatur. Quod si vxore semel vsus fuerit, vegetior utique erit, & magis solutus. Si vero sæpius rem peregerit, durior euadet, & squallorem quendam habebit, & decolora-
tior ac

*Coitus qđ
his faciat.*

A tior ac magis lassatus erit. Porro egestionis alui procedere oportet his qui laboribus exercentur, quandiu parum e-
derint, ac parum potauerint, modicas & duras, atque hoc
quotidie. Si vero tertio quoque die, aut quarto, aut ex lon-
giore interuallo prodierint, periculum est aut febris, aut alui
profluuium corripiendos esse. Quæcunque vero egestionis li-
quidiores sunt, quàm vt in transitu conformentur, hæ sanè
omnes peiores sunt. At vero his qui multum edunt, & mul-
tum laborant, egestionis transitum mollem, oportet esse sic-
cum, & copiam ciborum ingestorum pro ratione laboris. Pro-
cedunt autem ab æquali ciborum copia, his quidem qui mi-
nimum laborant, plurimæ egestionis. his vero qui plurimum
laborant, modicæ, si sani fuerint, & iusta victus ratione vtan-
tur. Nam ad hæc coniecturam facere oportet. Liquidio-
res autem egestionis, & sine febribus nentes, & quæ septima
die, aut citius iudicantur, commodæ sunt si semel vna vice
omnes fiant, & non reuertantur. Si vero insuper febrerint
homines, aut alui profluvia redierint, si longa fuerint, peni-
tus mala sunt, siue biliosa fuerint, siue pituitosa, siue cruda:
& victus ratione propria, singula opus habent, itemque me-
dicamentis alia aliis. Cæterum vrinam iuxta potionis co-
piam mingere oportet, & semper æqualem, & quam maxime
aceruatim, & momento paulo crassiores, quàm id quod in
potu acceptum fuit. Si vero fuerit aquosa, & copiosior quàm
pro eo quod bibi imperatū est, significat hominem non obe-
dire, sed copiosiore potu uti: Aut non posse renutriri, quàm
diu talia vrinam faciunt. Si vero paulatim stridat vrina, aut
medicamentis hominem opus habere significat, aut morbum
aliquem circa vesicam habere. At sanguinem mingere, ra-
ro quidem & sine febre ac dolore, nihil mali significat, sed las-
situdinum solutio fit. Si vero sæpius mingat, & aliquid ex his
accefferit, malum est. Verum prædicere oportet, siue cum do-
lore mingatur, siue cum febre, fore vt insuper pus mingat, at-
que ita dolores ac afflictiones quiescant. Crassa vero vrina
albam subsidentiam habens, aut circa articulos dolorem ali-
quem, aut tumorem significat. Aliæ vero omnes subsidentia
in vrinis eorum qui exercentur, à morbis circa vesicam sunt,
id quod ipsi manifestum facient. Cum doloribus enim erunt,
& tales vt difficulter quis ab ipsis liberari possit. Atque hæc
Gg. iij quidem

*Oletū qua-
le oīm esse
debeat.*

*Lotium
quale.*

*Sanguinis
minctio.*

*Puris min-
ctio.*

*Crassum
lotium.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

Hydropi-
sis.

Phthisis.

Podagra.

Morbus
sacer.

Qui Hy-
dropes sa-
nantur.

quidem de his scribo, & huiusmodi alia dico. Ceterum ex his qui exactam ac certam prædictionum rationem prædicant, cum aliquibus ipse conuersatus sum, cum aliquorum vero filiis ac discipulis rem contuli, quorundam vero scripta accepi. Quare quum probe sciam qualiter quisque ipsorum sentiat, & exactas certitudines nunquam compererim, hæc scribere aggressus sum. At vero de aqua inter cutem, & tabidis, & podagris, & his qui à morbo sacro appellato corripuntur hæc dico, ex aliqua quidem parte de omnibus idè. Nam qui hos morbos congenitos habet, is ægre ab ipsis liberari potest. Reliqua vero singularim scribam de singulis. Eum qui ab hydrope, siue aqua inter cutem correptus est, & superstes esse volet, bonis visceribus præditum esse oportet, ita vt natura se exerat, simulque facile concoquat, & bene spiraret, sitque sine dolore, & totum corpus aequaliter tepidum habeat, & non circa extremas partes colliquatum. Melius est autem vt tumores potius habeat in extremis partibus. Optimum vero est neutrum horum habere. Nam molles ac faciles esse conuenit extremas partes, itemque ventrem ad contactum mollem. Tussim vero adesse non oportet, neque sitim, neque linguam resiccare, tum reliquo tempore, tum post somnos, quando hæc valde fieri solent. At cibos libenter accipere oportet, & vbi multum satis comedit, non affligi. Alium vero ad medicamenta quidem celerem habere, reliquo autem tempore egerere recrementum molle efformatum. Vrinam autem apparere conuenit, pro studiorum ratione, & vinorum mutatione transeunt. Laborem vero ferre oportet facile, & lassitudinis exortem esse. Ac optimum quidè est hominem ita per omnia dispositum esse, & sic securissime sanus fieri poterit. Sin minus, plurima ex his habeat. Nam spes erit vt superstes euadat. Qui vero nihil horum habuerit, sed contraria, eum desperatum esse scito. Qui autem pauca horum habuerit, quæ bona esse dixi, si hydrope laboranti adsint, huic exigua spes restant. Cui vero multum sanguinis sursum ac deorsum eruperit, & febris insuper accesserit, eum multa aqua repletum iri timor est, atque hic hydrops breuissimi temporis est, & ex quo paucissimi euadunt. Verum de hoc alteri prius significare oportet. At quibus magni tumores facti emarcescunt ac rursus attolluntur, hi magis conualescunt, quam illi

- A** quàm illi qui ex sanguinis eruptione implètur. Verum fallunt hi hydropes ipsos egrotos, faciuntque ut ipsi à medicis discedant ac pereant. De tabescentibus quod ad sputum ac tussim attinet, eadè dico quæ de pectore suppuratis scripsi. *Phthisicorum bona signa*
- Oportet enim eum qui probe liberari volet, facile sputum per tussim reiicere, & id esse album, & æquale, & eiusdem coloris, & ab inflammatione alienum. Quod verò à capite defluit ad nares conuertri. febrè autem non inuadere, ut ne à cœnis prohibeatur, neque sitiatur. Venter autem egerat quotidie, & id quod egerit sit durum, copia pro ratione ciborum ingestorum. Hominem verò quàm minime tenuem esse oportet. Pectus autem laudare conuenit quadrangulum & hirsutum. &
- B** os ipsius paruum sit, & robuste carnosum. Quicunque enim hæc omnia habuerit, maxime superstes erit. Qui vero nihil horum habet, interitui proximus. Quicunque verò pectore suppurati facti fuerint, dum iuuenes sunt, ex humorum illapsu, aut fistula, aut alio quopiam huiusmodi, aut ex abscessus recursu, hi non euadunt, nisi valde multa bona signa ipsis accesserint. *Quo tempore hi pereunt.*
- Pereunt autem homines hi ad autumnum. Sed & ex aliis morbis longis plerique ad hoc tempus maxime moriuntur. Cæterum ex aliis minime superstites manent & virgines, & mulieres quibus ex suppressis mensibus tabes oborta est. Si vero aliqua virgo, aut mulier euasura est, & aliorum signorum bonorum multa accedere oportet, & menses splendide ac pure apparere, aut nulla spes est. *Phthisis mulierum. Suppuratis*
- C** Qui verò ex sanguinis eruptione, pectore suppurati sunt, & viri, & mulieres, & virgines, non minus euadunt. Verum signis omnibus tum spuratorum, tum tabescentium collectis, & superstitem futurum, & periturum prædicere oportet. Maxime vero euadunt ex sanguinis eruptione, hi quibus dolores sunt atrabiliarij, & in dorso, & in pectore: & qui post eruptionem minus dolent. Nam & tussis non valde insuper accedunt, & febres plerumque perseverant, sitim facile ferètes. At reuersiones eruptionis sanguinis maxime fiunt his, si non abscessus succedat. Optimi vero sunt abscessus sanguinolentissimi. *Qui abscessus meliores.*
- Quibus autem in pectoris dolores insunt, & per tempus attenuantur, & tussunt, ac difficulter spirant, neque febribus insuper corripientibus, neque suppurationibus succedentibus, eos interrogare oportet, quum tussiant, & difficulter spirent, an & compa-

HIPPOCRATIS LIBER II.

Podagra. Cum quiddam & modicum odorem habens tussiendo reiici-
ant. De podagricis hæc dico. Quicunque aut senes sunt, aut
circa articulos callos tofaceos concretos habent, aut ærum
nose viuunt, ac siccam aluum habent: hi omnes sani fieri non
possunt humana arte, quantum ego noui. Sanant quidem hos
optimæ dysenterix si successerint. Sed & aliæ eliquationes
valde profunt, quæ ad inferos locos repunt. Qui vero iu-
uenis est, & circa articulos nōdum tofaceos callos concretos
habet, & accurate viuit, & laboris amans est, & aluum bonam
habet ad obediendū pro studiorū ratione, hic sanè medicum
intelligentiam habentem nactus, sanus fieri poterit. Ex his
porrò qui à sacro morbo corripiuntur, difficillime quidem li-
berantur hi quibus à puero contigit morbus, & simul ad vi-
rilem ætatem peruenit. Deinde hi quibus corpore in vigo-
re ætatis constituto factus est, & fuerit à viginti quinque an-
nis, vsque ad annum quadragesimum quintum. Post hos au-
tem, quibus factus fuerit morbus, nullam significationē præ-
bens ex qua corporis parte initium sumat. At quibus ex capi-
te initium capere videtur, aut à latere, aut à manu, aut pede
facilius curatur. Verum differunt etiam hæc morbi genera.
Qui enim à capite initium sumūt, ex his grauissimi sunt. De-
inde qui à latere. Qui verò à manibus ac pedibus, maxime sa-
nari possunt. Cæterum horum curam aggredi oportet medi-
cum, qui medendi modum nouit, si homines fuerint iuuenes,
& laboris amantes, nisi mens mali aliquid habuerit, aut quis
stupore attonito sideratus fuerit. Nam hæc atrabiliarix men-
tis emotiones non sunt conducibiles. Alij vero qui ad infer-
nas partes conuertuntur abscessus, boni sunt. Longe vero o-
ptimi & hic sunt, qui sunt sanguinolentissimi. Quicunque ve-
ro senes apprehēdi incipiunt, maxime moriūtur. Et si non pe-
reant, statim celerrimèque per se liberantur, à medicis autem
minime opem ferunt. At quibus pueris oculi repente dis-
torti fuerunt, aut maius quoddam malum perpeffi sunt, aut
tubercula sub ceruicem oborta sunt, aut vocem graciliorem
adepti sunt, aut tusses siccæ diuturnæ adharerent, aut maiori-
bus factis dolor procedit ad ventrem, & non exturbatur, aut
in lateribus distortionēs habent, aut venas crassas circa ven-
trem varicosas, aut omentum descendit, aut testis magnus fa-
ctus est, aut manus tenuis & impotens, aut pes aut tibia tota
clauda

**Sacer mor-
bus.**

**Comitialis
senes toli-
lit ferē.**

- A** clauda facta est, citra aliam causam; his omnib⁹ morbū antea factum fuisse, scire oportet, prae his vniuersis. Et plurimi qui pueros educant, si interrogentur consitebuntur: quosdam vero etiam res latet, negantque se scire quicquam tale factum esse. Qui porro de vlceribus cognoscere volet, quomodo singula finient, eum primum hominum species pericrutarī oportet, tum eas quae meliores sunt ad vlcerā, tum quae deteriores. Deinde aetates nosse, in quibus singula vlcerā curatu difficilia existunt. Locos item in corporibus perspectos habere, quantum alij ab alijs differunt. Sed & alia qualia in singulis accedunt tum bona, tum mala, nosse oportet. Si quis enim omnia haec nouerit, is sanè sciet etiam quomodo singulorum
- B** euentus continget. Qui vero non nouerit haec, non nosse poterit quales fines vlcera erunt. Species equidem bonae sunt haec. Leues, & commoderatae, & bonis visceribus praeditae, & neque valde carnosae, neque durae. Iuxta colorem vero sunt species alba, aut nigra, aut rubes. Haec enim omnes bonae sunt, si purae sunt. Si vero pallidus color ammixtus fuerit, aut color ipse pallidus aut liuidus fuerit, peius est. Species vero quae praescriptis contrariae sunt, eas deteriores esse scito. At vero quod ad aetates attinet, tubercula quidem suppurata sunt, & strumosa haec plurimos pueros occupant, & facillime ex ipsis liberantur. Senioribus vero pueris & adolescētib⁹, minus quidē oriūtur, verum difficiliter ab ipsis liberantur. Viris autem talia quidem tubercula non valde fiunt, verum, caria
- C** Graecis dicta, ad modū faui concreta, horreda; & cancri occulti submersi, & ex pustulis nocturnis herpes, donec sexaginta annos transmiserint. Senibus autē nihil talium tuberculorum accedit, verum cancri & occulti, & summas partes occupantes, & comoriuntur. Ceterum ex locis subalares difficiliores curatu sunt, & laterū mollitudines, ac femora. Nam & more in ipsis fiunt, & recidiunt. Ex articulis periculo maxime obnoxij sunt magni digiti, & praesertim pedū. Quibus autem in obliqua linguae parte vlcus sit diuturnū, in his dentes considerare oportet, an quis iuxta illam vlcera partem acutior sit. Vulnere magis lethalia sunt, quae in venas crassas in collo ac inguinibus insiguntur. Deinde quae in cerebrum, & in hepar. Postea quae in intestinum & vesicam. Sunt autem haec omnia perniciose valde, non tamen ita ut nemo ex his euadat,

*Quae ad
vulnera ul
cerāue fas
cienda.*

*Aetate &
locorū dif
ferentia.*

*Quae homi
nū species
& qui co
lores pro
bi.*

Strumae.

Herpes

*Loca sau
cia curatu
difficilia.*

*Vulnera
lethalia
sunt*

HIPPOCRATIS LIBER II.

euadat, velut putatur. Nam & loci qui hæc nomina habent, multum inter se differunt, & iidem modi. Multum etiam differt corporis ipsius hominis structura. Aliquando enim neque febricitat, neque inflammatur sauciatus. Aliquando etiam citra causam febricitat, & aliqua corporis pars omnino inflammatur. At quando is qui vlcus habet delirat, & facile fert vulnus, tunc vulnus aggredi oportet, velut iuxta medicinæ & accedentium rationem, euentum habiturum. Moriuntur enim homines ab omnis generis vulneribus. Multæ enim venæ sunt & tenues, & crassæ, quæ sanguinem fundentes occidunt, si gliscere ac eo ferri ipsas contigerit, quas alia temporis occasione si quis pertundat, corporibus prodesse sentiat. Multa vero vulnera in locis vilibus ac non malis esse, & nulla re grauius videntur, & tamen sic dolore affligit plaga, vt respirare non possit. Alij vero præ vulneris dolore, quod sanè graue nulla re erat, spiritum quidem duxerunt, verum delirarunt, & febrientes mortui sunt. Quicumque enim aut corpus febricitans habent, aut mentem turbatam, talia patiuntur. Sed neque hæc admirari oportet, neque formidare, illud expendendo, quod & animæ & corpora hominum plurimum differunt, & vim maximam habent. Quæcunque igitur vulnera tempus nanciscuntur, aut corpus & mentem huiusmodi, aut ita gliscetem sanguinem, aut magnitudine tanta fuerint, vt homo ad curationem adduci ab eius contemptu non possit, ab his quidem discedere oportet, qualiacunque tandem fuerint, diariis animi deliquis exceptis: alia vero omnia aggredi, quæ recens sunt incussa, quo & febres effugiant homines, & sanguinis eruptiones, & nomas vlcenum proserpentes, hi qui euadent. Exactissime vero & ad plurimum tempus, eorum quæ grauissima sunt custodiam facere oportet. Nam ita

*Quæ vulne
ra curada.*

*Nome
que male
sint.*

*Herpetes
que male
non sint.*

facere iustum est. At vero nome lethalissimæ sunt, quarum putredines profundissimæ & nigerrimæ ac siccissimæ existunt. Præuæ etiam sunt ac periculosæ, quæ nigram saniem remittunt. Albæ vero ac mucosæ putredines, minus quidem occidunt, magis autem reuertuntur, & diuturniores sunt. Herpetes autem minime omnium vlcenum quæ depascendo proserpunt, periculosi sunt, verum maxime, difficulter submoueri possunt, quemadmodum canceri occulti. In omnibus autem talibus febrem superuenire vna die confert, & pus quam albis-

simum

- A** finum ac crassissimum. Cōmodat & corruptio aerui, aut etiā offis, aut etiā amborū, tum in profundis, tum in nigris putredinibus. Nam in corruptionibus pus multum fuit, & putredines soluit. Porro ex capitis vulneribus lethalissima sunt quæ ad cerebrum pertingunt, velut etiam antea scriptum est. *Capitis vuln-
nra.* Grauia sunt & huiusmodi omnia, os nudum magnum, os infarctum, os diffractum. Si vero etiam osculum vlcis paruum fuerit, fissura vero offis aliquandiu permanferit, periculosus est. Hæc autē omnia grauiora sunt, si & iuxta suturā sunt, & ex locis semper periculosiores summi in capite existūt. *Quid in
his peten-
dum.* Cæterū in omnibus memorabilib⁹ vulnerib⁹ interrogare oportet, si adhuc recentes fuerint plagæ, aut etiam iactus fuerint, an conciderit homo, aut an in soporem altiore collapsus sit. Si
- B** enim horum quippiam factum fuerit, ampliore custodia opus habet, nimirum quum cerebrū vulnus tunc perceperit. Si vero non recēs sauciatus fuerit, ad alia signa respicere oportet, ac consilium capere. Optimum quidē igitur est, neque febrire cum qui vicus in capite habet, neque sanguinem insuper ipsi erupisse, neque inflammationem, neque simul vllum aliquem dolorem accessisse. Si vero quid horum apparuerit, securissimum est vt in principio fiat, & modico tēpore permaneat. Cōducit autem in doloribus, etiam inflammationes ex vlcibus accedere. In sanguinis autem eruptionibus, pus in venis apparere. Quæ vero in acutis morbis cōferre febribus scripsi ea etiam in his fieri cōducit, & eadem hic quoq; bona esse assero, cōtraria vero mala. At incipere febrē in capitis
- C** vulnere quarta die aut septima, aut vndecima, valde lethale est. Iudicatur autem plerisque, si quidem quarta vulneris die febris inceperit ad vndecimam. Si vero septima die febris inchoarit, ad decimam quartam, aut decimam septimam. Si vero vndecimo febrire inceperit, ad vigesimam: quemadmodum in febribus descriptum est, quæ absque manifestis causis sunt. Cæterum in principiis febrium, siue delirium accesserit, siue alicuius membri sideratio, periturum hominem sciendū est, si nō omnino aut ex optimis signis aliquod accedat, aut corporis vires adsint. Verū cōsiderabis modum. Nam *Mortis no-
te in his.* homini adhuc spes salutis, sed claudū fieri articulum in quem *Clauda-
sæue quī
membra* incubuit necesse est, etiam si superstes maneat homo. Porro vulnera in articulis, quæ quidem magna sunt, & nequos fiant, coniun-

HIPPOCRATIS LIBER II.

**Vulneris
observa-
tio.**

cōiungentes penitus præsecant, clarum est quod claudos efficiant. Si vero ambiguum fuerit de nervis, quomodo se habeat, si quidem fuerit acutum telum quod rectum vulnus fecit, melius est obliquo. Si vero graue & obtusum fuerit id quod vulnerauit, nihil refert. Sed plagæ profunditatē & alia signa considerare licebit. Sunt autem hæc. Pus si insuper accedat ad articulum, duriores fieri necesse est. Si vero etiam tumores simul permanserint, hunc locum ad multum tempus durum esse necesse est, & quum sanum iam est vlcus, tumorem permanere necessarium est, simulque flecti ac extendi, quæcunque dum articulus incuruus est, curantur. Quibus vero etiam nervus elapsurus esse videtur, securius de claudicatione prædicere licet, tum alias, tum si inferiorum nervorum aliquis fuerit exolutus. Ex his autem cognoscēs nervum qui excidet. Pus album & crassum, multo tempore defluit, doloresque ac inflammationes circa articulum in principiis fiunt. Eadem fiunt etiam si os elabetur. At vero dissectiones in cubiti gibbis, præsertim quæ sunt cum inflammatione, ad supurationem perueniunt, sectionesque ac vitiones.

**Medullæ
tergi affec-
tæ signa.**

Medulla vero spinæ si ægrotarit, siue ex lapsu, siue ex alia aliqua causa, siue sua sponte, homo & cruribus impotens fit, ut neque si tangatur percipiat, & ventre ac vesica, ut circa prima tempora, neque stercus, neque urinam egerat, nisi ad necessitatem. Quum autem vetustior factus fuerit morbus, non virgæ homine, & stercus prodit, & urina. Moritur autem postea, non multo interposito tempore. Quod si vero cuipiam fauces

**Fauces
cruentæ.**

implentur sanguine sæpe singulis diebus ac noctibus, cui neque caput antea doluit, & qui neque tussim habuit, neque vomuit, neque febre correptus fuit, neque dolorem habuit, neque pectoris, nec dorsum, huius consideranda sunt nares, & fauces, an vlcus aliquod habere compareat in hoc loco, aut hirudinem.

Lippitudo.

Oculi porro lippientes optime permutantur, si & lachryma, & sordes, & tumor, simul fieri inceperint. Si vero lachryma fordi fuerit permixta, & non valde calida: Sordes autem alba fuerit & mollis, & tumor levis solutus: Si ita hæc se habuerint, oculus cōglutinabitur ad noctes, ut doloris exors fit, atque hoc modo res minime periculosa fuerit, ac minime diuturna. Si vero lachryma procedit multa & calida, cum paucissima sorde, ac paruo tumore, atque hoc ex altero oculo tantum, tunc

- A** tum, tunc diuturnum valde fit malum, verum non periculum, & doloris exors est hic modus. Et iudicationem in his maxime expectare oportet, primam quidem ad vigesimam diem. Si vero hoc tempus transmittat, ad quadagesimam expectanda est. Si vero neque in his diebus sedetur, in sexaginta iudicatur. Per totum autem tempus hoc, sordem considerare oportet, an in digito misceatur, & alba ac mollis fiat, maxime sub iudicationis tempus. Si enim desinet, hæc faciet. At si utrique oculi hæc perpetiantur, in maiori periculo sunt, ne vlcerentur. Verum iudicatio breuioris temporis erit. Sordes autem siccae valde dolorosae sunt, sed cito iudicantur, si non vulnus acceperit oculus. Si vero tumor magnus fuerit, dolorisque exors & siccus, periculo vacat. Si vero cum dolore fuerit, malus est si siccus sit, & periculum est ne vlceretur oculus ac concreseat. Sed & grauis est tumor, si lachrymam coniunctam habeat, itemque dolorem. Si enim lachryma procedit calida ac salsa, periculum est & pupillam exulcerari, & palpebras. Si vero tumor confederit, sed lachryma multa multo tempore effundatur, & sordes fuerint, viris quidem palpebrarum euersionem praedicere oportet: mulieribus autem & pueris exulcerationem ac euersionem palpebrarum. At si sordes pallidae aut liuidae fuerint, & lachryma multa ac calida, & in capite ardor fuerit, & de tempore dolores in oculum decubuerint, & vigiliae his accesserint, necesse est vlcus in oculo factum esse, & timor est quoque ut talis rumpatur. Prodest autem febris accedens, aut dolor ad lumbos innixus. Praedicere vero his futura oportet, ita ut respectus & ad tempus habeatur, & ad ea quae ex oculo fluunt, & ad dolores itemque vigilias. Postquam vero & oculum cotueri datum fuerit, si quidem compertus fuerit ruptus, & per fissuram prominuerit oculus, malum est & difficile ut sedetur. Si vero & putredo tali suberit, penitus inutilis oculus redditur. At vero alios vlcerum modos praedicere oportet, locos considerando, & putredines, & profunditates. Necessarium enim est iuxta vlcerum vehementiam cicatrices fieri. Quibus igitur rupuntur oculi, & postea prominent, ut extra locum oculus sit, his & tempore, & arte, opem ferre non datur, ad hoc ut videant. Parum vero oculorum transmotiones sedari possunt, si nihil mali accesserit, & homo iuuenis fuerit. At vlcerum cicatrices, quibus nihil aliud

*Cum acies
oculorum
extuberat
de visu a-
ctum est.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Pupillari
color.*

hil aliud mali affuerit, omnes & à temporibus, & ab arte, opè
ferre posse putandum est, maxime recentissimas, & in iuue-
num corporibus. Caterum ex locis maxime oculi lardun-
tur, si exulcerantur. deinde pars quæ est supra supercilia, po-
stea quicquid vicinissimum his locis fuerit. Pupillæ vero
flauescentes, aut argenti speciem referentes, aut ceruleæ, non
bonæ sunt. His autem paulo meliores sunt, quæ aut minores
apparent, aut ampliores, aut angulos habentes, siue ex causis
tales factæ fuerint, siue sua sponte. Caligines & nubeculæ,
& cicatrices subalbicantes, leuigantur ac delentur, si nõ vul-
nus aliquod in eo loco accesserit, aut prius cicatricè habue-
rit in hoc loco, aut vnguem pterygion dictū. Si vero splē-
dicans cicatrix in nigra oculorum parte fiat, partem aliquam
nigredinis dealbat, adeo vt si multo tempore permaneat, &
aspera & crassa, etiam memoriam sui relinquat. Porro iudi-
cationes quemadmodum in febribus scripsi, ita & hic se ha-
bent. Verum signa edoctum, iuxta differentias lippitudinum
prædictionem facere oportet, quū pessima signa accesserint,
diuturnarum lippitudinum, velut de singulis perscriptū est:
quum vero apparuerint optima signa, breuium. Tunc enim
septima die desituras esse prædicendum est, aut prope hoc
tempus, & alioqui securas esse putandum est. Recidivas autē
expectare oportet his, quibus melius habere contingit, neq;
in diebus iudicatoriis, neque signis bonis conspectis. Omnium
vero maxime vrinæ statum in oculorum affectionibus con-
siderare oportet. Nam temporum occasiones repentine sunt.

*Præcipua
in his obser-
uatio.*

*Dysente-
ria quæ
mala.*

Dysenteria si quidē cum febre inuaserint, aut variis alui
egestionibus, aut cum hepatis inflammatione, aut præcordij,
aut ventris: aut quæ dolorosæ fuerint, aut cibos intercipiūt,
sitimque inducunt: hæ omnes malæ sunt. Et qui sanè plurima
horum malorum habuerit, citissime peribit. Cui vero paucis-
sima talium affuerint, huic plurimæ spes sunt. Moriuntur au-
tem ex hoc morbo maxime pueri quinquennes, & seniores
adhuc, decennes. Reliquæ vero ætates minores. At quæ dy-
senteria commodæ sunt, hæ mala hæc non inducunt. Verum
sanguine & ramenti egestis, desuerunt septima die, aut de-
cima quarta, aut vigesima, aut quadragesima, aut intra hæc tē-
pora. Huiusmodi enim egestionem, etiā eos qui prius sunt in
corporibus, morbos sanant, antiquiores quidem diutius tē-
pore, re-

- A** pore, recentiores autem in paucis diebus submouere possunt. Nam & quæ utrum gestant, etiam ipsæ euadunt superstites magis ad partum, & ex partu, & foetus conseruant, sanguine & ramentis egestis, etiam per multos menses: nisi dolor ipsis affuerit, aut aliud quoddam malum signum ex his quæ in dysenteriiis fieri scripti, accesserit. Si vero aliquod illorum apparuerit, & foetui perniciem significat, & prægnanti periculum, si non post foetus effugium, & secundæ exolutionem, ipsa dysenteria eadem die, aut post modicum tempus desinat.
- Leuitates porro intestinorum, *lienteria* græcis appellata, quæ quidem sunt continuæ & diuturnæ, & per omnem horam, & cum strepitibus, & sine strepitibus exturbatur, & similiter noctu ac interdum incumbentes, & egestionem subeunte aut valde cruda, aut nigra & leui ac graecolente: hæ omnes malæ sunt. Nam & sitim inducunt, & potum non ad vesicam promouent, ut per vrinam eiiciatur, & os exulcerant, & ruborem eleuatum in facie efficiunt, & maculas solares varios colores habentes. Simul autem & ventres emollitos, & sordidos ac rugosos reddunt. Ex talibus autem homines impotentes sunt, ad cibum capiendum, ad deambulandum, ad faciendum alia quæ facere debent. Estque morbus hic gravissimus senioribus. Vehemens est etiam viris. Reliquis autem ætatibus multo minor. Quisquis autem neque in ætatibus his est, quas male tractari ab hoc morbo dixi, & paucissima ex signis habet, quæ mala esse scripsi, hic securissime dispositus est.
- C** Indiget autem curatione hic morbus, donec & vrina pro ratione eius quod in potu acceptum est, procedat, & corpus ab ingestis cibis augmentum capiat, & à malis coloribus liberatum fuerit. At vero alia profusio alui, quæ sine febre sunt, & breui tempore durant, & mitia existunt. Aut enim celuta sedabuntur, aut sua sponte. Prædicere autem oportet excretionem subitus erumpentem desituram esse, quum tantæ ventrem manu nullus motus occurrerit, & in fine egestionis flatus penetrarit. Sedes autem euertuntur ac prociuant, viris quidem, quos ubi hæmorrhoides habent, alui profusum corripit: pueris autem calculo laborantibus, & in dysenteriiis longis ac meracis: Senibus vero quibus muci agglutinati insunt. Porro ex mulieribus, quæ magis aut minus in utero concipere solent, ita consideratione facere conuenit.
- Medela quæ.*
- Alui profusio.*
- Sedis prociuentia.*
- Mulierum secunditatis cognitio.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

uenit, primum quidem specierum, Paruæ enim ad cōceptionem præstantiores sunt maioribus, tenues crassis, albæ rubicundis, nigræ liuidis. Quæ item venas conspicuas habet, meliores sunt quàm quibus non apparent. Carnem autem vberiorē habere, aniculæ malum est, mammas autem tumidas ac magnas, bonum. Atque hæc quidē ad visum exposita sunt. Verum interrogare oportet etiam de mensuris purgationibus, an omnibus mensibus compareant, & an copia satis magna, & an boni coloris sint, & æquales in singulis temporib⁹, & in iisdem mensium diebus. Sic enim has fieri optimum est.

Vteri qualitas.

Conceptus impedimēta.

Post ulcus qualis locus.

Cum ulcus in altera parte est quid pariant.

Locum vero in quo conceptio fit, quem sanē vterum nominamus, sanum esse oportet, & siccum, ac mollem. Sit item neque retractus, neque pronus, neque os ipsius sit auersum, neque conclusum, neque euersum. Fieri enim non potest vt cōceptio fiat, quodcunque tandem talium impedimentorū affuerit. Quæcunque igitur mulieres in vtero concipere non possunt, verum pallidæ apparent, neque febre, neque visceribus in causa existentibus, hæc capite se dolere dicent, & menses sibi male ac meracos prodire. Siue autem breui, siue longo tempore, ipsis sic affectis menses non comparuerint, vteri in his purgatione opus habent. Quæcunque vero bene coloratæ sunt, & carnem multam ac pingue habet, & venulas occultatas, & dolore carent, & menses his aut omnino non apparent, aut modici & meraci prodeunt: Hic modus difficilissimus est ad cogendum vt concipiant. Si vero mensibus comparentibus inculpate, & mulier sic corpore disposita fuerit, & non conceperit, locus in quo est vterus in causa est, vt fœcunda fœtu fieri non possit. Aut enim reuulsus est, aut euersus. Nam & alia quæ isthic fiunt, cum doloribus. decolorationeque ac colliuatione fiūt. Quibus porro vlcus factum fuerit in vtero, siue ex partu siue ex tuberculo, siue ex alia quadam causa, his febres & inguinum tumores succedere necesse est, & dolores in his locis. Si vero & puerperij purgamēta simul fuerint intercepta, hæc mala si fuerint, omnino meraciora sunt & diuturniora. Et ad hæc præcordiorum ac capitis dolores. Ulcere autem facto & sanato, locum hunc leuiorem ac duriorē fieri necesse est, & minus concipere posse. Si vero solum in sinistra parte fiat vlcus, & mulier in vtero cōcipiat, siue dum adhuc habet vlcus, siue vbi iam sana est, masculum magis

- A** magis enixurâ esse spes est. Si vero in dextra parte vlcus fiat, & mulier concipiat, foemineum magis fore foetum expectandum est. At si febres corripiant concipere non potentem, & attenuata sit muliercula, interrogare oportet, an vteri vlcus aliquod habeant, aut aliud quippiâ ex malis de quibus scriptum est. Si eni in hoc loco nihil mali subesse apparuerit, quod causa sit attenuationis, & quod concipere non possit, sanguinem vomituram esse mulierem expectandum est, menses autem tali necessario euauernat. Si vero febris soluta fuerit à sanguinis eruptione, & menses comparuerint, in vtero cōcipiet. Si vero priusquam sanguis erumpat, alui excrementa liquida facta fuerint prauo modo, periculum est perituram esse mulierem antea quàm sanguinem vomat.
- B** Quaecūque in vtero se concepiſſe putant, & non cōceperunt, & per multos menses falluntur, menstruis purgationibus non apparentibus, & ventres augeri ac moueri vident: hæc & caput dolent, & colulum, & præcordia, & in mammis lac ipsis non est, nisi modicum quiddam, atque id aquosum. Postquam vero ventris tumiditas exoluta fuerit, ac molles factæ fuerint, in vtero concipiēt, si non aliud quoddam impedimentum ipsis fiat. Nam hæc affectio bona est ad mutationem in vtero faciendam, vt post hoc tempus in vtero concipiant. At his quæ cōceperunt, dolores hi non sunt, nisi familiares his fuerint capitis dolores, & lac in māmīs gignitur. At vero eas quæ à diuturnis fluxionibus vexantur, interrogare oportet an caput doleant, & lumbos, & infernam ventris partem. Interrogandæ sunt etiā de dentium stupore, & visus hebetudine, & aurium sonitu. Quaecunque autem dum ieiunæ sunt, subbiliosa vomunt per multos dies, quum neque vterum gestent, neque febricitent, eas interrogare oportet an lumbricos rotundos simul vomāt. Si enim hoc non consententur, prædicendum est ipsis futurum esse. Fit autem hic morbus maxime quidem mulieribus. deinde vero etiam virginibus, aliis autem hominibus minus. Quibuscunque vero sine febribus dolores fiūt, mortem quidem non inducunt, verum plerique diuturni sunt, & multas mutationes ac recidivas habent. Modi autem hi sunt. Primū quidem ex capitis doloribus aliqui sunt leues, aliqui multo grauiores. Utroque vero hoc modo considerare oportet. Quicunque hebetem visum habent, & rubor quidam ipsis fit
- Conceptus fallacia.*
Quid ab his petendum.
- Hh inculis,

HIPPOCRATIS LIBER II.

in oculis, & pruritus frontem vexat, his sanguis sua spōte manans opitulatur. Atque hic modus necessario simplex est.

Quibus vero dolores circa caput & frontem, ex magnis ventis fiunt, & ex frigoribus quum vehementer calfacti fuerint, eos grauedines quidem maxime perfecte liberant. profunt autem & sternutationes, & muci in naribus fientes, magis quidem sua sponte, sin minus, coacte. Grauedines autem fiunt perfecte, adeo vt & tussis succedant. & sternutationes succedentes si dolores non sedauerint, necesse est tubercula & decolorationes his succedere. Quibus autem dolores sine manifestis causis fiunt, & diurni, & in toto capite, suntque ipsi & graciles; & debiles, his prædicendum est morbum longe grauiorem priore esse. Si vero etiam ad collum, & ad dorsum dolor descendat, caput relinquens, & rursus ad caput recurrat, adhuc grauior fit. Verum omnium horum grauissimum est, si ex capite ad collum ac dorsum tendat. Vtilitates autem his ex abscessibus fore expectandum est, aut vbi pus per tussim reiecerint, aut hæmorrhoidas habet, aut pustulas in corporibus enatas, Confert etiam caput furfures habens. Torpores & puncturæ pruriginosæ velut ab vrtica, quibus per caput discurrunt, aliquando per totum, aliquando per aliquam partem: Sæpe vero & frigiditas aliqua ab ipsis sentiri putatur, velut per caput discurrere, hos interrogare oportet, an etiam ad summam linguam punctura illa procedat. Si enim hoc fecerit, perfectus morbus fit, & qui difficilius submoueri possit. Verum absque hoc facilis est. Modi vero vilitatum consequendarum ex abscessibus cōtingent, veluti antea scriptum est. Sed tamen abscessus minus in his succedunt, quàm in illis. Quosunque vero vnâ cum doloribus vertigines corripunt, malum ægre exolubile ac furiosum existit. Senibus autem maxime hic modus fit. At alij morbi circa caput, & viris, & mulieribus, cum securitate vehementissimè fiunt, & diuturniores. fiunt autem & adolescentibus, & virginibus in ea pubertatis ætate, & maxime circa mensium progressum. Mulieribus vero in capitis doloribus, alia quidem omnia fiunt, quæ & viris. Verum puncturæ illæ pruriginosæ & affectiones atrabiliaria, his minus quàm viris, si non menses penitus aboliti fuerint. Quibus colores dum iuuenes sunt, prauisunt ad multum tempus, & continenter, non tamen morbi

Quid his
profit.

Torpor.

Quid his
profit.

Vertigo.

Color.

regij

- A** regij modo: hi siue viri sint, siue foeminae, caput dolent, & lapides ac terram comedunt, & haemorrhoidas habent. *Pallor.* Pallidi vero cum virore colores, qui diuturni sunt, & morbus regius vehemens non est, alia quidem eadem facere solent, verum pro lapidum ac terrae esu, praecordia hos magis affligunt quam alteros. Quicunque vero multo tempore pallidi apparent, & facies in tumorem eleuatas habent, eos caput dolere sciendum est, aut circa viscera dolorem habere, aut in sede malum aliquod in seipsis. Ex his autem apparentibus, plerisque non vnum aliquod horum malorum apparet, sed plerumque multa, aut etiam omnia. Qui nocte vident, quos *Nyctalops* sanè nyctalops vocamus, hi morbo corripiuntur iuuenes, aut pueri, aut etiam adolescentes, & liberantur sua sponte, aliqui in quadraginta diebus, aliqui septimo mense, quibusdam vero & per totum annum permanserunt. Quapropter de tempore coniectare oportet, ita vt & ad morbi robur, & ad aegri aetatem respicias. Abscessus autem his prosunt insuper apparentes, & ad infernas partes fluentes. Verum non valde accedunt, propter iuuentutem. At mulieres non corripiuntur ab hoc morbo, neque virgines quibus menses comparent. Quibus autem lachrymarum fluxiones diuturnae fuerint, & hi nyctalopes sunt, eos interrogare oportet an caput doluerint antea quam haec reuelarunt. Quicunque dum neque *Tempor* febricitant, neque decolores sunt, saepe & verticem & tempora dolent, si non alium manifestum habuerint abscessum in facie, aut grauitur loquantur, aut dentes doleant, his sanguinem per nares erupturum esse expectandum est. Quibus vero ex naribus sanguis fluit, hi alioqui sani esse videntur, hos autem vel splenem in tumorem eleuatum habere comperies, vel caput dolere, & splendicans quiddam ipsis ob oculos obuersatur. Plerisque vero horum simul & caput & splenem, hoc modo se habere apparent. *Lien non* Gingiuae vitatae, & ora graueolentia his sunt quibus splenes magni. Quicunque vero *sani quid* habent splenes magnos, & neque sanguinis eruptiones ipsis *ferat.* contingunt, neque oris graueolentia, horum tibiae vlcera praua habent, & cicatrices nigrae. Quibus partes sub oculis vehementer attolluntur, eos magnos habere lienes comperies. Si vero etiam in pedibus tumores accesserint, aquam etiam habere videbuntur. Verum & ventrem, & lumbos in-
- Hh ij spicere

Distortiones faciei. spicere oportet. At vero distortionem in facie, si nulli alij corporis parti communicent, cito sedantur, aut sua sponte, aut ad necessitatem coactæ: reliqui vero syderati sunt.

Quibus vnâ cum hoc quod mouere non possunt, morbo-
sa corporis pars attenuatur, hi in sanitatem restitui non pos-
sunt. Quibus autem colliquationes non accesserint, hi sani
euadent. Cæterum de tempore quando sani erunt prædican-
dum est, respectu habito ad vim morbi, & ad tempus, & ad
ætatem hominis, & ad anni tempus, ita vt eius rei memor sis,
quod vetustissimi morbi, & pessimi, & qui reuoluuntur, gra-
uissime obediunt: itemque hi qui sunt in vetustissimis cor-
poribus. Sed & autumnus & hyems, ad tales morbos submo-
uendos minorem commoditatem exhibent quàm ver & æ-
stas. Dolores porro in humeris fientes, qui quidem ad ma-
nus descendunt, torporesque ac dolores inducunt, his absces-
sus non succedunt, verum nigram bilem vomentes sanantur.
*Humero-
rû dolor.* Qui vero isthic in humeris manet, aut eiam ad dorsum pro-
grediuntur, eos puris, aut atræ bilis vomitu effugiunt. Ve-
rum de his ita considerationem facere oportet. Si quidem e-
nim facile spirauerint, ac graciles fuerint, atram bilem ipsos
vomituros esse spes est. Si vero difficilius spirauerint, & in
faciem ipsis color incurrit, qui prius non erat, siue rubicun-
dus siue niger, eos magis pus sputuros esse sperandum est.
Ad hæc vero considerandum est etiam, an in pedibus tumo-
res sint. Nam & hoc signum in his consentit. Atque hic mor-
bus viris vehementissimus esse solet, à quadragesimo anno
vsque ad sexagesimum. Quia ætate etiam coxendicum mor-
bus maxime affligit. Porro de coxendicum morbo sic con-
siderationem facere oportet. Quibuscunque senioribus &
torpores vehementissimi sunt, & perfrigerationes tum lum-
borum, tum crurum: & qui pudendum arrigere non possunt:
& quibus alius non egerit, nisi ad necessitatem coacta, &
prodit ipsis multus stercoraceus mucus: his maxime diutur-
nus morbus erit, prædicendumque est annum vt minimum
duraturum esse morbum, ab eo tempore quo incepit, & opé
ad ver & ætatem expectandam esse. At vero iuuenibus non
quidem minus doloris inducit coxendicum morbus, verum
breuior est. Nam quadragesimo die liberantur. Sed neque
torpores vehementes accedunt, neque perfrigerationes cru-
rum ac

Arum ac lumborum. Quibus autem hic morbus est quidem in lumbis ac cruribus, non autem affligit adeo vt decumbat, considerare oportet an alicubi sint collectiones in coxa, & interrogare an ad inguen dolor progrediatur. Si enim ambo hæc habet, diuturnus fit morbus. Interrogandum insuper est, an in femore torpores insint, & ad poplitem progrediantur, & si hoc confiteatur, rursus interrogandum, an & per tibiā ad summum pedem procedant. Quicunque enim pleraque horum confessi fuerint, his dicendum est, quod crura ipsis aliquando calida, aliquando frigida fiant. Quod si morbus hic lumbos relinquens, aliquibus ad infernas partes vertatur, eos confidentes esse iube. Quibuscurque vero coxas & lumbos non relinquens, ad supernas partes conuertitur, malum id esse prædicandum est. At quibus circa articulos dolores fiunt, & tumores, & sedantur, non podagrico modo: in his comperies viscera magna, & in vrina subsidentiā albam. Et talis si tempora eleuarit, dicet se sæpe dolere, dicet etiam sudores sibi nocturnos oboriri. Si vero neque in vrina subidet talis subsidentiā, neque sudores fiunt, periculum est ne aut claudi fiant articuli, aut affectio abscessus humore melli similis, quem melicerida vocant, sub ipsis nascatur. Fit autem hic morbus his quibus in puericia & iuuentute sanguis ex naribus fluere solitus desuit. Proinde interrogandum est de sanguinis eruptione, an in iuuentute facta fuerit: & an pruriginosa velut ab vrtica punctura, & in pectore, & in dorso insint: & quibus alui dolores fortes indacant, citra exturbationes: & quibus hæmorrhoides fiant. Hoc enim horum morborum principium est. Si vero etiam malo colore præditi sint hi homines, interrogandum est an caput doleant. Hoc enim fatebuntur. Quibus vero ex his alui dolores in dextris fuerint, dolores his vehementiores fiunt, & præsertim quum ad præcordiū iuxta hepar, reliquæ doloris fuerint. His autem doloribus prodest strepitus statim in aluo obortus. Postquam autem dolor quieuerit, vrinam crassam ac cum virore pallidam mingunt. Atque hic modus nequaquam lethalis est, verum valde diuturnus. Quum autem iam vetustus fuerit morbus, homines ab ipso cæcutiunt. At de sanguine interrogare oportet, an in iuuentute fluxerit, & de visus hebetudine, & de vrinæ

HIPPOCRATIS

euacuationis pallore, itemque de strepitibus an insint, & succedentes profint. Hæc enim omnia fatebuntur. Impetigines & lepræ, & vitiliginis albæ, leucæ appellatæ, quibus quidem iuuenibus aut pueris aliquid horum factum est, aut paulatim conspectum in multo tempore augefcit: his nõ putare oportet abscessum esse, eam papularum eruptionem, sed morbum. Quibus vero horum aliquid factum est multum & repente, hoc sanè fuerit abscessus. Fiunt autem leucæ quidem ex lethalissimis morbis, qualis est & morbus tabidus appellatus. Lepræ vero & impetigines, ex morbis ab atra bile factis. Ex his autem facilius sanantur ea quæ in maxime iuuenibus fiunt, & quæ recentissima sunt, & in mollissimis ac carnosissimis corporis partibus producuntur.

Impetigines.

Leucæ.

Leucæ unde.

Lepræ unde.

HIPPOCRATIS COI

COACAE PRÆNOTIONES,

Iano Cornario medico physico interprete.

Qui post rigorem periscant.

Perfrigeratio.

Pavor & tristitia sine causa.

Ignorantia, obliuio.

Rigores soporosi.



Vi ex rigore perfrigeratur, caput ac collum dolentes, voce destituti, insuper exudantes, postquam se recollecterint moriuntur. Molestè ferre morbum cum perfrigeratione, pessimum est. Perfrigeratio cum duricia perniciofa est. Ex perfrigeratione, timor, & tristitia præter rationem, in cõuulsionem finit. Ex perfrigeratione urinas intercipi pessimum est. Ignorantia cum rigore, malum. Malum item obliuio. Soporosi rigores aliquatenus perniciosi, & flammeus in facie color, cum sudore, in his malignus est. In his frigiditas posteriorum partium cõuulsionem accersit. Et in summa, posteriorum partium frigiditas, cõuulsoria est. Ex dorso horrores frequentes, & cito transeuntes, ægre tolerari possunt. Urinæ enim interceptionem dolorosam significanc.

A ficiant. Insuper exudare, his pessimum est. Rigor continenter vexans, corpore iam debili existēte, lethalis est. Qui frequenter exudat, ac insuper rigent, perniciosum hoc est. & in fine suppurationem habere comperiuntur, ventresq; perturbatos. Rigores ex dorso molestiores sunt. Qui vero decima septima die rigorem habuit, & quarta ac vicesima insuper riguerit, malignum hoc est. Horrore affecti, caput dolētes, exudantes, malignum id est. Horrore affecti, multum insuper exudantes, difficili malo implicantur. Rigores multi torpidi, maligni sunt. Quibus sexta die rigores sunt, hi ægræ iudicantur. Quibus sanis horrores frequentes sunt, hi ex sanguinis fluxione suppurantur. Horror & spiradi difficultas in doloribus, signa tabis sunt. Ex pulmonis suppuratione, & circa ventrem aliquando ac claviculam dolores, & anxie stertere, sputi copiam in pulmone significat. Horrore affecti, anxij, delassati, lumbos dolentes, alius humectas habent. Affectiones insuper rigētes, & quæ ad noctem aliquanto magis exacerbantur, cum vigiliis ac delirio in somnis, aliquādo vrias inuoluntarie emittentes, in cōuulsionem definiunt. Continui rigores in acutis, prauī sunt. Ex rigore, cū capitis dolore exolutiones, perniciose. Cruentæ in his vrinæ prauæ. Rigor cum distentione neruorū in posteriora occidit. Qui in horruerūt & exudarunt iudicatorio modo, & postridie præter rationē horruerunt, si quis nō vigiliis infesteretur, neq; cōcoxerit, ei sanguinē erupturū esse puto. Vrinæ cum rigore suppressæ, malæ & conuulsoriæ, tum aliās, tum si quis antea graui sopore pressus fuit. Spes autē in his est abscessus retro aures fore. Rigores velut in febre tertiana, si in media inordinata febre exacerbentur, valde maligni sūt. Si vero cōtrario conuellentibus modo exacerbentur, cum rigore & febre, perniciosum est. Vocis interceptiones ex rigore, soluantur tremore. Et insuper rigentes tremores succedētes iudicāt. Qui ex rigore cum capitis dolore exoluuntur, in periculo versantur. Cruenta vrina his mala est. Quibus rigor, his vrinæ suppressio. Cōuulsio in febre, manuum ac pedum dolores, maligni sunt. Malignus est & doloris ex femore progressus. Neq; genuum dolor bonus est. Sed & surarum dolores maligni sunt, mētemq; emouent, tum aliās, tum si vrinæ subsidētia in medio innatet. Febres ex præcordio-

Rigor cōtinuus.

Horror qui malus. Rigores multi.

Horror & dyspnœa.

Horrores quales.

Rigor cōtinuus.

Rigor episthodes.

Lotiū tentū malum est.

HIPPOCRATIS

rum dolore malignæ sunt, sopor in his pessimus est. Qui frequenter exudare cum præcordij intensione non cessant, plerumque maligne habent. & dolores in summum humerum ac claviculam incubentes, in his pravi sunt. Febres tertianæ naturam referentes, cum anxietudine, malignæ sunt. Vocis interceptiones in febre malæ sunt. Lassati, caligantes, vigilantes, soporosi, exudantes, recalescentes, male habent. Lassati cum horrore si exudarunt iudicatorio modo, recalsati in morbo acuto, male habent, tum aliàs, tum si circa hæc sanguis de naribus stillarit. E regio morbo abunde colorati, moriuntur, alba vero alui egestio in his præcedit. Febres tertianæ naturæ referentes erroneæ, in pares dies translapse, difficiles sunt. Anxietudines in diebus iudicatoriis, si in his sine sudore perfrigerentur, & omnes qui sine sudore perfrigerantur citra indicationem, male habent. Et qui insuper riguerunt ex his, ubi vomuerunt meraca, anxii, tremuli in febre, malum. Qui ex rigoribus, parvis sudoribus, perfrigerantur, malum. Exudantes, vigilantes, recalescentes, malum. Qui insuper exudant in febre, maligne habent. Quibus biliosa est alui egestio, his circa peccatus morsus & amaritudo, malum est. In febribus inflata aluo, flatu non erumpere malum. Lassati, singultientes, stupore detecti, mali. Præter consuetudinem quid facere, velut est, proponere sibi aliquid, & expectare aliquid, prius non consuetum, aut contrarium, malum est, & mentis emotioni proximum.

Qui morbi in malis signis leuatur, & qui in bonis non remittunt, difficiles sunt. Qui exudant, & maxime capite, in morbis acutis submoleste ferentes, malum, tum aliàs, tum si urinae sunt nigrae & turbidus spiritus in his malus. Extremæ partes si in utramque partem cito transmutentur, malum est. Sed & sitis huiusmodi mala est. Ex moderato ferox responsio, malum. Vox acuta, malum. Præcordia his intro trahuntur. Qui ex perfrigeratione sudorosa cito recalescunt, malum. Qui in acutis exudant submoleste ferentes, malum. Qui præter rationem nulla existente vasorum euacuatione, impotentes fiunt, malum. In febre tractus velut à vomitu, in creationem desinens, malum. Torpor in utramque partem cito translabens, malum. Sanguinis stille pusillæ, malæ. In acuto morbo sitis præter rationem soluta, malum. Qui ad manum exiliunt, male habent. Quibus cum febre ardente, tumores somnolenti, torpidi fiunt, his dolor in
latus

A latus superueniens levis sideratiōis ac resolutiōis modo occidit. Suffocatio in acutis agris attenuatis, perniciofa. In perniciofis iam parui tremores, & vomit⁹ æruginofus. Qui in potibus fubftrepunt, & fubmurmurāt in ficcis; & qui difficulter deglutiant fpiritu tuſſiēte, pernicioſe habēt in acutis perfrigeratis. Rubores in manibus ac pedibus, perniciofi.

Efflantes & refracti, in ſomnis leuiter ſuſpicientes, morbo regio abunde colorati moriuntur, alba alui egeſtio in his præcedit. In febribus mētis emotiones taciturnæ, in eo qui voce priuatus nō eſt, pernicioſæ ſunt. Liuiorēs fiētes in febre, breuī mortem affore ſignificāt. Quibus in febre dolore lateris fiēte, aluus multa aquoſa ac biliōſa egerit, hi alleuantur.

B Quibus vero inedia cōſequenter accedunt, ac ſudores, cū bono faciei colore, & aluo liquida, ita vt adſit etiā aliquis cordis, ſeu potius oris vētris dolor, hi vbi longius ægrotarunt, peripneumonicorū modo moriuntur. Febrienti ſi atra bilis in principio, ſuſum aut deorſum prodierit, lethale eſt. Qui cū perfrigerationibus, nō ſine febre, ſuperne exudant, moleſte ferētes & phrenitici, in acuto morbo pernicioſe habēt. Dolores modice acuti, ad clauiculam ac ſuſum trāſeuntes, perniciofi. In longis pernicioſis morbis, ſedis dolor lethalis eſt. Si debilitè iam affecti, non videant, aut nō audiāt, aut labiū, aut oculus, aut naſus iſtis diſtorqueatur, lethale eſt. In febribus inguinis dolor, morbū diuturnum ſignificat. In febribus iudicationes impeditæ ac ſublata, tēporis quidē diuturnitatē inducunt, non autē pernicioſæ ſunt.

C Febres ex doloribus vehemētibus diuturnæ. Mētis emotiones tremulæ, palpatoriæ, phrenitiæ ſunt, & dolores circa furam, in his mentē emouent. Quicunq; in febre cōtinua, voce deſtituti iacentes, oculis cōiuentes niſtant, hi ſi poſtquam ſanguis iſtis ex naribus fluxit, & vbi vomuerūt loquātur, & ad ſeipſos redeant, ſeruātur. Si vero hæc nō fiant, difficulter ſpirantes facti breui moriuntur. Qui melius habuerunt, ſi poſtridiæ exacerbantur, malum eſt. Si tertia die cohibiti, quarta exacerbantur, malum eſt. Num & tales exacerbationes phrenitiæ ſunt? Quibuſcūque deſinunt febres, nō in diebus iudicatoriis, his recidiuæ ſunt. Qui in principio tenues, cum capitis pulſu, & vrina tenui, ad iudicationē acerbātur, his nihil miri eſt ſi & mētis emotio inſuperq; vigiliæ

gilia accedant. In morbis acutis, motus, iactatio, somnus. **D** turbulentus, quibusdam conuulsionem significat. Turbulentæ cum ferocia excitationes mentem emouentes, malæ sunt, itemq; conuulsoriæ, tum aliàs, tum cum sudoribus. Cõuulsoriæ etiam videntur colli ac dorfi perfrigerationes, immo etiam totius corporis. In his mictiones sunt pelliculosæ.

Deliria cum sopore, cõuulsoria. Mentis emotiones modice feroces, ferinæ sunt, sed & conuulsiones significant. In morbis longis, ventris præter rationem tumores, conuulsorij. Affectiones statim turbulentæ, vigilias inducetes, sanguinem de naribus stillantes, sexta die alleuantes per nocte, verum postridie rursus affligentes, exudâtes in somnum delatæ, mentem emouentes, large sanguinem fundunt, & morbos soluunt. Aquosa vrina talia significat. Qui cū relatis, ab atra bile mête moti, tremuli fiunt, maligne habet. Deliriū in spiritu & sudore, lethale est. Lethale est & in spiritu ac singultu. Insomnia in phrenitide euidencia bona sunt.

In phrenitide egestionis alui albæ, & torpor, malum. Rigor his pessimus est. In phreniticis in principiis affectiones mansuetæ, ac frequenter transmutationē habentes, malæ sunt. Quibus ab atra bile mête motis, tremores fiunt, malū est. Qui ab atra bile mête moti, tremuli fiūt, ac saluā fūdūt, nū sanē phrenitici sunt? Mête moti, acute insuper febrīetes phrenitici fiunt. Phrenitici parum bibentes, strepitum valde percipientes, tremuli, aut conuulsi. In vehementer phreniticis, tremores lethales sunt. Deliria circa necessaria, pessima. Quæ ex his exacerbantur lethalia sunt. Mentis parculsiones, voce clangorosæ, linguæ conuulsiones tremulæ, & voces tremulæ fientes, mentē alienāt. Duricies in his perniciofa est. Prædebilitatorū deliria pessima. Affectiones in phreniticis frequēter transmutationē habētes, cõuulsoriæ, prauæ. Phrenitici cum perfrigeratione saliuā fundētes, vomitū nigrum indicant. Qui varie ægrotant, & frequenter soporosi mente mouentur, his nigrū vomitū expectandū esse dicito. Quæ cõuulsoria modo exacerbantur, stupefactoria sunt. Tumores iuxta aurē, in morbis longis parui sunt: Sanguinis fluxiones ac vertigines insuper apparentes, perniciosæ. Febres vertiginosæ, & cū voluulis, & sine voluulis, perniciosæ. Anhelosis febris postea acuta, Cū præcor-

A præcordio intèro perfrigeratis, magnus circa aurem tumor.

Quibus in febre dolores circa lumbos & infernas partes fientes, septu transuersum cōtingunt, infernas partes relinquentes, perniciosi sunt, tum aliàs, tum si aliud quoddam signum prauū accedat. Si vero alia signa nō fuerint praua, suppuratum fore timor est. Pueris febris acuta, & aluus suppressa, cum vigiliis, & calcitrare, & colorem mutare, & ruborem habere, conuulsorium est. Affectiones statim turbulētæ, vigilias inducentes, & nigra cōpacta egerētes, partim sanguinē fundūt. Affectiones cū vigiliis & anxietudine repētina, sanguinē fundūt, tū aliàs, tū si quid etiā antea pfluxerit. Num & qui modice perfrigerati postea horruerunt? At qui circa exacerbationes tussunt, & parum exudant, maligne habent.

B Ad latus dolore ac suffocatione accedente, hi suppurantur. Quibus in febribus continuis pustulæ per totum corpus erumpunt, lethale, si non purulentus abscessus fiat, maxime autem circa aurem his fieri solet. In morbo acuto externas partes perfrigerari, internas autem ardere, & sitire, malum est. Febres cōtinuæ per tertiam diē augescētes, periculosæ. Quibus febris aliquādo intermittit, periculo vacat. In febribus longis, aut tubercula, aut dolores, in articulis fiunt: & si facti fuerint, nō sunt inutiles. Capitis dolor in morbo acuto, præcordium reuulsum, nō profluente ex narib⁹ sanguine, ad phrenitidem deuenit. Febres lypiricæ, bilis sursum ac deorsum effusione nō accedente, nō soluuntur. Morbus regius ante septimum diem accedens,

C malū. Septimo vero ac nono, & vndecimo ac decimo quarto, iudicatorius est, si nō præcordia induret: sin minus, ambigua res est. Frequētes per eadē recidiuæ, circa iudicationē sanguinolēte, nigrorū vomitū faciūt, fiūt autē & tremulæ. Dolores qui in tertianis febribus exacerbātur, tertianarū generis morbū faciūt, & grumosum sanguinē egerūt. In febribus secundū venam quæ est in collo, pulsus ac dolor, in dysenteria definit. Color qui sæpe in calore trāsmutatur, utilis est. In biliosis spiritus magnus, & febris acuta, cū præcordij intēssione, iuxta aurē abscessum facit. Qui ex morbis longis se refocillātes bene cibū accipiant, & nihil proficiunt, hi maligne recidiuam incidunt. Quibus in febribus venæ in tēporibus pulsant, & facies sana est, & præcordiū nō molle,

HIPPOCRATIS

molle, diuturnum morbum significat, & non desinētem citra **D**
 multi sanguinis ex naribus fluxum, aut singultum, aut cōul-
 sionem, aut coxendicū dolorem. In febre ardente si al-
 pus eruperit, mortale est. Ex alui dolore laborioso, febris
 ardens, pernicioſa. In febribus ardentibus si aurium soni-
 tus accedant, cum visus hebetudine, & gravitate secundū na-
 res, melancholico modo ab atra bile mente mouentur, sangui-
 ne ipsis non erumpente. Tremores in febribus ardentibus,
 mentis percussio soluit. In febre ardente fluxio sanguinis
 ex naribus, quarta die, mala est, si non aliud quid boni coinci-
 derit. Verum quinta minus periculosa est. Qui ex febribus
 ardentibus aliquātulum perfrigerantibus, cum egestionibus
 alui aquosis ac biliosis laborant, oculis malum est, tum alias, **E**
 tum si stupidi fiant. Febris ardens rigore superaccedēte sol-
 puitur. Febres ardentes recidiuare solent, & ubi per dies
 quatuor significationem de se præbuerunt, postea exudant.
 Sin minus, septima die. Febres ardētes quatuordecim dies
 diiudicant, aut alleuantes, aut perimentes. Ex febre arden-
 te, abscessu purulento circa aurem non fiēte, non valde ser-
 nantur. Letargici, tremuli ex manibus, somnolenti, discolo-
 res, tumidi, pulsus tardi sunt, & partes sub oculis eleuatas ha-
 bent, & sudores insuper accedunt, & aluos biliosas, & intem-
 peratas subumidas habent. Si vero obaridas habuerint, vrinæ
 & egestionis alui latenter ipsis progrediuntur, vrina ve-
 lut iumentorum est, potum non expetunt, neque aliud quic-
 quam. Postquam vero resipuerint, collum dolorosum se ha- **F**
 bere dicunt, & sonitus per aures transire. Qui vero ex le-
 thargicis seruantur, plerūque pectore suppurati fiunt. Qui-
 buscumque in febribus tremores circa iudicationem cessant,
 his temporis progressu abscessus dolorosus suppuratus in ar-
 ticulos fit, & vesica dolorosa. Febrientibus quibus rubores
 suat in facie, & dolor capitis fortis, & venarum pulsus, his san-
 guinis fluxio plerūque contingit. Quibus autem cibi fasti-
 dia sunt, & oris vetriculi morsus, & multum saliuæ, his vom-
 itus fit. Quibus vero ructus adiunt, & flatus, strepitus ac ele-
 uationes ventris, his fit alui exturbatio. Qui diutius se-
 cure ex febre continua laborant, citra dolorem aut inflam-
 mationem, aut aliam causam, his abscessus expectandus est
 cum dolore ac tumore, & magis in infernis parib⁹. Expecta-
 re autem

A re autem oportet abscessus, his magis qui trigessimum annum egressi sunt, & tunc expectare abscessus oportet, vbi viginti dies febris transmiserit. Senioribus autem minus fiunt, & vbi multo tempore febres durant. At intermittentes & erroneo modo inuadentes, autumnio maxime in quartanam leniter transeunt, & hoc magis his qui triginta annos excefferint. Abscessus autem hyeme magis fiunt, & tardius desinunt, & minus recurrunt. Quibus vero saepe recidiva contigit, his si semestre tempus transmiserint, tabes coxendicum leniter accedit. Quaecunque signa febrile se opponunt, & non abscessus significationem habent, maligna sunt. Febres quae neque in diebus iudicatoriis, neque post solutorium signum decesserunt, reciduant. Acuti morbi in diebus quatuordecim iudicantur. Tertianae exquisitae in quinque aut septem circuitibus, aut ad summum in nouē iudicatur. Quibus febrile incipientibus, sanguis de naribus steruntatione fiens distillat, & vrina subsidentiam albam in quarta die habet, his in septima die solutionem significat. Morbi acuti iudicantur, sanguine de naribus fluente, in die iudicatorio: & sudore multo fiens, & vrina purulenta ac vitri formam referente, prodeunte & bonam subsidentiam habente, & acervatim excurrente: Abscessu item memorabili fiens, & alio mucosa & cruenta de repente egerente: & vomitibus non prauis fiens circa iudicationem. Somni profundi, non turbulenti, firmam iudicationem significant. Turbulenti vero cum dolore corporis, inconstantes sunt. Septima die, aut nona, aut decima quarta, fluxiones sanguinis à naribus fiens, plerumque febres soluunt: Similiter & alui fluxio biliosa, & qualis in dysenteria fieri solet: & genuum ac coxendicum dolor: & vrina concocta ad iudicationem. In muliere vero etiā menstruae purgationis fluxus. Quibus in febribus sanguis abunde vndeque profluxit, his in refectionibus à morbo alui humectantur. Qui in febribus exudant, caput dolentes alio suppressa, conuulsi fiunt. Mentis emotiones modice feroces, & ferinum, & conuulsionem significant. Conuulsio in febre fiens, & eadem die desinens, bona est. Conuulsio in febre fiens, sedat febrem eadem die, aut postera, aut tertia. Si vero empus quo incepit transgrediatur, & non desinat, malum est. Febres intermittentes, verū inaequaliter calefcentes,

HIPPOCRATIS

tes, aluo inflata, pauca egeréte, in his post iudicationem lumborum dolore sequuto, alui erumpunt. At amburentes ad manum, torpidæ, siticulosæ, anxiosæ, in his aluo suppressa grauatissimi exoluuntur. Quandoque vero & rubicundæ in pedibus ambustiones, eadem significant. Hybernæ febres quartanæ, leniter in acutos morbos transeunt. Capitis dolor pertinax cum febre acuta, & alio signo maligno, lethale est. Ceterum sine signo malo, transgrediens vigesimum diem, sanguinis aut puris fluxum è naribus, aut abscessus ad infernas partes significat: fluxiones quidem iunioribus trigintaquinque annis, senioribus vero, abscessus. Si vero circa frõtem ac tempora fuerit dolor ille pertinax, fluxiones. Quibus capitis sunt dolores, & sonitus aurium, citra febrem & vertigo, & vocis tarditas, & manuum torpor, eos aut syderatos, aut comitiales, aut obliuiosos fore expecta. Qui caput dolent, stupore correpti, delirantes, aluo suppressa, oculo ferociente, florulenti, hi in posteriorem partem conuelluntur. Capitis succussiones, oculi rubicundi, mente manifeste emouètes, perniciosæ sunt. Non commoriuntur hæc, sed circa aurem tumorem faciunt.

Capitis dolor, cum sedis & pudendorum dolore, & torpore, & impotentiam inducit, & vocem resoluit. Hæc horrenda non sunt, verum somnolenti ac singultientes fiunt nonno mense, ex quibus soluta voce, in idem restituntur. Qui in capitis dolore ascaridas habent, his surditas & sopor consequens, abscessus circa aurem excuscat. Qui caput dolent, stupore detenti, dolorosi, oculum rubicundum habentes, sanguinem effundunt. Capitis concussiones, & aurium sonitus sanguinem effundunt: aut mulieri menses deducunt, tum aliàs, tum si iuxta spinam ardor consequatur: fortassis autem dysentericis fluxiones. Capite grauari, iuxta sinciput dolentes, vigiliis infestati, sanguinem effundunt, tum aliàs, tum si quid ad collum se extendat. Vomitus in capitis doloribus æruginosi, cù surditate, vigilatibus, cito insaniam excitant. Quibus capitis ac colli dolor est, sed & totius corporis tremula quadã impotètia, sanguinis eruptio soluit. Quin & tẽpore hæc soluntur. Verum vesicæ in hoc supprimuntur.

In acutis capitis doloribus, & in torpidis cum grauitate, conuulsiones fieri solèt. Capitis dolorem soluit pus per nares, aut sputa crassa, & non olentia. Soluit item vlcera eru-
ptio

A prio. Quandoq; & somnus, & alui fluxus. Capitis dolor moderatus, cum siti cibum capiente, aut cum sudore non soluente febrem, abscessus in gingivis, aut circa aurem significat, alui non exturbata. Capitis dolor soporofus cum gravitate, convulsorium quid facit. Caput dolentes, siticulosi, aliquatenus vigilantes, obsecuri cognitu, impotentes, ex aluo liquida defassati, num mente moventur? Caput dolentes, surdastri, manibus tremuli, collum dolentes, mingentes nigra condensata, vomentes nigra, perniciose habent. Caput dolentes, exudantes, aluum suppressam habentes, convulsioni obnoxij sunt.

Sopor ubique malus est. Soporosi in principiis fientes, cum capitis lumborum, colli praecordij dolore, vigilantes, num phrenitici sunt? Nasus in his destillans perniciosus, tum alias, tum quarto ab initio die. Malum est etiam alui proluuium valde rubicundum. Soporosi ab initio exudantes, urinis concoctis ardentes, veram citra iudicationem perfrigescentes, & breui rursus ardentes, torpidi, soporosi, convulsi, perniciose habent. Somni soporosi, & perfrigerationes, perniciosi sunt. Soporosis defassatis, surdis factis, aluo erumpente si rubicunda egesta fuerint circa iudicationem profunt. Soporosi, anxiosi, praecordium dolentes, parum vomentes, abscessus iuxta aurem habent. Antea vero circa faciem tumores cum sopore. Morbi derepente mentem percellentes cum anxietudine, sanguinem profundunt. Soporosi, anxiosi, dolorosa praecordia, frequenter parum spuentia, Tumores circa aurem habent. Soporosi, num aliquid convulsorij habent? Affectiones soporosa, fatuitatem inducentes, stuporis detentionem inferentes, praecordia variantia, & ventrem tumidum habentes, cibum fastidientes, aluo suppressa exudantes, num his turbidus spiritus, & genitura simile quid pertransiens, singultum significat? Num & alius biliosa insuper egerit? Splendidum in his mictum prodest. Ventres quoque his insuper turbantur. Cerebro corrupto alij in tribus diebus, alij in septem moriuntur. Has vero si effugerint servantur. Quibus autem ex his relictis, os disparatum repertum fuerit, hi pereunt. Caput dolentibus ex posteriore parte ossa rupta habentibus, fluxio e nare larga crassa, mala est: Hi ubi oculum antea doluerint, rigent. Num & iuxta tempora ossium disruptiones convulsoriae sunt? Auris dolor pertinax, cum febre acuta, & alio quodam

HIPPOCRATIS

dam signo aliquantum maligno, iuvenes quidem septima die occidit, & citius delirio correptos, si non multum pus effluerit ex aure, aut sanguis è naribus, neque aliud quoddam bonum signum compareat. Seniores autem tardius, & minus tollit. Nam & aures suppuratione præveniunt, & minus delirant. Verum multi ex his recidiunt, atque sic pereunt. Surditas in acutis ac turbulentis consequens, malum. Malum etiam in longis. In his autem dolores etiam ad coxas deducit. In febribus surditas, alui sistit. Aures frigida, & pellucida, & contracta, perniciose. Tinnitus in acutis, & sonitus in auribus, lethale. Sonitus aurium, cum visus hebetudine, & narium grauedine, mentem euomet, & sanguinem profundit. Quibus surditas cum capitis grauitate, & præcordij intentione, & ad splendorem turbatio, sanguinem profundit. In febre acuta aures obfurdescere, furiosum est. Valde surdi, in accipiendo tremuli, linguam resoluti, torpidi, malum. Accedente ægitudine surditas, & vrina subrubicunda subsidentiam non habens, sed id quod in medio innatat, metem euomet. Morbo regio corripì, in his malum est. Mala est & ex morbo regio fatuitas. Hos voce priuari, sentientes tamen esse contingit. Fortassis autem & alui male his afficitur. Quæ circa aurē dolorose excitantur, perniciose sunt. Rubores circa aurem ex prægresso dolore, in febribus fientes, signum quidem sunt erysipelatis in facie futuri. Sed & conuulsiones ex talibus fiunt, cum vocis interceptione ac exolutione. Tumores circa aurem ex plurimis graueolentibus cum febre acuta, & præcordio intento, tardius excitati, occidunt. Tumores circa aurem leuiter syderatis, mali. Tumores circa aurē in longis morbis non suppurantes, lethales. Alui vero his deorsum feruntur. Num quibus abscessus sunt iuxta aures, caput dolent? Num & supernis partibus exudant? Num & insuper rigent? Num & alui erumpunt, & quid soporosum habent? Num & aquosa est vrina, alba innatantia habens, & aliquantum varia, exalbida, graueolentia. Abscessus iuxta aurem submouent tussiculæ cum sputationibus fientes. Vrinæ in abscessibus retro aures cito & modice maturescences, malæ sunt. & sic perfrigerari, malum est. Abscessus circa aurem in morbiditurnis suppurati, non valde albo & inodoro pure, occidunt, & maxime mulieres. Abscessus iuxta aurem, ex acutis

- A** acutis morbis maxime in febribus ardentibus fiunt. & si non iudicationem fecerint, & maturefcant, aut ex naribus sanguis fluxerit, aut urinae subidentiam crassam habuerint, agri pereunt. Plerique vero talium tumorum antea propulsantur. Verum considerare oportet insuper etiam ipsas febres, siue augefcant, siue remittant, atque sic pronunciare. Ex surditate ac torpore, de naribus aliquid destillare, difficultatis aliquid habet. Vomitus his conueniet, & alui turbatio. Ex surditate leniter abscessus iuxta aures fiunt, tum alias, tum si quid naufex accedat. Sed & soporosis ex his, etiam magis abscessus ad aurem fiunt. Surditatem ex febribus, sanguinalis è naribus fluxio soluit: itemque alui turbatio. Facies quæ
- B** ex tumida humiliatur, & vox leuior ac debilior fiens, & spiritus rarior ac leuior, remissionem in sequentem diem significat. Faciei corruptio, lethalis. Verum minus, si propter vigilias, aut famem, aut alui exturbationem fiat: Et si id quod propter hæc corruptum est, sedetur per diem ac noctem. Talis autem fuerit, oculi caui, nasus acutus, tempora collapsa, aures frigida ac contractæ, cutis dura, color pallidus aut niger. Liuescens vero ex his palpebra, aut labium, aut nasus, breui lethale est. Faciei bonus color, & toruitas, in morbo acuto, malum est. Frontis ex his contractio, phrenitidis signum est. Circa faciem color bonus, & sudores non febrientibus, stercora vetusta subesse significat, aut victus rationem inordinatam. Rubores circa nasum, alui humescantis signa sunt. Dolores circa præcordia aut pulmonem si suppurentur, malum est. Oculorum puritas, & albas ipsorum partes, ex nigris aut liuidis puras fieri, iudicatorium est. Si igitur cito purgentur, celerem iudicationem significat, Si tarde, tardiozem. Caligo oculorum, aut si alba ipsorum pars rubescat, aut liuescat, aut venulis nigris impleatur, bonum non est. Malum est etiam lucis splendorem fugere, aut lachrymari, aut distorqueri. Et alterum minorem fieri, malum est. & oculos frequenter agitare, ac iactare, aut paruas lemas ac fordes circa ipsos, aut concretionem tenuem albicantem habere: aut albam partem maiorem fieri, nigram vero minorem: aut nigram sub palpebram supernam occultari. Mala est etiam oculorum cavitatis, & expressio valde foras, & splendoris extritio, ut pupilla extēdi non possit. Et extremitatum
- li palpe-

HIPPOCRATIS

palpebrarum curvitas, & oculi fixi, & assidue nictare, & colores permutare, & palpebras inter dormiendum non committere, perniciosum est. Malus est & oculus peruersus. Oculorum rubor in febre siens, alui diurnam malignam affectionem significat. Circa oculos pustularum eruptiones in virium refectionibus, aluum prorumpere faciunt. In oculorum distortionibus febrienti, lassato, rigor perniciosus, & soporosi in his male habent. Viro lippienti, febre superueniente, solutio. Sin minus, periculum est ne cæcus fiat, aut pereat, aut utrumque. Quibus lippientibus capitis dolor accedit, & ad multum tempus cocomitatur, periculum est ne cæci fiant. Lippienti alui profluuium sua sponte prodiens, vtile est. Oculorum obscuratio, & oculus fixus caliginosus, malum. Oculorum obscuratio, cum animi deliquio, breui conuulsionem inducit. Oculorum rectitudo in morbo acuto, & motus velox, & somnus turbulentus, & vigilia, & quandoque sanguinis ex naribus stillationes, nihil boni. Qui febres ad tactum non adurentes habent, phrenitici fiunt: & magis si sanguis fluxerit. Lingua quæ in principio quidem inhorruit, in colore vero permanet: progressu autem temporis exasperatur, & liuescit, & rûpitur, lethalis est. Si vero valde nigrescat, in quattodecima die iudicationem fore significat. Periculosissima autem est nigra, & cum virore pallida. Linguam circa bifidam sui partem, velut saliuâ alba obduci, febris remissionis signum est, si quidem id quod superinductum est crassum fuerit, eadem die. Si vero tenuius, postridie. Si vero adhuc tenuius, tertia die. Eadem significant etiam huiusmodi, si circa summam linguam fiant, verum minus. Lingua tremula cum rubore iuxta nasum, & aluo liquida, si reliqua sine signis sint circa pulmonem, malum est, & celeres purgationes, perniciosas significat. Lingua citra rationem tenera siens, & cum cibi fastidio nauseabunda, cum frigido sudore, ex aluo liquida, nigrorum vomituum, signum est: lassitudo in his mala est. Lingue tremulæ quibusdam etiam aluum liquidam quandoque faciunt. Denigratæ vero in his, celerem mortem significant. Num lingua tremula mentem non firmam significat? Lingue asperæ & resiccatae, phreniticae sunt. Dentes collidere aut stridere, quibus non familiare id est à pueris, furiosum ac lethale est: iam vero delirans si hoc faciat, penitus lethale est. Per-

niciosum

A niciosum autē est & reficari dentes. Dentis corruptio abscissum circa gingiuam factum soluit. Ex dētis corruptione, vehemens febris superaccedēs, & delyrium, lethale est. Si vero seruentur, vlcera suppurabunt, & ossa discedent. Quibus circa palatum humoris collectio fit, plerunq; suppuratur.

Dolores vehementes circa maxillas, periculum est ne ad ossis educationem deueniant. Labium contractum, alui biliose eruptionem significat. Sanguis de gingiuis, ex aluo liquida perniciosus. Sputi excreationes in febre, liuidæ, nigre, biliosæ, si quidem supprimantur male sunt, secedentes vero pro ratione, vtilis. Quib⁹ saluginosa sputa, ac tussis supprimuntur, his corpus velut à pustulis rubescit. Verum ante obitum

B exasperatur. Scretatio frequens, si sanè & aliud quoddam signū affuerit, phenitidē indicat. Vocis interceptiones cum exolutione, pessimæ. Modice feroces mentis emotiones, malæ & ferinæ sunt. Quibus vox cum febre deficit, & cum iudicatione intercepta, tremuli moriuntur. Vocis interceptiones in febre conuulsorio modo fientes, ad mētis emotionem cum silentio deueniūt, perniciosum. Vocis ex dolore interceptiones, dolorosam mortē inducunt. Vocis interceptiones cum exolutione stupefactorio modo, perniciosæ sunt.

Voces confractæ post medicamenti sumptionem, num prauæ sunt. Plerique horū exudant, & venres humectos habēt.

In vocis interceptione spiritus, velut his qui strāgulantur, præ manibus expositus, malus est. Num & mentem emouet?

C Ex capitis dolore vocis interceptiones si sint, febricitātes cum sudore laxantur in seipsos, fiuntque morbi reuertentes diutius durantes. his insuper rigere, malum non est. Mētis emotiones cū vocis interceptione, perniciosæ. Vocis interceptiones insuper rigētibus, lethales. Tales autem leniter caput dolent. Vocis interceptiones cū exolutione, in febre acuta sine sudore, sunt quidem lethales, minus vero quā cū sudore. Verum diuturnitatē temporis significant. fortassis autē & qui ex recidina tale quid patiūtur, tutissimi sunt. Perniciosissime autē ex talibus habent quibus sanguis ex narib⁹ fluit, & quibus alui humectantur. Vox acuta, planctū referens, & oculorū obscuratio, cōuulsorium est. Dolores his ad infernas partes, toleratu faciles sunt. Cum voce tremula, solutio alui præter rationē, in his moram trahētib⁹ diuturnis, perniciēs

HIPPOCRATIS

est. Frequētes subīporatę vocis interceptiones consisten- **D**
tes, tabem pręsignant. Spiritus qui densus quidem & paru-
us est, inflammationem & dolorę in locis principalibus signi-
ficat. Magnus autę & per multum tēpus delirium aut con-
uulsionem. Et frigidus quidę lethalis est, lethalis autę est & fe-
briculosus & fuliginosus. Verum minus quā frigidus. & qui
magnus foras expiratur, paruus vero intro: & paruus foras,
magnus vero intro, pessimus sanę est, & morti propinquus.
Itęmq; extendens, & vrgens, & obscurus, & dupla intro reuo-
cario, veluti superinspirantibus. Bona autem spiratio, in om-
nibus morbis qui cum febre acuta sunt, & in quadragintadie-
bus iudicantur, magnum momentum ad salutę habet. Col-
lum durum & dolorosum, & maxillarũ colligatio, & venarum **E**
iugularium palpitatio fortis, & tendinũ distentio, pernicio-
sum. Dolores in faucibus gracilibus strangulatorij, a capi-
tis dolore originę trahentes, conuulsorij sunt. Frigiditates
colli ac dorsi apparentes, Sed & totius corporis cōuulsoria, in
his mictiones fiunt crassiorę farinam referentes. Quibus
circa fauces irritamenta sunt, his tumores circa aurę leniter
erumpunt. Fauces dolorosę, graciles, cum ægre tolerabili
molestia, perniciosę acutę sunt. Quibus spiritus retrahi-
tur, & vox strangulatoria est, & vertebra intro cōsider, his in
fine velut contrahente quodam spiritus fit. Fauces modice
exasperatę, & alius vanis conatibus nitens, frontis dolores,
ægri palpando contrectatę, dolorosi: quę ex his auęscunt,
difficilia sunt. Dolores fortes circa fauces, tumores circa **F**
aurem, & conuulsiones efficiunt. Colli item ac dorsi dolores.

Cum febre acuta conuulsiones perniciosę. Colli & cu-
bitorum dolores, conuulsorij. A facie autem hi, & secundum
fauces. Pallidi, graciles, saliuam sputantes, In his in somnis
sudores boni sunt. Num & sudore leuari, plurimis non malum
est? Dolores ad infernas partes his toleratu faciles sunt. In
dorsi ac pectoris dolore, mictio cruenta suppressa, pernicio-
sa est dolorose. Colli dolor malum quidem in omni febre, pes-
simus autę his quibus timor est vt etiam insaniant. In pe-
ctoris dolore febriculoso, alius turbata, torpida, nigrarum e-
gestionum signa sunt. Dolores parui in acutis iuxta fauces
graciles, in gracili vbi hiarit, non facile os contrahente, men-
tem emouent. Ex his phrenitici perniciosę habent. Fauces
exulce-

A exulceratæ in febre, cum alio signo ex his quæ difficilia sunt, periculosæ sunt. In febribus derepente suffocari, & deglutire non posse, citra tumorem, malum est. Collum conuertere non posse, neque deglutire, vt plurimum lethale est.

Præcordium molle esse conuenit, & doloris exors, & æquale. At inflammatum, aut inæqualiter se habens, aut dolens, si-
gnum est ægritudinis non leuis. Tumor vero in præcordiis durus & dolorosus, pessimus quidem est si iuxta omnes partes fuerit. Ex his autem qui ab vna parte sunt, minus periculofus est qui à sinistris est. Significat autem in principio quidem tales, mortem citam. Si vero viginti dies transmittant, febre manente, suppurationem. Contingit autem his in primo circuitu, etiam sanguinis eruptio è naribus, & valde prodest. Plerunq; enim hi caput dolêt, & visus obscuratur. & magis in his sanguinis eruptione affore expecta. In ætatibus autè annorum trigintaquinq; Senioribus vero minus. At vero molles & doloris exortes tumores, diuturniores iudicationes faciunt, & minus periculosi sunt. Sed & hi sexaginta dies transgredientes, febre manente, suppurantur. Consimilia vero significant & tumores circa vèrem, his qui sunt in præcordiis. Verum minus suppurantur hi q̃ illi. Minime vero qui sub vmbilico cōsistunt. & fiunt etiam hi quidè in tunica, illi vero sursum diffusi. Lethales autem sunt ex ipsis, quicunque intro rupti fuerint. ex reliquis autem suppurationibus, quæ quidè foras rumpuntur, optimum est vt in breuissimâ & acutissimam molem colligatur: quæ vero intro, vt neque mole, neque dolore, neq; colore, foris se manifestas faciant. Contrariū autem pessimum est. Quædā vero ex his propter puris crassitudinē, nullam de se significationē præbent. Porro recentes in præcordiis tumores, si non cum inflammatione fuerint, & dolores ab ipsis soluit murmur in præcordio obortum, & maxime quidè si pertrāsierit per vrinas, & alui egestionem. Sin minus, si etiam ipsum pertransierit. Prodest autè & si subdescēderit ad infernos locos. Pulsus in præcordio cū tumultu, mentis emotorius est, & magis si oculi frequēter moueantur. Oris ventriculi dolor, & pulsus præcordiorum, febre perfrigerata, malum, tum aliàs, tum si insuper exudarint. Dolores ad præcordium irruentes, tū aliàs mali sunt, tum si aluos humectēt. Peiores autè sunt, si breui fiant, & tumores circa aurem ex his

li iij emer-

HIPPOCRATIS

emergētes, maligni sunt, & alię suppurationes. Oris vētri- D
culi dolores cum tormine vētris animalcula erūpere faciunt.

Oris ventriculi dolor seniorē frequenter impetens, mor-
tem repentinā significat. Quibus præcordia eleuantur, al-
uo suppressa, malū est, maxime autē in morbis tabidis, longis.
& quibus alui humectantur, in præcordio inflāmatiō suppu-
ratoria est, quibus ante mortem nigra per aluum subeunt.

Præcordiorū distētiō cum sopore anxioso, in caput dolen-
te abscessus circa aurem attollit. Post præcordiorū tumo-
rem, biliosus spiritus magnus & febris acuta, abscessus circa au-
rem attollit. In dolore præcordiorum submurmuranti, lum-
borum dolor superaccedens in febribus, ventres vtpurimum
humectat, si non flatus eruperit, aut vrinæ copia prodierit.

Ex præcordio diutine afflicto, & aluo graueolenti, absces- E
sus circa aurem, occidit. Quibus à præcordiorū doloribus,
aluus paulatim subuiscosa egerens, pauca stercoracea effun-
dit, num etiam sanguinē effundit? Quibus derepente dum
sine febre sunt, præcordij & oris vētriculi dolor, & circa cru-
ra, ac infernas partes, & aluus in tumorem eleuata est: soluit
venæ sectio, & alui fluxio. His febrile nocuum est. Longæ e-
nim & vehementes febres fiunt, & tusses, & spiritus & singul-
tus fiunt. His autem ad solutionem tendentibus, dolor fortis
coxarum, aut crurum, aut puris sputum, aut oculorum priua-
tio succedit. Quibus dolores præcordiorum, oris ventricu-
li, hepatis, partium circa vmbilicum, hi sanguine per aluum e-
gesto, seruantur: non autē egesto, moriuntur. Quibus præ- F
cordia non mollia, facies sana, non liberantur citra multi san-
guinis ex naribus fluxum, aut conuulsionem, aut coxædicum
dolorē. Dolores ad præcordia in febre, voce intercepta, si-
ne sudore soluti, malum est. His ad coxendices dolores fiunt,

Iuxta ventrem in febre palpitaciones, mentis emotiones
inducunt, Sanguinis autem fluxio horrorem efficit. Dolo-
res in febre ad præcordia exilientes, sine sudore soluti, mali-
gni sunt. His ad coxendices dolores fiunt, & ipsis vnā cum fe-
bre ardente, aluus deorsum erumpēs, perniciosum est. Do-
lores circa vmbilicum palpitatorij, habent quidem & aliquid
mentis emotorium, verum circa iudicationem pituita his a-
ceruatim copiosa cum dolore penetrat. Post aluum suppres-
sam, præcordia subleuata in tumorem, mala sunt, maxime
tabescen-

- A** tabescentibus iam diu, & quibus alui humectatur. Anxietatem in præcordio sentientibus, tumores circa aurem oborti, ipsos occidunt. Duricies circa ventrem cum dolore, in febriculis cum horrore, cibum auersantibus, si alio insuper parum humectata, purgationem non faciant, ad suppurationem peruenient. Dolor supra umbilicum, & lumborum dolor, si medicamentis non soluantur, in hydropem sicum desinunt. Dolores ex lumbis diuturniores, qui febre tertianæ generis modo exacerbantur, grumofum sanguinem egerere faciunt. Dolores in lumbis, sanguinis fluxionem inducunt. Ex lumborum dolore sanguinis fluxiones largæ fiunt. Quibus ex lumborum dolore, recursus ad caput, &
- B** manus torpidæ, & oris ventriculi dolores, & aurium sonitus, his sanguis large profluet. Sed & alui his deorsum erumpit, & mens turbata est ut plurimum. Ex dorsi dolore ægritudinis principia difficilia sunt. In lumborum dolore pertinaci, & ampliore alui subductione, à veratro vomere spumosa multa prodest. Spiæ distortionem ac spirandi difficultatem, sanguinis fluxio soluit. In lumbis dolentibus oris ventriculi dolores insuper accedentes, signa sanguinis fluxionis sunt, etiam prægressæ. Affectiones ex lumbis ad collum & caput transeuntes levis siderationis modo resoluentes, convulsoriæ, mentis emotoriæ sunt. Num tales etiam soluuntur convulsionibus? Aut taliû alui ægrotant per eadem prodeuntia? Ex lumborum doloris recursu, oculorum distortio, malum.
- C** Dolor in pectus firmatus torpore, malus in febre est. Hi repente pereunt. Ex lumborum dolore recursiones ad os ventriculi febriculosa, horrorem inducentes: Sic affecti reuomentes tenuia aquosa, mête moti, voce destituti, nigrorum vomitu facto moriuntur. Diuturni circa lumbos, & tenue intestinum dolores, & ad præcordia dolores, si ægri cibos auersentur vnâ cum febre, his dolor intentus ad caput progressus, repente ipsos occidit convulsorio modo. Quibus lumborum dolor est, hi male habent. Num his tremores fiunt, & circuli rubicundi in tibiis in rigore? Nû lumbos dolentibus, cibos fastidientibus, non vomentibus, modice ferociter mente motis, spes est nigra proditura esse? Lumborû dolor in ventriculi os dolente, cum excreatione violenta, habet quid convulsorium. Rigor vnâ cum indicatione ali-

HIPPOCRATIS

quatenus horrendus est. Lumborum dolor sine causa manifesta saepe impetens, maligni morbi signum est. Lumborum dolor cum sopore anxio, malus est. Lumborum distentio ex muliebrium mēstrui multitudine, ad suppurationem tendit, & varie prodeuntes viscosi, graueolentes, strangulatorij menses ex prædictis, ad suppurationem tendunt. Arbitror autem tales etiam aliquantum delirare. Quibus lumborum dolor, & lateris, sine causa manifesta, hi regium morbum incurrunt. Perfrigerationes ex sanguinis eruptionibus in diebus indicatoris vehementes, pessimæ sunt.

Vice versa sanguinem erumpere, malum est. velut in splene magno ex dextris. & circa præcordia eodem modo se res habet. Vulnere sanguinem fundentia, insuper rigentia, maligna. Sic affecti loquentes latenter moriuntur. Affectiones quæ quinta die sanguinem large fundunt, sexta insuper riguerunt, septima perfrigerata fuerunt, & repente recalescunt, in his alui male afficiuntur. Post sanguinis eruptionem, nigrorum per aluum egestio, mala. Mala autem sunt & rubicunda valde & æruginosa. Quarta die tales fiunt sanguinis eruptiones. Soporosi ex talibus conuulsi moriuntur, nigris prægressis, & vêtre tumefacto. Post sanguinis eruptiones, & nigrorum egestionem, in acuto surditas, malum. Sanguinis egestio his perniciofa. Surditas autem soluit. Quibus sanguinis eruptiones plures, his temporis progressu alui male afficiuntur, si non vrina concocta prodierit. Num & aquosa vrina tale quid significat? Quibus ex sanguinis eruptione larga frequenti, multa fit alui cum nigris egestio, ea autē suppressa, sanguinis fluxiones: hi aluum dolent. vnà vero cū quibusdam flatibus, facile tolerant. Num tales multis frigidis sudoribus exudant? Conturbata in his vrina, mala non est: neque id quod genituræ simile in ipsa residet, verum plerumque hi aquosa mingunt. Quibus de naribus in surditate ac torpore pauca destillant, habent quid difficultatis. Vomitus his conducit, & alui perturbatio. Magnæ in principiis sanguinis eruptiones, circa refectionem aluos humectant. Fluxiones ex naribus largæ per vim suppressæ, quandoque conuulsionem prouocant. Venæ sectio soluit. Vndecima die fientes sanguinis stillationes, difficiles sunt, tum alias, tum si his superstillauerint, & rursus stillauerint. In sanguinis fluxione

- A** xione multa, aut singultus, aut conuulsio, mala est. In his qui decolores vsque ad septem annos vires recolligunt, & spiritus in viis acervatus, & terræ concupiscētia, sanguinis corruptionem ac exolutionē significat. In morbis longis paruae comparentes sanguinis fluxiones, perniciosae sunt. Vertigines ab initio sanguinis narium fluxio soluit. Ex naribus erumpente sanguine, cum exiguis sudoribus perfrigescentia, maligna sunt. Sanguinis detractio in perfrigeratione torpida, mala est. Qui aluo suppressa sanguinem effundunt, & una cum sanguinis effusione insuper rigent, his aluum velut ex intestinorum leuore lubricam haec faciunt, itemq; durat, & ascaridas, aut ambo. Sanguinis fluxiones statis temporibus fientes, siticulosae, si sanguinem non effuderint, comitialis morbi mortem inducunt. Ex haemorrhoidae parū apparente, vertigines obortae, paruam ac modicam fiderationē significant, soluit venae sectio. & quicquid hoc modo apparuerit, mali aliquid significat. Palpitantes per totum, num etiam voce intercepta moriuntur? Tremores conuulsorij fiētes in sudoribus, reuerti solent. Iudicatio his fit, vbi super-riguerint. Super-rigent autem hi ardore circa ventrem prouocati. Somnus inultus in his conuulsorius, & ad frontē grauitates, & mictio difficilis. Cōuulsiones antea non cognitae in strangulatis ab utero, faciles sunt. Conuulsoria sine sudore sputa defluentia in febriēte, leuia sunt, His insuper alui aliquantum humectantur. fortassis autem & ad articulos aliquid abscedet. Quibus conuulsis oculi intente relucēt, neque apud seipsos sunt, & diutius aegrotant. Quae conuulsorio modo exacerbantur, cum stuporis detētionē, abscessus iuxta aurem excitant. Tremulis, anxiosis, parui iuxta aurē tumores conuulsionem significant, aluo male affecta. Cōuulsiones & tetanicas distentiones febris accedens soluit.
- Conuulsio ex vulnere lethalis est. Conuulsio in febre fiens, perniciosa est. Minime vero pueris. Seniores septem annis in febre nō corripiuntur conuulsione. Sin minus, perniciosum est. Conuulsionem soluit febris superueniens acuta, quae prius non fuit. Si vero fuit prius, iam exacerbata, Prodest & urinae transitus vitri speciem referens, copiosus, & alui fluxus, & somni. At repentinas cōuulsiones soluit febris, alui fluxus. In cōuulsionibus vocis interceptio diu durās, mala est;

HIPPOCRATIS

mala est: parua autem, aut linguæ sîderationem, aut brachij, **D**
 aut dextrarum partium significat. Soluitur autem vrinis mul-
 tis acruatis derepente prodeuntibus. Sudores autem paula-
 tim sientes profunt. Aceruati vero, itemque sanguinis detra-
 ctiones acruatæ lædunt. In distentionibus & ante & re-
 tro sientibus, & in tergû solû cõtinentibus, si maxillæ solu-
 tur lethale est. Lethale est etiã sudare in distentione in dor-
 sum siente, & corpus dissolui, & in eadẽ affectione reuomere
 per nares, aut clamare, aut nugari, si ab initio vox intercepta
 fuit. In posteram enim diem mortẽ significat. Febriles in
 dorsum distentiones, vrinæ genituræ similes soluant. An-
 ginæ quæ neque in collo, neque in faucibus, quicquam con-
 spicuum faciunt, verum suffocationem vehementem ac spi- **E**
 randi difficultatem inducunt, eadem die & tertia occidunt.
 Quæ vero tumores & ruborem in collo accipiunt, in cæteris
 quidem consimiles sunt, verum diuturniores. Quibuscumque
 vero & fauces, & ceruix, & pectus, simul rubuerint, diutur-
 niores sunt, & ex ipsis maxime seruantur, si non recurrerint
 rubores. Si vero dissipentur, neque tuberculo foras conuerso
 ac collecto, neque pure leniter ac sine dolore excreato, ne-
 que in diebus indicatoriis, perniciosæ sunt. Num etiam sup-
 purati sunt? Securissimum autem est ruborem & abscessus
 quàm maxime foras verti. Erysipelas vero foris quidem ac-
 cedere, commodum est, intro autem conuerti, lethale. Con-
 uertitur autem intro, quum disparente rubore pectus grauæ-
 tur, & difficilem spirationem habet. Quibus vero anginæ ad **F**
 pulmonem vertuntur, partim in septem diebus pereunt, par-
 tim euadentes suppurati sunt, si non educio pituitosa sur-
 sum ipsis fiat. Quibus per pulsationis venarum vehemen-
 tiam, sterqus derepente per aluum secedit, lethale est. In
 anginis sputa gracilium subarida, malum. Anginosi in lin-
 guis tumores, citra signa disparentes, perniciosi: & dolores
 disparentes citra manifestam causam, perniciosi sunt. In
 anginis qui non breui concocta exspuunt, perniciosè habet.
 In angina dolores ad caput, citra notas, cum febre, perni-
 ciosi. In angina dolores ad crura, citra notas, cum febre,
 perniciosi. Ex anginis citra indicationẽ præcordij dolor,
 cum impotentia ac torpore sient, occidit occulte, etiã si valde
 mansuete se habere putent. Ex anginosis citra notas atte-
 nuatis,

A nuatis, dolor ad pectus & ad aluum progressus concitatus, pus egerere facit, alias autem eius qui exoluitur tale est. In anginis omnia pernicioſa ſunt, quæ non manuſtum dolore faciunt. Sed & ad crura dolores diuturni procedunt, & difficulter ſuppurantur. Ex angina ſputa viſcoſa, craſſa, valde alba, quæ violenter educuntur, mala ſunt. Et omnis eiufmodi maturatio, mala. Purgatio multa deorſum, tales levis ſiderationis modo perimit. Ex angina, ſubarida frequentia ſputa, cum tuffi, lateris dolorem inducentia, pernicioſa: itemq; ea quæ inter potandum per tuffim ſubemergunt: & deglutitio violenta, mala. Pleuritici quibus in principio ſputationes penitus purulentæ ſunt, tertia die moriuntur, aut quinta. Si vero has effugerint, non multo melius habentes, ſeptima, aut nona, aut vndecima ſuppurari incipiunt. Quibus ſupra

B aurem rubor, & ſimiliter veluti pleuritici caleſcunt, & aliis bilioſis ac graueolētibus exturbatur, hi vigefima ac quadregefima die periclitantur. Vbi vero has effugerint, ſeruantur.

Pleuritides ſiccæ ac ſine ſputo difficilimæ ſunt. Horrendæ quoq; hæ in quibus dolores ſuperne ſunt. Pleuritides ſine cōuulſionibus, grauiores ſunt his quæ cū cōuulſionibus ſūt.

Quibus pleuriticis in principio lingua bilioſa fit, hi ſeptima die iudicantur. Quibus autem tertia aut quarta die, circa nonam. Bulla ſubliuida ſente in lingua, in principio, qualis eſt ferri tincti in oleum, difficilior ſolutio contingit: & iudicatio quidem ad decimumquartum diē peruenit, ſanguinem autem plerunque ſpuunt. Sputum in pleuriticis

C tertia die maturari ac exſpui incipiens, citiores ſolutiones facit, verum poſterius, tardiores. In doloribus pleuriticorum commodum eſt aluum molliri, ſputa colorari, ſtrepitus in pectore non fieri. vrinam bene procedere. His autem contraria, difficilia ſunt: itemq; ſputū dulce fieri. Bilioſæ ſimul & ſanguinæ pleuritides, plerunque nona aut vndecima die iudicantur, & maxime ſanantur. Quibus autem pleuriticis in principio quidem dolores molles ſunt, quinta vero aut ſexta die exacerbantur, hi magis ad duodecimā perueniunt, & non valde ſeruantur. periclitātur autem maxime ſeptima die ac duodecima. Vbi vero bis ſeptem dies effugerint, ſeruātur. Quibus pleuriticis ſtrepit⁹ ſputi multus in pectore eſt, & facies triftis, & oculus morbi regij colore infectus, ac

caligi-

HIPPOCRATIS

caliginosus, hi pereunt. Qui ex pleuritide suppurati sunt, in quadraginta à ruptione diebus expuunt. Sputum in omnibus pleuriticis ac peripneumoniacis facile ac cito expui conuenit, & flauum sputo ammixtum esse. Quod vero longe post dolorem educitur flauum, aut non mixtum, & multam tussim inducens, malum est. Prauum autem penitus est flauum meracum, & viscosum, & album, & rotundum, & cum virore pallidum valde, & spumosum, & liuidum, & æruginosum. Peius autem aliquanto est id quod ita meracum est, ut nigrum appareat. At sanguine nō multo permixtum flauum, in principio quidem salutare est, septima vero die, aut posterius, minus tutum. Sanguineum vero valde, aut liuidum, statim in principio periculosum est. Præua sunt etiam sputa spumosa, & flaua, & nigra, & æruginosa ac viscosa, & quæcunque cito colorantur. At mucosa ac fuliginosa, & cito colorantur, & securiora sunt. Quæ vero intra quintum diem ad coctionem colorantur, meliora sunt. Omne porro sputum non soluens dolorem, malum est: soluens autem, bonum. Quicumque vero cum bilioso purulentum educunt, aut seorsim, aut permixtum, plerumque decimaquarta die moriuntur, si non mali aut boni quippiam ex præscriptis superueniat. Sin minus, pro ratione, maxime autem his quibus eiusmodi pus septima die incipit. Bonum vero est & in his & in omnibus circa pulmonē morbis, facile ferre morbum, à dolore liberatum esse, sputum facile educere, bene spirare, & sine siti esse, & totū corpus æqualiter calefcere, ac molle esse. Et ad hæc somnos, sudores, vrinas, alui egestiones, bonas esse. Mala autē sunt his cōtraria. Si quidem igitur omnia bona ad hoc sputum accesserint, seruari homo poterit. Si vero partim affuerint, partim non, nō ultra decimū quartum vita producta peribit. Quod si contraria signa accedant, citius etiam. Quicumque vero dolores in his locis non sedantur, neque ad exspuitiones, neque ad venarum sectiones, ac victus rationes, suppurantur. Quibuscumque autem ex peripneumonia abscessus circa aurem, aut ad infernas partes fiunt, & suppurantur ac fistulantur, hi superstites euadunt. Fiunt autem his quibus & febris, & dolor affuerit. & sputum pro ratione non prodierit, neque biliofa alui egestiones, solutuque faciles ac meracæ fiunt, neque vrina crassa valde, & multam subsidentiā habens; & alia salutaria

- A** lutaria habuerint. Fiunt autem ad infernas quidē partes, his quibus circa præcordia inflammatio fit: ad supernas vero, quibus præcordium molle & doloris exors fuerit, & ubi per tempus aliquod difficulter spirauerint, ac citra manifestam causam cessauerint. At abscessus ad crura in periculosis inflammationibus pulmonis, omnes quidem commodi sunt, optimi autem, sputo purulento pro fluo fiente. Non procedēte vero sputo secundum rationem, neque vrina bonam subsidentiam habēte, periculum est claudum fore hominem, aut multum molestiarum exhibitura res est. Si vero recurrerint abscessus, febre consequente, & sputo non procedente, periculum est ne moriatur ac deliret. Quicumque vero peripneumonici non purgati sunt iudicatoriis diebus, sed mēte moti quatuordecim dies effugerunt, eos periculum est suppuratos fieri.

Peripneumoniæ ex pleuritide trāsmutatæ, securiores sunt his quæ ab initio sūt. Corpora exercitata ac densa citius à pleuriticis ac peripneumonicis morbis pereunt q̄ inexercitata. Grauedines & sternutationes in morbis circa pulmonem, & antecessisse, & succedere, malū est. Reliquis autē sternutatio non incōmoda est. Peripneumonicis quibus lingua tota alba ac aspera fit, ambæ pulmonis partes inflammatae sunt. Quibus vero dimidium, vna iuxta quam apparet. Et quibus ad vnā clauiculam dolor fit, his superna pulmonis ala vna ægrotat. Quibus autem ad ambas clauiculas dolor fit, ambæ supernæ pulmonis alæ ægrotant. Quibus iuxta

C mediam costam, media. Quibus ad discriminationem, inferna. At totam vnā partem dolentib⁹, omnia iuxta hanc partem dolent. Siquidem igitur aortæ appellatæ, vtrinque appendentes pulmonis partes, valde inflammatae sunt, vt ad latus affideant, hac corporis parte resoluuntur, & liuores foris circa costam habent. Hos autē veteres ictos, siue syderatos vocabant. Si vero non valde inflammatae sunt, vt non affideant, dolor quidem fit, per totum, nō tamen resoluuntur, neque liuores habent. Quibus vero totus pulmo inflammatus fuerit, vnā cum corde, vt ad latus allabatur, hi toti resoluuntur, & iacet æger frigidus, sensus exors. Moriturque secunda aut tertia die. Si vero etiam sine corde cōtigerit, minus diu viuunt. Quidā autē etiā seruantur. Qui suppurati sunt, maxime ex pleuritide ac peripneumonia, eos calores comitantur,

tur, interdiu tenues, noctu vehementiores, & nihil memora-
 tu dignum spunt, & circa collum ac clauiculam sudant, & o-
 culi caui fiunt, maxillæ vero rubent. digiti summi deterius ca-
 lescunt ac asperantur. Ungues curuantur, ac perfrigerantur, & cir-
 ca pedes tumores habet, & circa corpus pustulas, & abstinet
 à cibis. Diuturnæ igitur suppurationes, signa hæc habent.
 Quæ vero breui rumpuntur, ex notis ad eas consequentibus
 cognoscere oportet, & ex doloribus in principio. Simul autē
 & si aliquāto difficiliter spirauerit homo. Rumpuntur autem
 plurimæ suppurationes, partim vigesima die, partim quadra-
 gesima, partim sexagesima. Quibus igitur dolor in principio
 incumbit intentus, & spirandi difficultas, & tussis cū sputa-
 tione, ad vigesimum diem aut citius, eruptionem expecta.
 Quibus autem leuiora hæc sunt, iuxta rationem. Supputare
 autem oportet tempus, à quo primum doluit, aut grauatus
 fuit, aut febricit, aut si quando rigor corripuit. Necesse est au-
 tem præcedere & dolorem, & spirandi difficultatem, & spu-
 tationem, ante ruptionem. Quibus igitur & febris statim post
 ruptionem decedit, & cibum appetunt, & pus facile educitur
 album, inodorū, leue, eiusdem coloris, & à pituita liberum, &
 alius parua compacta egerit, plerumque breui seruatur. Quos
 vero & febres sequuntur, & sitis, & cibi fastidium, & pus luid-
 dum, aut cum virore pallidum, aut pituitosum, aut spumosum,
 & alius insuper liquida fit, moriuntur. At quibus aliqua ex
 prædictis accesserint, aliqua non, horum aliqui pereunt, ali-
 qui multo tempore seruantur. Qui suppurati futuri sunt,
 primum sanguinosum spunt, deinde dulcius. Quibus in
 pulmone tubercula fiunt, pus educunt ad dies quadraginta
 post ruptionem. Has vero transgredientes plerumque tabidi
 fiunt. In lateris dolore, stillatio sanguinis de naribus, ma-
 la est. Quos suppuratos mitius habentes, sputorum gra-
 uæolentiæ sequuntur, eos recidiva occidit. Qui ex pleuri-
 tici exspunt purulenta, subbiliosa, rotunda: aut purulen-
 ta subcruenta progressu tempore, perniciose habent. Perni-
 ciose item qui nigra fuliginosa spunt: aut quibus velut à vi-
 no nigro sputa fiunt. Quicumque sanguinem spumosum
 spunt, dextrum præcordium dolentes, de hepate spunt,
 & multi pereunt. Quibus dum concutuntur pus cæno-
 sum & graueolens prodit, plerumque pereunt. Quibus à
 pure

A pure specillum coloratur, velut ab igne, plerunque pereunt.

Cum lateris dolore, non tamen pleuritico, & turbulentis tenuibus lenibus, hi phrenitici euadunt. In morbis pulmonis valde rubicundæ sanguinis stillæ, malæ sunt. Cum raucedine, sputa viscosa, saluginosa, mala. Si vero etiâ quid attollatur iuxta pectus, in his malum est. Dolores ad collum his attenuatis perniciosi. Raucedo cum tussi & aluo liquida, pus educit. Quibus in peripneumonia urinæ crassæ in principio, deinde ante quartum diem attenuantur, lethale est. Qui in peripneumoniis siccis pauca concocta educit, horrida res est. Rubores in pectorib⁹ sublatis, talibus perniciosi sunt. Lateris dolor in sputo bilioso, præter rationem euanescent, mentem emouet. Febres intermittentes ob

B suppurationem, pleræque sudorificæ sunt. Suppuratis surditas oborta, eruentam egestionem significat. His ad finem nigra prodeunt. Lateris dolor cum febre diuturna, puris educationem fore significat. Horrore affecti frequenter ad suppurationem deueniunt. Sed & febris tales ad suppurationem perducit. Quos ex lateris dolore cibi fastidia sequuntur, oris ventriculi dolore ac sudore aliquantulum vexantur. Facie flores habente, & aluo liquidior, suppurationes circa pulmonem habent. Erectæ cervicis spirationes facit hydrops siccus. Cōuulsiones omnes quidem molestæ sunt, & dolores in principio intentos inducunt, & postea quoque aliquos commonefaciunt. Verum difficilimæ

C sunt circa thoracem, & maxime periculosa. Quibus est vomitus sanguinis, febris multa, & dolor circa mammam, thoracem, & dorsum; quibus hæc omnia fiunt, breui moriuntur. Quibus autem non omnia, neque valde, tardius. Inflammati autem sunt diebus quatuordecim ad summum. Sanguinem spuentibus confert, ut sint sine febre, & tussiant, ac doleant leuiter, & ut sputum tenue fiat ad dies bis septem. Febrile vero & tussire, ac dolere pertinaciter, & sanguinem recentem semper spuer, incommodum est. Quibus latus subleuatum in tumore ac calidius est, & inclinatis in alterū, grauitas aliqua impendere videtur, his pus ex vna parte est. Suppuratis pulmonem per aluum pus secedere, lethale est. Quicunque vulnerati in thoracem, externa vulneris parte sanati sunt, interna non, periclitantur ne suppurati

sint.

HIPPOCRATIS

fiant. Quibus autem debilis inducta est intus cicatrix, facile refringitur. Ex peripneumoniciis suppurationibus seniores magis pereunt, ex reliquis iuniores. Quibus suppurationis dum concutiuntur, multus strepitus de humeris fit, minus puris habent hi, quàm quibus paucis, si difficilius spirent & meliorem colorem habeant. Quibus autem strepitus quidem nullus fit, verum difficultas spirandi fortis, & vngues liuidi, hi pleni sunt pure, & perniciose habent. Qui spumofum sanguinem vomunt, dolore infra septum transuersum non existente, de pulmone vomunt. Et quibus quidem magna in ipso vena rumpitur, multum vomunt, & in periculo versantur. Quibus vero minor, minus educunt, & securiores sunt.

Quibus tabidis sputum in igne grauem nidorem olet, & capilli de capite fluunt, pereunt. Quibus tabidis in mare expuentibus, pus ad fundum fidit, breui pereunt. Sit autem mare in æneo vase. Quibus tabidis capilli ex capite defluunt, à profluuiio alui moriuntur. Et quibus tabidis alui profluvia accedunt, moriuntur. In tabescentibus sputa suppressa, mentem ad nugas garriendas emouent. His spes est hæmorrhoidè apparere posse. Tabes periculossimæ sunt, à ruptione venarum crassarum, & à defluxu de capite. Aetates periculossimæ sunt ad tabem, ab anno decimo octauo, vsq; ad trigessimū quintum. Pruriginosa corpora post aluum suppressam, in tabidis mala sunt. In habitibus tabescentibus cum febre, fluxiones ad gingiuas & dentes comparentes, malæ sunt. In omnibus in tumorem eleuata præcordia, mala sunt, in tabidis autem pessima. Ex his qui diutina tabe perniciose consumpti sunt, aliqui ante finem rigore apprehenduntur. Pustularum eruptiones velut ferro lancinatae, habitus tabem significant. Difficulter spirantes ex putredine, multa cruda educentes in tabe, perniciose habent. Quibus hepaticis multum est sputum cruentum, siue subputridum, siue biliosum meracum, statim perniciosum est. In hepatico colliquatio cum rauedine, malum, tum aliàs, tum si aliquantulum tussiat. Hepar dolentes, os ventriculi dolentes, soporosi, rigorem habentes, & aluum turbatam, tenues, cibum auersantes, multum exsudantes, purulenta per aluum egerunt. Hepar derepente circumcirca dolentibus, febris accedens dolorem soluit. Qui sanguinem spumofum spuunt, præcordium

A dium dextrum dolentes, de hepate spuunt, & moriuntur.

Quibus hepar vstis, velut amurca prodit, lethale est. Hydropes ex morbis acutis dolorosi fiunt, ac perniciosi. Incipiunt autem pleriq; à laterum mollitudine, aliqui etiã ab hepate. His igitur quibus à laterum mollitudine initiũ sumunt, pedes tument, & alui profluvia diuturna sequuntur, aluum non mollientia, neq; dolores ex lumbis & laterũ mollitudine soluentia. Quibus vero ab hepate, tussis adhuc prompte oboritur, & pedes tumet, & aluus dura egerit, eaq; ad necessitatẽ coacta, & tumores circa ipsam fiut, partim in dextera, partim in sinistra, & rursus sedantur. In hydropicis ficcis, vrinẽ stillicidia mala. Malæ etiã vrinæ paruas subdientias habentes.

B Hydropicis comitialis morbi affectiones accedentes, perniciose sunt, & inter se signa praua sunt, & aluos humectant.

In biliosis aluus turbata, egerens parua genitura similia, mucosa, & dolorem circa pubem inducentia, & vrinæ non facile solubiles prodeũtes, ex talibus in hydropem desinunt.

Hydropico febrienti, vrina parua, & turbata, perniciofa est. In aqua inter cutem incipiente, alui profluuium aquosum fiens, citra cruditatem, morbũ soluit. In hydropes sicco sui significationẽ præmittente, tormina circa intestinũ tenue incidentia, mala sunt. Ex hydropicis comitiales perniciosi. Hydrops qui ad curationem remisit recurrens, desperatus est. Hydropicis circa venas aqua, in aluum prolapsa, solutio fit. Dysenteria intempestiue suppressa, abscessum in costis, aut visceribus, aut in articulis facit. Num igitur

C biliosus abscessus in articulis, sanguineus in costis aut visceribus fit? Dysentericis vomitus biliosus in principio, malus est. Quibus ex dysenteria acuta, humor ad purulentiam deuenit, his id quod superstat, valde album ac multum erit.

Dysentericæ, subrubræ, limosæ, largæ egestionis alui, in flammeis valde rubicundis coloribus solutæ, insanix timorem inducunt. Dysenteria non longa splenicis commoda est, longa vero mala. desinente enim si hydropes, aut intestinorum leuitates fiunt, lethale est. In intestinorum leuitatibus, cum animalculis, dolores tormine soluti, partes circa articulos tumefaciunt, ex talibus squamulæ rubicundæ pustulosæ: hi vbi exudarunt velut flagris cæsi rubescunt. Qui in longis intestinorum leuitatib⁹, vnã cum animalculis, tormi-

HIPPOCRATIS

na patiuntur, & doloribus afficiuntur, his solutis intumescunt. D
 Insuper rigere his malū est. Intestinorū leuitates cū spirā-
 di difficultate, & lateris pūctura, in tabē desinūt. Voluulo-
 fis vomitus, & surditas, malū. Vesicæ duræ & dolētes, om-
 nino quidē malæ sunt, pessimę vero cum febre cōtinua. Nam
 dolores ab ipsis vesicis, ad occidendū sufficiūt, & alui his nō
 valde egerunt. Soluit autem hos vrina purulenta prodiens,
 albam ac leuem subsidentiam habens. His vero non solutis,
 neque vesica mollescente, in primis circuitibus, ægrum mor-
 riturum esse timor est. Fit autem hoc maxime à septem an-
 nis, vsque ad decimum quintum. Calculosi ita figurati, vt
 lapis ad vrinarium meatum non illabatur, facile mingunt.

Quibus tuberculum est circa vesicam, quod mingendi dif-
 ficultatem inducit, ad omnis generis figuras vexātur. huius E
 autem solutio fit, pure erumpente. Quibus vrina clande-
 stine allabitur ad pudendum, exoluuntur desperati. In vri-
 nę stillicidio voluulus accedens, septima die perimit, si non
 febre accedēte vrina aceruatim prodeat. Torpores, & sen-
 sus stupiditates, præter morem fientes, futuræ syderationis
 signum sunt. Qui ex vulnere importētes fiunt corpore, fe-
 bre quidē accedente citra rigorem sanantur; non autē ac-
 cedente, syderati fiunt dextra aut sinistra parte. Syderatis
 si hæmorrhoides accedant, vtile est: Si vero frigiditates &
 torpores, malum. In syderatis ex spiritus ægra latione, su-
 dor accedens, lethale. Rursus autem in his ipsis si febris ac-
 cedat, solutio fit. Syderationes derepente exolutorio mo-
 do fientes, febre insuper temporis progressu accedente, per-
 niciose sunt. Quibus ex aliqua ægritudine, ad aquā inter-
 cutem res deuenit, his alui siccæ excrementa caprini sterco-
 ris pilulis similia egerunt, cum eliquatione mucosa, & vrina
 non bona, & distentiones circa præcordia, & dolores ac tu-
 mores circa vētrem, & dolores circa laterum mollitudinem,
 & iuxta spinæ musculos accidunt: febres item, & sitis, & tus-
 ses siccæ sequuntur, & circa motus spirandi difficultas, & cru-
 rum grauitas, & à cibis abstinent, & paucis ingestis explētur.

Hydropas leucophlegmatias appellatos, alui profluuium
 sedat. At tristitiæ cum silentio, & hominum auersiones, le-
 niter eo modo affectos occidūt. Qui ex timore cum per-
 frigeratione mente mouentur, febres cum sudoribus, & som-
 ni vocem

A ni vocem aliquantum intercipientes, hæc solvunt. Ex insaniam, ad raucedinem cum tussi, fit discessus. In furiosis consilio accedens, dissipationem facit. Mentis emotiones taciturnæ, non quiescentes, oculis circumspicientes, spiritum extra efferentes, perniciosæ sunt. Faciunt autem & leues syderationes diurnas. Sed & ita affecti ad insaniam deveniunt. Qui vero in ventris turbatione ita exacerbantur, his nigra circa iudicationem prodeunt. Quibus sanis hyeme circa lumbos frigiditas, & gravitas ex levi causa, & alvus suppressa, superno ventriculo probe officium suum præstante, his coxendicum morbus, aut rhenum dolor, aut urinæ stillicidium fortassis contigerit. Quibus infernæ partes affliguntur, pruritibus antea fortibus obortis, his arenosa urina fit, & supprimitur. Qui vero ex his perniciosè habent, his mens obtorpescit. Qui circa articulos rubicundas in superficie pustulas habent, insuperque rigorem, hi circa venter & inguina rubescunt, velut ex plagis dolorosis, & moriuntur.

B Morbo regio affecti, non ita subtili sensu præditi, quibus singultus sunt, his alui erumpunt. Fortassis autem & suppressio fit, hi viridanti pallore inficiuntur. Dolores iuxta latus, in febribus tenuiter cōsistentes, citra notas, venę sectio læserit, siue cibum auerfetur æger, siue præcordium sublime habuerit: & in perfrigeratione, nō sine febre torpidus, sanguinis detractio lædit; & putantes se melius habere, hi moriuntur. Caput & pedes, & manus, perfrigerari, alio & lateribus calidis, malum est. Optimum autem est, totum corpus similiter calidum ac molle esse. Conuerti autem convenit facile agrotum, & in attollendo se leuem esse. At gravitas totius corporis, & manuum ac pedum, mala est. Si vero etiā ad grapitatem liuidi fiant digiti ac ungues, mors propinqua est.

C Si vero penitus nigrescant, minus perniciosi sunt liuidis. Verum etiam alia considerare oportet. Si enim facile fert morbum, & aliud quoddā ex bonis signis subindicat, morbus ad abscissum vertitur, & partes corporis nigrescētæ decidunt.

Testes & pudenda reuulsa, malum significant. Flatum sine strepitu ac crepitu prodire, optimum est. Melius autē est & cū strepitu exire, q̄ isthic reuolui, etiam si tali modo progressus, dolorem & desipientiam significet: si nō volens homo vltro flatum ita emittat. Vlcus liuidum & ficcum, aut

HIPPOCRATIS

cum virore pallidum, lethale est. Decubitus optimus est, D
velut quis sanus solitus fuit. At supinum iacere, cruribus ex-
tentis, bonum non est. Si vero etiam delabatur pronus ad pe-
des, deterius est. Lethale autem est & hiare, & dormire sem-
per, & crura supine iacentis valde incuruata esse ac compli-
cata. In ventrem autem decumbere, si quis non sit adsuetus,
delyrium significat, & dolores circa ventrem. At pedes nu-
dos habere & manus, si quis non vehementer calidus sit, & cru-
ra disiecta, malum est. Anxietatem enim significat. Ceterum ere-
ctum sedere velle, malum est in acutis, pessimum autem peripneu-
monicis ac pleuriticis. Dormire vero oportet noctu, inter-
diu vigilare, Contrarium autem malum est. Minime vero lædi
æger poterit, si dormiat mane ad tertiam diei partem, Verum E
postea somni mali sunt. Pessimum autem est non dormire, neq;
die, neque nocte: aut enim præ dolore & afflictione vigila-
rit, aut ab hoc signo delyrabit. Quibus tempora secantur,
convulsio ex contrariis sectioni partibus oboritur. Quibus
cerebrum concussum fuerit & doluerit, percussis, aut alias la-
p-
sis, hi statim voce priuantur, & neq; vident, neq; audiunt, &
plerumque moriuntur. Quibus cerebrum vulneratur, febris
plerumque ac bilis vomitus accedit, & corporis syderatio, atq;
tales perniciose habet. Ex ruptis capitis ossibus, difficili-
ma cognitu sunt ea, quæ circa futuras rupuntur. Rupuntur au-
tē maxime à grauib⁹ ac rotundis telis, & ex his quæ ex subcō-
trario afferuntur, & non ex plano loco. At vero de quibus
ambiguum est, rupta ne sint an non, iudicare oportet, exhi- F
bito ad manducandum in utrâque maxillam asphodeli cau-
le, aut ferula, ita ut animaduertere iubeas, an os aliquod ip-
si strepere videatur. Nam fracta strepere videntur. Progres-
su vero temporis, fracta partim septima, partim decima quar-
ta, partim etiam aliter significationem de se præbent. Nam
& carnis ab osse discessus fit, & os lividum, & dolores sanie
effluente. Hæc autem ægre iam auxilium admittunt.

Quibus omentum excidit, necesse est putrefieri. Si in-
testinum quoddam ex gracilibus dissectum fuerit, non coa-
lescit. Nervus dissectus, aut genæ tenuis pars, aut præpu-
tium, non coalescit. Quodcumque os in corpore rese-
ctum fuerit, aut cartilago, non augetur. Ex vulnere con-
vulsio accedens, mala est. Ex vulnere bilis vomitus acce-
dens

- A** dens malum, & maxime in capitis vulneribus. Nervi crassissimi si vulnerantur, plerunque claudi fiunt, & si obliqui vulnerantur praesertim, & si musculorum capita, maxime in femoribus. Moriuntur maxime ex vulneribus, si quis cerebrum sauciatus fuerit, aut spinalem medullam, aut hepar, aut septum transversum, aut cor, aut vesicam, aut venam crassam. Moritur autem etiam, si in arteriam & pulmonem valde magnae plagae fiant, ita ut pulmone percusso, paucior spiritus per os procedat, quam is est qui ex vulnere elabitur. Moriuntur autem qui in intestina vulnerati sunt, siue ex tenuibus aliquod, siue ex crassis vulneratum fuerit, si per transversum fiat plaga, & magna. Si vero parua & recta, quidam evadunt. Minime vero moriuntur vulnerati in partibus corporis ubi haec non sunt, aut ab his quam longissime absunt. At vero visus obscuratur in vulneribus sientibus in supercilium, & paulo altius. Prout autem vulnus recentius est, maxime vident, cicatrice vero diutius tardante ac senescente, magis obscurari contingit. Fistulae difficilissimae sunt, quae in cartilaginosis & excarnibus locis sunt, & cauae sunt, & procedunt ac sanie manant semper, & caruncula in osculo ipsis inest. Curatu autem faciliores sunt, quae in mollibus & carnosissimis & non nervosis existunt. Morbi hi ante pubertatem non fiunt, peripneumonia, pleuritis, podagra, nephritis, varix circa tibiā, fluxus sanguineus, cancer non congenitus, viriligo leuce dicta non à natura insita, defluxus medullae spinalis, haemorrhoides, voluulus chordapsus appellatus non cognatus. Horum morborum nullum ante pubertatem fore expectandum est. Verum ab anno decimoquarto, usque ad quadragesimum secundum, natura corporis morborum omnis generis ferax fit. Rursus ab hac aetate, usque ad annos sexaginta tres, non fiunt strumae, neque lapis in vesica, nisi prius existat, neque defluxus medullae spinalis, neque nephritis, nisi ex alia aetate comitetur, neque haemorrhoides, neque fluxus sanguineus, nisi prius fuerit. Hi usque ad senectutem absunt morbi. In mensibus muliebribus qui aquosi ante partum prodeunt, mali sunt. Ora feruido aphtharum ulcere affecta, utrum gestantibus, non sunt bona. Num & alui humectantur? Dolores ex laterum mollitudine, ad intestinum tenue transeuntes, in morbis longis, ex corruptione foetus non valde purgata, perniciosi sunt. Quae ex partu ac foetus cor-

HIPPOCRATIS

ruptione multa repente concitata, supprimuntur, difficilia sunt. Rigor his infestus est, & alui turbatio, tum aliàs, tum si præcordium doleant. Vterum gestantibus dolores capitis soporosi, cum grauitate fientes ac conuulsione, plerunque mali sunt. Quibus dolores pertinaces ex mensibus, circa supernam partem, & intestinum tenue, aluos humectant, aliquantum cibos auersantur. His circa iudicationem, delationes in somnum fiunt, & impotentes ex capitis dolore exsulant, ac perfrigerantur. Tales recidiuq; plerisque fientes post remissionem, cito occidunt. Spiritus qui cum suspiriis extra feruntur, & colliquatio præter rationem, in vterum gestantibus abortum facit. Dolor ventris post partum, in his purulenta purgat. Torpidæ, & præsertim in motibus, cum impotentia fractæ, circa iudicationem vexatæ, anxiosæ, multum exsulant. Alui his humectæ, malum. Menses non supprimi commodum est, ex talibus comitiales morbi fiunt, vt arbitror, quibusdam vero ventris subductiones dæturnæ, quibusdam hæmorrhoides. Prægnantibus præcordij dolor, malum. & alui his subeuntes, malum. & insuper rigere his malum. Dolor ventris in talibus, minus malum, si limosa purgentur.

Quæ ex talibus facile pariunt, post partum vehementer molestantur. Prægnantibus tabescentibus quibus rubor in facie fit, stillationes de naribus fientes huc auertunt. Quibus ex partu prodeunt alba, his vero suppressis cum febre surditas, & dolor acutus ad latus fit, mente mouentur, & perniciosè habent. In gestantibus vterum saluginosa, significant post partum molestias ex albis mordacibus. Tales purgationes indurant, singultus in his malum. Ad pedes & ad lumbos distentiones ex mensibus, suppurationem inducunt, itemq; ea quæ de aluo viscosa graueolentia cum dolore prodeunt. Strangulationes quoq; ex præscriptis suppuratione faciunt. Vterinæ in ventriculis duricies dolorosæ acute, perniciosum.

Vterum iam gestantibus ex feruido vlcere fluxiones dolorosæ, malum. Hæmorrhoids his pessimum. Quibus aluo tumefacta, ad pudendum rubor deuenit, mensib. albis humidis derepente progressis, in longis febribus moriuntur. Conuulsionis, si menses in principio apparuerint, febre non accedente, solutio fit. Urinæ tenues cum aliquantula nubecula in medio consistente, rigorem significant. Si à quarta die sanguinis

A sanguinis fluxus fiat, diuturnitate significat, & alius erumpit, & crurum tumores. Vterum gerentibus capitis dolores, soporosi, cum grauitate fientes, mali sunt, fortassis autem his etiam conuulsorium quid pati contingit. Quæ ante partum, iuxta modum bilis sursum ac deorsum erumpētis, doluerunt, facile quidem pariunt, verum si febricitent, maligne habēt; tum alias tum si circa fauces quid vexet, aut aliquod signū in febre malignum appareat. Aquosa ante partus erūpentia, mala. Vterum gestantibus saluginosæ iuxta fauces fluxiones, malum.

Ante partum rigorem habere, & partus circa dolorem, periculosi. Vterum gerentibus ex feruido vlcere fluxiones, malum; conuulsæ, exolutæ, & postea perfrigeratæ excalescunt acute. Sed & difficiles sunt prægnantibus tumores circa tenuē intestinum, quales circa eminētias osculi vteri sunt, erectæ ceruicis spirationem inducentes. Num tales tumores gemellorū partum significant? Num & conuulsionē tales tumores faciunt? Quæ suspiriosum efferūt spiritum in febribus, abortiunt. Horrorem habentibus, lassitudine affectis, capite grauatis, menses erumpunt. Ad manum torpidæ, obaridæ, sitis exortes, menses multos emittentes, suppuratæ sunt.

Alba de repente ex abortu decurrentia, si aliquantum riguerit, & ad femur impetus, in his tremor difficilis est. Ora feruido, aphtha appellato, vlcere affecta, vterum gestantibus aluos humectant. Prægnantes prægrotantes ante partus insuper rigent. Torpescatorix exolutiones difficiles quidem ex partibus contingunt & mentem emouentes, non tamen perniciosæ. Sed & mensium copiā præsignificant. Quæ in partu os ventriculi prædoluere, paulo post eiiciunt. Horrores, lassitudines, capitis grauitates, colli dolores, menses extrudūt. Circa iudicationem tale siens cum tussicula rigorem insuper inducit. Quibus puellis erectæ ceruicis spiratio contingit vterum gestantibus, his mammæ suppurantur, & menses apparere in principio, malum est. Insanix febres acutas turbulentas non bilioso os ventriculi dolenti soluant,

In sterilibus, & non parientibus sanguinis vomitus ad conceptionem prodest. Caligines mensibus multis comparentibus soluantur. Quibus mulieribus ex febris dolor mammarum sit, sputatio cruenta non feculenta oborta, soluit dolores. Conuulsiones ex vtero affecto sine febre faciles

Kk iiij sunt,

HIPPOCRATIS

sunt, velut etiam Dorcadi. Quibus ex rigore febris lassatoria, menses decurrunt. collum in his dolorosum sanguinis eruptionem inducit. Vomitus minime molestus est ex pituita ac bile permixtus. verum ne valde multus vomatur. At meraciores vomitiones deteriores sunt. Prasinus autem vomitus, & niger, & liuidus malus est. Si vero etiam omnes colores idem vomuerit, perniciosum est. Celerrimam autem mortem significat liuidus, & male olens. Est etiam lethalis ruber vomitus, & maxime si cum necessitate dolorosa vomatur. Qui anxie se iacentes, citra vomitum exacerbantur, male habent, itemque qui lancinantur citra vomitum. Parui vomitus biliosi sunt, tum aliam, tum si vigilauerint. In nigris vomitibus surditas non nocet. Pauci sientes, celeres, biliosi, meraci vomitus, mali sunt in alui subductione vberiore, & pertinaci lumborum dolore. Ex vomitibus anxietates, clangores, oculi concretionem lanuginosam habentes, furiosa. Acute insania correpti, voce intercepta, ita affecti moriuntur. In vomitu si quis siticulosus sit, & sitis exors fiat, malum est anxiosus vigilantibus. Abscessus iuxta aurem maxime sunt anxiosi. Alio turbata suppressa, breui velut culicum punctura erumpunt, & ad oculos lachrymosus abscessus deuenit. In meracis vomitibus singultus, malus, mala etiam conuulsio. Similiter etiam in nimis purgationibus ex medicamentis. Qui vomituri sunt, antea sputationes faciunt. Ex veratro conuulsio, perniciofa. In omni purgatione redundante, frigiditas cum sudore, perniciofa est: & qui insuper vomunt, siticulosi in his, malum. Anxiosi, lumbos dolentes, aluo humectantur. Purgationes valde rubicundorum, nigrorum, a veratro, male sunt: & cum talibus exolutio, mala. A veratro vomere rubicunda, spumosa, pauca prodest, facit tamen duricias, & supurationes magnas abducit. Sunt autem hi qui talia vomunt aliam & pectus dolorosi, & in rigoribus exudantes, & testes intumescunt, quod si contigerit insuper rigent, & gracilescunt. Frequentes per eadem recidiuum vomitoria, circa iudicationem nigrorum vomitum faciunt. sicut item tremula. Sudor optimus quidem est, qui febre in die iudicatorio soluit. commodus autem est & qui leuat. frigidus vero, & circa caput solum ac collum fiens, malus est. Nam & temporis diuturnitatem, & periculum significat. At frigidus in febre quidem acuta, lethalis

- A** lethalis est. In mitiore vero, diurnitatem significat. Sudor una cum febre fiens in acuto morbo, malus est. Urina in febre albam habens & leuem subsidentiam firmata, celerem dimissionem significat. Celerem etiam ea quae ex indiscreta, pinguedinem quandam habens, exauescit. At subrubra, & subsidentiam subrubram habens & leuem, si quidem ante septimum diem prodeat, septima die liberat. Post septimum vero, tardius, aut omnino post tempus aliquod diurnus. & quae in quarto die nubeculam subrubram habet, septimo liberat, si reliqua iuxta rationem habeant. Caeterum tenuis & biliosa, & vix tenuem ac exiguam subsidentiam habens, & quae ad melius, ac deterius mutatur, diurna est. Haec autem diurnis consequens, aut temporis diurnitate circa iudicationem fiens, periculo non vacat. Aquosa vero & alba perpetuo, in diurnis morbis difficulter iudicat, & secunda non est. Nubeculae in urinis albae quidem & inferne, comoda sunt; rubicundae vero, & nigrae, ac liuidae, difficiles sunt. Periculosa urina est biliosa, non subrubra, in acutis; & quae crassiores farinae partes refert, albas habens subsidantias; & quae varia est colore ac subsidentia, & maxime in fluxionibus de capite. Periculosa est & quae ex nigra in tenuem biliosam transmutatur: & quae ex subsidentia diuellit: & quae ex coactis innatantibus, subsidentiam habet subliuidam, limosam. Num ex talibus praecordium dolent? dextrum arbitror, aut etiam cum virore pallidi fiunt? & abscessus circa aurem dolentes? His paululum erumpens alius
- C** perniciosus est. Urinae quae derepente citra rationem paulatim concoquuntur, malae sunt: & in summa, quae citra rationem matura est, in morbo acuto, mala est. Mala est etiam valde rubicunda ex his, florulentiam ærugineasam continens. Alba vero & diffusa pellucida urina, mala est, maxime si in phreniticis comparet. Mala est quoque quae post potum cito mingitur, & praesertim pleuriticis ac peripneumonicis. Mala est & quae ante rigorem oleosa mingitur. Malae sunt & in acutis viridantis palloris, non existentes in colore. Perniciosa est urina nigram subsidentiam habens, & nigra. In pueris vero tenuis, magis quam crassa. Verum in tenuibus vice versa quam in crassis. Et grandinosa geniturae similis diffusa, eademque dolorosa. Perniciosa etiam est omnis quae latenter mingitur. At peripneumonicis perniciosa est quae in principio quidem

cocta est, post quartum vero diem attenuatur. Pleuriticis v-
 rina cruenta, caliginosa, cum subsidentia varia, indiscreta, le-
 thalis est plerūque in quatuordecim diebus. Lethalis est item
 in pleuriticis breui prasina, nigram subsidentiam habens, aut
 furfuraceam. Verum in febre ardēti stupefactorio modo de-
 tentis, pessima est vrina valde alba. Vrina cruda multo tempo-
 re manens, aliis signis salutaribus, abscessum & dolorē signi-
 ficat, & magis in partibus sub septo transverso. Si vero dolo-
 res in lumbis oberrarint, ad coxam, & in febre, & sine febre.
 At quæ emittitur vrina pinguedinem habens in subsidentia,
 febrem significat. Cruēta vero in principio mīcta, diuturnā.
 turbata, cum sudore, recidiuam. Alba velut iumētorum, capi-
 tis dolorem, pelliculosa, conuulsionē. Quæ sputo similes sub-
 sidentias, aut limosas habet, rigorem indicat: Quæ aranei te-
 lis similes, colliquationem. At in febribus erroneis nigræ nu-
 beculæ, quartanā indicant. Decolores autem, nigra innatātia
 in medio habentes, cum vigiliis & turbatione phrenitidem.
 puluerulentæ, cū spirandi difficultate, aquā inter cutē. Vri-
 na aquosa aut turbata friabili asperitate, aluū liquidam fore
 significat. Verū tenuis valde vrina si densa fiat, num sudorem
 futurum indicat: iam vero factum, spumosa in seipsam consi-
 dens. In tertianis cum horrore velut nubeculæ nigræ, hor-
 roris inconstantis indicia sunt. Et pelliculosa vrinæ, & cum
 horrore subsidentes, conuulsorix sunt. Vrina bonam, habens
 subsidentiam, derepēte non habens, dolorem & mutationem
 significat. At subsidentiam habens turbata desinens, rigorem
 circa iudicationem. Fortassis autem & in tertianam aut quar-
 tanam transitionem. In pleuriticis vrina subrubram ha-
 bens leuem subsidentiam, securam iudicationem significat.
 Cum leui virore ac pallore florulenta, albam subsidentiam ha-
 bens, etiam celerem. At rubicunda valde & florulenta, subsi-
 dentiam cum virore pallidam, leuem, sinceram habens, diu-
 turnum valde turbulentum morbum qui in alium transmu-
 tatur, non tamen perniciosum. Alba vero aquosa, subsiden-
 tiam crassas polentæ partes referentem, fuluam habens, do-
 lorem & periculum significat: & quæ cum virore pallida est,
 fuluam crassas polentæ partes referentem subsidentiam ha-
 bens, tempus & periculum significat. Vrinæ quæ in his qui
 iuxta aures abscessus habent, cito & modice concoquuntur,
 malæ

A malæ sunt. & perfrigerari hoc modo, malum est. Vesica intercepta tum aliàs, tum cum capitis dolore, habet quid conuulsorium. Quæ in his cū torpore exoliuntur, difficiia sunt; non tamen perniciofa. Num & aliquantum mente mouentur?

Rhenum dolor repentinus, cum vrinx suppressione, calculorum aut vrinarum crassarum mictione significat. Tremores senioribus in febre fiunt, atque sic comparentes, fortassis calculos per vrinam ægris eiciunt. Vrinæ suppressio, & grauitas in imo ventre plerunque stillicidium vrinx significat futurum. Sin minus alium morbum ex quo ægrotare solet. In biliosis vrinx interceptio, breui occidit. Vrina in febre densitatem habens diuulsam, recidiuam aut sudorem significat. In febribus longis, tenuibus, erroneis, vrinarum tenuium mictiones, splenicæ sunt. In febre aliàs

B aliarum vrinarum mictiones, morbum producunt. Vrinæ quæ minguntur à non recordantibus nec commonefactis perniciofæ sunt. Num his minguntur velut si subsidentiam conturbassent? Quibus vrinx pauca, grumosa, non sine febre, copia ex his progressa tenuis prodest. Prodit autem talibus ab initio, aut breui subsidentiam habet. Quibus vrinx cito subsidentiam habent, hi cito iudicantur. Comitiali morbo laborantibus vrinx tenues & crudæ, præter morem, sine repletionem, morbi inuasionem significant, tum aliàs, tum si quis dolor, aut cōuulsio, in summum humerum, aut collū, aut dorsum incidat, aut torpor corporis fiat, aut turbulētum insomnium viderit.

C Parua cōparere, veluti sanguinis stillas, & vrinam & vomitum, & alui egestiones, penitus quidem malum est. Pessimum vero si propinque inter se prodeant. Alui egestio optima est mollis, cohærens ac compacta, subfulua, non valde graueolens, prodiens hora consueta, copia pro ratione ciborum ingestorum. Spissum autem fiat ad iudicationem. Commodum est & lumbricos rotundos exire simul vbi ad iudicationem tendit. In acutis spumosa, circumbiliofa alui egestio, mala est. Mala item valde alba. Adhuc vero peior est, quæ farmæ ac sterquilini speciem refert. Sopor in his malus est, & cruenta egestio, & vacuorum vacuatio præter rationem. Alui interceptio, parua nigra, velut caprarum stercora, ad necessitatem coacta emitteus, natus his erumpens, malum. Viscosa meraca, aut alba

alui

HIPPOCRATIS

alui egestio, mala est. Mala est & abunde multum fermentata, & subpuitiosa. Praua item ex compactis quibusdam innatantibus, subsidentia subliuida, purulenta, cum biliosa. Sanguinem splendidum egerere, malum est, tum alias, tum si quis dolor affuerit. Spumosa, circumbiliosa alui egestio, mala est. Sed & morbum regium ex talibus incurrunt. In biliosis alui egestionibus spumosa florulentia, mala est, maxime ei cui lumbi doluerint, & mente motus fuerit. Num autem his dolores? Tenuis spumosa alui egestio, aquosam cum virore pallidam habens subsidentiam, mala est. Mala etiam purulenta, & nigra cruenta mala, cum febre, & aliis, & varia, abunde bile colorata egestio, mala est, tantoque deterior quantum colore magis horrenda est, preterquam in medicamentorum usu. In hoc enim periculo vacat, si non copia excedat. & tenuis, mollis egestio, in febre mala est. Mala quoque sicca, friabilis, decolor, tum alias, tum si aluum humectet. Nigris vero antea egressis occidit. Liquida alui egestio, & acruatim, & paulatim fiens, mala est. altera enim vigilias, altera exolutionem facere poterit. Liquida subtenuis alui egestio perfrigescens, non sine febre, mala est. Rigores in his vesicam & ventrem corripunt. Aquosa vero valde non desinens in acutis, mala: & magis si etiam sitim non habuerit. Valde rubicunda egestio in alui profluuiio, mala est. Mala quoque valde cum virore pallida, aut alba, aut spumosa, aut aquosa. & parua, & viscosa, & leuis, & cum virore subpallida, mala est. Et soporosis torpescit liquidum egestio, pessima est. Lethale autem & aluum sanguine manare, inulta grumosa egestionem, itemque alba ac liquida, cum ventre in tumorem elevato. Egestio alui nigra velut sanguis, & cum febre, & sine febre, mala est. Mala item omnes variae abunde ex bile colorata. Egestionem desinens in spumosas meracas, omnes quidem exacerbant, conuulsos autem etiam valde. Ex talibus abscessus iuxta aurem emergunt. At quae valde liquidae fiunt, & rursus compactae, meracae, stercoraceae egestionem, longitudinem morbi significant. Valde rubicunda in febre delirium. Alba stercoracea morbo regio difficilis est, itemque liquida quae seposita ruborem capit. In sanguinis eruptionibus viscosa egestio nigris variegata, maligna est, maxime autem valde albidis.

Valde alba egestio in febre, non bene iudicat. Aluus turbulenta

Abulenta paruis frequētibus ad egerendum progressibus, maxillas intendit. Soluit etiam rubores in facie fientes. Stercoracea cum cōtentione egestio, alui afflictionem significat. Pituitosa vero acute cum oris ventriculi dolore, dysenteria: fortassis autem & lumborum dolorem. Talibus alui circumfensio ad necessitatem liquida demittens, citius restitans, habet quid conuulsorium, Insuper rigere his perniciosum est.

Quibus nigra per aluum prodeunt, frigidum sudorem excludunt. Quibus aluus ab initio turbatur, vrina vero paucæ sunt, & progressu temporis aluus quidem siccatur, vrina vero tenuis redundat, his abscessus ad articulos fiūt. Progressus ad egerendum paulatim fientes, horrorem ac rigorem inducunt. & quibus larga fit egestio difficilimum est quartanis incipientibus. Frequentes ad egerendum progressus paulatim fientes, pauca stercoracea subuiscosa habentes, cum præcordij & lateris dolore, morbum regium denotant. Num his suppressis hi cum virore pallidi fiunt? Arbitror autem & hoc sanguinem effundere. At dolores in lumbis, in his sanguinem fundentibus, sanguinem egerunt splendidum. Cū sopore, & capitis dolore, calefcere insuper, perniciosum est.

Viscosæ, biliosæ, magis abscessus iuxta aurem faciunt.

Quicumque tumores aluo humecta eleuantur, cum doloribus, malum. Aluo vero suppressa, & nulla alia re nouata, cito rumpuntur, & malignus est. Vomitiones in his malæ & ferinæ. Quibus & flammeis & valde rubicundis solutis, graueolens, larga, subrubra fit, hi ne infaniant timor est. Corpus squallidum aluum male affectam significat, In his valde rubicundæ, instar purulentæ carunculæ, egestionis maxime prodeunt. Ad aluum biliosam mollem stercoracea egerentem, ardores comparentes, tumorem iuxta aurem faciunt.

Biliosas egestionis surditas sedat, & surditatem sedat biliosa alui egestio. Pustulæ serpiginosæ supra inguina, ad laterum mollitudinem ac pubem fientes, aluum male affectam significant. Exolutio dolorem soluens, aluum maxime humectat. Iuxta sedem dolorosæ suppurationes aluum turbat.

Lethales egestionis sunt, pinguis, nigra, liuida cū graueolentia, & biliosa habens in se simile quiddam cicerci aut fabis fressis, aut veluti floridos sanguinis grumos, & quæ odore similis est egestionis infantium, & varia eademque diuturna,

Talis

HIPPO. COACAE PRAENOTIONES.

Talis autem fuerit cruenta, ramentosa, biliosa, nigra, prasina, **D**
& simul, & permutatis vicibus. Lethalis quoque; omnis est quae
sensum aegri fugiens exit. Qui potum difficulter deglutiunt
spiritu tussiente, eructatio subtracta intro reuoluta dolorem
ventris significat. Mala sunt etiam egestionibus valde rubre
æruiginosæ in quartanis. Et tales sanguinis fluxiones soporo-
sæ sunt, ex his conuulsione moriuntur, nigris antea egressis.

Exolutiones alui repentinæ præter rationem, in diuturni-
tate temporis cõsumptis, vna cum vocis tremula interceptio-
ne, perniciosè habent. Tenuis nigrorum egestionibus hor-
rificæ, meliores talibus sunt. Tales profunt maxime in ætate
ante vigorem. Pruriginosæ affectiones omnibus nigrorum
egestionem significant, & vomitum grumofum. Et tremulæ **E**
affectiones cum morfu ac capitis dolore, nigras egestionibus si-
gnificant. Ante tales, vomitus prodit, & ubi vomuerunt, mul-
tæ tales insuper detrahuntur. Quibus in alui turbatione
exacerbatur morbus, circa indicationem nigra inferne pro-
deunt. Ex aluo diutine affecta, vomentibus, biliosis, cibum
fastidientibus, sudor multus cum impotentia repentina, oc-
cidit. In medicamentorum usu, in defluxione, tenuis ab-
de sanguis eliquescent, malum est. Duricies circa ventrem
cum dolore, in febribus cum horrore cibos auersantibus, aluo
parum ad purgationem humectata, non suppurantur. Vna
cum febre aluus turbata salsuginoso modo, soporosos, torpi-
dos, non valde comitatur. Ex aluo liquida lassatos, caput
dolentes, siticulosos, vigilantes, valde rubicunda egestionibus so-
lutos, timor est ad insaniam deuenturos esse, si difficulter spi-
rauerint. Ad hoc ubi quis cum virore pallescit, bene spirare
noxium non est aluo insuper probe egerente. Adustræ e-
gestionibus contentionem habentes, aluum male affectam si-
gnificant. Biliosis aluus turbata, parua, frequenter egeres,
distendunt cum paucis mucosis, dolorem circa tenue inte-
stinum hæc faciunt, & vrinam non facile prodeuntem, ex ta-
libus ad hydropem desinunt. Linguae tremulæ quibusdam
alui eruptionis futuræ signum sunt. Quibus ardor fit, & ad
egressas egestionibus alui, insuper exsudent, his febris exacer-
batur. Ex aluis liquidis perfrigeratio cum sudore, mala.

Ex aluis liquidis, sanguis de gingiuis defluens, lethalis est.
Alui egestio pura superueniens, soluit febrē acutā cum sudore.

Hippo-

A HIPPOCRATIS COI

LIBER DE CAPITIS VVL-

neribus, Iano Cornario medi-

co physico interprete.



Vllum capitis vulnus leuiter contemni debet. Sæpe enim cutis sola contusa ferro, aut alia aliqua re, si non diligenter, & cum quadã cautione curetur: veluti si sanguis cõcretus non expurgetur, aut aliud quiddam negligatur: vlcus incrudescens non parum molestiæ exhibet, & aliquando etiam febrem inducit: & medico quidem nego-

*Cutis capitis læsa pericula-
sa.*

tia, ægroto vero periculum nõ minus affert. Verum hoc multo magis contingit, si caluaria, & cerebri membranę rumpuntur. Quare si non singula hæc diligenter medicus curauerit, sæpe mortis causa existit. Et de his quidem omnibus etiã alibi diximus, sed & nunc dicendum est. Primum igitur capite vulnerato interrogare oportet: per quid vulneratum sit. Deinde quid homo fecerit, quum vulneratus fuit. Postea qua parte vulnus infligum sit. Nam hominum capita nihil inter se similiter habent, neque futuræ capitis in omnibus eodem

*Suturæ capitis diuer-
sæ.*

*Prominē-
tiæ capitis
prioris par-
te.*

loco consistunt. Verum quisquis ex prioris capitis parte prominentiam habet: est autem prominentia, rotunda ossis pars eminens præ alia; huius futuræ consistunt in capite, velut litera græca tau T pingitur. Breuiorem enim lineam ad prominentiam transuersam constitutam habet. alteram vero lineam per medium caput, sed secundum longitudinẽ ad collũ semper habet. Qui vero ex posteriore capitis parte prominentiam habet, huius futuræ etiam contrario priori modo consistunt. Breuior enim linea ad prominentiam transuersa consistit. longior autem per medium caput, secundum longitudinem ad frontem semper constituta est. Quisquis autem ex vtraq; capitis parte, & anteriore, & posteriore, prominentiam habet: huic future sunt similiter constitutæ, velut litera

græca

HIPPOCRATIS LIBER

Suturæ capitatis h. lites ræ similes. H scribitur. Consistunt autem longæ quidem lineæ ad utrâque prominentiam transuersæ. Breuis autem per medium caput, secundum longitudinem ad utranque longam lineâ desinens. At qui neutra parte ullam prominentiam habet, hic futuras habet velut litera græca χ pingitur. Consistunt autem hæ lineæ, altera quidem transuersa ad tempora pertingens, altera vero secundum longitudinem, per medium caput.

Os capitis duplex. Duplex autem est os iuxta medium caput. durissima vero ac densissima suprema ipsius pars existit, & infima quæ est ad membranam. Consimilis est color ossis sub carne. consimilis est color ossis inferne. Secedit autem à supremo ac infimo osse, à durissimis ac densissimis, ad mollius, ac minus densum, & communius, ad duplicatam laminam. Est autem duplicata lamina cauiissima, ac mollissima, & maxime antrofa. Est autē & totum os capitis, excepta valde modica suprema ac infima parte, spongiæ simile & habet os in seipso carunculas similes multas humidas, & si quis ipsas digitis conterat, sanguis utique ex ipsis prodierit. Sūt etiam in osse venulæ tenuiores ac cauiiores, sanguine plenæ. Quod igitur ad duriciam, & molliciem, & cavitatem attinet, sic habet. Quod vero ad crassitudinem ac tenuitatem, hoc modo. Vniuersi capitis os tenuissimum est ac debilissimum, quod est circa sinciput: & carnē paucissimam ac tenuissimam hac parte os in seipso habet: & cerebrum hac capitis parte plurimum subest. Et quia hæc ita se habent, ut & vulnera, & tela æqualia sint magnitudine, & minora: & similiter vulneratus quis sit, & minus: os hac capitis parte & magis cōtunditur, & rumpitur, & magis intro cōtufum cedit. & lethaliora, ac ad curandū, & effugiendā mortem, difficiliora sunt vulnera hac parte, quàm alibi in capite. & ut sint æqualia vulnera, & similiter vulneratus quis sit, & minus: homo ubi etiam alias ex vulnere moritur⁹ est, breuiore tēpore moritur, qui hac parte capitis vulnus habet, quàm qui alia. Cerebrū enim & citissime & maxime iuxta sinciput sentit mala, quæ & in carne, & in osse fiunt. Sub tenuissimo enim osse, ac modica carne, cerebrum est hac parte: & plurimum cerebrum sub sincipite iacet. Cæterum ex reliquis ossibus id quod circa tempora est debilissimum est. Cōmissura enim est infernæ maxillæ ad caluariam, & motus in temporib⁹ sursum ac deorsum, velut articuli: & auditus prope ipsum

Cur uerticis uulnus cæteris periculosius sit.

Cerebri situs.
Tempora cur periculosa.

Ape ipsum est: & vena per tempora extenta est, caua ac fortis.

Omni vero capitis osse robustius est os verticis: & quod *Capitis*
est retro aures, robustius est quàm totum quod in anteriore *qua parte*
parte est. & carnem ampliolem ac profundiorē in seipso hoc *durum est*
os habet. Et sanè his ita se habentibus, si quis & vulneri-

bus, & telis, omnibus æqualibus ac similibus, & maioribus ac minoribus, similiter sit vulneratus, & magis: hac capitis parte os minus rumpitur, & contunditur. & si homo alias moriturus est ex vulnere, si in posteriore capitis parte vulnus habet, diutius durans tempore morietur. In longiore enim tempore os suppuratur, & deorsum ad cerebrum transpuratur, propter ossis crassitudinem: & paucius etiam cerebrum hac

B parte subest: & plures mortem effugiunt plerūque ex his qui posteriore capitis parte vulnerati sunt, quàm qui anteriore. Sed & in hyeme diutius tempore viuit homo quàm in æstate, quisquis etiam alias moriturus est ex vulnere, quacunque capitis parte vulnus habeat. At vero sedes telorum acutorum ac leuiorum, ipsæ in seipsis fientes in osse, & cum fissura, & contusione, ac intro cessione: fiūt autem hæ similiter, & in anteriore & in posteriore capitis parte: ex his mors nō contingit secundum iustitiam, etiam si contingat. Sutura vero in vlcere si compareat, osse denudato, quacunque capitis parte vlcere fiente, debilissimus æger est ad resistendum vulnere ac telo, si in ipsam futuram telū incubuerit: & maxime omnium si telum in sincipite, iuxta debilissimam capitis partem incussum fuerit, & suturæ circa vlcus, si ita contingat, fue-

C rint, & telum ipsas suturas contigerit. Vulneratur porrò os in capite tot modis. Singulorum autem modorum plures species fracturæ in vulnere fiunt. Os vulneratum rumpitur, & ossi fissuram continenti ac ambienti necesse est contusionem accedere, si ruptum fuerit. Nam telum quod os rumpit, idem hoc etiam os, aut magis, aut minus contundit, id ipsum videlicet os, in quo fissuram rumpit. Atque hic vnus modus est. Species autem fissurarum omnigenæ fiunt. Nam & tenuiores, & valde tenues conspicuæ fiūt. Quædam vero neque statim post vulnerationem, neque in diebus, in quibus dolorū utilitas mors homini contingere potest. Rursus autem aliquæ fissuræ crassiores ac ampliores fiūt. quædā vero etiam valde amplæ. Et alię quidem in longiore modū

Varii lesionis modi.

Modus primus.

LI rumpunt-

HIPPOCRATIS LIBER

**Secundus
modus.**

rumpuntur, alia vero in breuiorem. & alia rectiores sunt, alia etiam valde recta. alia vero curuiores & curua ac profundiores. alia autem ad infernam partem, & per totum os. Poterit autem & os in sua ipsius natura contundi, ita vt nulla fissura ad contusionem ossi accedat. Atque hic secundus modus est. Species autem contusionis plures sunt. Nam & magis, & minus contunditur, & altius ac per totum os, & minus in altum ac per totum os, & in ampliore & minorem tum longitudinem, tum latitudinem. Verum harum specierum nullam oculis intuenti cognoscere datur, qualisnam specie existat, & quata magnitudine. Neque enim etiam si sint contusa, & malum factum sit, an contusa sint, oculis videre conspicuum sit, statim post vulnerationem: quemadmodum neque aliqua fissura videri possunt, quae rupto osse procul absunt.

**Tertius
modus.**

Intro etiam cedit os ex natura sua, vna cum fissuris: alias enim non intro cesserit. Nam quod intro cedit, abruptiturque ac frangitur, intro cedit ab alio osse, quod in sua ipsius natura manet. & sic sane fissura adest intro cessioni. Atque hic tertius modus est. Intro autem cedit os per multas species. Nam & maior ossis pars, & minor intro cedit: & magis ac profundius deorsum, & minus ac magis in superficie. Quin & sede teli in osse contingente, fissura utique ad sedem accesserit, & ad fissuram etiam contusionem magis aut minus accedere, necesse est, si quidem & fissura accedat ea parte qua & sedes facta est: & fissura sit in osse continente & sedem, & contusionem. Atque

**Quartus
modus.**

Teli sedes.

hic quartus modus est, in quo sedes teli sit in osse. Sedes autem vocatur, quum manente osse in sua ipsius natura, telum quod in os incubuit, manifestum fecerit ubi incubuit. Verum in singulis modis plures species fiunt. Et de contusione quidem ac fissura, si ambo haec ad sedem accedant, & si contusio sola fiat, iam dictum est, quod multae species & contusionis, & fissurae fiunt.

Haec autem sedes ipsa in seipsa, longior ac breuior sit, & curuior ac rectior, & orbiculatio: & multae aliae species talis modi sunt, prout etiam figura teli fuerit. & eadem etiam profundiores deorsum, & magis & minus, & angustiores, & ampliores. & valde amplae, si dissectione intercisae fuerit. Quanta autem dissectio in longitudinem ac latitudinem fiat, in osse sedes est, si alia ossa dissectionem ambientia in sua ipsorum natura transferant, & non vna cum dissectione intro cesserint ex sua na-

A sua natura. Nam si ita contingat, intro cessio fuerit, & non amplius ossis sedes. Si vero alia capitis parte vulneratur, & vlcus habet homo, & os carne denudatum est, quint^o hic modus est: & hac calamitate vbi facta est, nulla re iuuare queas. Nam si passus est hoc malum, non est quod ex ipso exquirere possis, an passus sit hoc malum, neq; qua capitis parte: & ex his fracturæ modis ad perforationem deuenit, tum si contusio ad visum incōspicua est, tū si aliquo modo manifesta fuerit: & fissura si incōspicua visui fuerit, & ad visum manifesta. Sed & si sede teli in osse fiēte, fissura ac contusio ad sedē accedat: & si contusio sola accedat ad sedē, absq; fissura: hæc quoq; ad perforationem deuenit. At vero os quod ex sua natura intro cessit, parum perforatione opus habet: & quæ maxime intro cesserunt, & maxime fracta sunt, & perforatione minime opus habent. Neq; sedes ipsa in seipsa fiens, absque fissura ac cōtusione, perforatione indiget. Neq; dissectio ipsa, si magna ac ampla fuerit. Dissectio enim & sedes idē sunt.

*Quintus
modus.*

B Cæterum primum spectare oportet in vulnerato, qua capitis parte, & num in debilioribus, vulnus habeat: & capillos considerare circa vlcus, an dissecti sint à telo, & an intus sint in vulnere: quod si est, periculū est os carne nudum esse. Itaque dicere oportet, os aliquam læsionem à telo habere. Atq; hæc longe prius considerasse ac dixisse oportet, antequam hominem contingas. Vbi vero iam contigeris, clare nosse conari, an nudum carne os sit, aut non. & si quidem oculis cōspicuum fuerit os nudum, bene habet: Sin minus, specillo cōsiderato. & si quidem inueneris os carne nudum esse, & non sanum à vulnere, eius quod in osse est dinotionem primum facere oportet, inspiciendo & quantum sit malum, & quo opere opus habeat. Oportet etiam vulneratum interrogare vt passus sit, & quo modo. Si vero non cōspicuum fuerit os, multo adhuc magis interrogationem facere oportet, an habeat quid mali, aut non habeat: & si nudum est os, vt factum sit, & iuxta quem modum. Nam contusiones & fissuras in osse non apparentes, & tamen præsentēs, ex vulnerati responsione cognoscere primum conari oportet, an tale quid passum sit os, aut nō passum. deinde ratione & opere exquirere, citra specilli admotionem. Specilli enim admotio nō indicat, an tale quid mali os passum sit, & an habeat quid in seipso, aut non

*Que cōsu
deranda.*

C passum

HIPPOCRATIS LIBER

*Os quæ pa-
tiatur.*

*Cadentes
de alto &
econtrà
quid pa-
tiantur.*

*Telorum
varietas.*

passum fit. Sed sedem teli indicat specillum, & an intro cef-
serit os ex natura sua, & an vehementer fractum fit os: quæ
etiam oculis conspicua videnti cognoscere datur. Rumpitur
autem os & obscuris fissuris, & manifestis: & cõtunditur ob-
scuris contusionibus: & intro ex sua natura maxime cedit,
quum alter ab altero fauciatur, de industria fauciare volens:
aut quum ex altiore loco fit iactus, aut plagæ ictus, vter tan-
dem fuerit, magis quàm ex plano loco: & si contineat manu
telum, siue iaciat, siue percutiat: & si fortior debiliorem vul-
nerat. Ex his verò qui cadentes vulnerantur ad os, aut in ip-
sum os, is qui ex altissimo loco cadit, & in durissimum ac ob-
tusissimum: huic periculum est vt os & rumpatur, & contun-
datur, & intro cedat ex sua natura. Ei verò qui ex plano ma-
gis loco cadit, & in molliorem, os minus hæc patitur, aut et-
iam non patitur. Quæcunque vero illabentia in caput te-
la, ad os, vulnerant, ex his id quod ex altissimo loco illapsum
est, & minime ex plano, & quod durissimum ac obtusissimū,
& grauissimum ac minime leue est, & quod minime acutum
ac molle: hoc & ruperit os, & contuderit. & maxime sanè pe-
riculum est vt os hæc patiatur, quum & hæc fiant, & è dire-
cto aduersus telum, os fauciari contingat, siue ex manu per-
cutiatur, siue iactum suscipiat, siue quid ipsi incidat, siue ipse
collapsus faucietur ita vt quomodocunque fauciatus, osse
aduersus telum occurrat. Quæ vero tela ex obliquo os sau-
ciant, minus & os rumpunt, & intro ad caput contundunt,
etiã si carne fuerit os denudatum. Nam quædam vulnera
ita inflicta, neque denudant os carne. Profecto ex telis ma-
xime os rumpunt, & manifestis, & obscuris fissuris, & contun-
dunt, & ex natura sua os intro cedere faciunt, quæ sunt ro-
tunda, & orbiculata, & vndiquaque plana, & obtusa, & gra-
uia, & dura: & carnem hæc contundunt, & maturam faciunt,
ac concidunt: & vlcera fiunt à talibus telis in obliquum, Sed
& in circulum, subcaua, & suppurata magis fiunt, ac humida
sunt, & diutius tempore purgantur. Neceffe est enim car-
nes confusas ac concisas: pus fieri ac consumi. At tela ob-
longa, multum tenuia, & acuta, & leuia, carnem magis disse-
cant quàm contundunt, & os eodem modo. Et sedem quidè
inducit id ipsam quod etiã dissecauit. Dissectio enī & sedes
idem sunt. Verum non valde os contundunt talia tela, neq;
rumpunt,

- A** rumpunt, neq; ex natura sua intro cedere faciunt. Cæterū oportet supra conspectum tuum, quicquid tandem apparuerit in osse, etiam de omnibus his interrogationem facere. Nā *Sauciati signa.* magis & minus sauciati signa hæc sunt, si vulneratus soporē altiore incidit, & caligo offusa fuerit, & vertigo, & si ceciderit. Quum autem os carne denudatū à telo fuerit, & circa ipsas futuras vlcus fieri contigerit, difficile est sedē teli deprehendere, quę in alio osse manifesta est, an insit in osse, aut non insit, & an sedes facta sit in ipsis futuris. Occultat enim ipsa futura, asperior existens reliquo osse, & non satis clarum est vbi in ipso futura est, & vbi ossis sedes, si nō valde magna sedes fiat. Accedit etiam ruptio ad sedem, plerunque & ipsa in futuris fiens, & fit etiam hæc ruptio rupto osse deprehensū difficilior, eo quod circa ipsam futuram ruptio fit, si rumpitur, vtp plurimum. Procliue enim est hac parte os rūpi ac dissolui, propter ossis hac parte debilitatem ac raritatē, & propterea quod parata sit futura vt rumpatur ac dissoluatur. Nā reliqua ossa futurā ambientia ruptionis exortia manere possunt, eo quod robustiora sunt quā futura. Verum ruptio circa futuram fiens, etiam dissolutio futuræ est, & non facile est deprehendere, neque si à teli sede fiat in futura, vbi rupta fuerit ac dissoluta. Verum difficilior est deprehendere fissuram ex contusione. Fallunt enim & mentem, & visum medici hæ futuræ, fissuræ speciem referentes, & reliquo osse asperiores existentes, nisi vehemēter dissectæ fuerint ac dissolutæ. Dissectio autem & sedes idem sunt. Proinde si circa futuras vulnus factum fuerit, & ad os telum incubuerit, animaduersionē habere oportet, ac inuenire quod os passum sit. Nam ab æqualibus magnitudine telis, & similib. ac multo minoribus, & similiter & multo minus vulneratus, longe magis malum accipit, qui in osse in futuras telum recepit, quā qui nō in futuras id recepit. Et pleraque horum perforare oportet. Verū ipsas futuras perforare non oportet, sed secedēdo in propinquo osse perforationem facere, si perfores. Porro de curatione vulnerum in capite, & quo modo deprehendere oportet affectiones in capite fientes non manifestas, ita mihi videtur. Vlcus in capite pullo humore humectare conuenit, ac ne vino quidē: neque cataplasmate integere, neque linamēto curationem facere. Neque vero comprimere oportet vlcus

Capitis vlcus qui curretur.

HIPPOCRATIS LIBER

*Vlcera
que secā-
da.*

in capite, si non in fronte fuerit, aut in loco pilis nudato, aut D
circa supercilium & oculum. Hic enim fictia vlcera, cataplas-
matis ac deligatione magis opus habent, quàm in aliis capi-
tis partibus. Continet ac ambit reliquum caput totam fron-
tem, partes autem vlcus ambientes, in quacunque tandè par-
te vlcera fuerint, inflammantur ac intumescunt, propter san-
guinis influxionem. Oportet autem neque ea quæ in fronte
sunt vlcera, per omne tempus cataplasmatibus integere ac deli-
gare, sed postquam inflammatio sedata est, & tumor sedatus,
à cataplasmatibus ac deligatione cessare. At in reliquo capite
vlcus, neque linamentis, neque cataplasmatibus, neque deliga-
tione curare oportet, si non & sectione opus habeat. Secare
autem oportet vlcerebus in capite ac fronte fientibus, qua E
parte os carne nudum fuerit, & læsionem aliquam ex telo ha-
bere visum fuerit. Vlcera vero quæ non habent sufficien-
tem magnitudinem longitudinis ac latitudinis, ad ossis in-
spectionem, an quid mali passum sit à telo, & quale id pas-
sum sit, & quantum caro contusa est, & quantam os læsionem
habet: & rursus an illæsum sit os à telo, & nihil mali passum
sit: & ad curationem, qualinam opus habet vlcus, & caro, &
ossis affectio: talia sanè vlcera sectione opus habent. Si vero
etiam os quidè carne fuerit denudatū, subcaua vero fuerint
vlcera in obliquum, cauitatem quæ plurimum refecare oportet,
vbi nō facile est medicamēto quocunq; peruenire. Sed & or-
biculatiores vlcera, ac plurimū subcaua, etiā ipsa refecare o-
portet, circulo diuisim inciso secundum lōgitudinem pro ho-
minis natura, vt longius fiat vlcus. At vero in capitis sectio-
ne, reliquæ quidè capitis partes securitatem habent dū secā-
tur. Verum tēpora, & adhuc supra tēpora venā, quæ per tem-
pora fertur, secare nō oportet. Cōuulsio enim corripit sectū.
Et si quidem sinistra tempora secta fuerint, dextera cōuulsio
corripit. Si vero dextera secta fuerint, sinistra cōuulsio ap-
prehendit. Quū igitur vlcus in capite secas, ossium gratia
carne denudatorum, scire cupiens an habeat os quid mali à
telo, aut nō habeat, secare oportet vulnus tanta magnitudi-
ne, quāta sursum opus habere visum fuerit. Secantē vero car-
nē ab osse diducere oportet, quæ ad membranā, & ad os exi-
stet. Deinde linamētū per totū vlcus adhibere oportet, quod
vlcus quā amplissimum in posterum diem faciat, cū mini-
mo do-

- A** mo dolore. vbi vero linamentum adhibuisti, cataplasmate v-
tere, quāto tempore etiam linamento, ita vt mazam ex tenui
polenta in aceto subigas, aut coquas, & quā maxime visco-
sam facias. Postridie vero vbi linamentum exemeris, inspecto
osse quod passum est, si nō conspicua tibi sit vulneratio, qua-
lissimā sit in osse: neque cognoscas an os aliquid mali in se
habeat, aut nō habeat: telum autem ad os peruenisse ac læ-
sisse videatur: radere oportet specillo rasorio, secundū longi-
tudinē ac profunditatem pro hominis natura. & rursus si
etiam transversum sit os, ruptionum gratia ad visum incon-
spicuarum, & contusionis obicurræ gratia, quæ non intro cec-
sit ex natura alterius ossis capitis. Indicat enim ipsa ratio ma-
gis, si non etiam aliās conspicuæ fuerint hæ affectiones, ex
B telo in osse existentes. Et si sedem teli in osse videris, tum ip-
sam teli sedem radere oportet, tum ambientia ipsam ossi, ne
sepe ad sedem ruptio accedat, & contusio, aut sola cōtusio, &
deinde lateant, quā non cōspicua existant. Postquam autem
os scalpro raseris, si quidem ad perforationem tendere ossis
saucium videatur, perforare oportet, & citra perforationem
triduum nō excedere, sed in hoc perforare, tum aliās, tum tē-
pore calido, si ab initio curationem susceperis. Si vero su-
spiceris os ruptū, aut contusum esse, aut ambo hæc: cōiectura
facta quod vehementer sauciatus sit, ex vulnerati verbis: &
quod à forti id contigit qui sauciauit, si alius ab alio vulne-
ratus fuerit: & quod telum quo vulneratus est, ex malefico-
rum telorum ordine fuit: deinde q̃ vertigo & caligo iptum
C corripuerit, & quod in soporem profundiorē incidērit, &
quod ceciderit: His ita fientibus, si nō cognoscas an os ruptū
sit, aut contusum, aut ambo hæc, neque aliās videas: super os
aliquid maxime nigri coloris, nigro medicamento liquato
subactum, imponere oportet: & subextento linteo oleo im-
buto super vlcus, & deinde mazæ cataplasmate appposito de-
ligere: postridie vero exoluto ac expurgato vlcere deradere.
Et si sanum nō fuerit, sed ruptum ac contusum, reliquū quidē
os rasum album erit, fissura vero & contusio, quæ nigrū me-
dicamentum eliquatum in seipsam suscepit, in reliquo osse al-
bo nigra erit. Cæterum hanc fissuram conspectam rursus
secundum profunditatem radere oportet. Et si quidē radens
fissuram hanc conspectam nigrā exemeris, & deleueris è cō-
ll iij spectu

*Cum os an
ruptum sit
abigatur.*

HIPPOCRATIS LIBER

spectu sublatam, cōtusio quidem ossis, aut magis aut minus fa- D
 cta fuit, quæ sanè etiam fissuram à scalpro ratorio deletā rup-
 pit. Verum minus horrenda hæc est, & minus negotij exhi-
 buerit, fissura deleta. Si vero in profundo sit, & dum radiatur
 deleri nolit, ad perforationem deuenit hæc calamitas. Sed
 perforare oportet, ac de cætero vlcus curare. Cauere autem
 conuenit vt ne aliquid mali os contrahat ex carne, si male cu-
 retur. Nam & perforato ossi, & aliàs denudato, sed sano: & si
 lesionem aliquam ex telo habeat, & tamen sanum esse pute-
 tur, periculum magis imminet vt suppuratum fiat, etiam si a-
 liàs futurum non esset, si & caro os ambiens male curetur, &
 inflammetur ac constringatur. Ignescit enim, & multa flāma
 impletur. Et sanè os ex ambientib. carnibus in seipsum calo- E
 rem & flammam, & quæcunque mala in seipsa habet caro,
 trahit, & ex his ita suppuratum fit. Malum est etiam humidā
 esse carnem in vlcere, & putrescentem, & ad multum tempus
 purgari. Quare suppuratum quidem quàm celerrime vlcus
 facere oportet. Sic enim ambientes vlcus partes quàm mini-
 mum inflammabuntur, & vlcus citissime purum erit. Necesse
 est enim carnes concisas ac cōtusas à telo suppuratas fieri ac
 consumi. Postquam autem purgatum fuerit, siccius fieri vl-
 cus oportet. Sic enim citissime sanū fiet, sicca carne germi-
 nante, & non humida. Et sic quoque vlceri caro non super-
 increscet. Eadem ratio membranæ circum cerebrum est. Sta-
 tim enim osse perforato & exsecto, ac de membrana detra-
 cto, ipsam denudatam membranam puram quàm citissime ac F
 siccam facere oportet, vt ne vbi ad multum tempus humida
 sit, conputrescat ac in tumorem attollatur. His enim ita fien-
 tibus, periculum est ipsam putrefieri. At vero os quod dis-
 cedere à quouis alio osse oportet, vlcere in capite fiente, &
 sede teli in osse existente, aut aliàs osse plurimum denudato:
 discedit vbi plurimum exangue factum est. Resiccatur enim
 sanguis ex osse, & à tempore, & à plurimis medicamētis. Ci-
 tissime enim discesserit, si quis vlcus quàm citissime purga-
 rit, & de cætero & vlcus, & os, tum maius, tum minus resic-
 cauerit. Quod enim citissime resiccatum ac testaceum factū
 fuerit, ex hoc facto maxime dimittitur ab alio osse, quod san-
 guinolentum ac viuum existit, & quum exangue ac siccum
 fiat, à sanguinolento ac viuo valde discedit. Quæcunque
vero

vero ossa intro contusa cedunt ex sua ipsorum natura, rupta *Ossa fracta*
aut etiam dissecta, valde ampla, talia minus periculosa sunt, *ita quæ*
vbi membrana sana fuerit, & quæ pluribus fissuris & amplio- *minus pe-*
ribus intro rupta sunt, adhuc minus periculosa sunt, & ad de- *riculosa.*
tractionem faciliora fiunt. & nullum ex talibus perforare o-
portet, neq; periclitari ossa auferre conando, priusquam spõ-
te sua emergant, priore forma exoluta. Emergunt autem car-
ne subnascere. Subnascitur autem ex duplicata ossis lamina,
& ex sano osse, si superna ossis pars sola fuerit corrupta. Sic
vero quàm citissime & caro subnasci ac germinare poterit, &
ossa emerferint, si quis vlcus quàm citissime suppuratum red-
ditum, purum faciat. Et si per totum os ambæ partes intro cõ-
tusa cesserint ad membranam, & superna ossis pars, & infer-
na, si quis similiter medeatur, vlcus celerrime sanū erit, & os-
sa quæ intro cesserunt celerrime emergunt ac reuertuntur.

At vero puerorum ossa, & tenuiora & molliora sunt, ea de *Puerorum*
causa, quòd sanguinolentiora sunt, & cana, & neque antrofa, *ossa.*
neque densa, neq; solida: & à telis æqualibus ac debilioribus,
si similiter ac minus fuerint vulnerati, iunioris pueri vulnus,
& magis & citius suppuratur, & in breuiori tempore quàm
senioris: & si aliàs ex vulnere moriturus est, iunior seniore
citius perit. Cæterum si os denudatū carne fuerit, animad-
uersione habita cognoscere conari oportet, si oculis videre
ac noscere non datur, an ruptum sit os, & an contusum, aut so-
lum contusum: & an sede teli facta, adsit contusio, aut fissura,
C ant ambo hæc. Et si quid horū os passum fuerit, detraçio san-
guine, paruo terebello modice & cum cautione, os terebra-
re oportet. Tenuius est enim os, & minus profundum iuue-
nibus, quàm senioribus. Quicumq; vero ex vulneribus in
capite moriturus est, & fieri non potest vt sanus fiat ac serue-
tur, ex his signis dinotionē morituri facere oportet, & quod
futurum est prædicere. Patitur enim hæc. Quum quis os *Moriturus*
fractum, aut ruptum, aut contusum, aut quocūq; modo fractū *signa.*
intelligens, per errorem deliquerit, & neque raserit, neq; per-
forauerit, veluti os non opus habeat, & velut os sanū existat:
ante decimumquartum diem febris corripiet vt plurimum
in hyeme. In æstate vero post septimum diem febris corri-
pit. & postquam hoc factum fuerit, vlcus colorem omittit, &
ex ipso sanies pauca fluit, & quod inflammatum est ex ipso
emoritur,

HIPPOCRATIS LIBER

emoritur, & viscosum fit, & apparet velut falsamentum, colore fuluum, subliuidum. & os tunc corrupti incipit, & fit valde nigrum postremum pallidum aut valde album euadens. Quum vero iam suppuratum fuerit, in lingua pustulae oboriuntur, & desipiens æger moritur, & conuulsio plerisque corripit in altera corporis parte: si quidem in sinistra parte capitis vlcus habeat, in dextra corporis parte conuulsio corripit. Si vero in dextra capitis parte vlcus habeat, in sinistra corporis parte conuulsio corripit. Sunt autem & qui syderati fiunt, atque sic pereunt ante septimum diem in æstate, aut decimumquartum in hyeme. Similiter autem significant hæc signa, & in iuniore, si vulnus existat. Quapropter vbi intellexeris febrē inuadere hominem, & ex aliis signis aliquod ipsi accedere, non cunctari oportet, sed os vsque ad membranam perforare, aut scalpro rasorio deradere. Est enim & ad perforationem, & ad rationem, facile ac expeditum. Deinde reliqua sic curare, prout conducere visum fuerit, respectu ad id quod fit habito. Quum vero in vulnere in capite, homine terebello perforato, aut non perforato, osse autem denudato, tumor rubicundus, ignis sacri speciem referens, accesserit in facie, & in oculis vtrisque, aut altero: & si quis tumorem contingat, doleat: & febris corripiat ac rigor: & vlcus ipsum tum quod ad carnem attinet, tum quod ad os, bene habeat ad aspectum: & ambientes vlcus partes bene habeant, excepto tumore qui in facie existit: & aliud peccatum nullum tumor habeat, quod ad reliquam viæ rationem attinet: Huius infernam aluum deorsum purgare oportet medicamento, quod bilem ducit. & vbi sic purgatus fuerit, & febris dimittit, & tumor sedatur, & sanus euadit. Medicamentum vero dare oportet, ad vires hominis respiciendo, prout robore validus fuerit. Cæterum de perforationis ac terebrationis vsu, vbi ea necessitas ingruat, vt necesse sit hominē perforare, sic statuendum est. Si ab initio assumptam curationem administras, non oportet statim os ad membranam perforare ac excindere. Non enim conducit membranam osse denudatam esse, ad multum tempus male afflictam: sed postremum vbi madore corrumpi ac putrescere ipsam periculum est. Est & aliud periculum, si statim osse ad membranam perforato, ipsum auferas, ne in ipso opere membranam per terebellum

*Medela
huius.*

*Terebra-
tionis mo-
dus qui.*

A rebellum vulneres. Verum terebrantem oportet, vbi iam valde parum abest vt os sit perforatum, & os iam monetur, à terebratione desistere, & sinere vt os sua sponte discedat. Nam in osse perforato, & à perforatione relicto, nihil mali accedere poterit. Tenuē enim iam id quod restat sit, Reliqua vero curare oportet, prout vlceri conducere visum fuerit.

Terebrantem autem frequenter eximere terebellum oportet, caliditatis ossis gratia, & in frigidam aquam immergere. Calescens enim ex circumductione terebellum, etiam os excalfaciens ac resiccans adurit, & maius os perforationē ambiēs discedere facit, quàm aliās discessurum fuisset. Si vero etiam statim volueris vsque ad membranā perforare, &

B postea os auferre, eodem modo frequenter eximere terebellum oportet, & in frigidam aquam demergere. At si non ab initio curationem assumpseris, sed ex alio traditam susceperis, ita vt posterior tarde ad curationem deuenias; terebello exsculpto statim os ad membranā perforare ac excindere oportet, & exempto sæpe terebello speculari: tum aliās, tum per admotum speculum, circumcirca ipsius terebelli viam. Nam multo citius perforatur os, si suppuratum iam ac transpuratum perforaueris, & sæpe contingit vt non profundum os sit, tum aliās, tum si ea capitis parte fuerit vulnus, quatenius magis quàm crassum os ipsum existit. Quare cauere oportet, vt in terebelli admotiōe ne fallaris, verum qua parte crassissimum os esse visum fuerit, in eam semper terebellum admotum adigito, ita vt frequenter confideres, ac cōmoueas os, & eicere coneris. Postquam autē abstuleris, reliqua velut vlceri conferre visum fuerit curato.

HIPPOCRATIS COI

CHIRVRGIAE OFFI-

cina, Iano Cornario

medico physico

interprete.

Aur



Vt similia, aut dissimilia, à principio, à maximis, à facillimis, ab his quæ vndiquaque penitus cognoscuntur: quæ & videre, & tangere, & audire licet: quæ & visu, & tactu, & auditu, & naribus, & lingua, & intelligentia sentire licet: quæ & quibus cognoscuntur, omnibus cognoscere licet. Quæ vero ad chirurgiæ officinam. Aegrotās.

agens. ministri. instrumenta. lumen. vbi, quomodo. quot, quomodo. quando. corpus. vasa commoda. Tempus. modus. locus.

Lux duplex.

Agens aut sedens, aut stans, moderate ad seipsum, ad id quod tractatur, ad splendorem lucis. Lucis igitur species duæ sunt, altera communis, altera artificialis. Communis, in nobis non est. Artificialis, etiam in nobis est. Vtriusque vero duplices usus sunt, aut ad lucem, aut sub lucem. Sub lucem, & modicus usus est, & moderatio manifesta. Ad lucem vero, ex præsentibus, ex conferentibus luminibus, ad splendorem conuertere oportet id quod tractatur; exceptis his quæ aut latere oportet, aut videre turpe est: ita vt id quod tractatur ex aduerso sit luci, qui vero tractat ex aduerso eius quod tractatur, veritamen vt ne tenebras inducat. Sic enim & qui agit videre poterit, & quod tractatur non videtur. Ad seipsum vero, si quidem sedeant, pedes secundum rectitudinem sursum versus è directo ad genua sint, distantia autem parua in consistendo intercedat. Genua autem superiora sint inguinibus modice distantia, pro commoda cubiti positione ac appositione. Vestitus expedite, distincte, æqualiter, similiter, cubitis, humeris.

Quæ chirurgus prospicienda.

Ad id vero quod tractatur, vltra & prope, & sursum ac deorsum, & hac aut illac, aut in medio. Vltra quidem & prope termini sunt cubitorum gibbi, ita vt in anteriorem partem non excedant genua in posteriorem cestas. Sursum vero, vt non supra mammas, summas manus habeat. Deorsum vt non inferius quam vt vbi pectus ad genua habet, summas manus angulares ad brachia figuret, & in medio quidem hoc modo se habet. Hac vero aut illac, vt non extra sedem: sed pro ratione conuersionis & corpus, & operatorem corporis partem producat. Si vero stet, vtrisque pedibus ex æquo insistere satis est.

- A** est. Agere vero oportet ita ut altero pede inscendat, non eo qui est ad manum agentem, genu ad inguem sublato, velut in sede, sed & alij termini iidem sunt. At qui tractatur, reliqua corporis parte tractanti inseruiat, aut stans, aut sedes, aut decumbens, quo quàm facillime ita velut figuram habens perseueret, seruans subfluxionem, subsidentiam, euersionem, decliuitatem. Sic quæ debet seruari & figura, & forma eius qui tractatur in exhibitione, in tractatione, in habitu postea sequente. Vngues neque præminere oportet, neque deficere. Digitorum vertices ad vsum exercere, digitis quidē summis pleraque, indice ad magnum admoto. Tota vero manu prona, ambabus autem aduersis. Digitum extendere cogit
- B** magnum quiddam in medio digitorum positum, & oppositum facere magnum digitum indici. Morbum autem esse manifestum est, per quem etiam leduntur hi quibus ex natiuitate, & educatione, asuevit magnus digitus ab aliis contineri. Opera omnia exercere oportet vtriusque seorsim agendo, & ambabus simul. Similes enim sunt; ambabus coniectando bene, pulchre, cito, non laboriose, concinne, expedite. Instru- *Instrumēta in promptu sunt & ministri.*
- menta quidem, & quando, & qualiter dicetur. Vbi oportet, ut ne quid impediatur opus, neque impedimento sit inter accipiendum circa operantem corporis partem. Si vero alius det, paulo prius paratus sit, & faciat vbi iusseris. Qui vero circa egrotatē sunt, id quod tractatur exhibeant prout visum fuerit. Reliquum autem corpus detineant, ut totum quiescat, tacentes, & præfecto obedientes. Deligationis species duæ *Deligatio duplex.*
- sunt, quæ facta est, & quæ adhuc fit. Quæ adhuc fit, cito, non laboriose, expedite, concinna. Cito quidem perficiendo opera. Non laboriose, facile agēdo. Expeditio vero ad omnia parata est. Concinnitas autem iucunda aspectu est. Ex quibus vero exercitationibus hæc cōtingant, dictum est. Quæ facta est, bene, pulchre. Pulchre quidem, simpliciter, distincte; aut similia ac æqualia, æqualiter ac similiter: aut inæqualia ac dissimilia, inæqualiter ac dissimiliter. Species vero hæ sunt, simplex rotunda in orbem, ascia, sima, oculus, rhombus, & semisecta: ita ut species cōgrua sit speciei & affectioni eius quod deligatur. Eius vero quod bene deligatur, duæ sunt species, roboris quidem, aut compressione, aut copia linteolorum. & partim quidem ipsa deligatio sanat, partim curantibus
- Ligationis species.*

HIPPOCRATIS

Modi ligandi. bus inferuit, Ad hæc igitur lex hæc est. In his autem maxima deligationis vis est. Compressio quidem, ut incumbentia non abscendant, neque penitus innirantur: sed sint quidem firmata, non autem coacta, & minus quidem extrema, minime vero media. **Nexus.** Nexus & filum procedant non deorsum, sed sursum, in exhibitione, & præparatione, & deligatione, & habitu postea sequente. Initia non super vlus iniicere oportet, sed hinc aut illinc facere nexum. Nexum vero neque in semita, neque in opere, neque illic ubi inane est, ut ne in vanum iaceat. Nexum autem & filum, mollia non magna. Hoc tamen probe nosse conuenit, quod omnis deligatio ad declinua & acuminata fugit, velut in capite, ad partem supernam: in tibia, ad infernam. Deligare oportet dexterarum partes, in sinistras: & sinistras, in dexterarum: excepto capite. Hoc vero secundum rectitudinem. Verum contraria ex duobus initiis. Si vero ex vno, ad id quod simile est, ad subtilitatem: velut est media pars capitis, & si quid aliud huiusmodi. Quæ vero mouentur, velut articuli, quæ quidem parte inflectuntur, quàm minimis ac expeditissimis linteis obuoluere oportet, velut poplitem: quæ vero circumtenduntur, expansis ac latis, velut est patella. Circundare quoque insuper oportet, comprehensionis quidem gratia eorum quæ circa hæc sunt, appensionis vero vniuersi deligamenti, in quiescentibus & depressioribus corporis partibus, qualis est & supra, & infra genu. Conuenit autem in humero quidem, circumductio circum alteram alam: In inguine vero, circum alteram lateris mollitudinem: in tibia, supra suram, & quibuscunque sursum contingit fuga, his inferne appensio conuenit: quibus autem deorsum, vice versa. Quibus vero non est, velut in capite, his in æqualissima parte comprehensiones facere oportet, & minime obliquo deligamento uti. Nam stabilissimum postremum circumdatum, vel maxime vagabunda continet. Quibuscunque autem neque comprehensio, neque appensio linteorum, commode se habet: his per filæ appensiones facere conuenit, ex iniectione, aut consusione. Deligamenta sint pura, leuis, & qualia. mollia, tenuia. Obuoluere vero oportet ambabus simul, aut vtrisque seorsum exercere. Conueniente autem deligatione uti, coniectura ad latitudinem ac crassitudinem partium facta. Obuolutionis capita dura, æqualia, distincta sint. In quibus

A quibus autem futurum est ut decidant, ea peiora sunt, quam si cito decidant. Quaedam vero sunt eiusmodi, ut neque comprimere, neque decidere oporteat. Quae vero spectat deligatio, aut subligatio, aut ambo, haec sunt. Subligatio, quidem in causa est, ut aut disparata attrahantur, aut expansa contrahantur, aut contracta diducantur, aut distorta dirigantur, aut vice versa. Preparare autem oportet lintea leuia, tenuia, mollia, pura, lata, non confuta. neque extuberantias habentia, & sana, ut extensionem ferant, & paulo praestantiora, non sicca, sed succo imbuta singulis affectionibus familiari: ad ea quidem quae disparata abscesserunt, ita ut sublimia sedē quidem contigant, non tamen comprimant. Initium autem sumere

*Lintea
qualia.*

B oportet ex sana parte, & ad vlcus definire, quo id quidem quod subest excoletur, aliud autem non amplius colligatur. Deligare autem oportet recta quidem, in rectum: obliqua vero, oblique, in figura doloris exorte, in qua neque constrictionio, neque discessio contingat: ex qua ubi translatio fit ad appensionem, aut positionem, non transmutent, sed similia habeant haec, musculos, venas, nervos, ossa, & bene posita, & bene delecta. Appensa vero aut posita esse conuenit, in figura doloris exorte, quae est secundum naturam. In quibus vero discesserint, vice versa. At quibus expansa sunt, contrahere oportet, quod ad alia quidē attinet eodem modo: ex multo vero temporis spatio interposito contractionem facere oportet, & sensim progressu facto compressionem, primum minime, deinde magis, ita ut terminus quod maxime facta sit, mutuus contactus fiat.

*Deligatio
qualis.*

C Quibus vero contracta sunt, diducere: cum inflammatione quidem vice versa: sine hac autem, preparatione quidem eiusmodi, deligatione vero contraria. Distorta vero dirigere oportet, quod ad alia quidem attinet eodem modo. Verum quae quidem abierunt, ea reducere oportet, subligatione, agglutinatione, appensione. Contraria vero contrario modo. Spleniorum largitudines, latitudines, crassitudines, multitudines. Longitudo, quanta est deligatio. Latitudo, quatuor aut trium digitorum, crassitudo, ut triplices aut quadruplices sint. Multitudo, ut dum circumdantur non excedant, neque deficiant. Quibus vero ad directionem, in longitudinem circumdando, latitudinem ac crassitudinem defectu coniectare oportet, ita ut non acervatim explcamus. At

Splenia.

vero

HIPPOCRATIS

Linteorū vero linteorum subligationes duæ sunt, prima ex loco læso **D**
subligatio ad supernas partes definit: altera ex loco læso, ad infernas.
 Iuxta locum affectum maxime comprimere oportet: Mi-
 nime extremas partes: Reliqua vero pro ratione. Deligatio
Deligamē autem multam sani loci partem occupet. Deligamento-
ta qualia. rum multitudo, longitudo, latitudo. Multitudo quidem, vt
 ne superetur à loco læso, neque per ferulas illisio fiat, ne-
 que pondus, neque circuncirca inclinatio, neque effœmi-
 natio deligamenti contingat. Longitudo vero & latitudo,
 trium, aut quatuor, aut quinque, aut sex, cubitorum quidem
 longitudo, digitorum autem latitudo. Et affulcimenti cir-
 cunductiones tot sint, vt ne comprimant. Mollia vero &
 non crassa sint hæc omnia, pro longitudine, & latitudine, **E**
Ferule. ac crassitudine partis affectæ. Ferulæ porro sint leues, æ-
 quales, iuxta extremitates simæ, hinc atque illinc paulo mi-
 nores delegatione, crassissimæ autem ea parte qua extat fra-
 ctura. Quæcunque vero partes incuruæ sunt & excarnes, in
 his quæ præminent cauendæ sunt, velut circa digitos & mal-
 leolos, aut positione, aut breuitate. Affulcimentis autem ful-
Ceratum, cire ac firmare oportet, non comprimere primum. Cera-
Aquæ. tum molle, & leue, & purum sit. In aqua spectatur calidi-
 tas, multitudo. Caliditas, vt supra suam ipsius manum medi-
 cus affundat. Multitudo, ad laxandum quidem & attenuan-
 dum, plurima optima est. Verum ad incarnandum ac mol-
 liendum, moderata. Moderatio autem in perfusione ea est,
 quod dum adhuc attollitur pars, priusquam concidat desiste- **F**
 re oportet. Primum enim attollitur. Postea vero attenua-
 tur. Positio sit mollis, æqualis, sursum vergens, in emin-
 tibus corporis partibus, velut calcaneo, & coxa, vt neque re-
 frangatur, neque euertatur. Canalem toti potius cruri quàm
 dimidio adhibere oportet. Ad affectionem tamen respicere
 oportet: & reliqua quæ lædere solent manifesta sunt. Exhibi-
 tio vero, & dissentio, & restitutio, & reliqua secundum natu-
 ram fiant. Natura in operibus est. operis actione quid illa ve-
 lit coniectandum est. Ad hæc autem ex quiescente, ex com-
 muui, ex consuetudine. Ex quiescente quidem ac remisso, re-
 ctitudines considerare oportet, velut in manus figura. Ex cõ-
 muni vero, extensionem & inflectionem, veluti figura cubiti
 ad brachium, quæ prope ad angularem accedit. Ex consuetu-
 dine,

A dine, quod non alias figuras magis ferre possunt, velut crura extensionem. In hac enim figura plurimum tempus facillime durarint, nulla facta immutatione. In immutatione vero ex-distensione, similia hæc habent, ad habitum aut positionem, musculos, venas, neruos, ossa, & bene posita, & bene detenta.

Distentio fit maxime circa maxima, & crassissima, ac æqualia, & vbi ambo ossa læsa sunt. Secundo loco vbi subiectū, minime vbi supernum. Si vero magis moderato fiat, detrimētum affert: pueris exceptis. Oportet autem ipsa paululum accliuia habere.

Directionis exemplum, æquiuocum, coniugatum simile, sanum. Defricatio potest soluere, ligare, incarnare, minuere. Dura, ligare. Mollis soluere. Multa, minuire. Moderata, crasse facere.

B Deligare vero oportet, primum vt is qui deligatur, dicat, maxime se compressum esse circa læsam partem, minime circa extremas: & firmatum se esse, non compressum, copia linteorum, non robore: & hac die ac nocte paulo magis, postridie minus, tertia laxè. Reperitur autem postridie in extremis partibus tumor mollis. Tertia vero die deligatum solum gracilius fit, atque hoc per omnes deligationes. Secunda vero deligatione an iuste deligatum apparuerit discere oportet. Hinc autem magis & pluribus comprimatur. Tertia adhuc magis, itēque pluribus. Septima vero à prima deligatione soluta, inueniantur gracilia ossa ac depressa. At vero in ferulas deligata, si gracilia & pruritus exortia, & sine vlcere fuerint, sinere oportet vsque ad dies viginti à læsione. Si vero quid suspectum sit, soluere in medio tempore, & ferulas tertio quoque die firmare.

C Appensio, positio, deligatio, vt in eodem statu sint custodire oportet. Figurarum summa hæc est, consuetudines, naturæ singulorum membrorum, species ex currendo, ambulando, stando, decumbendo, ex opere, ex remittendo. Nam vsus corroborat, ocium autem colliquat. Aut compressione, aut copia linteorum. Quæcunque vero effuso sanguine sugillationes, aut contusiones, aut vulsiones, aut tumores inflammationis exortes, ex vulnere oboriuntur, ad supernam partem plurimum, ad infernam etiam parum deligare oportet, ita vt manum aut crus non habeat in decliue, & initium supra vulnus ponat, ac maxime firmet, minime extremas partes, medio modo medias, vltimam partem ad supernam corporis

Mm partes

Distentio.

Defricatio.

Deligationis modus.

Figura.

HIPPOCRATIS CHIRURGIAE OF.

partes distribuendo, deligatione, cōpressione. Sed & hæc copia, magis quàm robore. Maxime autem his lintea tenuia, leuia, mollia, pura, lata, sana debentur, vtpote sine ferulis: & vberiore perfusione vti oportet. At vero elapiones aut luxationes, aut tortiones, aut distātię disparatę, aut auulsiones, aut abruptiones, aut distortionēs, veluti mutilationes ad alteram partem vergentes, vnde quidem exceſſerūt, remittendo deligare oportet: quò vero exceſſerunt, intendendo deligamentum, vt ad contraria vergāt deligata, etiam priuſquā fuerint deligata, paulò magis quàm vt ex æquo ſint, & deligamentis, & ſpleniis, & appenſionibus, & figuris, extensione, defricione, directione: & hic etiam vberiore perfusione.

Cæterum imminutiones multam sanam partem occupando deligare oportet, vt ex influxione qua colliquata plus quàm ſua ſponte imminuta ſunt, alia deligatione permutata ad augmentum declinent, & carniū efformationem faciant. Melius autem eſt, vt & ſuperna pars ſimul deligetur, velut tibia, & fœmorum, & alterum crus cum ſano crure, quo ſimilius ſit, & ſimiliter quieſcat, & ſimiliter alimentum excludāt, & ſuſcipiant. Linteorum vero copia, non cōpreſſione vtendum eſt, remittēdo primum id quod maxime opus habet, & vtendo defricione incarnante, & perfuſione abſque ferulis.

*Fulcimēta
quibus
aptanda.*

Fulcimenta porrò ac ſtabilimēta adhibere oportet, veluti pectori, coſtis, capiti, & aliis quę eiufmodi ſunt: partim pulſum gratia, vt ne concutiantur: partim etiam diſtantiarum diſparatarum gratia, circa iuncturas, in oſſibus capitis, quo firmentur. Et in tuſſibus, aut ſternutationibus, aut alio motu, qualia ſunt circa thoracem & caput ſtabilimenta. Horum omnium eadē ſunt deligationis commodationes. Qua enim parte læſiones ſunt, maxime comprimendum eſt. Supponere igitur oportet lanam mollem, affectioni conuenientem: deligare vero non amplius comprimendo, vt ne pulſus concutiantur: neque amplius quàm vt diſtantium iuncturarum extremitates mutuo ſe contingant. Neque vt tuſſes & ſternutationes ſiant, ſed vt prohibeantur ſtabilimentum adhibeatur, quo neque cogatur quid, neque concutiantur.

HIPPO-

A HIPPOCRATIS COI LI

BER DE FRACTVRIS,

Iano Cornario medico physi-
co interprete.



Portet medicum & luxationum, *Que medi-
cus in his
præstare
debeat.*
& fracturarum extensiones quàm
directissimas facere. Hac enim ius-
tissima natura est. Si vero quid vel
hac, vel illac inclinarit, ad pronam
partem vergere conuenit. Minus
enim hoc peccatū est quàm ad su-
pinam. Qui igitur nihil præmedi-
tati sunt, plerunque nihil peccant.

Ipse enim qui deligatur manū por-
rigit, vt qui ita à iusta natura cogatur. Qui vero sapientes sibi
videntur medici, hi sunt nimirum qui peccant. Studij igitur
non multi est manum fractam tractare, & quilibet vt ita di-
cam, medicus hoc potest. Verum cogor plura de hoc scribere, *Medicos
imperitos
taxat.*
quòd sciam medicos esse, qui sibi sapientes esse videntur ex
figuris manus in deligatione, ex quibus ipsos indoctos es-
se putare oportebat. Sed enim multa in hac arte hoc mo-
do iudicantur. Quod enim peregrinum est, quum nondum
intelllexerint an bonum sit, magis laudant quàm familiare,
quod iam bonum esse sciunt: & alienum magis laudant quàm
probe notum. Dicendum igitur, quænam medicorum pecca-
ta de natura manus, tum dedocere, tum docere velim. Nam &
aliorū corporis ossium doctrinā hic sermo affert. Manum ita-
que, de qua nobis sermo est, quidam pronam deligādā de-
dit, ille vero cogeabat sicut tenere velut sagittātes, quum hume-
rum iniciunt, atque ita habentem deligabat: hoc ipsum illi
secundum naturam esse existimans, & in testimonium addu-
cebat, tum omnia cubiti ossa, quòd directionem inter se ha-
berent, tum coloris concordiam, quòd ipsa per seipsam recti-
tudinē haberet, idque hoc modo & externa & interna parte.
Hoc modo etiā dicebat & carnes, & neruos, à natura produ-
ctos esse, & artē sagittandi in testimonium citabat. & hæc di-

Mm ij cens

HIPPOCRATIS LIBER

cens ac faciens, sapiens esse sibi videbatur. Verum aliarum artium oblitus erat, & eorum quæ robore, & eorum quæ artificijs operantur ac efficiunt: non animaduertens aliam in alio figuram secundum naturam esse, & in eodem opere alias dextræ manus figuras secundum naturam esse, alias sinistrae, si ita contingat. Alia enim figura in iaculatione secundum naturam est, alia in fundæ iactu, alia in lapidis iactu, alia in pugilatu, alia in quiescendo. Quot vero artes inuenire quis possit, in quibus non eadē figura manuum naturalis est? & in vnaquaque arte, aliter ad instrumentum quod quisque habet, & ad opus quod perficere vult manus figurantur. Ei vero qui sagittandi artem exercet, hanc figuram alterius manus optimā esse consentaneū est. Cardiniformis enim brachij pars, in cubiti sede in hac figura innitens, ossibus cubiti & brachij rectitudinem facit, veluti totum vnum esset. & refraçtio articuli fracta est in hac figura. Verisimile est igitur hoc modo minime flexibilem & rigidissimum esse hunc locum, & non superari, neque remittere, dum à dextra manu neruus trahitur. & sic neruum quidē quā plurimum trahet, à firmissimo vero ac confertissimo emittet. Ex talibus enim sagittarum emissionibus, celeres & vehementiæ, & longinquitates fiunt. Deligationi vero cum arte sagittandi nihil cōmune est. Nam & vbi deligauit, si manum ita habiturus esset, multos utique dolores maiores vulnere adderet: & si flectere iuberet, neque ossa, neque nervi, neque carnes in eodem permanerent, sed superata deligatione aliō transferrentur. Et quæ tandem est figuræ sagittarij utilitas? Et in hac parte fortasse non peccaret is qui sibi sapiens esse videtur, si ipsum vulneratum sibi manum exhibere permitteret. Alius porro medicus supinam manū præbens, ita extēdere iubebat, atque hoc modo habentem deligabat, hanc figuram naturalē esse putans, coniectura ex colore facta: & ossa hoc modo secundum naturam esse existimans, eo quod os eminēs circa manus iuncturā, vbi paruus digitus est, ē directo esse apparet eius ossis, ex quo vnam homines metiuntur. & hæc testimonia adducebat, quod secundum naturā hoc modo figura se haberet. & recte dicere putabatur. At vero si quidem manus supina extendatur, vehementer utique doluerit. Cognoscere autem poterit hoc quisque sua manu ita extenta, quod dolorosa est hæc figura. Nā & debiliior vir, for-

Modus alius deligandi.

tiō rem

A tiores ita manibus suis comprehensum, vt cubiti flexura supina frangitur, quocunq; voluerit duxerit. Neq; enim si gladium in hac manu habeat, eo vti poterit, adeò violēta hæc figura est. Deinde si vbi deligauit quis, in hac figura finat, maior quidem dolor vbi obambularit, magnus autem etiam vbi decubuerit, sentietur. Quin & flectere manum si opus fuerit, omnino necesse est & musculos & ossa aliam figuram habere. Sed & citra reliquam pernitiē, in hac figura hæc ignorabat. Os enim circa iuncturam manus eminēs, iuxta paruum digitum, hoc quidē cubiti est. Quod vero in flexura est, à quo vlnā homines metiuntur, id brachij caput est. Ille vero idem os esse, & hoc & illud putabat: itēmq; multi alij. Est autē idem

B cum illo, is qui cubitus sine cubiti gibbus vocatur, in quē innitimur. Si quis igitur ita supinam manum habeat, tunc & os distortum apparet, & nerui à manus iunctura tendentes, ex interna parte & de digitis, distorti sunt. Tendūt enim hi nerui ad os brachij, vnde vlna mensuratur. Tanta sane ac talia sunt peccata, & ignorantia naturæ manus. Si vero velut ego iubeo, manum fractam quis extendat, os quidem quod est circa paruum digitum, ad cubiti flexuram tendens, in directum conuerteret, rectitudinem vero habebunt nerui à manus iunctura ad brachij summas partes tendentes: & manus dum apensa excipitur, in consimili figura erit, in quali etiam erat dum deligaretur, ita vt neque ambulanti, neque decumbenti, vllus dolor aut fatigatio accedat. Desiderē vero hominē ita

C oportet, vt ossis pars ad clarissimā presentem lucē constitutatur, ne is qui extensionē tractat circa sufficientē directionem fallatur. Nam periti artificis manum admotam, ne os quidem eminens in cōtactu latere poterit. Porro ex cubiti ossibus vbi non ambo fracta sunt, facilius curatio est, si supernum os sauciatum est, etiam si crassius id existat; partim quòd sanū subtentum fundamenti loco ipsi est, partim quòd facilius occultari potest, nisi iuxta manus iuncturam sauciari contigerit. Crassū enim est caro quæ superne innascitur. Infernum vero os ex carne est, & non facile occultari potest, & vehemētiore extensione opus habet. Si vero hoc contritum non fuerit, sed alterum illud, vilior extensio sufficit. At si ambo fracta fuerint, fortissima extensio opus habent. In puero etenim vidi extēta magis quàm oportebat, Verum pleriq; minus quàm

*Cubiti ossa
si fracta
fuerint.*

Mm iij. oportet

HIPPOCRATIS LIBER

Deligatio oportet extenduntur. Conuenit autem facta extensione, vo-
 lis ad motus dirigere : deinde cerato illito non ita multo, vt
 ne deligamēta circumfluent, ita deligare, vt summā manum
 non interius cubiti flexura habeat, sed etiam paulo superius
 ne ad summam partē sanguis influat, sed intercipiatur. Post-
 ea linteo deligare, initio eius supra fracturam iniecto, ita vt
 firmet quidē, non tamen admodum premat. Postquā autē cir-
 cundedit eodē loco bis aut ter, ad supernam partem deligans
 distribuat, quo sanguinis influxiones intercipientur, & illic
 desinat. Conuenit autem prima lintea non esse longa. Secun-
 dorum vero linteorū initium supra fracturam iniicere, ita vt
 semel circumdet eodē loco, deinde deorsum distribuat, & mi-
 nus premēs, & magis traducēs, quo linteam ipsū sufficiens sit,
 ad recurrēdum eo vbi alterum desuiit. Hic igitur lintea ad si-
 nistram, aut dextrā deligētur, aut ad vtrā partē contulerit ad
 fracturæ figuram, & in vtram declinare expedient. Postea ve-
 ro splēnia extēdere oportet modico cerato illita. Nam sic &
 mitius & stabilius se habēt. Deinde sic linteis deligare alter-
 natim, modo in dextrā, modo in sinistram : & plerunq; infer-
 ne initio facto, sursum ducere aliquādo etiam superne deorsum.
 Extremitates autē subaridas, & in acutum abeuntes, splē-
 niis obuolutis curare oportet, ita vt copia opertiorum non
 totū acervatim, sed particulatim corrigat. Insuper autem cir-
 ca manus iuncturā siue articulum laxè circumdare splēnia o-
 portet aliās atq; aliās. Copia vero linteorum sufficiens pri-
 mum, duę partes sunt. Signa autē bene curati, & terminus re-
 ctē deligati, hæc sunt: si interrogaueris ipsum an compressus
 sit, & si compressum quidē se esse dixerit, sed leniter, & maxi-
 me circa ipsam fracturam. Huiusmodi ita facta esse perpetuo
 dicere oportet eum qui rectē deligatur. Signa vero medio-
 critatis hæc sunt. Ea die ac nocte qua deligatus est ipse sibi ip-
 si videatur non minus, sed magis compressus esse. Postridie
 vero tumorem paruum, mollem, ad summam manum abor-
 tum esse. Mediocritatis enim factæ à te compressionis si-
 gnum hoc est. Desinente autem die minus compressus esse
 sibi videatur. Tertia vero die deligamenta laxa esse ipsi vi-
 deantur. Et si quid horum iam relatorum defecerit, nosce-
 re oportet deligationem moderata laxiorem esse. Si vero
 quid ex relatis abundauerit, nosse oportet vltra modum
 compressum

A compressum esse. Et ex his coniectura facta, postea deligans aut laxabis, aut comprimes magis. Resolvere autem oportet tertia die, vbi extenderis. Et si primū moderate deligasti, hanc deligationem paulo magis q̄ illā comprimere oportet, & initia supra fracturā iniicere, quemadmodum etiā antea. Si quidem enim hanc prius deligaueris, sanies ex hac ad extremi- tates hinc atq; illic exhauritur. Si vero aliquā aliam partem prius cōpresseris, in illā ex compressa exhauritur. Intelligē- tia autē ad multa vtilis existit. Sic igitur semper incipere o- portet & deligationē, & cōpressionem ex hoc loco. Reliqua vero iuxta rationem, ita vt quāto lōgius à fractura digressus fueris, minus cōprimas, nunquā quidem laxa omnino circū- dando, sed adhaerentia. Postea vero pluribus linteis deligare oportet in singulis deligationibus. Et si interrogetur, dicat se paulo magis cōpressum esse q̄ prius, & præsertim circa fra- cturā. Sed & alia, & circa tumorem, & circa dolorem, & circa alleuationē, pro prioris deligationis ratione fiant. Postquam vero tertius iā aderit dies, laxiora esse ipsi videātur deliga- menta. Deinde resolvere oportet, & rursus paulo magis cō- primendo deligare, & hoc cū omnibus linteis quibus deli- gandus erat. Et postea omnia ea ipsum apprehendant, quæ etiam in primis deligationum circuitibus contigerant. Vbi vero tertius aderit dies, & septimus à prima deligatione, si quidem recte deligatus fuerit, tumor in summa manu, atque hic non valde magnus erit: locus autem qui deligatur, in o- mnibus deligationib⁹ tenuior ac gracilior comperietur. Ve- rum in septimo etiam valde tenuis, & ossa fracta magis mo- uentur, & facilius ad correctionem ducuntur. Et si hæc hu- iusmodi fuerint, facta coaptatione velut ad ferulas adhiben- das deligare oportet, paulo magis comprimēdo quā antea, si non dolor aliquis maior fuerit ex tumore qui est in summa manu. Postquam autem linteis deligaueris, ferulas circum- ponere oportet, & vinculis quā laxissimis circū dare, quie- tis saltem gratia, vt ferularum appositio ad compressionē ma- nus nihil faciat. Postea vero & dolor, & alleuatio, eodem mo- do fiant, velut in primis deligationū circuitibus. At vero vbi tertio die laxas esse dixerit, tunc postea ferulas firmare opor- tet, maxime quidem circa fracturam, sed & alia iuxta ratio- nem, si quidem & deligatio magis laxa fuerit, quā compri-

*Ferulæ
quando ap-
ponendæ.*

HIPPOCRATIS LIBER

mat. Crassissimam autem ferulam esse oportet, qua parte ex-
 tat fractura, non tamen multum. Et ad hoc studium vel ma-
 xime adhibendum est, vt ferula è directio magni digiti nò po-
 natur, sed hac vel illac; immo neq; à directio parui digiti, qua
 parte os supereminet in manus articulo, sed hac vel illac.
 Quod si ad fracturam conferat, hac parte aliquas ferulas po-
 ni, breuiores ipsas aliis esse oportet, vt ne perueniant ad ossa
 præminencia, iuxta manus articulum. Periculum est enim vl-
 cerationis, & denudationis neruorum. Oportet autem tertio
 quoque die ferulis valde leniter firmare, hoc cogitantes, qd
 ferulæ deligationis conseruanda gratia apponuntur, nò au-
 tem compressionis gratia alligantur. Si quidè igitur pro-
 be noueris, quòd in prioribus deligationibus ossa sufficien-
 ter sunt directæ, & neque pruritus infestèt, neque vlla aliqua
 vlcération suspecta sit: ita cum ferulis deligatum sinere oporteret,
 donec viginti dies trāsgressus fuerit. In triginta enī die-
 bus vniuersis maxime ex toto cubiti ossa corroborantur. Cer-
 tum tamen nihil est. Nam & natura à natura, & ætas ab æta-
 te valde differt. Postquam autem solueris, aquam calidam af-
 fundere oportet, & postea deligare, paulo minus comprimē-
 do quàm antea, & paucioribus linteis quàm prius. Et postea
 tertio quoque die soluere, ac rursus deligare, ita vt min⁹ cō-
 primas, & pauciorib⁹ linteis vtaris. At vero si vbi ferulis de-
 ligatus est, ossa non recte posita esse suspiceris, aut aliud quid
 vulneratum vexet, in dimidio temporis spatio, aut paulo pri⁹
 soluere, & rursus deligare oportet. Victus porro his quibus ab
 initio vlcera non facta fuerint, neque ossa extra eminēt, suf-
 ficit aliquanto simplicior. Verum parciori victu vtendum est
 ipsis, vsque ad diem decimum, vt qui iam etiam quiescant: &
 obsoniis tenellis vtendum, quæ transitui mediocritatem ex-
 hibent. A vino vero & carnis esu abstinendum. Postea tamen
 sensim progressu factio reficiendi sunt. Hic sermo velut lex iu-
 sta posita est de fracturarum curatione, & quomodo tractare
 oporteat, & quomodo euentus sequi, ex iusta tractatione,
 Quicquid vero nò ita euentum habuerit, scire oportet, qd in
 tractatione quid defectuose, aut reduñdanter factū est. Quin
 & hæc insuper in hoc simplici modo cōsiderare oportet, quæ
 non ita valde curare solent medici, & quidem quum omnē
 curationem, & totā deligationem corrumpere possint, si non
 recte

**Victus ho-
 ræ qualis.**

- A** recte fiant. Si enim ambo ossa fracta fuerint, aut infernum solum; is vero qui deligatus est, in fascia quadam manum exceptam ac appensam habeat, & plurima fasciæ pars circa fracturam existit, ita ut manus hinc atque hinc pendeat: hunc necesse est reperiri os ad supernam partem distortum habentē. Si vero sic fractis ossibus, & summam manum in fascia habet, & partem iuxta cubiti flexuram: reliqua vero cubiti pars non sit eleuata; hic ad infernam partem os distortum habere comperietur. Poinde in fascia molli latitudinem habere maximam cubiti partem, & manus articulum, æqualiter suspendere ac eleuata gestare oportet. At vero si brachiū fractū fuerit, si quidem quis extentam manum in hac figura extendat, musculus brachij extentus deligabitur. Postquam autem deligatus cubiti flexuram inflexerit, musculus brachij aliam figuram habebit. Iustissima igitur brachij extensio hæc est. Qui brachij fractum coarctatur.
- B** lignum cubitale aut paulo breuius, qualia sunt ligna quæ in foramina lignonum immittuntur, suspendere oportet, hinc atque illinc catena deligatum. Hominem vero in alta quapiam sede collocatum, ita manu superincumbere oportet, ut lignum id sub ala sit moderate habens, ut homo vix sedere possit, & ferè subleuatus sit, supposito postea alio quopiam fulcimenō, & coriaceo puluino vno aut pluribus subiectis, quo moderatam altitudinem habeat cubitus, ad rectum angulū obliquatus. optimum quidem est corium latum ac molle, aut fasciam latam circundare, & magnum aliquod pondus appendere,
- C** quod moderate intēdere possit. Sin minus, vir aliquis robustus in hac figura cubiti, circa cubiti flexuram deorsum cogat. At vero medicus erectus stans, & alterū pedem in altiore quopiam habens, aggressionem faciat, ita ut volis os dirigat ac componat: facile autem dirigetur. Nam hæc extensio bona est, si quis ipsam recte præparet. Deinde deliget fasciarum principiis supra fracturā injectis: & reliqua omnia, quæ admodum prius monuimus, tractet: & easdem interrogationes faciat. & iisdē signis vtatur, an moderate habeat, aut secus. Et per tertium diem deliget, & magis comprimat. Et septima aut nona die cum ferulis deliget. Et si suspicionem habeat, os non bene positum esse, intermedio tēpore soluat, & ubi probe collocauit, rursus deliget. Corroboratur autem maxime os brachij in xl. diebus. Postquam vero hos excefferit, soluere

Quoto tēpore brachij fractū coalescat.

HIPPOCRATIS LIBER

soluere oportet, & minus comprimere, & paucioribus quoque D
lintheis deligare. Cæterum victum quendam exquisitiorem quã
prius constituere oportet, & ad longius tempus. Eius vero cõ-
iecturam facere oportet, ad tumoris qui in summa manu est
robur respiciendo. Insuper autem & ad hæc animum aduer-
tere oportet: quod brachium à natura ad externam partem in-
curuatum est, & distorqueri solet, si non bene curetur. Sed &
alia omnia ossa, quæ à natura ad hanc partem distorta sunt,
etiam dum curantur ubi fracta sunt, distorqueri solent. Vbi igitur
tale quippiam in suspicionem venerit, lata insuper fascia
brachium circûcirca completi oportet, & circum pectus de-
ligare: & ubi quiescere volet, inter cubiti flexuram & costas,
splenium quoddam multiplex conuolutum ac complicatum E
supponere: aut aliud quid quod huic simile existat. Hoc enim
modo incuruatio ossis recta euadet. Cauere tamen oportet,

*Pes & os
sa eius fra-
cta quæ cu-
rentur.*

ut ne minus ad internam partem vergat. Pes vero homi-
nis ex multis ac paruis ossibus compositus est, quemadmodum
etiam summa manus. Franguntur quidem non ita valde hæc
ossa, si non vnâ cum corpore, ab acuto aliquo aut graui vul-
nerato. Vulnerata igitur quomodo curare oporteat, in vlce-
rationum parte refertur. Si vero quid è loco suo motum fue-
rit, aut digitorum articulus, aut aliud quoddam ex ossibus sum-
mi pedis, vnûquodque in suum locum cogere oportet, quẽ-
admodum & ea quæ in manu sunt. Curare vero oportet ce-
rato, & spleniis, & lintheis velut etiam fracturas, exceptis feru-
lis, eodem modo comprimendo, & per tertium diem deligã-
do. Interrogetur item is qui deligatur similiter, velut in fra-

*Quoto te-
pore hæc
sanescant.*

cturis, & de cõpressionem facta, & an laxa sit deligatio. At ve-
ro sana fiunt in xx. diebus perfecte omnia, exceptis his quæ
cum tibiæ ossibus communionem habent, & cum ipsa è dire-
cto. Conducit autem hoc tempore decumbere. At non tole-
rant continentes mærbum. Verum priusquam sani fiant obam-
bulant: & propterea plurimi non perfecte sanantur, sed dol-
or ipsos sæpe merito commouet. Totum enim corporis
pondus pedes vehunt. Quam igitur nondum sani iter faciunt,
articuli moti male curantur, ideoque alias atque alias hi qui ad
tibiæ sunt dolent. Quæ vero cum tibiæ ossibus communionem
habent & maiora aliis sunt, & ubi hæc mota sunt, diuturnio-
rem medellam requirunt. Curatio tamen eadem est. Verum
lintheis &

- A** linteis & spleniis pluribus vti oportet: Et in totū hinc atque illinc deligare, cōprimere item velut alia omnia, ea maxime parte qua emora sunt, & primas quoq; linteorū obvolutiones eodem modo facere. In vnaquaq; vero resolutione, multa, calida aqua vti oportet. In omnibus enī circa articulos lationibus, multa aqua calida affundenda est. Ceterum cōpressiones & laxationes in iisdē temporibus eadem signa ostendunt, quæ in superioribus: & relaxationes eodē fiant. Sani vero perfecte hi sūt in xl. maxime diebus, si decumbere sustinuerint. Sin minus, eadē patiuntur quæ prius relata sunt, & adhuc amplius. Porro quicumq; saltu de alto quopiā loco facto, in calcaneū vehementer se fulcuerunt, his ossa quidē disparantur, venulæ vero sanguinē effundunt, carne circa os cōtusa, tumor autem accedit, & dolor multus. Os enim hoc parvū non est, & supereminet quidem sub tibiæ rectitudinē, cōmunionem vero habet cum venis ac nervis principalibus. Tendo autem posterior huic ossi annectitur. Hos curare oportet cerato, & spleniis, & linteis, & aqua plurima calida, & linteis pluribus. Et ab his opus est etiam aliis q̄ optimis ac lenissimis. & si quidem mollis fuerit à natura cutis circū calcaneum, sic sinere oportet. Si vero crassa & dura veluti quidā habent, incidere oportet, equaliter, & attenuare, ita tamē vt ne vulneretur. At vero talia bene deligare non cuiusvis est. Si enim deliget quis, quomodo alia circa malleolos deligantur, ita vt aliquando circū pedem, aliquando circum tendinem, fasciæ circūdētur: hæc cōstrictiones calcaneū separāt: qua parte contusio facta est. Atq; ita periculum est, ne calcanei os cōrumpatur, & sanē si corruptum fuerit per omne ævum morbus durare potest. Nā & alia quæ non ex tali modo suat, ipsū cōrumpūt, sed in decubitu denigratō calcaneo, ex figuræ neglectu: aut in tibia vulnere sōnte periculoso, ac diuturno, & cōmunionem cum calcaneo habenter aut in femore: aut vbi ex alio morbo diuturnus decubitus contingit. Attamen & talibus diuturnæ ac moiestæ affectiones sūt, & quæ sæpe refringantur, si nō bona diligentia, & multa quiete curentur. Quare etiā ea quæ ex tali modo cōrumpuntur, supra aliquā lationem, magna corpori pericula inducunt. Febres enim peracutæ oboriuntur, continuæ, tremulæ, singultuosæ, mentem contingentes, paucis diebus durantes ac occiden-

Qui de alto
to desiliunt.

Curatio
horum.

HIPPOCRATIS LIBER

occidentes. Fieri etiam possunt venarum sanguifluarū liuores, venarum nausæ, & cançerationes ex compressione. Fieri autem possunt hæc aliq̃ue alia corruptione. Atque hæc quidem relata sunt, vbi vehementissimæ contusiones fiunt. Plurima tamen leniter circumcirca contunduntur, neque vllum magnum curationis studium exigunt, sed recte tamē tractare oportet. Quū verò vehemens in fulciēdo illisio facta esse visa fuerit, tunc sanè relata facere cōuenit, & deligationē plurimam facere circum calcaneum obuolutam, ita vt aliquando ad summas pedis partes, aliquando ad medias, aliquando ad tibiæ partes, ex opposito lintea obuoluantur. Deligare insuper oportet & vicina omnia, hinc atque illinc, velut etiam prius dictum est, & vehementem compressionem non facere, sed cum multis linteis. Præstat autem & veratrum bibendum dare eadem die, aut postridie: & tertia die resolueret ac rursus deligare. Signa porro an recrudescant, aut non, hæc sunt. Quum sanguis è venis effusus, & denigrationes, & his vicina, fiunt subrubra & subdura, periculum est ne recrudescant. At si quidem febre careat, sursum purgans medicamentum dandum est, velut dictum est: itemque si non continua febre laboret. Si vero continua fuerit febris, medicamentum dandum non est. Verum & à cibis, & à sorbitionibus abstinendum. Potu vero vtendum aqua, non vino, sed fauorum cremore decocto, aut aceto mulso dulci. Si vero non recrudescant, sanguis è venis effusus, & denigrationes, & vicinæ partes, cum virore subpallidæ fient, & non duræ. & bonum est hoc testimonium in omnibus sugillatis, sanguine è venis subter cutem effuso, quod non recrudescant. Quæcunque vero cum duricia liuescunt, ea vt denigrescant periculum est. Cæterum hoc studio habere oportet, vt pes plerumq; paulo altius reliquo corpore habeatur. Sanus autē fieri poterit in sexaginta dieb⁹, si quieuerit. At vero tibia duo ossa sunt, quorum alterum altero hac parte multo tenuius est, illa vero parte non multo tenuius. Cohærent autē inter se iuxta pedem, & appendicem communē habent. Verum in rectitudine tibiæ non cohærent. Iuxta femur autē cohæret, & appendicem habent, & appendix discriminationem. Longius vero paulo alterum os est, quod secundum paruum digitum est. Et talis quidem est natura ossium in tibia. Luxantur au-

Tibiæ ossa

tur autem aliquando iuxta pedem ambo ossa, quandoque cum appendice, quandoque vero appendix tantum emouetur, quadoq; alterum tantū os. Hæc autē minus molesta sunt, quàm ea quę in articulo manus existūt, si quiescere homines sustineāt. Curatio vero consimilis est velut illorū. Nam & repositionē ex extēsiōe, velut in illis facere oportet. Verū vehemētiore extēsiōe opus habēt, quanto fortius est ea parte corpus. Plerūq; tamē sufficiunt viri duo, alter hinc alter illinc extēdentes. Si vero nō satis robusti fuerint, facile est vehemētiore extēsiōē facere. Aut enim rotæ modiolū, aut aliud quid huic simile defodere oportet, & molle quiddā pedi circūdare, & postea latis bubulis loris pede deligato, principia lororū aut ad pistillū, aut ad aliud lignū alligare, ita ita ligno in summū modiolū indito refringere, ita vt alij cōtra extēdant humeris & poplite apprehēsis. potest etiā superna corporis pars necessitate hac extēsiōis vrgeri, partim quidem si ita voles, ligno rotūdo leuigato alte defosso, partem quandā ipsius supereminētē intra crura iuxta ani & scorti intercapedinē applicato, quo corpus sequi prohibeat ad eos qui à pedibus extendunt. Deinde ad crus quod extenditur declinare non oportet, sed aliquem à latere assidere, qui nates retrudat, ne corpus circūtrahatur: partim vero si etiā circa alas hinc atque illinc ligna affigantur, manus autem extētæ feruentur, apprehendat autem quis circa genu, atque ita cōtra extendat: partim item si quis velit, aliis loris circa genu aut circa femur deligatis, & alio rotæ modiololo supra caput defosso, & loris ex ligno quopiam alligatis, & ligno ita in rotæ modiolū defixo, ad contrariam partem his qui à pedibus extendunt, adtrahere potest. Quin & si voles, pro rotarum modiolis trabem mediocrem sub lectum extēdes, deinde ad trabis hinc atque illinc caput ligna fulciens ac refringens, lora ipsis alligata intendes. Si vero & hoc velis, asellis hinc atque illinc constitutis, in ipsis extensionem facies. Sunt autē & alij multi extensionum modi. Optimum autem fuerit, si quis in magna ciuitate medicum agit, vt lignum habeat præparatum, in quo omnes necessitates insint, tum ad omnes fracturas, tum ad omnes articulorum repositiones, ex extensione, ac vectium vsu. Satis autem est si lignum fuerit & longitudine, & latitudine, & crassitudine tale, quales columnæ

*Tibiæ ossa
quæ luxat
tur.*

HIPPOCRATIS LIBER

quernæ quadrangulæ sunt. Postquam autem sufficienter extenderis, facile iam est articulum reponere. Eleuatur enim in directum supra pristinam sedem. Dirigere itaq; manuum volis oportet, ita vt his partim in id quod eluxatum eminet innitaris, partim ab altera parte infra malleolum renitaris. Vbi vero reposueris, si quidem fieri poterit, extetum ita deligabis. Si vero præ loris impediaris, his exolutis distentione facias, donec deligaueris. Deligare autem eodẽ modo oportet, & fasciarum initiis similiter in id quod luxatum eminet iniectis, & primis obuolutionibus plurimis supra id factis, imò etiam spleniis plurimis supra id impositis, & compressione maxime isthic fiende. Sed & hinc atque illinc multum insuper deligare oportet. Magis autem hic articulus cõpressione opus habet, in prima deligatione, quàm is qui in manu est. Postquam autem deligaueris, sublimius reliquo corpore deligatam partem habeat. Positum autem ipsius ita facere oportet, quo quàm minime pes dependeat. At vero attenuationem corporis ita facere oportet, prout talem vel talem vim ipsa luxatio habet. Aliqua enim parum, aliqua multum luxantur. In totum vero magis & longiore tempore, in vulneribus circa crura, quàm his quæ circa manus sunt, attenuare oportet. Nã & maiora & crassiora hæc quàm illa sunt: & sanè etiam necessarium est quiescere corpus ac decumbere. Verum postea deligare articulum tertia die, neque prohibet quicquam, neq; vrget. & alia omnia similiter velut superius relata curare oportet. Et si quidem quiete decumbet, sufficient quadraginta dies, si solum in suum locum ossa rursus descenderint. Si vero quiescere nolet, non facile quidem crure vti poterit, & deligatione ad multum tempus vtì cogetur. Quæcunque vero ossa non perfectè desidēt in suū locū, sed aliquid deficit, pgressu tēporis attenuatur coxa, & femur & tibia. Et si quidē intro luxata fuerint, externa pars attenuatur. Si vero extra, interna. Plurima autem ad internam partem luxantur. Postquam vero ambo tibiæ ossa fracta fuerint, citra exulcerationem, extensione vehementiore opus habet. Extendere autem oportet quibusdam modis ex prædictis, si magnæ emotiones fuerint. Sufficiunt etiam à viris fiendes extensiones. Plerumque enim suffecerint duo viri robusti, alter hinc, alter illinc distendentes. Intendere autem oportet

Tibiæ utraque ossa cū fracta sunt.

in di-

- A** in directū, secundū naturā, & secundū rectitudinē tibie ac femoris, siue tibie fracte, siue femoris ossa extēderis. Sed & deligare sic oportet vtrisque extētis, vtrū tandē horū deligaueris. Nō enim eadē cruri & manui cōferant. Nam vbi cubiti & brachij ossa fracta fuerint deligata, manus appensa excipitur. At si extēta deligaueris, figuræ carniū alterantur inter flectendum in cubiti flexura. Feri enim nō potest, vt cubiti flexura ad multum tempus maneat extēta. Nō enim sæpe in hac figura, sed in flexione esse consuevit. Quin & quā homines obambulare possint, vbi circa manum fauciati fuerint, opus habent flexione in cubiti flexura. At crus quū & in ambulando, & in stando consueuerit, aliquando quidem extētum esse, aliquando vero ferē extētum esse,
- B** ad infernam partem secundum naturam: & sinē etiam ad hoc vt reliquū corpus vehat: propterea facile est ipsi extētum esse, vbi eius necessitatem habuerit. Quin & in cubilibus sæpe in hac figura est, vt videlicet sit extētum. Postquam autem vulneratum fuerit, necessitas animi propositum in seruitutem adigit. Impotētes enim fiunt ad se attollendum, adeo vt ne meminerint quidem, vt inflectant ac exurgant: sed quiescunt in hac figura decumbētes. Propter has igitur causas, neque extensionis, neque deligationis figura eadem, manui & cruri cōducit. Si quidem igitur suffecerit extēsiō quę per viros sit, nihil aliud laboris frustra insumere oportet. Imperitiam enim arguit, machinas adhibere vbi ipsis nō est opus. Si vero nō sufficiens fuerit extēsiō per viros, etiam ex aliis necessariis quædam adhibere oportet, si quæ commoda fuerint. Quū autē satis iam extēta fuerint, facile est dirigere ossa, & ad naturam reducere, manuum volis ac palmis corrigendo ac coaptando. Vbi vero direxeris, linteis deligare extēta, siue ad dextram partē, siue ad sinistram, circūdūcere prima lintea conducit. Initia autem ipsorum supra fracturam iniiciantur, & circū hanc primæ quoq; obuolutiones circūdūcantur, deinde deligando sursum ad tibiam distribuuntur, velut in fracturis dictum est. Cæterum lintea latiora esse oportet, & longiora, eaq; multo plura circa crus quā in manu. Vbi vero deligaueris, super planum quoddam & molle deponere conuenit, vt neq; hac, neq; illac distorqueatur: neque repandum, neque gibbum fiat. Maxime autē confert puluinar,

HIPPOCRATIS LIBER

*Canales
an sint sup
ponendi.*

puluinar, aut lineum, aut laneum, non durum, laxū, per me- **D**
dium secundum longitudinē subiectum, aut aliud quid quod
huic simile existit. Nam de canalibus qui sub crura fracta
subiiciuntur, quid consulam ambigo, an supponere ipsos cō-
ueniat, aut non. profunt enim, non tamen quantum putant hi
qui ipsos supponunt. Non enim quiescere cogunt canales, ve-
lut illi putant. Nam neq; dum reliquum corpus aut hanc, aut
illāc vertitur, cogit canalis vt crus ne sequatur, si non ipse ho-
mo huius rei curam habeat: Neque rursus absque corpore
crus moueri canalis prohibet, vel in hanc, vel in illam partē.
Quin & crudelius est lignum subiicere, si non simul molle
qui idā in ipsum indatur. At vtilissimum est in strato permu-
tando, & in progressibus ad aluum exonerandam. Licet igitur
& cum canali, & sine canali, & bene, & male rem moliri.
Verum vulgo persuasum est, etiam medicum minus delin-
quere, si canalis subiiciatur, etiam si minus hoc artem referat.
Oportet enim super plano quopiam ac molli cubare crus ip-
sum, penitus in directum: alioqui necesse est deligationem
superari à distortionē, quæ in positu contingit, quocunque
& quantumcunque tandem inclinarit. Respondeat autem
deligatus eadem quæ etiam prius dicta sunt. Nam & deliga-
tionem talem esse oportet, & tumorem ita attolli ad extre-
mas partes, & laxationes ita, & religationes per tertium diē:
& quod deligatur gracilius inueniri, & deligationes magis
facere, & pluribus linteis, & circumdare pedem laxē, si non
vulnus valde propinquum genu fuerit. Extendere autem
moderate, & dirigere ossa, in vnaquaque deligatione oportet. **F**
Si enim recte curetur, & tumor secundum rationem pro-
cedat: tum locus qui deligatur tenuior ac gracilior erit, tum
ossa adductu faciliora, & extensioni magis obedientia. Post-
quam autem septimus aut vndecimus aderit dies, ferulas ap-
ponere oportet, quemadmodum & in aliis fracturis dictum
est. Cæterum ferularum locationes vitare oportet, & se-
cundum malleorum rectitudinem, & supra tendinē, qui est
in tibia pedis. At tibiæ ossa corroborantur in quadraginta
diebus, si recte curentur. Si vero suspicionem habeas, os ali-
quod directione opus habere: aut de ulceratione aliqua ti-
meas, intermedio tempore soluere, & probe coaptata reli-
gare oportet. Porro si alterum tibiæ os fractum fuerit, ex-
tensione

*Ferule
quādo ap-
ponende.
Tibiæ os-
sis coale-
scencia
quota.*

- A** tentione quidem debiliore opus habet, non tamen deficere, neque segniter agere, in extendendo conuenit. & maxime quidem omnes fracturas in prima deligatione, quantum eius fieri debet, extendere oportet: Sin minus, quàm citissime. Quodcunque enim os non recto modo coaptatum deligans quis compresserit, locus maiori dolore vexabitur. Reliqua vero curatio eadem est. At vero ex ossibus his internum, tibia & prima tibia appellatū, molestiam maiorē in curādo exhibet, & extēsiōne magis opus habet: & si non recte coaptata ossa fuerint, occultari non possunt. Est enim totum cōspicuum & carnis exors, & hoc fracto, lōge tardius progredi eo crure poterint. Si vero externum os fractum fuerit, & multo facilius ferunt, & multo melius occultare possunt, etiā si non bene fuerit coaptatum. Est enim carnosum, & cito in pedes consistunt. Plurimum enim oneris internum tibiæ os vehit. Nam simul & vnā cum ipso crure, & oneris secundum crus rectitudine, maiorē laboris partem internum os suffert. Femoris enim caput supernam corporis partem sustinet. Hoc autem intra crus est, & non extra, sed secundum tibiæ rectitudinem: & simul reliqua dimidia corporis pars huic rectitudini magis appropinquat, & non externæ: & simul crassius est internum quàm externum, quēadmodum etiam id quod in cubito est, secundum parui digiti rectitudinem, tenuius est & longius. In articulo tamen inferno nō similis est ossis longioris cōstitutio. Inæqualiter enim cubiti gibbus siue flexura, & poples flexūtur. Propter has igitur causas, externo quidem osse fracto, celeres progressus fiūt, interno vero fracto, tardi. At vero si femoris os fractum fuerit, extēsiōnem præ omnibus facere oportet, ita vt ne defectuosius fiat. Amplior enim facta nihil læserit. Neq; enim si quis distantia ex vehementia extēsiōnis ossa deligauerit, fieri poterit vt deligatio ipsa teneat, vt ita distent: sed coeunt inter se ossa quàm citissime, vbi intendentes ipsa remiserunt. Crassissimæ enim ac fortissimæ quum sint hac parte carnes deligationem superabunt, non ab ipsa superabuntur. Magnum enim dedecus est ac detrimentum, femur breuius efficere. Nam si quidem manus breuior fiat, & occultari poterit, & nō magnus est error. At crus si breuius fiat, claudum hominē efficiet. Sanū enim crus lōgius est, & id redarguit. Quare vtilius fuerit, vt si quis

Nn male

Femoris
os fractū.

HIPPOCRATIS LIBER.

male curandus sit, ambo potius crura fracta habeat, quàm al- D
 terum tantū. æquilibris enim ipse sibiipſi fuerit hoc modo.
Curatio. Postquam vero ſufficienter extēderis, directione ac coapta-
 tione per manuum volas facta, eodē modo deligare oportet,
 velut etiam prius scriptū eſt, iniectis etiam fasciarum initiis
 velut dictum eſt, & deligationis distributione ſurſum verſus
 fiēte. & deligatus eadem respondeat, velut etiam prius : &
 doleat eodem modo, & melius habeat, & ſimiliter rursus de-
 ligetur. & ferularum appoſitio eadem ſit. Corroboratur autem
Femur fra- femur in quinquaginta diebus. Insuper vero & hoc confi-
ctū quoti- derare oportet, q̃ femur gibboſum magis eſt ad externam,
coaleſcit. partem, quàm ad internā, & magis ad anteriorem, quàm po-
 ſteriore. In has itaq; partes etiā diſtorquetur, ſi non probe E
 curetur. & ſanē iſdem partibus etiā ipſe ſeiſo magis excar-
 nis eſt, vt neq; occultari poſſit in diſtortione. Si igitur huius-
 modi quippiam ſuſpectum habueris, machinari ea oportet,
 quæ in brachio diſtorto conſuluimus. Pauca inſuper lintea
 circa coxam, & locum inter coxas & lumbos, circumdare o-
 portet, quo & inguina, & articulus circa intermediam crurū
 ac inguinum partē plechada appellatam, inſuper deligetur.
 Nam & aliàs confert, & vt ne extremæ ferularum partes læ-
 dant, ſi ad non deligata adhibeantur. Deficere autem opor-
 tet ſemper ferulas, à nuda parte, & hinc atque illinc multum:
 & poſitionem ferularum ſemper ita providere conuenit, vt
 neque ſuper os aliquod circa articulos natura prominēs, ne- F
 que ſuper neruum circa articulum fiat. Tumores vero iuxta
 poplitem, aut circa pedem, aut iuxta aliam quampiam par-
 tem, ex compreſſione eleuatos, multis lanis ſuccidis probe
 carminatis, vino ac oleo reſperſis, cerato ſublito, deligare o-
 portet, & vbi preſſerint ferulæ, citius laxare. Graciles autem
 fieri poterint, ſi ſupra ferulas gracilibus linteis tumores de-
 ligaris, ab infima parte initio facto, ad ſupernam proceden-
 do. Sic enim quàm citiſſime tumor gracilis fieri poterit, &
 tranſcēderit ſupra priores deligationes. Verum hoc delega-
 tionis modo vti non oportet, ſi non periculum fuerit in tu-
 more, puſtularū, aut denigrationis. Tale vero nihil ſit, ſi non
 quisvalde premat fracturam, aut ſuſpenſam habeat, aut manu
Canalis ſcalpat, aut aliud quid quod irriter corpori allabatur. At ve-
quātus ef- ro canalem ſi quis ſub ipſum femur ſupponat, qui poplitem
ſe debeat. ROU

A: nō excedat, læserit magis quàm profuerit. Neq; enim prohibuerit, quo minus & corpus, & tibia, sine femore moueatur. Noxius enī erit ad poplitē pertingēs, & quod minime oportet, id facere impulerit. Minime vero oportet genu flectere. Omnem enim turbationē deligationibus inducit, & femore, & tibia deligata, quisquis genu flexerit. Necesse enim erit propter hoc, musculos aliās atque aliās aliam figuram haberet. Necesse est item ossa fracta moueri. Præ omnibus itaque faciendum, vt poples sit extentus. Videtur igitur canalis similiter prodesse, qui à coxa ad pedem vsque subiectus contineat, & aliās circa poplitem, fasciam cum canali laxè circumdare oportet: quemadmodum infantes in cunis fasciis obvoluntur. Deinde si femur ad supernam partem distorqueatur, aut ad latus, melius ita contineri poterit vnà cum canali.

B Cæterum calcanei summi valde magnam curam habere cōuenit, vt & in tibiæ, & in femoris fracturis, apte se habeat. Si enim dependeat pes, reliqua tibia firmata, necesse est iuxta anteriorem tibiæ partem, ossa incurua esse. Si vero calcaneū quidem moderato altius fuerit firmatum, reliqua vero tibia aliquantulum eleuata, necesse est huic ossi, vt circa anteriorem tibiæ partem, moderato cavius appareat: atque hoc adhuc magis, si calcaneum hominis natura fuerit magnum. Sed & omnia ossa tardius corroborantur, si non secundum naturam posita fuerint, itemque ea quæ non in eadem figura quiescunt: & calli quoque debiliores ipsis obducuntur. Atque hæc quidem de his quibus ossa quidem fracta sunt, non autem extra eminent, neque aliās vlcus factum est. Quibus vero ossa fracta sunt simplici modo, & non multifido, ita vt eadem die reposita sint, aut postridie in sedem suam recepta, & nullus timor sit fissorum ossium discessionis: aut etiā quibus vlcus quidē factum est, ossa vero fracta non extra eminent, neque modus fracturæ talis est, vt sint segmenta à fissis ossibus separata: tales spes est simplici modo curari posse.

Et quidem sanè neque magni quippiam boni, neque mali faciētes, vlcera quidē curant aliquo purgatorio, aut picatum ceratum, vt emplastrum cruentis vulneribus idoneum, aut aliud quid ex his quæ facere solent, imponētes: Ego vero eos laudo qui splenia vino imbuta, aut lanas succidas, aut aliud quid huiusmodi deligant: Vbi vero vlcera pura facta fue-

Nn ij rint,

*Calcanei
in his cura*

HIPPOCRATIS LIBER

rint, & iam coalescunt, tunc multis linteis deligare, & ferulis **D**
 dirigere conantur. Hæc quidem curatio boni aliquid facit,
 nihil autem magni mali: Ossa tamē non similiter in suam se-
 dem firmari possunt. Verum corpora aliquanto tumidiora
 ea parte sunt, quā sit opportunum. sunt autē & breuiora
 his quibus vtraque ossa, aut cubiti, aut tibiæ fracta sunt. Alij
 vero rursus sunt, qui talia statim linteis curant, & hinc atque
 illinc linteis deligant, vlcus vero ipsum relinquunt, & per-
 frigerari sinunt. Deinde super vlcus purgatorium aliquod
 imponunt, & splenis vino imbutis, & lanis succidis curant.
 Hæc curatio mala est, & verisimile est eos qui ita curant, tum
 in aliis fracturis, tum in huiusmodi maxime imprudenter se
 gerere. Maximū enim est cognoscere quomodo initium lin- **E**
 tei iniicere oportet, & qua parte maxime cōprimere: & quæ
 vtilitas contingat, si quis initium lintei recte iniiciat, & qua
 maxime oportet parte premat: & quæ detrimenta inducan-
 tur, si quis non recte iniiciat, neq; quā maxime oportet pre-
 mat, sed hinc atque illinc id faciat. & dictum quidem est et-
 iam in superioribus, quæ ex vtrisque eueniant. Testatur au-
 tem & ipsa hæc medicina. Necesse est enim ei qui ita deliga-
 tur, tumorem ad ipsum vlcus eleuari. Etenim si sanum corpus
 hinc atque illinc fuerit deligatum, in medio vero relictum,
 iuxta relictum vtrique spatium maxime intumuerit, ac deco-
 loratum reddetur, quo modo vlcus hæc nō perpetietur? Ne-
 cesse igitur est, ut vlcus quidē decoloratum sit, & labiis euer-
 sum ac protuberans, verum lachrymosum & non suppurans: **F**
 ossa vero etiam quæ discessura non erant, discedant: sed &
 pulsans, & febriēs vlcus fuerit. Coguntur autem propter tu-
 morem cataplatmata insuper imponere, quod & ipsum in-
 commodum est his qui hinc atque illinc deligantur. Ponderus
 enim inutile ad reliquum pulsū accedit. Postremum vero
 deligamēta resoluunt, ubi iam malum ipsis recrudesceat, & de
 cætero citra deligationem curant. Neque vero minus, etiam
 si aliud quoddam eiusmodi vulnus acceperint, eodem modo
 curant. Non enim deligationē hinc atque illinc factam, & vl-
 ceris perfrigationē in causā esse putant, sed aliud quoddā
 infortunium. Attamē de hoc tam multa non scripsissem, si nō
 certo scirem incommodam esse hanc deligationē, & multos
 esse qui ita curent, & magni momenti esse hanc rem dedi-
 scere,

*Quid potis-
 simum in
 his.*

A scere, & testimonio hæc esse, quòd recte scripta sint ea quæ prius scripta sunt, siue maxime premendæ sint, siue minime ipsæ fracturæ. Oportet autem vt in summa dicam, his quibus non est futuri discessus ossis expectatio, eadem curationem adhibere, veluti his quibus os fractum fuerit, vlcus autè non habent. Nam & extentiones, & directiones ac coaptationes ossium eodem modo facere oportet, & consimilem deligationem. Super ipsum enim vlcus splenium tenue duplex, picato cerato illitum deligandum est, & circumfitæ partes cerato albo illinendæ. Verum lintea, & reliqua latiora, aliquantum fissa sint magis, quàm si non vlcus haberet: & id quo primum deligamus, multo latius sit ipso vlcere. Quæ enim angustiora sunt quàm vlcus, circum vlcus tenent, id quod fieri non conuenit, sed prima circumductio totum vlcus comprehendat, & linteum hinc atque illinc præmineat. Itaque secundum vlcus rectitudinem, linteum iniicere oportet, & premere paulo minus, quàm si vlcus non haberent. Distributenda vero est deligatio, velut etiam prius dictum est. Lintea autè semper quidem mollis modi sint, magis tamè in talibus, quàm si vlcus non esset. Copia vero linteorum non minor sit prius relatis, sed etiam aliquàto amplior. Si vero deligatus fuerit, videatur is sibi lintea firmata quidè esse, non autè compressa: dicatq; super vlcus maxime firmata esse, Eadem autè tēpora esse oportet, ad hoc vt magis firmata esse videantur, & ad hoc vt magis laxa videantur, quèadmodum etiam in superioribus dictum est. Deligatio etiam postea facièda per tertium diè, ita vt omnia postea faciamus consimili modo, velut prius dictum est, præterquam quòd in totum, minus aliquàto hæc quàm illa comprimèda sunt. Quòd si secundum rationè, quæ fieri par est, facta fuerint, gracilior quidè semper cōperietur vlcus pars, graciliores autè & reliquæ omnes, quæ à deligatione continètur: & suppurationes citiores erunt, quàm in vlcibus aliter curatis: & quæcunque caruncule in vulnere denigratæ sunt & mortificatæ, citius abrumpuntur ac excidunt in hac curatiōe, quàm in aliis: & ad cicatricè citius peruenit vlcus, si hoc modo quàm si alio curetur. At omniū horum causa est, quòd & locus circa vlcus gracilis sit, & quæ circumfita sunt gracilia omnia fiunt. In reliquis igitur omnibus consimiliter curare oportet, velut ossa sine vlcerationibus

*Ligatiōis
modus.*

Nu iij fracta,

HIPPOCRATIS LIBER

**Ferularū
appositio.**

fracta, Verū ferulas apponere non oportet. Et propterea lin- D
tea his plura esse debent quā aliis, & quod minus compri-
mantur, & quod ferulæ tardius apponantur. Si tamen ferulas
apposueris, non secundum rectitudinem vlcis appones, sed
ita vt laxæ adhibeantur, prouidendo vt nulla magna ab ipsis
constrictio fiat. Dictum autem hoc quoque est in his quæ
prius scripta sunt. Victus autem rationem exquisitiorem, &
longiori tempore constituere oportet, his quibus ab initio
vlcera fiunt, & quibus ossa extra eminent. & vt in summa di-
catur, in vehementissimis vulneribus exquisitiore, eoquæ
diuturniore, victu vti conuenit. Eadem etiam curatio vlce-
rum est in his quibus ossa quidem fracta sunt, sed vlcus ab
initio non fuit. Verum inter medendum factum est, aut vlce- E
re linteis magis compresso, aut à ferularum infessu, aut ab al-
lia quapiam causa. Cognoscuntur autem tales fracturæ, an vl-
cus subsit, & dolore, & pulsib. & tumor qui in extremis parti-
bus est, talibus durus efficitur, & si digitum admoueris, attol-
litur: sed & cito rursus subterfugit. Si igitur tale quid suspi-
catus fueris, soluere oportet: & si quidem pruritus circa sub-
ligationes fuerit, aut alia quapiam parte deligata, cerato pi-
cato pro altero vti. Si vero horum nihil fuerit, verum ipsum
vlcus irritatum, reperitur nigrum valde aut impurum: & fu-
turum est vt & carnes suppurentur, & nerui insuper excidant,
hos omnino perfrigerare nō oportet, neq; quicquā has sup-
purationes vereri, sed curare in reliquis omnibus consimili
modo, velut eos quibus ab initio vlcus factū est. Linteis vero F
deligare incipere oportet valde laxis, à tumore qui in extre-
mis partibus consistit, atq; ita deligationem distribuere sem-
per sursum versus, nusquā quidem cōprimendo, sed maxime
super vlcus firmādo, super alia vero minus. & prima quidem
lindea hæc munda sint, & nō angusta. Copia vero linteorum
tanta sit, quāta est si cum ferulis deligatio fiat, aut paulo mi-
nor. Super ipsum autē vlcus sufficiens est splenium cerato al-
bo illitum. Siue enim caro, siue neruus denigratus fuerit, ex-
cidet. Talia enim acribus curare non oportet, sed mollibus,
velut ambuga. Deligare vero postea per tertium diem conue-
nit, ferulas autē non apponere. Quiescere vero magis quā
prius, & modico cibo vti. Scire vero expedit, siue caro, siue
neruus sit, id quod excidet, qd hoc modo multo minus vltra
depasci-

**Linteorū
quantitas.**

- A** depascitur, & multo citius excidet, & multo graciliores circumstita partes erunt, quam si quis exolutis linteis, aliquid medicamentorum purgatoriorum super vlcus imponat. Quin & si exciderit id quod suppurasset, & citius carne repletur, & citius ad cicatricem peruenit, quam si illo aut alio modo curetur. Omnia sane in hoc sita sunt, ut quis haec recte & moderate deligare sciat. Conferunt insuper & figurae quales esse oportet, & reliqua victus ratio, & linteorum aptitudo. Si vero in recens vulneratis decipiaris, ossium discessum non fore putas, quum tamen expectatio sit illa emeritura esse, modum curationis timere non oportet. Nihil enim magni mali contigerit, si modo bonas ac innoxias deligationes manu facere noueris.
- B** Signum autem hoc est, si ossium discessus in hoc curationis modo futurus est. Pus enim multum fluit ex vlcere, & gliscere ac turgere affecta pars videtur. Frequentius igitur deligare oportet, ob nimiam humiditatem, & quod alias etiam febres fiunt. Et si quidem valde premantur a deligatione, & vlcus, & circumstitae partes graciles fiunt. Quicumque itaque valde tenuium ossium discessus fuerit, hi nulla magna mutatione opus habent, nisi ut laxius deligatio fiat, ut ne pus intercipiatur, sed facile effluere possit. Sed & frequentius deligare oportet, donec os discesserit, & ferulas non apponere. Quibus vero maioris ossis discessus expectatur, siue hoc a principio praeueneris, siue etiam postea cognoueris, non amplius eadem curatione opus habet. Sed extensiones & directiones ita facere oportet, velut dictum
- C** est: splenia vero duplicata, latitudine quidem dimidio palmo non minora: quale tamen fuerit vulnus iuxta hoc coniectura facienda est: longitudine vero paulo quidem breuiora, quam ut bis circum sauciatum corpus circumduci possint, multo vero longiora quam ut semel. Copia vero tot sint, quot facere conducit. Haec in vino nigro austero madefacta, ex medio initio facto circumuolueri oportet, quemadmodum fascia ex duobus initiis deligatur: & deinde asciatim alternatione ipsorum facta, initia dimittere. Haec & super ipsum vlcus adhibenda sunt, & ab utraque vlcis parte, & ne comprimantur, sed saltem fulciendi vlcis gratia incubant. Supra ipsum vero vlcus, ceratum picatum imponere oportet, aut aliquod ex emplastris cruentis vulneribus destinatis, aut aliud quoddam medicamentum, quod familiare ac idoneum sit humectationi adhi-

Offis maioris abscessus.

HIPPOCRATIS LIBER

hibendæ & si quidem æstatis tempus fuerit, vino madeface- D
 re splenia frequenter oportet. Si vero hyems, lanas succidas
Quid æstas multas vino & oleo imbutas adhibeto. Oportet autem capre
& hyems pellē subternere, & defluctiones obseruare, vt facile efflue-
in his pos re possint, ita vt meminerimus quod hi loci in iisdem figuris
scat. multo tempore permanentes, intertrigines curatu difficiles
 faciunt. Qui vero deligatione sanari per aliquē ex relatis, aut
Quis sine referendis modis non possunt, eos magnam huc curam adhi-
ligatione bere conuenit, vt fractam corporis partē commodē positam
curetur. habeant secundum rectitudinem, animaduersione ad hoc ha-
 bita, vt sursum magis quā deorsum vergat. Si vero quis bene
 ac facile opus perficere velit, operæ precium est etiam machi-
 namenta facere, quo iustam & non violentam extensionem,
 pars corporis fracta habeat. Maxime vero in tibia machina-
 mēta adhibere expedit. Sunt igitur aliqui qui in omnibus ti-
 biæ fracturis, & quæ deligantur, & quæ non deligantur, pe-
 dem summum ad lectum alligant, aut ad aliud quoddam li-
 gnum iuxta lectum defossū. Hi itaque omnia mala faciunt,
 nihil autem boni. Neque enim vllam opem affert extēsiōi,
 hæc pedis alligatio. Nihilominus ad pedem concedet
 reliquum corpus, atque sic non amplius extenditur: neq; rur-
 sus ad rectitudinem quicquam prodest, sed etiam obest. Dum
 enim vertitur reliquum corpus, aut hac, aut illac, nihil prohi-
 bebitor vinculum illud, quo minus & pes, & ossa pedi annexa,
 reliquū corpus sequantur. Imò si pes alligatus non fuisset, mi-
 nus distorqueretur. Si vero quis pilas duas ex corio Aegyptio E
He pilæ consuat, tales quales gestant hi qui multo tempore in magnis
quid sibi compedibus vincti sunt: habeant autem pilæ hinc atq; illinc
uelint. tunicas, ad vulneris quidē partes, profundiores; ad articulo-
 rum vero partes, breuiiores: Sint itē tumidæ ac molles, & con-
 gruentes ad hoc, vt altera supra malleolos, altera infra genu
 coaptetur. Habeat insuper vtrique duas vtrinque appendi-
 ces à latere, aut ex simplici, aut ex duplici loro, breuiiores ve-
 lut ansas, ita vt alteræ sint ab vtrique malleoli, alteræ ab v-
 traque genu parte: & superna pila alteras tales habeat secun-
 dum eandem rectitudinem. Postea virgis corneis acceptis,
Virgæ cor æqualem inter se magnitudinem habentibus, crassitudine
neæ. quidem digitali, longitudine vero vt flexæ appendicibus
 congruant, huc diligentiam adhibeas, vt extremæ virgarum
partes

- A** partes non ad corpus, sed ad summas pilarum eminentias innitantur. Oportet autem esse tria virgarum paria, aut etiam plura, & alias aliis aliquanto longiores, & aliquanto breuiores ac minores, vt si velis magis distendere possis. Locentur autem virgæ vtræque hinc atque illinc à malleorum vtræque parte. Hæc itaque si bene machinatus fueris, & extensionem iustam exhibuerint, & secundum rectitudinem æqualem, & vulneri nullus dolor accesserit. Nam quæ expressa fuerint, si quid tamen exprimeretur, partim ad pedem abducentur, partim ad femur: & virgæ hinc atque illinc à malleolis accommodatiores erunt, vt tibiæ positio non impediatur, & vnus probe impingat ac sustentetur. Neque enim impedimen-
- B** to est, si quis velit duas virgas superiores, ipsas inter se coniungere, & si quis leuiter quid superimponere velit, vt id quod superimponitur, à vulnere eleuatum sit. Si quidem igitur & pilæ lenes, & molles, & bonæ, & recenter consutæ fuerint: & virgarum intentio probe intenta fuerit, velut iam dictum est, commodum erit machinamentum. Si vero quid horum nõ recte habuerit, læserit magis quam profuerit. Conuenit autem & alias machinas, aut bene machinari, aut non machinari. Turpe enim est & minime artificiosum, in machinis struendis à machinis aberrare. Plerique porro medici fracturas, & cum vlceribus, & sine vlceribus, primis diebus lanis succidis curant, & nihil ab arte alienum ipsis hoc esse videtur. & qui quidem à recens vulneratis coguntur, ex linteorum inopia lanis vti, his plurimus veniæ locus patet. Non enim habuerit quis in linteorum penuria, aliud quid multo melius ad tales deligendas quàm est lana. Verum omnino multæ lanæ esse debent, & valde bene carminatæ, & non asperæ. Nam paucarum & malarum vires etiam modicæ sunt. Qui vero ad vnum aut duos dies, lanis deligare iustum esse censerent, tertia vero ac quarta linteis deligentes premunt, ac extedunt tunc vel maxime, hi in re multi adeo ac magni in medicina momenti, se imprudenter gerunt. Minime enim tertia ac quarta die omnia vulnera mouere oportet, & vt in summa dicam, etiam omnes specillorum admotiones vitare conuenit in his diebus, & alia quoque quibus vulnera irritantur. In totum enim tertia ac quarta dies in plerisque vulneribus recrudescencias pariunt, & quæ ad inflammationem ac immundiciam

HIPPOCRATIS LIBER

mundiciam procedunt, & quæ ad febres deueniunt. Et hæc **D**
 res multi momenti est vt discatur, vt si qua alia. Cum qua e-
 nim ex vtilissimis in medicina rebus, non solum circa vulne-
 ra, verum etiam circa alios multos morbos, communionem
 non habet? nisi quis etiam alios morbos vlcera esse dixerit.
 Habet enim & hic sermo aliquam verisimilitudinem. Multis
 enim modis alij alijs cognati sunt. Quicunque tamen iu-
 stum esse putant lanis vti, donec septem præterierint dies,
 deinde vero extendere ac dirigere & linteis deligare, hi non
 similiter imprudētes videri poterint. Nam & maximum in-
 flammationis periculum præterit, & ossa laxa ac apta post
 hos dies sunt. Longe tamen & hæc curatio superatur, ab ea
 deligatione quæ ab initio linteis fit. Ille enim modus præpa- **E**
 rat ac efficit vt septima die ferulis perfecte deligari possint.
 Hic autem modus multo tardior est. Sed & alia quædam de-
 trimenta habet. Verum longum esset omnia scribere. Qui-
 bus vero ossa fracta & extra eminentia in suam sedem col-
 locari non possunt, his hæc restitutio debetur. Ferramenta
 facere oportet ad eum modum quem vctes habent illi qui-
 bus lapidæ vtuntur, alia latiora, alia angustiora. Esse vero
 conuenit tria, aut plura etiam, quo quis maxime congruis vt-
 tatur. Postea cum his vnâ cum extensione motionem aggre-
 di oportet, ita vt ad inferiorem ossis partem subiicias, ad supe-
 riorem vero partem ossis, superiorem ferramenti partem in-
 nitendo firmes. In summa, quæadmodum si quis lapidem aut
 lignum vehemēter vctē commoueat. Sint autem valida fer-
 ramenta quantum eius fieri potest, vt ne flectantur. Hoc ma-
 gnum auxilium est, si & ferramenta idonea fuerint, & si quis
 velut conuenit commotionem faciat. Nam ex omnibus in-
 strumentis quæ homines machinati sunt, fortissima hæc tria
 existunt, aselli circumductio, per vctes commotio, & cuneo-
 rum vsus. At sine horum vno aliquo, aut sine omnibus, nullū
 vehementissimum opus homines perficiunt. Non igitur sper-
 nenda est hæc per ferreos illos vctes commotio. aut enim
 hoc modo, aut nullo alio, in sedem suam collabentur. Si ve-
 ro superna ossis pars immutata fuerit ac confracta, vt ve-
 cti adhibendo locus non fit commodus, sed acutum quid
 prominet, tunc osse scalpendo derafo, securam vcti sedem
 facere oportet. Hanc autem per vctes commotionem & ex-
 tensionem,

*Cū ossa fra-
 cta & ex-
 tantia non
 redeunt.*

- A tensionem, eadem die aut secunda facere oportet. Non au- *Tertius,*
tem tertia. Minime vero quarta aut quinta. Nam etiam si *quartus,*
non reponas, sed aliàs molestiam exhibeas in his diebus, in- *quintusq;*
flammationem induxeris: quanto magis si reponas. Conuul- *dies repos*
sionem tamen multo magis induxeris si reponas, quàm si re- *sitione non*
ponere omittas. Atque hæc probe nosse conuenit. Si enim *admittit*
reponenti conuulsio accesserit, non multa salutis spes est.
Commodum autem est rursus euicere os à sua sede, si hoc fie-
ri citra molestiam possit. Non in laxioribus quàm opportu-
num est, conuulsiones ac distensiones accedunt, sed in his quæ
magis extenta sunt. Cæterum de qua re nunc nobis sermo
est, in prædictis illis diebus molestiam exhibere nõ oportet,
& curam adhibere vt vlus minime inflammetur, & maxime
B suppuretur. Postquam vero septem præterierint dies, aut pau-
lo plures si sine febre fuerit, & vlus non inflammatu sit, tunc
minus verat vt reponere tentes, si speres obtenturum te esse.
Sin minus non oportet frustra molestiam suscipere & infer-
re. Si igitur ossa reposueris in suam sedē, iam scripti sunt mo-
di quomodo curare oportet, siue ossa discessura esse, siue nõ,
expectatio sit. & si quidem ossium discessus expectatio sit,
eo quem dixi modo cum linteis, in omnibus talibus deliga-
tionem facere oportet, ex medio linteo initio facto vt plu-
rimum, velut ex duobus initiis fascia deligatur. Coniectu-
ram autem facere oportet iuxta vlceris formam, quo sit quàm
minimum hians ac labiis protuberans & expansum. Ali-
is enim ad dextram deligare commodum est, aliis ad fini-
C stram, aliis ex duobus initiis. Quæcunque vero ossa repo-
sitionem effugerunt, ea discessura esse nosse oportet: itē-
que ea quæ carnibus penitus nudata sunt. Nudatur autem
quorundam superna pars, quorundam vero carnes circūcirca
mortificantur. Et quibusdam quidem ex veteri vulnere ali-
qua ossa emarcuerunt: quibusdam vero non. & aliquibus ma-
gis, aliquibus minus, & partim parua, partim magna. Propter
hæc igitur relata, vno verbo dici non potest, quando ossa sint
discessura. Aliqua enim ob paruitatem, aliqua ex eo quod in
summa parte existunt, citius discedunt: aliqua eo quod non
discedunt, resiccata & marcida fientia desquamantur. Præ-
terea differt curatio à curatione. In totum igitur ossa ci-
tissime his discedunt, quibus citissima sunt suppurationes
&

HIPPOCRATIS LIBER

& citissimæ ac optimæ carnis productiones. Subnascentes enim iuxta læsam partem carnes, plerunque ossa ipsa eleuant. Totus tamé ossis circulus, si in quadraginta diebus discesse- rit, bene discedet. Quædam enim ad sexaginta dies perue- niunt. Nam & rariora ossa citius discedunt, solidiora vero tar- dius. Alia autem minora: multo minore temporis spacio, alia aliter. Cæterum os extra eminens his de causis præsecare o- portet, si reponi non possit, & parum absit vt reponi posse vi- deatur, & fieri poterit vt auferatur, & si noxium fuerit, & de carnibus quid rumpat, & sensus molestiam exhibeat. Sed & si nudum fuerit, tale auferre oportet. Reliqua siue præfices, siue non præfices, non multum refert. Hoc enim certo scire expedit, quòd ossa quæ carnibus perfecte priuantur, ac exa- rescunt, omnia penitus discedent. A quibus vero squamæ dis- cessoræ sunt, ea præsecare non oportet. Coniecturam vero eorum quæ discedet, ex constitutis signis facere oportet. Cu- rare autem tales splenis & vinosa curatione, velut etiã prius de discessuris ossibus scriptum est. Sed cauere decet ne pri- mo tempore frigidis madesiant. Rigorū enim febrilium pe- riculum est. Periculum ité conuulsionum. Frigida enim sem- per conuulsionem prouocant quandoque vero etiam vlce- ra. Nosse quoque id conuenit, necesse esse ibi corpora bre- uiora fieri, vbi ossa fracta ac immutata curantur, & quibus to- tus ossis circulus discessit. At vero quibus femoris aut bra- chij os extra eminet, hi non valde superstites euadunt. Nam & ossa magna sunt, & multum medullæ habent: & quæ simul vulnerantur, multa sunt & magni momenti, & nerui, & mu- sculi & venæ. Et si quidem reposueris, conuulsionem accede- re solent. Si vero non reposita fuerint, febres acutæ, & bilio- sæ, & singultuosæ oboriuntur, & denigrantur. Non minus au- tem superstites euadunt hi, quibus reposita non sunt, neque tentatum est vt reponerentur. Adhuc vero magis euadunt, quibus inferna ossis pars eminet extra, quàm quibus super- na. Euadunt etiam quibus reposita fuerint, attamen raro. Nā & curationes à curationibus multū differunt, & naturæ cor- porum à naturis, ad facile tolerandum. Multum etiam differt an in interna brachij ac femoris parte ossa extra promineāt. Multæ enim & periculossæ venarum extensiones in interna parte sunt, quarum aliquæ si vulnerentur, lethales sunt. Sunt autem

A autem & in externa parte, verū minus. In talibus igitur vulneribus, qualia pericula immineant, ignorare non oportet, & ad temporum occasiones prædicere. Si vero reponere hæc ossa cogaris, & reponendi aliqua tibi spes sit, & non multa ossis immutatio fuerit, & muscoli non concurrerint: solent enim concurrere: vectis molitio etiam his cum extensione, opem bene ferre poterit. Vbi vero reponis, veratrum molle bibendum dare oportet eadem die, si eadem die reposita fuerint. Sin minus, ne aggredi quidem oportet. Verum vlcus curare oportet velut in capitis ossibus fractis, & frigidi nihil adhibere, & cibos penitus auferre. & si quidē amara bile præditus natura fuerit, fauorum cremorem odoratum coctū, aut
B acetum mulsū dulce, in aquam instillato, eoque pro victu vtatur. Si vero amara bile præditus non sit, aquæ potione vtatur. Et si quidem continua febre laborarit, ad quatuordecim dies vt minimum hoc victu degat. Si vero sine febre sit, septē diebus. Postea sensim progressu siente secūdum rationem ad vulgarem victum adducatur. Et quibus ossa non reposita fuerint, eandem itidem medicamenti purgationem facere oportet, & vlcera curationem, eundem item exhibere victum: & dependentem de corpore partem non extendere, sed magis adducere, quo laxior sit pars circa vlc⁹. At ossium discessus diuturnus est, velut etiam prius dictum est. maxime vero talia fugere oportet, si modo quis honestam fugam habeat. Nam & spes pauca sunt, & pericula multa. & si quis non reponat, artis expers esse videri poterit: & si reponat, propinquius ad mortem quā ad salutem perduxerit. Cæterum luxationes & emotiones ossium circa genua, multo mitiores sunt emotionibus ac luxationibus circa cubiti flexuram. Nā femoris articulus pro magnitudine expeditior est quā brachij, & iustam naturam solum habet, eamque rotundam. Brachij vero articulus & magnus est, & sinus plures habet. Ad hæc vero, tibiæ ossa longitudine inter se similia sunt, & externum os paululum, ne memorabili quidem modo excedit, nullum magnum impedimentum afferens, à quo externus tendo circa poplitem enascitur. At cubiti ossa inæqualia sunt, & quod breui⁹ est, multo crassius est: quod vero tenui⁹ est, multum superat & excedit articulum. Dependet tamen & hoc ex nervis, iuxta communem ossium connexionem. Maiorem
autem

*Luxatum
genu facili
reponitur.*

*Tibiæ &
cubiti ossa
qualia.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Cubiti
recaptatio.*

autem partem connexionis nervorum in brachio os tenue D
habet, quàm crassum. Horum itaque articularum & ossium flexuræ cubiti natura huiusmodi est. & propter naturæ modum, ossa circa genu sæpe quidem luxantur, facile autem rursus incidunt ac reponuntur. Inflammatio vero non magna accedit, neque vinculum articuli. Luxantur autem plerunque in internam partem, aliquando etiam ad extremam, quandoque etiam ad popliteum. Horum omnium repositiones non sunt difficiles. Verum si quidem foras aut intro luxentur, hominē in humili aliquo sedili sedere oportet, ita ut crus altius, non tamen multo habeat. Extensio autem plerunque moderata sufficit, ita ut ab altera parte tibia, ab altera femur in diuersum extendatur. At ossa circa cubiti flexuram molestiora sunt, quàm quæ circa genu sunt, & difficilius reponi possunt, etiā ob inflammationē, si quis non statim reponat. Luxantur quidem minus quàm illa, verum difficilius reponuntur ac coaptantur, insuperque inflammantur, ac collum acquirunt. Sūt autem & horum plerunque parvæ inclinationes, aliquando ad partem ad costas, aliquando ad externam, non ut totus articulus sit emotus, sed manet quid iuxta ossis brachij cavitatem, qua parte cubiti os excedens habet. Talia igitur siue hac, siue illac luxentur, facile est reponere: & sufficit extensio in directum fiens, secundum brachij rectitudinem, ita ut alter iuxta manū iuncturam extendat, alter locum sub alis amplectatur: Medicus vero altera manu ad emotum articulum admota, volis impellat. altera prope ad articulum iniecta retrudat. Obediunt autem tales luxationes, & non tarde reponuntur, si quis antea quàm inflammentur reponat. Luxantur autem plerunque magis ad internam partem. luxantur etiam ad externam. Innotescit id ex figura: & talia sæpe etiam absque vehemente tensione rursus incidunt. Oportet autem in his quæ intro luxantur, articulum quidem ad naturam suam repellere, cubitum vero magis in pronam partem vergentem circumducere. Et plerunque sanè cubiti luxationes huiusmodi sunt. Si vero transgressus fuerit articulus, aut hac, aut illac, supra cubiti os, quod ad brachij cavitatem excedit: fit quidè raro hoc, si vero fiat, non amplius similiter extensio in directum fiens, talibus luxationibus idonea est. In tali enim extensione, os à cubito excedens, brachij transgressionem prohibet.

Alibet. Oportet itaque sic emotis extensionē tali facere, qualis prius descripta est, vbi quis ossa brachij fracta deligat, vt ab alia quidem in supernam partem tensio fiat, ab ipsa vero cubiti flexura, ad infernam cogatur. Sic enim brachium supra suum sinum maxime elenabitur. Si vero eleuatum fuerit, facilis est restitutio cum volis manuum, ita vt emotam quidē brachij partem apprehendentes impellamus, os vero cubiti iuxta articulum retrudamus, vtraque eodem modo, minus tamen. Atque talis extensio huiusmodi luxationis iustissima est. Poterit etiam reponi per extensionem in directum, verū minus quā hoc modo. At si in anteriorem partem brachiū luxetur: rarissime autem hoc contingit. Sed quid repentina eluctatio nō eiecerit? Multa enim etiam præter naturam suā excidunt, etiam si magnum quid sit quod prohibeat. Huic autem eluctationi magnum quoddā obstaculum est, & os crassius quod superexcedit, & multa neruorum extensio: attamē quidam sanē eluctātur. Signum autē his qui ita eluctati sunt. Nihil enim de cubito flectere possunt. Manifestus est etiam articulus ad contactum. Si quidem igitur non statim repositus fuerit, vehementes ac violentæ inflammationes, itemque febriles sunt. Si vero statim quis occurrat, facile reponi potest. Oportet autem linteum durum conuolutum (suffecerit nō magnum) imponere obliquum in cubiti flexuram, & de repente cubitum inflectere, & manum quam maxime ad humerum adducere. Sufficiens igitur fuerit hæc repositio his qui ita eluctati sunt. Sed & extensio in directum, hunc repositionis modum coaptare potest: volis tamen manus in eminentem brachij partem iniectis, iuxta flexuram retro impellere oportet, ita vt aliquis inferne iisdem in cubiti gibbū iniectis, ad cubiti rectitudinē retrudat. Efficax est etiam in hoc luxationis modo illa extensio quæ prius scripta est, quomodo ossa brachij fracta extendere oportet, vbi sunt deliganda. Postquam vero extenta fuerint, sic cum manuum volis iniectis coaptationes facere, velut etiam prius scriptū est.

*Brachium
antrorsum
luxatum
quale.*

Cæterum si in posteriorem partem brachium exideris, raro autem hoc contingit, hæc luxatio omnium maxime dolorosa existit, & febres continuas meracæ bilis paucorum dierum ac maxime lethales inducit. & tales extendere brachiū non possunt. Si igitur statim affueris, extēto cubiti gibbo cogere o-

*Brachium
retrosum
luxatum.*

HIPPOCRATIS LIBER

gere oportet, & sponte incidit. Si vero febris præuenerit, nō. D
 amplius reponere oportet. dolor enim in cogendo augeſcet.
 Vt autem in ſumma dicam, neque alium articulum febrienti
 reponere oportet, minime vero cubiti gibbum. Sunt autē &
 aliæ læſiones ac moleſtiæ circa cubiti gibbum. Hoc enim os
 craſſius, ſi quando ab altero emotum eſt, neque ſecti, neque
 extendi ſimiliter poteſt. Maniſtum autem ſit ex contactu,
 iuxta cubiti flexuram, circa venæ diſciſſionem ſupra muſcu-
 lum tendentem. Quibus autem tale accidit, his non amplius
 facile eſt ad ſuam naturam reducere. Neque enim aliam vllā
 communem duorum oſſium connexionem emotam, ad pri-
 ſtinam naturam collocare facile eſt: ſed neceſſe eſt tumorem
 habere ipſam diſparationem. Quomodo vero deligare opor-
 tet in articulo, dictum eſt in deligatione circa malleolum.
 Quibuſdam autem os cubiti brachio ſubiectum frangitur,
 quandoque quidem cartilaginosa ipſius pars, ex qua tendo
 retro brachium enaſcitur, & ubi hæc emota fuerit, febrile eſt
 ac malignum. Articulus tamen manet in ſuo loco. æqualiter
 enim baſis ipſius hac parte excedit. Quum autem abductus
 fuerit ea parte qua caput brachij excidit, vagabundus magis
 ſit articulus, quàm ſi penitus ſit abruptus. Nam vt in ſumma
 dicam, omnia oſſa quæ fraguntur, minus noxia ſunt, quàm ſi
 oſſa quidem non frangantur, venæ autem & nerui alicuius
 momenti in his locis contendantur. Vicinius enim ad mor-
 tem accedunt hæc quàm illa, ſi febris cōtinua acceſſerit. Pau-
 cæ tamen tales fracturæ ſiunt: quandoque vero hoc brachij
 caput iuxta appendicem frangitur, atq; hoc quum videatur
 multo magis noxium eſſe, lōge mitius noxis circa cubiti gib-
 bum contingentibus exiſtit. Quomodo igitur ſingulas lu-
 xationes reponere, & præſertim curare oportet, ſcriptū eſt: &
 quod ſtatim reponere articulum maxime conſert, propter ce-
 leritatem inflammationis neruorum. Nam etiamſi elapſa ſta-
 tim repoſita fuerint, ſimiliter tamen nerui diſtentionem fa-
 cere ſolent, & ad tempus aliquod tum extensionem, quam fa-
 cere ſolent, tum influxionem impedire. Conſert autem om-
 nia hæc ſimiliter curare, & quæ franguntur, & quæ diſparan-
 tur, & quæ luxantur. Omnia enim multis linteis, & ſpleniis,
 & cerato curare oportet, velut etiam alias fracturas. At figu-
 ram cubiti gibbi in his etiam omnino talem facere oportet,
 qualem

Caput bra-
 chij fra-
 ctum.

- A** qualem in his quibus brachium fractum, & cubit⁹ deligabatur. Communissima enim omnibus luxationibus, & emotionibus, & fracturis, hæc figura est. Communissima item ad distentionem postea faciendam, & ad singula extendenda, ac inflectenda. Hinc enim viæ sunt ad vtrâsq; partes confimiles. Commodissima est etiâ hæc figura ipsi aegroto, vt ipsum & gesser, & appensum excipiat. His adde si à callo apprehensus fuerit, si quidē extenta manus apprehendatur, melius fuerit si non adlit. multis enim impedimento erit, paucis adiumento. Si vero inflexa, magis quidem commoda fuerit, Verum longe commodior, si mediam figuram obtinēs callo apprehendatur. & hæc quidem de figura. Deligare vero oportet, primum lintei initio super ipsam læsam partem iniecto, siue fracta fuerit, siue emota, siue disparata, primas etiam obvolutiones super ipsam facere, ita vt maxime hac parte innitantur, minus vero hinc atque illinc. Deligationem autem communem facere oportet, & cubiti, & brachij, vtriusq; multo plus quàm plerique faciunt, quo quàm remotissime à læsa parte tumor hinc atque illinc exprimatur. Circundetur insuper etiam acuta cubiti pars, siue læsio in hac fuerit, siue non, vt ne tumor ibi circa ipsam colligatur. Fugendum vero est in deligatione, quantum eius fieri potest, vt ne circa flexuram multa lintea coaceruata sint. Compressio autem quàm maxime circa læsam partem faciēda est. Sed & reliqua compressio ac laxatio eadem adhibeatur, & iisdem temporibus singula, quemadmodum in ossium fractorum curatione antea scriptum est. Et religationes postea per diem tertium fiât. Videatur autem laxa esse deligatio tertia die velut etiâ tūc. Et ferulæ conueniente tempore adhibeantur. Neque enim alienum hoc est, & in his quibus ossa fracta, & quibus non fracta sunt, si non febriant. Sint autem quàm laxissimæ partim à brachio extenæ, partim ad cubitum positæ: & non sint crassæ. Necessè est etiam inæquales ipsas esse inter se, vt vicissim permutantur qua parte conducit, coniectura iuxta inflexionem fiente. Quin & spleniorum appositionem eiusmodi facere oportet, velut de ferulis dictum est, ita tamē vt paulo tumidiora super læsam partem apponantur. Tempora vero ab inflammatione, & ab his quæ prius scripta sunt coniectare oportet.

Schema



*Ferulæ
quales in
his ponendæ.*

HIPPOCRATIS COI D

LIBER DE ARTICVLIS,

Iano Cornario medico phy-
sico interprete.

Humero-
rum luxa-
tio.



Vmeri vero articulum vno modo luxari noui, ad locum sub alis. Sursum autem nūquam, neque ad externam partem. Non tamen affirmauerim an luxetur, aut non, etiā si habeam quod dicā de ipso. Sed neque in anteriorem partem vnuquā vidi, neque videtur mihi vnuquam excidisse. Medicis tamē videtur valde in anteriorem partem luxari, & maxime decipiuntur in his, quorū carnes tabes circa articulum & brachium occupauit. Apparet enim in talibus caput brachij omnino in anteriorem partem eminēs. Atque ego tale aliquando non excidisse asserens, ob hāc rem apud medicos & vulg^r male audiui. Solus enim ip[s]is ignorare videbar, alij vero omnes cognoscere. Nec potui ip[s]is persuadere, nisi admodum difficulter, rem ita se habere. Si quis in brachio supernam humeri partem carnibus denudarit, denudarit autem qua parte musculus sursum tendit. Nudarit itē tendinem, qui sub alis, & iuxta clauiculam ad pectus est: apparuerit utiq; caput brachij in anteriorem partem vehementer eminens, etiā si non sit elapsum. A natura enim pronū est brachij caput in anteriore partem, reliquum autē brachij os, ad externā partem incuruum. Conuersatur autem brachium cum scapulae cavitare obliquum, quū iuxta costas fuerit porrectum. Quum vero ad anteriore partem extensa fuerit tota manus, tunc brachij caput ē directio est in scapulae cavitare, & non amplius in anteriorem partem eminere conspicitur. Verum de quo nunc est sermo, nunquam vidi in anteriore partem elapsum; non tamen affirmarim ne de hoc quidē, an ita excidat, nec ne. Quum igitur exciderit brachium ad locum sub alis, multi reponere nouerunt, utpote q̃ multis elabatur.

Eruditi

- A** Eruditi autem est omnes modos nosse, quibus medici id reponūt, & quo modo quis his modis quā optime vtatur. Optimo vero horum modorum vti oportet, si fortissimam necessitatem videris. Optimus autem est qui postremus describetur. Quibuscunq; igitur frequenter humer⁹ excidit, hi plerunque ipsi sibi ipsis ad reponēdum sufficientes sunt. Immis-
Humerali repositio
 sis enim alterius manus digitis ac nodis in locum subalarem, articulum sursum cogunt, cubiti vero gibbum ad pectus adducunt. Eodem etiam modo medicus reponet, si ipse quidē sub alam, articulo magis intro elapso, subtentis digitis à costis diducat, ita vt capite suo in summum humerum iniecto, renitendi gratia, genibus vero iuxta cubiti gibbum ad brachium admotis, ad costas retrudat. Conducit autem eum qui reponit fortes manus habere: aut ipse quidē manibus & capite ita faciat, alius vero quidā cubiti gibbum ad pectus adducat. Est autem & humeri repositio, vt cubit⁹ retrorsum ad
Alia repositio
 spinā subducatur, deinde altera manu in summā gibbi cubiti partē iniecta retortio fiat, altera vero iuxta articulum retro innitatur. Hęc repositio, & ea quę prius dicta est, quum non sint secundum naturam, tamen articulum circumagitātes incidere cogunt. Qui vero calcaneo reponere conātur, propinquum quid ei quod est secundum naturam cogunt. Oportet autem hominē humi supinum reclinare, eum vero qui reponit humi sedere qua parte articulus excidit. Deinde apprehensam manum lāsā, cum suis manibus extēdere, calcaneo vero in subalare locum iniecto, dextro in dextrū, sinistro in sinistrum, retrudere. Oportet autē in cauitatem sub ala rotūdum quid congruens indere. cōmodissimę vero fuerint pilę valde parvę ac durę, quales multę ex coriis cōsuuntur. Si enim nō eiusmodi quid inditum fuerit, calcaneum ad brachij caput peruenire non potest. Dū enim manus extēditur, locus sub ala cauatur. Tēdines enim qui hinc atq; illinc locum sub ala constringunt, contrarij sunt. Oportet autē aliquem ab altera parte eius qui extenditur confidentē, sanum humerum cōtinere, vt ne corpus circumtrahatur, dum lāsā manus in alteram partē extenditur. Postea vbi pila sub alam subdita fuerit, molle lorum sufficienti latitudine pręditum, circum pilā circumdare oportet, ita vt quidem eo loto ex vtrisque initiis apprehenso sursum retrahat, à capite eius qui extenditur cō-
 Oo ij fidens,

HIPPOCRATIS LIBER

fidens, & pede ad summi humeri os innitens. Pila vero quàm **D**
 penitissime & maxime intus ad costas sita sit, & non ad bra-
 chij caput. Est & alia repositio, quum humerum alter sub-
 dit. Maiorem tamen esse oportet eum qui humerum suppo-
 nit, ita ut apprehensa manu, humerum suum acuminatum sub
 illius luxati alam supponat, & deinde aliquantum verteret, ut
 velut sedi insideat, ea coniectura facta, ut homo ille circa hu-
 merum suum ex ala pendeat, ipse vero seipsum in hunc hume-
 rum altiorē faciat quàm in alterum, brachium autem pendē-
 tis ad pectus suum quàm citissime cogendo adducat. In hac
 vero figura insuper concutiat ubi hominē sustulerit, quo re-
 liquum corpus in aduersam partē brachio quod continetur
 vergat. Si vero valde levis fuerit homo, puer aliquis levis in-
 super ex ipso retrorsum dependeat. Atq; hæ omnes repositi-
 ones in palæstra vsitatae sunt, eo quod non opus habet alio-
 rum instrumentorum importatione. Poterit tamen quis etiā
 alibi his uti. Sed & qui circum pistillum cogūt, propemo-
 dum secundum naturam reponunt. Oportet autem pistillum
 molli quadam fascia esse inuolutum: minus enim ita labarit:
 & inter costas ac brachij caput subter intrusum. & si quidem
 breue fuerit pistillū, collocare hominē in sedili aliquo oportet,
 quo vix brachium circum pistillum circundare possit. Sit
 autem potius longum pistillum, quo homo stans fermē circū
 pistillum dependeat. Postea brachium quidem & cubitus cir-
 ca pistillum porrigantur, ab altera vero corporis parte, quis
 manib⁹ circa ceruicem ad claviculam circumiectis deorsum
 cogat. Hæc repositio moderate secundum naturam est, & re-
 positionem facere potest, si probe ipsam tractet. Quin & per
 scalam alia quædā huiusmodi repositio fieri potest, & adhuc
 melior, eo quod corpus hinc atque illinc eleuatum, securius
 librando adæquari potest. Nam circum pistillum etiam si hu-
 merus fixus maneat, periculum tamen est ne corpus hac aut
 illac circunagatur. Oportet tamē & super scalam superne ro-
 tundum quid deligatum esse, quod ad loci sub ala cavitatem
 congruum sit, & quod brachij caput ad naturam redire insu-
 per cogat. Optima vero ex omnibus repositionibus talis est.
 Lignum esse oportet latitudine quidē quinque aut quatuor
 in totum digitorum, crassitudine vero duorum digitorum,
 aut etiam tenuius, longitudine autem bicubitali, aut paulo
 breuius.

Alia repositio.

*Alia repositio-
nis mo-
di.*

*Repositio
per scalam.*

*Repositio
optima.*

- A** breuius. Sit autem altera parte summa rotūdum, & angustissimum ac tenuissimum hac parte, habeatque crepidinē paululum supereminētem, in extrema rotunditatis parte, sed nō ea quæ ad costas, verum ea quæ ad brachij caput existit, quo sub alā cōgrua sit, iuxta costas sub brachij caput subdita. Lintheo autem vel fascia molli, lignum summa parte obuoluatur, quo leuius reddatur. Deinde subdito ligni capite quā penitissime sub alam, inter costas ac brachij caput, totam manum ad lignum porrectam alligare oportet, iuxta brachium, iuxta cubitum, & iuxta manus iuncturam, quo quā maxime sit quīeta. præ omnibus autem curandum est, vt summa ligni pars, quā penitissime intra subalarem locum recipiatur, brachij caput trāsgressa. Postea inter duas columnas trabē trāuersā probe alligare oportet, & deinde manum cum ligno supra trabem transmittere, quo man^{us} ab altera parte sit, corpus ab altera, trabs vero sub ala. & postea ad alteram partem manum deorsum cogere vnā cum ligno, circum trabē: ad alteram vero reliquum corpus. Trabs autem ea altitudine alligetur, vt reliquum corpus eleuatum summis pedum digitis innitatur. Hic modus repositionis humeri lōge optimus est. Iustissime enim commotionem facit, si solum penitius intus ad brachij caput lignum fuerit. Iustissimæ item sunt in utrāque partem adæquationem facientes librationes, & ad hęc ossi brachij securæ. Recentes itaque luxationes citius incidunt, quā quis putare possit, & priusquam extēte esse videantur. Sed & veteres sola hęc repositio reponere potest, si non iam ob vetustatem, caro quidem in acetabulum deuenit, caput autem brachij in loco ad quem declinauit, semitam fibi ipsi iam fecit. Veruntamen etiam ita inueteratum brachij elapsū, mihi posse reponere videtur. Quid enim iusta moliatio non nouerit? manere tamen in loco posse, nō ita mihi videtur, sed prout consuevit rursus luxabitur. Idem facit etiam si circum scalam, eodem modo velut dixi præparatam, coactio transmissi brachij fiat. Abunde item sufficit circum magnam sedem Theffalicam coactionem facere, si recens fuerit luxatio. Præparatum autem esse oportet lignum, velut dictū est. hominem vero locare oportet in sede obliquum, deinde brachium vnā cum ligno supra sedis reclinatorium transmittere, & ad alteram partem corpus deorsum
- Oo iij cogere,

HIPPOCRATIS LIBER

*Que i his
perpende-
da.*

*Exemplo
cōprobat.*

*Herba
brevis me-
lior peco-
ribus.*

cogere, ad alteram brachium cum ligno. Idem quoque fa-
cit coactio supra biforem ianuam. His autem quæ forte præ-
sentia fuerint vtendum est. Nosse igitur expedit, quod na-
turæ à naturis multum differunt, ad hoc vt elabentia faci-
le rursus incident: differt etiam acetabulum ab acetabulo,
quum aliud facile transcendendi possit, aliud minus. Plurimum
item differt neruorum ligamentum, quum in quibusdam re-
missum sit, in quibusdam intentum. Nam humiditas homi-
nibus fit ex articulis, propter neruorum connexionem, si la-
xa fuerit, & intensiones facile ferat. Multos enim videas qui
adeo humidi sunt, vt quando velint, articuli ipsis citra do-
lorem excidant, & absque dolore restituantur. Differt et-
iam habitus quidam corporis. Nam his quibus bene se ha-
bet membrum, & carnosus, & minus excidit, & difficilior
incidit. Vbi vero ipsi seipsis tenuiores & magis excarnes fue-
runt, tunc & magis excidit, & facilius incidit. Argumen-
tum autem quod hæc ita se habeant, hoc est. Bobus enim
tunc magis femora excidunt ex acetabulo, quum tenuissimi
existunt. Fiunt autem tenuissimi boues ad finem hyemis.
Tunc igitur etiam maxime luxantur: si tamen & huiusmo-
di quiddam in medicina scribere conuenit. Verum conue-
nit utique. Bene enim Homerus didicit, quod ex omnibus
pecudibus boues quàm maxime laborent hoc tempore, & ex
bobus potissimum aratores, eo quod hyeme operentur.
His itaque maxime excidunt articuli. Hi enim maxime at-
tenuantur. Nam reliqua quidem pecora breuem herbam
depasci possunt, Bos autem non ita valde priusquam alta fi-
at. Reliquis enim tenuis est labri prominentia, tenuis item
superna maxilla. Boui vero crassa est labij prominentia, cras-
sa item & obtusa superna maxilla. Quapropter in breues her-
bas subiicere non potest. Rursus solipeda animalia utpote
vtrinque dentata, & dentes inter se committere possunt, &
sub breuem herbam dentes subiicere queunt, delectantur-
que tali herba magis quàm alta. Brevis enim herba in totum
melior ac solidior est quàm alta, adde quod alta etiam prius
fructum effert. Ob hoc igitur ita cecinit,

*Haud secus ac bobus nigris gratissima uerba
Tempora proueniunt.*

quia

- A** quia gratissima apparet ipsis alta herba. Sed & aliàs bos laxū habet hunc articulū, magis quàm alia animalia. & ob id etiā magis quàm alia pedē trahit, & maxime quum macilentus est, & iam senex. Propter omnia hæc etiam maxime boui excidit. Plura autē de ipso à me scripta sunt, eo quòd omnium antea relatorum testimonia hæc sunt. Verum de quo nunc sermo est, excarnib⁹ magis excidit, sicut etiā citius incidit, quàm probe carnosus: & humidis ac excarnibus minus inflammatur, quàm siccis ac carnosus: & in posterum tēpus quoque minus vincitur: sed & mucus amplior moderato subest, si non adsit inflammatio, & sic sanè lubricus fuerit. Mucosiores enim omnino sunt articuli excarnibus quàm carnosus. Nam
- B** & ipsæ carnes eorum qui non recte ex arte fame macerati sunt, in macilentis mucosiores sunt, quàm in crassis. Quibus tamen cum inflammatione mucus subest, his inflammatio vinculo factò articulum cōtinet: & ob id hi qui submucosi sunt articuli non valde excidunt, & exciderent utiq; si non plus aut minus inflammationis accessisset. Quibus igitur quum articulus excidit, circumsitæ partes non inflammantur, & statim citra dolorem humero uti possunt, hi putant quidē nihil opus esse ut suiipsorum curā gerant, me dici tamē est ut contra tales vaticinetur: talibus excidit rursus magis quàm his quibus nerui sunt inflammati. Atque hæc res in omnibus in homine ita habet, & maxime circa humerum & genu. Maxime igitur etiam hæc excidunt. Quibus autem nerui inflammati sunt, hi humero uti nō possunt. Prohibet enim dolor & inflammationis distentio. Tales igitur curare oportet cerato, & spleniis, & linteis multis deligando. Sub alam vero lanam mollem purā conuolutam subicere oportet, ad cavitatē explendam, quò fulcimētum quidem sit deligationi, articulum vero sustentet. At brachium pierunq; sursum vergens tenere oportet. Sic enim procul fuerit humeri caput à loco, in quem excidit. Oportet autē postquam humerum deligaueris, brachium ad costas adalligare, fascia quadam in orbem circum corpus obducta. Fricare quoq; humerum oportet placide & accurate. Multarum autē rerum peritum medicum esse expe dit, & nō minus frictionis. Ex eodem enim nomine, non idē euentus subsequitur. Nam & vincere potest frictio articulum iusto laxiorem, & soluere articulū iusto duriorē. Verū de fri-

*Curatio
horum.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Brachium
an exci-
derit si-
gnum.*

tionem in alio opere à nobis tractabitur. Talem igitur hume- **D**
rum mollibus manibus fricare cōuenit, confert enim, & aliàs
leniter. Articulū autem cōmouere non violenter, sed intan-
tum vt citra dolorem cōmoueatur. Restituuntur vero omnes
articuli partim lōgiore, partim breuiore tēpore. An autem
brachium exciderit, his signis cognoscere oportet. Nam vbi
iustū corpus habent homines, manus itē ac crura, sano in ex-
emplum vti oportet, ad non sanum: & non sano ad sanū, non
alienos articulos inspiciendo, (alij enim aliis magis extanti-
bus sunt articulis) sed ipsos eius qui affectus est, an dissimilis
sit sanus ægroto. & hoc recte quidē dictum est, multam tamē
erroneam intelligentiam talia habent: & non satis est solum
sermonis doctrina artem hanc nosse, sed conuersatione etiā **E**
versare oportet. Multa enim præ dolore, aut ex alia causa, quā
non exciderint ipsis articuli, tamen nō possunt in similes fi-
guras restitui, in quales sanum corpus figuratur. Proinde &
talem figuram insuper intelligere ac cōsiderare oportet. Sed
& in loco sub ala, caput brachij multo magis incumbere vi-
detur, in luxato quā in sano. Quin & superne iuxta super-
nam humeri partem, cauus apparet locus: & summi humeri
os extans conspicitur, vtpote articulo ad infernum locū di-
gresso, & est etiam aliqua erronea in hoc intelligentia, sed
postea de ipso scribetur. Est enim dignum de quo scribatur.
Præterea in luxato cubiti gibbus magis à costis distare, videt̃
q̃ in altero. Si tamē quis vim afferens cogat, adducitur qui-
dem, sed cum dolore. Sed & sursum ad aurem manum attol- **F**
lere cubiti gibbo extento, non valde potest, velut sanam: ne-
que hanc & illam similiter diducere. Hæc igitur signa sunt hu-
meri luxati, repositiones item præscriptæ & curationes hæ
sunt. Operæ præciū vero est discere, quomodo frequēter ex-
cidentes humeros curare oporteat. Multi enim à certamini-
bus iam prohibiti sunt, ob hanc calamitatem, quum aliàs pe-
nitius fuerint inculpabiles. Multi etiam ad res bellicas inuti-
les fuerunt, & ob hanc calamitatem perierunt. Sed & pro-
pterea res digna est quæ discatur, quòd nullum nouerim qui
recte medeatur, sed alios ne aggredi quidem sciam, alios cō-
tra quā conducit & sentire, & facere. Multi enim medici
humeros luxatos vsserunt, & iuxta supernam humeri partē,
& iuxta anteriore, qua parte caput brachij extuberat, & iux-
ta po-

- A** xta posteriorem paululum retro supernam partem. Hæ igitur vñtiones, si quidem sursum brachium excidisset, aut in anteriorem aut posteriorem partem, recte inusta essent. Nunc vero quò deorsum excidit, eiiciunt magis hæ vñtiones quàm impediunt. A superna enim spaciij amplitudine caput brachij excludunt. Verum hæc ita vrere oportet. Cutem sub ala digitis apprehensam attrahere oportet, secundum ipsam maxime rectitudinem, secundum quam brachij caput excidit. Deinde ita attractam cutem in vltiorem partem perurere. Ferramentis autem talia vrere oportet non crassis, neq; valde caluis, sed oblongis. Citius enim penetrant, & manu firmata transigi possunt, pellucidis item his vrere oportet, quò quàm celerrime pro viribus penetrent. Nam crassa tarde penetrantia, latiores crustarum elapsiones faciunt, & periculū est ne cicatrices rumpantur, & nihilo quidem deterius hoc esset, verum turpius & ab arte alienius. Postquam autem in vltiorem partem perusseris, in plurimis satis est vt infernæ parti soli has crustas inuras. Quòd si periculum esse non videatur ne cicatrices rumpantur, sed multum spaciij interpositum sit, tenue quoddā specillum per inusta foramina traicere oportet, cute adhuc attracta. Neq; enim aliàs traicere possis. Vbi vero traieceris, cutem dimittere. Postea inter crustas aliam crustā tenui ferramēto infligere ac inurere, donec specillum contingas. Quantum vero de cute sub ala apprehendere oportet, hinc coniectare licet. Glandulæ sub ala sunt, sicut etiā in aliis corporis partibus. Verum in alio libro de tota glandularum natura scribetur, quòd sint, & qualia in quilibet significant ac possunt: glandulas igitur simul apprehendere non oportet, neque ea quæ glandulis sunt interiora. Magnū enim afferunt periculum. Sunt enim neruis maximi momenti vicina. Quantū vero extra glandulas est, eius quàm plurimam partem apprehendere oportet. Nihil enim periculi est. Nosse tamē hoc expedit, quòd si fortiter brachium extenderis, nihil cutis sub ala apprehendere poteris, quod sanè attractu memorabile sit. Distrahitur enim in extēsiōe. Nec vero neruos vlla machina vulnerare oportet. Hi enim prompti expositi sunt ac extēti in hac figura. Si vero parum brachium eleuaris, multū quidē cutis apprehendes: Nerui vero quorum curam gerere oportet, intus vltra apprehensionē consistēt.

*Excidentes
humeri q
urantur.*

*Ferramē-
ta qualia
ad hunc
usum.*

*Glandulæ
periculo-
sæ.*

*Nerui non
ledendi.*

HIPPOCRATIS LIBER

consistent. Nōne igitur in omni arte prae omnibus curandum est, ut in singulis figuræ iustæ inueniantur. Atque hæc quidē de loco sub ala, & sufficiunt hæc apprehensiones, si crustæ recte fuerint iustæ. Extra vero alam duo solū loci sunt, ubi quis crustas inurere queat huic affectioni auxiliantes. Vnam in anteriore parte, inter brachij caput, & tendinem iuxta alam. Et hac quidem parte cutē penitus perurere oportet, sed non altius. Vena enim crassa propinqua est, & nervi, quorum neutra igne calfaciēda sunt. Retrorsum autem alteram crustam inurere licet, multum supra tendinē, qui est iuxta alam, & paululum infra brachij caput. Et cutem quidē penitus perurere oportet, Verum neq; hic valde altam crustam facere. Inimicus enim est ignis nervis. Curare igitur vlcera per omnem curationem oportet, ita ut brachium nunquam vehementer extendas, sed moderate, vlcerum saltem curandorum gratiā. Minus enim ita perfrigeratur. Conducit enim omnes vñiones tegere, ut etiam leniter curentur, & minus disparentur, minusq; sanguinis erumpat, & minus conuulsio accedat. Vbi vero pura facta fuerint vlcera, & ad cicatrices deuenerint, tunc sanē penitus brachium semper die ac nocte costis alligatū esse oportet. Sed & quū sana facta fuerint vlcera, similiter ad multum tempus, brachium ad costas alligandum est. Sic enim maxime cicatrix induci poterit, & spatij amplitudo intercipietur, in quam maxime luxatur brachiū. Quibuscunque vero humerus repositione fuerit destitutus, si quidem homines adhuc crescant, os brachij non similiter ut sanum coaugescit, sed augescit quidem, verum altero breuius aliquanto efficitur. Et qui mustellæ cubito præditi sunt, paruumque ac macilentum brachium ex natiuitate habent, galeancones vocati, ob duplices has calamitates sunt tales, tum si talis aliqua luxatio ipsos dum in vtero sunt corripuerit, tum ob aliam calamitatem, de qua postea aliquando scribetur. Quin & hi quibus dum adhuc infantes sunt, profundæ ac submersæ suppurationes circa brachij caput sunt, omnes galeancones efficiuntur. & siue secti fuerint, siue vñti, siue sua sponte ipsi eruperint, hæc ita se habere nosse oportet. Qui tamen ex natiuitate galeancones sunt, etiam si manu potentissime uti possint, tamen neque ipsi extento cubiti gibbo, brachium ad aurem extendere ac eleuare possunt. Sed multo

Ignis inimicus nervis.

Galeancones.

- A** multo minus hanc quàm sanam manum. Quibus vero iam viris exciderit humerus, & repositus non fuerit, his superna humeri pars magis excarnis efficitur, & habitus hac parte tenuis fit. Quum tamen dolor cessauerit, non omnia ea similiter operari possunt, quæ eleuato cubiti gibbo à costis in obliquum operari oportet. Quæ vero transmoto brachio iuxta costas, aut in anteriorem, aut in posteriorem partem operari oportet, ea operari possunt. Nam & scobinam, & ferram trahere poterint, securi item findere, & fodere, si non valde sursum cubiti gibbum attollant, sed & alia iuxta tales figuras operantur. At vero quibus summus humerus fuerit auulsus, *Humerus summus auulsus.* his os auulsum extra eminens apparet. Est autem hoc velut vinculum clauiculæ & scapulæ. Alia enim est hominis natura hac parte quàm aliorum animalium. Medici igitur in hoc vulnere maxime falluntur. Nam quum os auulsum emineat, superna humeri pars humilis & caua apparet, vt. etiam velut humeri elapsi curam adhibeant. Multos igitur noui medicos aliàs non malos, qui grauitè affixerunt, tales humeros reponere conantes, ita excidisse rati, & non prius desistunt ipsi existimare se humerum reponere, quàm vel desperarint, vel frustrati fuerint. His curatio quidem eadem quæ etiam aliis huiusmodi, ceratum, splenia, & lintea, & deligatio eiusmodi: deorsum tamen cogere os supereminens oportet, & splenia super hoc ponere plurima, & hac parte maxime premere: & brachium ad costas adalligatum ad supernam partem tenere. Sic enim os auulsum maxime appropinquit.
- C** Hæc tamè probe nosse expedit, & velut certa prædicere, si alioqui voles, quòd nullum detrimētum, neque paruum, neque magnum, humero contingit ex hoc vulnere. Sed locus turpior euadit. Neque enim hoc os in pristinam sedē similiter firmari poterit, velut natura exigit, sed necesse est plus aut minus tumidum esse ad supernam partē. Neque enim aliud vllū os in eundē locum restituitur, quod cum alio osse cōmunionem habet, & adhærens à veteri naturali sede auulsum fuerit. Paucis autem diebus summus humerus doloris exors fit, si probe deligetur. Clauicula porro fracta, si quidem penitus caulatim hoc contigerit, curatu faciliior est. Si vero oblonge, difficilius sanatur: & contraria in his contingunt, aliter quàm quis putauerit. Nā quæ penitus caulatim fracta est, cogi magis
- Curatio.*
- Clauicula fracta.*

HIPPOCRATIS LIBER

magis poterit vt ad naturam redeat. Et si diligens cura adhibeatur, partem quæ superior est, inferiorē fecerit figuris idoneis. & deligatione cōueniente. Si vero perfecte non firmata fuerit, attamen supereminens ossis pars non valde acuta fit. At quorum os in longitudinem fractum fuerit, his similis ossibus auulsis calamitas contingit, de quibus antea scriptum est. Neque enim ipsum ad seipsum valde firmari solet, & summa ossis eminentis, valde acuta fit. In vniuersum igitur nosse expedit, quòd nullum detrimētum neque humero, neque reliquo corpori, ob clauiculæ fracturam accedit, si non insuper corruptio aliqua contingat. Raro autem hoc fit. Deformitas tamen circa clauiculæ fracturam accedit, primum turpissima, deinde vero minor fit. Coalescit autem clauicula cito, itēque alia ossa laxa. Celerem enim calli obductionem talia faciunt. Quum igitur recens fracta fuerit, vulnerati ad curationem festinant, maius malum esse putantes quàm est, & medici quoque prompti sunt ad recte curandum. Progressu vero temporis & vulnerati, vtpote qui neque dolent, neque iter facere, neque cibum capere prohibentur, negligunt: & medici, vtpote qui suis sedibus restituere non possunt, aufugiunt, neque vulneratorum negligentiam ægre ferunt. In hoc autem calli obductio acceleratur. Deligationis vero modus plerisque consimilis est, vt cerato & spleniis, & mollibus linteis curatio fiat. Insuper autem & hæc curatio, & hæc animaduersio habenda est, & præsertim in hac aggressione: quòd plurima splenia iuxta eminentem partem imponere oportet, & plurimis deligationibus maxime circa hanc partem premere. Sunt autem aliqui quibus complacuit plumbum graue insuper adaligare, vt supereminentem partem deorsum cogat. Fortassis autem neque intelligunt qui simpliciter deligant. Sed neque hic modus ad clauiculam fractam pertinet. Neque enim fieri potest vt id quod eminet memorabili modo deprimatur. Alij vero quidē sunt, qui quum cognouerint quòd hæc deligationes erroneæ sunt, & non secundum naturam supereminentia deorsum cogunt: deligant quidem ipsos spleniis & linteis vteutes, velut etiam alij. Verum cincto homine fascia quadam qua parte maxime cingi solet, postquam splenia supra eminentes fracturas imposuerunt, ita vt isthic magna molle extuberent, tunc initium linteï ad cincturam ex anteriore parte aligant,

Deligatio

- A** ligant, atque ita deligant in directum clauiculæ extendentes ac retrorsum ducentes, & isthic cincturæ circumdatum in anteriorem partem reducant, & rursus in posteriorem. Aliqui vero non cincturæ linteum circumdant, sed circum inter foramineum iuxta sedem, & per spinā linteum circumdantes, hoc modo fracturam comprimunt. Hæc itaque si quis inexpertus audit, prope secundum naturam esse videntur, verum si quis vtatur inutilia existunt. Neq; enim stabilia sunt, etiam si decumbat quis, quamuis ita vel maxime stabilitas contingat: attamen si decumbēs aut crus inflexerit, aut ipse se inclinet, omnia deligamenta mouebuntur. & alioqui noxia est hæc deligatio. Nam & sedes intercluditur, & linteum in hac angustia aceruata fiunt. & quæ rursus cingulo circumdantur, non ita valida facta cinctura circūdari possunt, vt non cingulum sursum ascendere cogant, neque ita necesse est omnia deligamenta laxari. Quam proxime vero quis rem conficere videri possit, etiam si non magna faciat, si quibusdam linteis cingulum circumdet, plurimis autem linteis priorem deligationem perficiat. Sic enim maxime stabiles fuerint deligationes & mutuam inter se opem tulerint. Plurima igitur ex his quæ contingunt his quibus clauicula fracta est relata sunt. Insuper autem & hoc ad intelligere oportet, quod clauicula plerumque frangitur ita vt os quod à pectore est, ad supernam partem emineat: quod vero à summo humero est, in infernam partem subsidat. Causæ vero horum hæ sunt, quod pectus neque multo inferius, neque superius procedere potest. Nam articuli in pectore motus paruus est. Ipsum enim sibi ipsi, & spinæ, ex continuitate commissum est. Proxime quidem clauicula ad humeri articulum fluctuat. Cogitur enim frequentem motum habere, propter summi humeri connexionem, & alioqui vbi vulnerata est, ad supernam partem defugit ea pars quæ pectori adhæret, & non valde ad infernam partem cogi potest. Nam & à natura leuis est, & loci amplitudo ipsi superne maior est, quàm inferne. At humerus, & brachium, & quæ his annexa sunt, à costis ac pectore facile exolui possunt: & propterea multo superius ac inferius abduci queunt. Quum igitur fracta fuerit clauicula, os quod ad humerum est magis deorsum repit. Huc enim ipsum vnā cum humero & brachio desuere procliuius est quàm sursum ferri. Quum igitur hæc
ita

HIPPOCRATIS LIBER

ita se habeant, imprudenter se gerunt qui supereminentem ossis partem deorium cogere oportere putant. Nam infernam ad supernam adducendam esse manifestum est. Hæc enim morum habet. Hæc est quæ à natura discessit. Clarum itaque est aliter nullo modo ipsam cogi posse. deligationes enim nihilo magis appellant quam repellunt. Si vero quis brachium quam maxime ad costas admotum sursum cogat, ut quam acutissimus esse humerus videatur, perspicuum est quod sic adaptari poterit ad os quod à pectore est, unde est diuisa. Si quis igitur legitima deligatione utatur, celeris curationis gratia: & reliqua omnia frustra fieri puter, præter figuram relata, is & recte intellexerit, & celerrime ac optime curauerit. Decumbere tamen hominem multum refert, & sufficiunt dies quatuordecim si quieuerit, aut ad summum viginti. Si tamen contrario modo clauicula fracta fuerit, quod non valde contingit, ut os quod à pectore est subsidat, quod vero à summo humero est supereminet, alterique superstitet: nulla magna curatione in his opus fuerit. Ipse enim humerus & brachium si demittatur, ossa inter se committere ac firmare potest, & vilis quæpiam deligatio suffecerit, & pauci dies satis erunt ad callum obducendum. Quod si hoc modo fracta non fuerit, sed in obliquum hæc vel illæc luxata, ad naturam reducere oportebit, humero cum brachio sursum adducto, velut etiam ante dictum est. Quum autem ad pristinam naturam refederit, reliqua curatio velox erit. Plerasque igitur immutationes ac luxationes, brachium si sursum cogatur corrigit. Quæcunque vero luxationes ex supernis oblique ad latus fiunt, aut deorsum, his correctio præparatur, si homo supinus decubuerit, iuxta medias autem scapulas aliquid altius superpositum fuerit, quo pectus maxime in utranque partem inflexum sit: & brachium adducat quis ad costas porrectum. Medicus autem altera manus vola in brachij caput iniecta retrahat, altera ossa fracta componat. Sic enim quam maxime ad naturam reduxerit. Verum quod iam dictum est, supernum os facile ad partem subsidere solet. Plerisque igitur ubi deligati fuerint, figura ipsa opitulatur, ita ut ad ipsas costas cubiti gibbum habentes, hoc modo humerum ad supernam partem cogant. Quibusdam vero humerum quidem sursum velut dictum est, cogere oportet: cubiti autem gibbum ad pectus adducere.

Alia clauiculae fractura.

Alia.

ducere: summam vero manum ad summum sanum humerum adhibere. Siquidem igitur decumbere sustinet, fulcimentum aliquod quod obfirmet apponere oportet, quo humer^o quàm maxime superne maneat. Si vero obambulare volet, fundam ex fascia factam; & acutæ gibbi cubiti parti circumdatam, de collo appensam gestare oportet. Cubiti porro gibbi articu- *Cubiti la-*
lus ubi emotus aut luxatus est, ad costas, aut foras, acuta ipsius *ratio.*
parte in brachij cauitate manente, extensione in directum facta, id quod eminet retrorsum & in obliquum repellere oportet. Vbi vero perfecte excidit, aut hac, aut illac, extensio in qua brachium fractum deligatur requiritur. Ita enim incurua gibbi pars non impedit. Excidit aut maxime ad partem versus costas. Correctiones vero facere oportet quàm plurimum abducendo, & ut ne brachij caput cornicem contingat, sublimem circumducere ac inflectere, & non in directum cogere, simul autem contraria in vtranque partem detrudere & in sedem compellere. Contulerit etiam in his gibbi cubiti inuersio, modo in supinā, modo in pronam partem. Curatio vero ex figura est, ut summam manum paulo altiorrem cubiti gibbo habeāt, brachium vero ad costas. Sic etiam appensū exceptio, & positio, & gestandi facilitas, & natura, & vsus, in communi sunt, si modo non male callus obducatur. Obducitur autem cito. Curatio fit linteis iuxta legem articuli- *Curatio.*
larem, ita ut acuta eius pars insuper deligetur. Recrudescit autem maxime cubiti gibbus febribus, doloribus, nausea & vomitu meracæ bilis, præsertim si retrorsum luxatus fuerit, ob torporem: deinde, si in anteriorem partem. Verum curatio eadem est. Repositio vero retrorsum luxati, ut extensum distendamus: Signum autem est, quod extendere ipsum non possunt, sicut in anteriorem partem luxati, quod inflectere nequeunt. Verum tunc durum quiddam inuolutum indere oportet, & circum hoc ab extensione derepente inflectere. Disparationis autem ossium signum est manifestum ex contactu iuxta venam quæ in brachio finditur. At vero callus cito his obducitur. Ex natiuitate autem breuiora sunt ossa infra noxam, plurimum quæ proxima sunt, cubiti, deinde manus, postea digitorum. Verum brachium & humerus robustiora sunt, propter inuersionem. At altera manus propter opera adhuc fortior est. Immautio vero carniū fit, si foras excidit, intrinsecus:

HIPPOCRATIS LIBER

secus : Sin minus, in contrarium prout excidit. Cubiti vero gibbus si intrò, aut extra exciderit, extensio fit in communi figura cubiti ad brachium. fascia enim sub alam data, ipsam exceptam suspendere oportet: ad summum vero cubiti gibbum iuxta articulum pondus appendere, aut manibus deorsum coagere. Vbi vero articulus vltra eleuatus est, coaptationes manuum volis fiunt, velut etiam in manibus. Deligatio quoque in hac figura, & exceptio appèsi, & positio. At si in posteriore excidit partè, statim extètum palmis dirigere ac coaptare oportet. Simul autè in directione etiam aliis opus est. Si in anteriore, circum linteum conuolutum iustæ mollis inflectendo simul directionè facere oportet. Si verò in alteram partem inclinarit, in directione simul vtraq; facere oportet. Verum curationi comunis est figura & deligatio. Possunt autè & ex distictione omnia in communi còtingere. At vero repositiones aliæ ex supereleuatione reponùtur, aliæ ex extènsione, aliæ ex circunuolutione. Hæ vero ex figurarũ excessibus, aut hæc, aut

Manus luxatio. illac celeriter fiunt. Manus articulus aut intrò, aut extra luxatur, plerunq; verò intrò. Signa autè facilia cognitu sunt. Si enim intrò luxatus est, digitos inflectere non possunt. Si extra

Repositio extèdere nequeunt. Repositio fit, digitis supra mensam posit, vt ab aliis atque aliis in diuersum extensio fiat, & id quod eminent, aut vola aut calcaneo retrudatur, & in anteriore partem deorsum protrudatur. Inferne vero iuxta alterum os molles aliqua conuoluta mollis supponatur, si supra eminent, manu prona locata: si infra, supina. Curatio vero linteis fit. Tota

Curatio. porro manus, aut intro, aut extra, aut hæc aut illac luxatur. Maxime verò intrò. Quandoque autem & appendix emota est. Quandoque vero alterum os disparatum distat. His extensio fortis facienda est, & quod quidem eminent retrudatur, alterum verò contrà trudatur, duabus speciebus simul contingentibus, & retrorsum, & in obliquũ, aut manibus supra mensam, aut calcaneo. Quæ vero recrudescunt ac deformia sunt, tempore ad vsum corroborantur. Curatio fit linteis cum manu & cubito. & ferulæ vsque ad digitos ponuntur. At ferulis hæc deligata frequentius quàm fracturas soluere oportet, & perfusionem ampliorem adhibere. Ex natiuitate autem manus breuior fit, & carnes imminuuntur maxime in contraria parte ei in qua luxatio facta est. At adulto iam ossa manent.

Digiti

- A** Digiti vero articulus luxatus facilis cognitu est. Repositio fit extendēs in directum, ita vt quod eminet os protrudatur, contrariū vero contra trudatur. Curatio fit fasciis ac linteis. Si vero nō reponatur, forinsecus callo obducitur. At si ex natiuitate, aut dum adhuc crescit homo, luxata fuerint ossa, breuiora fiunt infra luxationē, & carnes imminuuntur cōtraria maxime parte ei in qua luxatio facta est. In adulto vero ossa manent. Maxilla vero paucis iam perfecte luxata est. Os enim quod à superiore maxilla prodit, cū eo osse subiugatum est, quod sub aurē annexum est, quòdque capita infernæ maxillæ cōcludit, ac dirimit, quū altero capite superius sit, altero inferius: & extremæ infernæ genæ partes ita se habēt, vt altera ob longitudinem non facile accessum admittat: altera vero cornix est, & supra iugale os excedit. Simul autē & ambarum harū extremitatum nervosi tēdines existunt, ex quibus musculi dependent, qui tēporales ac manducatorij appellantur. Propterea autē appellantur, & propterea mouentur, eo quod hinc depēdent. Nam in edendo, & in loquendo: & in reliquo oris vsu, superna quidē maxilla quiescit. Est enim capiti connexa, & nō coarticulata. Inferna autē maxilla mouetur. Coarticulata enim est à superna maxilla, & à capite. Cur igitur in conuulsionibus ac distētionibus hic articulus distentus primus de se significationē præbeat: & cur plagæ tēporales periculose sint, ac soporē inducant, alio libro referetur. Quòd vero non valde luxetur, causæ hæ sunt. Sed & hæc quoque causa est, quòd non valde tales ciborum necessitates hominē apprehēdunt, vt magis quàm potest hiet. Exciderit autē à nulla alia figura, quàm si quis valde hiās maxillā in alteram partem diducat. Confert tamē ad hoc vt excidat, hoc ipsum. Quicunque enim nervi, & quicunque musculi circa articulos sunt, aut ab articulis, ex quibus colligantur, horum quicunque in vsu sæpe mouentur, hi etiam maxime ad extensiones remittunt, quemadmodum etiam pelles mollissimæ multum remittant. De quo igitur sermo est, luxatur quidē & excedit maxilla raro: laxatur tamen sæpe in hiatibus, velut etiam aliæ musculorum ac neruorū immutationes hoc faciunt. Manifestum vero ex his maxime fit, vbi excidit. Prominet enim inferna maxilla in anteriore partem, & in contrariam luxationi partem abducitur: & ossis cornix circa supernam maxillam tumidior
- Pp fit:&

Digitus luxatus.

Repositio. Curatio.

Maxilla luxatio.

HIPPOCRATIS LIBER.

Repositio. fit: & infernas maxillas difficulter committūt. Quæ vero re-
positio his conueniat, manifestum est. Oportet enim aliquem
vulnerati caput detinere, & alterum infernam maxillam in-
trinsecus ac extrinsecus ad mentum digitis apprehendere, &
primum maxillâ aliquandiu hæc atq; illâ manu abducere, &
ipsum hominē iubere, vt maxillam laxam habeat, & simul ad-
ducat, ac quàm maxime remittat. Deinde repente tribus figu-
ris simul laxare oportet, diligenti in hoc animaduersione ha-
bita. Nam & ex distortionē ad naturam deducere oportet, &
infernam maxillam retrorsum protrudere, ita vt ager hæc se-
quatur, & maxillas cōmittat, ac non hiet. Atque hæc quidem

Curatio. repositio est, & neque aliis figuris fieri poterit. Curatio vero
breuis sufficit. Splenium enim inceratum apponitur, ac laxo
deligamento deligatur. Securius autem hæc aggressio perfici-
tur, homine sup: no reclinato, & coriaceo puluinari plenissi-
me facto capiti supposito, vt in ipsum innitens quàm mini-
mum cedat. Insuper autem & caput vulnerati aliquis detine-
re debet. Si vero ambæ maxillæ luxatæ fuerint, curatio qui-
dem eadem est, verum hi os minus committere possunt. Nam
his genæ prominentiores sunt, sed indistortæ. Quod vero
distortæ non sint, maxime cognoueris ex dentium tum su-
periorum, tum inferiorum terminis è directo inter se cor-
respondentibus. His confert vt quàm citissime reponantur.
Repositionis autem modus prius dictus est. Si vero non repo-
nantur, animæ periculum imminet, præ febribus continuis,
& torpido sopore. Soporiferi enim hi muscoli sunt, & dum al-
terantur, & dum intenduntur præter naturā. Solet etiam al-
nus his biliosa, meraca, pauca egerere. Et si vomuerint, mera-
ca vomunt. Hi igitur etiam moriuntur decima maxime die.
At si fracta fuerit inferna maxilla, si quidem nō omnino cau-
latim hoc contigerit, sed cohæret adhuc os, contractum ta-
men fuerit, dirigere quidem os oportet digitis circa linguam
obliquam subiectis, forinsecus vero contra niti, prout contu-
lerit. Et si distorti fuerint dentes iuxta vulnus commoti, post-
quam os directum fuerit, dentes inter se coniungere oportet,
non duos solum, sed etiam plures, atq; hoc maxime auro, sin-
minus, lineo filo, donec os corroboretur. Postea cerato, & sple-
niis paucis, & linteis modicis deligare, nō nimium firmis, sed
laxis. Nam hoc probe necesse expedit, quod deligatio per lin-
tea,

A tea, maxillæ fractæ parum quidem contulerit, si recte fiat: magnopere vero læserit, si prauè deligetur. Frequenter autè circa linguā, explorare oportet, & multo tempore reniti ac digitis dirigere os con fractum, optimūque esset si hoc semper fieri posset, sed fieri nequit. Si vero os penitus caulatim diffra ctum fuerit, raro autem hoc contingit: dirigere quidem os oportet velut dictum est. Vbi vero direxeris, dentes coniugare, quemadmodum antea dictum est. Magnopere enim contulerit ad quietem, & adhuc magis si quis recte coniungat, & velut oportet futuras consuat. At enim non facile est omnem chirurgiam scripto exquisitè prodere, sed ex his quæ scripta sunt, formam & imaginem cōcipere oportet. Postea corio opus est Carthaginensi, & si quidem iunior fuerit vulneratus, satis est squama inde detracta uti. Si vero adultior, ipso corio: ita ut defecta inde particula trium digitorum latitudine, aut prout congrua fuerit, sublita prius è gummi maxilla, ita enim mitius fuerit, glutine agglutinetur summa sui parte, ad diffra ctam maxillæ partem, digiti aut paulo ampliore distantia à vulnere. Et hæc quidem particula ad infernam partem agglutinanda est, & habeat fissuram è directio nēti quo acutam eius partem circuncirca complectatur. Alterum autem eiusmodi lorum, aut paulo latius, ad supernam maxillæ partē agglutinare oportet, tanta à vulnere distantia, quanta illa altera lori particula abfuit. Sit autem & hoc fissum, ut circuncirca aurem ambiat. Sint autem hæc lora acuta, qua parte cōmittuntur, & vbi ipsorum extremitates connectere ac colligare oportet. In agglutinatiōe vero, caro corij ad cutē vergat. Sic enim magis agglutinatum adhærescit. Postea extento hoc lora, magis autem eo quod circa mentum est quàm maxime, ne maxilla exacnatur, lora ipsa circa verticem connectere oportet, & deinde linteo frontem deligare. & superinectum quid esse oportet, velut moris est, quo vincula quieta sint ac firma. Decubitum autè faciat in sanam maxillam, non maxillæ, sed capiti innitens. Attenuandum vero est corpus vsque ad dies decē, deinde renutriendum non tarde. Si enim primis diebus inflammatio non accesserit, in viginti diebus maxilla corroboratur. perfecte enim callo obducitur, quēadmodum etiam alia ossa rara, si nō corruptio infestari. Verum de corruptionibus omnium ossium alia longa tractatio restat. Hæc exten-

sio per agglutinamenta fiens, mitis est, & prompta ad mo- **D**
 derationem faciendam, & ad multas ac multis locis facien-
 das directiones accommodata. At medici non intelligentia
 æque ac manibus prompti, tum in aliis vulneribus, tum in ma-
 xillarum fracturis tales existunt. Variis enim modis, & bene
 & male, maxillam fractam deligant. Omnis enim deligatio
 maxillæ sic fractæ, ossa ad fracturam magis vergentia incli-
 nat, quàm ad naturam ducit. Si vero inferna maxilla circa
 connexionem ad mentum diuulsa fuerit. Sola autè hæc con-
 nexio in inferna maxilla est. Verum in superna multæ. Sed
 non volo sermone longius aberrare. In aliis enim morborum
 speciebus de his dicendum est. Si igitur connexio ad men-
 tum disparata fuerit, ipsam coaptare cuiuslibet viri est. **E**
 Os enim quod eminet, ad internam partem digitis admotis de-
 trudere oportet. Quod vero intrò vergit, ad externam par-
 tem digitis immisissis reducere. Hæc tamen extensione disten-
 dendo facere oportet. Facilius enim sic ad naturam redibūt,
 quàm si quis ossa inter se complicans cogere conetur. Vbi ve-
 ro coaptata fuerint, coniugare oportet dentes inter se hinc
 atque illinc, velut prius dictum est. Curare vero cerato, &
 splenis paucis ac linteis. Deligationem autem breuem po-
 tius quàm variam hic locus maxime admittit. Nam vt æqui-
 libris non est, prope tamen ad æquilibrium accedit. At linte-
 i obuolutionem facere oportet, si quidem dextra maxilla emi-
 net, in dexteram. In dexteram enim fieri putatur, si dextra
 manus deligationi præit. Si vero altera maxilla eminu- **F**
 erit, aliter deligationem ducere oportet. & si quidem recte quis
 coaptationem adeptus fuerit, & velut cōuenit quieuerit, ci-
 ta curatio continget, & dentes illæsi manent. Sin minus, diu-
 turnior fiet curatio, & distortionem habebit. dentes autè læ-
 si & inutiles fiunt. Porro si nasus fractus fuerit, fracturæ mo-
 dus non vnus est. Verū qui pulchris deligationibus gaudent
 citra intelligentiam, tum in aliis multis damnum incurrunt,
 tum in fracturis circa nasum vel maxime. Ex deligationibus
 enim hæc maxime varia est, & quæ plurimas ascias habeat, &
 interruptiones ac interceptiones cutis maxime varias rhom-
 biformes. Sicut igitur dictum est, qui nulla intelligentia præ-
 diti aggressionis studio tenentur, vltro se offerunt ad nasum
 fractum deligandum. Vna itaque alteraque die latatur me-
 dicus,

Nasi fractura.

- A** dicus, gaudet quoque is qui deligat. Deinde cito quidē is qui deligatur satiatur. Noxia enim & molesta est gestatio : satis autem est medico ostentasse, quod nasum varie deligare nouit, facit autem talis deligatio omnia contra quā conuenit. Partim enim qui propter fracturam sumi fiunt, si superne quis magis premat, sumiores nimirum fient. partim vero quibus nasus hāc aut illāc distorquetur, aut circa cartilaginem, aut superius, palām est quod neq; ipsis superne deligatio proderit, sed etiam magis lædet. Non enim ita congruit ipleniis altera nasi pars, quanquam neq; hoc faciant deligantes. Proxime vero deligatio resistere mihi videtur, si iuxta medium nasum circa acutam partem, contusa caro ad os fuerit, aut etiam os parum, & non multum contusum sit. Talibus enim nasus callo obducitur, & aliquanto asperior euadit. Sed tamen neq; his deligatio multo negotio opus habet, si modo etiam deligare oportet. Sufficit autem super contusionem splenium inceratum extendere. Postea velut ex duobus inuitis deligatio fit, ita semel linteum circundandum est. Optima tamen curatio est, per farinam triticeam hornam, lotam, viscosam, subactam, modicam, ita ut talia ex illa velut cataplasmate integantur. Si igitur triticea farina bona fuerit, & tractu facilis, ea ad omnia huiusmodi vti oportet. Si vero non facilis tractu sit, modicam mannam lenissime tritam, & aqua dilutam, cum farina subigere oportet, aut gummi parum, similiter ammiscere. Quibuscunque igitur nasus fractus est,
- C** vt deorsum & in sinum vergat, si quidem ex anteriore parte iuxta cartilaginem subsidat, fieri potest vt aliquid quod ipsum dirigat in nares indatur. Sin minus, omnia talia digitis in nares iniectis dirigere oportet, si id fieri datur. Sin minus, crassum specillum non in anteriorem narium partem digitis indere oportet, sed qua parte nasus subsidit : extrinsecus autem ab vtraque parte nasum apprehendere, simulque cogere ac sursum ducere. Et si quidem valde in anteriore parte fuerit fractura, fieri poterit, vt aliquid intra nares indatur, velut iam dictum est, nimirum lintei rasura, aut aliud quid huiusmodi, linteo inuolutum, aut potius in corio Carthagenensi consutum, ea figura quæ congruat loco cui incumbet. Si vero vltius facta fuerit fractura, fieri non potest vt aliquid indatur. Si enim in anteriore parte mole-
- Pp iij sta est

Curatio.

HIPPOCRATIS LIBER

ita est gestatio , quomodo non sit in interiore ? Primum igitur & intrinsecus conformando , & forinsecus non parcendo , ad pristinam naturam reducere ac dirigere oportet . Valde enim conformatur nasus fractus , maxime quidem eadem die : sin minus , paulo postea . Verum segniter agunt medici , & leuius quàm conuenit primum contingunt . Iniicere enim manus hinc atque illinc iuxta naturam nasi quàm infime oportet , ex infernis sursum cogendo , & sic quàm maxime erigere , vnà cum interna directione etiam extrinsecus dirigendo . Postea ad hæc nullus talis medicus est , si studium adhibere ac tolerare vult , velut ipsius digiti indices . Hi enim maxime secundum naturam sunt . Vtrumque enim digitum iniicere , eoque totum nasum firmare oportet , atque ita in quiete habere , si quidem fieri posset , semper donec corroboretur : sin minus , plurimo tempore velut dictum est . Quod si fieri nequeat , aut puer aut aliqua mulier hoc faciant . Molles enim manus esse oportet . Sic enim quàm optime nasus curari poterit , vbi non in obliquum , sed ad infernam partem æqualiter subsidat . Ego igitur nullum vnquam nasum vidi , qui sic fractus dirigi non potuisset , si statim ita cogeretur priusquam callus obduceretur , si modo quis recte curare vellet . Verùm homines vt ne deformes fiant , multo quidem precio coemerint , studium autem adhibere non sciunt , simulque non tolerant , si non dolore vexentur , aut mortem timeant : quamquam breui tempore nasus callo obducatur . decem enim diebus corroboratur , si non corruptio insuper accedat . Quibuscunque vero os in obliquum frangitur , curatio quidem eadem est . Verum directionem non æqualem vtrinque facere oportet , sed quod inclinatum est , extrinsecus cogendo ad naturam compellere , & in nares facta cōtrectatione , ea quæ intrò repunt impigre dirigere , donec correctæ fuerint : ita vt eius probe memineris , quòd si non statim corrigantur , fieri non possit vt nasus non distortus fiat . Postquam autem ad naturam reduxeris , digitos plures aut vnum digitum ad locum adnouere oportet , qua parte eminebat , atque ita aut ipsum , aut alium quendam sustentare , donec vulnus corroboratum fuerit . Sed & in narem paruum digitum inmittere oportet , & aliàs atque aliàs impellendo ea quæ inclinata sunt dirigere . At si quid inflammationis his accedat ,

- A** accedat, farina fabacta vti oportet : & tamen incumbente etiam farina digitos similiter admouere opus est. Si vero iuxta cartilaginem in obliquum fractus sit, necesse est summum nasum distorqueri. Talibus igitur in summam narē aliquid quod dirigat ex relatis, aut quod his simile sit, indere oportet. Poterit autem quis multa idonea inuenire, quæ neque odorem habeant, neque alias lenia sint. Ego vero quandoque pulmonis ouilli frustum defectū indidi. Hoc enim forte obtingebat. Nam spongiæ inditæ humiditates suscipiūt. Postea Carthaginēsis corij squamā magni digiti latitudine, aut prout contulerit resectam, extrinsecus ad nasum inclinatum agglutinare oportet, & deinde hoc corij lorum prout contulerit extendere. Paulo tamen amplius extendere conuenit, quo erectus & absolute directus sit nasus. Longum autē sit hoc lorum, vt postea infra aurē abductū circum caput obducatur, & licet quidē lori extremitatē ad frontem agglutinare, licet etiā longius ducere, & deinde capiti obductum deligare. Hic modus simul iustam directionem habet, & simul ad moderationē faciendam promptus est, vt si quis magis aut minus nasi inclinationē ad contrariū facere velit. Nam quibus in obliquum nasus frangitur, eos in reliquis velut relatum est curare oportet. Plurimis tamen insuper opus est, vt inclinationis in contrarium gratia, lorum ad summū nasum agglutinetur. Quibuscūque vero cum fractura etiam vlcera adsunt, eos ea propter turbari non oportet. Verum super vlcera ceratum picatum imponere, aut ex emplastris aliquod cruetis vulneribus idoneum. Facilia enim curata talia sunt. Similiter etiam, si ossa discessura sunt. Primam directionē impigre facere oportet nihil omittendā, & directionem per digitos etiā postero tempore, ita vt laxius quidē admoueas, admoueas tamen. Ex omnibus enim corporis partibus nasus facillime conformari potest. Cæterum lororum agglutinatione ac in contrarium inclinatione vti omnino nihil prohibet, siue vlcera affuerint, siue inflammatio. Nullā enim molestiam exhibent.
- At vero si auris fracta fuerit, deligationes omnes inimicæ sunt. Neque enim ita laxam quis circudare poterit. Si vero magis premat, maius malum operabitur. Nam & sana auris deligatione pressa, dolore, & pulsatione, & febre afficitur. Sed & cataplasmata pessima quidem omnino sunt quæ grauissima

*Auriculæ
fractura.*

Pp iij sunt.

HIPPOCRATIS LIBER

sunt. Verum & alia pleraq; omnia mala sunt, & abscessus inducunt, & mucum ampliorem suggerunt, & deinde suppurationes noxias. His autē fracta auris minime opus habet. Proximum tamen locum habet, si quid imponi debet, farina viscosa, quā neque ipsam grauem esse oportet. Cōtingere vero quāminime conducit. Bonum enim aliquādo medicamentum est, etiam nullum adhibere medicamentum, & ad aures, & ad multa alia. Vellicationem insuper ac sculpturam vitare oportet. Corpus autem attenuare, & magis in quo periculū est ne auris suppuretur, meli⁹ est quoq; aluum mollire. Si vero quis facile vomat, ex moderata aliqua purgatione vomitū faciat. At si ad suppurationem deueniat, cito quidem aperire non oportet. multa enim ex his quæ suppurari videntur, quādoque reforbentur, etiāsi nōdum quis vllum cataplasma imposuit. Si vero quis aperire cogatur, celerrime quidē sana fit, si in vltiorem partem perurat. Illud tamē certo scire expedit, q̄ mutata fiet auris, & minor altera, si perusta fuerit. Si vero non in vltiorem partē peruratur, tumidam partem non valde parua sectione incidere oportet. Sub crassiore enim cute pus reperitur quā quis putauerit. Verum vt in summa dicam, alia quoq; omnia mucosa, & mucos faciētia, vtpote quæ sunt viscosa, ad cōtactum sub digitis hac atq; illac cito dilabuntur; & propterea sub crassiore cute medici talia inueniūt, quā putarint. Nā & aliquas neruorum cōtortiones, ganglia appellatas, quæ sanē laxæ ac fluidæ sunt, mucosamq; carnem habent, multi aperiunt, humorē in talib. se inuēcturos esse putantes. Medicus quidē igitur sententiā sua fallitur, verum rei huiusmodi nullū ex apertione accedit detrimentū. Qui vero aquosi loci sint, aut mucō pleni: & in qualib. locis singula si aperiuntur mortē afferant, aut etiam alia detrimenta inducant, de his in alio opere scribetur. Quum igitur inciderit quis aurem, ab omnibus quidē cataplasmatibus, & ab omni linamentorum vsu abstinere oportet. Curare autem vel emplastro aliquo cruentis vulneribus idoneo, vel aliquo alio, quod neq; grauitatem, neq; dolorē inducat. Si enim cartilago denudari inceperit, & subsidentia purulēta aut mucosa habuerit, molestū est: Sic autem & hoc propter illas curationes. Cæterum omnium eorū quæ recruduerunt, perustio in vltioriē partem sufficientissima medela est. Verticula vero spinæ quibuscun-

Auris incis.
sa.
Curatio.

Verticula
spinæ.

- A** quibuscunque in gibbum trahuntur ex morbis, pleraque, ut soluantur fieri non potest. Insuperque & quæ supra septum transversum si iuncturam ac connexionem gibba fiunt. Quæ vero infra, eorum aliqua solvunt varices in cruribus fientes. Magis autem hæc varices quæ in vena iuxta popliteam fiunt, quibuscunque gibbositas contigerit, eam solvunt. Fiunt autem & in vena circa inguina. Iam vero quibusdam etiam dysenteria diuturna solvit. Et quibus quidem gibba fit spina dum pueri sunt, priusquam corpus ad augmentum plenum perfectum fuerit, his corpus iuxta spinam coangari non solet. Sed crura quidem ac manus perficiuntur, illæ vero partes defectuosiores fiunt. & quibus supra septum transversum gibbositas est, his & costæ in amplitudinem augeri non solent, sed in anteriorem partem: & petus acutum fit, sed non latum: ipsique & difficulter spirant, & stridulam faucium asperitatem habent. Nam ventriculi qui spiritum suscipiunt ac emittunt, minorem amplitudinem habent. Sed & iuxta magnum verticillum cervicem repandam habere coguntur, ut ne caput ipsis pronum sit. Multam igitur angustiam faucibus exhibet etiam hoc os intro vergens. Nam & his qui natura recti sunt, spirandi difficultatem hoc os inducit, si intro vergat, donec repressum fuerit. Ob talem igitur figuram eiusmodi homines eminentis gutturis, magis quam sani apparent; & tuberculis circa pulmonem duris ac crudis plerumque tales affecti sunt. Nam & gibbositatis occasio, & diffusio plerisque propter tales collectiones fit, cum quibus vicini nervi communionem habent. Quibus vero infra septum transversum gibbositas est, horum quibusdam morbi rheum ac vesicæ accedunt. Sed & abscessus ad suppurationem, & circa laterum mollitudines, & inguina diuturni ac ægre curabiles, & nervi horum gibbositates solvunt. Coxæ vero his magis excarnes fiunt, quam his quibus superne gibbositas contigit. Univerſa tamen spina his longior est quam superne gibbosis. Pubes vero & barba tardior ac imperfectior. Sed & infecundiores hi sunt quam superne gibbosi. At vero quibus iam aucto corpore gibbositas facta fuerit, his palam præsentis tunc morbi iudicationem gibbositas facit, per tempus tamen, aliquid ex iisdem significationem de se plus aut minus præbet, quemadmodum etiam in pueris. Minus autem maligne in totum talia se habent. & multi sanè iam facile ac sano modo gibbositatem sustinuerunt,

HIPPOCRATIS LIBER

*Spina gib-
bosa.*

stinuerunt, usque ad senectutem: & maxime hi quibus ad car-
nositatem ac pinguitudinem promotum fuerit corpus. pauci
tamen talium sexaginta annos transgressi sunt. plerique ve-
ro brevioris vite sunt. Quibusdam etiam in latus, aut hac aut
illac, verticula obliqua sunt. Et omnia aut pleraque talia, pro-
pter collectiones intra spinam sunt. Quibusdam una cum mor-
bo etiam figura insuper conferunt, ad quas reclinari consue-
verunt. Verum de his in diuturnis pulmonis morbis dicitur.
Illic enim de his quae futura sunt, pulcherrimae praenotiones
habentur. Porro quibus ex casu spina gibba fit, horum sa-
ne pauca superantur, ita ut dirigi possint. Nam quae in scala
sunt extensiones, nihil direxerunt quod ego sciam. Utuntur
enim ipsa maxime hi medici, qui multitudinis famam aucu-
pantur. Apud tales enim haec in admiratione sunt, si aut pen-
dentem, aut prolici aliquem aut quae his similia sunt videat,
& haec celebrant semper, neque ipsis cura est quale quid eue-
niat ex hac aggressionem, siue bonum id sit, siue malum. Medi-
ci tamen qui talia studio habent, quos sane ego novi, imperi-
ti sunt. Inventum equidem vetus est, & laudo sane vehemen-
ter eum qui primus excogitavit & hoc machinamentum, &
quoduis aliud secundum naturam inventum. Nihil enim de-
spero, si quis recte constructum concutiat, fieri posse ut quae-
dam dirigantur. Ipse tamen omnia huiusmodi hoc modo cu-
rare erubui, propterea quod impostori magis tales sunt mo-
di. Quibus igitur prope cervicem gibbositas fuerit, his veri-
simile est has in caput extensiones minus prodesse paruum
enim pondus habet caput, & summi humeri deorsum vergen-
tes. Verum tales verisimile est magis dirigi posse, si in pedes
concutiantur. Ita enim maior propensio ad huiusmodi fieret.
Quibus autem magis inferius gibbositas est, hos par est ut ma-
gis in caput concutiantur. Si quis igitur concutere volet, re-
cte sane hoc modo preparare poterit. Scalam coriaceis aut
lanceis pukuinaribus infernere oportet probe alligatis, paulo
amplius & in longitudinem, & in utraque parte, quam qua-
rum corpus hominis occupavit. Deinde hominem supinum
supra scalam reclinare, & postea pedes quidem alligare iux-
ta malleolos ad scalam non disparatos, vinculo quidem satis
valido, verum molli, alligare vero etiam oportet infra & su-
pra utrumque genu, itemque circa coxas. Circa laterum au-
tem mol-

Atem mollitudinem, & circa pectus, laxas fascias circū dare, ita ut ne impediant concussionem. Manus vero ad costas extētas, ad corpus applicare, & non ad scalam. Vbi vero hæc præparaueris, scalam ita ad turrim aliquam altam, aut ad domus lacunar attrahere oportet. Locus autem in quo concussionē facis, renitens sit. Eos vero qui extendunt probe doctos esse conuenit, quo æqualiter, & probe, & ex æquilibrio, ac derēpente demittant, ut neque scala in alteram partem repēs ad terram deueniat, neque ipsi proni sint. Quod si tamen a turri, aut malo defixo carthesium habēte, quis demittat, adhuc melius præparabit, ita ut ex trochlea aut asello laxatis instrumentis ac funibus demissio fiat. Verum iniucundum est de his longius verba facere; attamen ex his structuris maxime

B quis concuti poterit. Si vero valde superne fuerit gibbositas, & concutere sit opus, omnino in pedes id faciendum est, velut dictum est. Ita enim maior propensio ad hæc contingit. Et firmare quidem oportet iuxta pectus ad scalam fortiter deligando, iuxta ceruicem vero fascia quā laxissima, directionis saltem gratia. Sed & ipsum caput iuxta frontem ad scalam alligare oportet, manus autem porrectas ad corpus alligare non ad scalam. Reliquum vero corpus indeligatum esse oportet, nisi quantum satis est directionis gratia, alia atque alia laxa fascia circumdatum esse. Verum considerandum est ne concussionem impediant hæc vincula. Crura vero ad scalam quidem ne deligentur, sed inter se, ita ut secundum spinam in directum vergant. Atque hæc quidem hoc modo

C facienda sunt, si omnino opus fuerit in scala concussionem fieri. Turpe tamen est & in omni arte, & non minime in medicina, multam turbam, & multā ostentationem, & multum rumorem concitare, & deinde nullā vtilitatem afferre. Oportet autem primum spinæ naturam qualis est cognoscere, ad multos enim morbos ea opus fuerit. Nā quā parte ad ventrem vergit, verticula intus inter se paria sunt, & inter se ligata vinculo mucoso ac nervoso de cartilaginib. exorto vsq; ad medullam. Alij vero nervi nervosi perpetui annexi, hinc atq; illinc iuxta ipsa porriguntur. Verum venarū & arteriarū communitates, in alio sermone declarabuntur, quot & quales sint, & vnde proficiantur, & in quibus qualia possint. Itemque quibus inuolucris ipsa medulla intecta sit, & vnde profectis,

*Spinæ natura per-
nosceda.*

HIPPOCRATIS LIBER

profectis, & ubi desinētibus, & quibus cum cōmunionem ha- D
 bentibus, & qualia potentib. At in vltiore parte in articulis
 verticula inter se cādinis in modum conferta sunt. Nerui ve-
 ro communes iuxta omnia, & in externis, & in internis par-
 tibus porriguntur. Et processus ossis ad externam partem, ab
 omnibus verticulis vnus de vnoquoq; tum à maioribus, tum
 à minoribus. In his autem processibus cartilaginum appen-
 dices, & ex illis neruorum progerminatio, cognata ac confi-
 milis extremis neruis. Costæ vero annexæ sunt, ad internam
 partem magis quàm ad externam capitibus vergentes, ad v-
 numquodque autem verticulum adarticulatæ sunt. Curuissi-
 mæ autē sunt hominis costæ obtorto modo. Intermediā ve-
 ro partem costarum & ossium de verticulis procedentium, E
 explent vtrinque muscoli, à ceruice initio sumpto, vsq; ad se-
 pti transuersi annexionē. Ipsa autem spina secundum longitu-
 dinem rectobliqua est, à sacro quidē osse vsque ad magnum
 verticulū, iuxta quod crurum annexio depēdet, gibbosa est.
 Nam & vesica, & genitura, & intestini recti laxa pars, in hac
 parte constituta sunt. Inde vero vsque ad septi annexionem;
 in directum repāda est, & musculos ad nates habet solus hic
 locus, ex internis partibus, quos lumbarios vocant. Ab hac au-
 tem parte vsq; ad magnum verticulū, quod supra supernas hu-
 meri partes est, è directo gibbosa est, imò magis esse videtur
 quàm est. Nam spina media sui parte, altissimas ossiū propa-
 gines habet, hinc autē atq; illinc, minores. Ipse vero ceruicis
 articulus repandus est. Quibuscūq; igitur gibbositates iuxta F
 verticula fiunt, his expulsio magna à connexionē abrupta,
 vnus aut plurium verticulorum, nō ita multis, sed paucis cō-
 tingit. Neq; enim talia vulnera fieri facile est, neq; ad exter-
 nam partem expelli facile est, si non ex anteriore parte, forti
 aliqua re per ventrē quis vulneratus fuerit. Sic autem vtique
 perierit: aut nisi quis ex alto loco delapsus, coxis aut hume-
 ris impeerit. Sed & hic vtique morietur, etiamsi statim non
 intereat. At ex posteriore parte ad internam, huiusmodi ex-
 pulsionem fieri non est procliue, si non in immensum graue
 aliquod onus irruat. Nam ex ossibus quæ foras enata sunt, v-
 numquodq; eiusmodi est, vt prius ipsum frangatur, quàm ma-
 gnā intro inclinationem faciat, ita vt & ligamenta, & arti-
 culos inter se alternatos ac articulatos violet. Præterea & spi-
 nalis

- A** nalis medulla affligeretur, si ex modico loco inflexionē haberet, vbi verticulum tali expulsiōe exiluiſſet: & verticulum quod exiluiſſet, ſpinalem medullā vtiq; premeret, ſi non etiā abrumperet: At ea preſſa ac intercepta, multarū & magnarū & nobilium partium torporē induceret. Quare neq; curę foret medico, quomodo verticulū dirigat ac coaptet, quū multa & violenta alia mala adſint. Itaq; ſi tale contingat, palām eſt quòd neq; concutiendo, neq; alio quodam modo, reponi poſſit, niſi quis diſſecto homine, & manu in ventrem iniecta inquiſitionem faciat, & ex interna parte ad externam manu retrudat. atq; hæc in mortuo quidē fieri poſſent, in viuō autem non ita. Cur igitur hæc ſcribo? Quia ſunt quidam qui
- B** putant ſe curaſſe homines, quibus intro exciderint verticula articulos penitus tranſgreſſa: & ſanè facilimam hanc diſtortionē eſſe, vt quis inde cōualeſcat, aliqui cenſent, eamq; nulla repositione opus habere, ſed ſua ſponte talia ſaneſcere. Ignari autē multi ſunt, & lucro hoc habēt quod ignorāt. Perſuadent enim alios. Verū fallūtur hi hac de cauſa. Spinā quæ in ſpina ipſa eminet, verticula ipſa eſſe putāt, quia vnūquodque ex his offibus ad contactum rotundū apparet, ignorātes quòd hæc offa ſunt ea quæ à verticulis enata ſunt, de quibus paulo ante dixi. At verticula longe magis in anteriore partem abſunt. Anguſtiſſimum enim ventrem ex omnibus animalibus homo habet, quantum ad magnitudinem attinet, à poſteriore ad anteriorem partē, inſuperq; etiā iuxta pectus.
- C** Quum igitur horum ſupereminentium offium aliquod vehementer fractū fuerit, ſiue vnū, ſiue plura, ea parte humilior locus redditur, quàm hinc atq; illinc: & propterea decipiuntur putantes verticula intro abiſſe. Decipiunt autem inſuper ipſos etiam figurę vulneratorum. Si enim inclinare ſe conātur, dolent: quū ea parte qua vulnerati ſunt, cutis ſit circumtenta: & ſimul offa fracta ita magis corpus affligunt. Si vero in repandum recuruantur, melius habent. Nam & cutis iuxta vulnus laxior fit, & offa minus affligunt. Sed & ſi quis ipſos cōtingat, ea parte repandi cedunt, & locus vacuus ac mollis hac parte ad contactum apparet. Hæc omnia relata inſuper medicos decipiunt. Verum tales cito ſani & illæſi ſua ſponte fiunt. Cito enim omnia eiufmodi offa quæ laxa ſunt, callo obducuntur. Obliquatur igitur ſpina etiā ſanis iuxta multos modos.

Spinæ obliquatio.

HIPPOCRATIS LIBER

modos. Nam & in natura, & in usu ita se habet. Sed & præ se- D
 neſcitur, ac dolorib. Nam hæc colligãdi vim habent. At gib-
 boſitates ex caſibus contingẽtes plerunq; ſiunt, ſi aut in co-
 ſtas innitatur ac impingat, aut in humeros cadat, Neceſſe eſt
 enim foris apparere in gibboſitate vnum aliquod altiffimum
 verticulũ, minũs vero ea quę ſunt hinc atq; illinc. Non igitur
 proſilit multũ ab aliis, ſed parum, quũ ſingula aceruatim cõ-
 cedãt. Propter hoc igitur etiã ſpinalis medulla eiufmodi di-
 ſtortiones facile fert, eo q̃ circularis ipſi diſtortio cõtigit,
 non angularis. Oportet autem fabricã inſtrumẽti coactõ-
 rij huiufmodi cõſtruere. Licet equidẽ lignum robuſtum & la-
 tum, inciſuram oblongam habens, deſodere. Licet etiã pro li-
 gno, in pariete inciſuram oblõgam facere, quæ aut cubiti al-
 titudine, aut prout congruum fuerit, à pauiẽto extet. Poſt- E
 ea colũnam querneam, quadrangularem, obliquã ad parietẽ
 adiicere oportet, tanto ſpacio in medio relicto, aut aliquis
 pertranſire poſſit, ſi forte opus ſit. Et ſuper colũnam quidem,
 aut tunicas, aut aliud quid molle, quod tamẽ non multum ce-
 dat, inſternere oportet, homini vero fomentum adhibere. Si
 vero admittat, ipſum etiã lauare. Deinde pronũ extenũ re-
 clinare, & manus ipſius ſecundum naturã extenſas ad corpus
 alligare. Poſtea vero loro molli ſatis lato ac longo, ex duobus
 perpetuis inter ſe aduerſariis loris conſtante, ex media ipſius
 parte, iuxta medium pectus quã proximẽ ſub alas, bis cir-
 cundare oportet: & quod ſupereſt de loris vtriſq; iuxta alam
 circum humeros obuoluatur, & initia ipſorũ ad lignũ quod- F
 dam piſtilloforme alligentur, ita vt congruant ſecundũ lon-
 gitudinem ſubiectæ colũnæ, ad quã lignum illud piſtillofor-
 me apponere, & renitendo extenſionẽ facere oportet. Tali
 vero quodam alio vinculo & ſupra genna, & ſupra calcanea
 alligato, initia item ad eiufmodi lignũ alligare oportet. Poſt-
 ea autẽ alio loro lato ac molli & robuſto faſcię formã habẽ-
 te, longitudinẽq; ac latitudinem ſufficentẽ, partem inter co-
 xas & lumbos, quã proximẽ ad coxas, circumcirca fortiter
 deligare, atq; ita tum huius lori, tum aliorum duorũ capita,
 ad lignũ à pedib⁹ extenſũ alligare. & poſtea in hac figura hinc
 atq; illinc, æqua ſimul inclinatione, ſimulq; in directũ exten-
 ſionẽ facere. Nullũ enim magnũ malũ talis extenſio induce-
 rit, ſi cõmode præparata fuerit, niſi quis de induſtria ſe exten-
 dendum

- A** tendendum exhibeat. At medicus, siue alius quisquā fortis & nō imperitus, imposita manus vola supra gibbū, & altera manu insuper alteri superimposita, deorsum cogat, animaduersione habita an in directum deorsum cogere oporteat, siue ad caput, siue ad coras. Atq; hec coactio maxime innoxia est. Sed & si quis infideat super gibbum, & attollendo se dum ille distenditur incutiat, innoxium est. Neq; quicquam prohibet pede inscendere ac gestari supra gibbum, atque ita sensim incutere. Ad hoc autem moderate faciendum idoneus quis fuerit ex his qui in palestra aduersi sunt. Efficacissima tamē coactio est, si aut paries incisuram habeat, aut lignum defossum infra spinæ altitudinem incisum sit, quantum moderate habere videatur, ita vt tabula tiliacea, aut cuiusdam alterius ligni, non tenuis, incisuræ indatur, & postea linteum quoddā multiplex, aut paruum quoddā coriaceum puluinar, super gibbū imponatur. Quam paucissima tamē imposita esse cōducit, cauēdi saltem gratia, vt ne tabula præ duricie dolorem aliquē importune inducat. Sit autem gibbositas è directo maxime incisuræ in pariete, quo qua parte maxime extat, ea quam maxime tabula imposita premat. Vbi vero imposita fuerit, aliquis extremā tabulæ partem deprimat, aut duo hoc faciant, si vnus non suffecerit. alij vero corpus secundum longitudinem velut dictum est extendant, partim hinc, partim illinc constituti. Potest etiam a sellis extensio fieri, aut iuxta lignum defossum, aut in ipso ligno a fellorum postibus cōstructis, siue erectos velis vtrinq; paululum supereminentes, siue hinc atq; illinc iuxta ligni verticem. Hæ coactiones moderationē admittunt, vt & vehemētissime, & moderate fieri possint. Talem autem vim habent, vt si quis etiam ad perniciem tales necessitates adhibere velit, & non ad curationem, tunc quoque multum possint. Nam si quis secundum longitudinem hinc atq; illinc saltem sic extendat, & nullam aliam necessitatem addat, tamen sic etiam extensionem facere poterit. Sed & si non extendat, & tabula solum ita quis vtatur, etiam sic sufficienter deorsum cogere poterit. Bonæ autem sunt huiusmodi violentiæ, quibus & vehemētioribus & debilioribus vti licet, vsu ipsorum prout quisq; vult moderato. Et sanē etiam secundū naturam coactionem faciunt. Nam ea quæ extant, ad locum suū redire cogit depressio. Quæ vero præter

HIPPOCRATIS LIBER

præter naturam coiuerunt, ea extendunt extensiones secundum naturam. Proinde neque meliores his necessitates ego habeo, neque iustiores. Rectitudo enim extensionis iuxta ipsam spinam, inferne & iuxta os sacrum appellatum, nullam ansam habet: superne vero iuxta ceruicē & caput, habet quidem ansam, sed in speciem indecora est: & si hac parte extensio fiat redūdans, etiā alias læsiones inducere poterit. Experimentum autē aliquando feci, ut homine supino extēto, virem non inflatum sub gibbum subderem, & postea folle ex officina fabri in subiectum virem immisso inflarē. Verū res mihi nō successit. Quum enim bene extēderem hominem, vincebatur vter, & non poterat flatus aliquam coactionē facere. Sed & aliās hæc res prompta erat ad dilapsionē, nimirū quum in idem & hominis gibbositas, & vtris pleni incurua turgiditas cogatur. Quum autem rursus non valde extenderem hominem, vter quidem præ flatu incuruus turgebat, homo verò omnino magis quàm conducebat repandus fiebat. Scripsi autem hoc de industria. Pulchrum enim est etiā ea discere quæ in experimentum assumpta successu caruerunt, & cur successum non habuerunt. Quibuscunq; porro verticula intro obliquantur, aut ex casu, aut graui aliqua re illapsa, his nullum quidem verticulum extat plerunque ita multum ab aliis. Si vero extiterit multum, aut vnum aut plura, mortem inducunt, velut etiā antea dictum est. Circularis etiam hæc, & non angularis emotio existit. Vrinæ igitur talibus magis supprimūtur, itemq; alui egestio, quàm his qui extra gibbosi sūt: & pedes ac tota crura magis perfrigerantur, & lethalia sunt hæc magis quàm illa quæ dixi. Sed & si superstites euadunt hi, magis profluam urinā habent, & cruribus impotentiores ac torpidiores fiunt. Si vero etiā in superna parte magis repadi fiant, totius corporis impotentia ac torpor accedit. Atque ego sanè nullā machinā habeo, per quam talia in idem restitui possint, si non alicui concussio per scalā opem tulerit, aut etiā alia quædā eiusmodi curatio aut extensio, qualis est ea quæ paulo antea relata est. At coactionem vnā cum extensione nullā habeo, quæ sanè fieri ita posset, velut in gibbo tabula coactionem faciebat. Quomodo enim quis ab anteriore parte per ventrem coactionem facere possit? Neque enim fieri hoc potest. Sed neque tusses, neque ster-

nutationes

*Verticula
obliquata.*

- A** nutationes vllam vim habent, vt extensioni auxiliari possint. Nec vero flatus immissio in ventrem quicquā efficere poterit. **Quin** & si magnæ cucurbitæ affigatur, attractionis nimirum gratia verticulorum intro repentium, magno hoc mentis errore cōtingit. Propellunt enim magis quā attrahunt, & neque hoc animaduertunt hi qui ipsas affigunt. Quāto enim magis ipsas quis adigit, tāto magis repādi fiunt hi quibus affiguntur, cute simul sursum coacta. Possem autē & alios cōcussionum modos, quā hi sunt quos antea retuli, exponere, quos sanē affectioni magis conuenire quis putare possit, verum non valde ipsis fidem habeo, & propterea non scribo. In summa igitur de his quæ relata sunt, ita aceruatim constitutere oportet, quod ea quidem quæ in repādum emota sunt, lethalia sunt ac noxia: quæ vero in gibbum, innoxia in totum, quantum ad mortem, & vrinæ suppressionem ac torporem attinet. Non enim riuos qui sunt in ventre gibbositas ad externā partem intendit, neque fluidos esse prohibet. Repāditas vero ambo hæc facit, & ad alia multa hæc accedunt. Nam multo plures & curibus & manibus impotentes fiunt, & corpore torpescunt, & vrinæ his supprimuntur, quibus gibbositas quidē neque extra neque intrō extiterit, verum in rectitudinem spinæ vehementer concussi fuerint. Quibus vero gibbositas extat, hi minus talia perpetiuntur. Multa vero etiā alia in medicina quis videre poterit, ex quibus ea quidem quæ fortia sunt, innoxia sunt per se totā morbi iudicationem inducentia: quæ vero debiliora, noxia, ita vt & diurnos morbos progenerēt, & cum reliquo corpore ampliorē communionem habeāt, Nam & costarum fractura eiusmodi quid perpetitur. Quibus enim fracta fuerit costa vna, aut plures, velut plurimis frangitur, ita vt ossa ad internam partem non vergant, neque denudata sint, ex his pauci iam febricitarunt. Sed neque sanguinem multi iam expuerunt, neque suppurati multi fiunt, neque curatione medicamentorum ex illitis linamentis opus habent, neque ossium corruptiones accedūt, & victus vulgaris sufficit. Si enim febris continua ipsos non corripuerit, etiam vasa per inediam his vacua fieri deterius est, quā si non vacua fiant. Maiorem item dolorem ac febrē & tussim inducit. Moderata enim ventris repletio, costarum sit directio. Verum vacuatio pendentes costas facit, & hæc
- Qq depen-

HIPPOCRATIS LIBER.

dependētia dolorē inducit. Extrinsecus autē vulgaris deligatio talibus sufficit, ita ut cerato, & spleniis, & linteis, plana deligatio placide firmetur, ut etiā lanceum quiddam insuper imponatur. Corroboratur autem costa diebus viginti. Cele-riter enim his ossibus calli obducuntur. At confusa circa co-
stas carne, aut ex plaga, aut ex casu, aut renisu, aut alio quo-
piam eiusmodi, multi iam multum sanguinem spuerūt. Riui
enim in molli ad vnamquāque costam extenta parte, & ner-
ui, à principalissimis in corpore partibus progressus habent.
Multi itaque iam tussiculosi, & tuberculosi, ac suppurati facti
sunt, & linamentis opus habuerunt, & costa ipsis corruptio-
nem sensit. Sed & quibus nihil tale accessit, carne circa co-
stas confusa: tardius tamē dolor in ipsis sedatur, quā in his
quibus costa fracta fuerit: & in talibus vulneribus locus do-
lorum recidiuus magis habet. Proinde aliqui tales noxas ma-
gis contemnunt, si costa ipsis fracta fuerit. Quin & curatio-
ne exactiore tales indigent, si modo sapiant. Visum enim
contractum esse conducit, & corpore quā maxime quie-
scere, & à venere abstinere, eduliisque pinguibus, & fauces
exasperantibus, ac fortibus omnibus: Venamque in cubi-
ti flexura secare, & quā maxime filere. Deligare vero lo-
cum confusum conducit spleniis non multiplicibus, sed mul-
tis & multo latioribus tota confusione, & cerato subline-
re, & linteis latis cum fasciis latis ac mollibus deligare, &
moderate firmare, ut deligatus non valde se compressum
esse dicat, neque rursus laxum. Initium autem sumere de-
bet qui deligat in ipsa confusione, atque isthic maxime fir-
mare. facienda vero est deligatio velut à duobus initiis, de-
ligandumque ut ne circumflua sit cutis circa costas, sed æ-
quilibris. Deligandum autem aut singulis aut alternis die-
bus. Præstat autem & aliud mollire leni aliquo medica-
mento, cibi saltem euacuandi gratia: & ad decem quidem
dies attenuare. Postea vero corpus renutrire ac tenerum fa-
cere. Quādiu vero attenuas, deligatione magis firmata v-
tendum est. Quādiu autem ad teneritudinem deducis, la-
xioze. Et si quidem sanguinem ab initio expuerit, quadra-
ginta dierum curationem ac deligationem facere oportet. Si
vero sanguinem non spuat, sufficit viginti diebus utpluri-
mam curatio. Verum ex robore vulneris tempora coniecta-
re oportet.

- A** re oportet. Qui porrò tales contusiones neglexerint, etiam si aliud nihil maioris mali ipsis contingat, tamen locus contusus mucosiores carnem habet, quàm antea habebat. Vbi vero tale quippiam relinquitur, & curatione non probe exprimitur, deterius quidem est si iuxta ipsum os mucositas relicta fuerit. Neque enim caro amplius similiter os contingit, & os ipsum morbosius redditur, & corruptiones ossis diuturnæ, multis iam ex huiusmodi occasionibus factæ sunt. Sed & si iuxta os non fuerit, verum ipsa caro mucosa sit: attamen etiam sic recidiuæ, ac dolores, aliàs atque aliàs fiunt, si quis forte corpore ægrotauerit. Quapropter deligatione vti oportet bona, simulque multum conueniente, quo ad ea humoris effusio, quæ in contusione facta est, reficcetur ac resorbeatur, locus autem carne sana augeatur, & ossis quoque caro augeatur. At quibus ex neglectu verustatem contraxerit, ita ut locus sit dolorosus, & caro submucosa, his vltio medela optima est. Et si quidem ipsa caro mucosa fuerit, vsque ad os vrere oportet, non tamen ut os percalescat. Si vero inter costas mucositas fuerit, ne sic quidem in superficie vrere oportet, cauere tamen ne in vltiorem partem peruras. Si vero ad os ipsum contusio esse videatur, & sit adhuc recens, & nondum os corruptionem sentiat: si quidem parua admodum fuerit, sic vrere oportet veluti dictum est. Si vero oblonga fuerit iuxta os contusionis eleuatio, plures crustas incutere oportet. Cæterum de corruptione costæ, vna cum eorum qui linamentis opus habent curatione, dicetur.
- C** Si vero femoris articulus ex coxa exciderit. Excidit autem iuxta quatuor modos, intrò quidem sæpe, foras autem præ aliis sæpe. Verum in posteriorem ac anteriorem partem excidit quidem, sed raro. Quibus igitur intrò exciderit, his longius apparet crus, si ad alterum comparetur, atque hoc merito, propter duas causas. Nam os quod à coxa procedit, & sursum ad pectinem fertur, fundamentum fit capitis femoris, & articuli ceruix in acetabulo vehitur: & nates forinsecus cauæ apparent, utpote quum intrò cesserit femoris caput. Et rursum summa femoris pars iuxta genu, extra repere cogitur, Tibia item, & pes, eodem modo. Quum igitur foras repat pes, medici ob imperitiam, sanum pedem ad hunc adhibent, & non hunc ad sanum: & propterea multo longius

*Femoris
articulus
quatuor
modis ex-
cidit.*

Qq ij læsum

HIPPOCRATIS LIBER

læsum crus apparet quàm sanum. Multis autem etiam aliis locis talia sinistram intelligentiam habent. Nec vero flectere iuxta inguen similiter ut sanum possunt. Sed & si femoris caput in interfoemineo contingatur, palàm extuberare comperitur. Signa igitur hæc sunt, in his quibus femur intro excidit. Quibus igitur articulus elapsus non fuerit repositus, sed aut frustra tentatus est, aut neglectus, his & ambulatio per cruris circumvolutionem, velut in bobus fit, & plurima vexatio ipsis in sano crure contingit: & coguntur iuxta lateris mollitudinem, aut iuxta elapsum articulum, mutili ac obliqui esse. Iuxta sanum vero crus, nates ad externam partem rotundæ esse coguntur. Si quis enim sani cruris pede extra ambularet, protruderet utique reliquum corpus, ut ad læsum crus veheretur. Læsum autem vehere hoc non poterit. quomodo enim posset? Cogitur igitur sic sani cruris pede intro ambulare. & non extra. Ita enim maxime vehit sanum crus, & suam ipsius, & læsi cruris, partem corporis utrisque incumbētem. Quum autem iuxta lateris mollitudinem, ac iuxta articulum cauentur, parui apparent, & baculo inniti coguntur à latere iuxta sanum crus. Hac enim parte fulcimento opus habent. Ad hanc enim & nates repunt, & in hac corporis pondus vehitur. Coguntur item se inclinare. Manum enim quæ est à parte cruris læsi, ad obliquum femur firmare coguntur. Non enim potest læsum crus vehere corpus, in crurum permutatione, si non detineatur dum ad terram premitur. In his igitur figuris esse coguntur hi quibus intro elapsus, non fuerit repositus articulus, homine non præmeditante ut quàm facillime sit figuratus. Sed ipsa hæc calamitas ex præsentibus ea quæ facilima sunt eligere docet. Nam & qui vlcus habent in pede aut tibia, non omnes crure valde ingredi possunt, & infantes sic iter faciunt, extra enim ingrediuntur læso crure. Et duplex lucrum consequuntur. Duplici enim opus habent. Nam & corpus non similiter vehitur in eo crure quod extra ingreditur, sicut in eo quod intro. Non enim secundum rectitudinem ipsi incumbit pondus, sed multo magis ei quod subingreditur. Ipsi enim è directo incumbit pondus, tum in ipsa ambulatione, tum in crurum permutatione. In hac enim figura sanum crus celerrime supponere poterit, si eo quod læsum est, exterius: sano

A sano interius ingreditur. Verum de quo nunc sermo est, Bonum est vt corpus ipsum sibiipſi facilimas figuras inueniat. Quibus igitur nondum perfectis ad augmentum, elapſus articulus non fuerit repositus, his femur decurtatur, & tibia, & pes. Neque enim ossa similiter in longitudinem auſcunt, sed breuiora sunt. Maxime autem femoris. Excarne item & emusculatum, ac effœminatum & tenuius totum fit crus, simul quidem propter priuationem loci articuli, simul autem quod eo vti non possunt, eo quod secundum naturam firus non est. Vſus enim aliquis liberat ab effœminatione, liberat etiam aliquantum ab intercepto in longitudinem augmento. Maxime igitur læduntur hi quibus dum in vêtre sunt, hic articulus fuerit luxatus. Secundo loco hi quibus vnde infantib⁹ idem cōtigit. Minime vero hi qui perfecti sunt. Qualis igitur ambulatio perfectis cōtingat, dictum est. Quibus vero dum infantes sunt calamitas hæc incidit, plerique ad corporis directionē tardi sunt, immo male ad sanum crus deuoluuntur, manu quæ est ad sanum crus, ad terrā se fulcientes. Sed & ex perfectæ ætatis hominib⁹ quidā, quibus hæc calamitas contigit, ad ambulationem rectā cunctantur. Quicunq; vero infantes hac calamitate pressi, recte educati fuerint, sano quidem crure in rectum vtuntur, verum sub alam secundum sanum crus scipionem ferunt, aliqui etiam sub vtranque alam. Crus autem læsum eleuatū habent, & tātō melius habent, quātō breuius ipsius læsum crus fuerit. Sanū autem crus nihilominus ipsis robustum est, quā si ambo sana essent. Effœminantur tamen omnibus talibus carnes cruris, & plerunq; hoc magis perpetiuntur hæc quæ sunt ab externa parte, quā quæ ab interna. Cæterum quidā fabulantur Amazonides masculam suā sobolem statim dum infantes sunt luxare, aliās circa gēua, aliās circa coxas, quo nimirum claudi fiant, & masculum genus fœmineo infidias non fruatur. Vtuntur itaq; his pro opificib⁹, ad coriaria, aut fabrilis, aut alia sedētaria opera. An equidem vera hæc sint, ego non noui: quod autē tales fiant, scio, si quis ipsos statim dum infantes sunt luxet. Iuxta coxas igitur magna differētia est, an extra, aut intro fiat luxatio. Iuxta gēua vero, differentia quidem aliqua est sed minor. Modus autem vtriusque claudicationis proprius est. Decurtantur enim magis hi quibus

Qq iij extra

HIPPOCRATIS LIBER

*Offiū co-
auctio.*

extra luxatio facta est. Recti autem minus stant, quibus in- D
tro luxatio contigit. Eodem modo etiam si iuxta malleolum
luxatio fiat, si quidem ad externam partem id contingat,
mutili quidem fiunt, verum stare possunt. Si vero ad internā
valgi quidem fiunt, minus autē stare possunt. At vero co-
auctio ossium talis fit. Quibus quidem circa malleolum ti-
biæ os excessit, his pedis quidem ossa minime coaugescunt.
hæc enim proxime ad vulnus sunt. Verum tibiæ ossa augen-
tur quidem non multo defectuosius, carnes tamen minuun-
tur. Quibus vero iuxta malleolum mæserit articulus secundū
naturā, iuxta genū autem excesserit, his tibiæ os similiter co-
augescere nō solet, sed breuius fit. Hoc enim proxime ad vul-
nus est. Pedis autem ossa minuuntur quidem, sed non simili-
ter, velut paulo ante dictum est, quia articulus circa pedē sal- E
uus est. Si vero ipso etiā vti possent, velut mutilo, minus ad-
huc pedis ossa his minuerentur. At quibus circa corā luxatio
cōtingit, his femoris os non similiter coaugescere solet. Hoc
nim proxime ad vulnus est: sed breuius sano fit. Tibiæ tamen
ossa nō similiter his augmento destituuntur, neq; ossa pedis.
atq; hoc ea de causa, q̃ femoris articulus qui ad tibiā est, &
tibiæ articulus qui ad pedē est, in sua natura manet. Carnes
tamen minuuntur his totius cruris. Si vero vti crure possent,
adhuc magis ossa augerētur, velut etiā prius dictum est, ex-
cepto femore, & minus excarnes essent. Multo tamen minus
carnosi q̃ hi qui sunt essent. Argumēto autē quod talia ita se
habent, hoc est. Quicunq; enim brachio elapso, mustellæ cubi- F
bito præditi sunt, paruumq; ac macilentū brachiū habet, aut
ex natiuitate, aut etiā dum augescunt, priusquā perfecti eua-
dant, galeancones appellari, hi os quidem brachij breue ha-
bent, cubitum autem & summā manum paulo, defectuosio-
rem quā fani, propter relatas causas, eo quod brachiū vul-
nerato articulo proximum est, ut ideo breuius factū sit. Rur-
sus autem cubit⁹ propterea nō similiter calamitatē percipit,
quia brachij articulus qui est ad cubitū, in veteri natura ma-
net. Et rursus manus adhuc longius abest à calamitate quā
cubitus. Propter has igitur causas cōtingit, ut & ossa quæ non
coaugētur, nō coaugescāt, & quæ coaugētur, coaugescāt. Cē-
terū ad carnositatē & manui & brachio multū profuerit, si
quis manu laborādo se fatiget. Quæcunque enim manuum
opera

- A** opera sunt, plurima ex ipsis Galeâcones hac manu operari conantur, velut altera possunt, & nihilo defectuosius quàm cum illæsa efficiunt. Non enim supra manus, velut supra pedes, corpus vehi necesse est. Verum leuia sunt ipsis opera. Propter vsum autem non minuuntur carnes Galeanconibus, neq; circa manum, neque circa cubitum. Sed & brachium propterea aliquam opem sentit ad carnositatem. Quum autem coxa eluxata fuerit ad internā partem à natiuitate, aut adhuc infanti, carnes ideo magis minuuntur quàm in manu, quòd crure vti non possint. Quòd autem hæc hoc modo se habeāt, testimonium vnum quoddam in paulo posterius referendis habebitur. At quibus in exteriorem partē femoris caput excesserit, his crus breuius apparet, si ad alterum extendatur, atque id merito. Non enim super os fundamentum fit capitis femoris, sicut quum intro excidebat, sed iuxta os quod inclinatam naturam habet in carne humida ac sedente firmatur. & propterea quidem breuius apparet. Intrinsecus autem iuxta plechada, intermediam crurum ac inguinum partem, femur magis mutilum & ex carne fit. Nates autē extrinsecus incuruiores, vtpote quum extra femoris caput elapsū sit. Sed & superius apparent nates, vtpote quum caro quæ isthic est, femoris capiti cesserit. Summa vero femoris pars circa genu, intro reperi videtur. Tibia item & pes. Sed neque inflectere velut sanum crus possunt. Et signa quidem femoris extra elapsi hæc sunt. Quibus igitur perfectis iam elapsus articulus non fuerit
- C** repositus, his totum crus breuius apparet. In ambulatione autem calcaneo terram pertingere non possunt. Verum pectore pedis in terra consistūt ac progrediuntur, parum autem ad internam partem summis digitis vergunt. At crus læsum in his multo magis corpus vehere potest, quàm quibus ad internam partem excidit, partim quòd caput femoris, & ceruix articuli, quum natura obliqua sit, sub multam coxæ partem subsistit: partim quòd summus pes non ad externam partem inclinatus esse cogitur, sed prope est ad rectitudinem corporis, & tendit etiam interius. Quum igitur semitam ac callem acceperit articulus, in carne ad quam elapsus est, & caro viscositatem contraxerit, doloris exors progressu temporis fit. Quum autem doloris exors factus fuerit, possunt quidem absque baculo iter facere, si alijs voluerint. possunt autem &
- Q3 iiij vehere

HIPPOCRATIS LIBER

vehere corpus supra crus læsum. Itaque propter vsum, car- D
 nes talibus minus effœminantur, quàm illis de quibus paulo ante dictum est. Effœminantur autem aut plus, aut minus. Magisque adhuc effœminantur plerunque iuxta internam partem, quàm iuxta externam. Plerique tamen ex his calceamentum sibi inducere non possunt, propter cruris inflexibilitatem. Quidam vero etiam hoc possunt. At quibus dum adhuc in ventre sunt, hic articulus fuerit luxatus, aut dũ adhuc augescunt, vi elapsus, non fuerit repositus, aut etiam præ morbo hic articulus excefferit, ac luxatus fuerit: multa enim huiusmodi fiunt: talium quibusdam si corruptionem senserit femur, suppurationes diuturnæ & linamentis indigentes fiunt, & aliquibus ossium denudationes. Similiter autem E
 & quibus corruptionem femoris os sentit, & quibus non sentit, multo breuius fit, & velut sanum coaugescere non solet. Tibiæ tamen ossa breuiora quidem fiunt quàm alterius tibiæ, sed paululum, ob causas antea relatas. Ambulare vero tales possunt, & quidam ex ipsis eo modo quo perfecti, quibus elapsus articulus repositus non est. aliqui vero etiam toto pede consistentes progrediuntur, declinant tamen inter ambulandum propter cruris breuitatem coacti. Hæc autem hoc modo fiunt, si diligenter educati fuerint in figuris, & recte in quibus oportet, priusquam ad iter faciendum corroborati fuerint. diligenter item & recte, postquam corroborati fuerint. Plurima autem diligentia opus habent hi, quibus dum maxime infantes sunt, hæc calamitas cõtingerit. Si enim F
 neglecti fuerint dum infantes sunt, inutile penitus, & omni augmento priuatum, totum crus euadit, & carnes totius cruris magis minuuntur quàm sani. Multo tamen minus his minuuntur quàm illis quibus intro excidit, propter vsum & laborem, ita ut statim crure uti possint, velut etiam paulo ante in Galeanconibus dictum est. Sunt autem aliqui, quibus partim statim à natiuitate, partim præ morbo, amborum crurum articuli exciderunt ad externam partem. His igitur ossa quidem easdem affectiones habent ac perpetiuntur. Carnes tamen minime effœminantur. Sed & satis carnosa crura fiunt, præterquam si quid sanè circa internam partem paululum deficiat. Propterea vero satis carnosa sunt, quia utrisque cruribus similiter vtuntur. Similiter enim fluctuant hæc atque illac

A illac inter ambulandum : & vehementer eminentibus nati-
bus hi videntur , propter articulorum excessum . Si vero ossa
ipsis corruptionem non senserint , neque gibbosi supra co-
xas fiant : nonnullos enim etiam talia corripiunt : Si igitur
tale quid non contigerit , satis sani de cætero durant . Totum
tamen corpus hi minus augescens habent , capite excepto .

At vero quibus in posteriorem partem femoris caput ex-
ciderit : paucis autem excidit : hi crus extendere non pos-
sunt , neque iuxta articulum elapsum , neque ita valde circa po-
plitem , & multo minus q̃ hi quibus iamdudum id contigit .
Hi enim magis & circa inguē , & circa poplitem , articulū ex-
tendunt . Illud tamen insuper intelligere oportet : Est enim
B commodum , & magni faciendum , & plerisque ignotū : Quod
neque sani articulum circa poplitem extendere possunt , si
non simul extendant etiam articulum circa inguen , præter-
quam si pedem valde sursum attollant . Sic enim poterint . Hi
itaque neq; inflectere articulum circa poplitem similiter pos-
sunt , sed multo difficilius , si non etiam articulum circa in-
guen inflexerint . Multa vero etiam alia circa corpus huius-
modi fraternitates ac cognationes habent , & circa neruorum
distentiones , & circa musculorum figuras , plurima , & pluris
facienda vt cognoscantur , quàm quispiam putauerit . Item
circa intestini naturam , & totius ventris . & circa vterorum
errores ac distentiones . Verum de his alibi nobis sermo erit
cognatus his quæ nunc dicuntur . Sed de quo nunc sermo est ,
C neque extendere possunt , velut iam dictum est , & breuius
crus apparet , atque hoc ob duas causas , & quod non extendi-
tur , & quod ad natium carnem elapsum est . Natura enim os-
sis coxæ ea parte est , qua & caput & ceruix femoris existit .
Vbi vero luxatum fuerit , primum ad externā partem natium
defertur . Inflectere tamen possunt , si dolor non prohibeat ,
& tibia & pes moderate recta apparent , & neq; hæc , neq; il-
læc multū inclinata . Iuxta inguen vero caro insuper aliquāto
mollior esse videtur , præsertim ad contactum , vt pote articu-
lo ad alteram partem elapso . Ad ipsas autem nates si attredæ-
tur femoris caput , aliquāto etiam magis extuberare videtur .
atque hæc quidem signa sunt , si cui in posteriorem partem fe-
mur excidit . Cui igitur iam perfectō elapsum non fuerit , re-
positum , hic ambulare quidem potest , vbi tempus interces-
serit ,

HIPPOCRATIS LIBER

serit, & dolor sedatus fuerit, & articulus in carnem versari **D**
 adfueuerit. Cogitur tamen vehementer se inflectere circa
 inguina, dum iter facit, atque hoc ob duas causas: tum quòd
 multo breuius crus fit, ob ea quæ antea dicta sunt: tum quòd
 multum valde abest ab eo, vt calcaneo terram contingat. Si
 enim conaretur vel paululum pede illo vehi, ita vt nihil aliud
 habeat quo se firmet, retro sane corruerit. Magna enim fue-
 rit momenti inclinatio, & coxis multum in posteriorem par-
 tem supereminentibus super pedis gressum, & spina insuper
 ad coxas vergente. Vix autem pectore pedis terram attingit,
 & ne sic quidem, nisi ipse seipsum circa inguina inflectat,
 & altero crure circa poplitem insuper se inflectat. Ob
 hæc autem cogitur, vt manum quæ est secundum læsum crus,
 ad supernam femoris partem in singulis gressibus firmet. **E**
 Cogit igitur aliquantum hoc ipsum, vt circa inguina inflectatur.
 Nam in permutatione crurum in ambulando, corpus supra
 læsum crus vehi non potest, si non insuper firmetur crus
 per manum ad terram, nimirum quum non sub corpore articulus
 subsistat, sed ad posteriorem partem iuxta coxam extet. Abs-
 que tamen baculo tales iter facere possunt, si aliàs adfueue-
 rint, eo quòd gressus pedis in vteri rectitudine manet, & non
 ad extremam partem inclinatus est. Quapropter nihil opus
 habent baculi fulcimento. Quicumque tamen pro femoris
 per manum apprehensione, supposito sub alam, quæ ad fini-
 strum crus est, scipione inniti volunt, hi siquidem longiorem
 scipionem supposuerint, erectiores quidem iter facient, pede **F**
 autem ad terram non innituntur. Si vero pede inniti vo-
 lent, breuior ipsis baculus faciendus est, & ad inguina, vt se
 inflectant, necesse fuerit. Cæterum carnium imminutio-
 nes etiam his secundum rationem fiunt, velut antea dictum
 est. Qui enim eleuatum habent crus, & nihil laborant, his
 etiam maxime minuuntur. Si vero plurimo vtuntur ingres-
 su, his minime minuuntur. Sanum tamen crus nihil inde v-
 tilitatis consequitur, sed etiam deformius fit, si læso crure
 ad terram innitentes vtantur. Illi enim simul inferuiens, &
 extra prominente coxa esse cogitur, & circa poplitem se in-
 flectere. Si vero quis læso crure non ad terram vtatur, sed e-
 leuatum habeat, & scipioni innitatur, sic sanum crus robu-
 stum fiet. Nam & in naturali statu degit, & exercitationes
 ipsum

A ipsum corroborant. Possit aliquis dicere, extra medicinam talia esse. Quid enim opus est de his quæ incurabilia iam facta sunt, amplius tractare? At hoc facere multum refert. Eiusdem enim professionis est & hæc cognoscere, Non enim fieri potest, vt inter se dirimantur. Oportet enim curabilia ita tractare, vt ne incurabilia fiant, ea intelligentia vt quàm maxime prohibeamus, ne ad hoc deueniant vt incurabilia reddantur. Oportet autem & incurabilia cognoscere, vt ne maxime lædant. Prædictiones autem splendorum sunt ac gloriosæ ex cognitione, quò, & qualiter & quando, singula desinent, siue eo vertantur vt incurabilia fiant, siue curationis spem exhibeant. Quibuscûque vero ex natiuitate, aut dum adhuc aliàs augeſcunt, ita elapsus fuerit articulus,

*Articulus
cū repositus
nō fuerit.*

B & non repositus, siue ex violentia elapsus sit, siue præ morbo: Multæ enim huiusmodi luxationes fiunt in morbis: Qui vero sint hi morbi, in quibus articuli elabuntur, postea scribetur: Si itaque elapsus non fuerit repositus, femoris quidem os breue sit, affligitur autem totum crus, & augmento destituitur, & multo magis excarnæ sit, eo quòd ipso non vtantur. Nam & articulus circa poplitem his affligitur. Nervi enim ob ea quæ antea dicta sunt intenduntur. Quare articulum circa poplitem extendere non possunt hi quibus hoc modo coxa excidit. Vt enim in summa dicam, Omnia quæ in corpore ad vsum facta sunt, si quis moderate ipsis vtatur, & in his laboribus exerceat, ad quos singula sunt adfuerat, sic quidem sana sunt, & augeſcunt, & probe consenescent.

C Si vero quis non vtatur, sed quiescat, morbosiora fiunt, & non augeſcunt, & cito consenescent. Inter hæc autem non minime perpetiuntur hoc & articuli, & nervi, si quis non ipsis vtatur. Propter has igitur causas, magis in hoc luxationis modo quàm in aliis affliguntur. Totum enim crus & in ossium, & in carnum natura, augmento destituitur. Tales igitur vbi iam in viros euaserunt, eleuatam ac inclinatum crus hoc habent, altero vero vehuntur baculo innitentes, aliqui vno, aliqui duobus. Quibus porro in anteriorem partem femoris caput elapsus fuerit: paucis autem hoc contingit: hi extendere quidem crus perfecte possunt, inflectere autem se minime hi possunt circa inguen. Affliguntur autem etiam, si circa poplitem se inflectere coguntur. Longitudo

*Femur an
trorsum et
lapsum.*

HIPPOCRATIS LIBER

gitudo vero cruris confimilis apparet, & circa calcaneum D
 quidem valde. Verum summus pes aliquanto minus in an-
 teriorem partem prominere solet. Totum autem crus recti-
 tudinem habet secundum naturam, & neque hanc, neque il-
 lac vergit. Cæterum hi statim dolore corripiuntur maxi-
 me, & vrina imprimis supprimitur, aliquanto magis quàm
 in aliis luxationibus. Caput enim femoris proxime his in-
 cumbit ad præcipuos nervos, & circa inguen quidem ex-
 tuberantes videntur, & locus extensus apparet, Verum cir-
 ca nates rugosior, & maxime excarnis. Atque hæc quidem
 quæ relata sunt, signa sunt eorum quibus ita femur exci-
 dit. Quibuscunque igitur viris iam factis, hic articulus ela-
 psus, non fuerit repositus, hi vbi dolor ipsis sedatus fuerit, E
 & articulus in eo loco in quem excidit, versari adfueue-
 rit, statim ferè recti ambulare possunt, absque baculo, & val-
 de quidem recti, vtpote quum ad læsum crus, neque circa
 inguen, neque circa poplitem, facile se flectere possint. Pro-
 pter inguinis itaque inflexibilitatem, rectiore toto crure in
 ambulando vtuntur, quàm quum sani essent. Sed & aliquan-
 do ad terram pedem trahunt, vtpote quum supernos articu-
 los non facile inflectant, & toto pede ingrediantur. Nihilo
 enim minus hi calcaneo ingrediuntur, quàm anteriore pedis
 parte. Si vero magnis gressibus progredi possent, etiã valde
 calcaneo insistentes progredierentur. Nã & sani quãto mino-
 ribus gressibus iter faciunt, tanto magis calcaneo ingrediun-
 tur, alterum pedem deponentes, contrarium eleuantes. Qui F
 buscunque itaque hoc modo excidit, adhuc etiam magis cal-
 caneo terram contingunt, quàm anteriore pedis parte. An-
 terior enim pedis pars, vbi reliquum crus extensum fuerit, nõ
 similiter in anteriorem partem inflecti potest, sicut vbi crus
 fuerit inflexum: Neque rursus sinuari pes potest crure infle-
 xo, sicut vbi crus fuerit extensum. Sana igitur natura hoc mo-
 do est, veluti dictum est. Quum vero elapsus articulus repo-
 situs non fuerit, sic iter faciunt, velut dictum est, ob prædi-
 ctas has causas. Magis tamen ex carne crus fit quàm alterum,
 & iuxta nates, & circa suram, & iuxta posteriorem rectitudi-
 nem. At vero quibus dum adhuc infantes sunt, articulus sic
 elapsus, nõ fuerit repositus, aut etiam à natiuitate ita habue-
 rint, & his femoris os aliquanto magis minuitur, quàm tibiæ
aut pedis

- A** aut pedis ossa Et minimum quidem in hoc luxationis modo femur minuitur. Carnes tamen vndique minuuntur, maxime circa posteriorem rectitudinem, quemadmodum etiam prius dictum est. Quicūque igitur recte educati fuerint, hi vbi au-
gescunt, crure vti possunt, breuiore aliquantū existēte quā-
altero, ita tamen vt baculo innitatur ea parte qua lēsum crus
est. Non enim absque calcaneo, pedis pectore admodum vti
possunt, vt in id innitantur, quemadmodum in aliis claudi-
cationibus aliqui possunt. Causa vero cur non possint, ea est
quæ paulo ante relata est. Ob id igitur baculo insuper opus
habent. Qui vero neglecti fuerint, & crure ad terram non v-
tuntur, sed eleuatum id habent, his minuuntur quidem ossa,
- B** vbi augescunt, magis quā his qui eo vtuntur. Minuuntur au-
tem & carnes magis multo quā his qui vtuntur. Verum cir-
ca articulos in directum mutilatur his crus aliquanto magis,
quā quibus alio modo luxatio facta est. Quo igitur in sum-
ma dicatur, Articuli excidentēs ac qui luxantur, inæqualiter
inter se ipsos excidunt ac luxantur, aliquando multo plus, ali-
quando multo minus. Et quibus quidē multo plus luxati aut
elapsi fuerint, his omnino difficilior reponuntur. Et si repo-
siti non fuerint, maiores & manifestiores mutilationes ac as-
siftiones tales habent, & ossium, & carniū, & figurarū.
Vbi vero minus exciderint & luxati fuerint, tales facilius q̄
alii reponi possunt. Si vero frustra tentati, aut neglecti fue-
rint, minores ac minus noxiæ mutilationes his fiūt, quā il-
lis de quibus paulo ante dictum est. Reliqui igitur articuli
etiam valde multum differunt ad hoc vt aliquando minor,
aliquando maior luxatio fiat. Verum femoris & brachij ca-
pita, quā similime inter se vtrāq; excidunt. Nā capita prout
rotunda sunt, simplicem & caluam rotunditatem habent. Or-
biculatiores autem sinus sunt, qui capita excipiunt, capitibus
tamen ipsis congruentes. Quapropter fieri non potest vt di-
midium articuli ex ipsis elabatur. Nā ob rotunditatis circun-
ferentiam, aut ad externā, aut ad internam partem luxari po-
terit. Sed de quo nunc sermo est, perfecte excidunt, nā alio-
qui non excidunt. Attamen & hi aliquando plus, aliquando
minus, à naturali statu profiliunt, & femur aliquanto magis q̄
brachium patitur. Nam aliq̄ etiam ex his luxationibus quę
à natiuitate fiunt, si parum elapsæ fuerint, ad naturalem sta-
tum reduci

HIPPOCRATIS LIBER

tum reduci possunt, & maxime articuli circa pedem. Quicū-
 que à natiuitate mutili sunt, plerique ex his curabiles sunt, si
 non valde magna emotio facta fuerit, aut etiam præuētis
 iam pueris contigerit. Optimum igitur est vt talia quàm ce-
 lerrime curentur, priusquam valde magnus ossium defectus
 fiat, & priusquā admodum magnus carniū defectus circa ti-
 biam contingat. Modus itaque mutilationis nō vnus est, sed
 plures. Plurima quidem eluxata non sunt penitus, sed per fi-
 guræ consuetudinem, in quadā pedis interceptione mutila-
 ta. Animaduertēdum autem in horum curatione est, vt tibiæ
 circa malleolum os, quod extrinsecus est, ad internā partem
 detrudatur ac dirigatur, & calcanei os quod ē directio illi
 subiacet, ad externā partem retrudatur, quo ossa quæ eminet
 sibiipsis occurrant iuxta medium ac obliquum pedem. Digi-
 ti vero aceruati vnā cum magno digito ad internā partē in-
 clinentur, atque ita circuncirca cogantur. Probe autem deli-
 gare oportet cerato resinato, & spleniis, & linteis molli-
 bus paucis, neque nimis compressis, atque ita deligationis circū-
 ductiones facere, velut etiam manibus directio pedis fiebat,
 quo pes paulo magis ad valgum vergere videatur. Soleam e-
 tiam quandā facere oportet, aut ex pelle non nimis dura, aut
 è plumbo, eamque insuper alligare non ad corpus positā, sed
 vbi iam postremis linteis deligare voles. Quum vero iā deli-
 gatus fuerit, vnus alicuius lintei ex his quibus deligatur, ini-
 tium, ad deligamenta quæ infra pedem sunt assuere oportet,
 è directio parui digiti, & postea sursum extendere, ita vt mo-
 derate habere videatur, atque sic supra surā circundare, quo
 sic extensum ac collocatum stabile maneat. In summa, quasi
 quis ceram fingat, ad naturā iustam adducere oportet, ita vt
 & inclinata, & distenta præter naturam, & manibus sic diri-
 gamus, & similiter deligatione: adducamus autem non vio-
 lenter, sed leniter. Assuere vero ita oportet lintea, vt condu-
 cat ad reparationes ac appensiones faciēdas. Aliæ enim clau-
 dicationes alia reparatione ac appensione opus habent. Cal-
 ceum insuper plumbeum facere oportet, extra deligationem
 adalligatum, qualem modulum crepidæ chiæ habebunt. Ve-
 rum nihil ipso opus est, si quis & manibus recte direxerit, &
 linteis recte deligauerit, & appensiones ac reparationes per
 assuta lintea recte fecerit. Atque hæc quidem est curatio, &
 neque

- A** neque sectione, neque vitione, neque alia varietate quicquā opus habet. Citius enim talia medicinā obtēperant, quā quis putarit. Deuincere tamen tempore oportet, donec in iussis figuris corpus auctum fuerit. Vbi vero calcei ratio habēda est, Arbylæ lutigradæ, calceamēti ita appellati species, accommodatissimæ existunt. Hoc enim calceamētum minime à pede superatur, sed potius ipsum superat. Idoneus est etiam creticus calceamentorū modus. At vero quibus tibiæ *Tibiæ ossa luxata.* ossibus luxatis, ac vlcere inducto, articuli circa pedem penitus eminent, siue intro vergant, siue extra, tales reponere nō oportet, sed permittere vt quicūque velit medicus reponat. Illud enim clare scire oportet, quod homo morietur, si repositi permāserint. Sed & vita paucorum dierum his cōtinget.
- B** Pauci enim ex ipsis septimum diem transgrediuntur. Cōuulsio enim est quæ ipsos occidit. Sed & cancerari contingit tibiā ac pedem. Hac ita futura esse certo scire oportet. Et neq; veratrum mihi videtur profuturum esse, & eadem die datū, & rursus epotum, proxime autem si quicquam huiusmodi facit, non tamē mihi hoc videtur. Si vero repositi non fuerint, & ne tētati quidem ab initio, plerique ipsorum superstites euadunt. Sic autem & tibiā & pedem coaptari oportet, prout ipse volet, modo non sint dependentia, aut commota. *Curatio.* Curatio vero faciendā est cerato picato, & splenis vino imbutis paucis non valde frigidis. Frigiditas enim in talibus cōuulsionem accersit. Idonea etiam sunt folia betarum, aut tussilaginis, bechij appellatæ, aut alicuius alterius huiusmodi, in vino nigro austero semicocta ac imposita. Et faciendā est curatio super vlcus, & super partes adiacētes. Et cerato tepido ipsam vlcus illinendum. Si vero hyemis tempus fuerit, etiam lannæ succidæ vino ac oleo tepidis imbutæ superne ipsum madesfaciant. Deligatio vero nulla, neque vllum cataplasma adhibendum est. Probe enim nosse conuenit, quod compressio ac omnis oneris gestatio, talibus omne malum affert. Accommodata autem sunt ad talia, & ex emplastris aliqua quæ cruentis vulneribus destinata sunt, quibus videlicet ex ipsis cōfert, vt lanæ superimpositæ vino madescant, & multo tempore sinantur. Quæ vero ex illis cruentis emplastris, paucissimis diebus incumbere debent, & quæ resina comprehenduntur forissecus adiecta, nō similiter vt illa idonea sunt. diuturna enim sūt

nim fit horum vlcere purgatio, quum multo tempore magiore abundant. Quosdam tamen ex his deligare, bonum est. Verum illud clare nosse oportet, quod necesse est hominem turpiter claudum fieri. Nam pes in talibus in supernam partem retractus est: & ossa luxata, extra eminentia apparēt. Neque enim vllum ex talibus ossibus plerumque denudatur, nisi leuiter aliquantum: neque abscedit, sed tenuibus ac debilibus cicatricibus circumducitur: atque hoc si multo tēpore quieverint: Sin minus, periculum est ne vlcusculum immedicabile relinquatur. Verum de quo sermo est, qui sic curantur, seruantur. Si vero repositus fuerit articulus ac permanferit, moriuntur. Eadem ratio est, si etiam cubiti ossa circa manus articulum vlcere facto emineant, siue ad internam manus partem, siue ad externam. Clare enim nosse id oportet, quod is morietur intra paucos dies tali morte, qualis antea dicta est, cui reposita ossa permanferint. Quibus vero reposita nō fuerint, neque repositio tentata est, hi multo plures superstitēs manent. Curatio autem eiusmodi etiā talibus comoda est, qualis iam dicta est. Figuram vero claudicationis turpē esse necesse est, & digitos manus debiles ac inutiles. Si enim ad internā partem ossa luxata fuerint, digitos inflectere nō potest. Si vero ad externam, extendere nequit. Quibus vero tibiæ os facto vlcere, circa genu eminuerit foras, siue ad externā partem siue ad internā, his si quis reponat, adhuc proprior mors adest quā aliis, etiam si etiam illis prompta aderat. Si vero omīssa repositione medearis, spes quidem salutis hoc solo modo existit. Verū periculosiōra hęc ossa sunt, quāto superiora ac robustiora sunt, & à fortioribus elapsa. At si os femoris quod ad genu est, vlcere facto elapsū fuerit & repositum permāserit, mortem adhuc violētiorem citius induxerit quā prius relata. Si vero repositum non fuerit, lōge magis periculosum est quā priora. Sola tamen hęc salutis spes est. Eadē vero ratio est, & de articulis circa gibbum cubiti, & de cubito ac brachio. Quęcunque enim ex his luxata, vlcere facto eminnerint, ea omnia si reposita fuerint mortem inducunt: non reposita, spem salutis: claudicationem vero superstitibus. Lethaliores autem sunt superiores articuli, si reponantur. Sed & si non reponantur, periculosiores iidem sunt. Si vero alicui superiores articuli luxati, facto vlcere emineant,

*Os tibiæ
eminens.*

*Os femo-
ris quā pe-
riculosum.*

- A** mineant, hi & si reponantur celerrimam mortem inducunt: & si non reponantur, periculosiores sunt. Curatio vero iā re- Curatio.
iata est, quę mihi accommodatissima esse videtur. At vero quibus articuli digitorum aut pedis, aut manus luxati, facto vlcere eminuerint, osse nō fracto, sed circa ipsam connexionē auulso, his si repositi permanerint, adest quidem periculum conuulsionis, si non bene curati fuerint: attamen operæ precium est vt repositio fiat, cum prædictione quod multa custodia ac cura opus habet. Reponere vero facilimum est, efficacissimumq; ac artificiosissimum per vetriculū, velut etiā antea dictū est in fractis ac eminētibus ossibus. Postea quiescere quāmaxime conuenit, & decumbere, ac paucō cibo vtī. Melius est & pharmaco sursum purgante leuī aliquo vtī.
- B** Vlcus vero curare oportet, aut cruentis emplastris quę madesiunt, aut polyophthalmi siue buphthalmi foliis impositis, aut quibus ossa in capite fracta curantur. Nihil autem valde frigidum adhibere. Minime igitur primi articuli periculosi sunt. Superiores autem periculosiores. Reponere vero oportet eadē die aut postridie: Tertio ac quarto minime. Quarto enim die maxime recrudescere solent. Quibus autem nō statim repositi fuerint, in his dictos dies transgredi oportet. Quicquid enim intra decem dies repositum fuerit, omne id continetur. Si vero reposito osse conuulsio accedat, articulū statim eiicere oportet, & calida quāmaxime sapissime humectare, & totum corpus, & præsertim circa articulos, calide & leniter ac molliter tractare. Verum inclinatum magis quā extentum totum corpus esse oportet. Expediādum tamen est articulos circa digitos qui reponuntur abscessuros esse. Plerūque enim ita contingit, si vel quæuis inflāmatio subsit. Quare si non propter vulgi imperitiam, medico verēda esset accusatio, nullum penitus reponere oportebat. Atque ad hunc modum periculosa sunt ossa, circa articulos eminentia foras, si reponantur, quemadmodum dictum est. Quæcunque vero circa articulos digitorum penitus rescātur, ea plerūq; innoxia sunt, si nō quis in ipsa vulneratione ex animi deliquio lædatur. Et curatio vulgaris talibus vlceribus sufficit. Sed & quę non circa articulos, sed iuxta aliam quandam ossium re-
titudinem rescantur, & hæc innoxia sunt, & adhuc aliis curatu faciliora, Et quę iuxta digitos ossa fracta extra eminet,
- Rr non ad

HIPPOCRATIS LIBER.

non ad articulum, & hæc si reponatur innoxia sunt. At resec-
 ctiones ossium perfectæ circa articulos, & in pede, & in ma-
 nu, & in tibia ad malleolos, & in cubito ad iuncturâ manus,
 plerisque quibus resecatur innoxia sunt, si non statim animi
 deliquiū euertat, aut quarta die febris cōtinua accedat. Cor-
 ruptiones tamen carniū contingunt, & in vulneribus san-
 guifluis fientibus, & vehementibus cōstrictionibus, & in os-
 sium fracturis magis quàm oportet compressis: & aliis vin-
 culis violentis intercepta plerisque decidunt. Et pleriq; ex ta-
 libus superstites euadūt, & quibus femoris pars aliqua & car-
 niū & ossis decedit, & quibus brachij pars (Minus autem si
 cubiti aut tibiæ pars deciderit) & amplius facile ferentes su-
 perstites euadūt. Quibus igitur fractis ossibus corruptiones
 statim fiunt, & denigrationes, his abruptiones corporis cele-
 res circuncirca fiunt, & decidētia cito decidunt, vt quū ossa
 iā antea remiserint emollita. Quibus vero dū ossa sana sunt,
 denigrationes fiunt, carnes quidem etiā his cito moriuntur,
 ossa vero tarde abscedūt, qua parte termini sunt denigratio-
 nis, & ossis nudatio extat. Oportet autē partes corporis que-
 cunque infra terminos denigrationis sunt, quum iam penit^r
 mortuæ fuerint & doloris exortes, iuxta articulum auferre,
 prouidendo vt ne vulneres. Si enim is cui resectio fit, dolore
 affectus fuerit, & corpus nodū mortuum fuerit ea parte qua
 resecatur, magnum periculum est ne præ dolore animi deli-
 quium incidat. Talia vero animi deliquia multos iam eueffig-
 io peremerunt. Femoris itaque os tali modo denudatum o-
 ctogesimo die abscedere vidi. Tibia tamen huic homini cir-
 ca genu vigesima die ablata fuerat, aut vt mihi videbatur etiā
 citius. Non enim simul, sed ad maiorem prouidentiam face-
 re quid mihi visum fuit. At tibiæ ossa ex eiusmodi denigra-
 tione circa mediam tibiā, sexagesimo die mihi deciderunt,
 quæcunque ex ipsis fuerunt denudata. Differt equidem & cu-
 ratio à curatione, ad hoc vt ossa denudata citius aut tardius
 decident. Differt etiā compressio à compressione, prout ve-
 hementior aut debilior fit, ad hoc vt citius aut tardius nerui
 denigrati emoriantur, carnes item & arteriæ ac venæ. Nam
 quæcunque non vehementer intercepta moriuntur, ex talibus
 quædā ad ossium denudationes nō perueniunt, sed magis in
 superficie decident. Propter has igitur causas, non vnum nu-
 meri no-

- A** meri nomen tempori poni potest, in quâto singula ex his iudicantur. Assumere vero valde oportet tales curationes. Sûnt enim magis horrendi aspectus q̃ curationis, & curatio lenis omnibus talibus sufficit. Ipsa enim seipsa solû iudicant; & circa victum diligentia adhibere oportet vt pro viribus febris exors sit: & in iustis figuris corpus collocare. Iustæ autem hæ sunt, vt neq; sublimius eleuatum sit, neq; deorsum repat. Sed magis præterea sursum vergat, donec perfectæ fuerit circumcirca abruptum. Nā in hoc tempore sanguinis eruptionû periculum imminet. Ob id igitur vulnera deorsum repentia facere non oportet, sed vice versa. Alioqui vbi tempus amplius accesserit, & vlcera pura facta fuerint, non amplius hæ figuræ comoda sunt, sed positio recta, & aliquando deorsum repentes. **B** Temporibus enim progressu quibuscûq; horum ossis discessionibus sunt, & subligaminibus opus habent. Expectare tamen oportet, vt tales per tēpus à dysenteria corripiantur. Nā in plerisque denigrescētibus dysenteria accedit, & in sanguinis eruptionibus ex vlcerebus. Accedit autem iudicatis iam denigrationibus ac sanguinis eruptione. & procedit quidē large ac vehementi impetu, sed nō ad multos dies durat, neque lethalis est. Neq; enim valde cibum auersantur tales, neq; alias vasa vacua facere conducit. Femoris porro luxationem circa coxam hoc modo reponere oportet, si ad internam partē elapsam fuerit. Bona quidē ac iusta & secundum naturam hæc repositio est, & sanē etiam aliquid ostentationis habēs, si quis talium rerum iactatione superbire velit. **C** Ex pedibus hominē ad transversam mediæ domus trabē suspendere oportet, vinculo forti, sed molli ac lato, ita vt pedes quatuor digitorum spatium, aut minus, inter se distantes habeat. Sed & supra genua latum ac molle lorum circumdatum esse oportet, quod itē ad trabem illam extendat. Crus autem læsum duobus digitis amplius quā alterum extensum esse oportet. A terra vero ablit caput ad duorum cubitorum spatium, aut paulo plus, aut minus. Manus autē iuxta latera extente, aliquo molli sint alligatæ. Omnia vero hæc supino iacenti ipsi præparentur, vt quā breuissimo tēpore pendeat. Postquam vero suspensus fuerit, virum peritum & non debilem immisso inter femora cubito ita agere oportet, vt cubitum inter caput femoris elapsum, & interfemineum locum-

*Femoris
luxati res
positio.*

Rr ij que in-

HIPPOCRATIS LIBER

que inter anum ac pudédum ponat, & postea altera manu ad illam interpositam cōiuncta, rectus astans ad suspēsi corpus, derepente se appendens sublimis quàm æquabilissimè depēdeat. Hæc repositio omnia quibus secundum naturam opus est exhibet, Nam & ipsum corpus suspensum sua ipsius gravitate extensionem facit: & is qui appendet, vñā cum extensione, femoris caput super acetabulum eleuari cogit, simulq; cum cubiti osse, velut cum vecte molitur ac cogit, vt ad pristinam naturam relabatur. Oportet autem vincula omnino bene constructa esse, & curare vt fortissimus sit is qui se appēdit. Quemadmodum igitur etiam antea dictum est, Magna est differentia naturarum in hominibus, ad hoc vt vel facile, vel difficulter repositio fiat. Et cur magna sit differentia dictum est antea, vbi de humero egimus. Quibusdā enim femur rursus incidit nullo adhibito apparatu, sed ex modica extensione, quantum manibus directio fieri potest, & ex leui cōmotione. Multis autē qui crus iuxta articulum inflexerūt, iam facta circūagitatione rursus incidit. At multo plura vulgari cuilibet apparatui non obtemperant. Quapropter scire quidem oportet de singulis optima in omni arte, vti vero his quæ singulis vicib⁹ idonea visa fuerint. Relati igitur sunt extensionum modi etiā in superioribus, vt quis vti possit ex his qui forte affuerint. Oportet enim in contrarias partes fieri extensionē vehementer, in alteram, cruris: in alterā, corporis. Si enim probe extensio facta fuerit, femoris caput supra pristinā sedem eleuabitur. Et si quidē ita super eleuatum fuerit, ne prohibere quidē facile sit, quo minus ipsum in suā sedē infideat. Quare omnis iā vectis molitio ac directio sufficit. Sed enim in extensione deficiunt, & ob id maiore turbationem exhibet repositio. Oportet igitur nō solum iuxta pedē vincula alligata esse, sed etiam supra genu, quo non magis circa articulum sit deligatio in extensione, quàm circa coræ articulum. Sic igitur extensionē ad pedis partē præparatam facere oportet. Sed & in alteram partē extensionē, non solum ex deligatione circa pectus & alas, in contrarium extendere oportet, sed etiā loro longo, duplicato, robusto, leni, circa interfoemineum inserto, & à posteriore parte ad spinam porrecto, ab anteriore vero ad clauiculam tendēte, ibique ad alterum initū alligato, ita coactionē facere oportet, vt alij hinc, alij il-

A alij illinc extensionē faciant, ita tamen vt lorum circa inter-
fœmineum, non super femoris caput porrectū sit, sed inter ca-
put & interfœmineū. Verum inter extendendū pugno ad fe-
moris caput quis innixus, id ad exteriorē partē propellat. Si
vero is qui trahitur eleuetur, iniecta manu, & cum altera ma-
nu coniuncta, simul deorsum trahat, simulq; ad externā partē
cogat. Alius vero quispiam partē femoris ad genu, placide ad
internam partē dirigat. Dictum autē est etiā antea, operā-
precium esse vt si quis in vrbe populosa medicinā exerceat,
lignū possideat quadrangulare sex cubitorum, aut paulo mi-
nus: latitudine bicubitali; crassitudo autē sufficit dodranta-
lis. Id secundū longitudinē hinc atq; illinc sectionē incisam
habere oportet, vt ne altior q̄ oportet machinatio fiat. dein-
B de postea sufficit quidem in dimidia ligni parte, nihil tamen vetat
etiā per totum, velut fossas longas quinq; vel sex, quatuor di-
gitorū spacio inter se distantes, incisae esse; & satis est vt sint
hæ & latitudine & profunditate triū digitorū. Habere etiā
in medio hoc lignū debet excauationē profundiorē qua-
drāgulam triū digitorum, quo in hanc excauationē, vbi opus
esse visum fuerit, lignū cavitati congruū infigatur, quod su-
perne sit rotundū. In figendū autem hoc est, si quando cōdu-
cere visum fuerit, inter caput femoris & locū inter anum ac
pudendū. Hoc lignū erectum stans prohibet ne cōcedat cor-
pus, dū à pedibus extēditur. Quādoq; enim hoc ipsum lignū
C sufficit pro extensione in contrariū superne faciēda. Aliquā-
do etiā dum hinc atq; illinc crus extēditur, hoc ipsum lignū
hac vel illac laxum incūbens, cōmodum ad hoc fuerit, vt in-
star vectis, caput femoris ad externam partem extrudat. Ob
hoc enim etiam fossæ incisæ sunt, quo in quibuscunq; ex ip-
sis cōgruū id facere fuerit, vectes ligneas immissus moliti-
onē faciat, aut circa articulorū capita, aut ad ipsa penitus ca-
pita infixus, vnā cū extensione, siue ad externā partē, siue ad
internam, molitionē facere expedierit; siue etiā rotundum
vectē esse conducat, siue latū, alius enim alij articulo condu-
cit. Cōmoda autē est in omniū articulorum cruris repositio-
ne, hæc per vectes molitio vnā cū cōcussione. Verum de quo
nunc sermo est, teretē ac rotundum vectem esse cōuenit. Ex
his machinis ac coactionibus, non videtur mihi fieri posse vt

Rr iij vllius

HIPPOCRATIS LIBER

vilius articuli repositio frustra tentetur. Inuenire tamen quis **D**
 possit etiam alios modos repositionis huius articuli. Si enim
 lignum hoc magnū, habeat in medio à lateribus duos postes
 pedales, eius altitudinis, quæ conferre videtur, alterum hinc,
 alterum illinc. Deinde lignū transuersum, velut scalæ grad⁹,
 postibus impositū sit: atque ita sano crure inter postes trans-
 misso, læsum crus supra gradum adaptatū habeat. Verū ad al-
 titudinem, & ad articulum qua parte excidit facile quiddam
 adaptare oportet. Gradum enim moderato altiore facere
 oportet, & stragulum multiplex prout congruum fuerit,
 sub corpus subextēdere. Deinde lignum moderatam latitu-
 dinem ac longitudinē habens, sub crus ad malleolum vsque
 extēdū esse oportet, quod vltra femoris caput, quantum ei⁹ **E**
 fieri potest porrigatur, & ad crus alligetur quotiescunq; op⁹
 fuerit, vt moderate habeat. Postea dū extenditur crus, siue li-
 gno pistilloformi, siue aliqua alia ex his extēfionibus, crus si-
 mul circū gradū vnā cum alligato ligno, deorsum cogere o-
 portet, ita vt aliquis supra articulū iuxta coxam hominē de-
 tineat. Hoc enim modo simul & extensio femoris caput su-
 per acetabulū attollet, simulq; mollitio femoris caput in pri-
 stinā naturā detrudet. Hæ omnes relatæ necessitates ac co-
 ætiones fortes sunt, & omnes calamitate superiores, si quis re-
 cte ac bene præparet. Quemadmodum autē etiā antea di-
 ctum est, à longe debilioribus extēfionibus, & viliore appa-
 ratu pleriq; rursus incidit. At vero si ad externā partē fe-
 moris caput luxatū fuerit, extensiones quidē hinc atq; illinc **F**
 facere oportet, eodē modo velut dictū est. Verum molitionē
 cum vestrē lato, vnā cū extēfione facere cōuenit, ab externa
 parte ad internā cogendo, ita vt ad ipsas nates, & paulo supe-
 rius vestrē adhibeas. Ad sanam vero coxā iuxta nates aliquis
 manibus renitatur, vt ne cedat corpus: aut alio quopiam hu-
 iusmodi vestrē submisso, & ex fossa conueniente fulcito con-
 tra obnitatur. Partē autem femoris luxati quæ ad genu est, ab
 interna parte foras placide abducatur. Cæterū suspensio in hoc
 modo luxationis articuli non conuenit. Cubitus enim eius
 qui se appendit, caput femoris ab acetabulo propellit. Moli-
 tionē tamen cum ligno subiecto, ita quis adaptare possit, vt
 huic luxationis modo conueniat, si forinsecus adhibeat. Sed
 quid opus est plura dicere? Si enī recte extēfio fiat, & recte p-
 vestes

- A** *vetes molitio contingat, qui articulus hoc modo elapsus nō reponi possit? At si in posteriorem partem femur exciderit, extensiones & diuersum tensiones ita facere oportet, velut dictum est, ita tamen vt super lignum multiplex stragulū infernatur, quo mollissimū sit, & homo p̄nus reclinetur ac sic extēdatur. Verū vnā cum extensione, etiā tabula deorsum cogere oportet eodē modo veluti gibbositates, è directo natiū tabula collocata, aut magis ad infernā quā ad supernā coxarum partem, & incisura in pariete ad tabulam excipiendā non recta sit, sed paululum decliuus ad pedum partem. Hæc repositio maxime secundum naturā est huic luxationis modo, & simul fortissima. Suffecerit autem fortassis pro tabula, vt aliquis infideat, aut manibus innitatur, aut inscendat de repente, simulq; cum extensione incumbat. Nulla vero alia ex relatis repositionibus secundum naturā est huic luxatiōis modo. Si vero in anteriorem partem elapsus fuerit, idē quidem modus extēsiōum faciendus est. Verum virū & manib⁹ validissimum, & aliās peritissimū, vola manus alterius circa inguina firmata, & altera manu insuper iniecta, simul luxationem deorsum propellere, simulque femoris partem quæ ad genu est ad anteriorem partem compellere oportet. Hic enim modus repositionis, huic luxationi maxime secundum naturam est. Sed & suspensio finitimum quid secundum naturam habet. Oportet tamen eum qui se appēdit peritū esse, vt ne cubito articulū excutiat, sed circa medium inter anum ac pudendū locum, & iuxta os sacrum se appendat. Laudatur etiā is qui per vtrem hūc articulū reponere conatus est. Et iā sanē aliquos vidi, qui præ imperitia, etiā extra & retro luxatos, per vtrem reponere conabātur, non animaduertētes q̄ magis ipsum eiicerent q̄ reponerēt articulū. Nam qui prim⁹ excogitauit, haud dubie ad intrō elapsos articulos, per vtrem repositionē tentauit. Nosse igitur oportet q̄ alia multa vtres sunt potiora. Oportet autē vtrem nō inflatum intra femora ponere, quātum fieri potest supreme ad locū inter anū ac pudendum adductū, & facto à patellis genu initio, femora per fasciā vsq; ad mediā femorum partē deligare. deinde in partem vtis solutā folle ex officina fabri immisso inflare, & vtrem cogere vt distēdatur. Homine vero in latus decumbere oportet, & læsum crus superne habere. Atq; hic quidē est ap-*
- Rr iij paratus:

HIPPOCRATIS LIBER

paratus; sed pleriq; peius preparât quàm ego nûc dixi. Non enim deligant femora ad multâ partem sed solum genua, & non insuper extendunt. est autê insuper extêsiô quoq; faciêda. Attamê aliqui iam reposuerât, facile rem assequuti. Non autem ita facile est coactionê hoc modo perficere. Nâ & vter dum inflatur, tumidissimas partes suas ad articuli caput non habet, quod maxime emoliri oportet; sed inferius ipso, mediù ipse locatus est circa media femora, aut adhuc inferius; & rursus femora ipsa natura sunt curua. Superne enî carnosæ sunt, & inter se sociatæ. Inferne vero sicca, vt etiâ natura femorum vtrem ab opportunissimo loco repellat. Si vero quis paruum vtrem imponat, fieri nō potest vt paruum robur articulum cogat. Si itaque vtre vti velis, femora inter se ad multam partem colligâda sunt; & vnâ cum corporis extensioe vter inflandus est. Crura vero ambo deligâda sunt vsq; ad finem in hoc repositionis modo. At vero in vniuersa arte hoc plurimi facere præ omnibus oportet, vt id quod ægrotat sanum facias. Si vero multis modis fieri possit sanatio, vt cum qui minime molestus est eligas. Nam & virum bonum, & artis peritum, hoc declarat, qui populo imponere non studeat. Verum de quo nunc sermo est. Tales quædam sunt familiares extensiones corporis, vt ex his quæ adsunt expedita ac facilis reperiri possit. Nam si vincula ex loris mollia ac lenia non affuerint, sed aut ferrea, aut funes nautici aut domestici, fasciis aut pāniculis laneis ea maxime parte amplius obuoluere oportet, qua vincula detentionê factura sunt, atque ita vinculis deligare. Deinde in lecto robustissimo & ex præsentibus maximo, hominê bene extendere oportet, hoc modo. Lecti pedes qui ad caput sunt, aut à pedibus, ad limen ianuæ, intus aut foris prout cōmodum fuerit firmêtur. Ad alteros autem lecti pedes lignû quadrangulârê transversum obiiciatur, ita vt à pede ad pedem pertingat. Et si quidem tenue fuerit lignum, ad pedes lecti deligetur. Si vero crassum, non est opus. Deinde initia vinculorum, & eorum quæ à capite sunt, & eorum quæ à pedibus, vtrâq; alligentur ad pistillum, aut ad aliud huiusmodi lignum: ita vt è directo corporis sint, aut paulo superius. Moderate vero extendantur ad pistilla erecta consistêtia, quorum alterum ad limen, alterum ad lignum obiectum firmetur, atque sic reſtractis pistillis extensio fiat.

Sufficit

- A** Sufficit autem scala quæ robustos gradus habet, sub lectum extenta, pro limine ac ligno obiecto, quo pistillis ad conuenientes gradus hinc atque illinc firmatis, ita vinculorum extensio fiat. Porro reponitur femoris articulus etiam hoc modo, si ad internam, & ad anteriorem partem luxatus fuerit, Supra scalam in terrâ defixam hominem collocare oportet. deinde sanum crus placide extentum deligare, vbi commodum fuerit: ex sinistro vero vas testaceum aqua plenum, aut sportulam lapidibus refertam appendere. Alius repositionis modus, si ad internâ partē luxatus fuerit. Inter duas columnas trabē moderata altitudine deligare oportet. Præmineat autem vna pars trabis pro magnitudine natium. & vbi stragula circum pectus hominis deligaueris, ipsum hominē supra præminentem trabis partem collocato, & deinde pectus ad columnam lato aliquo vinculo alligato. Postea sanum quidem crus detineat aliquis, vt ne circumagatur. Ex læso vero apponatur pondus quantum congruit, velut etiam prius dictū est. Primum igitur scire expedit, quod omnium ossium commissuræ plerunque sunt caput & acetabulum. In quibusdam vero & locus acetabuli formam refert, & oblongus est. Quidam vero loci leuiter sinuosi sunt. Semper autem reponere oportet omnes articulos elapsos, maxime quidem statim dum adhuc calidi sunt. Sin minus, quàm celerime. Nam & ei qui reponit, facilius ac citius reponere contingit, & ægroto multo minus doloris affert repositio priusquam intumuerit. Omnes etiam articulos vbi reponere voles, præmollire ac commouere oportet. Sic enim facilius reponi solent. Circa omnes autem articulorum repositiones hominem attenuare oportet, maxime circa maximos articulos & repositu difficilimos: minimum circa minimos & faciles. At vero si digitorū articulus, siue primus, siue secundus, siue tertius in manu exciderit, idem ac æqualis repositionis modus est. difficilior tamen semper maximi articuli reponuntur. Excidunt autem quatuor modis, aut sursum, aut deorsum, aut in obliquum vtrinq; : maxime quidem superne, minime autē in obliquum, in vehementi motu. Vtrinq; autē in ea parte in quā exciderunt, velut crepido est. Si quidē igitur ad supernā aut infernam partem exciderit articulus, eo quod leuior est hic locus quàm à lateribus, & simul parua facta est transgressio, facile est

*Digitorū
articuli.*

HIPPOCRATIS LIBER

est reponere. Modus autem repositionis sic habet. Digitum D
 summum aut deligamēto aliquo, aut alia quapiam huiusmodi
 re obuoluto, ut ne ubi summū digitum apprehensum extē-
 dis elabatur. Quum autem obuolueris, alter quispiam manū
 supra iuncturam apprehendat, alter digitum obuolutū, atq;
 ita uterque ad seipsum probe extendat, simulq; elapsū arti-
 culum ad sedem suā detrudat. Si vero in obliquum excidit,
 extensionis quidem idem modus est. Vbi vero iam visus fue-
 rit tibi articulus lineam transgressus esse, simul cum exten-
 sione statim ad locum suum detrudere oportet, ita ut alius
 quidam ex altera digiti parte obseruet ac repellat, ut ne rur-
 sus illic elabatur. Moderate quoque repositionem faciunt vi-
 mineæ texturæ, sauræ id est lacertæ appellatæ, ex palmis cō-
 textæ: ita ut dum digitum hinc atque illinc distendis, altera E
 manu lacertam, altera manus iuncturam apprehendas. Post-
 quam autem reposueris, deligare oportet linteis quàm citis-
 sime tenuissimis inceratis, cera neque valde molli, neque val-
 de dura. Dura enim de digito abscedit. Mollis autē & lique-
 scens eliquatur, & digito calefiente deperit. Soluendus au-
 tem est digiti articulus tertia aut quarta die. In summa, si in-
 flammatus fuerit, frequentius soluendus est: sin minus, rarius.
 De omnibus articulis hæc dico. Restituitur digiti articulus
 decima quarta die. Idem vero est curationis modus digito-
 rum manus ac pedis. Circa omnes autem articulorum repositi-
 ones attenuare oportet ac fame macerare vsque ad septimū
 diem: & si inflammati sint, frequentius soluere: sin minus, ra-
 rius. Quietem vero semper habere oportet afflictum articu- F
 lum, & quàm optime figuratum positum esse. Genu porro
 propter expeditam ac facilem naturam, mitius est quàm cu-
 biti gibbus. Quare etiam facile excidit. Excidit autem sape
 intrò. Sed & extra, & in posteriorem partem. Repositiones
 autem fiunt ex repentina cōflexione aut exalcitratione: aut
 conuolutam fasciæ molem in poplitem ponito, & circū illam
 corpus ita ad flectendū genua in terrā dimittito. Potest etiā
 ubi in posteriorem partem excidit, moderata extensione re-
 poni, veluti cubiti gibbus. Si vero hac aut illac excessit, ex
 cōflexione aut exalcitratione reponitur. Cæterum dire-
 ctio ex moderata extensione omnibus cōmunis est. Si vero
 non inciderit, hi quibus in posteriorem partem excidit, fle-
 scere

- A** Genere nō possunt: Sed neq; alij ita valde: minuitur autem femoris & tibie anterior pars. Si vero intrō, valgiore sunt. Minuuntur autem externæ partes. Si vero extra, magis vari ac detorti, minus claudi fiunt. crassiore autē ossē vehūt, & internæ partes minuuntur. At si ex natiuitate, aut in augmento hæc fiant, iuxta priorem rationem res se habet. Cæterū articuli circa malleolos luxati extensione vehementi opus habent, aut manibus, aut aliis huiusmodi: & simul directione vtrunq; prestare. Cōmune autem hoc est omnibus. At vero *Luxationes articulorū pedis.*
- B** manu repositionē expetunt. Quicunq; vero factō saltu ex supernis, calcaneo innitentes se firmarunt, sic vt ossa disparata sint, & venæ humores effuderint, & nerui contusi sint: si grauitè hæc acciderint, periculum est ne corruptione accedente per omnem vitam affligatur. obtorta enim fiunt ossa, nerui autem inter se communionem habent. Quin & quibus fractis, aut ex vulnere, vel in tibia, vel in femore: aut neruis exolutis qui his cōmunicāt: aut ex negligentī decubitu, calcaneum fuerit denigratū, etiā his maximæ recrudescētiæ ex talibus fiunt. Quādoq; etiā ad corruptionē accedunt febres acutæ, singultuosæ, mentē percellentes, citā mortem inducentes, & insuper venarū sanguifluarum liuores. Signa recrudescētiarū sunt, si effuso sanguine sugillata, & denigrata, & vicina his, subdura ac subrubra fuerint. Si enim cum duricia liuescant, periculum est ne denigrescant. Si vero subliuida sint, aut etiā liuida mollia & diffusa: aut cū virore subpalida ac mollia: hæc in omnibus talibus bona sunt. Curatio si febris absit, veratro in potu dato fit: sū minus, nō. sed potu si opus sit, fauorum cremor decoctus, aut acetum mulsum dulce detur. Deligatio conuenit qualis in articulis. Ad contusiones autem magis quā ad omnia, linteis pluribus ac mollioribus vtendū est, & minus comprimēdum, & plurima insuper calcaneo obuoluenda. Figura sit velut deligatio postulat, vt ne ad calcaneum exprimatur. Ferulis vtēdum non est.
- Quibus vero aut ipse pes solus excefferit, aut cum appendice, excidit quidem magis ad internam partem: his si non rursus incidat, attenuatur progressu temporis & coxa, & femur,

HIPPOCRATIS LIBER

& femur, & tibiæ pars luxationi opposita. Repositio est velut iuncturæ ad manum. Extensio autem vehemens. Curatio pro lege articularum. Recrudescit, sed minus quam manus articulus siue iunctura, si quieuerint. Viçtus parçior quiescentibus expedit. Quæ vero ex natiuitate, aut in augmẽto fiunt, iuxta priorem rationem.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE VLCERIBVS,

Iano Cornario medico physico interprete.

E

Quæ ulcera
sunt.



Ulcera vniuersa, nisi vino, humectare non oportet, si non in articulo fuerit vlcus. Nam siccum sanum propius est, & humidum non sano. Est enim vlcus humidum: quod vero sanum est, siccum. Præstat autem absque deligatione sinere, præterquam quod cataplasma imponitur: quanquam aliqua vlcera neque cataplasma ferre possint, magis autem

recentia quam vetustiora, & quæ sunt in articulis. Modicus cibis, & aqua, quam maxime omnibus vlceribus conducunt, & magis recentioribus quam vetustioribus, & si quod aliud vlcus inflammatum est, aut inflammationem minatur, & si periculum est corruptionis: & vlceribus ac inflammationibus in articulis: & vbi conuulsionem fieri periculum est: & vlceribus in ventre. Maxime vero omnium, fracturis in capite ac femore, & si cui alij parti fractura contigerit. Stare autem vlceri minime cõducit, præsertim si quis in crure vlcus habeat;

imò neque sedere, neque ambulare. Verum ocium & quies maxime conferunt. At vero recentia vlcera omnia, tum ipsa, tum circumstæ partes, minime inflammationem incurrent, si quis quam citissime suppuret, & pus ab osculo vlceris non interceptum supprimatur: aut si quis auertat, vt omnino non suppurentur, præterquam necessario, eoque paucissimo

- A** ciffimo pure, & ficca fint quàm maxime. ex medicamēto non moleſto. Igneum enim feruorem hoc inducit, vbi horror & pulſatio acceſſerit, Inflammantur enim vlcera tunc quum ad ſuppurationem tendunt. Suppurantur autem alterato ſanguine ac calefacto, donec putrefactus talium vlcerum pus fiat. *Pus.* Quum vero cataplaſmate opus eſſe viſum fuerit, non ipſum vlcus cataplaſmate integere oportet, ſed circumſitas partes, quo pus decedat, & quæ indurata ſunt, molleſcant. Cate- rum ex vlcerib⁹ ſi quod acuto ſpecillo incifum aut diſſectum fuerit, cruentis vulneribus aptum medicamentum ſuſcipit. & reſiccatorium quoddam, quod prohibet ſuppurationem. Si qua caro ex telo contuſa & diſſecta eſt, eam curare oportet,
- B** quo quàm celerrime ſuppuretur. Nam & minus inflammatur, & neceſſe eſt carnes contuſas ac diſſectas, putreſcere ac pus fieri, & eliquari ac conſumi: & poſtea nouas carnes naſci. Omni recenti vlceri, præterquam in ventre, conducit frequen- ter ſanguinem deſluere facere, prout opportunum eſſe viſum fuerit, & ab ipſis partibus vlcus complectentibus, tum aliàs, tum ſi in tibia vlcus fuerit, aut in digito pedis aut manus, ma- gis quàm ſi alicubi in alia corporis parte. Sanguine enim de- fluente gracileſcētia, ſicciora ſunt ac minora. Prohibet enim hoc maxime talia vlcera humectari. Deinde vero in omnib⁹. *Sanguinis defluxio in his quid fa- ciat.* Putredo ſanguinis ex ſanguinis tranſmutatione fit. Conſert autem poſt ſanguinis defluxionem in talibus vlceribus, etiam ſpongiam deligare dēſam, mollem, conciſam, ſicciorē quàm
- C** humidiorē: aut ſuper ſpongiam ſuperne folia multa pone- re. At oleum, & quæcunque mollia, aut oleoſa ſunt medica- menta, talibus vlceribus non conducunt, ſi non valde iam ad ſanitatē tendant. Neque vlceribus ex recēti vulnere oleum conducit, neque mollientia, neq; adipoſa medicamenta, tum aliàs, tum quòd vlcus ampliore purgatione opus habet. Vt au- tem in ſumma dicam, oleo illitio faciendā eſt, & in æſtate, & hyeme, in his ad quæ talibus medicamentis opus habemus. Depurgatio ventris deorſum plurimis vlceribus conſert, & in vulneribus quæ ſunt in capite, & in ventre, & in articulis, & in quibus corruptionis periculum eſt, & in his quæ conſu- ta ſunt, & in exedentibus ac ſerpentibus, & aliàs inueteratis vlceribus. At vbi deligare voles, pharmaca non prius impo- nere oportet, quàm vbi valde ſiccū feceris vlcus. Tūc vero ap- *Oleū quib⁹ inuſitū* *Purgatio ventris cō- fert his.* ponere,

HIPPOCRATIS LIBER

ponere oportet, vlcus autem saepe spongia detergere, & rursus linteum siccum ac purum saepe adhibere, atque sicposito medicamento quod conferre videtur, deligare, aut non deligare. Plerisque vlceribus tempus calidius commodius est hyeme, exceptis his quæ in capite sunt ac ventre: magis vero æquinoctij tempus. Vlcerata quæcunque probe & probe ut oportet purgata sunt, semper ad siccio rem modum germinationem faciunt. Hæc autem plerumque carne non superexcrescunt. Si vnde cunque tandem os discesserit, aut vltum, aut scdum aut alio modo, horum vlcerum cicatrices cauiore s sunt.

Vlcerata non purgata, non comitti solent etiam si adducantur, neque sua sponte coeunt. Vbi circumscripta vlceris partes inflammatae sunt, quandiu durat inflammatio, vlcerata coire non solent. Sed & vbi circumscripta partes denigratae fuerint, & sanguinis putredine, aut etiam varice, influxione sanguinis exhibente, neque hæc coire solent, si non circumscriptas vlceris partes sanas feceris. Ex vlceribus rotunda si subcaua fuerint, excidere oportet vndiquaque in orbem ea quæ discesserunt, aut omnia, aut ex dimidio circuli, secundum longitudinem naturæ hominis.

In omni vlcere igne sacro accedente, corpus purgationem facere oportet, in vtram partem vlceri contulerit, siue sursum, siue deorsum. Cui tumor obortus fuerit circa vlcus, vlcere non inflammato, huic postea temporis progressu tumor puris subsidentiam habet. Quodcunque vlcus ex inflammatione tumidum non sedatur, dum alia quæ simul inflammari ac tumescere cœperunt sedatur, etiam hoc non coalescere periculum est. Quæcunque vero ex casu, aut alio quopiam modo dissecantur, & contunduntur, & intumescunt, ita vt vicinæ circumscriptas partes suppuratae, pus de tumoribus per vlcus egerant: in talibus quicquid cataplasmate opus habere visum fuerit, non super ipsum vlcus cataplasma ponere oportet, sed super circumscriptas partes, quo pus decedat, & indurata molliantur. Postquam autem mollita fuerint, & inflammatio sedata, spongiis super ea quæ abcesserunt deligatis compescito, initio à sana parte facto, atque ita procedendo. Superne vero super spongiam folia sint multa. Quum vero compesci non poterit caro quæ humida existit, in causa est vt hæc elicias. Si sub profunda carne vlcus fuerit, ex vtriusque, & ex deligatione, & ex eo quod insuper compressit, hoc facere in-

- A** ad incuruū subattollitur, & si quis id fecerit specillo, si fieri poterit, ad fluxionem accommodatum ab ore vlceris refecare oportet, vbi commodum tempus esse visum fuerit, atque ita curationem adhibere, qualicunque tandem indigere videbitur. Plerumque vero in omni vlcere quod ventrem habet, in directum ad visum conspicua sunt omnia, tumore non presente. Et si quidem in ipso fuerit putredo, aut caro suberit humida ac putrida, hoc vlcus & complectētes vlceris partes, aspectu nigra subliuida erunt. Et in excedentibus vlceribus, qua parte phagedæna affuerit, vehementissimèque depascitur ac edit, ea parte circumfusa vlceris pars colorem habebit nigrum, subliuidum. Cataplasmata tumorum & inflammationis in circumfritis partibus sunt, verbascum coctum, & trifolij folia cruda, & lignstri folia cocta, & polium. Si vero etiā purgari opus habuerit vlcus, omnia quidem etiā hæc purgant: Sed & fici & oleæ folia, & marrubium. Coquere autem oportet hæc omnia, & maxime viticem, & fici ac oleæ folia. & mali puniceæ folia similiter coquere oportet. Crudis vero his vtendum est. Maluæ folia terito cum vino, & ruta folia, & origani viridis. Omnibus his lini semen torrefactum ac tusum quàm leuissime, ammiscere oportet. Vbi vero periculum est ignem sacrum in vlceribus oboriturum esse, isatidis folia trita cruda cum lini semine imposito. aut lini semen solani aut isatidis succo subactum imposito. Quum autem vlcus purum quidem fuerit, verum inflammatum est & vlcus, & circumfusa itidem inflammata partes, lentem vino coctam, ac leuiter tritam, oleo modico subactam imposito, ac deligato. & rubi canini folia in aqua cocta, leuiter trita imposito, linteo tenui subextento, puro, vinoque ac oleo madefacto. Et vbi committere ac coalescere vlcus vult, rubi canini folia velut lentem præparato. Nasturtium item sauridion à lacerti similitudine appellatum, vinum, & lini semen tenuiter tritum commiscantur. Et hæc, lini semen, & vitex crudus, & alumen melium: hæc aceto subacta. Vuam albam immaturam per colum in vas æris rubri expressam, per dies ad solem exponito, noctu autem tollito, vt ne irroretur. Per dies vero indefinenter terito, vt æqualiter siccetur, & de æneo vase quàm plurimum assumat. Tanto autem tempore ad solem exponere oportet, donec ad mellis crassitudinem deuenierit. Postea & hunc succum, & mel quàm
- Ignem sacrum quæ prohibeāt*
- optimum,*

HIPPOCRATIS LIBER

optimum, & vinum dulce, in æneam ollam infundito, ita tamen vt prius resinam terebinthinam in vino coquas, donec dura fiat instar mellis cocti, & postea resinā eximas, & vinum affundas. Sit autem plurimus vix immaturę succus. Secundo

*Medica
menta uas
ria ad ulce
ra.*

loco vinum. Tertio mel. Myrrham etiam statim quā optimam leuiter tritam, eodem vino paulatim affuso diluito, & postea ipsam per seipsam cum vino sæpe agitando coquito, & vbi ad bonam crassitudinem deuenisse videbitur, ad vix immaturę succum affundito, & nitrum optimum torrefactum sensim ad pharmacū ammisceto, & flori æris minus quā natri. Hæc postquam miscueris, coquito non minus tribus diebus, lignis ficulneis non multis succensis, aut prunis, vt ne torreatur, & vbi hoc pharmacum illinitur, omnia quæ imponuntur sicca sint, & vlcera non humectentur. Vtendum autem est hoc pharmaco ad vlcerata inueterata ac recentia, & ad pudendi, & capitis ac aurium vlcera. Aliud ad eadem vlcera.

Fel bubulum siccum, mel quā optimum, vinum album in quo cocta sint loti rameta, thus, myrrha æqualis, crocus equalis, flos æris similiter. Ex liquidis autem vinum sit plurimum, deinde mel, paucissimū vero fel. Aliud. Vinū, mel, oleum cedrinum. Sicca vero sint, flos æris, myrrha, malicoriū siccum.

Aliud. Flos æris tostus dimidia parte, myrrhæ duæ partes dimidiæ, croci partes tres, mel modicū, cum vino hæc torrentur. Aliud. Thuris pars, gallæ pars, croci tres. Hæc singula sicca quæ leuissime terito, deinde mixta ad solem calidissimum, affuso vix immaturę succo, donec viscosa fiant, per tres dies terito. postea vino, austero, nigro odorato, paulatim affuso diluito. Aliud. In vino dulci albo, ilicis radices coquito, & vbi probe habere visum fuerit, de vino defuso duas partes sumito, & amurcæ olei quā siccissimæ partem vnam. Postea agitando coquito, vt ne torrescant, lēto igne donec ad bonā crassitudinem deueniant. Aliud. Reliqua quidem eadem sint.

*Alumē me
lium.*

Verum pro vino, acetum sit album acerrimum, in quo tinctæ sint succidę lanæ. Postea ammixta amurca coquito, & succum caprifici affundito, & alumen melium, & nitrum ac æris florem, vtraque tosta ammisceto. Hoc magis priore vlcera purgat. Verum prius non minus resiccat. Aliud. Lanæ succidas paucissima aqua tingito, deinde vini tertiam partē ad aquam misceto, ac coquito donec bona prouenerit, crassitu-
do. Ex

A do. Ex his recētia vulnera quā citissime suppurari possunt.

Aliud. Aron siccum inspergito ac adaptato. Aliud. Ficidum succulenta est corticem viridem, in vino tritum immittito: & sine vino, ipsum etiam cum melle. Aliud. Ad acetum in quo cocta sunt loti ramenta: fit autem acetum album: amurcam oliuarum, & picis serum crudum ammisceto, & illinito, & instillato, & deligato sicca. Hoc recentia vulnera auertit, ne suppurentur: aut aceto abluito, & vino imbuta, spongia extergito. Aliud. Plumbum tritum cum spodio cyprio leuigatum inspergito. Et loti ramenta inspergito. & squamam æris, & chalcitidem cum ære, & solam per se, & cum loti ramentis. Et aliās vbi siccis opus fuerit, talibus vtendum est,

B & spodio Illyrico trito cum ramentis, & ipsis folis ramentis, & flore argenti solo quā leuissime trito. & aristolochiam rasam ac tritam leuiter, inspergito. Aliud ad cruenta vulnera. Myrrha, thus, galla, ærugo, flos æris tostus, Alumen Aegyptium tostum, cœnâthe, lanarum sordes, plumbago. Horum singulorum æquale pondus diluitur cum vino velut superius, & reliqua præparatio fit eodem modo. Aliud. Acetum quā acerrimum album, mel, alumen Aegyptium, nitrum optimum leuiter tostum, fellis parum, simul coquito. Hoc carnem superexcrecentem consumit, & cauat, & non mordet.

*Partheniæ
microphyl-
lum.*

Aliud. Herba est paruis foliis prædita, cui nomen est Parthenium microphyllum. Hæc verrucas de pudendo aufert: & chalcitis ex insula Melo cruda, & elaterium tenue siccum ad-

C stringit: & malicorium tenue siccum eodem modo. Maxime

autem replet caua, pura, herba Lagopyrus nomine: est autem tritico similis vbi arefcit, folio paruo velut olea, sed longiore: & marrubij folium cum oleæ foliis. Aliud. Carissæ siccissimæ internam partem pinguem, mellis speciem referentem duabus portionibus, cum seminis lini tosti non admodum, ac triti quā tenuissime parte vna. Aliud. Caricæ partem internam, & florem æris tenuem modicum, & fici succum. Aliud. Caricæ partem internam, chamæleonem nigrum, bubulum fel siccum. Aliud. Reliqua quidem eadem sint. Verum sicca, nasturtium tenue crudum, irio, vtrunque pari pondere: caricæ vero partes duæ, sint, & seminis lini partes duæ, cum fici succo. Quum autem aliquo horum pharmacorum vteris, splenia aceto imbuta superne imposito, &

Lagopyr.

si spongia

HIPPOCRATIS LIBER.

spongia super splenia imposita deligato, & paulo magis appri- **D**
 mato. Si vero circumscripta partes inflammatae fuerint, quicquid
 conferre visum fuerit circumponito: Si liquido uti voles, etiam
 caricum pharmacum illinito, & velut supra scriptum est deli-
 gato eodem modo. Est autem ex his pharmacum factum, ve-
 ratro nigro, sandaracha, squama aris, plumbo vsto, cum multo
 sulphure, auripigmento, cantharide. Ex his prout visum fue-
 rit componito, ac vitior. Diluuntur oleo cedrino. Postquam vero sa-
 tis fuerit illitum, pharmacum eiicito, & aron coctum, tritum im-
 ponito: aut siccum, tritum, oleo subactum. Et si sicco Carico uti
 voles, liquida remouere oportet, & pharmacum inspergere.
 Facit autem siccum ex veratro solo constans ac sandaracha.

Aliud liquidum. Herba est cuius folium simile est aro- **E**
 natura, verum album, lanuginosum, ad haerere folij magnitudi-
 nem. Haec herba cum vino imponitur. Aut ilicis partem eam
 quae est circum truncum, cum vino tritam imponito. Aliud.

Vuae immaturae succus, acetum acerrimum, flos aris, ni-
 trum, succus caprifici. Ad vuae immaturae succum alumen in-
 iucito tenuissime tritum, & in vas aris rubri immisum ad so-
 lem exponito ac agitato, & ubi ad bonam spissitudinem de-
 uenerit, tollito. Sicca ad cruenta vulnera haec faciunt. Ve-
 ratrum nigrum tenuissime tritum inspergitur, quandiu ali-
 quid humoris inerit ac depascetis. Deligatio vero eadem est
 quae in emplastris. Aliud. Salis grana siccissima in aeneam

ollam, aut fictilem nouam immittito, magnitudine maxime
 aequalia, non magna: & mel optimum dupla salis mensura pro
 coniectura facta, ad salem affundito. deinde ollam prunis im-
 ponito, & dum totum combustum fuerit finito. Postea exter-
 so ac expurgato per spongiam vlcere inspergito, & velut pri-
 us deligato, & paulo magis comprimito. Postridie vero qua
 parte non adhaeserit pharmacum inspergito, comprimito ac
 deligato. Vbi vero pharmacum discedere voles, acetum cali-
 dum affundito, donec discedat, & rursus eadem facito, si opus
 fuerit extersione per spongiam facta. Aliud siccum mor-
 dax. Myfi quam leuissime tritum inspergito in ea quae hu-
 mida sunt ac putrida: & florem aris tenuem non penitus le-
 niter tritum. Aliud siccum similiter mordax. Vbi spongia
 extersisti, lanas quam maxime succidas in testa exurito, face
 admota donec totas combusseris. hoc pharmacum leuiter tri-

- A** tum inspergito, & eandem deligationem adhibeto. Aliud siccum ad eadem vlcera. Chamæleo niger, alumen fici succo subactum, subigito autem tostum, & anchusam misce-
to. Aliud. Anagallis & alumen Aegyptium tostum. Aliud. Puluillum inspersilem Orchomenium inspergito. Cæterū ad nomas proserpèdo depascentes, alumen Aegyptium tostum, itēq; Melium facit. Verū nitro tosto insperfo prius preparare ac spongia extergere oportet. Facit & chalcitis tosta. Torrere autem oportet, donec flammæ speciem induat.
- Ad vetera vlcera in tibiis fientia, sunt autem sanguinolenta & nigra, meliloti florem tritum, melle subactum, cataplasmaris modo vtere. At vero supra neruos dissectos, myrti syluestris radices contusas ac cribratas, & oleo subactas deligato. Et herbam quinq;folium: est autem alba & lanuginosa, & altior à terra, quàm nigrum quinq;folium: in oleo tritum deligato, & tertia die exoluit. His autem medicamentis in hyeme potius quàm æstate vtendum est. Medicamenta molliētia, quæ etiam cicatrices pulchras faciunt. Scillæ internam partem mucosam terito, & resinam de picea, cum recenti adipe suillo, & oleo modico, resināq; ac cerua modica. Et adipem anserinum, ac suillum recentem purum, & oleum modicum, & scillam, & ceram albissimam. Aut scillam, oleum albū, resinæ parum, cerā, adipem, suillū veterem ac recentem. Facit & oleum, & ærugo, & scilla, & resina. Sint autem duæ partes veteris adipis ad recētem. De reliquis autem quātum opportunum esse visum fuerit. Adipem recentem liquefactum in aliam ollam defundito, & plumbaginem leuiflime tritam ac cribratam commisceto ac coquito, & primum agitato. Coquito autem donec destillatū in terram congelatur. deinde tollito, ac reliquum diffundito, præter lapidē subsidētem: & resinā iniicito ac agitato, & modicū oleum cedrinum, & quod prius diffusum ac ablatum fuit ammisceto. Porro in omnibus mollib⁹ in quibus resinam ammiscēs, vbi phar macum ab igne abstuleris, in calidum adhuc resinam immit-
tito ac agitato. Aliud. Adeps suillus vetus & nouus, & cera, & oleum: Sicca vero, loti ramenta, thus, plumbago: thuris videlicet pars vna, plumbaginis vna, & ramentorum loti vna. Sint autem adipis veteris partes duæ, ceræ vna, & noui adipis vna. Aut adipem solum veterem suillum, & cum ipso adi-
Sf ij pem

HIPPOCRATIS LIBER

pem caprinum recentem, quàm minime cum membrana, sed **D**
 purgatum, parum terito aut contundito, & oleum affundito,
 & plumbum cum spodio inspergito, & ramentorum loti dimi-
 dium. Aliud. Adeps caprinus, spodium, chalcitis cerulea,
 oleum. De Ambustis. Illicis radices coquere oportet tene-
 ras. Quarum si cortex crassissimus est ac viridissimus, conse-
 ctum in tenues partes, vino albo affuso, lento igne coquito,
 donec ad bonam crassitudinem deueniat, vt illini possit. Po-
 test & in aqua coqui eodẽ modo. Aliud non mordax. Suil-
 lum adipem solum veterem liquefactum illinito. Superne ve-
 ro scillæ radicem dissectam imponito ac deligato. Postridie
 vero foueto ac perfundito, & adipem suillum veterem liqua-
 to, & ceram ac oleum ammisceto, thus item, & loti ramenta,
 ac minium. hoc vbi illeueris, ari folia in vino ac oleo cocta ap-
 ponito ac deligato. Aliud. Postquam suillo adipe illeue-
 ris vetusto, hastulæ regię radices in vino coctas ac tritas su-
 perillinito. Aliud. Adipem suillum veterem liquato, & re-
 sinam ac bitumen ammisceto, & hæc linteo illita, ad ignem
 calefacta, imponito ac deligato. Quum in dorso ex plagis, aut
 aliis vlcus factum fuerit, scula cocta, trita, ac linteo illita de-
 ligato. Postea vero adipem caprinum, & recentem suillum, &
 spodium, & oleũ, & thus illinito. Tumores in pedibus fien-
 tes, & sponte, & non sua spõre, in quibus nequẽ tumores, ne-
 que inflammatio, à cataplasmatibus sedatur: & si quis spon-
 gias deliget, aut lanas, aut aliud quid super sanam partem, postea
 intumescunt sua sponte, ac inflammantur: influxio sanguinis
 per venas in causa est, si cui non contusio causa est. Et si alicu-
 bi alia in corporis parte tale quid fiat eadẽ ratio est. Verum
 sanguinem detrahẽre oportet, de venis præsertim influenti-
 bus, si conspicuæ fuerint. Sin minus, pertundere tumores o-
 portet, profundioribus ac frequentioribus vulnusculis impa-
 ctis: Sed & in aliis omnibus quæ pertũdis, sic facere oportet,
 atque hoc acutissimis ac tenuissimis ferramentis. Quum ve-
 ro sanguinem detrahis, specillo ne valde premas, vt ne con-
 tusio accedat. Aceto autem perluito, & grumum sanguinis in
 hiatibus ne relinquito: & illito cruentis vulneribus destina-
 to medicamento, lanas succidas, carminatas, molles deligato,
 vino & oleo resperfas. Et pertusam partem æger ita habeat,
 vt refluxus sit sanguinis, non defluxus: & omnino nõ hume-

Dorsi ulc^o

**Pedum tu-
mor.**

Act;

- A** Aet: & parum cibi capiat, & aquam bibat. Si vero vbi solueris, fissuras repereris inflammatas, cataplasma ex vitice ac lini semine imposito. Si vero vlcera fuerint fissurae ac eruperint, ad rem respiciens, & quod opus fuerit adhibens, de cetero curato. At vbi varix inest in tibia, aut conspicuus, aut in carne, & tibia est nigra, & videtur opus habere sanguine ab ipsa defluente: talia nequaquam pertundere oportet. Plerumque enim magnavlcera ex fissuris fiunt, propter varicis influxum. Verum varicem ipsum aliàs atque aliàs compungere oportet, vbi opportunum esse visum fuerit. Ceterum quum venam secueris, postquam sanguinem dimiseris, & fasciam solueris, & non sistatur, in contrarium, partem habeat, quò refluxus sanguinis fiat, siue manus fuerit, siue crus, utpote sanguine retro fluente, atque ita tempus longius aut breuius decumbens expectet. Postea ipsum sic habentem deligato, nullo grumo existente in fissura. Deinde splenium duplum vino imbutum apponito, & super ipsum lanam puram oleo imbutam. Nam etiam si influxus sanguinis fuerit violentus, suppressio fit influentis. Et si grumo in fissura manente sic inflammetur, suppuratur. Pransum autem & potum plus aut minus venam secare sinere oportet, & aliquantum calefactum: & die calidiorè quàm frigidiorè. Si vero in fluat sanguis, cucurbitam affigere oportet, & si ablata cucurbita, multum sanguinis, aut serosus sanguis fluat, cito priusquam repleatur rursus affigere & quod restat extrahere. Sin minus, grumi in fissuris inhaerent, & deinde ex ipsis inflammata vlcera fiunt. Aceto autem omnia talia perluere oportet, & postea non humectare, neque in fissuras decumbere. Verum aliquo medicamento cruentis vulneribus destinato fissuras illinere. Et quum infra genu, aut ad genu affigere cucurbitas oportuerit, stanti erecto, si stare potuerit, affigantur.

*Varices si
bie.*

HIPPOCRATIS COI LI-

BER DE FISTVLIS,

Iano Cornario medico physi-
co interprete.

Sc iij Fistulae

*Cassa &
origo fistu-
lae.*



Istulae sunt quidem ex contusio-
nibus & tuberculis, sunt autem &
ex remigatione ac equitatione, quā
in natibus congregatus fuerit san-
guis prope sedem. Putrescēs enim
distribuitur ad molles partes, nimi-
rum quum & intestinum rectum
sit humidum, & caro mollis, in quā
distribuitur, donec tuberculum e-
ruperit, & deorsum ad rectum in-

testinum computruerit. Postquam autem hoc factum fuerit,
in fistulam abit, ac sanie manat, & stercus per ipsam fluit, &
status, & abominatio multa. Ex contusionibus itaque fit fistu-
la, ubi aliquis circa rectum intestinum locus cōtusus fuerit ex
plaga, aut ex casu, aut vulnere, aut equitatione, aut remiga-
tione, aut quaecunque talia sunt. Congregatur enim sanguis.
Putrescēs autem suppuratur. à suppurato vero ea quae de tu-
berculis dicta sunt patitur. Primum igitur quū tale quoddam
tuberculum nascēs senserit, crudum quā citissime secare o-
portet, priusquā suppuretur ad rectum intestinū. Si vero iam
aegrotantē ex fistula assumpseris, alij caulem recentē accipe,
& homine supino reclinato, diductis crurib⁹ altero huc, alte-
ro illuc, caulē immitte donec offendas ac impinguas, & fistu-
lae profunditatē per caulem metire. & fescelis radicem tenuis-
sime tritam, aqua affusa ad dies quatuor macerato, eamque a-
quam trium cyathorum mensura, melle ammixto aeger bibat
ieiunus. Cum hac etiam ascaridas purgato. Quicumque vero
relictī fuerint non curati, moriuntur. Postea linteū byssinum
tithymalli magni succo imbutū, flore aris tosto trito insper-
so, in penicilli figurā intorque longitudine fistulae æqualem,
filo per summū penicillū transmissio, & rursus per summū cau-
lem: & homine supino reclinato, adhibito catoptere instru-
mento sedem expandente, corrosam recti intestini partem
inspicio, & sic caulē immittito: & ubi in intestinum incide-
rit, apprehensum retrahito, donec penicillus fuerit intrusus,
& superiori ac inferiori parti adæquatus. Postquam vero fue-
rit intrusus, glādem corneam in intestinum indito, & podice
ex terra cimolia oblito finito. Vbi vero ventrem exonerat,
eximito, ac rursus indito, donec ad quintū peruenerit diem.

Sexta

A autem eximito, extrahens penicillū ex carne, & alumen terito, eoque glandem expleto, & in intestinum indito ac finito, donec alumen liquidum fiat. Podicem vero myrrha illinito, donec coaluisse visus fuerit. Alia curatio. Crudum linum tenuissimum accipito, & ad palmi longitudinem quincuplicato, & pilum equinum circumdato. Deinde facto specillo stāneo in summa parte perforato, & initio lini complicati in specillum immisso, specillum in fistulam demittito, & simul sinistrae manus digitum indicem in sedem indito: vbi vero specillum contigerit digitū, inflexa summa specilli parte, initium lini quod est in specillo per digitum adducito: & specillum quidē rursus extrahito, lini vero initia bis aut ter connectito, & reliquam lini partem intortam ad nexum deligato. Postea vero dimissum negocia sua obire iubeto. Ceterum quantum putrescente fistula de lino laxatur, tantum augere oportet, ac intorquere semper singulis diebus. Si vero linum crudum computrescat, priusquam fistula corrodat, aliud linum ad pilum innecte, immitte ac connecte. Pilus enim ea de causa ad crudum linum additur, quod non putrescit. Postquam vero fistula computruerit, spongiam mollem in tenuissima frusta concisam apponere oportet. deinde in fistulam quidem, florem aris tostum multum per specillū immittere. Spongiam vero melle illinere, & subiecto digito indice sinistrae manus, ultra protrudere: & appositam alteram spongiam deligare, eodem modo velut in haemorrhoidibus. Postridie vero exoluere, & aqua calida abluere, & cum spongia per sinistrae manus digitum fistulam purgare conari: & rursus aris florem immittere, ac spongiam deligare. Atque haec facere oportet per dies septenos. In his enim maxime tunica fistulae cōputrescit. de cetero vero donec sanata fuerit spongiam deligare. Nam dum per hunc modum fistula à spongia cogitur ac explicatur, neque rursus concidere poterit, neque alia ipsius pars sanabitur, alia vero rursus completitur, sed in seipsa tota sana erit. Verū in hac curatione multa aqua calida proluere oportet, & fame macerare. Si vero non corrosa fuerit fistula, specillo immisso secato donec diduxeris, & aris florem inspergito, & ad dies quinque finito. Deinde aquam calidam affundito, & polentam aqua subactā superimponito, & betarum folia deligato. Vbi vero excide-

*Medela
altera quā
et Celsus
sumpsit.*

Curatio fistulae.

*Medela
alia.*

Si iiij rit aris

HIPPOCRATIS LIBER

rit æris flos, & fistulæ vlcus purum fuerit, velut priorem cura- D
 rato. Si vero in loco sit vbi fieri id non possit, & profunda e-
 tiam sit fistula, flore æris, & myrrha, & nitro in vrina dilutis
 colluto: & in fistulæ osculum plumbeam glandem indito,
 vt ne coalescat. Collutio vero facienda est, pennæ fistula ad
 vesicam alligata, & fistula intro immissa, atque sic collutio-
 ne infusa. Verum sanus non fit, si non secetur. Si intestinū

*Intestinū
 rectum in-
 flammatum.*

rectum inflammatum fuerit, & dolor habeat & febris, & fre-
 quenter ad exonerandum aluum desideat, & nihil egerat, &
 præ inflammatione sedes exiisse videatur, & aliquando vri-
 næ stillicidium corripiat: hic morbus fit, quū pituita ex cor-
 pore ad intestinam rectum decubuerit. Conferunt autem ca-
 lida. Quum enim hæc adhibentur, pituitam attenuare ac cō-
 sumere possunt, & simul acrimonia sua salsam pituitā aquo-
 sam reddere, vt non sit ardor, neque morsus aliquis in inte-
 stino. Curare itaque oportet hoc modo. Aegrum in cali-
 dam aquam collocato, & trita grani cnidij grana sexaginta,
 in vini hemina, & olei hemina dimidia diluto, tepefacito, &
 infundito. Hæc & pituitam educunt & stercus. Si vero in a-
 qua non sedet, oua cocta in vino nigro odorato, ad sedem ap-
 ponito, calido quopiam inferne substrato, aut vesica aqua ca-
 lida plena. Aut lini semen tostum, molitum, tritum, pari fari-
 na, in vino nigro odorato, & oleo ammixta, cataplasmatibus
 modo calidissime imponito. Aut ordeum & alumen Aegy-
 ptium tritum misceto, & glandem oblōgam efformato, & ad
 ignem tepefaciens digitis effingito, deinde summe tepidam E
 effectam in sedem indito. Forinsecus autem cerato oblinito,
 & allium in vino nigro diluto coctum pro cataplasmate im-
 ponito. Postquam vero exemeris, in aquam calidam colloca-
 to: & solani succum, & anserinum ac suillum adipem, & chry-
 socollam, & resinam, & ceram albam commiscero, simulque
 liquefacito, & cum his illinito. & quandiu inflammatio du-
 rauerit, allium coctum cataplasma adhibeto. Et si quidem ad
 hæc à dolore liberetur, satis fit. Sin minus, bibat peplum, me-
 conium album appellatum, aut aliud quoddam quod pitui-
 tam purgat. Et quam diu durat inflammatio, eduliis leuibus
 nutriatur. Vrinæ stillicidium ex his incidit. Vesica ex in-
 testino recto calefcens, caliditate pituitam adducit: à pitui-
 ta vero vrinæ stillicidium fit. Si quidem igitur vnā cum mor-
 bo sede-

Curatio.

*Strāguiria
 quare his
 superue-
 niat.*

A bo sedetur, solet enim plerunq̃ue ita fieri, satis est. Sin minus, medicamenta ad vrinæ stillicidium destinata exhibeto. Si vero sedes elabatur, fomento per mollem spongiam adhibito, & cochleæ muco illito, è manibus deligatum suspendito ad modicum tempus, & redibit. Si vero amplius excidat, & non maneat intus, laterum mollitudines præcungito, & retrorsum fasciam ex cingulo submitto, & vbi sedem intro protruxisti, spongiam mollem aqua calida, in qua loti ramenta cocta sunt, imbutam imponito. Sed & de aqua ipsa ad sedem affundito, spongiam vero exprimito. deinde fasciam per media crura subextentam, circa vmbilicum deligato. Vbi vero aluum exonerare volet, inter tabulas angustissimas insidens id faciat. Si vero puer fuerit, intra mulieris pedes ad genua acclinatus. Dum autem ventrem exonerat, crura extendat. Sic enim minime sedes exciderit.

Sedis pro-
cidencia.

At si intestinum rectum humidum fiat, & sanies defluat, fece vini vsta & aqua ex myrti decocto abluito, & adiantum siccum, tustum, cribratum inspergito. Si vero sanguis profluat, ablutione ex iisdem facta chalcitidem, & cupressi, aut cedri, aut pini, aut terebinthi ramenta, inspergito, pari mensura de his ad chalcitidem ammixta. Forinfecus autem ceratum crassum oblinito. Quum sedes siue rectum intestinum exciderit, & in loco suo manere noluerit, sulphur optimum ac densissimum derafum tenue inspergito: & ster-

Sedis pro-
cidētis ua-
ria mede-
la.

C ad iram exacerbato. Aut vbi aqua calida abluisti, malicorium, & alumen, in vino albo trita, ad sedem affundito. deinde panniculos apponito, & femora per dies tres colligato, & ieiunet. Vinum autem bibat dulce. Si vero neque sic retro cedat, minium mixtum cum melle illinat. Intestinum rectum si procidat, & sanguis profluat, de ari radice detractum corticem in aqua coquito, deinde tritum farina ammixta calidum imponito. Aliud. Vitis sylvestris, quam aliqui psilothrion vocant, radices tenerrimas derafas in vino nigro meraco austero coquito, deinde tritas tepide imponito. Sed & farinā ammiscero, & in vino albo ac oleo subigito, & tepide imponito. Aliud. Cicutæ semen vino albo odorato instillato terito, deinde tepide imponito. Si vero inflammatum fuerit, hederæ radicem in aqua coctam, leuiter trita, ammixta

HIPPOCRATIS LIBER

ammixta farina optima, in vino albo subactam imponito, & oleum ad hæc ammisceto. Aliud. Mandragoræ radicem maxime viridem, sin minus, siccam: viridem itaque lotam ac concisam, in vino diluto coquito, ac imponito: siccam vero tritâ similiter imponito. Aliud. Cucumeris peponis internam partem leuiter tritâ imponito. Si vero dolor fiat, & inflammatum non sit, nitrum rubrum assato, ac leuiter terito, & alumen ac salem torreto ac leuiter terito, & pari mēsurâ singula misceto. deinde ad picem optimam ammisceto, & linteo illita apponito ac deligato. Aliud. Capparis folia viridia trita, in marsupium cōiecta adalligato: & vbi vire videberis auferto, ac tursus apponito. Si vero folia non affuerint, corticem radicis capparis contusum, vino nigro subactum, eodem modo alligato. Hoc etiam ad splenis dolorem bonum est. Ex his cataplasmatibus quæ quidē frigefaciunt, fluere prohibent: quæ vero molliunt ac calefaciunt, diffundunt: quæ in sese trahunt, siccant & attenuant. Porro hic morbus fit, quum bilis & pituita ad hos locos decubuerit. At recto intestino inflammato medicamento in quod resina, & oleum, & cera, & plumbago, & adeps calidissimus commiscetur, illinere oportet.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE HAEMORRHOI-

dibus, Iano Cornario medico

physico interprete.

*Causa hæc
morrhoidum.*



Æmorrhoidum morbus hoc modo fit. Quum bilis aut pituita ad venas recti intestini decubuerit, sanguinem qui in venis est calefacit. Calefcentes autem venę ex vicinis venulis sanguinē attrahunt: & vbi replētur, interna se lis pars intumescit, & capita venarum supereminent: & partim dum à stercore exeunt comprimuntur, partim dum

- A**tim dum à coaceruato sanguine coguntur, sanguinem ei-
 lantur: atque hoc maxime quidem vnà cum stercore, aliquā-
 do vero etiam sine stercore. Curare autem oportet hoc mo-
 do. Primum equidem noſſe oportet in quo loco ſint hæmor-
 rhoides. Rectum enim inteſtinum & ſecans, & reſecans, &
 conſuens, & vrens, & putrefaciens, etiamſi grauiffima hæc
 eſſe videantur, nihil læſeris. lubeo autem preparari ferramē-
 ta ſeptem aut octo, magnitudine palmi, craſſitudine ſpecilli
 craſſi, ex ſumma parte reflexa ac lata, velut in obolo paruo.
 Et vbi priore die purgatorio medicamento purgaſti, ea qua
 rem aggredieris vrito, & homine ſupino reclinato, & pului-
 nari ſub lumbos ſubiecto, ſedem quàm maxime per digitos
 foras extrahito: ferramentaque candentia facito, ac vrito,
 donec reſiccaueris, & hoc ita vt ne contingas. Vtre enim
 oportet, & nullam hæmorrhoidem ſine vſione ſinere, ſed
 omnes exurere. Cognosces autem hæmorrhoidas non di-
 ficulter. Supereminet enim in internam recti inteſtini par-
 tem, velut vux acini, liuidæ, & ſimul vt ſedes extrahitur,
 ſanguinem eiſculantur. Detineant autem aliqui ipſius ca-
 put & manus, dum vritur, vt ne moueatur: & dum vritur
 vociferetur, ſedes enim magis inde eminet. Poſtquā vero vſi-
 ſeris, lentes ac cruui coquito, & ex aqua trita imponito, ad
 quinque aut ſex dies. Septima vero die ſpongiam mollem in
 tenuiſſima fruſta concidito, Sit autem latitudo ſpongiæ vn-
 diquaque ſex digitorum. deinde ſuper ſpongiam linteum te-
 nue, ac leue, ſpongiæ æquale, melle illitum imponito, & po-
 ſtea ſubiecto digito indice ſiniſtræ manus, mediam ſpongiā
 in ſedem quàm penitiſſime protrudito. deinde ſupra ſpon-
 giam lanam apponito, quo in ſede quieta permaneat. Et la-
 terum mollitudines præcingito, & retrorſum ſaſciam ex cin-
 gulo ſubmittito, quam per media crura receptam, ad cingu-
 lum circa vmbilicum deligato. At pharmacum de quo dixi,
 ad denſam ac robuſtam carnem faciendam ac producendam
 deligatur, & non minus quàm viginti diebus hæc deligare o-
 portet. Sorbenda autem eſt ſemel in die farina, aut milium,
 aut furfurum decoctum: & aqua bibenda. Si vero ad aluum
 exonerandam deſideat, aqua calida proluito. & tertio quoq;
 die lauet. Alia curatio. Extracta q̄ maxime ſedē, aqua ca-
 lida perfundito. deinde ſummas hæmorrhoidū partes præſeca-
 to. Phar-

Curatio
que.Curatio
alia.

HIPPOCRATIS LIBER

Alia.

Alia cura-
tio.

10. Pharmacum autē ad sectionē præparatum sit hoc. In æreū D
vas mingito, & in vrinā, æris florem tostum, tritū, leuem in-
spergito, deinde diluito, ac vas agitato, & in sole siccato. Vbi
vero siccatum fuerit, eradito, terito, & leuigatū ad anum ap-
ponito, & splenia oleo imbuta addito, ac spongiam supra de-
ligato. Alius modus. Adnascitur ad venā sanguisuiam ex-
tuberātem, velut mori fructus. & si quidē valde extra fuerit
extuberātia, carnis tectoriū circum ipsam nascitur. Hominē
igitur flexis genibus in duo mortaria siue excisos lapides lo-
cato, ac videto. Cōperies enim inflatas partes inter nates cir-
ca sedem, sanguinē vero intrinsecus procedere. Si itaq; mol-
lis sit, & sub tectorio cedat extuberātia, digito ipsam auferre
oportet. Nihilo enim plus difficultatis hæc res habet, q̄ si E
quis dum ouicula excoriatur, digitum inter cutem ac carnē
adigat. Atq; hæc interim dum loqueris, ægro non animadu-
uertēte facito. Postquā autē extuberantiā abstuleris, necesse
est sanguinis cursus ex tota detractione promanare. Itaq; vi-
no austero in quo gallæ maceratæ sunt, cito abluere oportet:
& vena sanguisui vnā cum extuberantia peribit, & tecto-
rium sedabitur, & quanto vetustior affectio fuerit, tanto fa-
ciliior sanatio erit. Si vero penitius intus delituerit extube-
rantia, per catoptere in spicito, & ne à catoptere decipiaris
videto. Cū enim aperitur, extuberantiā explanat: dum vero
rursus cōtrahitur, recte ostendit. Auferre autē oportet, vera-
tro nigro in anum sublito. deinde tertia die auferre, ac vino
austero infuso colluere. Cæterum quod sanguis non fluit, F
quum abstuleris extuberantiā, mirari nō oportet. Neq; enim
si in articulis disseces manus aut crura, sanguis p̄fluet. Si vero
supra aut infra articulos secueris, cauas ac sanguisuias venas
comperies: & difficile fuerit vt expedite sistas. Sic etiā hæ-
morrhoidem in sede, si supra aut infra extuberantiæ detra-
ctionem feces, sanguis profluet. Si vero ipsam extuberantiam
in connexu abstuleris, non profluet. Si quidem igitur ita fe-
datur, bene habet: Sin minus, vr̄ito, cauendo vt ne contingas
ferro, sed prope ad motis ferramenti resiccato, & florem æ-
ris ex vr̄ina apponito. Alius modus curatiōis hæmorrhoi-
dum. Clysterem facere oportet, velut arundinem sepiariā,
p̄ragmiten appellatam, & in ipsum ferramētum probe cō-
gruum adaptare. Deinde indita in sedē clysteris fistula, fer-
ramē-

A ramentum eādens immittere, ac frequēter eximere, quo magis calefieri sustineat, & neq; vlcus ex calore habeat, & veng resiccata sanæ fiant. At vero si neq; vrere, neq; resicare volēs, vbi multa calida aqua proluiſti, & sedem euersam extraxisti, myrrhā tritam, leuigatā, & gallam, & alūmē Aegyptiū vſtum, vna & dimidia ad reliqua parte, & melanteriæ tātundem accipe, atq; ſiccis his vtēre. Hæmorrhoids enī ab his medicamentis decedet, velut corium cōbuſtum. Hæc facito donec omnes exſtirpaueris. Et dimidia chalcitidis vſtæ pars idē efficit. Si vero glādulis ſanare volēs, ſepiæ reſtā, plumbaginis tertiam partē, bitumen, alūmē, florem æris modicū, gallā, æruginē modicam, cōmiſceto & mel coctū affundito, & formatam ex his glandē oblongiorem apponito, donec exſtirpaueris. Muliebrē hæmorrhoidē hoc modo curato. Multa calida aqua proluito. In aqua vero odorata, velut eſt myrica trita coquito. Deinde ſpumā argenti toſtam, & gallam miſceto, & vinū album, & oleū, & anferis adipem affundito, omniaque ſimul trita, poſt factam proluſionem illinenda dato. Proluere vero oportet ſede quā maxime extracta.

Muliebris hæmorrhoids.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE VISV,

Iano Cornario me-

dico phyſico in-

terprete.



Oculi corrupti ſponte quidem cærulei ſientes, derepente tales ſiunt. & vbi facta fuerint, non eſt talium ſanatio. Qui vero maris ſpecie reſerunt, paulatim per muſtum tempus procedendo corrumpuntur. & ſæpe alter oculus in multo tempore poſtea corruptus eſt. Huius caput purgare oportet, & venas vtēre. Et ſi quiſ ab initio curatus fue-

Viſus cor-ruptus quælis.

Medela.

rit

HIPPOCRATIS LIBER

rit hoc modo, malum sedatur, & in deterius non procedit. At **D**
 qui colorem inter caruleum ac marinum medium referunt,
 si quidem puero tales fiant, ubi senior sit, sedantur. Si vero
 seniori septimum annum egresso fiant, melius videt magna
 valde & splendida: & videt quidem procul, sed non clare: &
 si quid valde ad oculum admouerit, etiam hoc videt, aliud
 autem nihil. Confert autem huic capitis purgatio, & capitis
 vstio. Sanguinem vero his detrudere non conducit, neque cæ-
 ruleo, neque maris speciem referenti. Et visum oculorum, o-
 culo sano existente, in iunioribus hominibus, tum scemellis,
 tum masculis, quicquam faciendo nihil iuueris, quandiu ad-
 huc augefcit corpus. Quum autem non amplius augefcit, ip-
 sius oculi palpebras intuitus radendo attenuato, & si opus
 esse visum fuerit, etiam ferramentis non admodum canden- **E**
 tibus intrinsecus inurito. Quum vero palpebras oculi rase-
 ris, lana mellea, crispa, pura, circumfusa obuoluta, radito,
 ipsam oculi coronam vitando, vt ne ad chartilaginem vsque
 peruras. Signum autem sufficientis rasuræ est, si non ampli-
 us splendidus sanguis exit, sed sanies cruenta aut aquosa.
 Tunc vero liquido aliquo medicamēto, in quo flos æris est,
 defricare oportet. Postea autem ubi & rationis, & vstionis
 crustæ exciderint, & vlcera purgata fuerint ac germinaue-
 rint, fissuram per sinciput secare oportet, & quum sanguis
 defluerit, medicamento cruentis vulneribus idoneo illi-
 nere. Deinde vero & huius, & omnium caput purgare ope-
 raprecium est. Palpebræ si crassiores quàm pro natura **F**
 fuerint, ex inferna parte carne quantum potes quàm expeditissime
 resecta, postea palpebram inurito, non candenti-
 bus ferramentis, vitando naturam pilorum: aut flore æris
 tosto tenui adstringito. Quum autem crusta exciderit, ve-
 lut reliqua curato. Quum palpebræ scabie laborant, &
 pruritus habet, floris æris glebulam ad cotem terito, & ex
 ipso palpebram defricato. Et tunc squamam æris quàm te-
 nuissime terito, deinde vix immaturæ succum excolatum
 affundito, ac leniter simul terito. & postea reliquum suc-
 cum in vase æris rubri affundens, paulatim terito, donec
 crassitudo fiat velut allij intritum. & ubi resiccatum fuerit
 Nyctalops medicamentum, leuiter trito vtere. Nyctalops medica-
 mentum bibat deorsum purgans, & caput purgetur, & cer-
 uicem

*Palpebra-
rum cura-
tio.*

*Palpebra-
curatio.*

*Nyctalops
qui curet.*

uicem eius quàm maxime scarificato, & fame ad multum tempus premito. Vbi vero remiserit, vnum aut duo frustra, prout maxima deuorare potest, de hepate bubulo crudo in melle tincto exhibeto. Si cui oculi dum sani sunt visum corrumpant, huic sectione & insuper excoriatione, in sinciput facta, os excindere, & aquam auferre oportet, sicque curare: & ita sani fiunt. Ad lippitudinem annuam ac popularem conducit purgatio capitis, & ventris inferni. Et si corpus habeat, sanguinis detractio ad quosdam eiusmodi dolores confert. Conferunt & cucurbitæ circa venas affixæ. Cibus modicus panis, & aquæ potus. Decumbat autem æger in tenebris, procul à fumo, & igne, & aliis splendidis, atque hoc in obliquum, modo in dextram, modo in sinistram partem. Caput vero ne humectet, neque enim conducit. Cataplasma si dolor non adest, verum velut ad fluxionem cohibendam, non confert, quum tumores sint doloris exortes. Verum post acria medicamenta, quæ ad dolorem illinuntur, postquam dolor sedatus fuerit ac separatus, post medicamentum illitionem, tunc cataplasmata imponere conducit, si quod commodum fore visum fuerit. Nec vero ad multum tempus contente intueri confert. Lachryma enim prouocatur, quum non possit oculus ad splendida officio suo fungi. Sed neque ad multum tempus claudere oculos conducit, maxime si fluxionem calidam habeat. Lachryma enim suppressa, calefacit. Si vero fluxio non sit, cum puluillo sicco subitionem facere conducit.

*Medela
cū quis sanis oculis
non uidet.
Lippitudinis curatio.*

HIPPOCRATIS COI

LIBER APHORISMORUM,

Iano Cornario medico physico interprete.

terprete.

Vita

HIPPOCRATIS LIBER

SECTIO PRIMA.



Ita brevis, ars longa, tempus præceps, experimētum periculofū, iudiciū difficile. Oportet autē nō solum ſeipſum exhibere quæ decent facientem, ſed etiam ægrotum, & præſentes, & quæ externa ſunt. **II.** In perturbatiōibus alui, & vomitibus ſponte ſientibus, ſi quidem qualia purgari oportet purgentur, confert, & leuiter ferunt: Sin minus, vice verſa. Sic & vaſorum vacuatio, ſi quidem talis fuit, qualis fieri debet, confert, & bene ferunt: Sin minus, vice verſa. Inſpicere itaque oportet regionem, & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus conuenit, aut non.

III. In exercitantibus boni habitus ad ſummum progreſſi periculofī ſunt, ſi in extremo fuerint. Nō enim manere poſſunt in eodem, neque quieſcere. Quum vero non quieſcant, non amplius in melius augeſcere poſſunt. reliquum eſt igitur vt in deterius. Ob has igitur cauſas bonam habitudinem nō tarde ſoluere confert, quo corpus rurfum, renutritionis principium ſumat. Neque vero collapſiones ad extremum ducere oportet. periculofum enim eſt. Sed qualis natura eſt eius qui perferre debet, ad hoc ducere conuenit. Similiter autem & euacuationes ad extremum ducentes, periculofæ ſunt. & rurfus renutritiones in extremo exiſtentes, periculofæ ſunt.

IIII. Tenuēs & exacti victus, & in lōgis ſemper affectiōnibus, & in acutis, vbi non expedit, periculofī ſunt. & rurfus victus ad extremam tenuitatem progreſſi, difficiles ſunt. Et repletiones ad extremum progreſſæ, difficiles ſunt. **V.** In tenui victu delinquentes ægrotantes, magis læduntur. Omne enim delictum quod cōmitti poterit, magis magnum cōmittitur in tenui quàm in paulo pleniore victu. Quapropter etiam in ſanis periculofus eſt valde tenuis, & conſtitutus, ac exactus victus. quoniā delicta grauius ferunt. Ob hoc igitur tenuis & exactus victus periculofus eſt magis quàm paulo plenior. **VI.** Ad extremos morbos, exactæ extremæ curationes, optimæ ſunt. **VII.** Vbi igitur peracutus eſt morbus, ſtatim etiam extremos labores habet, & extremè tenuiſſimo victu

- A** victu vti necesse est. Vbi non, sed pleniore victu vti licet, in-
tantum subdescendendum est, inquantum morbus extremis
mollior fuerit. VII. Quum in vigore fuerit morbus, tunc
tenuissimo victu vti necesse est. IX. Simul autem conie-
ctare oportet, an æger ex victu durare possit ad morbi vigo-
rem; & vtrum ille prius deficiet, & ex victu durare non pos-
sit: aut morbus prius deficiet ac obtundetur. X. Quibus
igitur statim vigor est, his statim tenuis victus exhibendus
est. Quibus vero vigor posterius, his ad illud, & paulo ante
illud tempus, subtrahendus est. Antea vero mitius æger victu
tractandus est, quo durare possit. XI. In exacerbationi-
bus subtrahere victum oportet. Nam apponere noxa est. Ex
quibus per circuitus exacerbationes fiunt, in exacerbatio-
nibus subtrahere oportet. XII. Exacerbationes & consti-
tutiones indicabunt morbi, & tempora anni, & circuituum
inter se collata incrementa, siue quotidie, siue alternis dieb⁹,
siue per amplius temporis intervallum fiant. Sed & ex appa-
rentibus indicia fiunt, velut in pleuriticis, si sputum statim
appareat incipiente morbo, ipsum abbreviat. Si vero poste-
rius appareat, producit. & vrinx, & alui egestionem, & sudo-
res apparentes indicant & ægre & facile iudicandos, & bre-
ues & longos morbos. XIII. Senes facillime ieiunium fe-
runt. Deinde ætate consistentes. Minime adolescentes. om-
nium vero minime pueri, inter hos ipsos qui ipsi seipfis ala-
ciores fuerint. XIV. Qui crescunt, plurimum habent in-
natum calorem. plurimo igitur opus habent alimento. Sin-
minus, corpus consumitur. Senibus autem modicus est ca-
lor: quapropter paucis fomitib⁹ opus habent, à multis enim
extinguuntur. Ob hanc etiam causam febres senibus non si-
militer acutæ fiunt. Frigidum est enim ipsorum corpus.
- XV. Ventres hyeme & vere natura calidissimi sunt, &
somni longissimi: Quapropter in his temporibus alimenta
plura exhibenda sunt. Nam innatum calorem amplio-
rem tunc habent, alimento igitur ampliore opus habent. Signum
sunt ætates, & athletæ. XVI. Victus humidi omnibus fe-
bricitantibus conferunt. Maxime vero pueris, & aliis ita ali-
adshuetis. XVII. Et quibus semel aut bis, & plus aut mi-
nus, & ex parte exhibere oportet, considerandum est. Dan-
dum vero etiam aliquid est tempori, & regioni, & ætati, &

HIPPOCRATIS LIBER.

consuetudini. **xviii.** Aestate & autumno cibos difficilissime ferunt, hyeme facillime, deinde vere. **xix.** His qui in circuitibus exacerbantur, nihil dare oportet, neque cogere: sed auferre de appositionibus ante iudicationes.

xx. Quæ iudicantur, & iudicata sunt integre, neque mouere oportet, neque nouare, neque medicamentis, neque aliis irritamentis, sed sinere. **xxi.** Quæ ducere oportet,

quò maxime repunt, eò ducere oportet, per conuenientes locos. **xxii.** Concocta medicamentis aggredi oportet, & mouere non cruda, neque in principiis, si non turgant.

Plurima vero non turgent. **xxiii.** Quæ prodeunt non multitudine æstimare oportet, sed quandiu prodeant qualia oportet, & facile æger ferat. Et ubi opus est, vsque ad a-

nimi deliquium ducere oportet: & hoc facere, si sufficiat æger. **xxiiii.** In acutis affectionibus raro etiam in principiis medicamentis uti oportet: atque hoc facere diligenti prius æstimatione facta. **xxv.** Si qualia oportet purgari,

purgentur, cõfert & facile ferunt. Cõtraria vero difficulter.

SECTIO SECYND A.

i. **I**N quo morbo somnus laborem facit, mortale: Si vero somnus profit, non lethale. **ii.** Vbi somnus delirium sedat, bonum est. **iii.** Somnus, vigilia, vtraq; modum excedentia malum. **iiii.** Non satietas, non fames, neq; aliud quicquam bonum est, quod naturæ modum excedat.

v. Lassitudines spontaneæ denunciât morbos. **vi.** Qui cunque aliqua corporis parte dolentes, plerunque dolores non sentiunt, his mens ægrotat. **vii.** Quæ multo tempore attenuantur corpora, lente rescire oportet. Quæ vero breui, breui. **viii.** Si ex morbo cibum capiens quis non fiat validus, significat quòd corpus vberiore alimento vitur, Si vero cibum non accipiente hoc contingat, nosse oportet quòd euacuatione opus habet. **ix.** Corpora quocunque quis purgare voluerit, fluida facere oportet.

x. Non pura corpora quanto plus nutries, tanto magis ades. **xi.** Facilius est repleri potu, quàm cibo.

xii. Quæ relinquuntur in morbis post iudicationem, recidiuam faciunt. **xiii.** Quibuscunque iudicatio fit, his nox gravis ante exacerbationem. Quæ vero sequitur plerunque tolerabilior est. **xiiii.** In alui fluxionibus, mutatio-

nes ege-

- A** nes egestionum profunt, si nō ad prauas mutentur. **xv.** Vbi fauces ægrotant, aut tubercula in corpore nascuntur, excretionē considerare oportet. Si enim bilioſæ fuerint, corpus ſimul ægrotat. Si vero ſimiles ſanis fiant, tutum eſt corpus nutrire. **xvi.** Vbi fames; non oportet laborare.
- xvii.** Vbi cibus præter naturam copioſior ingreſſus fuerit, morbum facit. Oſtendit autem ſanatio. **xviii.** Eorum quæ acervatim & velociter nutriunt, veloces etiam egeſtiones fiunt. **xix.** Acutorum morborum non omnino tutæ ſunt prædictiones, neque mortis, neque ſanitatis.
- xx.** Quibus dum iuvenes ſunt, ventres humidi ſunt, hiſ ſenſcentibus reſiccantur. Quibus vero dum iuvenes ſunt, ventres ſicci ſunt, hiſ ſenſcentibus humectantur. **xxi.** Famem vini potus ſoluit. **xxii.** Quicumque morbi ex repletionē fiunt, euacuatio ſanat. Et quicumque ex euacuationē, repletio. Et aliorum contrarietas. **xxiii.** Acuti morbi in quatuordecim diebus indicantur. **xxiiii.** Septimæ quarta index eſt. Alterius hebdomadæ octaua principium eſt. Conſideranda vero eſt vndecima. Hæc enim quarta eſt ſecundæ hebdomadæ. Conſideranda rurfus decimaſeptima. Ipſa enim eſt quarta quidem à decimaquarta, ſeptima vero ab vndecima. **xxv.** Aſtiuæ quartanæ plerūque ſunt breues. Autumnales vero longæ, & maxime quæ ad hyemē perſtingunt. **xxvi.** Febrem in conuulſione fieri melius eſt, quàm conuulſionem in febre. **xxvii.** Hiſ quæ non ſecundum rationem leuant, non oportet credere, neque valde
- C** timere ea quæ praua ſunt præter rationem. Pleraque enim ex talibus inconstantia ſunt, & non valde permanere, neque morari ſolent. **xxviii.** Febricitantium non omnino leuiter, permanere, & nihil minui corpus, aut etiā magis quàm pro ratione colliquari, malum eſt. Illud enim morbi longitudinem, hoc vero debilitatem ſignificat. **xxix.** Incipientibus morbis ſi quid mouendum videtur, moue: vigentibus vero, quietem agere melius eſt. **xxx.** Circa principia & fines, omnia debiliora ſunt. Circa vigores vero, fortiora.
- xxxi.** Ex ægitudine bene cibum accipiēti, nihil augere corpus, malū eſt. **xxxii.** Plerūq; omnes male habētes, ab initio cibum bene capientes, & nihil augeſcentes, ad finem rurfus cibos ſaſtidiūt. At ab initio quidem valde cibum

HIPPOCRATIS LIBER

bum auersantes, postea vero bene cibū capiētes, melius liberatur. D **xxxiii.** In omni morbo valere mēte, & bene se habere ad ea quæ exhibentur, bonū. contrarium vero, malum.

xxxiiii. In morbis minus periclitantur, quorum naturæ, & ætati, & habitui, & tempori morbus magis affinis fuerit, quàm hi quibus non affinis in aliquo horum existit. **xxxv.** In omni morbo partes circa umbilicum & pectinem, crassitudinē habere melius est. At vehemens tenuitas & eliquatio, praua est. Periculosa vero talis est etiam ad infernas purgationes. **xxxvi.** Sana habentes corpora, dum medicamentis purgantur, cito exoluuntur. Itemque qui prauo cibo vtuntur. **xxxvii.** Qui bene habent corpore, eos operosum est medicamentis purgare.

xxxviii. Paulo deterior & potus & cibus, verum iucundior, melioribus quidem, sed iniucundioribus præferendus est. **xxxix.** Senes iuuenibus plerunque minus egrotant. Quicumque vero ipsis fiunt morbi diuturni, vt plurimum commoriuntur. E **xl.** Raucedines & grauedines, in valde senibus non concoquuntur. **xli.** Qui exoluuntur sæpe & fortiter, absque manifesta causā, derepente moriuntur. **xlii.** Syderationem fortem quidem soluere, impossibile est. debilem vero, non facile. **xliii.** Ex his qui strangulantur, & submerguntur, nondum autem mortui sunt, non reconualescunt quibus spuma circa os fuerit.

xliiii. Crassi admodum secundum naturam, magis cito moriuntur, quàm graciles. **xlv.** Iuuenibus comitibus liberationem faciunt mutationes, maxime ætatis, & regionum, & victuum. F **xlvi.** Duobus doloribus simul fientibus, non secundum eundem locum, vehementior obscurat alterum. **xlvii.** Circa generationem puris, dolores & febres magis cōtingunt, quàm factō iam ipso. **xlviii.** In corporis motu, quum incōperit dolere, quiescere statim lassitudinem eximit. **xlix.** Adfueti consuetos labores ferre, etiam si fuerint debiles, aut senes, non adfuetis fortibus ac iuuenibus facilius ferunt. **l.** Ex multo tempore cōsueti, etiam si deteriora fuerint, inconsuetis minus molestare solent. Oportet igitur etiā ad inconsueta transmutationem facere. **li.** Multum & repente euacuare, aut replere, aut calefacere, aut frigefacere, aut omnino quomocunque

corpus

A corpus mouere, periculosum est. Et omnis multitudo naturæ contraria est. Quod vero paulatim fit, tutum est, tū aliās, tum si ex altero ad alterum transitus fit. **I. I.** Omnia secundū rationem facienti, si non secundum rationem fiant, non transire oportet ad aliud, manente eo quod visum est ab initio.

I. I. I. Quicunque ventres humidos habent, dum quidem iuuenes sunt, melius degunt quàm hi qui siccos habent. Verum ad senectutem deterius degunt. Resiccantur enim plerunque senescentibus. **I. I. I. I.** In corporis magnitudine iuuentutem quidem degere, liberale est & non indecorum. Senectutem vero degere, inutile, & deterius paruitate.

SECTIO TERTIA.

B Mutationes temporum maxime pariunt morbos, & in temporibus magnæ mutationes frigoris, aut caloris, & reliqua iuxta rationem hoc modo. **II.** Naturarum aliarum quidem ad æstatem, aliarum vero ad hyemem, bene aut male se habent. **III.** Morborum alij ad alia tempora, bene aut male se habent: & ætates quædam ad tempora, & regiones, & victus. **III. I.** In temporibus quum eadem die, modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos expectare oportet. **V.** Austri auditum grauantes, caliginos, caput grauantes, torpidi, dissoluentes. Quum hic præualuerit, talia in morbis patiuntur. Si vero Aquilo fuerit, tussis, fauces, alui duræ, urinæ difficultates, horrores, dolores costarum, pectoris. Quum hic dominatur, talia in morbis expectare oportet. **V. I.** Quum ætas fit veri similis, sudores in febribus multos expectare oportet. **V. I. I.** In siccitatibus febres acutæ fiunt, & si quidem annus amplius talis fuerit, qualem constitutionem fecerit, plerunque tales etiam morbos expectare oportet. **V. I. I. I.** In constantibus temporibus, si tempestiue tempestiua reddantur, morbi constantes & iudicatu facilissimi fiunt. In inconstantibus autem inconstantes, & qui difficulter iudicantur. **IX.** In autumno morbi acutissimi, & omnino mortiferi. Verum autem saluberrimum & minime lethale. **X.** Autumnus tabidis malus. **XI.** De temporibus si quidem hyems sicca & aquilonaris fuerit, Verum autem pluuiosum & australe, necesse est ætate febres acutas, & lippitudines, & dysenterias fieri, maxime mulieribus, & viris natura humidioribus. **XI. I.** Si vero hyems australis, &

Tt iij pluuios-

HIPPOCRATIS LIBER

pluuioſa, ac clemens fiat, Ver autem ſiccum & aquilonare, mu D
lieres quidem quibus partus ad ver inſtat, ex omni occaſione
abortiunt. Quæ vero pariunt, impotentes ac morboſos pue-
ros pariunt, ita vt aut ſtatim pereant, aut tenues ac morboſi
uiuant. Aliis autem dyſenteriz, & lippitudines ſiccæ ſiunt.
Senioribus vero deſfluxiones breui perimentes. XIII. Si
vero æſtas ſicca fiat & aquilonaris: Autumnus autem pluui-
oſus & auſtralis, capitis dolores ad hyemem ſiunt, & tuſſes, &
raucedines ac grauedines: quibuſdam etiam tabes. XIII.

Si vero aquilonaris & aquarum exors autumnus fuerit,
his quidem qui humiditas naturas habent, & mulieribus com-
modus erit. Reliquis vero ſient lippitudines ſiccæ, & febres
acutæ, & grauedines. Quibuſdam vero etiam atræ biles. E

XV. Ex anni vero conſtitutionibus, in ſumma ſiccitates
pluuioſis ſalubriores ſunt, & minus lethales. XVI. Morbi
in pluuiſis quidem plerumque ſiunt, febres longæ, & alui
fluxiones, & putredines, & comitiales, & ſyderationes, &
anginæ. In ſiccitatibus vero, tabes, lippitudines, arthritides,
vrinæ ſtillicidia, & dyſenteriz. XVII. Quotidianæ vero

conſtitutiones, aquilonares quidem corpora compingunt,
& robuſta, & ad motum idonea, & bene colorata, & melius
audientia faciunt, & ventres reſiccant, & oculos mordent,
& ſi circa thoracem aliquis dolor prius eſt, magis affligunt.
Auſtrales autem corpora diſſoluunt, & humectant, & gra-
uem auditum, ac capitis grauitatem, & vertigines faciunt. In
oculis autem & corporibus ægrum motum, & ventres hu- F
mectant.

XVIII. Secundum tempora vere quidem & pri-
ma æſtate, pueri, & qui his ætate cohærent, optime degunt,
& maxime ſani ſunt. Aæſtate vero & autumnno aliquandiu,
ſenes. Reliquo autumnno & hyeme, mediam ætatem ha-
bentes.

XIX. Morbi omnes quidem in omnibus tempo-
ribus ſiunt. Quidam tamen magis in quibuſdam ipſorum &
ſiunt, & exacerbantur.

XX. Vere inſaniæ, & atræ biles,
& comitiales, & ſanguinis fluxiones, & anginæ, & graue-
dines, & raucedines, & tuſſes, & lepræ, & impetigines, & vi-
tiligines, & puſtulæ vicerofæ plurimæ, & tubercula, & mor-
bus articularis.

XXI. Aæſtate vero & quidam ex his, & fe-
bres continuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, & quartanæ,
& vomitus, & alui profluuia, & lippitudines, & aurium dolores,
& oris

A & oris exulcerationes, & pudendorum putredines, & papulæ sudorosa. **xxii.** Autumno autem & ex æstiuis multi, & febres quartanæ, & erroneæ, & splenes, & hydropes, & tabes, & vrinæ stillicidia, & intestinorum leuitates, & dysenterix, & coxendices, & angina, & anhelationes, & voluuli, & comitiales, & insanix, & atræ biles. **xxiii.** Hyeme vero pleuritides, peripneumonix, grauedines, raucedines, tusses, dolores, pectorum, laterum ac lumborum, capitis dolores, vertigines, syderationes. **xxiiii.** In ætatibus autem talia contingunt, paruis ac recens natis pueris feruida oris vlcera, vomitus, tusses, vigilia, timores, vmbilici inflammationes, aurium humiditates. **xxv.** Ad dentitionem vero accedentibus, ginginarum pruritus, febres, conuulsiones, alui profluvia, & maxime vbi dentes caninos producunt, tum crassissimis pueris, tum his qui duros ventres habent. **xxvi.** Senioribus autem sientibus, tonsillæ, verticuli in occipitio intro, luxationes, anhelationes calculorum generationes, lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ, tumores glandularum circa aures oblongi satyriasmī appellati, strumæ, & alia tubercula, maxime vero prædicta. **xxvii.** Adhuc vero senioribus, & ad pubertatem accedentibus, pleraque ex his, & febres diurnæ magis, & ex naribus sanguinis fluxiones.

xxviii. Plurimæ vero affectiones pueris iudicantur, partim in quadraginta diebus, partim in septem mensibus, partim in septem annis, partim ad pubertatē accedentibus. Quæ vero permāserint pueris affectiones, & non exolutæ fuerint **C** circa pubertatem, aut scemellis circa mensium eruptiones, diurnæ fieri solent. **xxix.** Iuuenibus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutæ, comitiales, & alij morbi, maxime vero prædicti. **xxx.** His vero qui hanc ætatem excesserunt, anhelationes, pleuritides, peripneumonix, lethargi, phrenitides, febres ardentes, alui profluvia diurna, bilis sursum ac deorsum effusiones, dysenterix, intestinorum leuitates, hæmorrhoides. **xxxi.** Senibus autem spirandi difficultates, & defluxiones cū tussi, vrinæ stillicidia, vrinæ difficultates, articulorum dolores, nephritides, vertigines, syderationes, mali habitus, pruritus totius corporis, vigilia, alui, oculorum, & narium humiditates, visus hebetudines, glauccidines, auditus grauitates.

HIPPOCRATIS LIBER

SECTIO QUARTA.

Pregnantes medicamentis purgare oportet, si turget humor, quarto mense, & vsque ad septimum. Minus vero has, Iuniores autē & seniores foetus vereri oportet. **II.** In medicamentorum usu, talia ex corpore ducere oportet, qualia etiam sponte prodeuntia commoda sunt. Contrario autem modo prodeuntia, sedare. **III.** Si qualia oportet purgari, purgentur, confert & facile ferunt. Contraria vero difficulter. **IIII.** Medicamentis purgare oportet ætate quidem superiores magis: hyeme vero inferiores. **V.** Sub canem, & ante canem, operosa sunt medicamentorum purgationes. **VI.** Graciles, & facile vomentes, sursum purgare oportet, vitantes hyemem. **VII.** Difficulter vomentes, & moderate carnosos, deorsum, vitantes ætatem. **VIII.** Tabescentes autem, vitantes superiores. **IX.** Atrabiliarios vero plenius inferiores. Eadem ratione contraria apponens.

X. Purgare oportet in valde acutis, si humor turget, eadem die. Morari enim in talibus malum est. **XI.** Quibus tormina, & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neque à medicamento, neque alias soluitur, in hydropem siccum firmatur. **XII.** Quibus alui intestinorum leuitate affecti, eos hyeme sursum purgare malum est. **XIII.** Ad veratrum, his qui non facile sursum purgantur, ante potionem corpora humectare oportet, ampliore cibo ac quiete.

XIIII. Vbi biberit quis veratrum, ad motus quidem corporum magis ducere oportet, ad somnos autē & quietem minus. Declarat autem nauigatio, quod motus corpora turbat.

XV. Vbi volueris magis ducere veratrum, corpus moueto. Vbi vero sistere, somnum facito, & ne moueto. **XVI.** Veratrum periculosum est sanas carnes habentibus. Conuulsionem enim inducit. **XVII.** Sine febre existenti cibi fastidium, & oris ventriculi morsus, & vertigo, & os amarescens, medicamento sursum purgante opus habere significat.

XVIII. Dolores supra septum transuersum, qui purgatione opus habent sursum versus purgatione indigere significant: qui vero infra, deorsum. **XIX.** Qui in medicamentorum potionibus, dum purgantur non sitiunt, non cessant priusquam citierint. **XX.** Non febrientibus si fiat tormen, & genuum grauitas, & lumborum dolor, deorsum medicamento

A camento purgante opus habere significat. **xxi.** Egestion-
nes alui nigrae, velut sanguis niger, sua sponte prodeuntes, &
cum febre, & sine febre, pessimae sunt. & quāto plures fuerint
peiores colores, tanto magis malū est. Cum medicamēto ve-
ro melius, & quāto plures fuerint colores, nō malū est. **xxii.**

Quibuscunq; morbis incipientibus, si atra bilis, aut sursum
aut deorsum prodierit, lethale est. **xxiii.** Quibuscunque
ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex vulneribus, aut alijs
attenuatis, atra bilis, siue qualis sanguis niger subierit, postri-
die moriuntur. **xxiiii.** Dysenteria si ab atra bile incede-
rit, lethalis est. **xxv.** Sanguis sursum quidem qualiscunq;
fuerit, malus est. deorsum vero bona sunt nigra subeuntia.

B **xxvi.** Si à dysenteria occupato, veluti carnes subierint, le-
thale est. **xxvii.** Quibus in febribus sanguinis multitudo
erumpit vndecunque, his in refectionibus alui humectantur.

xxviii. Quibus biliosae sunt egestionēs, surditate fiente
cessant. Et quibus surditas, biliosis egestionibus fientibus ces-
sat. **xxix.** Quibus in febribus sexta die rigores fiunt, dif-
ficulter iudicāt. **xxx.** Quibus exacerbationes fiunt, qua-
cunque tandem hora febris dimiserit, si postridie eadem qua
antea hora corripuerit, difficulter iudicant. **xxxi.** De-
lassatis in febribus, ad articulos, & circa maxillas maxime, ab-
scessus fiunt. **xxxii.** Quibuscūque resurgentibus ex mor-
bis, si quid doluerit, isthic abscessus fiunt. **xxxiii.**

Sed & si ante morbum quid doluerit, isthic morbus incum-
C bit. **xxxiiii.** Si à febre occupato, tumore non existen-
te in faucibus, suffocatio derepente contingat, lethale est.

xxxv. Si à febre occupato collum repente obuersum
fuerit, & vix deglutire poterit, tumore non existente, lethale
est. **xxxvi.** Sudores febricitanti si inceperint, boni
sunt tertia die, & quinta, & septima, & nona, & vndecima,
& decimaquarta, & decimaseptima, & vigesima prima, & vige-
simaseptima, & trigesima prima, & trigesimaquarta. Hi enim
sudores morbos iudicant. Qui vero non sic fiunt, dolorem si-
gnificant, & longitudinem morbi, & recidivas. **xxxvii.**

Frigidi sudores cum acuta quidem febre fientes, mortem
significāt: cum mitiore vero, morbi longitudinē. **xxxviii.**

Et vbi in corpore sudor est, illic morbum esse declarat,
xxxix. Et vbi in corpore frigiditas aut calliditas, isthic
morbus

HIPPOCRATIS LIBER

morbus est. **XL.** Et ubi in toto corpore mutationes, & si D
 corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio fiat, longitudinem morbi significat. **XLi.** Sudor multus ex somno, citra manifestam causam fiens, corpus multo a limento uti significat. Si vero cibum non capienti hoc fiat, significat quod euacuatione opus habet. **XLii.** Sudor multus, frigidus aut calidus, semper fluens: frigidus maiorem calidus minorem morbum significat. **XLiii.** Febres quæcunque non intermittentes per tertiam fortiores sunt, magis periculosæ sunt. Quocunque vero modo intermiserint, sine periculo sunt significant. **XLiiii.** Quibus febres longæ, his tubercula ad articulos, aut dolores sunt. **XLv.** Quibus tubercula ad articulos, aut dolores, ex febribus longis sunt, hi pluribus cibis utuntur. **XLvi.** Si rigor incidat febre non intermittente ægroto iam debili, lethale est. **XLvii.** Excreationes in febribus non intermittētibz, liuidæ, & cruentæ, & graueolentes, & biliosæ, omnes malæ sunt. At probe secedētes, bonæ, & per alui egestionem, & per urinas. Si vero non aliquid ex conducentibus excernatur per hos locos, malū est.

XLviii. In non intermittētibz febribz, si externæ quidem partes frigidæ fuerint, internæ vero ardeant, ac sitim habeant, lethale est. **XLix.** In febre non intermittente, si labium aut palpebra, aut supercilium, aut oculus, aut nasus distortetur: aut non videat, aut non audiat, æger iam debilis existens; quicquid horum fiat, propinqua mors est. **L.** Ubi in febre non intermittente difficultas spirandi, & delirium fit lethale est. **Li.** In febribz abscessus qui non solvuntur ad primas iudicationes, longitudinem morbi significant. E

Lii. Quicunque in febribz, aut aliis ægritudinibz, ex voluntate lachrymatur, nihil absurdi est. Qui vero non ex voluntate, absurdum. **Liii.** Quibus circa dentes in febribz viscosa adherent, his fortiores febres sunt. **Liiii.** Quibus plerunque tussis sicca, parum irritantes, in febribz ardentibus, hi non ita valde siticulosi sunt. **Lv.** Ex glādularum tumoribus febres omnes malæ sunt, exceptis diariis. **Lvi.** Febricitanti sudor oboriens febre non remittēte, malum. Morā enim trahit morbus, & multam humiditatem significat.

Lvii. A convulsione, aut distentione nervorum vexato, febris accedens morbum soluit. **Lviii.** A febre ardente occupato, F

A occupato, rigore accedente, solutio fit. LX. Tertianæ exacta in septem circuitibus ad summum iudicatur. LX.

Quibus in febribus aures obsurduerunt, his sanguis è naribus effusus, aut alius exturbata, morbum soluit. LXI.

Febrientem si non in diebus imparibus febris dimiserit, recidiuare solet. LXII. Quibus in febribus morbus regius fit ante septimum diem, malum. LXIII. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur. LXIII. Quibus in febribus morbus regius septima, aut nona, aut decimaquarta accedit, bonum, si non præcordium dextrum durum fiat: sin minus, non bonum.

B LXV. In febribus circa ventrem æstus vehemens, & cordis siue oris ventriculi morsus, malum. LXVI. In febribus acutis conuulsiones, & circa viscera dolores fortes, malum.

LXVII. In febribus, ex somnis, timores aut conuulsiones, malum. LXVIII. In febribus spiritus offendens, malum. Conuulsionem enim significat. LXIX. Quibus vrinæ crassæ, grumosæ, paucæ, non sine febribus, vbi copia ex his successit, tenuis prodest. Tales autem maxime prodeunt his quibus ab initio, aut breui subsidentiam habent. LXX.

Quibus in febribus vrinæ conturbatæ, velut iumentis, his capitis dolores, aut adsunt, aut aderunt. LXXI. Quibus septima die morbi iudicantur, his nubeculam habet vrina, quarta die rubram, & alia secundum rationem. LXXII.

C Quibus vrinæ pellucidæ, albæ, malæ. Maxime autem in phreniticis comparent. LXXIII. Quibus præcordia eleuata, permurmurantia, lumborum dolore accedente, his alui humectantur, si non flatus erumpant, aut vrinæ copia prodeat. In febribus autem hæc. LXXIII. Quibus spes est abscessum fore ad articulos, eos liberat ab abscessu vrina multa, & crassa, & alba prodiens, qualis in febribus laboriosis quarta die quibusdam fieri incipit. Si vero etiam ex naribus sanguis eruperit, breui admodum soluitur. LXXV. Si quis sanguinem aut pus mingat, rhenum aut vesicæ vlcerationem significat. LXXVI. Quibus in vrina crassa existente, carunculæ parue, aut veluti pili simul exeunt, his de rhenibus excernuntur. LXXVII. Quibus in vrina crassa existente, fursuracea quædam simul minguntur, his vesica scabie affecta est. LXXVIII. Qui sua sponte sanguinè mingunt, his

HIPPOCRATIS LIBER

his in rhenibus venæ ruptione significat. **LXXIX.** Quibus in vrina, arenosa subſidunt, his veſica calculo laborat.

LXXX. Si quis ſanguinem mingat, & grumos, & vrinæ ſtillicidium habeat, & dolor incidat in imum ventrem, & ani ac ſcorti intercapedinem, partes circa veſicam affectæ ſunt.

LXXXI. Si quis ſanguinem & pus mingat, & ſquamas, & odor grauis ſit: veſicæ exulceratione ſignificat. **LXXXII.**

Quibus in vrinaria fiſtula tuberculum naſcitur, his ſuppuratione facta & eruptione, ſolutio fit. **LXXXIII.** Mictio noctu multa ſiens, medicam alui egeſtionem ſignificat.

SECTIO QVINTA.

Conuulſio ex veratro lethalis eſt. **II.** Ex vulnere conuulſio lethalis eſt. **III.** Sanguine multo effuſo conuulſio aut ſingultus accedens, malum.

IIII. Ex ſuperflua purgatione, conuulſio aut ſingultus accedens, malum. **V.** Si quis ebrius derepente voce priuatur, conuulſus moritur, ſi non febris corripuerit, aut vbi ad horam qua crapulæ ſoluuntur peruenit, loquatur.

VI. Quicumque à diſtentione antrorſum ac retrorſum corripuntur, in quatuor diebus pereunt. Si vero has effugerint, ſani ſiunt. **VII.** Quibuſcunq; morbi comitiales ante pubertatem ſiunt, tranſmutationem habent. Quibuſcunq; vero viginti quinque annos nati ſiunt, his plerunque commoriuntur. **VIII.** Quicumque pleuritici ſientes, in quatuordecim diebus non repurgantur, his ad ſuppuratione tranſiſio fit. **IX.** Tabes maxime ſit ætatibus, ab anno decimo octauo, uſque ad trigefimum quintum. **X.** Quicumq; anginam effugiunt, his ad pulmonem vertitur, & in ſeptem diebus moriuntur. Si vero has effugerint, ſuppurati ſiunt.

XI. Qui tabe infeſtantur, ſi ſputum quodcunque ruſſiſſendo reiecerint, graue olet, dum prunis iniicitur, & capilli de capite deſluunt, lethale eſt. **XII.** Quibuſcunque tabe laborantibus capilli de capite defluxerint, hi alui profluuium accedente moriuntur. **XIII.** Quicumque ſanguinem ſpuumſum ſpuunt, his ex pulmone educio fit. **XIIII.** A tabe occupato, alui profluuium accedens, lethale eſt. **XV.**

Quicumque ex pleuritide ſuppurati ſiunt, ſi in quadraginta diebus repurgati fuerint, ab ea die qua ruptio facta fuerit, liberantur. Si vero non, ad tabem tranſeunt. **XVI.** Calida fre-

A da frequenter ea vtiētibus, has noxas inducit, carnis effeminationem, neruorum impotentiam, mentis torporem, sanguinis eruptiones, animi deliquia. Hæc quibus mors. **xvii.**

Frigida vero conuulsiones, antrorsum ac retrorsum distentiones, nigrores, rigores febriles. **xviii.** Frigida inimica ossibus, dentibus, neruis, cerebro, spinali medullæ. Calida vero grata. **xix.** Quæcunque perfrigerata sunt, excalefacere oportet, præterquam à quibus sanguis erumpit, aut erupturus est. **xx.** Vlceribus frigida mordax, cutem obdurat, dolorem non suppuratē facit, nigrefacit, rigores febriles inducit, conuulsiones, distentiones. **xxi.** Quandoque,

B frigida multæ affusio, caloris reuocationem facit. Calor autem hæc soluit. **xxii.** Calida suppuratoria est, nō in omni ulcere, maximum signum ad securitatem, cutem mollit, attenuat, dolores eximit, rigores, conuulsiones, distentiones mitigat, capitis grauitatem soluit. Plurimum autem confert ad ossium fracturas, maxime denudatas. Ex his autem maxime his qui in capite vlcera habēt, & his quæ à frigiditate moriuntur, aut vlcérantur, & herpetibus exedentibus, sedi, pudendo, vtero, vesicæ. His calida grata est & iudicans. Frigida vero inimica & occidens. **xxiii.** In his frigida vti oportet vnde sanguis erumpit, aut erupturus est: non super ipsas partes, sed circa ipsas vnde fluit. Et quæcunque inflammationes, aut flammei ardores, ad ruborem & subcruentum colorem ex nouo sanguine tendunt, ad eas ipsas. nā veteres nigrefacit, & ad sacrum ignem nō exulceratum. nam exulceratum lædit. **xxiiii.** Frigida velut nix, glacies, pectori inimica sunt, tussis mouent, & sanguinis eruptiones, ac defluxiones inducunt. **xxv.** Tumores in articulis, & dolores absq; ulcere, & podagricas affectiones, & conuulsiones: Horum plurima frigida multa affusa leuat, & attenuat, & dolorem soluit. Torpor enim dolorem soluit. **xxvi.** Aqua quæ cito calescit, & cito perfrigerat, leuissima est. **xxvii.**

C Quibus bibendi appetentiæ noctu valde sitiētib; si obdormierint bonum est. **xxviii.** Menses ducit aromaticum suffit. Multis autem modis etiam ad alia commodus esset, si nō capitis grauitatem induceret. **xxix.** Prægnantes medicamentis purgare oportet, si turgent humor quarto

mensē, &

HIPPOCRATIS LIBER

menſe, & uſque ad ſeptimum. Minus uero haſ. Iuniores uero **D**
& ſeniores foetus uereri oportet. xxx. Mulierem uteri
gerentem ab aliquo acuto morbo corripì, lethale eſt. xxxi.

Mulier uterum gerens ſecta uena abortit, & magis ſi ma-
ior fuerit foetus. xxxii. Mulieri ſanguinem uomenti,
menſibus erupentibus ſolutio fit. xxxiii. Mulieri me-
ſibus deficientibus, ſanguinem ex naribus fluere, bonum eſt.

xxxiiii. Mulieri uterum geſtanti ſi alius multum flu-
xerit, periculù eſt ut abortiat. xxxv. Mulieri quæ ab u-
teri ſtrangulationibus vexatur, aut difficulter parit, ſternu-
tatio accedens, bonum. xxxvi. Mulieri menſes deco-
lores, & non eodem tempore ſemper fientes, purgatione o-
pus eſſe ſignificant. xxxvii. Mulieri uterum geſtanti, **E**

ſi mammae repente graciles fiant, abortit. xxxviii. Mu-
lieri uterum geſtanti, ſi altera mamma gracilis fiat, gemellos
geſtans alterum abortit. Et ſi quidẽ dextera gracilis fiat, ma-
ſculum: ſi uero ſiniſtra, foemellã. xxxix. Si mulier quæ
neque prægnans eſt, neque peperit, lac habet: menſes ipſius
defecerunt. xl. Mulieribus quibuſcunque ad mamas ſan-
guis colligitur, infaniam ſignificat. xli. Mulierẽ ſi ve-
lis cognoscere, an prægnans ſit, ubi dormire uolet, aquã mul-
ſam bibendam dato. Et ſi quidem tormen habuerit circa vē-
trem, prægnans eſt. Si uero non prægnans non eſt. xlii.

Mulier prægnans ſi quidem maſculum geſtat, bene colora-
ta eſt. Si uero foemellam, male colorata. xliii. Si mulie-
ri prægnanti ignis ſacer in utero fiat, lethale eſt. xliiii. **F**

Quæcunque præter naturam tenues exiſtentes, uterum ge-
ſtant, abortiunt priuſquam craſſeſcant. xlv. Quæcunq;
uero moderate corpus habentes, abortiunt bi-meſtres & tri-
meſtres, ſine cauſa manifeſta, hiſ uteri acetabula muco plena
ſunt, & non poſſunt foetum continere præ grauitate, ſed ab-
rumpitur. xlvi. Quæcunq; præter naturã craſſæ exiſtẽtes,
non concipiunt in utero, hiſ omentum oſculum uteri com-
primit, & priuſquam attenuentur, nõ concipiunt. xlvii.

Si uterus in coxam incumbens, ſuppuratus fuerit, neceſſe
eſt curationem ex medicamentis, per linamenta ipſi adhibe-
re. xlviii. Foetus maſculi quidem in dextris, foeminæ
uero in ſiniſtris magis. xlix. Ut ſecundæ excidant, ſter-
nutatorio indito, nares & os apprehendito. l. Mulieri
menſes

- A** menses si cohibere voles, cucurbitam quàm maximam ad mammam appone. **L. I.** Quæcunque vterum gestant, his osculum vterorum clausum est. **L. II.** Mulieri vterum gestanti si multum lac ex mammis fluat, debilem foetum significat. Si vero solidæ fuerint mammae, saniores foetus significant.
- L. III.** Quæ corrupturæ sunt foetus, his mammae graciles fiunt. Si vero rursus duræ fiant, dolor erit aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, & non corrumpunt.
- L. IIII.** Quibus os vterorum durum est, his necesse est osculum vterorum clausum esse. **L. V.** Quæcunque in vtero habentes, à febris corripuntur, & fortiter attenuantur sine manifesta occasione, difficulter pariunt & periculose: aut abortum facientes periclitantur. **L. VI.** In fluxu muliebri, conuulsio & animi deliquium si accedat, malum est. **L. VII.** Mensibus pluribus prodeuntibus morbi fiunt, & non prodeuntibus, ab vtero morbi contingunt. **L. VIII.** Ex intestino recto, & vtero inflammato, urinae stillicidium accedit, & ex rheumibus suppuratis urinae stillicidium accedit. Verum ex hepate inflammato, singultus accedit. **L. IX.** Si mulier in ventre non concipit, velis autem scire an conceptura sit, vestimentis circumtectam ex infernis suffito. Et si quidem odor per corpus tibi procedere videatur ad nares & ad os, scito quod ipsa non propter seipsam infecunda est. **L. X.** Si mulieri vterum gestanti purgationes prodeunt, impossibile est foetum sanum esse. **L. XI.** Si mulieri purgationes non prodeunt, neque horrore, neque febre accedente: verum cibi fastidia ipsi accidunt, hanc in ventre habere existimato. **L. XII.** Quæcunque frigidos ac densos vteros habent, non concipiunt: & quæcunque humidos habent vteros, non concipiunt. Extinguitur enim in ipsis genitura. Et quæcunque siccos magis & adustos. Præ inopia enim alimenti corrumpitur semen. Quæcunque vero ex utrisque temperamentum habent moderatum, tales fecundæ fiunt. **L. XIII.** Similiter autem in masculis. Aut enim propter corporis raritatem, spiritus extra fertur, ut semen non deducat: aut propter densitatem, humor non procedit foras: aut propter frigiditatem non concalescit, ut ad hunc locum congregetur: aut propter caliditatem, hoc idem contingit. **L. XIII.** Lac dare caput dolentibus, malum. Malum etiam febricitantibus, & quibus præcordia eleuata per-

HIPPOCRATIS LIBER

murmurantia, & sterculosis. Malum & quibus biliosæ alui e-
gestionis in febribus acutis sunt, & quibus sanguinis multi
egestio facta est. Cōuenit autem exhibere tabescentibus, nō
valde multum febrientibus, & in febribus longis, debilibus,
nullo ex prædictis signis præsentē, sed præter rationem con-
sumptis. **LXV.** Quibus tumores in vlceribus apparent,
nō valde conuelluntur, neque insaniunt. His autem derepē-
te dissipatis, retrorsum quidem conuulsiones & distēiones
fiunt: antrosum vero, insanix, lateris dolores acuti, aut sup-
puratio, aut dysenteria, si rubicundi magis fuerint tumores.

LXVI. Si in vulneribus fortibus ac prauis, tumor nō ap-
pareat, magnum malum. **LXVII.** Tumores laxi boni, cru-
di mali. **LXVIII.** Dolenti posteriorem capitis partē, ve-

na recta in fronte secta prodest. **LXX.** Rigores incipiūt,
mulierib⁹ quidem ex lumbis magis, & per dorsum ad caput.
Verum & viris magis posteriore corporis parte quā ante-
riore, velut ex cubitis ac femoribus. Sed & cutis rara est. Indi-
cat autem pilus. **LXX.** Qui à quartanis corripuntur, non
ita valde à conuulsionibus corripuntur. Si vero prius corri-
piantur, & quartana insuper accedat, cessant. **LXXI.** Qui-
bus cutis circū tenditur arida ac dura, hi sine sudore moriū-
tur. Quibus vero laxa ac rara, cum sudore moriuntur.

LXXII. Morbo regio laborantes, non ita valde flatuosi
sunt.

SECTIO SEXTA.

IN diurnis intestinorum leuitatibus, ructus acidus acce-
dens, qui prius non erat, signum bonum. **II.** Quibus na-
res natura humidiores, & genitura humidior, morbosius sani
sunt: quibus vero vice versa, salubrius. **III.** In longis in-
testinorum leuitatibus, cibi fastidium malum, & cū febre pe-
ius. **IIII.** Vlcera circumglabra maligna sunt. **V.** Dolo-
res in lateribus, & in pectoribus, & in aliis partibus, an mul-
tum differunt, considerandū est. **VI.** Rhenum affectio-
nes, & quæ circa vesicam consistunt, operose sanantur in se-
nibus. **VII.** Dolores circa ventrem fientes, sublimes qui-
dem leues sunt, non autem sublimes, fortiores. **VIII.** Hy-
dropicis fientia vlcera in corpore, non facile sanantur.

IX. Latæ pustulæ nō valde pruriginosæ sunt. **X.** Ca-
put dolenti & circundolenti, pus, aut aqua, aut sanguis fluēs
per na-

A per nares, aut os, aut aures, soluit morbum. **xi.** Atrabiliaris, & Phreniticis, hæmorrhoides accedentes, bonū. **xii.** Hemorrhoidas sananti diuturnas, si non vna seruata fuerit, periculum est hydropé aut tabem accedere. **xiii.** A singultu detento, sternutationes accedentes soluunt singultum.

xiiii. Ab hydropé detento, vbi aqua in venis ad vètré confluit, solutio fit. **xv.** A profluuiō alui longo correpto, vomitus sponte accedens, soluit alui profluuium. **xvi.**

A pleuritide aut peripneumonia occupato, alui profluuiū accedens, malum. **xvii.** Lippientem alui profluuiō corripit, bonum. **xviii.** Vesicam dissectam habenti, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut tenue aliquod intestinum, aut ventriculum, aut hepar, lethale est. **xix.**

B Vbi dissectum fuerit os, aut cartilago, aut neruus, aut genę pars tenuis, aut præputium, neque augetur, neque coalescit.

xx. Si in ventrem sanguis effusus fuerit præter naturam, necesse est suppurari. **xxi.** In insaniētibus, varicibus aut hæmorrhoidibus accedentibus, insanię solutio fit. **xxii.**

Quicumque dolores ex dorso ad cubitos descendunt, venę sectio soluit. **xxiii.** Si timor & tristitia multo tempore perseveret, atrabiliarium hoc signum est. **xxiiii.** Si ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit.

xxv. Ignem sacrum ab externis intro conuerti, non bonum: ab internis vero extra, bonum. **xxvi.** Quibus in febribus ardentibus tremores facti fuerint, mentis emotio soluit. **xxvii.**

C Quicumque suppurati aut hydropici, secantur aut vruntur, hi pure aut aqua acruata effluēte, omnino moriuntur. **xxviii.** Eunuchi non laborant podagra, neque calui fiunt. **xxix.** Mulier non laborat podagra, si nō menses ipsi defecerint. **xxx.** Puer non laborat podagra, ante veneris vsum. **xxxi.** Oculorū dolores meri potus, aut balneum, aut fomentum, aut venę sectio, aut medicamēti potio soluit. **xxxii.** Balbi ab alui profluuiō longo maxime corripuntur. **xxxiii.** Acidum rictū habentes, nō ita valde pleuriticī fiunt. **xxxiiii.** Quicumque calui sunt, his varices magnę non fiunt. Quibuscūque vero caluis varices accedūt, hi rursus hirsuti fiunt. **xxxv.** Hydropicis tussis accedens, malum. **xxxvi.** Vrinę difficultatem soluit venę sectio. Secare vero oportet internas. **xxxvii.** Ab angina

HIPPOCRATIS LIBER.

detento tumorem fieri foris in collo, bonū est. xxxviii. D

Quibuscunque occulti cancri fiunt, eos non curare meli⁹ est. Si enim curantur, citius moriuntur. Si vero non curētur, multum tempus perdurant. xxxix. Convulsio fit aut à repletionē, aut euacuationē. Sic autem & singultus. xl.

Quibuscūque citra præcordium dolores fiunt, absque inflā-
matione, his febris accedens dolorem soluit. xli. Qui-
buscunque suppuratum quid in corpore existēs, significatio-
nem de se non præbet, his propter puris aut loci crassitudi-
nem, sui significationem nō exhibet. xlii. Morbo regio
laborantibus hepar durum fieri malum est. xliii. Qui-
cunque splenici à dysenteria corripiuntur, his longa accedē-
te dysenteria, aut hydrops accedit, aut intestinorum leuitas,
& pereūt. xliiii. Quibuscūque ex vrinae stillicidio vol-
uulus accedit, hi in septem diebus pereunt, si non febre ac-
cedente vrina satis fluxerit. xlv. Vlcera quæcunque an-
nua fiunt, aut diutius tempore durant, necesse est os absce-
dere, & cicatrices cauas fieri. xlvi. Quicunq; gibbosi ex
anhelatione, aut tussi fiunt, ante pubertatem pereunt.

xlvii. Quibuscunque venæ sectio, aut medicamētum
conducit, his vere venam secare, aut medicamentum purgās
exhibere conuenit. xlviii. Splenici dysenteria acce-
dens, bonum. xlix. Quicunque podagrici morbi fiunt,
hi sedata inflammatione, in quadraginta dieb⁹ restituntur.

l. Quibus cerebrum dissectum fuerit, his necesse est fe-
brem, & bilis vomitum accedere. li. Quibuscunque sanis F
derepente dolores fiunt in capite, & statim voce intercepta
iacent, ac stertunt, in septem diebus pereunt, si non febris ap-
prehendat. lii. Considerare vero oportet etiam sub ocu-
lis apparitiones in somnis. Si enim albæ partis quid subap-
paruerit, non commissis palpebris, si id nō ex alui profusio,
aut medicamenti porione fuerit, malum signum & valde le-
thale est. liii. Desipientia cum risu quidem fētes, secu-
riores sunt: cum studio vero serio, periculosiores. liiii. In
acutis affectionibus, quæ cum febre fiunt, luctuosa respira-
tiones, malum. lv. Podagricæ affectiones vere & autū-
no vt plurimum mouentur. lvi. Atrabiliaris morbis pe-
riculosi humorum à loco ad locum decubitus, aut syderatio-
nem corporis, aut convulsionem, aut insaniam, aut carita-
tem fa-

Atem significant. LVII. Syderationes vero maxime fiunt, ætate à quadragesimo anno vsque ad sexagesimum. LVIII.

Si omentum exciderit, necesse est putrefieri. LIX. Quibuscumque à coxendicum morbo vexatis, coxa excidit, & rursum incidit, his mucii accedunt. LX. Quibuscumque à coxendicum morbo diuturno vexatis, coxa excidit, his crus tabescit, & claudicant, si non vsti fuerint.

SECTIO SEPTIMA.

In acutis morbis frigiditas extremarum partium, malum. I. Ex osse ægrotante, caro liuida, malum. II. Ex vomitu singultus, & oculi rubicundi, malum. III. Ex sudore horror, nõ bonum. IV. Ex infania, dysenteria, aut hydrodrops, aut mentis emotio, bonum. V. In morbo diuturno cibi fastidium, & meracæ alui egestionis, malum. VI. Ex multo potu rigor, & delirium, malum. VII. Ex tuberculi intus ruptione, exolutio, vomitus, & animi deliquiũ fit. VIII. Ex sanguinis fluxu delirium, aut etiam conuulsiõ, malum. IX. Ex volubulo vomitus, aut singultus, aut conuulsiõ, aut delirium, malum. X. Ex pleuritide peripneumonia, malum. XI. Ex peripneumonia phrenitis, malum. XII. Ex ardoribus vehementibus conuulsiõ, aut distentio, malum. XIII. Ex plaga in caput, stupor, aut deliriũ, malum. XIV. Ex sanguinis sputo, puris sputum, malum. XV. Ex puris sputo, tabes, & fluxus, malum. Postquã vero sputum supprimitur, moriuntur. XVI. Ex hepatis inflammatione singultus, malum. XVII. Ex vigilia conuulsiõ, aut delirium, malum. XVIII. Ex ossis denudatione, ignis sacer. XIX. Ex igne sacro, putrefactio, aut suppuratio. XX. Ex forti pulsu in vlceribus, sanguinis eruptio. XXI. Ex dolore diuturno partium circa ventrem, suppuratio. XXII. Ex meracæ alui egestionis, dysenteria. XXIII. Ex ossis dissectione delirium, si ad vacuum vsque processerit. XXIV. Ex medicamenti potione conuulsiõ, lethale. XXV. Ex dolore forti partium circa venter, frigiditas extremarum partium, malum. XXVI. Mulieri vterum gerenti, tenesmus accedens abortire facit. XXVII. Quodcumque os præfectum fuerit, aut nervus in corpore, neque augetur, neque coalescit. XXVIII. Si à pituita alba

Vv ij detento,

HIPPOCRATIS LIBER

detento, vehemens alui profluuium accedat, soluit morbum. D

xxx. Quibuscunque spumosa alui egestionis sunt in alui profluuiis, his de capite pituita defluit. xxxi. Quibuscunque febricitantibus, in vrinis subsidentia crassiores polenta partes referentes fiunt, longum morbum significant.

xxxii. Quibus vero biliosa subsidentia, ab initio tenues, acutum morbum significant. xxxiii. Quibuscunque disparata vrinae sunt, his vehemens turbatio in corpore est. xxxiiii. Quibus in vrinis bullae superstant, rhenum affectiones significant, & morbum fore longum. xxxv.

Quibus pingue est id quod superstat, & acruatum, his rhenum affectiones, easque acutas significat. xxxvi. Quibus vero iam nephriticis ex rhenibus affectis praedicta signa accidunt, doloresque circa musculos spinales fiunt, si quidem circa externos locos fiant, etiam abscessus extrinsecus futuros expecta. Si vero dolores magis circa internos locos fiat, etiam abscessus magis intus fore expecta. xxxvii. Quicunque sanguinem vomunt, sine febre quidem, salutare est: verum cum febre, malum. Perfrigerantibus autem & adstringentibus curare oportet. xxxviii. Defluxiones in ventrem supernum, in viginti diebus suppurantur. xxxix.

Si quis sanguinem mingat, & grumos, & vrinae stillicidium habeat, & dolor incidat in ani ac scorti intercapedinem, & imum ventrem ac pectinem, partes circa vesicam aegrotare significat. xl. Si lingua derepente impotens fiat, aut aliqua corporis pars syderata, atrabiliarium tale existit. xli. Si senioribus nimium purgatis singultus accedat, non bonum est. xlii. Si febris non a bile habeat, aqua multa calida in caput affusa, febris solutio fit. xliii.

Mulier ambidextra non est. xliiii. Quicunque suppurati vruntur, si quidem pus purum fluat & album, euadunt. Si vero subcruentum, & carnosum, ac graueolens, pereunt. xlv. Quicunque hepar suppuratum vruntur, si quidem pus purum fluat, & album, superstites euadunt. In tunica enim pus his inest. Si vero velut amurca fluat, pereunt. xlvi. In doloribus oculorum, vbi merum bibendum dedisti, & multa calida lauisti, venam secato. xlvii.

Hydropicum si tussis vexet, desperatus est. xlviii.

Vrinae stillicidium, & vrinae difficultatem, vini potus &

venae

A venæ sectio soluit. Secare vero oportet internas. XLIX.

Ab angina detento, tumor & rubor in pectore accedens, bonum. Foras enim vertitur morbus. L. Quibuscunque corruptum fuerit cerebrum, in tribus diebus pereunt. Si vero has effugerint, sani fiunt. LI. Sternutatio fit ex capite, percalescente cerebro, aut vacuo quod est in capite perhumefcente. Aer enim qui intus est, foras erumpit. Strepitum vero edit, quia transitus est ipsi per angustum. LII.

Quibuscunque hepar circuncirca dolet, his febris accedens soluit dolorem. LIII. Quibuscunque sanguinem de venis auferre conducit, his vere venam secare conuenit. LIII.

B LIII. Quibus inter ventrem & septum transversum pituita conclusa est, & dolorem exhibet, non habens exitum ad neutrum ventrem, his per venas ad vesicam conuersa pituita, morbi solutio fit. LV. Quibus hepar aqua repletum, ad omentum eruperit, his venter aqua impletur, & moriuntur. LVI. Anxietatem, oscitationem, horrorem, vinum æquali mensura aquæ ammixta potum soluit. LVII.

Quibus in vrinaria fistula tubercula fiunt, his suppuratione facta & eruptione, soluitur dolor. LVIII. Quibus cerebrum concussum fuerit ex aliqua causa, eos statim voce priuari necesse est. LIX. Corporibus humidis carnes habentibus, famem inducere oportet. fames enim corpora siccat. LX. Vbi in toto corpore mutationes, & corpus perfrigeratur, & rursus calefcit, aut color alius ex alio mutatur, longitudinem morbi significat. LXI. Sudor multus, calidus aut frigidus, semper fluens, humorem abducere oportere significat, forti quidem superne, debili vero, inferne. LXII. Febres non intermittentes, si per tertiam fortiores fiant, periculosa sunt. Quocunque vero modo intermiserint, sine periculo esse significat. LXIII. Quibus febres longæ sunt, his aut tubercula, aut ad articulos dolores fiunt. LXIII.

C LXIII. Quibus turbercula diutina, aut ad articulos dolores, ex febribus fiunt, hi cibis pluribus vtuntur. LXV. Si quis febricitanti cibum det, quem sano exhibet, sano quidem robur, ægroto vero morbus est. LXVI.

Quæ per vesicam prodeunt inspicere oportet, an qualia sanis prodeunt. Quæ igitur minime similia his sunt, ea morbosiora sunt. Quæ vero similia sanis, ea minime morbosiora.

HIPPOCRATIS LIBER APHORIS.

LXVII. Et quibus alui egestionēs, si stare permiseris, & non moueris, subsistunt veluti ramenta: si paucae fuerint, modicus morbus est: si multae, multus. His confert subpurgare aluum. Si vero non purgata aluo, sorbitiones dederis, laedes. & quanto plures dederis, magis laedes. **LXVIII.** Quibuscunque cruda deorsum secedunt, ex atra bile sunt: si plura, copiosiore: si pauciora pauciore. **LXIX.** Excreationes in febribus non intermittentibus liuidae, & cruentae, & graeolentes, & biliosae, omnes malae sunt. At probe secedentes, bonae, & per aluum, & per vesicam. & ubi sanè quid secedens constiterit non purgatum, malum. **LXX.** Corpora quocunque quis purgare voluerit, fluida facere oportet. Et si quidem sursum, sistere aluum. Si vero deorsum, humectare. **LXXI.** Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, morbus. **LXXII.** In non intermittentibus febribus, si externae quidem partes frigidae fuerint, internae vero ardeant, & febris habeat, lethale est. **LXXIII.** In febre non intermittente, si labium, aut nasus, aut oculus, aut supercilium distorqueatur: aut non videat, aut non audiat, aeger iam debilis existens: quicquid horum fiat, propinqua mors est.

LXXIII. Ex pituita alba, hydrops accedit. **LXXV.** Ab alui profluuium, dysenteria. **LXXVI.** A dysenteria, intestinorum leuitas accedit. **LXXVII.** Ex corruptione, abscessus ossis. **LXXVIII.** Ex sanguinis vomitu, tabes, & puris purgatio sursum. Ex tabe, fluxus ex capite. Ex fluxu, alui profluuium. ex alui profluuium, suppressio purgationis sursum versus. ex suppressione, mors. **LXXIX.** Qualia etiā sint in vesicae ac alui egestionibus, inspicere oportet, & in his quae per carnes excernuntur, & sicubi alibi à natura recedat corpus, si parum, paruum est morbus: si multum, multus: Si vero valde multus sit recessus, lethale hoc est. **LXXX.** Quicumque supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non ita valde sani fiunt. Minus enim periclitantur, quorum naturae, & aetati, morbus affinis fuerit. **LXXXI.** Quibuscunque in aegritudinibus oculi ex voluntate lachrymantur, bonum. Quibus vero citra voluntatem, malum. **LXXXII.** Quibus in febribus quartanis sanguis ex naribus fluxerit, malum est. **LXXXIII.** Sudores in diebus iudicatoriis fientes, vehementes & veloces periculosi sunt, qui expelluntur ex fronte velut guttae, &

A guttae, & aquę salientes, & frigidi valde ac multi. Necessę est enim talem sudorem prodire cum violentia, & doloris excessu, ac expressiõe diuturna. LXXXIII. Ex morbo diuturno, etiam alui defluxus, malum. LXXXV. Quęcunque non sanant medicamenta, ea ferrum sanat. Quę ferrum nõ sanat, ea ignis sanat. Quę ignis non sanat, ea incurabilia putare oportet.

HIPPOCRATIS COI

EPISTOLAE,

Iano Cornario me-
dico physico in-
terprete.

Regi regum magnus Artaxerxes, Peto gaudium.



MOrbus pestilens appellatus, inuasit exercitus nostros: & quum nos sæpe multa fecerimus, nihil adhuc remisit. Quare magnopere, & per omnia tibi à me data dona, te rogo, vt aut aliquid ex natura tua excogitatum, aut aliquam ex arte actionem, aut aliquod alterius viri mederi potentis consilium, celerissime ad nos mittas. Propulsa oro hoc malum. Multa enim anxietas populum corripuit, quę spiritum magnum ac densum habet. Non belligerantes debellamur: quum hostem habeamus bestiam illam ouilia deuastantem. Sauciavit multos: agre curabiles fecit: amara spicula immittit. Consilij inops sum. Non amplius habeo quod cum viris natura prudentibus consultem. Solue hæc omnia, neque nos bono tuo consilio destituas. Vale.

Natus, Regi regum magno Artaxerxe gaudium.
Naturalia auxilia pestilentis morbi popularem grasse-
Vv iij tio-

HIPPOCRATIS

Hippocratis laus.

tionem non soluunt. Qui enim ex natura fiunt morbi: eos ipsa natura iudicans sanat. Qui vero ex populari grassatione: eos ars curat, artificiose iudicans corporum mutationem. Hippocrates autem medicus curat hoc malū. Et genere quidē est Dorienſis: ex ciuitate vero Co, patre Heraclida, qui filius fuit Hippocratis, qui Gnoſidici, qui Nebri, qui Soſtrati, qui Theodori, qui Cleomittada, qui Chriſamidis. Hic diuina natura præditus eſt, & ex paruis ac vulgarib⁹, ad magna ac artiſicioſa, medicinā euexit. Eſt igitur diuin⁹ Hippocrates nonus quidem à Criſamide rege: decimus autem & octauus ab Aſculapio: vigēſimus vero à Ioue: ex matre vero Praxithea Phanaretis filia, ex familia Heraclidarum. Quare ex utroque ſemine à diis ortum habet diuinus Hippocrates: ut qui à patre quidem Aſclepiades eſt, à matre vero Heraclides. Didicit autem artem, tum à patre Heraclida, tum ab auo Hippocrate. Verum ab his quidem primum, uelut veriſimile eſt, in re medica initiatus eſt, quantum ſanè credibile eſt hos nouiſſe. Vniuerſam vero artem ipſe ſciſum docuit, diuina natura uſus, & in tantum animi induſtria progenitores tranſgreſſus, quantum etiam artis præſtantia eoſdem ſuperauit. Tollit autem non beſtiarum genus, ſed ferorum ac agreſtium morborum, per magnam terræ ac maris partem Aſculapij auxilia, quemadmodum Triptolemus Cereris ſemina diſpergens. Proinde iuſtiſſime in multis terræ locis diuinos honores etiam ipſe conſequutus eſt, & iſſdem donariis cum Hercule & Aſculapio ab Athenienſibus dignus factus eſt. Hunc ipſum accerſe, & auri atque argenti quantum uoluerit, ipſi dare iube. Hic enim non vnum modum curationis huius morbi nouit. Hic eſt ſanitatis pater, hic ſeruator: hic dolorum curator. In ſumma, hic diuinæ ſcientiæ princeps eſt. Vale.

Rex regum magnus Artaxerxes, Hyſtandi Heliceſpenti præſello.

Hippocratis medici Coi ab Aſculapio originem ducentis, gloria artis etiam ad me peruenit. Dato igitur ipſi auri quantum uoluerit, & reliqua abunde, quibus opus habet, & ipſum ad nos mittito. Nam optimatibus Perſarum æqualis erit. Et ſi quis alius bonus uir eſt in Europa, cum do-
mus

Amus regiae amicum facito, nihil diuitiis parcens. Viros enim inuenire, qui consilio praestent, non est facile. Vale.

Hystanis Hellesponti praefectus, Hippocrati ex Aesculapiadis prognato gaudium.

Magnus rex Artaxerxes te opus habet, & misit ad nos praefectos, iubens tibi argentum & aurum, & reliqua quibus opus habes, & quaecunque voles, dare, & breui ad te mittere. Fore enim te optimatibus Persarum aequalem. Tu itaque cito adsis. Vale.

Hippocrates medicus, Hystanidi Hellesponti praefecto gaudium.

Ad epistolam quam misisti, à Rege venisse adserens, remitte Regi quae dico, quam celerrime scribens: Quod & visu, & vestitu, & domo, & omni ad vitam sufficienti opulentia fruimur. Persarum autem diuitiis uti, fas mihi non est: neque barbaros homines à morbis liberare, qui hostes sunt Graecorum. Vale.

Hippocrates Demetris sanitatem.

Persarum rex nos accersuit, ignarus quod apud me maior est sapientiae ratio, quam auri. Vale.

C*Regi regum meo magno domino Artaxerxae, Hystanis Hellesponti praefectus gaudium.*

Quam misisti epistolam, iubens demittere ad Hippocratem Coum ab Aesculapio originem ducentem, demisi. Sed & ab ipso responsum tuli, quod scriptum tradidit, & ad domum tuam transmittere iussit. Itaque eius latorem ac nuncium Gymnasben Dieutychem ad te misi. Vale.

Rex regum magnus Artaxerxes Cois haec dicit.

Date meis nunciis Hippocratem Medicum malignis moribus praeditum, & in me, & in Persas petulanter se gerentem. Sin minus, cognosceris, etiam primi peccati poenam vos daturos esse. Urbem enim vestram deuastatam, & insulam distractam, in pelagus conuertam, ut in posterum tempus ne-

mo

HIPPOCRATIS

mo sciat, an in hoc loco fuerit insula, aut vrbs Cos.

D

Coorum responsum.

VIsu est populo, respondere nunciis ab Artaxerxe missis. Coi nihil indignum facient, neq; Merope, neq; Hercule, neq; Aesculapio. Quapropter omnes ciues non dabunt Hippocratem, etiam si pessima morte sint interituri. Nam quum Darius & Xerxes epistolas scripserint, & terram ac aquam à patribus nostris petuerint, populus nō dedit: quum eos ipsos se impetentes, similiter velut alios homines, mortales esse videret. Et nunc idem responsum dat. A Cois discedite: quoniam Hippocratem in manus vestras nō dant. Renunciate igitur ipsi vos nuncij, quod neque dei ipsi, nostri negligentes erunt.

E

Sensus populusq; Abderitarum Hippocrati gaudium.

NVnc maxime vrbi nostrę in periculo versatur vir noster, ō Hippocrates, qui & præsenti tempore & futuro semper gloria vrbi sperabatur. Neq; nunc, ō vos dei omnes, nobis inuideat. hic præ multa quæ detinet ipsum sapientia ægrotat, vt timor nō vulgaris sit, si Democritus mēte motus fuerit, reuera vrbem nostram Abderitarum pessum ituram esse. Etenim oblitus omnium, & primum sui ipsius, vigilans & noctu & interdiu, & singula parua ac magna deridēs, & totam vitam nihil esse putans, vitam transigit. Ducit aliquis vxorem, alius mercaturam exercet, alius concionatur, alius imperat, alius legatum agit, eligitur, abrogatur, ægrotat, vulneratur, moritur. At hic ridet omnia, dum alios mœstos ac tristes, alios gaudentes videt. Quin & de his, quæ apud inferos sunt, hic vir perscrutatur, & hæc scribit. Et idolis aerem plenum esse dicit. Et volucrum voces intentis auribus explorat. Et sepe noctu exsurgens, solus cantilenas sensim canenti similis est. Et se aliquando in rerum immensitatem proficisci dicit, & Democritos esse similes sibi ipsi innumerabiles. Et corpus vnā cum mente corrūpens viuit. hæc timemus ō Hippocrates, ob hæc perturbati sumus. Quapropter nos serua, & patriæ nostræ consulturus cito adsis: neque aos contempseris. Nam neque ita viles sumus: & in nobis testimonium situm est. Ob ipsum enim conseruatum, & gloriam, & pecuni-

F

as, &

▲ as, & doctrinæ famam consequeris : quanquam doctrinæ ratio multo potior apud te est, quàm fortunæ. Attamen & huius bona multa ac luculenta tibi à vobis obuenient. Etenim animæ Democriti gratia, etiam si vrbs aurum esset, non nostræ voluntari responderet, aut quacunque tandem re illi carendum esset. Leges nostras putamus ægrotare ò Hippocrates, leges præuicari. Adsis optime vir, curaturus virum insignem. Non medicus sed conditor, sacrationem tota Ionia murum nobis circūdabis. Ciuitatem, non virum curabis : & Senatum ægrotantem, & ne claudatur periclitantē, aperies. Ipse legislator, ipse iudex, ipse princeps, ipse seruator, & horū artifex aduenies. Ob hæc te expectamus ò Hippocrates, atque hæc etiā fient vbi veneris. Vna ciuitas nō ignobilis, imò tota Græcia rogat te, serua corpus sapientiæ. Quin potius ipsam apud te legationem agere puta doctrinā, ab hac præuaricatione liberari supplicantem. Cognata equidem res est omnibus, velut apparet, sapientiæ. Verum his qui propius ipsam complexi sunt, velut nobis, etiam longe amplius. Et, sicut probe nosti, gratificaberis etiam futuro seculo, si non destitueris Democritum propter veritatem, cuius primas se laturum esse sperat. Tu enim & genere, & arte cōiunctus es Aesculapio. Hic vero Hercules est ex fratre nepos. A quo est & Abderus, quemadmodum omnino audiisti, cuius cognomē vrbs nostra refert. Quare etiam illi grata fuerit Democriti sanatio. Quum igitur videas ò Hippocrates, & populum, & virum insignem, ad stupiditatem diffluentem : festina, rogamus, ad nos. Hecū vt etiam bona redundantia morbi existunt. Quantum enim Democritus ad summam sapientiam generose peruenit, tantum nunc pariter periclitatur, ne mentis stupore & stoliditate affligatur. At reliquum vulgus Abderitarum, quod mansit absque eruditione, cōmunem sanæ sensum habet. Immo nunc prudentiores sunt ad sapientis morbum iudicandum, qui prius desipuerunt. Adsis igitur cum Aesculapio patre. Adsis cum Hercules filia Epione. Adsis cum Aesculapij filiis, qui ad Ilium militarunt. Adsis nunc Pronias adferens morbi medelas. Nunc terra radicibus, & herbis, & auxiliaribus floribus, insanixque medicamentis fecunda est. Ferme igitur nunquam fertilius producat, neque terra, neque montium cacumina, quàm nunc proferunt

HIPPOCRATIS

proferunt ea, quæ pertinent ad Democriti sanitatem. Vale. D

Hippocrates Senatui populoque Abderitarum

rum gaudium.

Cuius vester Ameleffagoras venit in Co., & erat tunc in illa die Virgæ assumptio, & annua festiuitas, ac publicus, velut nostis, conuentus, & pompa sumptuosa fiebat, quam mos est eos, qui deo dicati sunt, ad Cyparissum deducere. Quandoquidem autem & ex verbis, & ex aspectu, Ameleffagoras festinare videbatur, credens, velut erat, rem ipsam vrgeret: epistolam vestram legi, & admiratus sum quod obvnum hominem, velut si vnus homo esset ipsa ciuitas, turbati estis. Et beati profecto sunt populi, qui sciunt bonos viros sua esse munimenta, & non turres, neque muros, sed sapientium virorum sapientia consilia. Ego vero, qui credo artes quidem esse Deorum dona, homines autem naturæ opera: (& ne ægre feratis viri Abderitæ) non vos puto, sed ipsam naturam me vocare, ad conseruandum ipsius opus, quod periclitatur, ne præ morbo collabatur. Quare præ vobis ego nunc, naturæ ac Diis obediens, festino ægrotatem Democritum sanare: si quidem sanè & hoc morbus est, & non potius error vobis tenebras of-fundit: id quod opto, atque vtinam sit hoc vberius vestræ beneuolentiæ signum, quod etiam ad suspicionem turbamini. Argentum autem mihi venienti, neque natura, neque Deus promittere poterit. Quare neque vos viri Abderitæ cogariss sed liberæ artis etiam opera libera esse finatis. Qui vero mercedem capiunt, hi scientias seruire cogunt, velut captiuas facientes ipsas ex priore libertate. Deinde, velut verisimile est, mentiri etiam poterint, velut de magno morbo: & negarint, velut de paruo: & polliciti non venerint, & rursus venerint non vocati. Misera est profecto humana vita: quoniam per totam ipsam intolerabilis auaricia, velut hybernus ventus, distributa est ac penetrauit. Ad quâ vtinam potius omnes medici conuenissent, quò grauiorem insaniam morbum curarent: quoniam quum morbus sit, & affligat, etiam laudatur. Ego vero arbitror etiam animæ morbos omnes vehementes esse insanias, quæ opinioniones quasdam ac imaginationes rationi inducunt. A quibus qui per virtutem depurgatus est, sanus euadit. Quod si ego omnino ditescere voluisssem, viri Abderitæ, non vtiq; decem talentorū gratia ad vos proficisceretur: sed ad

Magnum

- A** Magnū accessissem Persarum regem, vbi totæ ciuitates humanis opibus refertæ mihi obtigissent. sanassem autem illic ipsorum pestem. Verum denegaui, inimicam Græciæ regionem à malo morbo me velle liberare. Et ego, quantum in me fuisset, Barbaros expugnassem. Habuissem autē ignominiam ipsas à rege diuitias, & opulentiam patriæ inimicam. Hęc vero mihi adfuissent, velut ei qui vrbium Græciæ deuastator esset. Non sunt diuitiæ, vndiquaque lucrari. Magna enim sunt sacra virtutis, quæ à iustitia non occultantur, sed manifesta existunt. Aut non equale peccatum esse putatis, hostes seruare, & amicos mercede sanare? At non hoc modo se res nostræ habent, ô Abderitæ. Non capio fructum ex morbis, neque libenter audiui Democritum mente motum esse. **Qui** siue sanus est, amicus est: siue ægrotat, curatus magis amicus erit. Audio autem ipsum granibus ac solidis moribus præditum esse, & vrbis vestræ ornamentum. Valete.

Hippocrates Philopœmeni gaudium.

- L** Egati, qui vrbis epistolam mihi reddiderūt, etiam tuam tradiderunt. Et valde gauisus sum, & hospitium, & reliquum victum te promittente. Veniemus autem bona fortuna, & meliore spe, velut arbitramur, accedemus, prout in literis est declaratum: quum non insaniam, sed quandam excellentem mentis sanitatem vir ille declaret, dum neque liberorum, neque vxoris, neque cognatorum, neque rei familiaris, neque omnino alicuius curam gerit: sed & diu & noctu apud **C** seipsum consistit, & priuatim vitam degit, plerunque in antris & solitudinibus, aut sub arborum vmbis, aut in mollibus herbis, aut apud frequentia aquarum fluentia. Contingunt igitur talia plerunque atra bile percitis. Taciturni enim aliquando sunt, & solitarij, ac deserti amantes, & rerum familiarium conspectum auersantur, alienum putantes. Nec vero dissimile vero est, etiā his qui circa disciplinas versantur ab vna erga sapientiam adfectione, alias curas exclusas esse. Quemadmodum enim famuli ac ancillæ in domibus tumultuantes, & seditionem agentes, vbi derepente ipsis hera comparuit, consternati conquiescunt: sic etiam reliquæ in anima cupiditates malorum sunt hominibus ministræ. Postquam autem sapientiæ conspectus seipsum ingesserit: reliquæ affectiones velut famulæ discedunt. Non autem omnino insani antra & quietem

HIPPOCRATIS

quietem expetunt: sed etiam hi qui humana negocia con-
 temnunt, ob tranquillitatis cupiditatem. Quum enim mens
 ab externis curis vexata, corpus reficere voluerit, tunc cito ip-
 sum quieti tradit. Deinde recta exurgens, circuncirca verita-
 tis regionem collustrat, in qua non est pater, non mater, non
 vxor, non liberi, non frater, non cognati, non famuli, non for-
 tuna, non omnino quicquam ex his, quæ tumultum inducunt.
 Omnia autem perturbantia, exclusa stant præ timore: & ne-
 que appropinquare audent præ reuerentia eorum, quæ isthic
 habitant. Habitant autem illam regionem, & artes, & virtu-
 tes omnis generis, & Dei, & dæmones, & senatus, & consilia.
 Et magnus polus in illa regione, stellis multum mobilibus
 coronatus est: in quam fortassis etiam Democritus præ sa-
 pientia transmigravit. Deinde quum non videat amplius eos
 qui sunt in vrbe, utpote procul profectus: insanix morbo la-
 borare putatur, propter solitudinis amorem. Student autem
 Abderitæ argenti amorem & studium detegere, & in se ma-
 nifestum facere, eo quod Democritum non intelligunt. At
 tu hospitium nobis ô amice Philopœmen præpara. Non enim
 volo perturbatæ vrbi molestiam exhibere, quum veterem te
 proprium hospitem, velut nosti, habeam. Vale.

Hippocrates Dionysio gaudium.

A Ut in Halicarnasso me expecta, aut ipse ad me venire ô
 amice festina. Per summam enim necessitatem abeundum
 est mihi in Abderam, Democriti causa, ad quæ ægrotantem
 vrbs me accersuit. Ceterum admiranda est hominum, ô Diony-
 si, per consensum adfectio: velut vna anima cum ciue coægrotat.
 Quare mihi videtur etiam ipsi curatione opus habere. Ego ve-
 ro neque morbum ipsum esse puto, sed immodicam doctrinam:
 quæ reuera non est immodica, sed ab idiotis putatur. Nam nun-
 quam nocua est virtus immodica. Excellentia vero, morbi opi-
 nione de se prebet, propter iudicantium imperitiâ. Vnusquisque
 enim ex his, quæ ipse non habet, iudicat, id quod in alio abun-
 dat, superfluum esse. Sic sanè etiam timidus fortitudinè immo-
 destiam putat, & avarus magnanimitatē. Et omnis defectus,
 virtutis moderationem excedere putatur. Illum igitur ubi vi-
 derimus, cum prænotione hinc contingente, & ubi sermones
 eius audierimus: melius cognoscemus. Tu vero, ô Dionysi,
 studio habe ut ipse accedas. Volo enim te in patria mea comorari

A rari donec rediero: quo & rerū nostrarū, & imprimis vr̄bis nostræ curā geras. Nam haud scio quomodo ex casu contigit, vt saluber sit annus, & pristinam naturam habeat. Quare neque multi infestabunt morbi: attamen venito. Inhabitabis autem meam domum nimis quā opportunam, nimirum quum & vxor apud parētes maneat propter meam profectiōem. Attamen & illius res inspecta, quo pudice degat, & non ob viri absentiam, alios viros approbet. Honeſta equidem ab initio fuit, & parentes bonos habuit. Patrem autē mirifice virilem, & malos valde odio habentem, egregie senem. Attamen semper opus habet mulier moderatore. Habet animā à natura in se lasciuiam: quæ, nisi quotidie refecetur, velut arbores in materia multæ effusionem, exuberat. Ego vero amicū parentibus diligentiorē puto ad vxorem custodiendam. Non enim, velut illis, etiam huic cohabitat beneuolentiæ adfectio, per quam sæpe vmbra admonitioni obtenditur. In omnibus autem rebus prudentior est alienitas ab adfectione, vt quæ minime à beneuolentiā infringatur. Vale.

Hippocrates Damageto gaudium.

Q uum apud te Rhodi essem Damagete, vidi nanem illā, cui Solis inscriptio erat, penitus pulchram, & in puppi probe instructam, & sufficientem carinam habentem. Habebat & transtra multa. Et tu laudabas etiam in ipsa nauigandi præstantiam, quod velox esset, & tuta, & ad interuiendum artificiosa. Et insuper prædicabas probū in ipsa nauigationis cursum. Hanc mitte nobis: verū si fieri potest, non remis, sed alis ad remigium instructam. Viget enim res ipsa & amice, vt valde cito in Abderam nauigem. Volo enim agrotantem curare urbem, propter vnum agrotantem Democritum, si vnquam viri fama ad aures tuas peruenit. De hoc patria dicit, quod insania adfectus sit. Ego autem cupio, immo magis opto, non reuera ipsum insanire, sed illos ita putare. Ridet, inquit, semper, & ridere non cessat in omnibus negotiis. Et hoc ipsis insaniæ signum esse videtur. Quare tuis in Rhodo amicis dicito, vt semper moderate se gerant, & non multum rideant, neque multum tristes sint: sed inter ambo hæc modum teneant: vt aliis comis esse videaris, aliis sollicitus, de virtute cogitans. Est profecto mali quiddam dum ad singula ille ridet. Si enim immodestia malū est: ea sanè perpe-

tua

HIPPOCRATIS

tua longe peior est. Et dicam sanè ad ipsum: Democrite, & si quis ægrotat, & occiditur, & mortuus est, & obsidetur, & quoduis malum ingruit: singula quæ fiunt, materiam risus tibi præbent. Non autè repugnas deo, si, quum duo sint in mundo, Gaudium & Tristitia, tu alterum ipsorum eiecisti? Beatus profecto fueris, (verum impossibile est) si neque mater tibi ægrotat, neque pater, neq; postea liberi, aut vxor, aut amicus, sed propter tuum risum conseruantur, penitus felix es. At si, dum ægrotant, rides: dum moriuntur, gaudes: & si quid mali audieris, exilaris: pessimus es ô Democrite, & procul sanè à sapientia. Si vero putas hæc ipsa neque mala esse, certe atrabile percitus es Democrite, periclitās ne & ipse Abderita sis: prudentior autem sit ipsa ciuitas. Cæterum de his exactius illic dicemus Damagete. At vero nauis etiam hoc tempus, quo hæc tibi scribo, remoratur. Vale.

Hippocrates Philopœmeni gaudium.

COgitans ac sollicitus de Democrito, illa ipsa nocte dormiens, sub ipsius auroræ initium somnium mihi oblatum habui, ex quo puto nihil valde periculosi fore. Mirabiliter enim expergefactus sum. Videbar mihi videre Aesculapium ipsum coram, & iam ad ipsas Abderitarum portas adeamus. Aesculāpius autem non vt imagines eum aliās ostendunt, mitis ac blandus apparebat: sed habitu concitato, & aspectu horrendo. Sequebantur autem ipsum dracones reptilium generis immanes, longum tractum ducentes, & horribile quiddam velut in desertis ac saltibus subsibilantes. Sequebantur & socij, pyxides medicamentarias probe obsignatas gestantes. Deinde porrexit mihi manum deus: quam vbi libentissime apprehendissem, rogabam vt simul mecum pergeret, & ne me in medendo destitueret. Verum is: Nihil, inquit, in præsens me opus habes: sed hæc immortalium ac mortalium communis dea te peregrinum deducet. Et ego conuersus video mulierem pulchram ac magnam, simpliciter ornata, splendidam, cuius oculorum circuli puro lumine micabant, vt stellarum fulgorem putares. Et deus quidè disparuit. Mulier vero illa apprehensum me manu, lento gradu benigne per urbem ducebat. Et vbi prope domum essemus, in qua hospitium mihi paratum esse putabam, velut spectrum disparuit, hoc saltem dicens: Cras te apud Democritum deprehendam.

Aprehendam. Cum vero iam se illa cōuerteret: Rogo, inquam, optima fœmina, quænam es, & quo nomine vocari debes? Veritas, inquit illa. Cæterum quem accedentem vides (& deridente altera quædam mihi apparuit) neque ipsa mala videtur, audacior autem aspectu & concitator: Opinio, inquit, appellatur, & habitat apud Abderitas. Ego igitur vbi de somno surrexissem, mihi ipsi somnium interpretatus sum, quod non indigeret medico Democritus, quando sanè ipse medendi Deus discessisset, velut qui medendi occasionem & materiam non haberet. Sed ipsa quidem veritas, quod Democritus sanus sit, apud Democritum manet. Opinio vero, quod Democritus ægrotet, reuera apud Abderitas habitat. Atque hæc vera esse, mi Philopœmen, credo, & sunt sanè. Et non contemno somnia, maxime vbi etiam ordinem conseruant. Medicina autem & vaticinatio valde cognatæ sunt: quandoquidem & pater ambarum artium vnus est Apollo progenitor noster, & præsentis & futuros morbos prædicens, & ægrotos & ægotaturos sanans. Vale.

Hippocrates Crateuæ gaudium.

Scio te, ó amice, optimum radicifecam esse, & propter tuam ipsius exercitationem, & propter progenitorum gloriam, adeo vt in hac facultate Crateuæ proauo minime cedas. Proinde nunc, si vnquam aliàs, herbas collige, quot & quales poteris: vrget enim necessitas: atque has mihi trans mitte, ad virum toti ciuitati comparandum, Abderitam quidem verum Democritum. Aegrotare enim ipsum dicunt, & purgatione valde opus habere, vt qui insania sit correptus. Non vtemur fortassis medicamentis, quemadmodum etiam credo. Attamen vndiquaque instructum esse oportet. At vero rem herbariam apud te sæpe admiratus sum, quemadmodum etiam vniuersorum naturam ac constitutionem, & sacerrimum terræ fundamentum, ex qua animalia, & plantæ, & alimenta, & medicamenta, & fortuna, & ipsæ diuitiæ exoriuntur. Neque enim aliàs haberet vbi consisteret Auaricia, neque sanè Abderitiæ nunc decem talentis inescassent me, pro medico mercenarium declarantes. Si vero possis Crateua amarum auariciæ radicem excindere, vt nullæ ipsius reliquiæ restent: probe scito, quod hominum vnà cum corporibus etiam animas ægotantes purgassemus. At hæc quidem vota sunt. Tu

Xr vero,

HIPPOCRATIS

vero, quod fieri potest, nobis mótanas maxime & in altis col- D
 libus nascentes herbas radicitus refeca. Sunt enim aquosiori-
 bus solidiores & aciores, propter terræ densitatem, & aeris
 tenuitatem. Nam quod attrahunt, frigidius est. Conare ta-
 men vt etiam de his quæ circa stagna nascuntur, & de palu-
 stribus, & fluuiatilibus, aut fontanis flores colligas: quas fa-
 nè debiles, & exsolutas ac dulcis succi esse scio. Omnia au-
 tem medicamenta quæ succi & liquores fluidi sunt, in vitreis
 vasis ferantur: quæ vero folia, aut flores, aut radices sunt in
 fictilibus nouis probe obturatis: vt ne ventis perflata, medi-
 camenti vigorem velut in animi deliquium collapsa, amittât.
 Cæterum statim nobis hæc mistito. Nam & tempus anni con-
 gruum est, & necessitas dictæ infantiæ vrget. Ab omni equi- E
 dem arte aliena res est dilatio, verum maxime à Medicîna, in
 qua dilatio est animæ periculum. Curationum vero animæ
 sunt temporum opportunitates, quarum obseruatio finis est.
 Spero quidem sanum esse Democritû, etiam citra medelam.
 Si vero aliquis error naturæ, aut temporis, aut alterius alicuius
 causæ contingat: multa enim nos qui mortales sumus, la-
 tent, vrpote non omnino per veritatem corroboratos: ad
 id quod obscurum est, omnem vim congregatam esse oportet.
 Non enim contentus est is, qui in periculo versatur, his
 quæ possumus: sed concupiscit etiam ea, quæ non possumus.
 Et fermè semper ad duos fines militamus, alterum hominis,
 alterum artis. Quorum alter obscurus est, alter scientiæ de-
 terminatus. Opus est autem in vtrisque his etiam fortuna. In- F
 certa enim est coniectura eorum, qui in purgationibus caute
 procedunt. Nam & stomachi adflictionem veremur, & medi-
 cationis congruentiam, ad naturâ ignotam coniectamus. Nô
 enim vna & eadem est omnium natura, & aliud semper sibi ipsi
 decernens adsimilat ac familiare facit. Aliquâdo vero totum
 perdit. Sed & herbis multa reptilia venenum immittunt, &
 hiatu suo internæ ipsarum teneritudinî adflictionem pro au-
 xilio inspirant. Et huius rei ignorantia erit, nisi sanè nota ali-
 qua, aut macula, aut odor ferus & grauis rei factæ indicatio-
 nem fecerit. Deinde ipsa ars, propter fortunæ casum, à recte
 faciendi proposito aberrat. Stabiliiores autè semper sunt pur-
 gationes per veratrum, quibus etiâ Melampus in Proeti filia-
 bus, & Anticyreus in Hercule vsi esse narrantur. Minime ve- to vte-

Aro vtemur nos vllō aliquo ex his in Democrito: sed contigerit opto illi sapientia, efficacissimorum ac medicatissimorum pharmacorum finis. Vale.

Hippocrates Damagete gaudium.

Hoc erat illud Damagete, quod cōiectabamus: non insanit Democritus, sed super omnia sapit, & nos sapientiores effecit, & per nos omnes homines. Remissi autem tibi amice reuera Aesculapeam nauem: cui cum solis signo etiam sanitatis insigne apponito. Nam reuera secundo numine vela fecit: & illa die in Abderam nauigauit, qua scripserā ipsis, me peruenturum esse. Omnes igitur ante portas congregatos inuenimus, nos, velut verisimile est, expectātes, nō viros solum, sed etiā mulieres: insuperq; senes & pueros, per deos, **B**tristes, itēque infantes. Atque hi quidem sic habebāt, velut ob Democritum insanientem. Ille vero sincere tunc in philosophando excelebat. Postquā autem me viderent, visi sunt mihi paululum ad seiplos rediisse, & bonas spes ostentabant. At Philopœmē me ad hospitium ducere gestiebat, & hoc ab illis comprobabatur. Ego vero, o viri Abderite, inquam, nullū mihi maius opere precium est, quā Democritum videre. Illi vero hoc audito, collaudarunt, & gauisi sunt, & compendie duxerunt me per forum, partim sequentes, partim præcurrentes, alij ab vtraque parte: Serua, clamantes, auxiliare, medicare. Et ego adhortabar ipsos vt confiderent, tanquam fortassis nihil esset mali: aut si quid esset, modicum id esset, & correctu facile, cōfusus horis anni Etesius. Et simul hæc dicēs ibam. **C**Neq; enim procul erant ædes: immo neque tota ciuitas. Aderam igitur: propinqua enim muro erant, & me placidæ eō deducunt. At retro turrim collis erat altus, longis ac densis populis nigris vmbrosus, vnde Democriti habitacula conspiciantur. Et ipse Democritus sub ampla ac humilima platano sedebat, in veste crassa citra humeros desinente solus, discalceatus, super lapidea sede, valde pallidus ac macilentus, promissa barba. Iuxta ipsum vero à dextra, tenuis aqua per decliuem collem decurrens leniter resonabat. Erat autem delubrum quoddam super illum collem, quantum equidem coniectura assequor, Nymphis dicatum, sponte enatis vitibus circūdatum. Ipse vero cum multo ornatu super genibus librum habebat. Sed & alij quidem ex vtraque parte adiacebant. Ac

Xr ij cumulata

HIPPOCRATIS

cumulata erant etiam animalia multa per totum resecta. Et ipse aliquando concitate incumbens scribebat, aliquando quiescebat, diu multumque se continens, & in seipso meditando. Deinde non longe post, his peractis, exsurgens deambulabat, & viscera animalium inspiciebat, & depositis ipsis digressus, rursus desidebat. At Abderitæ circumstantes me tristes, & non procul à lachrymantibus oculos habentes: Vides, inquit, Hippocrates Democriti vitam, quàm insanit, & neque quod vult nouit, neque quod facit. Et quidam ex ipsis adhuc amplius ostendere volens ipsius insaniam, alta voce plorauit instar mulieris ob filij mortem lamentantis. Deinde rursus cum gemitu eiulauit, personam agēs viatoris, qui aliquid ex his quæ portabat, amisit. Verum Democritus cum hæc audisset, partim ridebat, partim cachinnis explodebat, & nihil amplius scribebat. Caput autem frequenter cōcutiebat. Ego vero: Vos, inquā, ô Abderitæ, hic manete: ipse vero vbi & verbis, & corpori viri propior factus fuero, videroque ac audiero, cognoscā adfectionis veritatem. Et hæc loquutus, placide descendebam. Erat autem locus ille asper ac decliuus. Itaque vix me suffulciens penetravi. Cum autem appropinquassem, incidi in ipsum nescio quid, quasi ex numinis adflatu & cum concitatione scriberem. Stabam igitur isthic expectans tempus quietis ipsius. Ipse vero paulo post, intermisso scribendi impetu, & stilo scriptorio deposito, respexit ad me accedentem, & Salue, inquit, hospes. Et ego: Plurimum & tu, inquam, Democrite vir sapientissime. At ille, verecundans arbitror, quod nō nomine me compellasset: Te autem, inquit, quo nomine vocabimus? Ignorantia enim tui nominis, causa erat, cur te hospitem appellarem. Hippocrates, inquam, Medicus est mihi nomen. Is vero: Asclepiadarum, inquit, nobilitas, & magna sapientiæ tuæ in re medica gloria multum celebris, etiam ad nos peruenit. Quid autem negocij, ô amice, te huc perduxit? Immo potius præ omnibus confide. Vides autem quod hæc sedes folijs instrata non est iniucunda, viridis adhuc ac mollis, & ad insidendum lenior inuidiosis fortunæ sellis. Cum autem confedissem, rursus inquit. Priuatumnē, aut publicum negocium agens huc peruenisti? Dic aperte. nam nos, quantum poterimus, adiutuabimus. Et ego: Quæ vera causa est, inquam, tui gratia huc venio, vt sapien-

- A** tem virum conueniam. Habet autem causam patria, cuius legatum ago. Ille vero: Hospitio itaque, inquit, primum vtere nostro. Ego vero per omnia virum pertentans, etiam si iam mihi manifestum esset, ipsum non insanire: Philopœmenem, inquam, nosti ciuem vestrum? Etiam, inquit, valde: Damonis filium dicis, qui habitat apud Hermaidem fontem? Hunc ipsum, inquam, cuius ego sum ex patribus peculiaris amicus. At tu Democrite potiore me hospitio excipe, & primum sanè quid sit hoc, quod hic scribis, dicito. Ille vero ubi paululum se continuisset: De insania, inquit. Et ego, ô rex Iupiter, inquam, opportune profecto scribis contra ciuitatem. At ille: Qualem, inquit, ciuitatem Hippocrates? Ego vero: Nihil, inquam, ô Democrite, sed haud scio quomodo hoc verbum mihi excidit. Verum quid de insania scribis? Quid enim, inquit, aliud quàm quid sit, & quomodo in hominibus generetur, & quomodo alleuetur. Nam animalia hæc, quæ vides, inquit, huius gratia refeco, non quòd odio habeam opera dei, sed bilis naturam ac sedem quarens. Nosti enim quòd hæc furoris hominū causa est, ubi nimium redundarit. In omnibus equidem à natura inest: sed in quibusdam minus, in quibusdam amplius. At immodestia ipsius morbi sunt, ipsa velut materia, aliquando bona, aliquando mala subiacente. Et ego, Per Iouem, inquam ô Democrite, vere hæc & sapienter dicis. Quare beatum te iudico, qui tanta quiete frueris. Nobis autem huius participes esse non permillum est. Interrogante vero illo: Cur ô Hippocrates, permillum non est? Quoniam, inquam, aut agri, aut res domesticæ, aut liberi, aut viuræ, aut morbi, aut mortes, aut famuli, aut nuptiæ, aut eiusmodi quædā opportunitatem nobis commodam eripiunt. Hic sanè vir ille ad solitam adfectionem delatus est, & valde effuse risit, ac cachinnatus est. Et de cætero quiescebat. Et ego: Quid vero, inquam, Democrite rides? vtrum bona quæ dixi, aut mala? Ille vero adhuc magis ridebat. Et Abderitæ de colle id videntes, partim capita sua cadebant, partim frontem. Alij vero capillos euellebant. Nam, velut postea dixerunt, ampliorem quàm aliàs solitus esset, risum effuderat. At vero, inquam, sapientum optime Democrite, cupio causam huius tuæ adfectionis cognoscere: quo risu ego tibi dignus visus sum, aut ea quæ dixi: quo

HIPPOCRATIS

hoc cognito, à causa desistam, aut tu reprehensus, intempesti- D
 uos risus coerceas. Ille vero: O Hercules, inquit, si me re-
 prehendere potes, curationem perficies, qualem nullam vn-
 quam, ô Hippocrates. Et quomodo non reprehendaris, ô
 optime? Aut non absurdum te esse putas, dum rides homi-
 nis mortem, aut morbum, aut mentis emotionem, aut insa-
 niam, aut atram bilem, aut cædem, aut aliud quid peius? Aut
 vice versa nuptias aut festiuitates, aut liberorum procreatio-
 nem, aut mysteria, aut magistratus, aut honores, aut aliud
 quid omnino boni? Nam quorum misereri oportet, ea tu
 derides, & ob quæ lætari conueniebat, ea itidem derides,
 adeo vt neque bonû, neque malum apud te sit discretum. At
 ille: Hæc quidem, inquit, recte dicis, ô Hippocrates: sed nō E
 nouisti risus nostri causam. Vbi vero cognoueris: satis scio q̃
 meum risum, meliorem legatione medelam ac curationem,
 tuæ patriæ & tibi ipsi auferes, & alios prudentes facere po-
 teris. Et pro hoc fortassis me vicissim medicinam docebis,
 vbi cognoueris quanto studio circa res nullo studio dignas
 versantes, & ea quæ nullius precij sunt facere conantes, o-
 mnes homines vitam consumunt, risu digna tractantes. Ego
 vero: Dic, inquam, per deos, nunquid vniuersus mundus æ-
 grotare se non animaduertit? & non habet quo legationem
 demittat ad sui curationem? Quid enim extra ipsum esse po-
 terit? Ille vero excipiens: Multæ, inquit, sunt mundorum in-
 finitates, & nequaquam, ô amice, diuitem naturam maligne
 extenues. At hæc quidem, inquâ, Democrite suo tempore do- F
 cebis. Vereor enim ne fortè dū infinitatē recensēs, ridere in-
 cipias. Scias autem nunc, de tuo risu, rationē vitæ te reddere
 debere. Ille autē torue me intuitus: Duas, inquit, risus meican-
 sas esse putas, bona & mala. Ego autē vnum hominem rideo,
 dementia quidē plenum, rectis autem actionibus vacuum, in
 omnibus cōsiliis pueriliter ac stulte se gerentē, & nullius vti-
 litatis gratia labores nunquam absolundos tolerātem, fines
 terræ & infinitos recessus ex immodicis cupiditatibus pene-
 trantē, argentum & aurum quærentem, & nunquā ab his ad-
 quirendis interquiescentē: sed semper circa plura adipiscen-
 da tumultuantem, quo ipse inferior non sit, & neq; pudeat,
 si non felix appelletur. Rideo itē ipsum eo q̃ hiatū terræ ef-
 fodit manibus corū perquirēs, qui partim à laxa irruēte terra
 oppressi

A oppressi sunt, partim diutissime in hac necessitate detenti, in supplicio velut in patria permanent, argentum & aurum inquirentes, vestigia pulveris ac ramenta perferutantes, arenam aliam aliunde eruentes, & terræ venas excindentes, ad opulentiam semper glebas confluantes, ex matre terra hostilem terram, quum tamen eadem sit, facientes, & hanc admirantes pedibus calcant. Quanto vero risu dignum est, quod ærumnosam & occultam terram amant, manifestam contumelia afficientes? Alij vero canes emunt, alij equos: alij multam regionem circumscribentes, propriam sibi inscribunt: & multis imperare volentes, neque sibiipsis imperare possunt. Vxores ducunt, quas paulo post eiiciunt. Amant, deinde odio habent. Cum magna cupiditate liberos generant: deinde adultos eiiciunt. Quæ est illa vana ac absurda diligentia, nihil ab insania differens? Bellum intestinum gerunt, quietem non amplectentes. Reges alios deponunt, alios surrogant: occidunt homines: terram fodientes, argentum quarunt. Argento reperto, terram emere volunt. Empta terra, fructus vendunt: fructibus diuenditis, rursus argentum accipiunt. In quot mutationibus versantur? in quanta malicia? dum opes non habent, opes expetunt: dū habent, occultant, dissipant. Rideo, dum improbe agentes video. Intendo risum, dum infeliciter agentes cerno. Veritatis enim Leges transgrediuntur: contentionis studio hostilem inter se hitem habent, & cum fratribus, & parentibus, & ciuibus: atque ad hæc, pro eiusmodi opibus, quarum nemo, ubi mortuus est, dominus est, se mutuo occidunt. Illicitam vitam degentes, amicorum ac patriæ penuriam cōtemnunt. Res indignas & inanimatas diuitiarum loco habent: pro vniuersa opulentia statuas emunt, quoniam effigies ita expressa est, vt loqui videatur. eos vero qui vere loquuntur, odio habent. Res insuper non faciles expetunt. Nam continentem habitantes, mare cupiunt. Et rursus, cum in insulis sunt, continentem desiderant, & omnia peruertunt ad propriam cupiditatem. Et in bello quidem fortitudinem laudare videntur. Vincuntur autem quotidie à petulantia, ab auaricia. Ex omnibus adfectionibus ægrotant. Therisitæ vero vitæ omnes sunt. Cur vero mecum risum reprehendisti ô Hippocrates? Non enim quispiam suam ipsius

HIPPOCRATIS

dementiam, sed alius alterius deridet: hi quidem ebrios, cum D
 ipsi sibi sobrii esse videntur: alij vero amantes, quum ipsi
 grauiore morbo laborent: alij nauigantes: alij eos, qui cir-
 ca agriculturam occupati sunt. Non enim concordant neque
 artibus, neque operibus. Ego vero: Hæc quidem, inquam,
 vera sunt Democrite: neque alius aliquis conuenientior ser-
 mo esse poterit, ad mortalium miseriam declarandam: ve-
 rum ipsæ res sanciant necessitatem, & domesticæ dispensa-
 tionis, & nauium fabricationis gratia, reliquæ item vitæ, in
 qua necesse est hominem esse. Non enim ad ocium natura ip-
 sum genuit. Ex his autem rursus ambitio effusa, multorum re-
 ctæ sentientem animam decepit, qui omnia quidem recte ac
 serio agere student, velut re certa ac stabili futura. Non au-
 tem ita validi sunt, vt obscuritatem præuidere possint. Si e-
 nim quis ô Democrite vxorem ducens, separationem aut
 mortem timeret: aut quispiam liberos educans, ipsorum in-
 teritum: imo neque in agricultura, & nauigatione, & regno,
 & magistratu, & omnibus quæ sunt in vita, vllus vnquam de
 errore præsumpsit, sed vnusquisque horum bona spe alitur,
 deteriorum vero ne meminit quidem: nunquid igitur risus
 tuus his minime conuenit? At Democritus: Valde, inquit, tar-
 do ingenio præditus es, & longe à sententia mea abes ô Hip-
 pocrates, qui tranquillitatis & perturbationis modum non
 consideras, præ ignorantia. Si enim hæc ipsa prudenti men-
 te disponerent: & ipsi facile liberarentur, & meum risum le-
 uarent. Nunc autem, velut rebus in vita firmis, dementes il-
 li superbiunt, ob ratiocinationis expertem mentem, inor-
 dinatum impetum suum ægre discentes. Sufficiens enim ad-
 monitio ipsis esset, omnium rerum vicissitudo, quæ subitis
 mutationibus irruit, & derepente omnigenam circunrota-
 tionem inducit. At ipsi, velut hæc firma sit ac stabilis, obli-
 ti adfectionum assidue incidentium, aliter alias ea, quæ tri-
 stitiam inferunt, cupientes, & quæ non conferunt, quæren-
 tes, multis calamitatibus inuoluuntur. Si vero quis iuxta
 propriam facultatem omnia facere cogitaret: stabilem sanè
 vitam custodiret, seipsum cognoscens, & sui ipsius compara-
 tionem clare considerans, & non cupiditatis studium in in-
 finitum extendens: sed opulentiam naturam, & omnium nu-
 tricem, per sufficientiam intuens. Quemadmodum autem
 in optimo

- A** in optimo corporis habitu, adfectionum periculum manifestum est: ita successu fortunæ magnitudo periculosa est. Insignes autem palam in infelicitatibus conspiciuntur. Alij vero velut proximorum facta non videntes, à propriis malefactis pereunt, tam manifesta, quàm obscura non prauidentes, quum longam vitam exemplum habeant eorum, quæ sunt, & quæ non sunt, ex quibus etiam futurum considerare oportebat. Hæc sunt quæ mihi risus materiam præbent, ô dementes homines, prauitatis poenas pendentes, avariciæ, insatiabilitatis, inimicitiae, insidiarum, doli, inuidentiæ (difficile est enumerare multiplices malorum versutias: sunt enim infinitæ) & in his dolosis versutiis vicissim conuersantes, & maligne sentientes. At virtutis apud ipsos modus est, id quod deterius est. Mendacij enim studium exercent, voluptatem cōsectantur, legibus nō obedientes. Quidam vero ex ipsis prauidentiam in hominibus esse negat, vt qui neque visus, neque auditus participes sunt. Solus autem sensus hominis recta intelligentia lucidus, & præsens & futurum præuidet. In omnibus displicentiam habent, & rursus ad eadem accedunt. abnegata nauigatione, nauigant. reiecta agricultura, rursus agrum colunt. eiecta vxore, aliam inducunt. genitos sibi liberos sepeliunt: & his sepultis, alios generant, ac rursus educāt. Senectam optant: ad ipsam autem peruenientes, gemunt, in nullo rerum statu constantem mētem habentes. Principes ac Reges priuatum prædicant: priuatus autem regnum appetit. Qui reipub. magistratum gerit, artificem laudat, velut extra periculum constitutum: artifex autem illum, velut per omnia potentem. Rectam enim virtutis viam, puram & leuem ac inoffensam, non vident, quam nemo ingredi audet. Feruntur autem in contrariam, difficilem & tortuosam, per aspera incedentes, lapsantes ac offendentes: plerique vero excidentes, anhelantes velut si qui persequatur, litigantes, modo posteriores existentes, modo præcedentes. Et quidam ipsorum petulanti alieni cubilis corrumpendi amore ardent, per impudentiam inducti alios avariciæ morbus infinitus cōsumit, alij mutuo insidias struunt. alij ab ambitionis studio in aerē sublatis, per maliciæ grauitatem in profundum perniciæ precipites deferuntur. Quidam destruunt, deinde rursus ædificant: largiuntur, deinde pœnitentia ducti, amicitiae iura tollunt, ma-

HIPPOCRATIS

lunt, malefici per inimicitiam cognationis iura bello impetentes. Et horum omnium causa est Avaricia. Qua in re hi à pueris ludentibus differunt: apud quos consilium quidem iudicio caret: quod vero se forte fortuna obtulit, id iucundum est. At vero in desideriis quid brutis animantibus reliqui faciunt, quàm quòd intra sufficientiam fere ipsa se continent? Quis enim leo aurum in terram occuluit? Quis taurus vberioris alimenti gratia depugnauit? Quam pardalim vnquam insatiabilitas cœpit? Sitit quidem aper, sed vsque ad aquæ appetentiam. Lupus autem, deuorato necessario alimêto oblato, quiescit. Si dies ac noctes coniungat homo, non sentit cœuiuandi satietatem. Et annuorum quidem temporum ordo, terminus est brutis ad coitum: at homo perpetuo insano libidinis cœstro stimulatur. Quæso te Hippocrates, non ridere debeo plorantem propter amorem, eo, quòd commodo suo exclusus est: maxime vero si quis periculorum contemptor sit, & per præcipitia, aut pelagi profunditates feratur, risum non extendam? Non ridebo autem eum, qui nauem multis mercibus onustam demersit, deinde mari indignatur, quòd ipsam plenam submersit? Ego quidem nequaquàm mihi ridere videor. Vellem autem potius aliquid molesti contra ipsos excogitare. At neque medicinam pro his esse oportebat, neque aliquem pæonia pharmaca præparatam: atque huius rei documentum præbeat tibi tuus ille progenitor Aesculapius, qui dum seruaret homines, fulminis ictus gratiam accepit. Non vides quòd & ego malicie pars sum, dum insanix causam inquirens, animalia macto ac resëco? Oportebat autem ex hominibus causam perscrutari. Non vides quòd etiam ipse mundus odio in homines plenus est? Infinitas enim contra ipsum afflictiones accumulauit. Tectus homo ex natiuitate morbus est. Dum educatur, inutilis est, & alienum auxilium implorat. Dum crescit, proteruus, insipiens, pædagogus opus habens. Dum in vigore est, audax est. Dum decrescit, miserabilis, ubi labores suos imprudenter recolit ac iactat. Ex maternis enim vteri inquinamentis talis prodiit. Et propterea alij indignatione ac immodica ira pleni, in calamitatibus ac pugnis versantur: alij semper in adulteriis & corrupendis puellis; alij in ebrietatibus; alij in rerum alienarum cupiditatibus; alij in suis prodigendis. Utinam facultas esset nobis, vniuersorum

A uerforum habitationes reuelare, & nullum rerum in ipsis uelamentum dimittere, atque ita ea, quæ intus aguntur, uidere: uideremus utique alios edentes, alios vomentes, alios suppliciiis torquentes, alios pharmaca miscentes, alios insidias conſtruentes, alios ſupputantes, alios gaudentes, alios plorantes, alios amicos accuſantes, alios propter ambitionem amantes. Quamquam ſint quædam actiones profundiores, quæ in animo occultantur. Et ex his quidam ſunt iuuenes, quidam ſenes: petentes, negantes: pauperes, opulenti: fame preſſi, luxu grauati: ſordidi, vineti, alij deliciis diſſuentes, famulitium magnum alentes: alij trucidantes, alij ſepelientes: alij ea quæ habent contemnentes, & ſperatis poſſeſſionibus inhiantes: alij impudentes: alij parci: alij inexplebiles: alij occidentes: alij vapulantes: alij ſuperbientes: alij vana gloria elati. Et ex his aliqui apud equos ſpectatores conſiſtunt: aliqui apud viros, aut canes, aut lapides, aut ligna, aut æs, aut picturas. Et aliqui legationibus, aliqui militiæ, aliqui ſacerdotiis præſunt. Et alij coronas geſtât, aliqui armati ſunt, aliqui occiduntur. Singuli vero ex his feruntur, partim ad pugnam naualem, partim ad militiam, partim ad ruſticationem: alij ad onerarias naues, alij ad forum, alij ad concionem, alij ad theatrum, alij ad fugam, alij alio. Et rurfus, quidam ad voluptatem deliciaſq; ac intemperantiam: quidam ad ocium ac ſocordiam. Quum igitur tot indignas ac infelices animas videamus: quomodo non uitam ipſarum eiufmodi intemperantia præditam riſu exſibilamus? **Quin** & valde timeo, neq; medicinam tuam ipsis placere. Nam præ intemperantia omnia ipsis diſplicant, & inſaniam ſapientiam putant. proſecto ſuſpico pleraq; in ſciëntia tua palam contumelia adfici, aut propter inuidiam, aut propter ingrati tudinem. Aegrotantes enim ſimul ut ſeruantur, cauſam diis aut fortunæ attribuunt. Plerique vero ſuæ naturæ hoc adſcribentes, benefactorem odio habent, & parum abeſt ut indigne ferant, ſi debitores eſſe putentur. Sed & plerique artis ignorantiam in ſeipſis habentes, & imperiti exiſtentes, id quod melius eſt, purgant. Inter ſtupidos enim ſunt ſuffragia, & neque ægroti atteſtari volunt, neque eiufdem artis artiſces teſtimonium præbere. Inuidia enim obſtat. Non autem inexpertus es tu talium nugarum: imo probe ſcio, ob hæc te ſæpe in memorabilibus adſiſſio-

HIPPOCRATIS

afflictionibus accersitum fuisse, & neque causam, aut in- **D**
uidiam libenter derisisse. Veritatis enim neque cognitio
ylla est, neque vllum testimonium. Hæc autem cum dice-
ret, subridebat, & mihi, ô Damagete, diuina specie appare-
bat, & velut qui priorem suam formam exuisset. Et ego: O
magnifice Democrite, inquam, magna xenia & hospitali-
tatis tuæ munera, in Co mecum auferam. Multa enim me sa-
pientiæ admiratione impleuisti, Discedo enim veritatis tuæ
præco, qui humanam naturam inuestigasti ac considerasti.
Quum autem mentis meæ medelam à te acceperim, ab eo
nunc tempore hoc expetente, itemque corporis curatione.
Cras vero, & deinceps, hoc loco rursus conueniemus. Atque
hæc loquutus, surrexi. Et ille paratus erat me sequi. Cum ve- **E**
ro quidam accederet, haud scio vnde, tradebat ipsi libros. Et
ego cōcitati⁹ festinaui, & ad Abderitas in specula me exspe-
ctantes: Viri, inquam, pro legatione vestra ad me, magna sit
vobis gratia. Vidi enim Democritum virum sapientissimum
qui solus potentissimus est homines prudentes facere. Hæc
habui Damagete, quæ de Democrito valde magna animi læ-
ticia tibi recensere volui. Vale.

Democritus Hippocrati felicitatem.

Accessisti ad nos velut insanos, ô Hippocrates, veratrū
nobis daturus, persuasus à viris stolidis, apud quos la-
bor virtutis insania iudicatur. Tunc autem de mundi dispo- **F**
sitione, & de polis ac astris cœlestibus scribebamus. Cum ve-
ro horum naturam cognouisses, quòd omnia valde commo-
de essent creata, & quòd procul ab insania ac desipientia
abessent: meam quidem naturam laudasti: desipientes au-
tem & crudeles ac furiosos illos iudicasti. Nam quæ simula-
chris per aerem vagantia nos decipiunt, quæ sanè mundus
esse comprehenduntur, & vicissitudinem habentia creata
sunt: ea mens mea, naturā perscrutata, vere in lucem pro-
duxit. Cuius rei testes sunt libri à me conscripti. Oportebat
igitur te, ô Hippocrates, cum viris eiusmodi moribus præ-
ditis minime congregi ac conuersari, quorum mens super-
ficiaria & inconstans est. Si enim ab illis persuasus, mihi, ve-
lut insano, veratrum bibendum dedisses, prudentia insania
facta

- A** facta fuisset: & artem tuam reprehendissent velut quæ insan-
niæ fuisset causa. Veratrum enim sanis datum, mèti tenebras
offundit. Insanis autem valde prodesse consuevit. Arbitror
equidem, si non deprehendisses me scribentem, verum re-
cumbentem, aut fortè deambulantem, & mecum colloquen-
tem, & nunc quidem indignantem, nunc vero ridentem, ob
ea, quæ mente reuoluam, & familiaribus me alloquentibus
non attendentem, sed cogitatione instantem, & mirum in
modum speculantem: putassem sanè Democritum, iuxta o-
culorum iudicium, ex his, quæ vidisses, insanix imaginem
præ se ferre. Oportet igitur Medicum non solum visu adfe-
ctiones iudicare, sed etiam re ipsa: & rythmos ac consonan-
tias vt plurimum indagare: & vtrum incipiat morbus, aut
medium teneat aut desinat, perscrutari: & differentia, ac
anni tempore & ætate obseruata, adfectionem curare: item-
que totius corporis naturam considerare. Ex his enim om-
nibus facile morbum inuenies. Porro remisi ad te de insa-
nia tractationem à te conscriptam. Vale.

Hippocratis Coi, de insania scriptum.

- Q**uemadmodum in libello de morbo sacro dixi, Insani-
enti necesse est præ humiditate cerebrû, in quo animæ
sunt opera, moueri: vbi videlicet humidius q̃ pro
natura fuerit. Eo vero cōmoto, neque visum, neque auditum
quiescere: sed aliàs alia & videre, & audire: & linguam ta-
lia loqui, qualia singulis vicibus viderit ac audierit. Quan-
Cdiu vero cerebrum quieuerit, tamdiu etiam homo sapit. Fit
autem corruptio cerebri à pituita & bile. Vtriusque vero co-
gnitio sic contingit. Etenim qui à pituita insaniunt, quieti
sunt, & non vociferantur, neque tumultuantur. Qui vero à
bile, percussores sunt, & malefici, ac non quieti. Et si quidem
assidue insant, hæ causæ sunt. Si vero terrores & timores
fuerint, à transmutatione fiunt, cerebro à bile calecente
quæ ad ipsum per venas sanguinarias procedit. Cum autem,
bilis discesserit rursus in venas, etiam corpus quiescit. Tri-
statur autem & angitur homo, & præter temporis rationem
obliuiosus fit, dum cerebrum à pituita perfrigeratur, & præ-
ter solitum morem compingitur. Postquam vero cerebrum
derepète

HIPPOCRATIS

derepente à bile calefactum fuerit, sanguine in prædictis venis effervescente: insomnia vident horrenda, & facies velut in vigilante flammescit, & oculi rubescunt, & mens aliquid mali operari cogitat. Atque hoc in somno homo patitur. Cum autem sanguis rursus ad venas dispersus fuerit, quiescit. Porro in quinto popularium morborum libro quendam recensui, cui fiebat vocis interceptio, ignorantia, frequentes delirationes, & reversiones. Lingua autem dura, & nisi collatione usus esset, loqui non poterat, & plerumque etiam valde amara. Venæ sectio exsoluit, aqua potus, aqua multa, veratrorum potiones. Hic ubi modicum tempus superuixisset, mortuus est. Erat & alius quidam, quem, ubi noctu ad coniuiuium progredere, timor tibi cinæ corripiebat, ubi audiret ipsam tibia canentem. Interdium vero audiens, nihil patiebatur.

Hippocrates Democrito felicitatem.

Artis Medicæ recta facta, ô Democrite, plerique è vulgo hominum non omnino laudant, verum Diis sæpe attribuunt. Si vero natura reluctata perdiderit eum, qui curatur: medicos reprehendunt, numen prætereuntes. Et ego sanè mihi videor, maiorem reprehensionem quàm honorem artis me assequeutum esse. Ego enim ad finem Medicinæ non perueni, etiam si iam senex sum. Neque enim ipsius inuentor Aesculapius, sed & ipse in multis à seipso dissensit, quem admodum nobis scriptorum libri tradiderunt. Proinde epistola à te ad nos missa, veratri medicinam reprehendebat. Inductus equidem sum, ô Democrite, velut insanienti veratrum daturus, non perscrutatus qualis quis tandem esses. Ubi vero tecum congressus, cognoui non per Iovis desipientiæ opus, sed fermè omni laude ac commendatione dignum, valde laudavi naturam tuam, optimumque naturæ ac mundi interpretem te indicaui. Eos vero qui me induxerunt ad te, velut insanientes reprehendi. Nam ipsi medicamento opus habebant. Quandoquidem igitur casus nos in idem coniunxit, recte feceris si ad nos frequentius literas dederis, & libros à te conscriptos impertiueris. Misi autem etiam ipse tibi de veratri usu libellum. Vale.

Hippocratis

A

His qui non facile sursum purgantur, ante potionem corpora prahumectare oportet uberiore alimēto & quiete. Vbi vero quis bibit veratrum, ad motus corporum magis ducere, quā ad somnos. Declarat autem nauigatio, quod motus corpora turbat. Cum veratrum magis ducere uoles, corpora moueto. Veratrum periculosum est sanas carnes habentibus. Quicumque in pharmacorum potionibus non sitiunt, dum purgantur, non cessant purgari prius quā siterint. Convulsio ex veratro, lethale. In nimia purgatione, convulsio aut singultus succedens, malum. In turbationibus ventris, & vomitibus spontaneis, si qui dem qualia purgari oportet, purgentur, conducit, & leuiter ferunt. Sin minus, vice versa. Quemadmodum autem in prænotionibus dixi, purgatio sursum versus commodat ei, in quo sine febre est cibi fastidium, aut stomachi punctura, aut vertigo, aut os amarum, & in summa doloribus supra septum transuersum: at deorsum versus, ubi sine febre est tormen, lumborum dolor, genuum grauitas, menses ægre prodeuntes, dolores in partibus sub septo transuerso. Vitare uero oportet in pharmacorum potionibus eos, qui bona habent corpora, maxime autem nigros, & humida carne præditos, sed & subscos, & balbos, ac blæfos. Quicumque uero inflammati in principio morbi, uelut in libello de ptisana dixi, statim medicamento soluere aggrediuntur, hi de eo quidem quod distentum est ac inflammatum, nihil auferunt: neque enim remittit qui crudus est adfectus. Ea uero quæ morbo resistunt, & sana sunt, consumunt. Corpore uero debili fiente, morbus superat, & immedicabile malum habent. Cæterum veratrum his dare oportet, quibus de capite fluxus fertur. Non autem dandum est pectore suppuratis. Neque medicamenta danda sunt decoloratis, rauosis, lienosis, exsanguibus, spirituosis & siccum tussientibus, siticulosi, flatuosi, & his qui præcordia, & latera, ac dorsum distenta habent, & torpentibus, & obscure uidentibus, & quibus aurium sonitus sunt, & urinae meatus impotentibus: neque item morbo regio laborantibus, aut uentre debilibus, aut his qui sanguinis eruptiones aut tubercula habent. Si uero medicandum esse uidebitur,

veratro

HIPPOCRATIS

veratro securus sursum purga, deorsum vero nō. Optimū autem his est viſus rationem cōſtituere. Quemadmodum autem in prædictionibus dixi, non sunt medicamenta danda his qui nigra euomunt, neque cibum auerſantib⁹, neque deliris & parum dormientibus, neque dolore vexatis, neque viſum temerarium inclinatum habentibus, neque tumefactis, neque vertiginosis, neque decoloratis, neque his qui in febre æſtuoſi ſunt ac confracti. Sicut autem de ptiſana dixi, ſeſamoides ſursum purgat. potio eius eſt drachma dimidia in aceto mulſo trita. Commiſcetur etiam veratris tertia portionis pars, & minus ſuffocat. Purgat item quartanas diurnas, & diurna febris lypyria vexatos: & eos, in quibus non eſt ſitis, neque excretio. Hos vero non ante tres hebdomadas. Aliquando etiam pleuriticos ac voluuloſos. Et ſicut in muliebribus morbis dixi, purgandum eſt etiam ſi vteri purgatione opus habuerint.

Hippocrates ad Theſſalum filium.

AD cognoscendam Geometriam & numerorum ſcientiam, mi fili multum ſtudij adhibeto. Non enim ſolum vitam tuam illuſtrem, & ad multa commodam, in humanarum rerum ſtatu efficient: ſed etiam animam acutiorem & clariorem reddent, ad omnium, quorum uſus in medicina expetitur, vtilitatem conſequendam. Etenim Geometriæ cognitio, quæ multiformis ac varia eſt, & omnia cum demonstratione trāſigit, vtilis erit & ad oſſium ſitus, & ad exarticulationes, & reliquum membrorum ordinem. Nam ad multiplicem horum adfectionem, & articulorum luxatorum repositione, & oſſium contritorum reſectione, & perforatione, & compositione, & exemptione, ac reliqua curatione, maiore induſtria vretur quiſquis nouerit qualis eſt locus, & quale eſt os, quod ex eo eluxatum eſt. At vero numerorum ratio, & ad circuitus, & ad tranſmutationes febrium præter rationem ſientes, & ad iudicia ægrotantium, ac ſecuritatis in morbis, ſufficiens erit. Præclara enim res eſt, tale miniſterium in medicina habere, quod tibi partes intenſionis ac remiſſionis, cum ex parte inæquales fuerint, facile cognobiles exhibet, citra errorem. Quapropter ad huiusmodi experientia

A perientiae facultatem peruenire sedulo stude. Vale.

Democritus Hippocrati, De natura humana.

- O** Mnes homines artem medicam nosse oportet, ô Hippocrates. Est enim res honesta simul ac utilis ad vitam: & ex his maxime eos, qui eruditionis ac eloquentiae cognitionem habent. Nam sapientiae cognitionem medicinae sororem ac contubernalem esse puto. Sapientia enim animam ab adfectibus liberat: medicina vero morbos à corporibus aufert. Augescit autem intelligentia, praesente sanitate: cuius providentiam habere, honestum est, eos qui recte sentiunt.
- B** At ubi corporis habitus ægrotat: neque mens ipsa alacritatem habet ad virtutis meditationem. Morbus enim praesens animam vehementer obscurat, intelligentiam ad adfectionem per consensum ducens. Cæterum naturæ humanæ descriptio, eiusmodi speculationem habet. Cerebrum quidem supremam corporis partem custodit, & securitatis tutelam sibi commissam habet, intra membranas nervosas cohabitans. Super quod duplicatorum ossium naturæ necessariae firmata, dominum mentis custodem, ipsum cerebrum tegunt. Pilorum decor est, cutem ornare. Oculorum vero vis visiva in multiplici tunica latitans, ob humoris instantias, sub frontem in medellam collocata est, & est videndi causa. Pupilla vero syncera, palpebræ marginem opportunitatis custodem sustinet.
- C** Duplices autem nares olfactum dinoscentes, oculorum vicinitatem dirimunt. Mollis vero labiorum contactus os circumplicans, verborum sensum, exactamque articulationem gubernans exhibet. Mentum autem in extremitatem desinens, ac lyrae simile, dentium clavis coaptatum est. At sermo receptacula aures, opifex aperuit: in quibus dum est sermo, non certus temeritatis minister existit. Loquelæ mater lingua, animæ nuncius, gustum custodiens, munitis dentium septis custodita est. Guttur autem & Gula inter se cōiuncta, vicina sunt. Illud enim in viam spiritus: hæc in profundum ventris, alimentum demittit, large id propellens. Regium vero cor, cono ac pinæ nuci simile, irā nutriens, aduersus omnes insidias thoracem induit. Frequenter autem flatuum ca-
- Yy uernæ,

HIPPOCRATIS

uerna, aere per ipsas erumpente, vocis causam flatu pariunt. **D**
 Quod vero sanguinem suppeditat, & in alimētum transmutat, cum apicibus saepe vena caua circumfluunt, hepar est, concupiscentia causa. Viridis autem bilis iuxta hepar manens, ubi superebullit, humani corporis corruptio est, & nociuus ac inutilis corporis humani inquilinus. Veruntamen vice versa dormit, nullum negotium exhibens. Inter hæc autem medius omnia suscipiens venter chorum ducit, & accumbit: concoctionem gubernans. Obnoxia vero ventris compositioni, per opificium conuoluta, circum ventrem euoluuntur intestina, adumptionis & excretionis causa. Gemini autem rhenes in coxis firmati, & pinguedine intecti, ab urinarum excretionem non sunt alieni. At dominus totius ventris, qui **E**
 Omentum vocatur, totum ventrem complectitur, solo splene excepto. Consequenter, nervosa vesica in coxa osculum firmatum habens, venis complicatis, urinarum excretionis causa est. Huic autem vicina mater puerorum, vehemens illud malum, infinitarum ærumnarum in muliere causa, vterus ipse latitat. Pylorus autem siue lanitor, ex coxarum recessu emergens caro, nervis adstringitur. Verum de plenitudine naturæ ventris effundit, ex opificij prouidentia. Porro extra corpus pensiles domum incolunt, ad generationem destinati, conditores testiculi, multis tunicis præditi. Iucundum ex venis ac nervis plicamentum est: pubes, quæ urinarum effusionem facit, & ad coitus ministerium à natura creata est, & pubertatis appetentiam regit. Crura vero & brachia, **F**
 & extremæ partes his annexæ, totum ministerij principium coaceruatæ habentes, tatum neruorum ministerium perficiunt. At vero incorporea in recessibus natura, omnifaria viscerum genera fabricauit. Quæ sanè mors instans, celeriter à ministerio quæta reddit.

Hippocrates Caus, Demetrio regi gaudium.

NOS equidem etiam prius, ô rex, studio habentes naturæ humanæ partes in summa considerare, has conscriptas quemadmodum voluisti demisimus. Nunc autem ea, quorum maxime studiosos esse oportet prudētes, partim à prioribus

Aribus transumpta, partim nunc per nos ipsos comperta, tibi conscripsimus. Quæ si tu priorum morborum signis fientibus sequutus, & iisdem sæpe vius fueris: per omne vitæ tempus morborum exsors esse poteris. Duo sunt morborum vniuersorum animalium genera, alterum secundum genus, alterum secundum affectionem, inter se dissimilia. At vero concupiscentias iuxta alimentum, ex subcontrariis cognosces, dum ea quæ euacuantur, indicant ea quæ plena sunt: & quæ implent, coniecturam præbent eorum quæ vacua sunt. Morbos autem omnes ex subcontrariis constitutos cognosces, & morbos à morbis fieri. In conuulsionibus febris succedens, sistit morbum: capitis autem dolores, sanguis ex auribus erumpens, aut ex naribus. Conuulsionibus omnibus morbis atræ bilis succedentes, atram bilem sedant. Et in summa, radix humanorum morborum est caput, & maximi morbi ex hoc accedunt. Quum enim ori velut cucurbita medica incumbat: contingit, vt ipsum omnium eorum, quæ ingeruntur, superfluitates attrahat, & tenues humores. Oportet autem animum aduertere, & peculiariter viuere, vbi te ipsum preparaueris in has partes, quo morbi accidentes nullum augmentum capiant, per curam diligentem & per bonum ordinem apud te fientem: ita vt neque rei veneræ intemperantia, neq; diuersorum eduliorum incontinentia, neq; somnis immodicis, inexercitato corpore vtaris: sed signa in corpore contingentia sequare, & vniuscuiusq; corporis occasionem conserues: quo morbum irruere parantem vites, & medelis, quas ego perscribo, vtens, à morbis exsors perseueres. Vale.

Decretum Atheniense.

Visum est ac decretum Senatui & populo Atheniense. Quandoquidem Hippocrates Cōs Medicus, & ab Aesculapio originem ducens, magnam beneuolentiam vnâ cum salute Græcis ostendit, quan- lo etiam peste à Barbaris in Græciam proficiscente, discipulis suis ad locos dimissis, indicauit quibus medelis vtī oporteat, & accedentem pestem secure effugere, quo medicina Græcis data, ipsorum aegrotos tuto seruaret. Sed & scripta sua de arte medica ex-

HIPPOCRATIS

acta edidit, multos esse volens Medicos qui seruare possent. **D**
 Et Persarum rege ipsum accersente, & honores optimatibus
 Persarum æquales promittente, & dona quæcunque tandem
 ipse Hippocrates veller offerente, Barbari promissiones
 contempsit, eo quod hostis & communis inimicus Græcis
 esset. Quo igitur appareat, populum Atheniensem sem-
 per ea quæ vilia sunt Græcis consultare: & vt gratiam con-
 dignam Hippocrati pro benefactis referat: visum est po-
 pulo, ipsum publice magnis mysteriis initiare, quemadmo-
 dum Herculem filium Iouis: & coronare ipsum corona au-
 rea mille aureorum: & ipsam coronam Quinquatriis ma-
 gnis Mineræ festis, in certamine gymnico per præconem
 proclamare. Et licere omnibus Coorum liberis, vt Athe-
 nis pubescant, quemadmodum liberi Atheniensium: quan-
 doquidem patria ipsorum huiusmodi virum genuit. Esse ve-
 ro Hippocrati, & vitam, & victum prouisum in Pritaneo
 per omnem vitam. **E**

Oratio Hippocratis ad aram consistentis.

O Vos multi & multarum urbium habitatores, in magna
 dignitate constituti, communi nomine Thessali, om-
 nibus hominibus amara necessitas incumbit, vt quæ à fati-
 statura sunt ferant. Quapropter ego nunc cedens cum ea so-
 bole, oleæ ramulis coronatus, ad Mineræ aram supplex
 consisto. Quis sim, ignorantibus dicere oportet. Hippo-
 crates, ô viri, medicus Cous, non per piam & honestam **F**
 causam, meipsum & liberos meos vobis commendo. Co-
 gnoscitis me ô plebs. Nam profecto vos estis viri mihi fa-
 miliares, inter quos, vt verum dicam, inter plerosque vestrum
 & in multis urbibus vestris cognitus sum, vt in summa di-
 cam. At vero nomen meum longe vltcrius, quàm formæ meæ
 aspectus, processit. Atque hæc causa ex arte mea sanitatis ac
 vitæ ortum habuisse videtur, quod non solum hominibus ve-
 stram regionem habitantibus, sed etiam multis Græcis vobis
 vicinis cognitus sum. Iam vero qua de causâ tantum nego-
 cium opere peragendum adsumpsi, referam. Athenienses ma-
 le habebunt, ô viri Thessali, qui Metropolim ac patriam no-
 stram

Astram Co deuastantes, in seruitutem redigunt ea, quæ libera sunt ex progenitorum acquisitione, priuatim sibi parta facientes: neque cognationem reueriti, quæ ipsis est ab Apolline & Hercule, quæ sanè ad Aenium & Sunium filios illorum peruenit, neque Herculis malorum domitoris beneficia mente recolunt, quæ ille communis & vobis & nobis benefaciens deus, in illos contulit. At vos per Iouem supplicationibus colendum, & per cognatos deos, egredimini, vindicete, liberate, propriæ virtutis memores, & nihil ad gloriam vestram spectans intermittentes.

Oratio Legati Thessali filii Hippocratis, ad Athenienses.

Conuenire arbitror viri Athenienses, constitutum apud vos, qui non omni multitudini cognitus est, primò indicare quis sit, & vnde sit: postea verò reliquam orationem persequi. Mihi equidem pater est Hippocrates: qui quantam in medicina facultatem habeat, vos nouistis. Nomen autè est Thessalus. Cognitus verò & ego sum nò in postremis, neque paucis vestrū. Patria verò mihi est Cos: quæ quomodo vobis cognata sit ab antiquo, alij dicunt, qui in recensenda historia sunt præstantiores. Veni autem missus à patre, quatuor beneficia à nobis in vos collata prolaturus. Primum quidem vetus quoddam, tempore progenitorum nostrorum commune in omnes Amphictyonas, quorum vos non minima pars estis. Alterum verò illo adhuc maius, & ad plurimos Græcorum progressum. Atque hæc quidem vrbis & progenitorum meorum esse apparebunt. Tertium autem patris proprium est, & tantum, quantū nemo vnus vir, & vobis & multis Græcis cōtulit. Postremum verò ex quatuor cōmune est patris & meū, & quod non ad plures, sed ad vos ipsos peruenit. Quod quidem priorum beneficiorum comparatione exiguum videri poterit: verum ad aliorum beneficia collatum, magnum est. Et sanè huiusmodi beneficia sic se habent, quemadmodū esse dixi, vt summatim dicam. Oportet autè non solum dicere, sed etiā demonstrare quòd vera sunt. Principiū igitur sermonis, ipsum ministeriorum nostrorum principium faciam.

Yy iij Vetu-

Exordii & docilitate.

Amphictyones.

Narratio.

HIPPOCRATIS

Crisæi.

Pythicum

templum.

Locri.

Crisæorum

calamitas

quanta.

Destilctia

obsidentiu

summa.

Vetustissima vero primum referam : in quibus fortassis longiora ac altius repetita me dicere deprehenderitis. At quisque vetus dici expetit. Erat enim tempus quando Crisæa gens erat, & habitabat quidem circa pythicum templum : terram vero habebat, quæ sanè nunc Apollini consecrata est. Appellatur autem Crisæus quidem campus, iuxta quem Locri habitant, & cui Melæna adiunt: Cirrhæus vero mons, cui Phocæses adiacent. Hi porro Crisæi cum essent aliquando populosi, & fortes, & opulenti, his bonis ad malum vsi sunt. Per insolentiam enim multa horrenda ac iniqua facta perpetrarunt, in deum impietatem exercentes, Delphos in seruitutem redigentes, vicinos deprædantes, agricolas spoliantes, vxores ac liberos abducentes, & corpora ipsorum constuprantes. Quade causa Amphictyones ira commoti, & exercitu in terram ipsorum inducto, & ipsis pugna deuictis, regionem deuastarunt, & vrbes expugnarunt. Vbi sanè illi, qui multa & impia perpetrarunt, misere accepti sunt, non minores pœnas persoluentes, quàm ipsi aliis intulerant. Felicissimi vero ex ipsis fuerunt, qui intra manus hostium perierunt. Secundo loco, qui manu capti sunt, & qui ad aliam regionem ac vrbes transfuerunt, Sua enim mala ob oculos non habuerunt. Qui vero ex captiuis isthic manserunt, infelicissimi fuerunt, quicumque in sua ipsorum regione torquebantur. Nam cum vxoribus & liberis, agros & vrbes igni tradi videbant. His vero adhuc peius degebant hi, qui intra mœnia perseuerabant, quando relata mala partim videbant, partim percunctabatur, plura veris audientes. Sic enim fieri solet. Et sanè malam salutis spem habebant. Erat autem ipsis vrbs prope hunc locum maxima, vbi nunc certamen equestre peragitur : cuius muros exstruxerant, & eos qui ex aliis vrbibus transfugerant, exceperant. Inutilia vero eiecerant, & necessaria importauerant. Et cogitabant obsidionem sustinere, bona spe præditi, neque manuum pugna, neque longi temporis obsidione, urbem capi posse. At vero Amphictyones, tum alia deuastarunt, tum ad hanc urbem præsidio constructo, & ad expugnationem præparato, reliquum exercitum per vrbes dimiserunt. Temporis autè progressu, cum pestis in exercitum illapsa esset, & milites ægrotarent: quidam vero etià morerentur; alij vero, propter morbum,

A morbum, præsidium reliquissent: Amphictyones turbabantur. Et alij alia consultabant. Solet autem in rebus communibus sic ferè fieri. Tandem vero afflictionem moleste ferentes, & de bello desperantes, deo rem commiserunt: & quid facere oporteret, interrogauerunt. Ille vero bellum gerere iussit, & victores fore promittebat, si ad Co profecti, cerui filium in auxilium adducerent, cum auro: atque hoc festinabundi, vt ne Crisei prius in adyto tripodem deprædarentur. Sin minus, urbem capi non posse. Ipsi vero, his auditis, & ad Co profecti, oraculum proposuerunt. Cum autem Coi dubitarent, & oraculum non intelligerent: surrexit vir genere quidem Asclepiades, progenitor autem noster, Medicus vero Græcorum eius temporis omnium confessione optimus: nomen autem ipsi erat Nebrus: qui oraculum dicere inquit, vt ad se ipsum venirét. Nam Deus, inquit, admonuit vos, vt profecti ad Co, cerui filium in auxilium adducatis. Cos equidem hæc est. Cernorum autem filij Nebri appellâtur, hoc est, hinnuli. Nebrus autem est mihi nomé. Quod vero aliud auxilium potius contigerit exercitui ægrotanti, quàm medicus? Et profecto non videtur mihi id consequens esse, quòd in tantum diuitiis Græcos omnes superantes, deus ad Co proficisci iusserit, & aureum numisma petere. Verum hoc oraculum in meam domum progreditur. Chryfos enim, hoc est aurum, vocatur masculus meus filius nati minimus. Est autem omnino & corporis specie, & animi virtute, quantum patri dicere licet, inter omnes ciues præcellens. Ego quidem igitur, nisi vobis aliud videatur, & ipse proficiscar, & filium mecum adducam, nauæ quæ quinquaginta remis agatur instructa meis sumptibus & ministertis medicis ac bellicis referta, quo in vtrâque partem auxilium feramus. Et hic quidem dixit: illi vero approbauerunt, qui missi fuerunt. At Nebrus hic etiam virum Calydoniam apud se educatum, in nauæ adsumpsit: de quo statim, vbi res tulerit, dicemus. Cum igitur peruenissent hi viri ad castra, Deus gaudebat. Nam & mortes militum cessabât, & eû diuina fortuna equus Eurylochi (qui belli dux erat, Thestius salus genere, & ex Heraclidis ortum duceus) canalem, per quem aqua in urbem ducebatur, vngula percussisset, vbi in puluere volutari voluisset: Nebrus aquam medicamentis infecit,

Yy iij vade

*Apollinis
responsum*

Nebri.

Chryfos.

Calydoni.

Euryloch.

HIPPOCRATIS

unde ventres Criseorū corrupti sunt:& sanè multum contu-
lit ad hoc vt ciuitas caperetur. Atq; hinc iam animi obsiden-
tium elati sunt, velut deo iam manifeste auxilium ferente.
Cum autem impetus facerent,& præmia proponerēt his qui
primi muros conscendissent: certamen erat fortissimum, &

Chrysus vrbs capiebatur. Primus enim muros conscendit Chrysus, &
primus mu turrim occupauit. Sequebatur autem ipsum eueffugio vir ille
et conscen Calydonius, sub communi scuto auxilium ferens, de quo an-
dit. tea dixi. Et Chrysus quidem hasta percussus cecidit ex sum-

Mermo- ma turri: percussus est autem à Mermode Lyci fratre, qui la-
des. pidibus obrutus mortuus est, cum in adytum irrupisset tripod-
em deprædaturus. Hi igitur ciuitatem sic cœperunt: & Nebri
auxilium cum Chryso, & secundum medicam, & secundum
bellicam facultatem recte successit:& deus vera dixit,&

Templum quæ promiserat fecit. Qua de causa Amphictyones Apollini
Apollinis. quidem templum consecrarunt, quod nunc est in Delphis:&
Equestre certamen gymnicum ac equestre prius non peragētes, nunc
certamen. peragunt: & Criseorum regionem vniuersam dicarunt deo
contributori, reddentes ea quæ dedit in eo quòd oraculum
dedit. Et Nebri filium Chrysum in circo equestri sepelierūt:

Chrysi se- & Delphis publice ipsi parentare præceperunt. Asclepiadis
pultura. vero in Co attributa est prudentia vaticinandi, quemadmo-
dum his qui mittūtur ex vrbibus ad sacrum Amphictyonum
concilium: atque hoc Nebri gratia. Calydoniis autem ab illo
viro & illo ministerio, etiam nunc in Delphis primæ vatici-
nandi partes, & alimenta dantur. Verū redeo ad nostra. Nam
quod vera dico, hinc clarum est. Cum enim pater & ego acces-
sissemus, Amphictyones hæc renouarunt, & attribuerunt, &
in columna descripta in Delphis dedicauerunt. Atque huius
quidem sermonis finis clare ostendit, nostros progenitores
esse vestros benefactores. Cæterum hoc relicto, alium de iis-
dem, non eundem sermonem, adsumam. Cum enim magnus
ille rex cum Persis & aliis Barbaris bellū gereret contra Græ-
cos, qui aquam & terram non dedissent: patria nostra maluit
in totum pessundari, vt ne contra vos, & eos qui vobiscū sen-
tirēt, hostilia arma sumeret, & in nauibus militarem expedi-
tionem mitteret. Sed abnuuit, honestum quid & dignum pa-
tribus meditata, qui Gigantes & Heraclidæ esse dicuntur. Vi-
sum

- A** sum igitur est ipsis, cum quatuor essent muri in insula, omnes relinquere, & ad montes confugere, & salutē tutari. Vnde sanē quid nō mali obuēnit? dum regio fuit deuastata, & corpora libera mancipata, & hostili lege occisa, & vrbs & alia munita, ac templa, ad fauillam exusta. Insuper autē & filia Lygdamis Artemisia, circa patrum victoriam datum est, omnia quæ reliqua essent expiscari ac exportare. Atenim, velut apparet à diis non sumus neglecti: verum tempestatibus ingentibus exortis, & naues Artemisia omnes in periculo fuerunt, & multæ perierunt: & in exercitum ipsius multa fulmina inciderunt, quum insula nostra paucis fulminibus impeteretur. Dicitur etiam spectra Heroum mulieri conspecta esse. Quorum sanē omnium timore perterrefacta, ab immedicabilibus cœptis destitit. amara confessione facta, quæ & relatu amara est. Quare omittatur. Attribuam autem & hic progenitoribus meis propriissime minime falsa, quod neque contra vos, neque contra Lacedæmonios, aliōsq; Græcorum socios, Coi voluntaria arma sumpserint: & quidem quum multi tum insulas, tum Asiam habitantes, cum Barbaris in bello coniuncti fuerint, nulla violentia coacti. Equidē præfecti vrbs tunc fuerūt Cadmus & Hippolochus. Verū autem est, & Cadmum & Hippolochum meos progenitores esse. Nam Cadmus, qui & Senatū regebat, matris meæ progenitor est: Hippolochus vero ex Asclepiadis, quartus à Nembro, cuius auxilio Crisæi sunt deuastati. Nos autē ex virili genere Asclepiadæ sumus.
- C** Quare & hoc bonum à progenitoribus nostris profectū amplectimini. Redeo ad Cadmum. Hic sanē vir ad eō commodi Græcorum studiosus fuit, vt cum regio ab Artemisiæ obsidione liberata esset, isthic relicta vxore ac sobole, abiuerit cum his qui eadem sentirent in Siciliam, quo Gelonem & fratres eius prohiberet, ne amicitia cum Barbaris contraherent contra Græcos. Perpetrauit & alia multa egregia facta, quæ longius producere non est tempestiuum. Atque hæc quidem & huiusmodi multa sunt publica progenitorum nostrorum in vos & alios Græcos beneficia. Nam deficit me dicendi facultas. Venio autem iam ad hoc, vt beneficium Hippocratis patris mei apud eos, qui id sciunt, producam: quod hoc modo recensens, vera dicere cognoscar. Cum pestis ex Barbaria adfueret,

*Artemisia
Lygdamis
filia.*

*Cadmus,
Hippolochus.*

Gelon.

HIPPOCRATIS

Pestilentia fluere, quæ supra Illyrios ac Præonas sita est, & cum malum **D**
Illyrica. in hanc regionem venisset: harum gentium Reges ad famam
 medicam, quæ vera erat, & vndiquaque processerat, & ad pa-
 trem meum, nuncios miserunt in Thessaliam (illic enim pa-
 ter meus & prius, & nunc domum habet) vocantes ipsum ad
 auxilium ferendum. Et non solum argentum, & aurum, & a-
 lias opes se missuros esse receperunt: sed etiam reportaturum
 esse quæcunque ipse veller, si auxilium tulisset. Ipse vero cum
 interrogasset quales motus partiales fierent, & æstus, ac ven-
 tos, & caligines perscrutatus, itémq; alia quæ habitus ex præ-
 senti statu commouere solent: cum sanè omnia didicisset, il-
 los quidem retro discedere iussit, & nullam sibi facultatem
 esse ad illorum regionem proficiscendi, pronunciauit. Verum
 ipse quàm citissime Thessalis denunciare studuit, quibus mo- **E**
 dis malum accedens cauere: & medelam conscriptam per
 vrbes proponebat. Me vero in Macedoniam demisit. Cum re-
Dracon gibus enim Heraclidarum, qui isthic imperium obtinent, pa-
Thessali terna nobis intercedit amicitia. Et ego quidem ibam à Thes-
frater. salia eo, quo me pater iussit, auxilium his qui isthic essent la-
 turus. Inuixit autem mihi vt etiam vrbi vestræ opem fer-
 rem. At fratrem meum Draconem ex Pagasis profectum, in
 Helespontum nauigare iussit, consimili consilio instructum,
 quali etiam ipse utebatur. Non enim omnes loci eadem au-
 xilia ferunt, eo quod non omnis ambiens nos aer similis est.
Polybius. Polybium vero, qui filiam ipsius, meam autem sororem ha-
 bet, & alios discipulos, ad alios aliorum cōuentus & vias pro-
 fecturos emisit, quo quàm plurimis opitularetur. Postquam au- **F**
 tem ipse res in Thessalia perfecit, ad vicinas gentes auxilium
 laturus proficiscebatur, & ad Pylas profectus, Doriensibus,
 & aliis, simulque Phocensibus auxilium tulit. Et cum sanè ad
 Delphos peruenisset, supplicationem deo pro Græcis fecit:
 & sacrificio factò, iter ad Boetos arripuit. Et cum ipsis opem
 tulisset, similiter ad vos progressus est, & sufficientia vobis ad
 salutem, quæ sanè nunc ego produco, ex animo penitus di-
 xit. Arbitror autem multos vestrum nosse, quod vera dico.
 Non enim ita diu est, sed nonus hic est annus, quando abiui,
 & in Peloponesum missus sum, isthic habitantibus opem la-
 turus. At vero vndiquaque nobis, & verbis, & re ipsa, di-
 gnus

Agnus honor contigit, ut minime poeniteat nos, quod non hunc cum quaestu ex Illyricis ac Pæonibus oblato permutauimus. Verum præ reliquis ciuitatibus magna sunt quæ à vobis data sunt. Nam & respublica vestra alias excedit. Athenæ enim alius quiddam sunt aliis vrbibus, quantum ad gloriam attinet. Et corona illa antea in vestro theatro patri imposita, ad summam æmulationem ac felicitatem ipsum euexit. Sed & hoc beneficium superastis, dum & patrem, & me publice Cereris & Proserpinæ mysteriis ac sacris initiastis. Atque hæc quidem tria sunt beneficia, quantum ego verbis consequi potui, & fracta voce proferre, vrbis, & progenitorum, & patris mei, in vos simulque multos Græcos. Quantum nunc dicere aggrediar, quod, velut antea dixi, in vos ego & pater meus collocauimus. Cum enim Alcibiadem emitteretis in Siciliam, multa quidem potentia, non autem ita multa, velut admiranda: & sermo in concione incidisset de Medico, quem exercitum sequi oporteret: pater meus progressus, me ad curanda corpora vestra se daturum esse promisit, propriis sumptibus instructum, & citra mercedis exactionem, quam diu classis abesset, paruipendens suam vtilitatem, ut qui sibi persuassisset, hoc in vestrum commodum cessurum esse. Ego enim non solum res meas insumebam, id quod faciebam vobis inferuiens: sed etiam ad alia magna opera destinatus fui. Et hoc minimum est ex his, quæ sum dicturus. Decreuit enim pater ob me filium fortunæ fluctibus agitari, & in terra aliena, & in mari, & in periculis bellicis, & in ægritudinibus, quæ his qui erroneam vitam degunt, magis accedere solent, quam his qui ordinatæ vitæ rationem habent. Nouit enim beneficium beneficio metiri: & non, velut qui aliquid emisset, contractu ex manu in manum facto semel, discedere. Et hic quidem talia prestitit. Ego vero, ut qui filius illius sum, nihil studij & artis prætermisi, auxilium ferens, & periclitatus vobiscum, si quando occasio tulisset. Et ad hæc ambo præstanda, neque morbus, neque afflictio, neque timor in mari, & intra hostium manus, me prohibuit. Testes autem huius rei non alios aliquos, sed vos ipsos habeo. Quare si quis contradicere volet, is nihil cunctatus exurgat. Verum non puto me mentiri. Cum autem hæc præstitissem ad annos tres,

& au-

HIPPOCRATIS

& aurea corona coronatus, & adhuc pulchrius laudatus: domum redij ad nuptias, quo & artis, & generis nostri successores producerem. Et quæ quidem à ciuitate, à progenitoribus, à patre, & à me, vobis obtigerunt, hæc sunt. Dictum est autem & quæ nos à vobis oblata tulimus. Arbitror autem multos è vobis admirari, qua de causa hæc à me ex tam longinquo principio repetita sunt. Quo igitur & vos cognoscatis, & mihi ea quæ cupio contingant: tempestiuum est ut hoc dicam. Pater meus, ô viri Athenienses, & ego petimus vos (sic enim liberos & amicos loqui decet, quo id quod petunt ab amicis liberis consequantur) contra patriam nostram hostilia arma ne sumatis. Si vero oportet, quemadmodum fortassis oportet eos, qui sua ipsorum causa progressi sunt, etiam rogamus, ut ne nos, qui eiusmodi & tam magna beneficia in vos priores contulimus, seruorum loco habeatis. Insuper autem (nam & sic dicere conueniet) supplicamus, ut ne nostra faciatis vobis ipsis in bello captiua, si contigerit ut multo inferiores superetis. Verum & hoc considerate, quod fortuna alias alia cito versat: & aliquando magni paruis opus habuerunt: & fortes per debiles salutem adepti sunt. Puto autem clarum esse, ut ne clarissimum dicam, quod ob vnum virum non ciuitas, sed multe gentes iam quandoque vtilitatem in rebus bellicis consequuntur. Et ubi ars in precio est, neque nos contemnere poteritis. Nam neque ita viles ac contemnendi sumus, quemadmodum in vobis testimonium situm est. Verum ab initio quidem dei, unde genus nostrum esse gloriamur, Aesculapius & Hercules in hominum vtilitatem prognati sunt. Et hoc propter virtutem, quam hic exercuerunt, omnes deorum loco habent. Vrbs autem mea, & ego qui ad vos verba facio, ad tales originem nostram referimus, quemadmodum sanè hominum traditiones habent. Vnde profecto etiam pro Græcis ambo hac parte, & in omni bono, ad ipsos tutandos stetisse apparebimus. Non enim fabula sunt res ad Troiam gestæ, sed factæ, in quibus Cos cum insulis suis non minima, sed maxima ad ferendum auxilium existit. Sic vero etiam Aesculapij filij, non arte solum, sed etiam armis, Græcis auxilium tulerunt. Machaon equidem animam in Troade

Aesculapius, Herculesque homines uti iuuarent, potissimum nati sunt.

- A** Troade deposuit, quando, velut scriptores de his prodentes dicunt, ex equo in Priami urbem venit. Proinde neque eo quod contribules, neque eo quod ex auxiliatorum numero, auxiliares etiam ipsi Græcis sumus, nos iniuria adfeceritis. Non in longum extendam sermonem, res Crisæorum, aut Persicas iterum repetendo, quando & ipsas audiuitis, & in manibus magis sunt, quàm ea quæ pauloante relata sunt. Quin & sic cogitate, minime pium esse benefactores iniuria adficere. Nos autem benefactores esse, facta ipsa clamant. Ex quibus patribus prognati esse videbimini (quemadmodum fabulatores dixerunt) si iniuria adficere, quàm benigni esse malueritis? Neque enim amarulentius quicquam dicere volo. Illi enim, o viri Athenienses, Heraclidis quidem gratias rependerunt. Aliis autem multis, beneficio adfecti, vicissim auxiliati sunt. Deficiat profecto me dies longius narrantem, si recensere velim quot hominibus quanta bona obuenerint, qui nihil de vobis bene meriti fuerunt. Circumspicite vos ipsos, & me nullo dicente, considerate qualia perpetratis. Mala res est potestas, o viri Athenienses. Non enim quæ sua sunt, mensura disponere nouit. Sed & vrbes quasdam & gentes iam perdidit. Si vero ad alios velut in speculum respexeritis, videritis ipsi quæ facitis, & ego vera dico. Quin & lex noua est: Quicumque felici rerum successu confusus, non etiam ad rerum difficultates respicit: Non est hoc vestrum viri Athenienses. Multum enim etiã sic Deum tætaretis. Nullam vobis iniuriã intulimus. Si vero etiã intulimus: nõ armis, sed verbis iudicemur. Deprecamur autem vos etiam hoc, vt ne faciatis nos aliis gratiam debere. qui nobis auxilium ferent. auxilium enim nobis ferent, si recte fecerint, & qui intra Thessaliam, Argos, Lacedæmonia, Macedoniam, sunt reges, & sicubi alij Heraclidæ, aut Heraclidarum cognati habitant. Præstat citra violentiam, quàm vi coactos facere quæ iusta sunt. Non dico de insolenti aduersum vos rebellionem: verum hoc vobis manifestum facio, quod multi nostri curam gerunt, aut certe curam habebunt, nisi vndiquaque de terra perierit, benignos adhuc esse homines. Ego quidem igitur, exiguae enim mihi sunt ad dicendum vires, vtpote qui aliarum rerum studio sim additus,

HIPPOCRATIS EPISTOLAE.

dictus, hic definam. Rogo autem vos per hospites nostros, & per eos qui nobis consiliarij esse consueverunt, & per Deos, & Heroas, ac gratias, quæ hominibus ab hominibus contingunt, vt inimicitias quidem vestras aduersum nos deponatis: ad amicitiam vero vos conuertatis. Si enim non in vestra ciuitate hæc consequemur: haud scio quo progressi, eorum, quæ cupimus compotes fiamus.

HIPPOCRATIS COI OPERVM
quæ ad nos extant omnium finis, Ia-
no Cornario medico phy-
sico interprete.



P A R I S I I S.

*Excudebat Carola Guillard, sub Sole
aureo, uia ad diuum Iacobum.*

M D X L V I.